

Portrait sociosanitaire de la population  
CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent

# Description du milieu socioéconomique et déterminants de l'état de santé



**Agence de la santé  
et des services sociaux  
de Montréal**

**Québec**




Santé publique





# Portrait sociosanitaire de la population CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent

Description du milieu socioéconomique et déterminants de l'état de santé



*Michèle A. Dupont  
Jean Gratton  
James Massie*

*Octobre 2006*

**Une réalisation du secteur Planification, orientations et évaluation  
Centre universitaire de santé McGill, mandataire.**

Michèle A. Dupont

Agent de recherche – Équipe de surveillance

Jean Gratton

Agent de recherche – Équipe de surveillance

James Massie

Technicien – Équipe de surveillance

**MISE EN PAGE**

Karine Bruegghe

Secrétaire – Planification, orientations et évaluation

Linda Larouche

Secrétaire – Planification, orientations et évaluation

**INFOGRAPHIE**

Javier Valdés

Infographe – Équipe de l'information

**Portrait sociosanitaire de la population, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent**

**Série de quatre cahiers**

*1 - Description du milieu socioéconomique et déterminants de l'état de santé*

*2 - Santé mentale des jeunes*

*3 - Santé mentale des adultes*

*4 - Perte d'autonomie liée au vieillissement*

© Direction de santé publique

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (2006)

Tous droits réservés

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2006

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2006

ISBN : 2-89494-527-2 (version imprimée)

ISBN : 2-89494-528-0 (version PDF)

Prix : 15 \$ pour la série de quatre cahiers

**Agence de la santé  
et des services sociaux  
de Montréal**

**Québec**



**Santé publique**

# TABLE DES MATIÈRES

---

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>INTRODUCTION</b> .....                                                                                                           | 11 |
| <b>POPULATION DU CSSS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE—SAINT-LAURENT</b> .....                                                              | 13 |
| DESCRIPTION SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION .....                                                                               | 13 |
| CONDITIONS DE VIE DANS LE TERRITOIRE DU CSSS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE—SAINT-LAURENT ....                                            | 16 |
| Défavorisation matérielle et sociale .....                                                                                          | 16 |
| Conditions de vie des jeunes .....                                                                                                  | 20 |
| Capital économique: la propriété .....                                                                                              | 22 |
| <b>ESPÉRANCE DE VIE</b> .....                                                                                                       | 24 |
| <b>IMMIGRATION ET SANTÉ</b> .....                                                                                                   | 25 |
| <b>DÉTERMINANTS DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION</b> .....                                                                       | 26 |
| CAUSES DE MORTALITÉ ET D'INCAPACITÉ .....                                                                                           | 27 |
| FACTEURS DE RISQUE: AGIR EN AMONT .....                                                                                             | 31 |
| HABITUDES DE VIE .....                                                                                                              | 33 |
| <b>QUELQUES DÉFINITIONS</b> .....                                                                                                   | 37 |
| <b>ANNEXE – RÉPARTITION DE LA POPULATION DU TERRITOIRE DU CSSS D'AHUNTSIC ET MONTREAL-NORD PAR<br/>SECTEUR DE RECENSEMENT, 2001</b> |    |



## LISTE DES FIGURES

---

|                  |                                                                                                                                                                  |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figure 1</b>  | Pyramides des âges, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, 2001, 2011, 2021 .....                                                                          | 15 |
| <b>Figure 2</b>  | Proportion de la population selon le niveau de défavorisation matérielle, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, Montréal et reste du Québec, 2001 .....   | 18 |
| <b>Figure 3</b>  | Proportion de la population selon le niveau de défavorisation sociale, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, Montréal et reste du Québec, 2001 .....      | 19 |
| <b>Figure 4</b>  | Proportion des familles avec enfants de moins de 18 ans vivant sous le seuil de faible revenu, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, 2000 .....           | 21 |
| <b>Figure 5</b>  | Proportion des 15-24 ans ne fréquentant pas l'école, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, 2001 .....                                                     | 21 |
| <b>Figure 6</b>  | Proportion des logements occupés par un propriétaire ou un locataire, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, 2001 .....                                    | 22 |
| <b>Figure 7</b>  | Proportion des ménages propriétaires ou locataires consacrant 30 % ou plus de leur revenu pour se loger, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, 2001 ..... | 23 |
| <b>Figure 8</b>  | Espérance de vie à la naissance selon le sexe, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, 1998-2002 .....                                                      | 24 |
| <b>Figure 9</b>  | Estimation de l'incidence des déterminants de la santé sur l'état de santé de la population.....                                                                 | 26 |
| <b>Figure 10</b> | Principales causes des années de vie ajustées sur l'incapacité, économies de marché établies, 1990 .....                                                         | 29 |
| <b>Figure 11</b> | Années vécues avec une incapacité selon la cause, économies de marché établies, 1990 .....                                                                       | 30 |
| <b>Figure 12</b> | Répartition des décès associés aux principaux facteurs de risque.....                                                                                            | 31 |
| <b>Figure 13</b> | Répartition des années vécues avec une incapacité attribuable aux principaux facteurs de risque .....                                                            | 32 |
| <b>Figure 14</b> | Répartition des années de vie ajustées sur l'incapacité attribuable aux principaux facteurs de risque .....                                                      | 32 |





## LISTE DES TABLEAUX

---

|                  |                                                                                                                                                                                               |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tableau 1</b> | Répartition des ménages et des familles, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, 2001 .....                                                                                              | 14 |
| <b>Tableau 2</b> | Répartition de la population selon l'âge, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, 2006 .....                                                                                             | 14 |
| <b>Tableau 3</b> | Répartition en nombre et en pourcentage de la population par quintile de défavorisation matérielle, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, Montréal et reste du Québec, 2001 .....      | 17 |
| <b>Tableau 4</b> | Répartition en nombre et en pourcentage de la population par quintile de défavorisation sociale, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, Montréal et reste du Québec, 2001 .....         | 18 |
| <b>Tableau 5</b> | Familles avec enfants de moins de 18 ans vivant sous le seuil de faible revenu selon la structure familiale, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, 2000 .....                          | 20 |
| <b>Tableau 6</b> | Enfants vivant dans des familles sous le seuil de faible revenu selon l'âge des enfants, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, 2000 .....                                              | 20 |
| <b>Tableau 7</b> | Principales causes de décès, années de vie perdues (AVP), années vécues avec une incapacité (AVI) et années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY), économies de marché établies, 1990 ..... | 28 |
| <b>Tableau 8</b> | Proportion de la population selon certains facteurs de risque pour la santé et selon le sexe et l'âge, Montréal, 2003 .....                                                                   | 33 |
| <b>Tableau 9</b> | Niveau d'activité physique de loisir selon le sexe, 18 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2003 .....                                                                                | 35 |



## **POINT DE MÉTHODE**

***L**es taux et les proportions présentés dans ce document sont parfois calculés à partir d'effectifs inférieurs à la population visée. Il s'agit donc d'estimations qui peuvent être soumises à des variations aléatoires et présenter une certaine imprécision. Ainsi, afin de permettre la comparaison entre les valeurs estimées pour ce CSSS et celles de l'ensemble de l'île de Montréal, un test statistique permet de déterminer si la valeur obtenue dans un CSSS est semblable ou différente de celle de Montréal, et ce, 19 fois sur 20. Dans les tableaux et les figures, les estimations (taux ou proportions) se rapportant aux CSSS sont donc marquées d'un plus (+) ou d'un moins (-) selon qu'elles sont statistiquement plus élevées ou plus faibles que la valeur correspondante pour Montréal. Ce sont ces résultats présentant des différences significatives qui ont été retenus pour la majeure partie des faits saillants.*



## INTRODUCTION

---

Le projet clinique des CSSS soutiendra l'implantation de neuf programmes de services. En appui à cette démarche, nous avons préparé une série de quatre cahiers thématiques réunissant des informations de nature descriptive sur la santé de la population en fonction des trois programmes de services suivants : santé publique, perte d'autonomie liée au vieillissement de la population, santé mentale des adultes et celle des jeunes. Le présent cahier vise plus particulièrement le programme de santé publique; il contient des informations générales sur la population du territoire. Il complète les cahiers destinés aux autres programmes de services.

Dans la première section se trouve une description de la population du CSSS fondée sur ses caractéristiques sociodémographiques et ses conditions de vie. L'espérance de vie de la population du CSSS dans son ensemble et dans chacun de ses secteurs fait l'objet de la section suivante: outre le fait qu'elle indique le niveau de mortalité dans une population, c'est aussi un indicateur de son état de santé général. Ensuite, la question de l'immigration et de la santé est traitée afin de comprendre comment un territoire réunissant un nombre élevé d'immigrants — lesquels connaissent des conditions économiques souvent précaires — présente une espérance de vie élevée, alors que le profil classique chez une population défavorisée est une espérance de vie inférieure à la moyenne. Enfin, étant donné l'incapacité que génèrent certaines maladies et les possibilités d'agir en amont de celles-ci, une réflexion sur ces questions et une brève présentation des habitudes de vie des Montréalais constituent la dernière section.

Les données présentées ici proviennent pour une part du recensement de 2001, du fichier des décès, de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2003) et, pour le reste, d'une publication de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).



## POPULATION DU CSSS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE—SAINT-LAURENT

---

### DESCRIPTION SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE LA POPULATION<sup>1</sup>

Au recensement de 2001, la population du CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent représentait 7 % de la population de Montréal. Soixante-trois pour cent des ménages y étaient alors familiaux, c'est-à-dire constituées de familles avec enfants et de couples sans enfant (tableau 1). Ce CSSS devrait compter environ 134 000 personnes en 2006 (tableau 2). Entre 2006 et 2011, on estime la croissance de sa population à 6,9 %, comparativement à 3,7 % pour l'ensemble de Montréal. Plus précisément, on prévoit une augmentation de 6,3 % des jeunes de moins de 15 ans, de 7,5 % des 15-64 ans et de 5,1 % des 65 ans et plus.

En 2001, près de la moitié de la population du CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent était formée d'immigrants. Parmi les 12 CSSS de la région, il se classe au 1<sup>er</sup> rang en importance pour la proportion d'immigrants sur son territoire. Avec 58 235 immigrants, il se situe au 2<sup>e</sup> rang en nombres absolus.

Une projection de la répartition par âge et par sexe de la population recensée en 2001 — construite à travers les pyramides des âges pour les années 2001, 2011 et 2021 — permet de comparer la structure de la population de ce CSSS à trois moments dans le temps et d'en percevoir l'évolution (figure 1). De 2001 à 2021, on note un léger élargissement de la base de la pyramide, surtout aux âges correspondant à l'adolescence, de même qu'au sommet. C'est une population qui croît dans le temps, et ce, pratiquement à tous les groupes d'âge. Rappelons que c'est la fécondité qui détermine principalement l'allure générale de la pyramide des âges et non la mortalité ou les mouvements migratoires. Les projections de population sont établies à partir de diverses hypothèses de fécondité, de mortalité et de mouvements migratoires faites par l'Institut de la statistique du Québec

---

<sup>1</sup> Notez que le secteur du Nord de l'Île a repris dernièrement son ancien nom de Bordeaux-Cartierville. Nous n'avons pu faire le changement à temps pour la publication du document.

**Tableau 1 Répartition des ménages et des familles, CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, 2001**

| Ménage ou famille                        | CSSS<br>de Bordeaux-Cartierville - St-Laurent |     | CLSC               |                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|--------------------|-----------------|
|                                          | n                                             | %   | Nord de l'île<br>n | St-Laurent<br>n |
| Ménages                                  | 50 320                                        | 100 | 21 275             | 29 045          |
| Ménages familiaux*                       | 31 865                                        | 63  | 13 230             | 18 635          |
| Ménages non familiaux                    | 18 455                                        | 37  | 8 040              | 10 415          |
| Ménages d'une seule personne             | 16 625                                        | 33  | 7 275              | 9 350           |
| Autres ménages                           | 1 830                                         | 4   | 765                | 1 065           |
| Familles avec enfants                    | 21 540                                        | 100 | 9 050              | 12 490          |
| Familles avec enfants de moins de 18 ans | 13 980                                        | 100 | 5 635              | 8 345           |
| Biparentales                             | 11 135                                        | 80  | 4 400              | 6 735           |
| Monoparentales                           | 2 845                                         | 20  | 1 235              | 1 610           |
| Couples sans enfant                      | 11 175                                        | 100 | 4 540              | 6 635           |

\* Les ménages familiaux se composent d'au moins une famille, parfois de deux ou plus.  
C'est pourquoi le nombre total de ménages familiaux peut être inférieur au nombre de familles.  
Celles-ci comprennent des familles avec enfants et des couples sans enfants  
Source : Statistique Canada, recensement de 2001

**Tableau 2 Répartition de la population selon l'âge, CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, 2006**


| Catégorie d'âge | CSSS<br>de Bordeaux-Cartierville - St-Laurent |              | CLSC               |                 |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
|                 | n                                             | %            | Nord de l'île<br>n | St-Laurent<br>n |
| Moins de 5 ans  | 8 189                                         | 6,1          | 3 265              | 4 924           |
| 5-11 ans        | 10 768                                        | 8,0          | 4 173              | 6 595           |
| 12-17 ans       | 8 883                                         | 6,6          | 3 373              | 5 510           |
| 18-24 ans       | 11 402                                        | 8,5          | 4 603              | 6 799           |
| 25-44 ans       | 39 536                                        | 29,5         | 16 110             | 23 426          |
| 45-64 ans       | 31 357                                        | 23,4         | 12 896             | 18 461          |
| 65 ans et plus  | 23 913                                        | 17,8         | 10 076             | 13 837          |
| 65-74 ans       | 11 266                                        | 8,4          | 4 898              | 6 368           |
| 75-84 ans       | 9 275                                         | 6,9          | 3 808              | 5 467           |
| 85 ans et plus  | 3 372                                         | 2,5          | 1 370              | 2 002           |
| <b>Total</b>    | <b>134 048</b>                                | <b>100,0</b> | <b>54 496</b>      | <b>79 552</b>   |

Source : ISQ, janvier 2005, Projections de population d'après Statistique Canada, recensement 2001




**Figure 1** Pyramides des âges, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, 2001, 2011, 2021


**2001**



**2011**



**2021**



Source : ISQ, janvier 2005, Projections de population d'après Statistique Canada, recensement 2001

## CONDITIONS DE VIE DANS LE TERRITOIRE DU CSSS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE–SAINT-LAURENT

Les comportements des gens, leur patrimoine génétique, l'accès à des traitements et à des soins sont autant d'éléments qui agissent sur leur santé et donc sur la durée de leur vie. D'autres facteurs contribuent à expliquer les variations parfois considérables de l'état de santé et de la longévité. En effet, les conditions de vie de la population constituent l'un des principaux déterminants de la santé et du bien-être. Ces conditions créent des inégalités qui proviennent de ce que nous possédons ou ne possédons pas : des biens (maison, voiture, actions, etc.), un revenu d'emploi ou d'autres sources, des relations sociales, un diplôme, des habiletés à nous exprimer et à nous faire comprendre, des connaissances, etc. Ces conditions font en sorte que des individus vivent dans certains environnements social et physique plutôt que dans d'autres; ces environnements agissent à leur tour sur l'état de santé et donc sur la longévité des gens.

La défavorisation dans le territoire du CSSS et ses secteurs de CLSC, la proportion de familles et celle d'enfants vivant sous le seuil de faible revenu et la propriété sont autant de mesures complémentaires pour décrire la situation socioéconomique propre à ce CSSS.

### *DÉFAVORISATION MATÉRIELLE ET SOCIALE*

L'indice de défavorisation matérielle et sociale est un résumé des facteurs qui conditionnent la vie matérielle (chômage, revenu, diplomation) et la vie sociale (situation conjugale, familiale et résidentielle) des gens. La défavorisation matérielle est proche de la notion de pauvreté, tandis que la défavorisation sociale rend compte d'une certaine fragilité du réseau social ou de l'isolement des gens. De nombreuses études ont montré que ces deux formes de défavorisation sont étroitement liées à la mortalité générale et à la mortalité due à des causes spécifiques, à l'espérance de santé, aux traumatismes, etc.

Les gens défavorisés le sont relativement aux membres qui constituent leur société : ici, les seuils de défavorisation ont été fixés en fonction de l'ensemble de la population du Québec. Avec cet indice, la population est répartie en cinq niveaux de défavorisation qui correspondent chacun à un quintile (20 %). Le quintile 1 regroupe les plus favorisés de la population et, à l'inverse, le quintile 5 représente les plus défavorisés.

Pour en savoir plus sur la confection de l'indice de défavorisation, consulter le site Internet suivant :  
<http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/index.php>

## FAITS SAILLANTS

- ✦ La défavorisation matérielle touche 22 % de la population du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. C’est presque le quart des résidants du secteur Saint-Laurent et moins du cinquième de ceux du Nord de l’Île qui sont dans cette situation (figure 2 et tableau 3).
- ✦ La défavorisation sociale y est beaucoup moins importante que la défavorisation matérielle, ce qui distingue nettement la situation de ce territoire de celle de Montréal. En fait le secteur Saint-Laurent ne compte que 8 % de sa population dans le quintile le plus défavorisé socialement, mais cette proportion grimpe à près de 40 % quand on tient compte du quintile 4. Le secteur Nord de l’Île a quant à lui une plus forte proportion (22 %) de gens favorisés socialement que l’ensemble du territoire du CSSS et que Montréal (figure 3 et tableau 4).
- ✦ Les personnes doublement défavorisées sont encore plus vulnérables que les autres. Ce CSSS en compte 3015, qui résident toutes dans le secteur Nord de l’Île. Environ 8000 personnes sont au contraire doublement favorisées et la très grande majorité d’entre elles sont aussi dans ce secteur.

**Tableau 3 Répartition en nombre et en pourcentage de la population par quintile de défavorisation matérielle, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, Montréal et reste du Québec, 2001**


| Territoire                                | Nombre                   |               |               |               |                            |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
|                                           | Quintile 1<br>(favorisé) | Quintile 2    | Quintile 3    | Quintile 4    | Quintile 5<br>(défavorisé) |
| <b>Bordeaux-Cartierville - St-Laurent</b> | <b>27 465</b>            | <b>22 757</b> | <b>21 217</b> | <b>22 905</b> | <b>26 372</b>              |
| Nord de l'île                             | 13 060                   | 6 807         | 9 097         | 11 511        | 9 687                      |
| Saint-Laurent                             | 14 405                   | 15 950        | 12 120        | 11 394        | 16 685                     |
| Montréal                                  | 493 060                  | 322 650       | 286 180       | 297 845       | 347 560                    |
| Reste du Québec                           | 921 140                  | 1 092 900     | 1 128 645     | 1 116 808     | 1 067 810                  |

| Territoire                                | %                        |             |             |             |                            |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
|                                           | Quintile 1<br>(favorisé) | Quintile 2  | Quintile 3  | Quintile 4  | Quintile 5<br>(défavorisé) |
| <b>Bordeaux-Cartierville - St-Laurent</b> | <b>22,8</b>              | <b>18,9</b> | <b>17,6</b> | <b>19,0</b> | <b>21,8</b>                |
| Nord de l'île                             | 26,0                     | 13,6        | 18,1        | 22,9        | 19,3                       |
| Saint-Laurent                             | 20,4                     | 22,6        | 17,2        | 16,1        | 23,6                       |
| Montréal                                  | 28,2                     | 18,5        | 16,4        | 17,0        | 19,9                       |
| Reste du Québec                           | 17,3                     | 20,5        | 21,2        | 21,0        | 20,0                       |

Source : [http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/pop2001\\_matclsc8.xls](http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/pop2001_matclsc8.xls)

**Figure 2** Proportion de la population selon le niveau de défavorisation matérielle, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, Montréal et reste du Québec, 2001



Source : [http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/pop2001\\_matclsc8.xls](http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/pop2001_matclsc8.xls)

**Tableau 4** Répartition en nombre et en pourcentage de la population par quintile de défavorisation sociale, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, Montréal et reste du Québec, 2001


| Territoire                                | Nombre                |               |               |               |                         |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
|                                           | Quintile 1 (favorisé) | Quintile 2    | Quintile 3    | Quintile 4    | Quintile 5 (défavorisé) |
| <b>Bordeaux-Cartierville - St-Laurent</b> | <b>20 357</b>         | <b>18 450</b> | <b>35 412</b> | <b>29 865</b> | <b>16 632</b>           |
| Nord de l'île                             | 11 212                | 6 385         | 13 379        | 7 975         | 11 212                  |
| Saint-Laurent                             | 9 145                 | 12 065        | 22 034        | 21 890        | 5 420                   |
| Montréal                                  | 211 805               | 182 795       | 254 155       | 464 705       | 633 835                 |
| Reste du Québec                           | 1 202 495             | 1 232 460     | 1 161 015     | 949 993       | 781 340                 |

| Territoire                                | %                     |             |             |             |                         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|                                           | Quintile 1 (favorisé) | Quintile 2  | Quintile 3  | Quintile 4  | Quintile 5 (défavorisé) |
| <b>Bordeaux-Cartierville - St-Laurent</b> | <b>16,9</b>           | <b>15,3</b> | <b>29,3</b> | <b>24,7</b> | <b>13,8</b>             |
| Nord de l'île                             | 22,4                  | 12,7        | 26,7        | 15,9        | 22,4                    |
| Saint-Laurent                             | 13,0                  | 17,1        | 31,2        | 31,0        | 7,7                     |
| Montréal                                  | 12,1                  | 10,5        | 14,5        | 26,6        | 36,3                    |
| Reste du Québec                           | 22,6                  | 23,1        | 21,8        | 17,8        | 14,7                    |

Source : [http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/pop2001\\_socclsc8.xls](http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/docs/defav/pop2001_socclsc8.xls)

**Figure 3** Proportion de la population selon le niveau de défavorisation sociale, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, Montréal et reste du Québec, 2001



## CONDITIONS DE VIE DES JEUNES

## FAITS SAILLANTS

- ✦ En 2000, parmi les familles avec des enfants de moins de 18 ans, près d'une famille sur trois ayant un couple à sa tête vivait sous le seuil de faible revenu dans le CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent; c'était une sur deux dans le cas des familles monoparentales. Ce CSSS, comme chacun de ses secteurs, connaît une situation légèrement défavorable en comparaison de Montréal, puisqu'une proportion significativement plus élevée de familles avec des enfants de moins de 18 ans y vivent sous le seuil de faible revenu (tableau 5 et figure 4).
- ✦ Les jeunes faisant partie d'une famille monoparentale sont proportionnellement plus nombreux que les autres à vivre une situation de pauvreté. Ce sont les plus jeunes (0-5 ans) qui sont les plus touchés, et ce, tant dans les familles biparentales que monoparentales (tableau 6).
- ✦ Une proportion plus faible (28 %) de jeunes de 15 à 24 ans de ce CSSS que celle (32 %) des jeunes Montréalais du même âge ne fréquente pas l'école. Les proportions sont pratiquement les mêmes selon les deux secteurs de CLSC (figure 5).

**Tableau 5 Familles avec enfants de moins de 18 ans vivant sous le seuil de faible revenu selon la structure familiale, CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, 2000**

| Territoire                                | En couple    |             | Monoparentales |             | Total        |             |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
|                                           | n            | %           | n              | %           | n            | %           |
| <b>Bordeaux-Cartierville - St-Laurent</b> | <b>3 595</b> | <b>32,3</b> | <b>1 525</b>   | <b>53,6</b> | <b>5 120</b> | <b>36,6</b> |
| Nord de l'île                             | 1 335        | 30,4        | 690            | 55,9        | 2 025        | 36,0        |
| Saint-Laurent                             | 2 260        | 33,6        | 835            | 51,9        | 3 095        | 37,1        |


Source : Statistique Canada, recensement de 2001

**Tableau 6 Enfants vivant dans des familles sous le seuil de faible revenu selon l'âge des enfants, CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent, 2000**


|                              | 0-5 ans      |             | 6-17 ans     |             | 0-17 ans      |             |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
|                              | n            | %           | n            | %           | n             | %           |
| <b>Enfants</b>               | <b>4 095</b> | <b>45,6</b> | <b>6 205</b> | <b>38,6</b> | <b>10 300</b> | <b>41,1</b> |
| Dans familles biparentales   | 3 235        | 41,7        | 4 250        | 33,7        | 7 485         | 36,7        |
| Dans familles monoparentales | 830          | 69,7        | 1 860        | 56,3        | 2 690         | 59,8        |
| Autres                       | 30           | 100,0       | 95           | 67,9        | 125           | 73,5        |

Source : Statistique Canada, recensement de 2001

**Figure 4 Proportion des familles avec enfants de moins de 18 ans vivant sous le seuil de faible revenu, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, 2000**



**Figure 5 Proportion des 15-24 ans ne fréquentant pas l'école, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, 2001**




## CAPITAL ÉCONOMIQUE: LA PROPRIÉTÉ

La propriété et l'état du logement sont une autre manière d'avoir une idée du capital économique de la population du CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent.

## FAITS SAILLANTS

- La proportion de logements occupés par leur propriétaire est plus élevée dans ce CSSS qu'à Montréal: 40,2 % par rapport à 35,8 %. La proportion de propriétaires devant consentir un effort important (30 % ou plus de leur revenu) pour le paiement de leur propriété est semblable à celle des propriétaires montréalais, soit 20 % (figures 6 et 7).
- Proportionnellement, les locataires sont moins nombreux dans ce territoire qu'à Montréal, mais ils sont proportionnellement plus nombreux à consacrer au moins 30 % de leur revenu au paiement de leur loyer (soit 40 % d'entre eux, comparativement à 37 % à Montréal) (figure 9).
- Au recensement de 2001, 3 240 logements privés nécessitaient des réparations majeures dans ce CSSS (6,4 % du parc de logements privés par rapport à 8,5 % à Montréal), soit 1410 dans le secteur Bordeaux-Cartierville (6,6 %) et 1830 (6,3 %) dans le secteur Saint-Laurent. Vingt-cinq pour cent nécessitaient des réparations mineures et le reste, un entretien régulier.


**Figure 6 Proportion des logements occupés par un propriétaire ou un locataire, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, 2001**



(-) (+) Significativement inférieur ou supérieur à Montréal  
Source : Statistique Canada, recensement 2001



**Figure 7** Proportion des ménages propriétaires ou locataires consacrant 30 % ou plus de leur revenu pour se loger, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, 2001



(-) (+) Significativement inférieur ou supérieur à Montréal  
 Source : Statistique Canada, recensement 2001


## ESPÉRANCE DE VIE

La maladie affecte la longévité. Les différences de santé entre les gens sont souvent exprimées par une mesure : l'espérance de vie. Celle-ci correspond au nombre moyen d'années que peut espérer vivre une personne soumise aux conditions de mortalité de la période d'observation considérée. De manière générale, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. L'espérance de vie des Montréalais varie selon leur secteur de résidence, ce qui illustre les différences de l'état de santé entre les sous-groupes qui composent cette population.

### FAIT SAILLANT

- ✦ Dans le CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, l'espérance de vie des femmes comme celle des hommes sont significativement supérieures à celle des Montréalaises et des Montréalais. C'est aussi le cas pour chacun de ses secteurs de CLSC (figure 8).

**Figure 8** Espérance de vie à la naissance selon le sexe, CSSS de Bordeaux-Cartierville—Saint-Laurent, 1998-2002



(-) (+) Significativement inférieur ou supérieur à Montréal

Sources : MSSS, fichier des décès, 1998-2002; ISQ, janvier 2005, Projections de population d'après Statistique Canada, recensement 2001

## IMMIGRATION ET SANTÉ

---

Si les conditions de vie déterminent largement l'état de santé d'une population, on ne s'étonnera pas d'apprendre que l'espérance de vie des résidents du secteur Lac Saint-Louis dans l'ouest de l'île — l'un des secteurs les plus favorisés au Québec — soit supérieure à celle de l'ensemble des Montréalais. On ne sera pas davantage surpris de savoir que les résidents de Pointe Saint-Charles dans le sud-ouest de l'île — l'un des secteurs les plus défavorisés au Québec — vivent moins longtemps que les autres Montréalais. Alors comment comprendre que l'espérance de vie des résidents de Parc-Extension, qui constituent la population la plus défavorisée au plan matériel de toute l'île, soit par contre plus élevée que celle de l'ensemble des Montréalais?

Une bonne partie de l'explication de ce paradoxe se trouve dans la composition même de la population de ces deux derniers secteurs : Parc-Extension comptait 58 % d'immigrants en 2001, Pointe Saint-Charles, 5 %. Or, pour obtenir la résidence permanente canadienne, un immigrant économique, comme ses parents qui viendront le rejoindre en vertu du regroupement familial, doit obligatoirement répondre à certains critères de sélection. Celui d'avoir un bon état de santé physique et mental est essentiel à l'acceptation de son entrée en tant que résident permanent. Seuls les réfugiés peuvent être admis sans satisfaire à cette exigence. C'est pourquoi dans le domaine de la santé, il importe de distinguer les réfugiés et les migrants économiques, les premiers pouvant constituer un sous-groupe vulnérable. Par ailleurs, on parle également d'autosélection de la part des immigrants parce qu'en général, la décision d'émigrer repose sur le fait d'être jeune, en bonne santé et d'avoir une bonne capacité d'adaptation.

Autrement dit, le fait d'avoir des immigrants sur son territoire constitue un gain pour la santé de la population canadienne en général et de la population montréalaise en particulier. En effet, plusieurs études ont mis en évidence l'écart entre l'espérance de vie et l'espérance de vie sans incapacité (dite aussi espérance de santé) des immigrants et celles des Canadiens de naissance. Cela tient à une prévalence moins élevée de problèmes de santé chroniques ou d'incapacités (autoévaluation) et de dépression majeure chez les premiers que chez les derniers.

Cependant, des changements de l'état de santé sont observés chez les immigrants au fur et à mesure que s'accroissent leurs années vécues au Canada. Une étude longitudinale a notamment montré que les immigrants non européens sont plus nombreux à déclarer une détérioration de leur état de santé que les autres, et qu'il y a augmentation de leur fréquence de consultation médicale, tandis que les changements de l'état de santé des immigrants européens se comparent à ceux des Canadiens de naissance. De certaines études transversales, il ressort aussi que l'augmentation de la durée de résidence est associée à l'augmentation de problèmes de santé chroniques déclarés et de dépression. Si l'avantage relatif de l'état de santé des immigrants par rapport aux autres Canadiens demeure, il s'estompe quelque peu avec leur durée de résidence.

### Sources :

Chen, J., R. Wilkins, E. Ng « Espérance de santé selon le statut d'immigrant, 1986 et 1991 », Rapports sur la santé, vol. 8, no 3, mars 1996, [En ligne], Statistique Canada, pp. 31-41, [<http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=82-003-X19960033016>].

Ng, E., R. Wilkins, F. Gendron et J. M. Berthelot. L'évolution de l'état de santé des immigrants au Canada : Constats tirés de l'Enquête nationale sur la santé de la population, [En ligne], Ottawa, Statistique Canada, 2005, 13 p., [<http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=82-618-M2005002>].

Ali, J. « La santé mentale des immigrants au Canada », Supplément aux Rapports sur la santé, volume 13, 2002, [En ligne], Ottawa, Statistique Canada, 13 p., [<http://www.statcan.ca/francais/freepub/82-003-SIF/2002001/pdf/82-003-SIF2002006.pdf>].

Pérez, C. E. « État de santé et comportements influant sur la santé des immigrants », Supplément aux Rapports sur la santé, volume 13, 2002, [En ligne], Ottawa, Statistique Canada, 14 p., [<http://www.statcan.ca/francais/freepub/82-003-SIF/2002001/pdf/82-003-SIF2002005.pdf>].


Wu, Z., et C. M. Schimmele. « The Healthy Migrant Effect on Depression : Variation over Time ? », Canadian Studies in Population, vol. 32, no 2, 2005, pp. 271-295.

## DÉTERMINANTS DE L'ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

Dans une société où les maladies chroniques ont supplanté les maladies transmissibles, les soins de santé jouent un plus grand rôle dans le maintien d'une bonne santé que par le passé. L'Institut canadien de recherches avancées estime que la santé de la population reposerait à 25 % sur les soins de santé (vaccination, médicaments, chirurgies, etc.). Autrement dit, 75 % de la santé est encore déterminée par des facteurs non médicaux et par leur interaction. Ce qui laisse un large espace d'intervention pour la promotion et la prévention de la santé (figure 9).

Comment orienter les décisions et les actions favorables à l'amélioration de l'état de santé ? C'est là une question complexe qui exige une réflexion approfondie tenant compte aussi bien des besoins de la population que de la disponibilité des ressources permettant ou non de les satisfaire. La santé se définit par «la capacité physique, psychique et sociale d'une personne d'agir dans son milieu et d'accomplir les rôles qu'elle entend assumer, d'une manière acceptable pour elle-même et pour les groupes dont elle fait partie» (L.R.Q., chapitre S-4.2, article 1). Une planification des soins et services axée sur la responsabilité populationnelle devrait entre autres s'appuyer sur la connaissance non seulement des principales causes de mortalité mais aussi des causes d'incapacité et des facteurs de risque qui agissent en amont.

**Figure 9 Estimation de l'incidence des déterminants de la santé sur l'état de santé de la population**



Source : Estimations de l'Institut canadien de recherches avancées – Santé Canada

## CAUSES DE MORTALITÉ ET D'INCAPACITÉ

Pour 36 pays industrialisés dont le Canada, l'OMS a identifié : a) les principales causes de décès, b) les années de vie perdues (AVP) à cause de ces décès, c) les années vécues avec une incapacité (AVI) liée à ces causes et finalement d) les années de vie perdues à cause de décès prématurés et d'années perdues en raison d'incapacité, dites années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY). (Chacun de ces éléments correspond à une colonne du tableau 7.)

L'intérêt de cette analyse réside dans la quantification du fardeau des problèmes de santé en tenant compte soit de la mortalité, soit de l'incapacité, soit de leur impact combiné: il s'ensuit un changement dans l'ordre d'importance des causes selon le cas. Par contraste avec l'approche classique où on utilise des données de mortalité, elle met en évidence les fardeaux importants que représentent, par exemple, la dépression et la consommation importante d'alcool sur la santé (figures 12 et 13).

### FAITS SAILLANTS

- ✦ Les maladies du cœur et certains cancers se classent aux premiers rangs parmi les causes de mortalité mais sont déclassés dans une estimation des années vécues avec une incapacité (tableau 7). À cause de l'incapacité qu'elles entraînent, les maladies neuropsychiatriques et la consommation d'alcool pèsent beaucoup plus lourdement dans la charge de morbidité que les cardiopathies ischémiques par exemple (figure 12).
- ✦ Toutefois, quand on tient compte à la fois des années de vie perdues à cause d'une mort précoce et des années vécues avec une incapacité, les maladies du cœur reprennent une place prépondérante, mais le fardeau de la dépression s'avère comparable. L'alcool et les accidents routiers se trouvent aussi en avant-plan à cause de l'effet combiné de l'incapacité et d'un décès survenu prématurément (figure 13).

**Tableau 7 Principales causes de décès, années de vie perdues (AVP), années vécues avec une incapacité (AVI) et années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY)\*, économies de marché établies\*\*, 1990**

| Cause de décès***                                 | Décès<br>(milliers) |     |      | Années de vie perdues (AVP)<br>(milliers) |     |      | Années vécues avec une<br>incapacité (AVI)<br>(milliers) |     |      | Années de vie ajustées sur<br>l'incapacité (DALY)<br>(milliers) |    |      |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----|------|-------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------|----|------|
|                                                   | Nombre              | %   | rang | Nombre                                    | %   | rang | Nombre                                                   | %   | rang | Nombre                                                          | %  | rang |
| <i>Toutes causes</i>                              | 7 121               |     |      | 49 674                                    |     |      | 49 120                                                   |     |      | 98 794                                                          |    |      |
| Cardiopathies ischémiques                         | <b>1 668</b>        | 23% | I    | <b>8 113</b>                              | 16% | I    | 764                                                      | 2%  |      | <b>8 876</b>                                                    | 9% | I    |
| Maladies cérébrovasculaires                       | <b>788</b>          | 11% | II   | <b>3 424</b>                              | 7%  | II   | <b>1 553</b>                                             | 3%  | VII  | <b>4 977</b>                                                    | 5% | III  |
| Cancer de la trachée, des bronches et des poumons | <b>379</b>          | 5%  | III  | <b>2 771</b>                              | 6%  | IV   | 216                                                      |     |      | <b>2 987</b>                                                    | 3% | VI   |
| Infections des voies respiratoires inférieures    | <b>272</b>          | 4%  | IV   | <b>1 162</b>                              | 2%  | IX   | 45                                                       |     |      | 1 208                                                           |    |      |
| Maladies pulmonaires obstructives chroniques      | <b>245</b>          | 3%  | V    | <b>1 122</b>                              | 2%  | X    | 1 162                                                    | 2%  |      | <b>2 284</b>                                                    | 2% | X    |
| Cancer du côlon et du rectum                      | <b>208</b>          | 3%  | VI   | <b>1 296</b>                              | 3%  | VI   | 330                                                      |     |      | 1 626                                                           |    |      |
| Diabète sucré                                     | <b>145</b>          | 2%  | VII  | 810                                       |     |      | <b>1 547</b>                                             | 3%  | VIII | <b>2 357</b>                                                    | 2% | IX   |
| Cancer de l'estomac                               | <b>140</b>          | 2%  | VIII | 932                                       |     |      | 129                                                      |     |      | 1 061                                                           |    |      |
| Cancer du sein                                    | <b>134</b>          | 2%  | IX   | <b>1 228</b>                              | 2%  | VIII | 193                                                      |     |      | 1 421                                                           |    |      |
| Accidents de la route                             | <b>131</b>          | 2%  | X    | <b>2 961</b>                              | 6%  | III  | 1 349                                                    |     |      | <b>4 310</b>                                                    | 4% | V    |
| Cirrhose du foie                                  | 117                 |     |      | <b>1 238</b>                              | 2%  | VII  | 346                                                      |     |      | 1 584                                                           |    |      |
| Blessures auto-infligées                          | 112                 |     |      | <b>1 989</b>                              | 4%  | V    | 166                                                      |     |      | 2 155                                                           | 2% | X    |
| Démence                                           | 94                  |     |      | 437                                       |     |      | <b>2 429</b>                                             | 5%  | IV   | <b>2 866</b>                                                    | 3% | VII  |
| Chutes                                            | 70                  |     |      | 435                                       |     |      | 916                                                      |     |      | 1 350                                                           |    |      |
| Maldies endocriniennes                            | 46                  |     |      | 401                                       |     |      | 856                                                      |     |      | 1 257                                                           |    |      |
| Affections périnatales                            | 46                  |     |      | 1 533                                     |     |      | 234                                                      |     |      | 1 767                                                           |    |      |
| VIH                                               | 41                  |     |      | 950                                       |     |      | 317                                                      |     |      | 1 267                                                           |    |      |
| Anomalies congénitales                            | 39                  |     |      | 1 171                                     |     |      | 962                                                      |     |      | 2 133                                                           |    |      |
| Asthme                                            | 22                  |     |      | 191                                       |     |      | 1 045                                                    |     |      | 1 236                                                           |    |      |
| Consommation d'alcool                             | 16                  |     |      | 223                                       |     |      | <b>4 467</b>                                             | 9%  | II   | <b>4 690</b>                                                    | 5% | IV   |
| Schizophrénie                                     | 13                  |     |      | 63                                        |     |      | <b>2 186</b>                                             | 4%  | V    | 2 249                                                           |    |      |
| Utilisation de drogues                            | 4                   |     |      | 108                                       |     |      | <b>1 413</b>                                             | 3%  | X    | 1 522                                                           |    |      |
| Troubles bipolaires                               | 1                   |     |      | 3                                         |     |      | <b>1 705</b>                                             | 3%  | VI   | 1 709                                                           |    |      |
| Dépression majeure                                | -                   |     |      | -                                         |     |      | <b>6 684</b>                                             | 14% | I    | <b>6 684</b>                                                    | 7% | II   |
| Arthrose                                          | -                   |     |      | -                                         |     |      | <b>2 701</b>                                             | 5%  | III  | <b>2 701</b>                                                    | 3% | VIII |
| Troubles obsessionnels-compulsifs                 | -                   |     |      | -                                         |     |      | <b>1 454</b>                                             | 3%  | IX   | 1 454                                                           |    |      |


\* Années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY) = Disability - adjusted life years (DALY).

\*\* Économies de marché établies : 36 pays inclus dont Australie, Canada, France, Allemagne, Japon, États-Unis, Royaume-Uni, Suède.

\*\*\* Maladies causant plus de 100 000 décès ou plus de 800 000 AVP ou plus de 1 000 000 AVI ou plus de 1 000 000 AVAI.

Tableau compilé et adapté par Patrick Morency, DSP de Montréal, tiré de Murray, C.J.L. et A.D. Lopez (1996). *The Global Burden of Disease*. World Health Organisation (WHO).


**Figure 10 Principales causes des années de vie ajustées sur l'incapacité, économies de marché établies\*, 1990**



\* Economie de marché établies : 36 pays inclus dont Australie, Canada, France, Allemagne, Japon, Etats-Unis, Royaume Uni et Suède.

\*\* Source: C.J.L Murray, A.D Lopez (1996). The Global Burden of Disease. World Health Organisation (WHO).

**Figure 11** Années vécues avec une incapacité selon la cause, économies de marché établies\*, 1990



\* Economie de marché établies : 36 pays inclus dont Australie, Canada, France, Allemagne, Japon, Etats-Unis, Royaume Uni et Suède.

\*\* Source: C.J.L. Murray, A.D. Lopez (1996). The Global Burden of Disease. World Health Organisation (WHO).




## FACTEURS DE RISQUE: AGIR EN AMONT

Dans une perspective de santé publique, et donc de prévention, il faut agir en amont, se préoccuper des facteurs antérieurs qui sont à l'origine de la maladie et de la mortalité. Quels sont-ils? Et quelle est leur importance relative?

### FAITS SAILLANTS


- Dans les pays ayant une économie de marché, dont le Canada, les facteurs associés à une plus grande mortalité sont, par ordre d'importance: le tabagisme, l'hypertension, l'inactivité physique et le milieu de travail (figure 12).
- La consommation d'alcool constitue le principal facteur des années de vie perdues pour cause d'incapacité, alors que le tabagisme se classe au second rang (figure 13).
- La donne change quelque peu quand on tient compte simultanément de la mortalité et de l'incapacité: le tabagisme se situe alors au premier rang, suivi de près par la consommation d'alcool. Viennent ensuite à égalité le milieu de travail et la sédentarité, puis l'hypertension, l'utilisation des drogues, etc. (figure 14).
- Tous ces facteurs de risque, comme la mortalité et la morbidité, sont parfois corrélés à la défavorisation sociale. Ils sont de plus généralement corrélés à la défavorisation matérielle. Des exceptions toutefois: l'incidence du cancer du sein et celle du cancer de la prostate sont parfois plus élevées parmi les couches favorisées de la population, mais pas la mortalité qui leur est attribuable.

**Figure 12 Répartition des décès associés aux principaux facteurs de risque**




Source : C.J.L Murray, A.D Lopez (1996). The Global Burden of Disease WHO

**Figure 13 Répartition des années vécues avec une incapacité attribuable aux principaux facteurs de risque**



Source : C.J.L Murray, AD Lopez (1996). The Global Burden of Disease WHO

**Figure 14 Répartition des années de vie ajustées sur l'incapacité attribuable aux principaux facteurs de risque**



Source : C.J.L Murray, AD Lopez (1996). The Global Burden of Disease WHO

## HABITUDES DE VIE

Certaines habitudes ou certains comportements sont étroitement associés à l'état de santé des individus. L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2003 nous renseigne sur de telles habitudes, dont celles des Montréalais quant au tabagisme, à la consommation d'alcool, à la sédentarité et à la consommation de fruits et légumes. L'excès de poids est également documenté. Ces habitudes et l'excès de poids peuvent varier en fonction de caractéristiques tels l'âge et le sexe. Dans cette enquête, les données ne sont pas disponibles à l'échelle des territoires de CSSS.

**Tableau 8 Proportion de la population selon certains facteurs de risque pour la santé et selon le sexe et l'âge, Montréal, 2003**

| Facteur de risque                                                       | 12-19 ans<br>% | 20-64 ans<br>% | 65 ans et plus<br>% | 12 ans et plus<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Tabagisme (Fumeurs réguliers ou occasionnels)                           |                |                |                     |                     |
| Hommes                                                                  | 16,1           | 33,9           | 12,1                | <b>29,2</b>         |
| Femmes                                                                  | 18,8           | 28,7           | 13,6                | <b>25,0</b>         |
| Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire au domicile            |                |                |                     |                     |
| Hommes                                                                  | 21,8           | 9,9            | 9,3                 | <b>11,0</b>         |
| Femmes                                                                  | 20,0           | 8,2            | 3,4                 | <b>8,3</b>          |
| Consommation de cinq verres d'alcool et plus au moins une fois par mois |                |                |                     |                     |
| Hommes                                                                  | 13,3           | 26,4           | 5,4                 | <b>22,3</b>         |
| Femmes                                                                  | 18,1           | 12,6           | 1,8                 | <b>11,1</b>         |
| Excès de poids                                                          |                |                |                     |                     |
| Hommes                                                                  | n.d.           | 52,3           | 60,3                | <b>53,5 *</b>       |
| Femmes                                                                  | n.d.           | 34,7           | 47,1                | <b>37,4 *</b>       |
| Sédentarité                                                             |                |                |                     |                     |
| Hommes                                                                  | n.d.           | 23,7           | 31,5                | <b>24,8 *</b>       |
| Femmes                                                                  | n.d.           | 25,2           | 35,4                | <b>27,2 *</b>       |
| Consommation de moins de cinq fruits et légumes par jour                |                |                |                     |                     |
| Hommes                                                                  | 52,6           | 67,8           | 54,5                | <b>64,7</b>         |
| Femmes                                                                  | 32,1           | 50,1           | 45,7                | <b>47,7</b>         |

\* Ces pourcentages concernent la population de 20 ans et plus

Source : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes*, 2003

### ✦ **Tabagisme**

Le tabagisme est en nette régression au Québec. Ainsi, selon l'ESCC, le taux de fumeurs actuels (fumeurs quotidiens et fumeurs occasionnels) était de 30 % en 2000-2001. En 2005, cette proportion n'était plus que de 24 %. Notons toutefois que malgré les progrès, le Québec était toujours la province affichant le taux le plus élevé. À Montréal, selon cette enquête, le taux de fumeur était de 28 % en 2003 (données montréalaises pour 2005 non disponibles). C'est dans la population adulte (20-64 ans) que cette habitude est la plus répandue. Il n'y a qu'une légère différence selon le sexe (tableau 8).

L'OMS classe la fumée secondaire comme un élément cancérigène de la catégorie de risque la plus élevée. Or, chez les non-fumeurs, ce sont les jeunes (12-19 ans) qui y sont les plus exposés, soit deux fois plus que les adultes non fumeurs. Plus encore, des grandes villes canadiennes, Montréal est celle où les jeunes sont les plus exposés aux méfaits de la fumée secondaire.

### ✦ **Consommation élevée d'alcool**

Une consommation d'alcool élevée correspond à la consommation de cinq verres ou plus d'alcool au cours d'une même occasion au moins une fois par mois au cours des 12 mois ayant précédé l'enquête. On remarque qu'une telle consommation est le fait de plus d'un homme de 20 à 64 ans sur quatre à Montréal. La consommation est moins importante chez les jeunes mais non négligeable. L'enquête sur la santé des jeunes Montréalais d'âge scolaire, menée en 2003, révèle que l'expérience de l'alcool survient tôt dans leur vie : un jeune sur cinq de 4<sup>e</sup> année et un sur trois de 6<sup>e</sup> année ont dit avoir bu de l'alcool au cours des 12 mois précédant l'enquête<sup>3</sup>.

### ✦ **Excès de poids**

Les données de l'ESCC 2004 nous apprennent que 57 % des Québécois de 18 ans et plus présentent un excès de poids. Ce problème ne se limite toutefois pas aux adultes. En 1999, il a été estimé qu'entre 10 % et 22 % des jeunes présentaient de l'embonpoint.

Les données de Montréal démontrent que l'excès de poids est un problème qui s'accroît avec l'âge, tant pour les hommes que pour les femmes (tableau 8). Mais il s'agit d'un problème avant tout masculin, car à l'âge adulte, c'est une majorité d'hommes qui en souffrent.

Malgré ce portrait quelque peu inquiétant, notre prévalence d'embonpoint demeure inférieure à celle du reste du Canada et encore davantage à celle des États-Unis et de plusieurs autres pays. Ce problème en émergence mérite qu'on s'y attaque, car l'excès de poids est à l'origine de plusieurs maladies.

Pour en savoir plus sur le sujet, consulter: <http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/420-PoidsQuebecois1987-2003.pdf>.  
À propos de la prévention du surpoids et de l'obésité en pratique médicale, consulter:  
<http://www.santepub-mtl.qc.ca/mdprevention/chronique/2005/18042005.html>.

<sup>3</sup> **Objectif jeunes: comprendre, soutenir.** Rapport annuel 2004-2005 sur la santé de la population montréalaise. Direction de prévention et de santé publique de Montréal, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Montréal, 2005, 108p.

### ✦ **Sédentarité**

L'activité physique est définie selon les réponses à des questions qui portent sur la fréquence, la durée et l'intensité des activités physiques des répondants durant leurs loisirs.

L'inactivité augmente avec l'âge. Environ un adulte sur quatre est inactif. La proportion passe à une personne sur trois chez les aînés. Selon le sexe, les écarts sont peu importants.

Bertrand Nolin de l'Institut de la santé publique du Québec a aussi étudié la question. Le tableau suivant présente son groupement des répondants selon qu'ils sont actifs, modérément actifs ou inactifs, en fonction d'un indice d'activité physique quotidienne moyenne calculé au cours des trois mois qui ont précédé l'enquête.

**Tableau 9 Niveau d'activité physique de loisir selon le sexe, 18 ans et plus, Montréal et ensemble du Québec, 2003**

|                    | Actif<br>% | Moyennement actif<br>% | Un peu actif<br>% | Sédentaire<br>% |
|--------------------|------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| Hommes             |            |                        |                   |                 |
| <b>Montréal</b>    | <b>41</b>  | <b>19</b>              | <b>15</b>         | <b>25</b>       |
| Ensemble du Québec | 39         | 18                     | 17                | 28              |
| Femmes             |            |                        |                   |                 |
| <b>Montréal</b>    | <b>39</b>  | <b>18</b>              | <b>17</b>         | <b>27</b>       |
| Ensemble du Québec | 35         | 20                     | 20                | 25              |

Source : Nolin, B., et D. Hamel, Institut national de santé publique du Québec, 2005

Notes :

a) Les pourcentages étant arrondis à l'unité, le total peut être différent de 100 %.

b) Les pourcentages représentent la moyenne, projetée sur l'ensemble de l'année, de la pratique sur une période de trois

On note peu de différence entre Montréal et l'ensemble du Québec. La majorité des Montréalais et des Québécois (tant les hommes que les femmes) sont actifs ou moyennement actifs. Dans son étude, le chercheur constate qu'en matière de pratique d'activités physiques durant les temps libres, le Québec est encore sous la moyenne canadienne. L'écart tend toutefois à se resserrer. Historiquement, la valorisation de ce genre d'activité a été plus grande du côté anglophone que francophone.

Pour en savoir plus sur le sujet et sur les recommandations d'activité physique pour les jeunes et les (Note: Il manque quelque chose ici), consulter: Nolin, B., et D. Hamel. «Les Québécois bougent plus mais pas encore assez», dans: M. Venne et A. Robitaille (sous la direction de), l'Annuaire du Québec 2006, Montréal, Fides, pp. 296-311, 2005.

### ✦ **Consommation de fruits et légumes**

Les habitudes alimentaires saines sont plus répandues chez les femmes que chez les hommes. Peu importe le groupe d'âge, une majorité d'hommes consomme moins de cinq fruits ou légumes par jour. Même si le problème est moins aigu chez les femmes, il y a quand même chez elles d'importantes lacunes, surtout parmi les adultes et les aînées.

Le MSSS, en partenariat avec le groupe Acti-Menu, la Fondation des maladies du cœur du Québec et la Société canadienne du cancer, mène présentement une campagne de promotion intitulée le 5-30, un concept développé pour inciter la population à consommer cinq fruits et légumes par jour et à faire 30 minutes d'activité physique par jour.

À propos de la promotion de la consommation de fruits et légumes, consulter:  
<http://www.santepub-mtl.qc.ca/Nutrition/fruitlegume/pourquoi.html>.

## QUELQUES DÉFINITIONS

### ***Indice de défavorisation matérielle et sociale***

«...[c'est] dans une tentative de décrire l'ampleur et la répartition géographique des inégalités sociales de santé au Québec qu'un indice de défavorisation a été développé. Telle que conçue ici, la défavorisation prend deux formes : matérielle et sociale. Alors que la première reflète la privation de biens et de commodités de la vie courante, la seconde forme renvoie plutôt à la fragilité du réseau social, tant à l'échelle de la famille que de la communauté. Basé sur un certain nombre d'indicateurs choisis principalement pour leur relation connue avec l'état de santé et l'une ou l'autre des deux formes de défavorisation, cet indice constitue un outil de planification des ressources et des interventions propre au domaine de la santé et du bien-être.»

Source: MSSS. Atlas de la santé et des services sociaux du Québec, [En ligne],  
[[http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/index.php?id\\_carte=11](http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/index.php?id_carte=11)].

### ***Seuil de faible revenu***

«Niveaux de revenu selon lesquels on estime que les familles ou les personnes hors famille consacrent 20 % de plus que la moyenne générale à la nourriture, au logement et à l'habillement.»

Source: Statistique Canada. Dictionnaire du recensement de 2001, [En ligne],  
[[http://www12.statcan.ca/francais/census01/products/reference/dict/index\\_f.htm#dictionnaire](http://www12.statcan.ca/francais/census01/products/reference/dict/index_f.htm#dictionnaire)].





## Répartition de la population du territoire du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent par secteur de recensement, 2001

