

QUOI FAIRE À LA SUITE D'UNE CHIRURGIE DES PAUPIÈRES



*Les soins postopératoires qui
doivent être faits à domicile*

Pour vous, pour la vie

Quoi faire lors de votre retour à la maison ?

- Retirer le pansement à _____.
- Un médicament contre la douleur vous sera prescrit. Sinon, vous pouvez prendre 1 ou 2 comprimés d'acétaminophène (Tylénol) de 325 mg aux 4 heures, au besoin.

Pour diminuer l'enflure de votre œil, vous devez...

- Commencez immédiatement l'application de compresses glacées, après avoir retiré le pansement. Pour ce faire vous pourrez prendre un bol d'eau avec de la glace et, à l'aide d'une débarbouillette propre, faire une compresse.
- Mettez une compresse glacée, 10 minutes toutes les heures pour 48 heures, ensuite appliquez des compresses tièdes aux 2 heures

pour les jours suivants, pour 3 à 5 jours selon le confort.

- Dormir avec 2 oreillers les premières 24 heures suivant la chirurgie.

Aviser le chirurgien ou les infirmières de la clinique si

Vous présentez des signes de complications au niveau de la paupière, par exemple :

- Une rougeur qui augmente;
- Une douleur non soulagée avec la médication;
- Une induration (gonflement qui durcit) qui augmente ou persiste;
- Un saignement abondant;
- Un écoulement de l'oeil de couleur jaunâtre ou verdâtre;

- Une température buccale supérieure à 38,5 °C (100 °F).

Comment nous joindre

Si vous présentez des signes de complications, appelez au 514-252-3878, entre 8 h et 16 h 30, du lundi au vendredi.

Pour toutes autres informations, appelez à l'unité de soins au 514-252-3881, du lundi 8 h au vendredi minuit.

Notes personnelles



Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Adresse postale

5415, boul. de l'Assomption
Montréal QC H1T 2M4

Téléphone : (514) 252-3400

www.maisonneuve-rosemont.org

Tous droits réservés

©HMR; Programme-clientèle d'ophtalmologie, 2010

CP-OPH-003