



Le **RAP**

RÉSEAU D'AVERTISSEMENTS PHYTOSANITAIRES

Leader en gestion intégrée
des ennemis des cultures

AVERTISSEMENT | BLEUET NAIN

N° 17, 16 octobre 2018

- Conditions climatiques.
- Traitement herbicide automnal du kalmia.
- Traitement herbicide automnal de la comptonie et du kalmia.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Vous pouvez accéder au résumé des conditions climatiques de la dernière saison en consultant le [sommaire météorologique](#). Plusieurs bleuetières atteindront prochainement le stade idéal pour les traitements herbicides automnaux.

TRAITEMENT AUTOMNAL DU KALMIA

Roundup WeatherMAX : répression du kalmia lorsque les plants de bleuets ont **perdu 95 % de leurs feuilles**. Des dommages pourraient être causés aux bleuetiers si les traitements étaient appliqués avant ce stade.

Pour plus d'information sur le traitement, consulter ce [feuillet de renseignements](#). Vous pouvez également consulter le [résumé de l'étiquette](#).

TRAITEMENT AUTOMNAL DE LA COMPTONIE ET DU KALMIA

BANVEL II : suppression de la comptonie et du kalmia après la **chute de 90 %** des feuilles de bleuets. Vous pouvez également consulter le [résumé de l'étiquette](#).



Comptonie voyageuse (*Comptonia peregrina*)
Source : Pierre-Patrick Fillion (CRLB)



Kalmia à feuilles étroites (*Kalmia angustifolia*)
Source : LEDP (MAPAQ)

Cet avertissement a été rédigé par Véronique Moreau, agronome (Club Conseil Bleuet). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter [l'avertisseur du réseau Bleuet nain ou le secrétariat du RAP](#). La reproduction de ce document ou de l'une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.