

ANALYSE DES CAS D'INFECTION GÉNITALE
À *CHLAMYDIA TRACHOMATIS*, DE GONORRHÉE,
D'HÉPATITE B ET DE SYPHILIS DÉCLARÉS AU QUÉBEC
PAR ANNÉE CIVILE
1996-2000



COLLECTION

*analyses et
surveillance*

22

ANALYSE DES CAS D'INFECTION GÉNITALE

À *CHLAMYDIA TRACHOMATIS*, DE GONORRHÉE, D'HÉPATITE B ET DE SYPHILIS DÉCLARÉS AU QUÉBEC

PAR ANNÉE CIVILE

1996-2000

AUTEUR :

RAYMOND PARENT

*Institut national de santé publique du Québec
Unité de recherche en santé des populations,
Centre de recherche, Hôpital du Saint-Sacrement,
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec*

COLLABORATEURS :

MICHEL ALARY

*Institut national de santé publique du Québec
Unité de recherche en santé des populations,
Centre de recherche, Hôpital du Saint-Sacrement,
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec*

SYLVIE VENNE

*Centre québécois de coordination sur le sida,
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Institut national de santé publique du Québec*

MICHELLE DUPONT

*Centre québécois de coordination sur le sida,
Ministère de la Santé et des Services sociaux*

ET

**COMITÉ CONSULTATIF SUR LES INFECTIONS
TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT (ITS)**

Novembre 2001

Santé
et Services sociaux

Québec



L'analyse exposée dans le présent document a été financée par le Centre québécois de coordination sur le sida et soutenue par le Laboratoire de santé publique du Québec de l'Institut national de santé publique du Québec.

Édition produite par :

La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour obtenir un exemplaire de ce document, faites parvenir votre commande

par télécopieur : **(418) 644-4574**

par courriel : **communications@msss.gouv.qc.ca**

ou par la poste : **Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction des communications
1075, chemin Sainte-Foy, 16^e étage
Québec (Québec)
G1S 2M1**

Le présent document est disponible à la section **Sujets (MTS-VIH-sida)** du site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'adresse est : **www.msss.gouv.qc.ca**

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec, 2002
Bibliothèque nationale du Canada, 2002
ISBN 2-550-39005-9

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source soit mentionnée.

Remerciements

Nous aimerions remercier :

- toutes les personnes qui se chargent d'alimenter et de gérer le système des maladies à déclaration obligatoire dans chacune des directions régionales de la santé publique ainsi qu'au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) ;
- les membres du Comité consultatif sur les ITS, qui commentent les données de surveillance périodique ;
- madame Myrto Mondor qui a aidé à la conception, au développement et à la programmation du cadre d'analyse ;
- la direction du LSPQ ainsi que monsieur Florian Gosselin, madame Louise Ringuette, madame Louiselle Clément et monsieur René Jean, pour nous avoir aidés à monter les fichiers de données.

Avant-propos

Le présent rapport expose les données sur les cas d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec au cours des cinq dernières années, soit entre le 1^{er} janvier 1996 et le 31 décembre 2000. Ces données aident à déterminer l'ampleur du problème des maladies transmissibles sexuellement (MTS). La répartition régionale des cas et l'analyse qui en est faite permettent d'orienter les interventions et de planifier les ressources pour lutter contre le problème.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux est responsable du programme de surveillance des maladies à déclaration obligatoire (MADO), mais plusieurs partenaires – médecins traitants, laboratoires déclarants et directions régionales de la santé publique – y collaborent. Ces dernières assurent la collecte, la saisie et le transfert des informations. De plus l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a réalisé la compilation et l'analyse des données du rapport.

La publication de ce document fait partie intégrante du programme de surveillance des maladies transmissibles sexuellement et s'adresse principalement aux responsables régionaux de la lutte contre les MTS, mais aussi à toutes les organisations, associations ou personnes qui assument un mandat dans le cadre de cette lutte, afin de les aider dans leurs interventions.

Le document peut être consulté à la section Sujets (MTS-VIH-sida) du site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'adresse est www.msss.gouv.qc.ca.

Table des matières

1. Faits saillants.....	1
2. Introduction.....	4
3. Observations et interprétations.....	5
3.1 Observations générales.....	5
3.2 L'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i>	7
3.3 La gonorrhée.....	9
3.4 L'hépatite B.....	12
3.5 La syphilis.....	13
4. Conclusion.....	14
5. Notes techniques.....	15
Tableaux et graphiques.....	T1 à T152
Annexe : Surveillance périodique des MTS, période 11 : du 31 décembre 2000 au 3 novembre 2001	

1. Faits saillants

Infection génitale à *Chlamydia trachomatis*

L'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* est la MTS la plus fréquemment déclarée au Québec, avec 37 127 cas rapportés entre 1996 et 2000. L'hépatite B et la gonorrhée suivent avec 6 924 et 2 826 cas respectivement.

L'augmentation des taux d'incidence de l'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* se poursuit. Après une diminution d'incidence de 61,2 % entre 1990 et 1997, une augmentation de 32,5 % a été observée entre 1997 et 2000. Cette augmentation est observée tant chez les hommes que chez les femmes et touche la très grande majorité des régions. En effet, entre 1997 et 2000, des augmentations d'incidence variant de 10 % à 56 % ont été observées dans quinze régions du Québec. L'augmentation d'incidence touche aussi tous les groupes d'âge entre 5 et 60 ans.

Le rythme global d'augmentation d'incidence décroît d'année en année : 11,3 % entre 1997 et 1998, 9,6 % entre 1998 et 1999 et enfin 8,6 % entre 1999 et 2000. Toutefois, la variation d'incidence d'année en année, depuis 1997, est différente selon le sexe : chez les femmes, l'augmentation est soutenue (8,3 %, 10,4 % et 10,6 % respectivement pour 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000), mais chez les hommes, le rythme évolue différemment : 20,2 %, 7,4 % et 3,1 %. Toutefois, les groupes d'âge des 20 à 24 ans et des 15 à 19 ans demeurent ceux qui ont les taux d'incidence les plus élevés.

Les données ne permettent pas de préciser les taux d'incidence spécifiques pour la population autochtone du Québec, mais si on en juge d'après les taux des régions où la proportion d'autochtones est plus importante (par exemple Nunavik, Côte-Nord et Terres-Cries-de-la-Baie-James), ces taux sont relativement plus élevés que pour l'ensemble de la population du Québec.

À la fin de la période 11, au 3 novembre 2001, 8 404 cas avaient été déclarés, soit 14 % de plus qu'à pareille date en 2000.

L'implantation des techniques d'amplification génique dans le dépistage de l'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* se poursuit au Québec. En 1998, 37 % des laboratoires médicaux se servaient de ces techniques, et on estimait que cette proportion serait de 64 % en 2000. Une partie de l'augmentation des taux d'incidence de l'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* s'explique par la plus grande disponibilité de ces techniques diagnostiques plus performantes et moins invasives. Mais il nous est impossible de déterminer quelle proportion de l'augmentation y est attribuable. Il est donc possible que nous assistions à une réelle accélération de l'épidémie au Québec.

Gonorrhée

Entre 1990 et 1996, le taux d'incidence de la gonorrhée a diminué de 76,3 % . La variation annuelle d'incidence est passée d'une diminution d'environ 30 % au début des années 1990 à une diminution d'environ 20 % au milieu des années 1990. Entre 1996 et 1998, une fluctuation d'incidence est observée, fluctuation qui semble tendre vers une augmentation d'incidence depuis 1998. En effet, des augmentations de taux d'incidence de 26 % et 6 % sont notées respectivement pour 1998-1999 et 1999-2000. Ces augmentations d'incidence se font aux dépens des hommes, chez qui elles ont été de 29 % et 11 % pour les années 1998-1999 et 1999-2000. Chez les femmes, l'incidence a constamment diminué au cours des dix dernières années, sauf entre 1998 et 1999, où le taux était passé de 3,0 à 3,6 pour revenir à 3,3 en 2000.

La grande majorité des cas de gonorrhée se retrouve dans la région de Montréal-Centre (66 %). En ajoutant la région de Québec (7 % des cas) et de la Montérégie (7 % des cas), il ne reste que 20 % des cas pour l'ensemble des quinze autres régions du Québec. Les fluctuations des taux d'incidence de ces régions n'ont ainsi que peu d'influence sur l'évolution de l'épidémiologie de la gonorrhée au Québec.

Il est donc raisonnable de conclure que l'augmentation des taux d'incidence de la gonorrhée au Québec depuis 1998 est essentiellement reliée à l'augmentation de l'incidence de la gonorrhée chez les hommes de la région de Montréal-Centre.

Par ailleurs, parmi les cas de gonorrhée déclarés, la proportion de souches productrices de pénicillinase (NGPP) a doublé en l'an 2000 (10,4 % comparativement à 5,1 en 1999). Parmi les 70 cas de NGPP au Québec, 80 % (56) proviennent de la région de Montréal-Centre.

Au 3 novembre 2001, 381 cas masculins avaient été déclarés dans la région de Montréal-Centre, soit 29 % de plus qu'à pareille date en 2000.

Hépatite B

Au cours des dix dernières années, le taux d'incidence de l'hépatite B aiguë a diminué de 63 %, passant de 6,5 à 2,4 par 100 000 habitants. Les variations annuelles ont fluctué considérablement, avec des baisses annuelles de 5 % à 27 %. Entre 1990 et 2000, trois hausses d'incidence ont été observées : une hausse de 7,6 % entre 1991 et 1992, une hausse de 3,7 % entre 1995 et 1996, et enfin une hausse de 9,6 % entre 1999 et 2000. La hausse de l'incidence entre 1999 et 2000 est attribuable à l'augmentation des cas chez les hommes, et plus spécifiquement chez les hommes de la région de Montréal-Centre, où l'excédent de cas est de 28, soit une hausse de 76 % entre 1999 et 2000.

Cette augmentation se poursuit en 2001, puisqu'au 3 novembre, 435 cas masculins d'hépatite B avaient été déclarés dans la région de Montréal-Centre, comparativement à 402 à pareille date en 2000.

Syphilis infectieuse (primaire, secondaire, latente précoce)

L'incidence de la syphilis infectieuse est très faible au Québec. Au début des années 1990, plus de soixante cas annuels de syphilis infectieuse étaient déclarés. Ce nombre a diminué considérablement et, entre 1997 et 2000, moins de dix cas ont été déclarés à chaque année.

Toutefois, une éclosion de syphilis a été observée chez les hommes de la région de Montréal-Centre depuis la fin de 2000. Au 3 novembre 2001, onze cas masculins y avaient été déclarés, comparativement à un seul à pareille date en 2000. Cette éclosion semble avoir touché particulièrement les hommes homosexuels.

2. Introduction

Certaines maladies transmissibles sexuellement (MTS) sont répertoriées dans le système québécois des maladies à déclaration obligatoire (MADO). Un système informatisé, implanté en 1989-1990, relie chacune des dix-huit régions sociosanitaires à une plate-forme commune d'enregistrement des cas déclarés située au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ). L'agrégation des données dépersonnalisées décrit l'épidémiologie des infections déclarées au Québec.

Nous traitons des cas d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* et des cas de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au cours des cinq dernières années, soit entre 1996 et 2000. Les données présentées dans les graphiques couvrent toutefois la période du 1^{er} janvier 1990 au 31 décembre 2000. Nous détaillons l'incidence de ces infections en fonction de l'âge, du sexe et de la région sociosanitaire de résidence des personnes atteintes. Dans cette huitième édition du rapport, la majorité des tableaux qui étaient intégrés au texte sont maintenant au début de la section des tableaux et graphiques.

Nous joignons au rapport les données recueillies en 2001 par la surveillance périodique faite aux quatre semaines. Les données présentées sont celles de la 11^e période (du 31 décembre 2000 au 3 novembre 2001).

3. Observations et interprétations

3.1 Observations générales

Les infections génitales à *Chlamydia trachomatis*, les gonorrhées, les hépatites B et les syphilis sont les MTS à déclaration obligatoire les plus fréquentes. En 1996, ces infections représentaient 41,4 % (8 764/21 159) des cas de MADO déclarés. Cette proportion demeure la même en 2000 (10 748/25 975).

Au 31 décembre 2000, un total de 131 732 cas d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis avaient été déclarés depuis 1990 dans le système des maladies à déclaration obligatoire.

Le tableau T1 donne le nombre de cas déclarés de chaque maladie entre 1996 et 2000. On y constate que parmi les MTS à déclaration obligatoire plus fréquentes, l'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* représente 79 % des cas déclarés, suivie par l'hépatite B (15 %), la gonorrhée (6 %) et la syphilis (0,5 %).

Le tableau T2 donne quant à lui les caractéristiques d'âge et de sexe des patients atteints. On y remarque que ces données sont rarement manquantes. Les deux tiers des cas touchent des femmes dont l'âge médian est de 21 ans, tandis qu'il est de 27 ans chez les hommes. Comme on le voit au tableau T3, l'âge médian des hommes atteints est d'ailleurs plus élevé que celui des femmes pour chacune des infections surveillées.

On trouve au tableau T4 le détail de l'origine des déclarations inscrites dans le fichier des MADO. Dans l'ensemble, 8 % des cas sont déclarés par les médecins et 92 % par les laboratoires.

Certaines MTS à déclaration obligatoire sont très peu fréquentes. Voici le nombre de cas déclarés pour ces infections entre 1996 et 2000 :

- lymphogranulomatose vénérienne :
un cas dans la région de Québec en 1996 et un cas au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 1997 ;
- chancre mou :
un cas dans la région de Québec en 1996 ;
- granulome inguinal :
aucun cas entre 1996 et 2000 ;
- herpès néonatal :
deux cas dans Montréal-Centre, un en 1996 et un en 2000, un cas dans la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine en 1997, et un cas dans la Montérégie en 1998.

Limites

Malgré la puissance d'analyse que donne le grand nombre de cas déclarés, le système de surveillance passif des MADO a ses limites. Chaque année, nous soulignons au lecteur que l'interprétation des tendances qu'on dégage du système MADO doit tenir compte de plusieurs facteurs, dont :

- la disponibilité régionale des nouveaux tests diagnostics ;
- les activités régionales de prévention et de promotion de la santé ;
- l'évolution des pratiques médicales ;
- l'application des définitions nosologiques ;
- les changements dans les procédures de saisie, de validation et de nettoyage des données.

La vérification systématique de la validité des cas déclarés et l'évaluation de la sous-déclaration permettraient de mesurer l'ampleur de certains de ces biais potentiels.

Les données issues du système MADO sous-estiment l'ampleur réelle du problème. L'analyse d'autres données recueillies dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement nous indique en effet qu'entre 1996 et 2000, il y avait chez les femmes et les hommes respectivement, 1,7 et 4,4 fois plus de cas traités pour une MTS ou un syndrome compatible que de cas déclarés dans les banques MADO (M^{me} Céline Poulin, communication personnelle).

Les données de la banque du programme de gratuité des médicaments ont aussi leurs propres limites. Il s'agit d'une banque de données administratives dans laquelle le diagnostic n'est pas mentionné. De plus, les observations tirées de cette source ne sont représentatives que des personnes qui ont décidé de profiter de ce programme et non de toutes les personnes infectées.

Mais même s'il sous-estime l'ampleur du problème, le système de déclaration nous permet d'en suivre l'évolution et de mieux le cerner.

3.2 L'infection génitale à *Chlamydia trachomatis*

Le tableau T5 présente le type d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* déclarée et le sexe des personnes atteintes au cours des cinq dernières années. Les tableaux et graphiques T6 à T47 décrivent la distribution des cas par sexe, région de résidence, année d'événement et groupe d'âge.

Toutes ces données permettent de dégager l'image suivante quant à l'évolution de l'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* au Québec ces dernières années :

	Observation
1995-1996	La baisse des taux d'incidence (TI) n'est plus que de 6 % entre 1995 et 1996. Elle était d'environ 10 à 15 % par année depuis 1988.
1996-1997	La baisse du taux d'incidence (TI) provincial est de 4 % entre 1996 et 1997. Les TI augmentent pour la première fois dans cinq régions.
1997-1998	Augmentation des TI dans quatorze régions. L'augmentation est plus marquée chez les hommes mais touche aussi les femmes. Le TI provincial augmente pour la première fois et il est de 96,5 en 1998 (une augmentation de 11 % : 20 % chez les hommes et 8 % chez les femmes).
1998-1999	Augmentation des TI dans douze régions.
1999-2000	Augmentation des TI dans treize régions. L'augmentation est plus marquée chez les femmes mais touche aussi les hommes. Le TI provincial passe à 114,9 par 100 000 habitants en 2000. Par rapport à 1996, l'augmentation est de 31 % chez les hommes et de 26 % chez les femmes.
2001	Augmentation du nombre de cas déclarés du 31 décembre 2000 au 3 novembre 2001 par rapport à la même période l'année précédente : 8 404 cas avaient été déclarés au 3 novembre 2001, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport à la même période en 2000 (10 % chez les femmes et 27 % chez les hommes).

C'est donc en 1997 que s'est amorcée l'augmentation dans certaines régions. En nombre absolu, l'excès de cas observé chez les femmes en 2000 atteint tous les groupes d'âge sauf les 40 à 49 ans (tableau T41). Chez les hommes, les augmentations des nombres de cas déclarés sont plus marquées chez les 15 à 29 ans et les 35 à 39 ans.

De 1997 à 2000, les augmentations des taux d'incidence les plus importantes sont observées chez les hommes de 35 à 49 ans et chez les femmes de 15 à 34 ans.

Discussion

Les taux d'incidence provinciaux augmentent depuis 1998. Cette augmentation est-elle causée par une accélération de l'épidémie ? Une réponse rigoureuse à cette question demanderait des études complémentaires.

Il nous faudrait savoir quelle est la proportion de l'excès de cas qui résulte de l'implantation des techniques de détection des acides nucléiques dans le dépistage de l'infection. Ces techniques sont plus performantes et permettent l'analyse des prélèvements d'urine, beaucoup plus faciles à obtenir, en particulier chez les hommes. Pour l'instant toutefois, les taux d'incidence sont nettement plus élevés chez les femmes, ce qui est lié au fait qu'elles consultent plus souvent. Ces facteurs ont un effet sur la détection des cas et pourraient expliquer une partie des augmentations observées.

On sait que 37 % des laboratoires médicaux se servaient de l'amplification génique en 1998 et que cette proportion devait passer à 64 % en 2000. La mise au point de techniques plus performantes pour le dépistage d'autres infections pourrait causer éventuellement le même problème, par exemple pour la gonorrhée.

Des études comportementales périodiques nous permettraient aussi de détecter des éléments pouvant expliquer une augmentation de l'incidence (par exemple la diminution de l'utilisation du condom).

3.3 La gonorrhée

Les tableaux T48 à T89 présentent la distribution des cas déclarés selon l'âge, le sexe, la région de résidence et le groupe d'âge. Ils permettent de dégager les observations suivantes quant à l'évolution récente de la gonorrhée au Québec :

	Observation
1995-1996	Baisse de 22% des taux d'incidence (TI). La baisse est observée autant chez les hommes que chez les femmes.
1996-1997	Augmentation des TI dans trois régions : l'augmentation touche presque exclusivement les hommes des régions de Québec, de Montréal-Centre et de la Montérégie.
1997-1998	Baisse des TI partout.
1998-1999	Augmentation des taux d'incidence (TI) dans sept régions. Certaines de ces augmentations relèvent de petits nombres de cas. Le TI provincial chez les hommes passe de 10,1 en 1998 à 13,0 par 100 000 habitants en 1999 (une augmentation de 29 %). Chez les femmes, il passe de 3,0 en 1998 à 3,6 par 100 000 habitants en 1999 (une augmentation de 19 %).
1999-2000	L'augmentation observée en 1999 dans certaines régions ne se poursuit pas en 2000, sauf chez les hommes de la région de Montréal-Centre, où le TI est passé de 33,9 par 100 000 habitants en 1999 à 40,5 en 2000. Les taux restent stables chez les femmes.
2001	Augmentation du nombre de cas déclarés chez les hommes au 3 novembre 2001 par rapport à la même période l'année précédente : un excès de cas masculins est observé à la fin de la 11 ^e période de surveillance (au 3 novembre 2001), avec 654 cas déclarés ; 560 cas avaient été déclarés à pareille date en 2000. Chez les hommes de la région de Montréal-Centre, le nombre de cas déclarés est passé de 295 à la fin de la 11 ^e période de 2000 à 381 en 2001. Chez les femmes, le nombre de cas est demeuré relativement stable.

Par rapport à 1999, nous observons en 2000 des augmentations du nombre de cas déclarés et des taux d'incidence de la gonorrhée chez les hommes de 15 à 19 ans et de 35 à 39 ans. Le nombre de cas déclarés reste relativement stable chez les femmes (tableaux T83 à T86).

L'augmentation des taux d'incidence de la gonorrhée chez les hommes n'est observée que dans Montréal-Centre. On y est passé de 255 cas déclarés en 1998 à 305 et 366 en 1999 et en 2000. Les nombres de cas déclarés dans les autres régions sont plutôt petits et l'incidence demeure stable.

L'augmentation de l'incidence de la gonorrhée chez les hommes de la région de Montréal-Centre touche ceux qui sont âgés de 15 à 49 ans. Si les taux les plus élevés se retrouvent chez les hommes âgés de 25 à 29 ans et de 35 à 39 ans (respectivement 102,1 et 107,0 par 100 000 habitants pour l'année 2000), la hausse la plus spectaculaire touche les jeunes hommes de 15 à 19 ans, chez qui le taux d'incidence est passé de 13,1 en 1998 à 47,0 en 2000, soit une augmentation de 72 %.

Les tableaux T90 et T91 donnent la distribution des cas causés par des souches productrices de pénicillinase (NGPP). C'est le LSPQ qui, depuis 1987, est responsable de la surveillance des cas de gonorrhée causés par des souches résistantes aux antibiotiques. La concordance entre les souches de NGPP reçues au LSPQ et celles qui sont déclarées dans les banques MADO est vérifiée depuis 1991. Une fois l'antibiorésistance confirmée, le personnel du LSPQ vérifie la conformité de la déclaration correspondante. Le LSPQ produit un rapport annuel intitulé *Surveillance des souches de Neisseria gonorrhoeae résistantes aux antibiotiques dans la province de Québec*. Le lecteur intéressé à en savoir plus est invité à consulter ce rapport déposé annuellement au LSPQ.

Un seul cas de NGPP a été déclaré chez les femmes en 2000. Chez les hommes toutefois, le nombre est passé de 27 en 1999 à 69 en 2000, ce qui représente 13 % de l'ensemble des cas masculins de gonorrhée déclarés. Cette proportion était de 6 % en 1999. L'augmentation n'est observée que dans la région de Montréal-Centre.

Le tableau T92 trace l'évolution de la résistance aux antibiotiques à partir des résultats de laboratoire qui ont été rapportés à même les déclarations faites aux directions régionales de la santé publique.

Aux déclarations de résistance qu'on y trouve, s'ajoute l'apparition de la résistance aux quinolones. Quinze déclarations (une en 1997, dix en 1999 et quatre en 2000) rapportent une résistance à la ciprofloxacine, dont huit montraient aussi des sensibilités intermédiaires ou des résistances à la pénicilline, à la tétracycline, ou au deux. On compte aussi cinq autres cas pour lesquels une sensibilité intermédiaire à la ciprofloxacine a été rapportée (un en 1998 et en 1999 et trois en 2000).

Le système MADO permet la déclaration de gonorrhées « génito-urinaires », « oculaires » ou « autres ». La grande majorité de ces dernières (258/295 entre 1996 et 2000) sont déclarées chez des hommes. Les tableaux T93 et T94 donnent le détail de la distribution de ces cas déclarés chez les hommes. On y constate qu'une quinzaine de cas de gonorrhée pharyngée sont déclarés par année, sauf en 1997 et en 2000, où 28 et 31 cas ont été déclarés respectivement. Le nombre de cas de gonorrhée rectale est quant à lui resté relativement stable ; il était de 34 en 2000.

Parmi les 242 hommes chez qui une gonorrhée rectale ou pharyngée a été déclarée entre 1996 et 2000, 102 (42,1 %) étaient âgés de 20 à 29 ans et 85 (35,1 %) avaient de 30 à 39 ans. Pour 22 des 242 cas (9,1 %), une souche productrice de pénicillinase a été déclarée au fichier. La majorité des cas (88 %) sont déclarés dans la région de Montréal-Centre (213/242 cas). Parmi les 29 autres, 12 ont été déclarés dans la Montérégie.

Discussion

Le taux d'incidence de la gonorrhée a fortement baissé entre 1985 et 1989. Cette baisse s'est poursuivie jusqu'au milieu des années 90. Depuis, le taux fluctue d'une année à l'autre, sauf dans la région de Montréal-Centre, où l'on observe une augmentation chez les hommes depuis 1998. Cette augmentation est accompagnée d'une augmentation du nombre et de la proportion des cas causés par des souches productrices de pénicillinase.

Il est intéressant de mentionner qu'une augmentation de l'incidence de la gonorrhée a été rapportée dans d'autres pays industrialisés (États-Unis, Europe) et que ce phénomène atteint particulièrement les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes¹⁻⁴.

1. K.K. FOX et autres, « Gonorrhea in the HIV era: A reversal in trends among men who have sex with men », *American Journal of Public Health*, vol. 91, n° 6, 2001, p. 959-964.

2. D. AN et autres, « Adult and Adolescent Spectrum of HIV Disease Project: Risk factors for and trends in gonorrhea incidence among persons infected with HIV in the United States », *AIDS*, vol. 15, n° 9, 2001, p. 1149-1155.

3. V. GOULET, P. SEDNAOUI, V. MASSARI, E. LAURENT, LES BIOLOGISTES DE RENAGO et LES MÉDECINS CHARGÉS DES ACTIONS DE SANTÉ DANS LES CONSEILS GÉNÉRAUX, « Confirmation de la recrudescence des gonococcies en France depuis 1998 », *Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire*, n° 14, 3 avril 2001 (dans le site de l'Institut de Veille Sanitaire : <http://www.invs.sante.fr>).

4. I.G. STOLTE et autres, « Increase in sexually transmitted infections among homosexual men in Amsterdam in relation to HAART », *Sexually Transmitted Infections*, vol. 77, n° 3, 2001, p. 184-186.

3.4 L'hépatite B

Le tableau T95 présente le type de validation des cas déclarés d'hépatite B. Depuis 1996, la proportion des cas caractérisés en épisodes chroniques ou aigus et validés sur la seule base des signes cliniques a augmenté, pour atteindre 58 % en 2000.

Les tableaux T96 à T136 décrivent la distribution des cas aigus par région, âge et sexe. Les tableaux T137 à T143 présentent les cas chroniques et le tableau T144, les cas de type non précisé.

La majorité des régions déclarent dix cas aigus ou moins par année. Il est donc difficile d'en dégager des tendances. Seules les régions de Québec, de Montréal-Centre et de la Montérégie déclarent un plus grand nombre de cas. Le nombre de cas déclarés dans la région de Québec reste stable, et il fluctue un peu d'une année à l'autre dans la Montérégie. Dans la région de Montréal-Centre, le nombre de cas aigus déclarés chez les hommes est passé de 37 en 1999 à 65 en 2000.

Discussion

Le programme de vaccination contre l'hépatite B implanté en 1994 devrait continuer à faire baisser le nombre de cas déclarés dans les années à venir. L'augmentation observée chez les hommes de la région de Montréal-Centre reste pour le moment inexpliquée. Les professionnels de la santé publique de cette région nous indiquent qu'il n'y aurait pas eu intensification des efforts de dépistage en 2000. Même s'il semble possible qu'une partie de l'augmentation puisse peut-être s'expliquer par un plus grand nombre de cas aigus détectés chez les immigrants, cela n'explique pas le fait que le nombre de cas n'a augmenté que chez les hommes.

Il ne faut pas oublier que cette augmentation du taux d'incidence dans la déclaration de cas masculins se produit parallèlement à une augmentation de l'incidence de la gonorrhée et à une éclosion de syphilis touchant particulièrement les hommes de la région de Montréal-Centre.

3.5 La syphilis

Au Québec, les infections syphilitiques peuvent être déclarées selon neuf catégories différentes. La classification des cas selon la présentation clinique étant très complexe, il y a un risque d'erreur de classification des cas déclarés. Ces erreurs sont rarement corrigées puisque aucun effort systématique de validation des cas enregistrés n'est fait. Il est donc difficile d'interpréter les tendances observées.

Nous avons catégorisé les cas de syphilis déclarés en cas « récents » ou « anciens », selon les définitions suivantes :

- cas récents : infections primaires, secondaires et latentes d'un an ou moins ;
- cas anciens : infections asymptomatiques : latentes de plus d'un an et neurologiques ;
infections devenues symptomatiques : symptomatiques tardives, neurologiques et cardiovasculaires.

Les tableaux T145 et T146 présentent les cas de syphilis selon le stade de la maladie et le sexe. Le nombre de cas de syphilis ancienne devenue symptomatique déclarés est relativement peu élevé. La distribution des cas d'infection récente déclarés est présentée aux tableaux T147 à T151, tandis que celle des syphilis anciennes l'est au tableau T152.

Six cas d'infection syphilitique récente ont été déclarés en 2000. Quatre touchent des hommes, deux des femmes, et tous ont été déclarés dans la région de Montréal-Centre.

Discussion

Les cas d'infection syphilitique récente rapportés dans la région de Montréal-Centre en 2000 étaient inquiétants puisque d'autres cas ont ensuite été déclarés en 2001. On a assisté dans cette région à une éclosion des cas qui semble toucher particulièrement les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, tel que le décrit un rapport produit par la Direction de la santé publique de Montréal-Centre en juillet 2001⁵.

Il est possible que l'éclosion de syphilis observée dans la région de Montréal-Centre soit causée par un relâchement des pratiques sexuelles sécuritaires. Un tel relâchement a été observé ailleurs dans le monde⁶⁻⁸.

5. Le rapport est dans le site de la Direction : <http://www.santepub-mtl.qc.ca/Mi/vigilance/syphilis23072001.html>.

6. R.J. WOLITSKI et autres, « Are we headed for a resurgence of the HIV epidemic among men who have sex with men ? », *American Journal of Public Health*, vol. 91, n° 6, 2001, p. 883-888 (Review).

7. M. REKART et autres, « Traitement et prophylaxie de masse durant une éclosion de syphilis infectieuse à Vancouver (Colombie-Britannique) », *Relevé des maladies transmissibles au Canada*, vol. 26, 15 juin 2000 (dans le site de Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/publicat/ccdr/00vol26/rm2612f.html).

8. J.C. DESENCLOS, « Résurgence de la syphilis en France, 2000-2001 », *Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire*, n°35-36, 28 août 2001 (dans le site de l'Institut de Veille Sanitaire : <http://www.invs.sante.fr>).

4. Conclusion

On observe cette année une augmentation de l'incidence de l'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* dans plusieurs régions. Dans la région de Montréal-Centre, on observe aussi des augmentations des taux d'incidence de la gonorrhée et des excès de cas d'hépatite B aiguë et de syphilis infectieuse déclarés chez les hommes.

La situation devient donc préoccupante, surtout quand on sait qu'en Europe, aux États-Unis et ailleurs au Canada, on a récemment observé soit un relâchement des pratiques sexuelles sécuritaires, soit une augmentation de l'incidence des infections transmissibles sexuellement, et parfois les deux.

Même si nous n'avons pas de données comportementales similaires au Québec, il serait imprudent de nous croire à l'abri de phénomènes observés ailleurs.

5. Notes techniques

La déclaration anonyme de la gonorrhée et de la syphilis rend difficile la détection des cas déclarés plus d'une fois. Pour les gonorrhées résistantes aux antibiotiques, le personnel du LSPQ fait toutefois certaines vérifications quant aux « doublons démographiques », puisque tous les laboratoires du Québec informent mensuellement le LSPQ du nombre de souches isolées dans le cadre du programme de surveillance du gonocoque résistant aux antibiotiques. On compare ainsi le nombre de déclarations au nombre de souches rapportées par les laboratoires. Ces vérifications ne sont pas faites pour les cas de syphilis. Les doublons dans les déclarations nominales d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* et d'hépatite B peuvent être décelés plus facilement.

Étant donné le faible nombre de cas, nous ne présentons que quelques histogrammes dans le cas des syphilis récentes.

Nous ne calculons pas les taux d'incidence des hépatites B chroniques et des syphilis anciennes. Les taux générés ne seraient que le reflet du rythme de détection des cas.

Les tableaux contiennent les cas pour lesquels la variable d'intérêt n'a pas été catégorisée. Pour faciliter les comparaisons, des taux ont été générés à partir de ces cas. Le dénominateur est toujours ici la population de référence à laquelle peut s'appliquer le numérateur observé. Ce taux s'ajoute aux taux générés pour les cas où la valeur de la variable n'est pas manquante, comme l'illustre l'exemple suivant : en 1997, quatorze cas d'infection génitale à *Chlamydia trachomatis* ont été déclarés au Québec sans que le sexe du patient ne soit précisé, pour un taux de 0,2 par 100 000 habitants si l'on rapporte ce nombre de cas à l'ensemble de la population québécoise.

Nous ne présentons pas les taux d'incidence ajustés dans chaque région à la structure d'âge provinciale. L'exercice fait en 1998 nous avait amenés à conclure que cet ajustement n'avait pas d'effet significatif en dehors des régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, où les taux ajustés étaient inférieurs d'environ 15 % et 30 % respectivement.

La banque MADO 1990-2000 utilisée ici a été importée le 23 mai 2001.

On trouvera dans cette section :

Données générales

- Le nombre de cas déclarés par année et maladie (**MTS total**)..... T1
- Les caractéristiques d'âge et de sexe des cas déclarés (**ÂGEsexe**).. T2
- Les tendances centrales de l'âge des cas déclarés par sexe et maladie (**ÂGE_{moy}**)..... T3
- L'origine des déclarations par année et maladie (**ORIdécl**)..... T4

Nombre de cas déclarés par année d'épisode et maladie, Québec, 1996-2000					
Nombre de cas (pourcentage)					
	Infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i>	Gonorrhée	Hépatite B	Syphilis	Total
1996	6 675 (76,1)	478 (5,5)	1 548 (17,7)	63 (0,7)	8 764 (100)
1997	6 461 (75,5)	556 (6,5)	1 488 (17,4)	52 (0,6)	8 557 (100)
1998	7 245 (79,8)	495 (5,5)	1 293 (14,2)	50 (0,6)	9 083 (100)
1999	7 999 (80,4)	624 (6,3)	1 299 (13,1)	33 (0,3)	9 955 (100)
2000	8 747 (81,4)	673 (6,3)	1 296 (12,1)	32 (0,3)	10 748 (100)
Total	37 127 (78,8)	2 826 (6,0)	6 924 (14,7)	230 (0,5)	47 107 (100)

Caractéristiques des cas¹ déclarés selon l'âge et le sexe, Québec, 1996-2000

Nombre de cas déclarés pour lesquels l'âge du patient est connu	46 502 (98,8 %)
Nombre de cas déclarés pour lesquels le sexe du patient est connu	46 947 (99,7 %)
Nombre de cas déclarés chez les hommes	16 227 (34,6 %)
Hommes d'âge connu	16 044 (98,9 %)
Nombre de cas déclarés chez les femmes	30 720 (67,1 %)
Femmes d'âge connu	30 391 (98,9 %)
Âge médian (moyen) des cas déclarés chez les femmes ²	21 ans (23,3)
Âge médian (moyen) des cas déclarés chez les hommes ²	27 ans (30,7)

1. Entre 1996 et 2000, 47 089 cas d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*, de gonorrhée, d'hé

2. La médiane est la mesure de tendance centrale à retenir à cause des valeurs extrêmes observées

Mesures des tendances centrales de l'âge des cas déclarés par sexe et type de maladie, Québec (2000)

	Infection génitale par <i>Chlamydia</i> <i>trachomatis</i>	Gonorrhée	Hépatite B (1)	Hépatite B aiguë	Hépatite B chronique	Syphilis récente (2)	Syphilis ancienne (3)	Total des cas
Femmes								
Nombre de cas (4)	6 444	126	458	46	376	2	8	7 038
Age (années)								
médian	20	21	34	31,5	34		29,5	21
moyen	21,9	23,4	36,5	31,5	37,1		44,6	22,9
écart-type	6,0	9,1	15,9	15,0	15,6		26,9	8,1
étendue totale	<1-82	13-60	<1-87	<1-66	<1-87		23-85	<1-87
étendue 1er-99e percentile	14-45	13-58	1-83	<1-66	1-83		23-85	14-57
Hommes								
Nombre de cas (4)	2 209	537	830	136	565	4	13	3 598
Age (années)								
médian	24	32	40	40	41		45	27
moyen	26,1	32,0	40,9	39,4	41,7		50,8	30,7
écart-type	7,9	9,2	14,1	13,8	14,3		18,5	11,7
étendue totale	<1-66	15-64	<1-83	1-77	<1-83		24-85	<1-85
étendue 1er-99e percentile	16-53	16-55	6-75	<6-75	9-77		24-85	16-69
Valeurs-p								
vs moyennes (5)	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0011	<0,0001		0,5417	<0,0001
vs médianes (6)	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0017	<0,0001		0,2877	<0,0001

(1): Total des cas

(2): Syphilis primaire, secondaire et latente de moins d'un an.

(3): Syphilis latente de plus d'un an et cérébrale asymptomatique.

(4): Nombre de cas pour lesquels les données étaient disponibles pour les calculs.

(5): Test de Student comparant la moyenne d'âge des cas déclarés chez les femmes à celle des cas déclarés chez les hommes.

(6): Test de Wilcoxon comparant la médiane d'âge des cas déclarés chez les femmes à celle des cas déclarés chez les hommes.

Origine de la déclaration des cas de MTS inscrits au fichier MADQ, Québec, 1996-2000

	Origine de la déclaration	Nombre (pourcentage) de déclarations				
		Année de déclaration				
		1996	1997	1998	1999	2000
Infection génitale par Chlamydia trachomatis	Médecin	891 (13,3)	499 (7,7)	546 (7,5)	503 (6,3)	497 (5,7)
	Laboratoire	5 784 (86,7)	5 962 (92,3)	6 699 (92,5)	7 496 (93,7)	8 250 (94,3)
Gonorrhée	Médecin	123 (25,7)	60 (10,8)	56 (11,3)	44 (7,1)	38 (5,7)
	Laboratoire	355 (74,3)	496 (89,2)	439 (88,7)	580 (92,9)	635 (94,3)
Hépatite B	Médecin	124 (8,0)	100 (6,7)	79 (6,1)	52 (4,0)	57 (4,4)
	Laboratoire	1 424 (92,0)	1 388 (93,3)	1 214 (93,9)	1 247 (96,0)	1 239 (95,6)
Syphilis	Médecin	58 (92,1)	50 (96,2)	43 (86,0)	30 (90,9)	30 (93,8)
	Laboratoire	5 (7,9)	2 (3,8)	7 (14,0)	3 (9,1)	2 (6,2)

On trouvera dans cette section :

Infections génitales à *Chlamydia trachomatis*


- Le type d'infection à *Chlamydia trachomatis*, le sexe des patients et le type d'infection (**CHLAMtype**) T5
- L'histogramme du taux d'incidence (TI) provincial (**chlamprov**) et de ses variations annuelles (**chlamVARan**)..... T6
- L'histogramme du taux d'incidence de chacune des régions (**chlamNUMÉRO**)..... T8
- La tendance des TI depuis 1988 par sexe (**TIséculCHL**) T26
- Deux tableaux donnant les nombres de cas déclarés et les TI correspondants par année, région et sexe (**NBrssCHL** et **TlrssCHL**) T27
- La distribution des nombres de cas déclarés et des TI correspondants par âge, région et sexe (**NBâgeCHLAMtot1** à **TlâgeCHLAMhom2**)..... T29
- La variation du nombre de cas déclarés et des TI correspondants par âge et sexe (**varNBâgeCHLAMfem** à **varTlâgeCHLAMhom**) T41
- Le taux d'incidence moyen par groupe d'âge et sexe ainsi que l'évolution des TI par groupe d'âge et sexe (**évoÂGEchlamTOT**, **évoÂGEchlamFEM** et **évoÂGEchlamHOM**) T45

Type d'infection par Chlamydia trachomatis¹, sexe des patients et type de cas déclarés. Québec. 1996-2000

Nombre de cas déclarés chez les femmes	27 409 (74,0 %)
Nombre de cas déclarés chez les hommes	9 645 (26,0 %)
Nombre de cas génitaux	37 028 (99,8 %)
Nombre de cas oculaires	70 (0,2 %)
Nombre de cas pulmonaires	29 (0,1 %)

1. Un total de 37 109 cas ont été déclarés entre 1996 et 2000.

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe , Québec (1990-2000)**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	83	7	0	90
1991	11635	3742	40	15417
1992	9822	3459	37	13318
1993	8547	3112	31	11690
1994	7364	2645	5	10014

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	5295	1768	11	7074
1996	5014	1653	8	6675
1997	4812	1635	14	6461
1998	5249	1982	14	7245
1999	5835	2145	19	7999
2000	6499	2230	18	8747

**Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par
Chlamydia trachomatis Québec (1991-2000)**




Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence *

	Femmes	Hommes	Total
1991	-15,6	-7,6	-13,6
1992	-13,0	-10,0	-12,2
1993	-13,8	-15,0	-14,3
1994	-24,4	-26,2	-25,0
1995	-10,1	-15,5	-11,5
1996	-6,1	-7,3	-6,4
1997	-4,7	-1,9	-3,9
1998	8,3	20,3	11,3
1999	10,4	7,4	9,6
2000	10,6	3,2	8,6

*: (taux année courante)-(taux année antérieure)/(taux année antérieure) *100

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région du Bas-St-Laurent**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	246	97	2	345
1991	273	136	2	411
1992	217	118	2	337
1993	194	104	0	298
1994	139	79	0	218

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	131	74	0	205
1996	98	66	0	164
1997	118	64	0	182
1998	145	104	0	249
1999	96	50	0	146
2000	94	50	1	145

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région du Saguenay/Lac St-Jean**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	458	181	2	641
1991	490	149	17	656
1992	436	165	21	622
1993	413	126	2	541
1994	304	109	3	416

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	280	90	3	373
1996	273	82	5	360
1997	194	72	5	271
1998	204	72	3	279
1999	244	84	0	328
2000	253	93	0	346

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région de Québec**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	1046	418	3	1467
1991	1021	368	1	1390
1992	721	279	1	1001
1993	663	242	0	905
1994	548	201	0	749

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	416	148	0	564
1996	413	159	0	572
1997	472	177	0	649
1998	533	211	0	744
1999	593	223	0	816
2000	579	225	0	804

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région de la Mauricie/Centre du Québec**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	583	195	0	778
1991	548	204	0	752
1992	491	195	0	686
1993	408	139	0	547
1994	354	144	0	498

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	272	126	0	398
1996	318	95	0	413
1997	253	90	0	343
1998	316	139	2	457
1999	290	105	6	401
2000	373	143	6	522

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région de l'Estrie**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	462	206	0	668
1991	467	185	0	652
1992	464	142	0	606
1993	301	107	0	408
1994	216	83	0	299

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	239	73	0	312
1996	235	70	0	305
1997	202	76	0	278
1998	199	98	1	298
1999	230	97	0	327
2000	270	107	0	377

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région de Montréal centre**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	3590	938	18	4546
1991	2252	873	14	3139
1992	1965	725	2	2692
1993	1642	649	2	2293
1994	1341	464	5	1810

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	1336	441	7	1784
1996	1267	448	3	1718
1997	1341	483	8	1832
1998	1490	569	7	2066
1999	1774	709	12	2495
2000	1945	645	9	2599

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région de l'Outaouais**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	600	153	0	753
1991	509	103	0	612
1992	394	110	0	504
1993	414	101	0	515
1994	310	68	0	378

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	270	60	0	330
1996	228	50	0	278
1997	187	50	0	237
1998	220	59	0	279
1999	278	72	0	350
2000	281	92	1	374

**Taux d'incidence des cas déclarés de d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région de l'Abitibi/Témiscamingue**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	501	155	1	657
1991	467	155	0	622
1992	352	111	0	463
1993	341	119	0	460
1994	266	96	0	362

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	208	85	0	293
1996	210	76	0	286
1997	173	48	0	221
1998	150	50	0	200
1999	127	46	0	173
2000	205	49	0	254

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région de la Côte-Nord**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	397	157	0	554
1991	358	130	0	488
1992	297	110	0	407
1993	260	103	0	363
1994	226	74	0	300

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	225	65	0	290
1996	198	64	0	262
1997	146	68	0	214
1998	173	55	0	228
1999	205	62	0	267
2000	173	67	0	240

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région Nord-du-Québec**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	52	24	0	76
1991	52	34	0	86
1992	57	20	0	77
1993	48	16	0	64
1994	25	17	0	42

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	28	6	0	34
1996	15	8	0	23
1997	10	3	0	13
1998	12	1	0	13
1999	15	7	0	22
2000	11	5	0	16

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région de la Gaspésie/Iles de la Madeleine**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	194	48	0	242
1991	178	38	2	218
1992	150	59	0	209
1993	132	63	1	196
1994	79	29	1	109

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	62	18	0	80
1996	60	10	0	70
1997	42	14	0	56
1998	22	9	0	31
1999	20	3	0	23
2000	44	16	0	60

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région Chaudière/Appalaches**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	389	143	1	533
1991	333	108	1	442
1992	261	94	0	355
1993	220	89	0	309
1994	165	66	0	231

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	116	47	0	163
1996	160	59	0	219
1997	145	69	0	214
1998	171	61	0	232
1999	162	66	0	228
2000	183	76	0	259

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région de Laval**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	472	211	6	689
1991	375	191	0	566
1992	356	205	0	561
1993	311	162	0	473
1994	199	82	2	283

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	165	72	1	238
1996	132	50	0	182
1997	187	47	0	234
1998	200	84	0	284
1999	212	88	0	300
2000	276	102	0	378

**Taux d'incidence des cas déclarés de d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région de Lanaudière**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	374	116	1	491
1991	359	137	0	496
1992	342	119	0	461
1993	263	95	0	358
1994	236	89	0	325

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	169	60	0	229
1996	176	63	0	239
1997	221	52	0	273
1998	188	66	0	254
1999	294	107	0	401
2000	304	91	0	395

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région des Laurentides**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	650	206	0	856
1991	605	184	0	789
1992	493	168	0	661
1993	492	161	0	653
1994	356	139	0	495

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	332	110	0	442
1996	298	86	0	384
1997	273	63	0	336
1998	295	97	0	392
1999	301	101	0	402
2000	387	118	0	505

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région de la Montérégie**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	1290	435	5	1730
1991	1161	394	0	1555
1992	1183	416	2	1601
1993	924	300	0	1224
1994	759	282	0	1041

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	738	235	0	973
1996	589	195	0	784
1997	588	183	1	772
1998	651	220	1	872
1999	727	242	1	970
2000	875	282	1	1158

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région Nunavik**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	222	49	1	272
1991	273	62	0	335
1992	283	64	3	350
1993	253	67	0	320
1994	218	49	0	267

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	205	50	0	255
1996	261	65	0	326
1997	193	66	0	259
1998	159	72	0	231
1999	189	77	0	266
2000	185	66	0	251

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-2000)
Région Terres Cries/Baie-James**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	109	10	0	119
1991	101	8	0	109
1992	85	12	0	97
1993	85	2	0	87
1994	99	3	0	102

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	103	8	0	111
1996	83	7	0	90
1997	67	10	0	77
1998	121	15	0	136
1999	78	6	0	84
2000	61	3	0	64

Evolution par sexe des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par
Chlamydia trachomatis, Québec (1988-2000)



Taux d'incidence par 100 000

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Femmes	386,8	359,6	331,4	279,9	243,1	201,3	158,3	142,4	133,8	123,5	138,5	152,2	168,5
Hommes	147,3	117,5	111,0	102,7	92,2	74,4	57,8	48,9	45,3	43,1	53,5	57,5	59,3
Total	284,7	241,8	224,0	193,6	169,6	138,8	108,9	96,4	90,3	84,1	96,7	105,7	114,9

Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996	98	66	0	164
	1997	118	64	0	182
	1998	145	104	0	249
	1999	96	50	0	146
	2000	94	50	1	145
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	273	82	5	360
	1997	194	72	5	271
	1998	204	72	3	279
	1999	244	84	0	328
	2000	253	93	0	346
Québec	1996	413	159	0	572
	1997	472	177	0	649
	1998	533	211	0	744
	1999	593	223	0	816
	2000	579	225	0	804
Mauricie/ Centre du Québec	1996	318	95	0	413
	1997	253	90	0	343
	1998	316	139	2	457
	1999	290	105	6	401
	2000	373	143	6	522
Estrie	1996	235	70	0	305
	1997	202	76	0	278
	1998	199	98	1	298
	1999	230	97	0	327
	2000	270	107	0	377
Montréal centre	1996	1267	448	3	1718
	1997	1341	483	8	1832
	1998	1490	569	7	2066
	1999	1774	709	12	2495
	2000	1945	645	9	2599
Outaouais	1996	228	50	0	278
	1997	187	50	0	237
	1998	220	59	0	279
	1999	278	72	0	350
	2000	281	92	1	374
Abitibi/ Témiscamingue	1996	210	76	0	286
	1997	173	48	0	221
	1998	150	50	0	200
	1999	127	46	0	173
	2000	205	49	0	254
Côte-Nord	1996	198	64	0	262
	1997	146	68	0	214
	1998	173	55	0	228
	1999	205	62	0	267
	2000	173	67	0	240
Nord-du- Québec	1996	15	8	0	23
	1997	10	3	0	13
	1998	12	1	0	13
	1999	15	7	0	22
	2000	11	5	0	16

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la madeleine	1996	60	10	0	70
	1997	42	14	0	56
	1998	22	9	0	31
	1999	20	3	0	23
	2000	44	16	0	60
Chaudière/ Appalaches	1996	160	59	0	219
	1997	145	69	0	214
	1998	171	61	0	232
	1999	162	66	0	228
	2000	183	76	0	259
Laval	1996	132	50	0	182
	1997	187	47	0	234
	1998	200	84	0	284
	1999	212	88	0	300
	2000	276	102	0	378
Lanaudière	1996	176	63	0	239
	1997	221	52	0	273
	1998	188	66	0	254
	1999	294	107	0	401
	2000	304	91	0	395
Laurentides	1996	298	86	0	384
	1997	273	63	0	336
	1998	295	97	0	392
	1999	301	101	0	402
	2000	387	118	0	505
Montérégie	1996	589	195	0	784
	1997	588	183	1	772
	1998	651	220	1	872
	1999	727	242	1	970
	2000	875	282	1	1158
Nunavik	1996	261	65	0	326
	1997	193	66	0	259
	1998	159	72	0	231
	1999	189	77	0	266
	2000	185	66	0	251
Terres Cries/ Baie-James	1996	83	7	0	90
	1997	67	10	0	77
	1998	121	15	0	136
	1999	78	6	0	84
	2000	61	3	0	64
Province de Québec	1996	5014	1653	8	6675
	1997	4812	1635	14	6461
	1998	5249	1982	14	7245
	1999	5835	2145	19	7999
	2000	6499	2230	18	8747

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996	94,4	65,6	0,0	80,2
	1997	114,2	64,1	0,0	89,6
	1998	141,1	105,0	0,0	123,3
	1999	93,9	50,8	0,0	72,8
	2000	92,5	51,2	0,5	72,8
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	188,7	56,7	1,7	124,4
	1997	134,6	50,0	1,7	94,0
	1998	142,0	50,2	1,0	97,2
	1999	170,6	58,8	0,0	114,8
	2000	177,6	65,4	0,0	121,6
Québec	1996	123,9	50,6	0,0	88,4
	1997	141,1	56,2	0,0	99,9
	1998	158,7	66,7	0,0	114,1
	1999	175,9	70,3	0,0	124,7
	2000	171,2	70,7	0,0	122,5
Mauricie/ Centre du Québec	1996	128,7	39,4	0,0	84,6
	1997	102,1	37,2	0,0	70,0
	1998	127,2	57,2	0,4	93,0
	1999	116,5	43,1	1,2	81,4
	2000	149,4	58,5	1,2	105,7
Estrie	1996	163,9	50,4	0,0	108,0
	1997	140,2	54,5	0,0	98,0
	1998	137,5	69,9	0,4	104,6
	1999	158,2	68,9	0,0	114,3
	2000	185,0	75,8	0,0	131,3
Montréal centre	1996	131,9	50,3	0,2	92,8
	1997	139,2	54,0	0,4	98,6
	1998	154,2	63,4	0,4	110,9
	1999	183,0	78,7	0,6	133,4
	2000	200,1	71,3	0,5	138,5
Outaouais	1996	142,6	31,6	0,0	87,4
	1997	115,0	31,1	0,0	73,3
	1998	133,1	36,2	0,0	84,9
	1999	165,6	43,5	0,0	104,9
	2000	164,9	54,7	0,3	110,5
Abitibi/ Témiscamingue	1996	271,0	93,6	0,0	180,2
	1997	222,9	58,9	0,0	138,9
	1998	192,9	61,2	0,0	125,4
	1999	163,0	56,1	0,0	108,2
	2000	262,6	59,6	0,0	158,4
Côte-Nord	1996	390,7	118,9	0,0	250,7
	1997	289,2	126,7	0,0	205,5
	1998	344,0	102,9	0,0	219,8
	1999	409,4	116,5	0,0	258,4
	2000	347,0	126,4	0,0	233,3
Nord-du- Québec	1996	155,9	76,0	0,0	114,2
	1997	104,5	28,6	0,0	64,9
	1998	125,9	9,6	0,0	65,1
	1999	158,1	67,4	0,0	110,7
	2000	116,4	48,3	0,0	80,8

Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total	
Gaspésie/ Îles de la madeleine	1996	115,6	19,2	0,0	67,3
	1997	81,6	27,1	0,0	54,3
	1998	43,1	17,6	0,0	30,3
	1999	39,5	5,9	0,0	22,7
	2000	87,6	31,8	0,0	59,7
Chaudière/ Appalaches	1996	83,1	30,6	0,0	56,8
	1997	75,1	35,6	0,0	55,3
	1998	88,3	31,4	0,0	59,8
	1999	83,5	33,9	0,0	58,6
	2000	94,1	38,9	0,0	66,5
Laval	1996	75,3	29,1	0,0	52,4
	1997	105,3	27,0	0,0	66,6
	1998	111,3	47,7	0,0	79,8
	1999	116,6	49,5	0,0	83,4
	2000	150,1	56,7	0,0	103,9
Lanaudière	1996	91,6	32,1	0,0	61,6
	1997	112,8	26,0	0,0	68,9
	1998	94,2	32,3	0,0	62,9
	1999	144,7	51,4	0,0	97,5
	2000	147,1	43,0	0,0	94,4
Laurentides	1996	133,9	38,3	0,0	85,9
	1997	119,9	27,4	0,0	73,4
	1998	126,8	41,3	0,0	83,8
	1999	126,7	42,1	0,0	84,2
	2000	159,7	48,2	0,0	103,6
Montérégie	1996	87,2	29,2	0,0	58,4
	1997	85,8	27,0	0,1	56,7
	1998	93,7	32,0	0,1	63,1
	1999	103,3	34,8	0,1	69,3
	2000	122,8	40,0	0,1	81,7
Nunavik	1996	5532,0	1376,0	0,0	3452,7
	1997	3946,0	1362,8	0,0	2660,8
	1998	3150,4	1451,9	0,0	2308,6
	1999	3637,4	1521,4	0,0	2593,4
	2000	3472,2	1278,8	0,0	2393,0
Terres Cries/ Baie-James	1996	2068,8	159,2	0,0	1070,2
	1997	1684,7	228,5	0,0	921,7
	1998	3078,9	344,5	0,0	1641,7
	1999	2004,1	138,6	0,0	1021,6
	2000	1576,2	69,5	0,0	782,0
Province de Québec	1996	133,7	45,3	0,1	90,2
	1997	127,4	44,5	0,2	86,7
	1998	138,0	53,5	0,2	96,5
	1999	152,3	57,5	0,3	105,8
	2000	168,5	59,3	0,2	114,9

Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	1	1	54	63	18	12	5	3	3	0	4	164
	1997	0	2	58	83	23	12	2	2	0	0	0	182
	1998	2	0	85	105	29	15	5	8	0	0	0	249
	1999	1	0	51	58	17	10	3	3	0	0	3	146
	2000	0	1	30	59	29	9	8	4	3	1	1	145
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	1	6	157	120	33	16	8	6	2	0	11	360
	1997	1	0	87	106	39	11	11	5	0	0	11	271
	1998	0	2	88	102	35	25	8	4	2	2	11	279
	1999	0	1	80	143	61	21	11	6	2	0	3	328
	2000	0	3	132	139	39	16	8	6	3	0	0	346
Québec	1996	2	5	154	258	73	38	11	20	6	2	3	572
	1997	1	5	189	269	84	54	18	20	3	4	2	649
	1998	0	5	224	278	119	58	36	15	4	2	3	744
	1999	3	6	235	336	124	54	22	25	6	3	2	816
	2000	1	7	210	323	144	41	33	29	7	3	6	804
Mauricie/ Centre du Québec	1996	1	6	136	138	61	28	18	18	3	2	2	413
	1997	1	3	124	130	49	15	11	3	0	1	6	343
	1998	0	5	123	203	71	29	10	8	1	0	7	457
	1999	2	1	117	174	57	15	12	12	3	0	8	401
	2000	1	6	172	220	69	28	5	9	6	2	4	522
Estrie	1996	2	1	90	120	45	20	11	14	2	0	0	305
	1997	1	1	96	106	42	11	17	3	1	0	0	278
	1998	2	1	91	126	41	18	14	5	0	0	0	298
	1999	1	0	96	144	41	19	13	10	3	0	0	327
	2000	0	1	119	171	46	21	9	6	4	0	0	377
Montréal centre	1996	5	14	469	608	285	155	64	47	12	2	57	1718
	1997	4	20	537	622	294	139	71	57	11	4	73	1832
	1998	3	18	619	751	328	154	81	35	15	2	60	2066
	1999	6	18	721	917	382	204	112	72	13	2	48	2495
	2000	8	20	771	936	402	184	127	81	12	1	57	2599
Outaouais	1996	2	3	95	96	43	16	7	6	0	0	10	278
	1997	0	3	71	90	39	14	11	4	1	0	4	237
	1998	2	4	80	96	52	17	10	7	7	0	4	279
	1999	0	2	137	114	60	21	8	5	0	0	3	350
	2000	0	8	114	141	57	26	15	8	1	0	4	374
Abitibi/ Témiscamingue	1996	2	1	111	103	25	28	8	5	2	1	0	286
	1997	0	6	100	62	31	11	7	3	1	0	0	221
	1998	0	3	96	60	23	15	1	1	1	0	0	200
	1999	0	4	72	53	22	12	3	3	3	0	1	173
	2000	0	7	92	93	34	17	3	5	3	0	0	254
Côte-Nord	1996	0	5	94	92	33	26	9	2	0	0	1	262
	1997	2	6	79	72	27	14	9	2	1	0	2	214
	1998	1	8	75	76	39	18	6	3	0	1	1	228
	1999	0	7	110	82	32	23	7	6	0	0	0	267
	2000	0	5	94	72	35	20	5	5	1	1	2	240
Nord-du Québec	1996	0	0	6	10	3	3	0	0	1	0	0	23
	1997	0	0	8	1	2	1	1	0	0	0	0	13
	1998	0	0	7	3	0	1	1	1	0	0	0	13
	1999	0	0	7	9	3	0	2	1	0	0	0	22
	2000	0	1	8	4	1	0	1	1	0	0	0	16

Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0	1	22	30	5	8	2	1	0	0	1	70
	1997	1	1	19	12	10	3	3	5	0	0	2	56
	1998	0	0	8	9	7	3	1	2	1	0	0	31
	1999	0	1	6	9	4	2	0	1	0	0	0	23
	2000	0	0	24	19	12	0	3	0	0	0	2	60
Chaudière/ Appalaches	1996	0	1	67	80	33	21	12	3	0	1	1	219
	1997	0	0	71	73	33	17	12	2	1	0	5	214
	1998	1	2	62	94	36	22	5	5	1	0	4	232
	1999	0	0	70	102	29	9	7	8	1	0	2	228
	2000	0	0	74	104	44	13	8	9	2	2	3	259
Laval	1996	0	2	71	64	20	10	8	5	1	1	0	182
	1997	1	4	99	79	28	9	5	6	2	0	1	234
	1998	0	5	94	105	41	18	11	4	2	3	1	284
	1999	0	6	112	104	35	21	8	11	3	0	0	300
	2000	0	3	131	130	60	28	15	6	4	0	1	378
Lanaudière	1996	0	2	101	83	26	10	10	6	0	0	1	239
	1997	2	1	108	91	23	21	8	9	0	0	10	273
	1998	0	10	101	84	32	11	10	4	1	0	1	254
	1999	0	5	151	144	59	23	9	6	2	0	2	401
	2000	0	8	139	161	52	22	7	5	1	0	0	395
Laurentides	1996	1	6	132	136	47	21	22	5	13	1	0	384
	1997	0	4	120	108	64	13	18	6	3	0	0	336
	1998	0	3	133	143	56	18	23	12	3	1	0	392
	1999	0	7	172	136	53	19	7	7	0	1	0	402
	2000	0	7	199	182	61	28	13	10	5	0	0	505
Montérégie	1996	1	9	277	278	110	46	18	31	5	0	9	784
	1997	0	8	288	279	98	45	20	19	10	1	4	772
	1998	2	9	339	331	110	43	20	13	3	1	1	872
	1999	1	11	363	366	128	52	26	18	2	1	2	970
	2000	1	15	447	445	136	47	38	20	6	1	2	1158
Nunavik	1996	1	5	90	89	68	42	16	10	4	1	0	326
	1997	0	7	61	77	45	43	15	8	2	1	0	259
	1998	2	8	49	57	44	36	26	7	0	0	2	231
	1999	1	6	67	78	41	32	25	8	5	1	2	266
	2000	0	2	78	74	40	30	16	10	1	0	0	251
Terres Cries/ Baie James	1996	0	4	30	35	13	5	0	1	1	0	1	90
	1997	0	0	29	26	17	3	2	0	0	0	0	77
	1998	1	1	45	45	27	9	1	3	2	0	2	136
	1999	0	1	27	29	18	5	3	1	0	0	0	84
	2000	0	1	20	23	13	3	3	0	1	0	0	64
Province de Québec	1996	19	72	2156	2403	941	505	229	183	55	11	101	6675
	1997	14	71	2144	2286	948	436	241	154	36	11	120	6461
	1998	16	84	2319	2668	1090	510	269	137	43	12	97	7245
	1999	15	76	2594	2998	1166	542	278	203	43	8	76	7999
	2000	11	95	2854	3296	1274	533	317	214	60	11	82	8747

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996	9,1	3,7	341,3	519,9	166,6	81,1	27,4	8,9	13,4	0,0	2,0	80,2
	1997	0,0	7,7	371,0	678,4	217,9	87,2	11,4	5,8	0,0	0,0	0,0	89,6
	1998	19,9	0,0	561,4	837,9	278,1	119,1	29,4	22,9	0,0	0,0	0,0	123,3
	1999	10,3	0,0	347,3	455,9	164,6	85,7	18,4	8,5	0,0	0,0	1,5	72,8
	2000	0,0	4,2	215,9	460,4	277,0	82,9	51,5	11,4	11,0	2,5	0,5	72,8
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	5,8	14,7	631,6	631,4	197,2	68,6	29,1	13,1	6,5	0,0	3,8	124,4
	1997	6,0	0,0	354,7	536,3	237,0	51,0	41,0	10,6	0,0	0,0	3,8	94,0
	1998	0,0	5,2	367,6	499,9	212,8	127,0	30,7	8,3	6,0	4,5	3,8	97,2
	1999	0,0	2,7	345,8	679,3	367,6	115,2	44,0	12,2	5,8	0,0	1,0	114,8
	2000	0,0	8,3	600,5	646,3	230,4	93,7	33,2	12,1	8,4	0,0	0,0	121,6
Québec	1996	5,7	7,0	359,8	585,1	157,2	69,9	18,8	18,6	8,0	1,8	0,5	88,4
	1997	2,9	7,0	443,0	608,9	185,6	103,2	31,0	18,3	3,8	3,5	0,3	99,9
	1998	0,0	7,0	534,4	626,0	269,3	116,0	62,6	13,5	4,8	1,7	0,5	114,1
	1999	9,2	8,4	575,0	747,9	285,1	113,1	38,7	22,2	6,9	2,6	0,3	124,7
	2000	3,1	9,8	531,3	712,8	334,9	89,3	58,9	25,6	7,8	2,5	0,9	122,5
Mauricie/ Centre du Québec	1996	3,6	9,6	380,2	467,2	210,6	73,7	41,8	23,2	5,5	2,2	0,4	84,6
	1997	3,7	4,9	345,4	427,2	173,0	41,7	25,7	3,8	0,0	1,1	1,2	70,0
	1998	0,0	8,2	347,9	644,1	255,1	85,4	23,7	9,9	1,7	0,0	1,4	93,0
	1999	7,8	1,7	337,5	537,5	204,5	47,0	29,0	14,6	4,8	0,0	1,6	81,4
	2000	3,9	10,2	512,6	663,8	244,6	92,1	12,4	10,8	9,2	2,1	0,8	105,7
Estrie	1996	11,6	2,7	430,0	643,2	246,0	91,2	45,9	31,9	6,5	0,0	0,0	108,0
	1997	5,9	2,7	460,3	553,6	236,0	51,8	71,5	6,7	3,1	0,0	0,0	98,0
	1998	12,1	2,7	443,1	639,1	235,3	89,1	59,1	11,0	0,0	0,0	0,0	104,6
	1999	6,1	0,0	469,8	717,7	239,1	98,1	55,3	21,8	8,4	0,0	0,0	114,3
	2000	0,0	2,8	594,8	841,5	266,7	112,9	38,9	12,9	10,7	0,0	0,0	131,3
Montréal centre	1996	4,6	7,3	442,0	483,9	188,0	93,0	40,3	17,3	5,9	0,5	3,1	92,8
	1997	3,8	10,2	504,8	494,3	202,0	85,2	44,6	20,7	5,3	1,1	3,9	98,6
	1998	2,9	9,0	580,8	590,5	233,3	97,7	50,6	12,5	7,0	0,5	3,2	110,9
	1999	5,9	8,9	678,3	711,0	279,7	134,4	70,0	25,3	5,9	0,5	2,6	133,4
	2000	8,0	9,8	729,8	719,6	299,1	126,0	79,6	28,0	5,3	0,3	3,0	138,5
Outaouais	1996	8,9	6,9	461,1	446,4	178,7	52,6	22,6	11,8	0,0	0,0	3,1	87,4
	1997	0,0	6,8	338,9	413,3	164,8	47,1	35,1	7,6	2,9	0,0	1,2	73,3
	1998	9,2	8,9	377,0	435,3	221,5	59,3	31,5	12,9	19,3	0,0	1,2	84,9
	1999	0,0	4,4	637,4	512,5	254,5	76,4	25,1	8,9	0,0	0,0	0,9	104,9
	2000	0,0	17,3	524,2	628,0	240,3	98,6	46,9	13,9	2,5	0,0	1,2	110,5
Abitibi/ Témiscamingue	1996	18,1	4,2	890,8	942,3	227,7	197,5	52,7	20,5	13,3	4,8	0,0	180,2
	1997	0,0	25,8	796,2	559,4	288,5	81,1	46,3	11,9	6,3	0,0	0,0	138,9
	1998	0,0	13,0	773,4	530,3	215,3	117,3	6,7	3,9	6,1	0,0	0,0	125,4
	1999	0,0	17,5	586,7	457,5	206,9	99,4	20,6	11,2	17,3	0,0	0,6	108,2
	2000	0,0	31,0	768,1	794,1	316,3	148,6	20,9	18,3	16,5	0,0	0,0	158,4
Côte-Nord	1996	0,0	35,1	1150,0	1199,0	429,4	274,2	92,4	11,9	0,0	0,0	1,0	250,7
	1997	30,4	43,0	990,1	930,4	360,4	153,8	94,6	11,7	8,3	0,0	1,9	205,5
	1998	15,7	58,3	969,9	976,2	530,6	208,6	63,7	17,4	0,0	7,7	1,0	219,8
	1999	0,0	52,0	1469,4	1068,7	433,1	282,1	75,5	34,7	0,0	0,0	0,0	258,4
	2000	0,0	37,9	1311,4	942,9	472,3	260,6	54,7	28,7	7,5	7,2	1,9	233,3
Nord-du Québec	1996	0,0	0,0	317,0	648,9	232,4	165,2	0,0	0,0	49,6	0,0	0,0	114,2
	1997	0,0	0,0	433,8	62,5	158,5	60,5	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9
	1998	0,0	0,0	379,0	181,1	0,0	67,0	53,8	31,0	0,0	0,0	0,0	65,1
	1999	0,0	0,0	396,8	519,9	231,3	0,0	111,0	30,9	0,0	0,0	0,0	110,7
	2000	0,0	31,2	486,0	222,7	73,2	0,0	58,8	30,3	0,0	0,0	0,0	80,8

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0,0	7,6	294,7	443,7	81,2	99,3	21,3	5,8	0,0	0,0	1,0	67,3
	1997	18,2	7,8	259,0	179,9	165,6	39,7	33,0	28,8	0,0	0,0	1,9	54,3
	1998	0,0	0,0	112,9	136,7	117,0	43,1	11,3	11,5	7,9	0,0	0,0	30,3
	1999	0,0	8,2	88,1	139,6	66,5	30,8	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	22,7
	2000	0,0	0,0	367,5	303,2	198,2	0,0	36,5	0,0	0,0	0,0	2,0	59,7
Chaudière/Appalaches	1996	0,0	1,9	223,6	321,6	138,2	67,9	35,0	4,8	0,0	1,6	0,3	56,8
	1997	0,0	0,0	238,0	285,4	139,4	57,8	35,4	3,2	2,3	0,0	1,3	55,3
	1998	4,4	3,9	210,7	358,4	152,0	79,4	14,9	7,8	2,2	0,0	1,0	59,8
	1999	0,0	0,0	243,5	379,0	121,4	34,3	21,2	12,3	2,1	0,0	0,5	58,6
	2000	0,0	0,0	266,1	379,5	181,4	52,0	24,7	13,8	4,0	3,1	0,8	66,5
Laval	1996	0,0	4,5	307,5	289,6	80,8	32,4	24,8	9,3	2,5	1,9	0,0	52,4
	1997	4,6	8,8	423,2	354,6	115,8	29,9	15,3	10,9	4,8	0,0	0,3	66,6
	1998	0,0	10,8	398,3	463,6	173,0	61,9	33,4	7,0	4,7	5,3	0,3	79,8
	1999	0,0	12,8	474,8	451,3	149,8	74,8	24,3	18,7	6,8	0,0	0,0	83,4
	2000	0,0	6,4	556,7	553,5	259,4	103,3	45,7	9,9	8,8	0,0	0,3	103,9
Lanaudière	1996	0,0	3,5	375,5	375,1	104,8	27,5	25,4	9,5	0,0	0,0	0,3	61,6
	1997	7,6	1,7	396,7	393,8	93,0	59,4	20,0	13,8	0,0	0,0	2,5	68,9
	1998	0,0	16,9	369,2	350,0	129,1	32,4	24,7	5,9	2,1	0,0	0,2	62,9
	1999	0,0	8,4	547,1	581,3	236,3	70,4	22,1	8,6	4,1	0,0	0,5	97,5
	2000	0,0	13,2	503,7	636,1	203,7	70,2	17,2	6,9	1,9	0,0	0,0	94,4
Laurentides	1996	3,2	9,6	446,4	519,5	156,3	49,6	49,5	7,0	27,4	1,6	0,0	85,9
	1997	0,0	6,2	395,9	399,5	214,0	31,4	39,6	8,1	5,9	0,0	0,0	73,4
	1998	0,0	4,5	434,7	511,3	186,6	45,0	49,6	15,6	5,6	1,5	0,0	83,8
	1999	0,0	10,4	556,3	473,0	175,4	49,4	14,9	8,8	0,0	1,5	0,0	84,2
	2000	0,0	10,2	641,3	617,4	199,2	75,2	27,4	12,0	8,4	0,0	0,0	103,6
Montréal	1996	1,1	5,0	290,0	320,1	117,9	39,1	14,4	14,3	3,4	0,0	0,7	58,4
	1997	0,0	4,4	300,9	314,0	105,8	39,2	15,9	8,6	6,3	0,5	0,3	56,7
	1998	2,3	4,9	355,6	364,0	119,0	38,7	15,8	5,7	1,8	0,5	0,1	63,1
	1999	1,2	5,9	383,9	393,2	138,5	48,4	20,4	7,8	1,1	0,5	0,1	69,3
	2000	1,2	8,0	480,5	469,6	146,4	45,0	29,9	8,5	3,3	0,5	0,1	81,7
Nunavik	1996	95,7	215,4	10181,0	10194,7	7709,8	5078,6	2305,5	1062,7	867,7	194,6	0,0	3452,7
	1997	0,0	298,9	6732,9	8415,3	5184,3	4976,9	2018,8	820,5	386,8	188,3	0,0	2660,8
	1998	182,0	345,6	5179,7	6202,4	4803,5	4230,3	3274,6	672,4	0,0	0,0	20,0	2308,6
	1999	89,0	260,2	6726,9	8387,1	4442,0	3686,6	3259,5	713,6	798,7	167,8	19,5	2593,4
	2000	0,0	88,0	7242,3	8034,7	4424,8	3413,0	1925,4	884,2	141,0	0,0	0,0	2393,0
Terres Cries/Baie James	1996	0,0	220,8	3654,1	3850,4	1629,1	704,2	0,0	131,2	185,2	0,0	11,9	1070,2
	1997	0,0	0,0	3485,6	3002,3	2063,1	432,3	352,7	0,0	0,0	0,0	0,0	921,7
	1998	110,1	57,5	5590,1	5590,1	3237,4	1291,2	170,4	365,0	366,3	0,0	24,1	1641,7
	1999	0,0	59,0	3413,4	3625,0	2197,8	714,3	497,5	122,9	0,0	0,0	0,0	1021,6
	2000	0,0	60,1	2522,1	2975,4	1585,4	431,0	510,2	0,0	171,2	0,0	0,0	782,0
Province de Québec	1996	4,1	7,7	428,1	499,2	180,4	78,6	34,0	15,8	6,8	0,9	1,4	90,2
	1997	3,1	7,6	424,7	467,4	185,9	70,1	35,7	13,0	4,2	0,9	1,6	86,7
	1998	3,6	8,9	462,1	535,1	217,1	85,6	39,9	11,3	4,8	1,0	1,3	96,5
	1999	3,4	8,1	521,8	590,1	234,4	95,0	41,4	16,4	4,7	0,6	1,0	105,8
	2000	2,6	10,1	584,2	639,8	256,0	97,2	47,6	17,0	6,2	0,8	1,1	114,9

Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	1	1	37	38	7	7	4	0	1	0	2	98
	1997	0	2	46	50	13	5	2	0	0	0	0	118
	1998	2	0	65	50	14	7	2	5	0	0	0	145
	1999	1	0	41	34	8	3	3	3	0	0	3	96
	2000	0	1	27	42	14	3	4	2	1	0	0	94
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0	6	143	85	19	7	5	2	1	0	5	273
	1997	1	0	77	73	21	4	6	3	0	0	9	194
	1998	0	1	75	76	21	13	6	3	1	1	7	204
	1999	0	1	72	113	38	9	6	3	1	0	1	244
	2000	0	3	115	97	18	9	6	3	2	0	0	253
Québec	1996	2	5	129	188	45	18	6	13	3	1	3	413
	1997	1	5	168	189	56	30	8	11	2	1	1	472
	1998	0	4	193	205	73	34	16	4	2	0	2	533
	1999	0	6	203	237	81	35	11	13	4	2	1	593
	2000	1	7	179	235	90	27	21	10	3	2	4	579
Mauricie/ Centre du Québec	1996	1	6	120	104	41	17	10	12	3	2	2	318
	1997	0	3	112	92	27	8	4	2	0	1	4	253
	1998	0	5	100	141	45	15	4	2	1	0	3	316
	1999	2	1	99	124	39	10	5	3	2	0	5	290
	2000	0	6	145	154	47	14	1	2	3	0	1	373
Estrie	1996	1	1	87	89	33	9	7	8	0	0	0	235
	1997	0	1	81	75	28	6	8	2	1	0	0	202
	1998	1	1	78	77	19	12	8	3	0	0	0	199
	1999	1	0	83	103	24	6	6	6	1	0	0	230
	2000	0	1	107	120	27	10	3	1	1	0	0	270
Montréal centre	1996	4	13	412	478	178	80	34	23	6	0	39	1267
	1997	2	20	480	478	178	66	33	29	4	4	47	1341
	1998	2	18	559	557	200	75	24	13	7	2	33	1490
	1999	2	16	647	670	241	88	45	27	4	1	33	1774
	2000	2	20	693	735	274	96	49	28	8	1	39	1945
Outaouais	1996	1	3	85	77	29	14	7	3	0	0	9	228
	1997	0	2	66	72	25	10	8	2	0	0	2	187
	1998	2	4	73	79	42	8	5	0	3	0	4	220
	1999	0	1	125	89	39	14	5	2	0	0	3	278
	2000	0	8	102	104	38	12	10	4	1	0	2	281
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0	1	99	68	15	16	6	4	1	0	0	210
	1997	0	6	84	46	24	7	4	2	0	0	0	173
	1998	0	3	81	43	11	10	1	0	1	0	0	150
	1999	0	4	63	35	13	8	0	1	3	0	0	127
	2000	0	7	86	74	23	11	0	1	3	0	0	205
Côte-Nord	1996	0	5	76	72	23	15	5	1	0	0	1	198
	1997	1	5	64	46	16	7	6	0	0	0	1	146
	1998	0	7	68	52	23	15	5	2	0	0	1	173
	1999	0	7	94	57	20	19	5	3	0	0	0	205
	2000	0	4	80	48	21	12	3	2	0	1	2	173
Nord-du Québec	1996	0	0	6	6	2	1	0	0	0	0	0	15
	1997	0	0	7	0	1	1	1	0	0	0	0	10
	1998	0	0	7	3	0	1	1	0	0	0	0	12
	1999	0	0	7	5	2	0	1	0	0	0	0	15
	2000	0	1	5	3	0	0	1	1	0	0	0	11

Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0	1	20	27	3	7	1	0	0	0	1	60
	1997	0	1	17	10	8	1	2	2	0	0	1	42
	1998	0	0	8	5	5	1	0	2	1	0	0	22
	1999	0	1	5	8	3	2	0	1	0	0	0	20
	2000	0	0	20	12	8	0	2	0	0	0	2	44
Chaudière/Appalaches	1996	0	1	61	52	20	14	7	3	0	1	1	160
	1997	0	0	62	51	15	7	6	1	0	0	3	145
	1998	1	2	54	65	25	15	2	2	1	0	4	171
	1999	0	0	59	68	20	5	5	4	0	0	1	162
	2000	0	0	70	66	28	5	4	4	2	1	3	183
Laval	1996	0	2	56	45	14	7	5	2	1	0	0	132
	1997	1	3	90	60	18	4	4	5	1	0	1	187
	1998	0	4	80	72	22	10	5	2	1	3	1	200
	1999	0	6	101	70	20	8	4	2	1	0	0	212
	2000	0	3	116	95	33	16	9	2	1	0	1	276
Lanaudière	1996	0	2	83	55	18	5	9	3	0	0	1	176
	1997	1	1	95	67	18	18	5	8	0	0	8	221
	1998	0	10	87	56	15	10	6	3	0	0	1	188
	1999	0	5	135	99	32	12	8	1	1	0	1	294
	2000	0	8	121	119	38	12	4	2	0	0	0	304
Laurentides	1996	1	6	121	99	30	15	14	3	8	1	0	298
	1997	0	4	107	87	50	9	11	3	2	0	0	273
	1998	0	2	118	108	41	11	11	3	1	0	0	295
	1999	0	7	152	88	34	13	3	4	0	0	0	301
	2000	0	6	179	127	38	17	10	6	4	0	0	387
Montérégie	1996	1	9	238	204	74	23	12	19	3	0	6	589
	1997	0	8	252	215	55	24	13	12	5	0	4	588
	1998	0	8	301	228	72	25	10	4	1	1	1	651
	1999	0	11	322	268	79	24	13	6	1	1	2	727
	2000	1	15	396	319	87	26	16	11	2	1	1	875
Nunavik	1996	0	5	83	69	48	33	10	9	3	1	0	261
	1997	0	7	52	57	33	26	9	7	1	1	0	193
	1998	2	8	33	46	32	22	14	1	0	0	1	159
	1999	0	6	54	51	31	20	17	4	5	0	1	189
	2000	0	2	65	53	29	23	11	2	0	0	0	185
Terres Cries/Baie James	1996	0	3	27	33	12	5	0	1	1	0	1	83
	1997	0	0	27	22	14	3	1	0	0	0	0	67
	1998	0	1	42	41	22	8	0	3	2	0	2	121
	1999	0	1	25	27	17	5	2	1	0	0	0	78
	2000	0	1	20	20	13	3	3	0	1	0	0	61
Province de Québec	1996	12	70	1883	1789	611	293	142	106	31	6	71	5014
	1997	7	68	1887	1690	600	236	131	89	16	7	81	4812
	1998	10	78	2022	1904	682	292	120	52	22	7	60	5249
	1999	6	73	2287	2146	741	281	139	84	23	4	51	5835
	2000	4	93	2526	2423	826	296	157	81	32	6	55	6499

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996	18,7	7,6	479,2	647,6	131,1	93,8	43,5	0,0	9,0	0,0	1,9	94,4
	1997	0,0	15,6	603,6	845,3	248,7	72,1	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	114,2
	1998	41,0	0,0	868,9	831,1	270,9	111,0	23,2	28,6	0,0	0,0	0,0	141,1
	1999	21,2	0,0	564,2	557,2	154,6	51,5	36,4	17,0	0,0	0,0	2,9	93,9
	2000	0,0	8,5	393,4	681,4	267,7	55,4	50,9	11,3	7,5	0,0	0,0	92,5
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0,0	30,0	1198,8	926,5	234,7	60,9	36,5	8,9	6,4	0,0	3,5	188,7
	1997	12,4	0,0	655,0	772,2	263,6	37,4	45,1	13,1	0,0	0,0	6,2	134,6
	1998	0,0	5,3	649,6	780,4	263,8	133,6	46,5	12,8	6,0	4,0	4,9	142,0
	1999	0,0	5,4	647,0	1130,2	472,5	99,6	48,6	12,5	5,8	0,0	0,7	170,6
	2000	0,0	16,9	1078,5	955,3	219,0	107,2	50,5	12,3	11,3	0,0	0,0	177,6
Québec	1996	11,8	14,2	612,1	866,5	197,8	67,7	20,7	23,9	7,7	1,5	0,9	123,9
	1997	6,1	14,3	801,9	867,6	252,2	117,2	27,9	19,9	4,9	1,5	0,3	141,1
	1998	0,0	11,4	939,0	933,6	337,1	138,4	56,7	7,1	4,7	0,0	0,6	158,7
	1999	0,0	17,1	1016,4	1067,6	378,5	149,4	39,4	22,8	9,0	2,9	0,3	175,9
	2000	6,5	20,1	926,7	1050,6	424,1	119,6	76,3	17,4	6,5	2,8	1,2	171,2
Mauricie/ Centre du Québec	1996	7,4	19,8	689,8	725,0	294,2	91,5	46,7	31,6	10,9	3,8	0,8	128,7
	1997	0,0	10,1	643,1	622,0	198,4	45,5	18,8	5,1	0,0	1,9	1,6	102,1
	1998	0,0	17,1	581,3	922,2	334,8	91,4	19,0	5,0	3,3	0,0	1,2	127,2
	1999	16,0	3,5	584,1	792,0	289,6	64,5	24,5	7,4	6,4	0,0	2,0	116,5
	2000	0,0	21,2	883,5	961,8	344,4	95,0	5,0	4,9	9,3	0,0	0,4	149,4
Estrie	1996	11,9	5,5	863,7	964,9	366,7	82,5	58,5	37,0	0,0	0,0	0,0	163,9
	1997	0,0	5,5	800,2	798,0	317,5	57,2	67,5	9,1	6,1	0,0	0,0	140,2
	1998	12,5	5,6	781,4	801,2	219,3	120,0	67,7	13,4	0,0	0,0	0,0	137,5
	1999	12,7	0,0	829,4	1059,1	280,7	62,6	51,2	26,4	5,6	0,0	0,0	158,2
	2000	0,0	5,7	1095,4	1220,6	313,9	108,9	26,0	4,4	5,4	0,0	0,0	185,0
Montréal centre	1996	7,6	13,9	782,1	769,1	241,4	99,9	43,1	16,5	5,6	0,0	4,1	131,9
	1997	3,9	21,0	910,5	768,4	251,6	84,1	41,9	20,5	3,6	1,8	4,9	139,2
	1998	4,0	18,6	1055,4	888,8	293,1	98,8	30,4	9,0	6,2	0,9	3,4	154,2
	1999	4,1	16,4	1225,5	1053,3	364,2	120,2	57,2	18,5	3,4	0,4	3,4	183,0
	2000	4,1	20,3	1321,7	1144,4	422,3	136,1	62,7	18,9	6,7	0,4	4,0	200,1
Outaouais	1996	9,2	14,0	836,2	725,4	238,9	91,7	45,0	12,0	0,0	0,0	5,6	142,6
	1997	0,0	9,2	639,8	667,0	209,3	66,7	51,1	7,7	0,0	0,0	1,2	115,0
	1998	18,9	18,1	695,1	721,3	357,0	54,9	31,6	0,0	16,9	0,0	2,4	133,1
	1999	0,0	4,5	1179,6	800,3	331,0	100,5	31,4	7,2	0,0	0,0	1,8	165,6
	2000	0,0	35,3	944,0	926,6	321,8	89,8	62,7	13,9	5,1	0,0	1,2	164,9
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0,0	8,8	1645,1	1281,8	280,3	233,3	82,0	34,6	13,6	0,0	0,0	271,0
	1997	0,0	53,2	1397,4	857,4	454,9	106,9	54,6	16,8	0,0	0,0	0,0	222,9
	1998	0,0	26,8	1371,3	781,5	212,8	161,0	13,7	0,0	12,6	0,0	0,0	192,9
	1999	0,0	36,2	1083,2	621,6	253,7	135,6	0,0	7,9	35,8	0,0	0,0	163,0
	2000	0,0	64,3	1500,6	1305,1	444,4	197,6	0,0	7,7	34,3	0,0	0,0	262,6
Côte-Nord	1996	0,0	71,8	1968,9	1991,2	622,1	323,0	107,8	12,4	0,0	0,0	2,0	390,7
	1997	31,3	73,2	1708,0	1261,3	448,7	158,4	131,2	0,0	0,0	0,0	2,0	289,2
	1998	0,0	104,5	1862,0	1424,7	668,6	357,2	110,1	24,2	0,0	0,0	2,0	344,0
	1999	0,0	106,6	2633,1	1602,0	579,4	483,8	111,6	36,2	0,0	0,0	0,0	409,4
	2000	0,0	62,2	2337,1	1365,2	606,4	325,0	68,4	23,9	0,0	13,8	4,0	347,0
Nord-du Québec	1996	0,0	0,0	663,0	785,3	322,6	112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,9
	1997	0,0	0,0	777,8	0,0	164,5	124,8	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	104,5
	1998	0,0	0,0	777,8	369,9	0,0	137,2	109,4	0,0	0,0	0,0	0,0	125,9
	1999	0,0	0,0	789,2	598,8	333,3	0,0	112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	158,1
	2000	0,0	64,7	599,5	350,9	0,0	0,0	120,9	63,4	0,0	0,0	0,0	116,4

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0,0	15,4	555,4	819,7	98,3	173,4	21,4	0,0	0,0	0,0	1,9	115,6
	1997	0,0	16,0	477,0	304,1	267,6	26,5	44,2	24,0	0,0	0,0	1,9	81,6
	1998	0,0	0,0	234,8	153,6	169,1	28,6	0,0	23,7	16,1	0,0	0,0	43,1
	1999	0,0	16,8	151,7	256,3	99,4	61,6	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	39,5
	2000	0,0	0,0	632,5	394,7	264,7	0,0	48,8	0,0	0,0	0,0	4,0	87,6
Chaudière/Appalaches	1996	0,0	3,9	419,8	436,8	175,2	93,4	41,6	9,8	0,0	2,9	0,5	83,1
	1997	0,0	0,0	430,6	418,1	132,7	49,1	36,0	3,2	0,0	0,0	1,6	75,1
	1998	9,1	8,0	379,8	520,5	221,7	111,9	12,2	6,3	4,5	0,0	2,1	88,3
	1999	0,0	0,0	425,5	532,8	175,1	39,8	30,9	12,5	0,0	0,0	0,5	83,5
	2000	0,0	0,0	522,7	509,6	241,0	41,8	25,4	12,4	8,2	2,7	1,5	94,1
Laval	1996	0,0	9,1	499,7	421,6	116,3	46,7	31,0	7,3	4,9	0,0	0,0	75,3
	1997	9,5	13,5	791,5	556,4	152,8	27,4	24,5	17,9	4,7	0,0	0,6	105,3
	1998	0,0	17,8	697,0	658,5	191,1	71,1	30,4	7,0	4,5	9,4	0,6	111,3
	1999	0,0	26,3	883,4	630,5	175,9	58,8	24,5	6,7	4,4	0,0	0,0	116,6
	2000	0,0	13,0	1012,8	842,3	293,4	121,6	55,8	6,6	4,3	0,0	0,5	150,1
Lanaudière	1996	0,0	7,2	649,5	511,8	144,4	27,4	46,4	9,7	0,0	0,0	0,5	91,6
	1997	7,8	3,6	737,7	598,1	145,6	101,3	25,5	25,0	0,0	0,0	4,1	112,8
	1998	0,0	34,9	670,7	482,0	121,8	58,5	30,3	9,1	0,0	0,0	0,5	94,2
	1999	0,0	17,3	1030,1	835,9	256,8	73,2	40,1	2,9	4,2	0,0	0,5	144,7
	2000	0,0	27,3	921,3	985,9	298,0	76,6	20,0	5,7	0,0	0,0	0,0	147,1
Laurentides	1996	6,5	19,5	845,8	779,8	200,2	71,0	63,8	8,6	34,5	3,0	0,0	133,9
	1997	0,0	12,7	728,8	664,3	335,0	43,6	49,2	8,3	8,1	0,0	0,0	119,9
	1998	0,0	6,2	797,1	799,1	274,4	55,5	48,1	8,0	3,8	0,0	0,0	126,8
	1999	0,0	21,2	1020,6	633,5	226,5	68,2	12,9	10,2	0,0	0,0	0,0	126,7
	2000	0,0	17,9	1196,8	894,1	250,8	92,3	42,6	14,8	13,6	0,0	0,0	159,7
Montérégie	1996	2,3	10,2	511,7	481,3	161,7	39,8	19,4	17,5	4,1	0,0	0,9	87,2
	1997	0,0	9,0	541,0	495,4	121,2	42,5	20,9	10,8	6,4	0,0	0,6	85,8
	1998	0,0	8,9	647,2	513,1	159,3	45,8	16,0	3,5	1,2	0,9	0,1	93,7
	1999	0,0	12,1	698,6	589,5	174,5	45,5	20,8	5,2	1,1	0,9	0,3	103,3
	2000	2,4	16,4	873,1	688,6	190,9	50,9	25,7	9,3	2,2	0,8	0,1	122,8
Nunavik	1996	0,0	432,9	18043,5	14806,9	10933,9	8128,1	3246,8	2097,9	1145,0	352,1	0,0	5532,0
	1997	0,0	588,7	11063,8	11850,3	7621,2	6103,3	2639,3	1594,5	339,0	339,0	0,0	3946,0
	1998	374,5	677,4	6693,7	9407,0	6808,5	5459,1	3753,4	209,6	0,0	0,0	19,8	3150,4
	1999	0,0	516,8	10131,3	10119,0	6553,9	4819,3	4632,2	770,7	1529,1	0,0	19,2	3637,4
	2000	0,0	173,6	11443,7	10515,9	6209,9	5424,5	2644,2	401,6	0,0	0,0	0,0	3472,2
Terres Cries/Baie James	1996	0,0	341,7	7031,3	7349,7	3314,9	1597,4	0,0	280,9	358,4	0,0	24,9	2068,8
	1997	0,0	0,0	6940,9	5314,0	3713,5	934,6	392,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1684,7
	1998	0,0	122,0	10714,3	10677,1	5714,3	2580,6	0,0	804,3	724,6	0,0	50,9	3078,9
	1999	0,0	123,6	6775,1	7049,6	4438,6	1677,9	696,9	278,6	0,0	0,0	0,0	2004,1
	2000	0,0	124,5	5618,0	5464,5	3258,1	1027,4	1107,0	0,0	355,9	0,0	0,0	1576,2
Province de Québec	1996	5,4	15,4	766,7	760,1	239,4	93,1	42,5	18,3	7,6	0,9	1,9	133,7
	1997	3,2	14,9	767,4	707,1	240,5	77,4	39,3	15,0	3,7	1,0	2,1	127,4
	1998	4,7	17,0	825,4	782,5	278,2	100,1	36,0	8,6	4,9	1,0	1,6	138,0
	1999	2,8	15,9	942,8	867,0	304,7	100,6	42,0	13,6	4,9	0,5	1,3	152,3
	2000	1,9	20,2	1058,6	966,3	339,7	110,4	48,0	12,9	6,6	0,8	1,4	168,5

Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0	0	17	25	11	5	1	3	2	0	2	66
	1997	0	0	12	33	10	7	0	2	0	0	0	64
	1998	0	0	20	55	15	8	3	3	0	0	0	104
	1999	0	0	10	24	9	7	0	0	0	0	0	50
	2000	0	0	3	17	15	6	4	2	2	1	0	50
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	1	0	14	34	14	9	3	4	1	0	2	82
	1997	0	0	8	33	17	7	5	2	0	0	0	72
	1998	0	1	12	26	14	12	2	1	1	1	2	72
	1999	0	0	8	30	23	12	5	3	1	0	2	84
	2000	0	0	17	42	21	7	2	3	1	0	0	93
Québec	1996	0	0	25	70	28	20	5	7	3	1	0	159
	1997	0	0	21	80	28	24	10	9	1	3	1	177
	1998	0	1	31	73	46	24	20	11	2	2	1	211
	1999	3	0	32	99	43	19	11	12	2	1	1	223
	2000	0	0	31	88	54	14	12	19	4	1	2	225
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0	0	16	34	20	11	8	6	0	0	0	95
	1997	1	0	12	38	22	7	7	1	0	0	2	90
	1998	0	0	23	60	26	14	6	6	0	0	4	139
	1999	0	0	17	48	18	5	7	9	1	0	0	105
	2000	1	0	27	62	22	14	4	7	3	2	1	143
Estrie	1996	1	0	3	31	12	11	4	6	2	0	0	70
	1997	1	0	15	31	14	5	9	1	0	0	0	76
	1998	1	0	13	48	22	6	6	2	0	0	0	98
	1999	0	0	13	41	17	13	7	4	2	0	0	97
	2000	0	0	12	51	19	11	6	5	3	0	0	107
Montréal centre	1996	1	1	57	130	107	74	29	24	6	2	17	448
	1997	2	0	56	143	116	73	38	28	7	0	20	483
	1998	1	0	60	194	127	79	57	22	8	0	21	569
	1999	4	2	68	245	141	116	67	44	9	1	12	709
	2000	6	0	78	200	125	87	78	52	4	0	15	645
Outaouais	1996	1	0	10	19	14	2	0	3	0	0	1	50
	1997	0	1	5	18	14	4	3	2	1	0	2	50
	1998	0	0	7	17	10	9	5	7	4	0	0	59
	1999	0	1	12	25	21	7	3	3	0	0	0	72
	2000	0	0	11	37	19	14	5	4	0	0	2	92
Abitibi/ Témiscamingue	1996	2	0	12	35	10	12	2	1	1	1	0	76
	1997	0	0	16	16	7	4	3	1	1	0	0	48
	1998	0	0	15	17	12	5	0	1	0	0	0	50
	1999	0	0	9	18	9	4	3	2	0	0	1	46
	2000	0	0	6	19	11	6	3	4	0	0	0	49
Côte-Nord	1996	0	0	18	20	10	11	4	1	0	0	0	64
	1997	1	1	15	26	11	7	3	2	1	0	1	68
	1998	1	1	7	24	16	3	1	1	0	1	0	55
	1999	0	0	16	25	12	4	2	3	0	0	0	62
	2000	0	1	14	24	14	8	2	3	1	0	0	67
Nord-du Québec	1996	0	0	0	4	1	2	0	0	1	0	0	8
	1997	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1999	0	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	7
	2000	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	5

Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0	0	2	3	2	1	1	1	0	0	0	10
	1997	1	0	2	2	2	2	1	3	0	0	1	14
	1998	0	0	0	4	2	2	1	0	0	0	0	9
	1999	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	2000	0	0	4	7	4	0	1	0	0	0	0	16
Chaudière/Appalaches	1996	0	0	6	28	13	7	5	0	0	0	0	59
	1997	0	0	9	22	18	10	6	1	1	0	2	69
	1998	0	0	8	29	11	7	3	3	0	0	0	61
	1999	0	0	11	34	9	4	2	4	1	0	1	66
	2000	0	0	4	38	16	8	4	5	0	1	0	76
Laval	1996	0	0	15	19	6	3	3	3	0	1	0	50
	1997	0	1	9	19	10	5	1	1	1	0	0	47
	1998	0	1	14	33	19	8	6	2	1	0	0	84
	1999	0	0	11	34	15	13	4	9	2	0	0	88
	2000	0	0	15	35	27	12	6	4	3	0	0	102
Lanaudière	1996	0	0	18	28	8	5	1	3	0	0	0	63
	1997	1	0	13	24	5	3	3	1	0	0	2	52
	1998	0	0	14	28	17	1	4	1	1	0	0	66
	1999	0	0	16	45	27	11	1	5	1	0	1	107
	2000	0	0	18	42	14	10	3	3	1	0	0	91
Laurentides	1996	0	0	11	37	17	6	8	2	5	0	0	86
	1997	0	0	13	21	14	4	7	3	1	0	0	63
	1998	0	1	15	35	15	7	12	9	2	1	0	97
	1999	0	0	20	48	19	6	4	3	0	1	0	101
	2000	0	1	20	55	23	11	3	4	1	0	0	118
Montréal	1996	0	0	39	74	36	23	6	12	2	0	3	195
	1997	0	0	36	63	43	21	7	7	5	1	0	183
	1998	2	1	37	103	38	18	10	9	2	0	0	220
	1999	1	0	40	98	49	28	13	12	1	0	0	242
	2000	0	0	50	126	49	21	22	9	4	0	1	282
Nunavik	1996	1	0	7	20	20	9	6	1	1	0	0	65
	1997	0	0	9	20	12	17	6	1	1	0	0	66
	1998	0	0	16	11	12	14	12	6	0	0	1	72
	1999	1	0	13	27	10	12	8	4	0	1	1	77
	2000	0	0	13	21	11	7	5	8	1	0	0	66
Terres Cries/Baie James	1996	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	7
	1997	0	0	2	4	3	0	1	0	0	0	0	10
	1998	1	0	3	4	5	1	1	0	0	0	0	15
	1999	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	6
	2000	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Province de Québec	1996	7	2	273	613	330	211	86	77	24	5	25	1653
	1997	7	3	254	594	347	200	110	65	20	4	31	1635
	1998	6	6	295	761	407	218	149	85	21	5	29	1982
	1999	9	3	299	848	425	261	139	118	20	4	19	2145
	2000	7	2	326	868	445	236	160	132	28	5	21	2230


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996	0,0	0,0	209,9	400,1	201,3	68,2	11,0	17,6	17,6	0,0	2,0	65,6
	1997	0,0	0,0	149,7	522,2	187,7	102,5	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	64,1
	1998	0,0	0,0	261,1	844,1	285,1	127,2	36,0	17,1	0,0	0,0	0,0	105,0
	1999	0,0	0,0	134,8	362,5	174,7	119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8
	2000	0,0	0,0	42,7	255,6	286,3	110,3	52,1	11,4	14,5	5,8	0,0	51,2
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	11,3	0,0	108,3	345,8	162,1	76,0	21,7	16,9	6,5	0,0	1,4	56,7
	1997	0,0	0,0	62,6	320,0	200,3	64,3	37,0	8,3	0,0	0,0	0,0	50,0
	1998	0,0	5,1	96,8	243,7	165,0	120,6	15,2	4,1	5,9	5,2	1,4	50,2
	1999	0,0	0,0	66,6	271,4	268,9	130,6	39,5	12,0	5,7	0,0	1,4	58,8
	2000	0,0	0,0	150,2	370,0	241,1	80,5	16,3	12,0	5,5	0,0	0,0	65,4
Québec	1996	0,0	0,0	115,0	312,5	118,2	72,1	17,0	13,2	8,2	2,2	0,0	50,6
	1997	0,0	0,0	96,7	357,3	121,4	89,9	34,0	16,7	2,6	6,6	0,3	56,2
	1998	0,0	2,7	145,1	325,2	204,1	94,4	68,2	20,1	4,9	4,3	0,3	66,7
	1999	18,0	0,0	153,1	435,6	194,7	78,2	38,1	21,6	4,7	2,1	0,3	70,3
	2000	0,0	0,0	153,4	383,5	247,9	59,9	42,1	33,9	9,1	2,1	0,6	70,7
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0,0	0,0	87,1	223,8	133,1	56,7	36,9	15,2	0,0	0,0	0,0	39,4
	1997	7,2	0,0	64,9	243,0	149,6	38,0	32,4	2,5	0,0	0,0	0,8	37,2
	1998	0,0	0,0	126,7	369,8	180,7	79,7	28,3	14,6	0,0	0,0	1,6	57,2
	1999	0,0	0,0	95,9	287,1	124,9	30,4	33,4	21,5	3,2	0,0	0,0	43,1
	2000	7,7	0,0	157,5	361,9	151,1	89,3	19,6	16,6	9,2	4,9	0,4	58,5
Estrie	1996	11,2	0,0	27,6	328,6	129,1	99,8	33,3	27,0	13,2	0,0	0,0	50,4
	1997	11,5	0,0	139,8	318,0	156,0	46,6	75,5	4,4	0,0	0,0	0,0	54,5
	1998	11,8	0,0	123,2	475,0	251,2	58,8	50,6	8,7	0,0	0,0	0,0	69,9
	1999	0,0	0,0	124,7	396,6	197,7	132,8	59,3	17,3	11,2	0,0	0,0	68,9
	2000	0,0	0,0	117,2	486,2	219,8	116,7	51,7	21,3	16,1	0,0	0,0	75,8
Montréal centre	1996	1,8	1,0	106,7	204,7	137,5	85,5	36,4	18,2	6,3	1,3	1,9	50,3
	1997	3,7	0,0	104,4	224,7	155,1	86,2	47,2	21,0	7,1	0,0	2,2	54,0
	1998	1,9	0,0	111,9	300,8	175,5	96,7	70,3	16,2	7,9	0,0	2,3	63,4
	1999	7,6	1,9	127,1	374,8	200,3	147,7	82,3	31,8	8,6	0,7	1,3	78,7
	2000	11,7	0,0	146,6	303,8	179,8	115,3	96,0	36,9	3,7	0,0	1,7	71,3
Outaouais	1996	8,7	0,0	95,8	174,5	117,4	13,2	0,0	11,6	0,0	0,0	0,6	31,6
	1997	0,0	4,4	47,0	163,9	119,4	27,2	19,2	7,5	5,8	0,0	1,2	31,1
	1998	0,0	0,0	65,3	153,2	85,4	63,8	31,5	25,6	21,6	0,0	0,0	36,2
	1999	0,0	4,3	110,1	224,8	178,1	51,6	18,9	10,6	0,0	0,0	0,0	43,5
	2000	0,0	0,0	100,5	329,5	159,5	107,7	31,2	13,8	0,0	0,0	1,2	54,7
Abitibi/ Témiscamingue	1996	35,2	0,0	186,2	622,1	177,7	164,0	25,4	7,8	12,9	10,1	0,0	93,6
	1997	0,0	0,0	244,3	279,8	128,0	57,0	38,6	7,5	12,3	0,0	0,0	58,9
	1998	0,0	0,0	230,6	292,4	217,7	76,1	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	61,2
	1999	0,0	0,0	139,4	302,3	163,3	64,7	40,0	14,2	0,0	0,0	1,2	56,1
	2000	0,0	0,0	96,1	314,5	197,4	102,1	40,6	27,9	0,0	0,0	0,0	59,6
Côte-Nord	1996	0,0	0,0	417,2	493,0	250,7	227,4	78,5	11,4	0,0	0,0	0,0	118,9
	1997	29,5	14,0	354,4	635,4	280,3	149,4	60,8	22,5	15,8	0,0	1,9	126,7
	1998	30,5	14,2	171,5	580,4	409,2	67,7	20,5	11,1	0,0	16,1	0,0	102,9
	1999	0,0	0,0	408,6	607,5	304,9	94,7	41,7	33,3	0,0	0,0	0,0	116,5
	2000	0,0	14,8	373,8	582,5	354,6	200,8	42,1	33,1	14,4	0,0	0,0	126,4
Nord-du Québec	1996	0,0	0,0	0,0	514,8	149,0	216,2	0,0	0,0	89,5	0,0	0,0	76,0
	1997	0,0	0,0	105,9	123,0	152,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	0,0	0,0	0,0	9,6
	1999	0,0	0,0	0,0	446,4	143,5	0,0	109,2	58,3	0,0	0,0	0,0	67,4
	2000	0,0	0,0	369,5	106,3	139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0,0	0,0	51,8	86,5	64,4	24,9	21,2	11,3	0,0	0,0	0,0	19,2
	1997	35,4	0,0	53,0	59,1	65,6	52,9	21,9	33,3	0,0	0,0	1,9	27,1
	1998	0,0	0,0	0,0	120,2	66,1	57,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
	1999	0,0	0,0	28,4	30,1	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	2000	0,0	0,0	118,7	217,0	132,0	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8
Chaudière/Appalaches	1996	0,0	0,0	38,9	215,9	104,2	43,9	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
	1997	0,0	0,0	58,3	164,4	145,5	66,1	34,8	3,1	4,6	0,0	1,0	35,6
	1998	0,0	0,0	52,6	211,1	88,7	48,9	17,6	9,2	0,0	0,0	0,0	31,4
	1999	0,0	0,0	73,9	240,3	72,2	29,3	11,9	12,1	4,1	0,0	0,5	33,9
	2000	0,0	0,0	27,8	262,9	126,6	61,2	24,1	15,1	0,0	3,5	0,0	38,9
Laval	1996	0,0	0,0	126,2	166,3	47,2	18,9	18,5	11,3	0,0	4,2	0,0	29,1
	1997	0,0	4,3	74,9	165,3	80,6	32,3	6,1	3,7	5,0	0,0	0,0	27,0
	1998	0,0	4,2	115,5	281,7	155,9	53,3	36,3	7,1	4,8	0,0	0,0	47,7
	1999	0,0	0,0	90,5	284,7	125,1	89,9	24,0	31,0	9,4	0,0	0,0	49,5
	2000	0,0	0,0	124,2	286,6	227,2	86,0	36,0	13,4	13,7	0,0	0,0	56,7
Lanaudière	1996	0,0	0,0	127,5	246,1	64,8	27,6	5,0	9,3	0,0	0,0	0,0	32,1
	1997	7,4	0,0	90,6	201,6	40,5	17,1	14,8	3,0	0,0	0,0	1,0	26,0
	1998	0,0	0,0	97,3	226,1	136,3	5,9	19,4	2,9	4,2	0,0	0,0	32,3
	1999	0,0	0,0	110,4	348,1	215,8	67,5	4,8	13,9	4,0	0,0	0,5	51,4
	2000	0,0	0,0	124,5	317,2	109,5	63,7	14,5	8,1	3,8	0,0	0,0	43,0
Laurentides	1996	0,0	0,0	72,1	274,4	112,6	28,3	35,5	5,5	20,6	0,0	0,0	38,3
	1997	0,0	0,0	83,2	150,6	93,4	19,2	30,4	7,9	3,9	0,0	0,0	27,4
	1998	0,0	3,0	95,0	242,1	99,5	34,8	51,1	22,9	7,3	3,4	0,0	41,3
	1999	0,0	0,0	124,8	322,9	124,9	30,9	16,8	7,3	0,0	3,3	0,0	42,1
	2000	0,0	2,9	124,4	360,1	148,7	58,5	12,5	9,4	3,3	0,0	0,0	48,2
Montréal	1996	0,0	0,0	79,6	166,5	75,7	38,4	9,5	11,1	2,7	0,0	0,4	29,2
	1997	0,0	0,0	73,3	138,6	91,0	36,0	10,9	6,3	6,3	1,2	0,0	27,0
	1998	4,4	1,1	75,8	221,5	80,4	31,8	15,5	8,0	2,4	0,0	0,0	32,0
	1999	2,2	0,0	82,5	205,8	103,9	51,2	20,1	10,4	1,1	0,0	0,0	34,8
	2000	0,0	0,0	104,9	260,1	103,6	39,3	33,9	7,6	4,4	0,0	0,1	40,0
Nunavik	1996	186,6	0,0	1650,9	4914,0	4514,7	2137,8	1554,4	195,3	502,5	0,0	0,0	1376,0
	1997	0,0	0,0	2064,2	4608,3	2758,6	3881,3	1492,5	186,6	450,5	0,0	0,0	1362,8
	1998	0,0	0,0	3532,0	2558,1	2690,6	3125,0	2850,4	1063,8	0,0	0,0	20,2	1451,9
	1999	173,3	0,0	2807,8	6338,0	2222,2	2649,0	2000,0	664,5	0,0	406,5	19,8	1521,4
	2000	0,0	0,0	2554,0	5036,0	2517,2	1538,5	1204,8	1263,8	307,7	0,0	0,0	1278,8
Terres Cries/Baie James	1996	0,0	107,1	686,5	434,8	229,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,2
	1997	0,0	0,0	451,5	885,0	671,1	0,0	320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	228,5
	1998	213,7	0,0	726,4	950,1	1113,6	258,4	313,5	0,0	0,0	0,0	0,0	344,5
	1999	0,0	0,0	473,9	479,6	229,4	0,0	316,5	0,0	0,0	0,0	0,0	138,6
	2000	0,0	0,0	0,0	737,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5
Province de Québec	1996	3,0	0,4	105,8	249,2	123,9	64,3	25,3	13,2	6,0	1,0	0,7	45,3
	1997	3,0	0,6	98,1	237,5	133,2	63,0	32,2	10,9	4,8	0,8	0,8	44,5
	1998	2,6	1,2	114,9	298,1	158,4	71,7	43,6	14,0	4,8	0,9	0,8	53,5
	1999	4,0	0,6	117,5	325,4	167,1	89,6	40,8	19,1	4,4	0,7	0,5	57,5
	2000	3,2	0,4	130,4	328,3	174,8	84,2	47,3	20,9	5,9	0,9	0,6	59,3

Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1997-2000)




$(\text{NB année courante} - \text{NB année antérieure}) / \text{NB année antérieure} \times 100$

Nombre de cas déclarés

		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49
Province de Québec	1996	1883	1789	611	293	142	106
	1997	1887	1690	600	236	131	89
	1998	2022	1904	682	292	120	52
	1999	2287	2146	741	281	139	84
	2000	2526	2423	826	296	157	81


**Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale
par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par groupe d'âge,
Québec (1997-2000)**



Taux d'incidence par 100 000

		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49
Province de Québec	1996	766,7	760,1	239,4	93,1	42,5	18,3
	1997	767,4	707,1	240,5	77,4	39,3	15,0
	1998	825,4	782,5	278,2	100,1	36,0	8,6
	1999	942,8	867,0	304,7	100,6	42,0	13,6
	2000	1058,6	966,3	339,7	110,4	48,0	12,9


**Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par
groupe d'âge, Québec (1997-2000)**



Nombre de cas déclarés



		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49
Province de Québec	1996	273	613	330	211	86	77
	1997	254	594	347	200	110	65
	1998	295	761	407	218	149	85
	1999	299	848	425	261	139	118
	2000	326	868	445	236	160	132

**Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale pa
Chlamydia trachomatis chez les hommes par groupe d'âge,
Québec (1997-2000)**




Taux d'incidence par 100 000


		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49
Province de Québec	1996	105,8	249,2	123,9	64,3	25,3	13,2
	1997	98,1	237,5	133,2	63,0	32,2	10,9
	1998	114,9	298,1	158,4	71,7	43,6	14,0
	1999	117,5	325,4	167,1	89,6	40,8	19,1
	2000	130,4	328,3	174,8	84,2	47,3	20,9



Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1996-2000)



Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes, Québec (1990-2000)




On trouvera dans cette section :

Gonorrhée

- L'histogramme du taux d'incidence (TI) provincial (**gonoprov**) et de ses variations annuelles (**gonoVARan**)..... T48
- L'histogramme du taux d'incidence de chacune des régions (**gonoNUMÉRO**). T50
- La tendance des TI depuis 1988 par sexe (**TIséculGON**)..... T68
- Deux tableaux donnant les nombres de cas déclarés et les TI correspondants par année, région et sexe (**NBrssGON** et **TlrssGON**)..... T69
- La distribution des nombres de cas déclarés et des TI correspondants par âge, région et sexe (**NBâgeGONtot1** à **TIâgeGONhom2**) T71
- La variation du nombre de cas déclarés et des TI correspondants par âge et sexe (**varNBâgeGONfem** à **varTIâgeGONhom**) T83
- Le taux d'incidence moyen par groupe d'âge et sexe ainsi que l'évolution des TI par groupe d'âge et sexe (**évoÂGEgonTOT**, **évoÂGEgonFEM** et **évoÂGEgonHOM**) T87
- Le nombre et le pourcentage par année des cas causés par des souches productrices de pénicillinase (**ngpp1** et **ngpp2**) T90
- Le nombre par année de souches résistantes aux antibiotiques (**GONOrésist**) T92
- Le nombre de gonorrhées déclarées chez des hommes selon le site d'infection (**GONOautres**) T93
- Le nombre par année de gonorrhées rectales et pharyngées déclarées chez les hommes (**GONOrrectPHARYN**) T94

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	659	1142	86	1887
1991	410	953	24	1387
1992	304	658	10	972
1993	255	495	5	755
1994	229	515	6	750

Nombre de cas déclarés


	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	171	431	5	607
1996	145	324	9	478
1997	139	410	7	556
1998	114	373	8	495
1999	137	485	2	624
2000	127	540	6	673



Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence *			
	Femmes	Hommes	Total
1991	-37,8	-16,5	-26,5
1992	-25,9	-31,0	-29,9
1993	-16,1	-24,8	-22,3
1994	-14,4	-2,1	-5,9
1995	-25,9	-17,0	-19,7
1996	-15,9	-25,4	-21,9
1997	-4,9	25,6	15,4
1998	-18,6	-9,7	-11,6
1999	19,3	29,1	25,2
2000	-7,9	10,6	7,1

*: (taux année courante)-(taux année antérieure)/(taux année antérieure) *100

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région du Bas-St-Laurent




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	6	4	0	10
1991	4	8	0	12
1992	1	4	0	5
1993	2	4	0	6
1994	2	4	0	6

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	2	4	0	6
1996	0	0	0	0
1997	0	6	1	7
1998	0	5	0	5
1999	0	5	0	5
2000	0	4	0	4

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région du Saguenay/Lac St-Jean




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	11	12	0	23
1991	17	13	1	31
1992	1	4	0	5
1993	7	1	1	9
1994	4	8	0	12

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	1	5	0	6
1996	0	6	0	6
1997	0	4	0	4
1998	4	5	0	9
1999	1	4	0	5
2000	0	5	0	5

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région de Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	14	52	1	67
1991	17	40	1	58
1992	12	43	0	55
1993	8	26	0	34
1994	7	48	0	55

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	1	26	0	27
1996	4	12	0	16
1997	3	23	0	26
1998	6	23	0	29
1999	19	44	0	63
2000	3	42	0	45


Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région de la Mauricie/Centre du Québec



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	34	23	0	57
1991	16	23	0	39
1992	20	8	1	29
1993	3	9	0	12
1994	11	8	0	19

Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	2	6	0	8
1996	1	3	0	4
1997	8	5	0	13
1998	2	6	0	8
1999	2	4	0	6
2000	5	16	0	21

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région de l'Estrie




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	7	4	0	11
1991	4	9	0	13
1992	1	11	1	13
1993	4	8	0	12
1994	4	8	0	12

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	3	4	0	7
1996	0	3	0	3
1997	1	7	0	8
1998	0	2	0	2
1999	1	5	0	6
2000	3	5	0	8

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région de Montréal centre




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	337	789	81	1207
1991	214	638	13	865
1992	137	445	3	585
1993	84	324	1	409
1994	107	325	6	438

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	98	292	5	395
1996	89	208	9	306
1997	66	278	6	350
1998	46	255	7	308
1999	74	305	2	381
2000	73	366	4	443


Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région de l'Outaouais



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	42	29	0	71
1991	12	9	0	21
1992	12	15	0	27
1993	8	14	0	22
1994	5	8	0	13

Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	4	5	0	9
1996	5	4	0	9
1997	4	9	0	13
1998	7	6	0	13
1999	6	17	0	23
2000	4	18	1	23

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région de l'Abitibi/Témiscamingue




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	11	11	0	22
1991	7	11	0	18
1992	5	8	0	13
1993	1	5	0	6
1994	2	3	0	5

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	8	8	0	16
1996	6	8	0	14
1997	3	4	0	7
1998	5	1	0	6
1999	1	0	0	1
2000	0	0	0	0

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région de la Côte-Nord




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	54	42	0	96
1991	34	26	0	60
1992	11	6	0	17
1993	17	11	0	28
1994	3	3	0	6

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	2	5	0	7
1996	3	6	0	9
1997	4	2	0	6
1998	2	0	0	2
1999	0	0	0	0
2000	1	2	0	3

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région Nord-du-Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	1	1	0	2
1991	0	2	0	2
1992	1	2	0	3
1993	0	0	0	0
1994	2	0	0	2

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	0	0	0
1996	0	0	0	0
1997	0	0	0	0
1998	0	0	0	0
1999	0	0	0	0
2000	0	0	0	0


Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région de la Gaspésie/Iles de la Madeleine



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	2	2	0	4
1991	0	2	0	2
1992	0	1	0	1
1993	0	1	0	1
1994	1	0	0	1

Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	2	0	2
1996	0	3	0	3
1997	0	1	0	1
1998	0	0	0	0
1999	0	0	0	0
2000	0	0	0	0

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région Chaudière/Appalaches




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	11	14	0	25
1991	3	7	0	10
1992	2	6	0	8
1993	4	6	0	10
1994	5	11	0	16

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	7	0	7
1996	2	3	0	5
1997	1	2	0	3
1998	0	4	0	4
1999	0	5	0	5
2000	0	5	0	5

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région de Laval




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	20	16	0	36
1991	12	27	0	39
1992	5	12	1	18
1993	9	10	0	19
1994	4	16	0	20

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	5	12	0	17
1996	3	13	0	16
1997	5	8	0	13
1998	4	13	0	17
1999	2	16	0	18
2000	4	13	0	17

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région de Lanaudière




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	10	14	1	25
1991	9	9	0	18
1992	9	10	0	19
1993	3	4	0	7
1994	7	10	0	17

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	3	4	0	7
1996	6	3	0	9
1997	1	1	0	2
1998	1	7	0	8
1999	4	11	0	15
2000	2	9	0	11

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région des Laurentides




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	19	16	1	36
1991	5	14	1	20
1992	3	9	0	12
1993	6	7	0	13
1994	3	8	0	11

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	7	7	0	14
1996	1	7	0	8
1997	3	5	0	8
1998	5	8	0	13
1999	6	14	0	20
2000	4	10	0	14

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région de la Montérégie




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	32	78	2	112
1991	25	77	2	104
1992	24	38	1	63
1993	20	41	0	61
1994	15	35	0	50

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	11	36	0	47
1996	6	42	0	48
1997	19	47	0	66
1998	13	34	1	48
1999	16	50	0	66
2000	11	36	1	48

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région Nunavik




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	41	35	0	76
1991	27	38	6	71
1992	57	35	3	95
1993	79	24	3	106
1994	37	20	0	57

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	17	6	0	23
1996	15	2	0	17
1997	17	6	0	23
1998	11	2	0	13
1999	4	5	0	9
2000	15	9	0	24

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-2000)
Région Terres Cries/Baie-James




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	7	0	0	7
1991	4	0	0	4
1992	3	1	0	4
1993	0	0	0	0
1994	10	0	0	10

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	7	2	0	9
1996	4	1	0	5
1997	4	2	0	6
1998	8	2	0	10
1999	1	0	0	1
2000	2	0	0	2

Evolution par sexe des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée,
Québec (1984-2000)



Taux d'incidence par 100 000

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Femmes	83,8	85,7	70,1	55,6	35,4	19,9	18,8	11,4	8,4	7,0	6,2	4,6	3,9	3,7	2,9	3,6	3,3
Hommes	128,0	121,8	92,3	70,6	40,0	27,9	33,9	27,3	18,7	13,9	14,4	11,9	8,9	11,2	10,1	13,0	14,4
Total	105,6	103,5	87,5	66,6	40,8	24,6	27,4	19,6	13,6	10,5	13,3	8,3	6,5	7,5	6,6	8,3	8,8

Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total	Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996 0	0	0	0	Gaspésie/ Îles de la madeleine	1996 0	3	0	3
	1997 0	6	1	7		1997 0	1	0	1
	1998 0	5	0	5		1998 0	0	0	0
	1999 0	5	0	5		1999 0	0	0	0
	2000 0	4	0	4		2000 0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1996 0	6	0	6	Chaudière/ Appalaches	1996 2	3	0	5
	1997 0	4	0	4		1997 1	2	0	3
	1998 4	5	0	9		1998 0	4	0	4
	1999 1	4	0	5		1999 0	5	0	5
	2000 0	5	0	5		2000 0	5	0	5
Québec	1996 4	12	0	16	Laval	1996 3	13	0	16
	1997 3	23	0	26		1997 5	8	0	13
	1998 6	23	0	29		1998 4	13	0	17
	1999 19	44	0	63		1999 2	16	0	18
	2000 3	42	0	45		2000 4	13	0	17
Mauricie/ Centre du Québec	1996 1	3	0	4	Lanaudière	1996 6	3	0	9
	1997 8	5	0	13		1997 1	1	0	2
	1998 2	6	0	8		1998 1	7	0	8
	1999 2	4	0	6		1999 4	11	0	15
	2000 5	16	0	21		2000 2	9	0	11
Estrie	1996 0	3	0	3	Laurentides	1996 1	7	0	8
	1997 1	7	0	8		1997 3	5	0	8
	1998 0	2	0	2		1998 5	8	0	13
	1999 1	5	0	6		1999 6	14	0	20
	2000 3	5	0	8		2000 4	10	0	14
Montréal centre	1996 89	208	9	306	Montréal	1996 6	42	0	48
	1997 66	278	6	350		1997 19	47	0	66
	1998 46	255	7	308		1998 13	34	1	48
	1999 74	305	2	381		1999 16	50	0	66
	2000 73	366	4	443		2000 11	36	1	48
Outaouais	1996 5	4	0	9	Nunavik	1996 15	2	0	17
	1997 4	9	0	13		1997 17	6	0	23
	1998 7	6	0	13		1998 11	2	0	13
	1999 6	17	0	23		1999 4	5	0	9
	2000 4	18	1	23		2000 15	9	0	24
Abitibi/ Témiscamingue	1996 6	8	0	14	Terres Cries/ Baie-James	1996 4	1	0	5
	1997 3	4	0	7		1997 4	2	0	6
	1998 5	1	0	6		1998 8	2	0	10
	1999 1	0	0	1		1999 1	0	0	1
	2000 0	0	0	0		2000 2	0	0	2
Côte-Nord	1996 3	6	0	9	Province de Québec	1996 145	324	9	478
	1997 4	2	0	6		1997 139	410	7	556
	1998 2	0	0	2		1998 114	373	8	495
	1999 0	0	0	0		1999 137	485	2	624
	2000 1	2	0	3		2000 127	540	6	673
Nord-du-Québec	1996 0	0	0	0					
	1997 0	0	0	0					
	1998 0	0	0	0					
	1999 0	0	0	0					
	2000 0	0	0	0					

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	6,0	0,5	3,4
	1998	0,0	5,0	0,0	2,5
	1999	0,0	5,1	0,0	2,5
	2000	0,0	4,1	0,0	2,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0,0	4,1	0,0	2,1
	1997	0,0	2,8	0,0	1,4
	1998	2,8	3,5	0,0	3,1
	1999	0,7	2,8	0,0	1,7
	2000	0,0	3,5	0,0	1,8
Québec	1996	1,2	3,8	0,0	2,5
	1997	0,9	7,3	0,0	4,0
	1998	1,8	7,3	0,0	4,4
	1999	5,6	13,9	0,0	9,6
	2000	0,9	13,2	0,0	6,9
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0,4	1,2	0,0	0,8
	1997	3,2	2,1	0,0	2,7
	1998	0,8	2,5	0,0	1,6
	1999	0,8	1,6	0,0	1,2
	2000	2,0	6,5	0,0	4,3
Estrie	1996	0,0	2,2	0,0	1,1
	1997	0,7	5,0	0,0	2,8
	1998	0,0	1,4	0,0	0,7
	1999	0,7	3,6	0,0	2,1
	2000	2,1	3,5	0,0	2,8
Montréal centre	1996	9,3	23,4	0,5	16,5
	1997	6,8	31,1	0,3	18,8
	1998	4,8	28,4	0,4	16,5
	1999	7,6	33,9	0,1	20,4
	2000	7,5	40,5	0,2	23,6
Outaouais	1996	3,1	2,5	0,0	2,8
	1997	2,5	5,6	0,0	4,0
	1998	4,2	3,7	0,0	4,0
	1999	3,6	10,3	0,0	6,9
	2000	2,3	10,7	0,3	6,8
Abitibi/ Témiscamingue	1996	7,7	9,9	0,0	8,8
	1997	3,9	4,9	0,0	4,4
	1998	6,4	1,2	0,0	3,8
	1999	1,3	0,0	0,0	0,6
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1996	5,9	11,1	0,0	8,6
	1997	7,9	3,7	0,0	5,8
	1998	4,0	0,0	0,0	1,9
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	2,0	3,8	0,0	2,9
Nord-du- Québec	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la Madeleine	1996	0,0	5,8	0,0	2,9
	1997	0,0	1,9	0,0	1,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/ Appalaches	1996	1,0	1,6	0,0	1,3
	1997	0,5	1,0	0,0	0,8
	1998	0,0	2,1	0,0	1,0
	1999	0,0	2,6	0,0	1,3
	2000	0,0	2,6	0,0	1,3
Laval	1996	1,7	7,6	0,0	4,6
	1997	2,8	4,6	0,0	3,7
	1998	2,2	7,4	0,0	4,8
	1999	1,1	9,0	0,0	5,0
	2000	2,2	7,2	0,0	4,7
Lanaudière	1996	3,1	1,5	0,0	2,3
	1997	0,5	0,5	0,0	0,5
	1998	0,5	3,4	0,0	2,0
	1999	2,0	5,3	0,0	3,6
	2000	1,0	4,2	0,0	2,6
Laurentides	1996	0,4	3,1	0,0	1,8
	1997	1,3	2,2	0,0	1,7
	1998	2,1	3,4	0,0	2,8
	1999	2,5	5,8	0,0	4,2
	2000	1,7	4,1	0,0	2,9
Montérégie	1996	0,9	6,3	0,0	3,6
	1997	2,8	6,9	0,0	4,8
	1998	1,9	5,0	0,1	3,5
	1999	2,3	7,2	0,0	4,7
	2000	1,5	5,1	0,1	3,4
Nunavik	1996	317,9	42,3	0,0	180,0
	1997	347,6	123,9	0,0	236,3
	1998	218,0	40,3	0,0	129,9
	1999	77,0	98,8	0,0	87,7
	2000	281,5	174,4	0,0	228,8
Terres Cries/ Baie-James	1996	99,7	22,7	0,0	59,5
	1997	100,6	45,7	0,0	71,8
	1998	203,6	45,9	0,0	120,7
	1999	25,7	0,0	0,0	12,2
	2000	51,7	0,0	0,0	24,4
Province de Québec	1996	3,9	8,9	0,1	6,5
	1997	3,7	11,2	0,1	7,5
	1998	3,0	10,1	0,1	6,6
	1999	3,6	13,0	0,0	8,3
	2000	3,3	14,4	0,1	8,8

Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	2	0	0	0	1	2	1	0	1	7
	1998	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5
	1999	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	5
	2000	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	4
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0	6
	1997	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4
	1998	0	0	0	5	0	0	2	2	0	0	0	9
	1999	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	5
	2000	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
Québec	1996	0	0	1	4	4	3	3	0	1	0	0	16
	1997	0	0	1	2	6	7	4	6	0	0	0	26
	1998	0	0	5	7	3	2	8	4	0	0	0	29
	1999	0	0	18	13	8	6	8	6	3	1	0	63
	2000	0	0	5	11	9	8	5	4	1	2	0	45
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	4
	1997	0	2	1	5	2	2	1	0	0	0	0	13
	1998	0	0	0	4	2	1	0	1	0	0	0	8
	1999	0	0	0	3	0	1	1	1	0	0	0	6
	2000	0	0	2	5	2	1	3	7	1	0	0	21
Estrie	1996	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
	1997	0	0	3	1	1	0	0	0	3	0	0	8
	1998	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	1999	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	6
	2000	0	1	2	0	1	0	2	2	0	0	0	8
Montréal centre	1996	0	1	39	66	49	46	46	28	12	2	17	306
	1997	0	3	45	60	54	61	54	43	12	3	15	350
	1998	0	3	27	45	58	65	45	30	14	2	19	308
	1999	0	1	50	79	72	58	61	40	10	5	5	381
	2000	0	0	53	77	82	66	88	61	9	0	7	443
Outaouais	1996	0	0	1	2	2	2	1	0	1	0	0	9
	1997	0	0	2	6	2	0	2	0	0	0	1	13
	1998	0	0	4	4	1	0	1	1	2	0	0	13
	1999	0	0	2	6	5	2	4	3	1	0	0	23
	2000	0	0	0	3	8	2	2	6	2	0	0	23
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0	0	2	3	2	3	2	0	1	1	0	14
	1997	0	0	0	2	1	2	0	0	2	0	0	7
	1998	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	6
	1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Côte-Nord	1996	0	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	9
	1997	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	6
	1998	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
Nord-du Québec	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/ Appalaches	1996	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	5
	1997	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	1998	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4
	1999	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5
	2000	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	5
Laval	1996	0	0	5	1	5	2	0	3	0	0	0	16
	1997	0	0	3	4	1	3	2	0	0	0	0	13
	1998	0	0	2	4	1	3	4	2	1	0	0	17
	1999	0	0	0	1	5	3	3	3	3	0	0	18
	2000	0	0	0	4	3	3	4	3	0	0	0	17
Lanaudière	1996	0	0	0	2	4	0	1	2	0	0	0	9
	1997	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	3	2	1	0	2	0	0	0	8
	1999	0	1	1	3	3	2	3	2	0	0	0	15
	2000	0	0	0	1	3	4	2	0	1	0	0	11
Laurentides	1996	0	0	0	3	3	0	1	0	1	0	0	8
	1997	0	0	2	1	2	2	1	0	0	0	0	8
	1998	0	0	3	5	1	1	1	2	0	0	0	13
	1999	0	1	4	3	4	4	2	1	1	0	0	20
	2000	0	2	2	2	2	0	3	0	2	1	0	14
Montérégie	1996	0	1	8	6	4	9	7	11	2	0	0	48
	1997	0	1	15	11	12	7	8	8	4	0	0	66
	1998	0	0	6	14	10	4	6	7	0	1	0	48
	1999	0	0	10	18	9	8	7	11	3	0	0	66
	2000	0	0	10	10	6	9	6	4	2	1	0	48
Nunavik	1996	0	0	2	5	4	2	4	0	0	0	0	17
	1997	0	1	4	7	5	3	1	1	1	0	0	23
	1998	0	1	3	4	3	0	1	0	1	0	0	13
	1999	0	0	2	5	0	2	0	0	0	0	0	9
	2000	0	1	11	11	0	0	0	1	0	0	0	24
Terres Cries/ Baie James	1996	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	5
	1997	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	6
	1998	1	0	0	6	1	1	0	1	0	0	0	10
	1999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2000	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Province de Québec	1996	0	3	64	99	83	71	67	48	21	4	18	478
	1997	0	8	83	104	91	88	75	64	23	3	17	556
	1998	1	4	54	105	84	82	70	55	18	3	19	495
	1999	0	4	91	133	108	88	93	74	21	7	5	624
	2000	0	4	87	128	119	95	118	91	20	4	7	673

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	5,7	5,8	4,2	0,0	0,5	3,4
	1998	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	7,9	5,9	5,7	0,0	0,0	0,0	2,5
	1999	0,0	0,0	6,8	0,0	9,7	0,0	6,1	2,8	0,0	2,5	0,0	2,5
	2000	0,0	0,0	7,2	7,8	0,0	0,0	6,4	0,0	3,7	0,0	0,0	2,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,3	0,0	6,5	3,2	0,0	0,0	2,1
	1997	0,0	0,0	0,0	5,1	6,1	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	1,4
	1998	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	7,7	4,2	0,0	0,0	0,0	3,1
	1999	0,0	0,0	4,3	4,8	0,0	0,0	4,0	4,1	0,0	0,0	0,0	1,7
	2000	0,0	0,0	0,0	4,6	5,9	5,9	4,1	2,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Québec	1996	0,0	0,0	2,3	9,1	8,6	5,5	5,1	0,0	1,3	0,0	0,0	2,5
	1997	0,0	0,0	2,3	4,5	13,3	13,4	6,9	5,5	0,0	0,0	0,0	4,0
	1998	0,0	0,0	11,9	15,8	6,8	4,0	13,9	3,6	0,0	0,0	0,0	4,4
	1999	0,0	0,0	44,0	28,9	18,4	12,6	14,1	5,3	3,5	0,9	0,0	9,6
	2000	0,0	0,0	12,7	24,3	20,9	17,4	8,9	3,5	1,1	1,7	0,0	6,9
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	5,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	1997	0,0	3,3	2,8	16,4	7,1	5,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
	1998	0,0	0,0	0,0	12,7	7,2	2,9	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,6
	1999	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	3,1	2,4	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
	2000	0,0	0,0	6,0	15,1	7,1	3,3	7,5	8,4	1,5	0,0	0,0	4,3
Estrie	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	1,1
	1997	0,0	0,0	14,4	5,2	5,6	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	2,8
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,2	4,3	6,5	0,0	0,0	0,0	2,1
	2000	0,0	2,8	10,0	0,0	5,8	0,0	8,7	4,3	0,0	0,0	0,0	2,8
Montréal centre	1996	0,0	0,5	36,8	52,5	32,3	27,6	29,0	10,3	5,9	0,5	0,9	16,5
	1997	0,0	1,5	42,3	47,7	37,1	37,4	33,9	15,6	5,8	0,8	0,8	18,8
	1998	0,0	1,5	25,3	35,4	41,3	41,2	28,1	10,7	6,5	0,5	1,0	16,5
	1999	0,0	0,5	47,0	61,3	52,7	38,2	38,1	14,1	4,5	1,3	0,3	20,4
	2000	0,0	0,0	50,2	59,2	61,0	45,2	55,2	21,1	4,0	0,0	0,4	23,6
Outaouais	1996	0,0	0,0	4,9	9,3	8,3	6,6	3,2	0,0	3,1	0,0	0,0	2,8
	1997	0,0	0,0	9,5	27,6	8,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,3	4,0
	1998	0,0	0,0	18,9	18,1	4,3	0,0	3,2	1,8	5,5	0,0	0,0	4,0
	1999	0,0	0,0	9,3	27,0	21,2	7,3	12,6	5,4	2,6	0,0	0,0	6,9
	2000	0,0	0,0	0,0	13,4	33,7	7,6	6,3	10,4	5,0	0,0	0,0	6,8
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0,0	0,0	16,1	27,4	18,2	21,2	13,2	0,0	6,6	4,8	0,0	8,8
	1997	0,0	0,0	0,0	18,0	9,3	14,7	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	4,4
	1998	0,0	0,0	24,2	8,8	9,4	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
	1999	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1996	0,0	0,0	48,9	13,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
	1997	0,0	7,2	12,5	25,8	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
	1998	0,0	0,0	12,9	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	13,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	2,9
Nord-du Québec	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0,0	0,0	13,4	14,8	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/Appalaches	1996	0,0	0,0	0,0	8,0	4,2	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,3
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,8
	1998	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	7,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,0
	1999	0,0	0,0	3,5	3,7	0,0	3,8	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,3
	2000	0,0	0,0	0,0	3,6	8,2	0,0	3,1	1,5	0,0	0,0	0,0	1,3
Laval	1996	0,0	0,0	21,7	4,5	20,2	6,5	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	4,6
	1997	0,0	0,0	12,8	18,0	4,1	10,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
	1998	0,0	0,0	8,5	17,7	4,2	10,3	12,1	3,5	2,3	0,0	0,0	4,8
	1999	0,0	0,0	0,0	4,3	21,4	10,7	9,1	5,1	6,8	0,0	0,0	5,0
	2000	0,0	0,0	0,0	17,0	13,0	11,1	12,2	5,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Lanaudière	1996	0,0	0,0	0,0	9,0	16,1	0,0	2,5	3,2	0,0	0,0	0,0	2,3
	1997	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998	0,0	0,0	0,0	12,5	8,1	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	2,0
	1999	0,0	1,7	3,6	12,1	12,0	6,1	7,4	2,9	0,0	0,0	0,0	3,6
	2000	0,0	0,0	0,0	4,0	11,8	12,8	4,9	0,0	1,9	0,0	0,0	2,6
Laurentides	1996	0,0	0,0	0,0	11,5	10,0	0,0	2,2	0,0	2,1	0,0	0,0	1,8
	1997	0,0	0,0	6,6	3,7	6,7	4,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
	1998	0,0	0,0	9,8	17,9	3,3	2,5	2,2	2,6	0,0	0,0	0,0	2,8
	1999	0,0	1,5	12,9	10,4	13,2	10,4	4,2	1,3	1,8	0,0	0,0	4,2
	2000	0,0	2,9	6,4	6,8	6,5	0,0	6,3	0,0	3,3	1,4	0,0	2,9
Montérégie	1996	0,0	0,6	8,4	6,9	4,3	7,6	5,6	5,1	1,3	0,0	0,0	3,6
	1997	0,0	0,5	15,7	12,4	13,0	6,1	6,3	3,6	2,5	0,0	0,0	4,8
	1998	0,0	0,0	6,3	15,4	10,8	3,6	4,7	3,1	0,0	0,5	0,0	3,5
	1999	0,0	0,0	10,6	19,3	9,7	7,4	5,5	4,8	1,7	0,0	0,0	4,7
	2000	0,0	0,0	10,7	10,6	6,5	8,6	4,7	1,7	1,1	0,5	0,0	3,4
Nunavik	1996	0,0	0,0	226,2	572,7	453,5	241,8	576,4	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
	1997	0,0	42,7	441,5	765,0	576,0	347,2	134,6	102,6	193,4	0,0	0,0	236,3
	1998	0,0	43,2	317,1	435,3	327,5	0,0	125,9	0,0	179,2	0,0	0,0	129,9
	1999	0,0	0,0	200,8	537,6	0,0	230,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7
	2000	0,0	44,0	1021,4	1194,4	0,0	0,0	0,0	88,4	0,0	0,0	0,0	228,8
Terres Cries/Baie James	1996	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	175,4	0,0	0,0	0,0	11,9	59,5
	1997	0,0	0,0	360,6	230,9	121,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8
	1998	110,1	0,0	0,0	745,3	119,9	143,5	0,0	121,7	0,0	0,0	0,0	120,7
	1999	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
	2000	0,0	0,0	126,1	0,0	0,0	0,0	0,0	118,3	0,0	0,0	0,0	24,4
Province de Québec	1996	0,0	0,3	12,7	20,6	15,9	11,0	9,9	4,1	2,6	0,3	0,2	6,5
	1997	0,0	0,9	16,4	21,3	17,8	14,1	11,1	5,4	2,7	0,2	0,2	7,5
	1998	0,2	0,4	10,8	21,1	16,7	13,8	10,4	4,5	2,0	0,2	0,3	6,6
	1999	0,0	0,4	18,3	26,2	21,7	15,4	13,9	6,0	2,3	0,5	0,1	8,3
	2000	0,0	0,4	17,8	24,8	23,9	17,3	17,7	7,2	2,1	0,3	0,1	8,8

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	1999	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Québec	1996	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	4
	1997	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3
	1998	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6
	1999	0	0	12	5	1	0	0	1	0	0	0	19
	2000	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	2	0	4	1	0	1	0	0	0	0	8
	1998	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	1999	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	2000	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	5
Estrie	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	2000	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Montréal centre	1996	0	1	34	26	9	10	5	2	0	0	2	89
	1997	0	3	31	18	3	4	1	3	3	0	0	66
	1998	0	3	20	10	6	3	2	0	1	0	1	46
	1999	0	1	35	24	5	2	4	1	0	1	1	74
	2000	0	0	28	22	11	5	1	2	3	0	1	73
Outaouais	1996	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	5
	1997	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	4
	1998	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	7
	1999	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	6
	2000	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	6
	1997	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
	1998	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	5
	1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Côte-Nord	1996	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	1997	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4
	1998	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Nord-du Québec	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/Appalaches	1996	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laval	1996	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	1997	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5
	1998	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
	1999	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	2000	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	4
Lanaudière	1996	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	6
	1997	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1999	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4
	2000	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Laurentides	1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	1998	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5
	1999	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	6
	2000	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Montérégie	1996	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	6
	1997	0	1	12	5	1	0	0	0	0	0	0	19
	1998	0	0	3	5	4	0	0	0	0	1	0	13
	1999	0	0	6	5	1	3	0	1	0	0	0	16
	2000	0	0	5	2	2	0	0	1	0	1	0	11
Nunavik	1996	0	0	2	5	3	2	3	0	0	0	0	15
	1997	0	1	4	4	4	2	1	0	1	0	0	17
	1998	0	1	3	4	2	0	0	0	1	0	0	11
	1999	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
	2000	0	1	7	6	0	0	0	1	0	0	0	15
Terres Cries/Baie James	1996	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	4
	1997	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
	1998	0	0	0	5	1	1	0	1	0	0	0	8
	1999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2000	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Province de Québec	1996	0	3	47	43	22	14	8	4	1	0	3	145
	1997	0	8	56	41	12	9	4	4	4	0	1	139
	1998	0	4	41	42	14	4	2	2	3	1	1	114
	1999	0	4	61	44	9	6	7	4	0	1	1	137
	2000	0	4	49	37	17	7	2	6	3	1	1	127

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	1999	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Québec	1996	0,0	0,0	0,0	9,2	4,4	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	1,2
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	3,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,9
	1998	0,0	0,0	14,6	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
	1999	0,0	0,0	60,1	22,5	4,7	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	5,6
	2000	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	1997	0,0	6,7	0,0	27,0	7,3	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	1998	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	1999	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	2000	0,0	0,0	6,1	12,5	7,3	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,0
Estrie	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	2000	0,0	5,7	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
Montréal centre	1996	0,0	1,1	64,5	41,8	12,2	12,5	6,3	1,4	0,0	0,0	0,2	9,3
	1997	0,0	3,1	58,8	28,9	4,2	5,1	1,3	2,1	2,7	0,0	0,0	6,8
	1998	0,0	3,1	37,8	16,0	8,8	4,0	2,5	0,0	0,9	0,0	0,1	4,8
	1999	0,0	1,0	66,3	37,7	7,6	2,7	5,1	0,7	0,0	0,4	0,1	7,6
	2000	0,0	0,0	53,4	34,3	17,0	7,1	1,3	1,4	2,5	0,0	0,1	7,5
Outaouais	1996	0,0	0,0	9,8	18,8	8,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	1997	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5
	1998	0,0	0,0	38,1	9,1	0,0	0,0	0,0	3,7	5,6	0,0	0,0	4,2
	1999	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
	2000	0,0	0,0	0,0	17,8	8,5	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0,0	0,0	33,2	18,9	37,4	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
	1997	0,0	0,0	0,0	18,6	19,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
	1998	0,0	0,0	50,8	18,2	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
	1999	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1996	0,0	0,0	51,8	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	1997	0,0	14,6	0,0	54,8	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
	1998	0,0	0,0	27,4	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Nord-du Québec	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/ Appalaches	1996	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laval	1996	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
	1997	0,0	0,0	26,4	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	1998	0,0	0,0	17,4	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	2000	0,0	0,0	0,0	8,9	17,8	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
Lanaudière	1996	0,0	0,0	0,0	9,3	24,1	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	3,1
	1997	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1999	0,0	3,5	7,6	0,0	0,0	6,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	2000	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Laurentides	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	1997	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	1998	0,0	0,0	13,5	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	1999	0,0	3,0	26,9	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	2000	0,0	6,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
Montérégie	1996	0,0	1,1	6,5	2,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	1997	0,0	1,1	25,8	11,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	1998	0,0	0,0	6,5	11,3	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,9
	1999	0,0	0,0	13,0	11,0	2,2	5,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	2,3
	2000	0,0	0,0	11,0	4,3	4,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	1,5
Nunavik	1996	0,0	0,0	434,8	1073,0	683,4	492,6	974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,9
	1997	0,0	84,1	851,1	831,6	923,8	469,5	293,3	0,0	339,0	0,0	0,0	347,6
	1998	0,0	84,7	608,5	818,0	425,5	0,0	0,0	0,0	321,5	0,0	0,0	218,0
	1999	0,0	0,0	375,2	396,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0
	2000	0,0	86,8	1232,4	1190,5	0,0	0,0	0,0	200,8	0,0	0,0	0,0	281,5
Terres Cries/ Baie James	1996	0,0	0,0	0,0	668,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	99,7
	1997	0,0	0,0	771,2	241,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,6
	1998	0,0	0,0	0,0	1302,1	259,7	322,6	0,0	268,1	0,0	0,0	0,0	203,6
	1999	0,0	123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7
	2000	0,0	0,0	280,9	0,0	0,0	0,0	0,0	259,7	0,0	0,0	0,0	51,7
Province de Québec	1996	0,0	0,7	19,1	18,3	8,6	4,4	2,4	0,7	0,2	0,0	0,1	3,9
	1997	0,0	1,8	22,8	17,2	4,8	3,0	1,2	0,7	0,9	0,0	0,0	3,7
	1998	0,0	0,9	16,7	17,3	5,7	1,4	0,6	0,3	0,7	0,1	0,0	3,0
	1999	0,0	0,9	25,1	17,8	3,7	2,1	2,1	0,6	0,0	0,1	0,0	3,6
	2000	0,0	0,9	20,5	14,8	7,0	2,6	0,6	1,0	0,6	0,1	0,0	3,3

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	2	0	0	0	1	2	1	0	0	6
	1998	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5
	1999	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	5
	2000	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	4
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0	6
	1997	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4
	1998	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	5
	1999	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	4
	2000	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
Québec	1996	0	0	1	2	3	3	3	0	0	0	0	12
	1997	0	0	1	2	5	6	4	5	0	0	0	23
	1998	0	0	2	4	3	2	8	4	0	0	0	23
	1999	0	0	6	8	7	6	8	5	3	1	0	44
	2000	0	0	2	11	9	8	5	4	1	2	0	42
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
	1997	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	5
	1998	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	6
	1999	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	4
	2000	0	0	1	3	1	1	3	6	1	0	0	16
Estrie	1996	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
	1997	0	0	3	0	1	0	0	0	3	0	0	7
	1998	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	1999	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	5
	2000	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	5
Montréal centre	1996	0	0	5	39	40	36	38	26	12	2	10	208
	1997	0	0	14	41	51	57	52	40	9	2	12	278
	1998	0	0	7	34	52	62	43	30	13	2	12	255
	1999	0	0	14	55	67	56	57	39	10	4	3	305
	2000	0	0	25	55	71	61	87	59	5	0	3	366
Outaouais	1996	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	4
	1997	0	0	2	3	2	0	2	0	0	0	0	9
	1998	0	0	0	3	1	0	1	0	1	0	0	6
	1999	0	0	2	1	5	2	4	2	1	0	0	17
	2000	0	0	0	1	7	2	1	5	2	0	0	18
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0	0	0	2	0	2	2	0	1	1	0	8
	1997	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4
	1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Côte-Nord	1996	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	6
	1997	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Nord-du Québec	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/ Appalaches	1996	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3
	1997	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	1998	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4
	1999	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5
	2000	0	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	5
Laval	1996	0	0	2	1	5	2	0	3	0	0	0	13
	1997	0	0	0	2	1	3	2	0	0	0	0	8
	1998	0	0	0	2	1	3	4	2	1	0	0	13
	1999	0	0	0	1	4	3	2	3	3	0	0	16
	2000	0	0	0	3	1	2	4	3	0	0	0	13
Lanaudière	1996	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3
	1997	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	2	2	1	0	2	0	0	0	7
	1999	0	0	0	3	3	1	2	2	0	0	0	11
	2000	0	0	0	0	3	3	2	0	1	0	0	9
Laurentides	1996	0	0	0	3	2	0	1	0	1	0	0	7
	1997	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	5
	1998	0	0	1	2	1	1	1	2	0	0	0	8
	1999	0	0	0	3	4	4	1	1	1	0	0	14
	2000	0	0	0	2	2	0	3	0	2	1	0	10
Montérégie	1996	0	0	5	5	3	9	7	11	2	0	0	42
	1997	0	0	3	6	11	7	8	8	4	0	0	47
	1998	0	0	3	8	6	4	6	7	0	0	0	34
	1999	0	0	4	13	8	5	7	10	3	0	0	50
	2000	0	0	5	8	4	9	6	3	1	0	0	36
Nunavik	1996	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	1997	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	6
	1998	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	1999	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	5
	2000	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	9
Terres Cries/ Baie James	1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	1998	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1996	0	0	17	55	61	57	56	44	20	4	10	324
	1997	0	0	27	62	79	79	70	60	19	2	12	410
	1998	1	0	13	61	70	78	68	53	15	2	12	373
	1999	0	0	29	89	99	82	86	70	21	6	3	485
	2000	0	0	38	91	102	88	116	84	15	3	3	540


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	8,4	0,0	0,0	6,0
	1998	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	15,9	12,0	11,4	0,0	0,0	0,0	5,0
	1999	0,0	0,0	13,5	0,0	19,4	0,0	12,5	5,7	0,0	5,8	0,0	5,1
	2000	0,0	0,0	14,2	15,0	0,0	0,0	13,0	0,0	7,2	0,0	0,0	4,1
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	8,4	0,0	12,7	6,5	0,0	0,0	4,1
	1997	0,0	0,0	0,0	9,7	11,8	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	2,8
	1998	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	15,2	8,1	0,0	0,0	0,0	3,5
	1999	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	7,9	8,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	2000	0,0	0,0	0,0	8,8	11,5	11,5	8,2	4,0	0,0	0,0	0,0	3,5
Québec	1996	0,0	0,0	4,6	8,9	12,7	10,8	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
	1997	0,0	0,0	4,6	8,9	21,7	22,5	13,6	9,3	0,0	0,0	0,0	7,3
	1998	0,0	0,0	9,4	17,8	13,3	7,9	27,3	7,3	0,0	0,0	0,0	7,3
	1999	0,0	0,0	28,7	35,2	31,7	24,7	27,7	9,0	7,1	2,1	0,0	13,9
	2000	0,0	0,0	9,9	47,9	41,3	34,3	17,5	7,1	2,3	4,1	0,0	13,2
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	1997	0,0	0,0	5,4	6,4	6,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	1998	0,0	0,0	0,0	12,3	13,9	5,7	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,5
	1999	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,1	4,8	2,4	0,0	0,0	0,0	1,6
	2000	0,0	0,0	5,8	17,5	6,9	6,4	14,7	14,2	3,1	0,0	0,0	6,5
Estrie	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	2,2
	1997	0,0	0,0	28,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	5,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	8,5	13,0	0,0	0,0	0,0	3,6
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	17,2	8,5	0,0	0,0	0,0	3,5
Montréal centre	1996	0,0	0,0	9,4	61,4	51,4	41,6	47,6	19,8	12,6	1,3	1,1	23,4
	1997	0,0	0,0	26,1	64,4	68,2	67,3	64,6	29,9	9,2	1,3	1,3	31,1
	1998	0,0	0,0	13,1	52,7	71,9	75,9	53,1	22,1	12,8	1,3	1,3	28,4
	1999	0,0	0,0	26,2	84,1	95,2	71,3	70,0	28,2	9,6	2,6	0,3	33,9
	2000	0,0	0,0	47,0	83,5	102,1	80,8	107,0	41,9	4,6	0,0	0,3	40,5
Outaouais	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	6,6	6,5	0,0	6,2	0,0	0,0	2,5
	1997	0,0	0,0	18,8	27,3	17,1	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
	1998	0,0	0,0	0,0	27,0	8,5	0,0	6,3	0,0	5,4	0,0	0,0	3,7
	1999	0,0	0,0	18,4	9,0	42,4	14,8	25,1	7,1	5,1	0,0	0,0	10,3
	2000	0,0	0,0	0,0	8,9	58,8	15,4	6,2	17,3	9,7	0,0	0,0	10,7
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0,0	0,0	0,0	35,5	0,0	27,3	25,4	0,0	12,9	10,1	0,0	9,9
	1997	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	14,3	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	4,9
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1996	0,0	0,0	46,4	24,6	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
	1997	0,0	0,0	23,6	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	3,8
Nord-du Québec	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0,0	0,0	25,9	28,8	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/Appalaches	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	3,2	0,0	3,7	0,0	1,6
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	14,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	2,1
	1999	0,0	0,0	6,7	7,1	0,0	7,3	5,9	3,0	0,0	0,0	0,0	2,6
	2000	0,0	0,0	0,0	6,9	15,8	0,0	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Laval	1996	0,0	0,0	16,8	8,8	39,3	12,6	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	7,6
	1997	0,0	0,0	0,0	17,4	8,1	19,4	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
	1998	0,0	0,0	0,0	17,1	8,2	20,0	24,2	7,1	4,8	0,0	0,0	7,4
	1999	0,0	0,0	0,0	8,4	33,4	20,7	12,0	10,3	14,1	0,0	0,0	9,0
	2000	0,0	0,0	0,0	24,6	8,4	14,3	24,0	10,0	0,0	0,0	0,0	7,2
Lanaudière	1996	0,0	0,0	0,0	8,8	8,1	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998	0,0	0,0	0,0	16,1	16,0	5,9	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	3,4
	1999	0,0	0,0	0,0	23,2	24,0	6,1	9,7	5,6	0,0	0,0	0,0	5,3
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	19,1	9,7	0,0	3,8	0,0	0,0	4,2
Laurentides	1996	0,0	0,0	0,0	22,2	13,2	0,0	4,4	0,0	4,1	0,0	0,0	3,1
	1997	0,0	0,0	0,0	7,2	13,3	4,8	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	1998	0,0	0,0	6,3	13,8	6,6	5,0	4,3	5,1	0,0	0,0	0,0	3,4
	1999	0,0	0,0	0,0	20,2	26,3	20,6	4,2	2,4	3,5	0,0	0,0	5,8
	2000	0,0	0,0	0,0	13,1	12,9	0,0	12,5	0,0	6,6	3,2	0,0	4,1
Montréal	1996	0,0	0,0	10,2	11,2	6,3	15,0	11,1	10,1	2,7	0,0	0,0	6,3
	1997	0,0	0,0	6,1	13,2	23,3	12,0	12,5	7,2	5,0	0,0	0,0	6,9
	1998	0,0	0,0	6,1	17,2	12,7	7,1	9,3	6,2	0,0	0,0	0,0	5,0
	1999	0,0	0,0	8,3	27,3	17,0	9,1	10,8	8,6	3,4	0,0	0,0	7,2
	2000	0,0	0,0	10,5	16,5	8,5	16,8	9,2	2,5	1,1	0,0	0,0	5,1
Nunavik	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	225,7	0,0	259,1	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3
	1997	0,0	0,0	0,0	691,2	229,9	228,3	0,0	186,6	0,0	0,0	0,0	123,9
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	224,2	0,0	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3
	1999	0,0	0,0	0,0	704,2	0,0	441,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8
	2000	0,0	0,0	785,9	1199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,4
Terres Cries/Baie James	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,7	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
	1997	0,0	0,0	0,0	221,2	223,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7
	1998	213,7	0,0	0,0	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1996	0,0	0,0	6,6	22,4	22,9	17,4	16,5	7,6	5,0	0,8	0,3	8,9
	1997	0,0	0,0	10,4	24,8	30,3	24,9	20,5	10,1	4,5	0,4	0,3	11,2
	1998	0,4	0,0	5,1	23,9	27,2	25,6	19,9	8,7	3,4	0,4	0,3	10,1
	1999	0,0	0,0	11,4	34,2	38,9	28,1	25,3	11,3	4,6	1,1	0,1	13,0
	2000	0,0	0,0	15,2	34,4	40,1	31,4	34,3	13,3	3,2	0,5	0,1	14,4


**Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par
groupe d'âge, Québec (1997-2000)**



Nombre de cas déclarés


		15-19	20-24	25-29	30-34
Province de Québec	1996	47	43	22	14
	1997	56	41	12	9
	1998	41	42	14	4
	1999	61	44	9	6
	2000	49	37	17	7

**Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes:
par groupe d'âge, Québec (1997-2000)**



Taux d'incidence par 100 000		15-19	20-24	25-29	30-34
Province de Québec	1996	19,1	18,3	8,6	4,4
	1997	22,8	17,2	4,8	3,0
	1998	16,7	17,3	5,7	1,4
	1999	25,1	17,8	3,7	2,1
	2000	20,5	14,8	7,0	2,6


**Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par
groupe d'âge, Québec (1997-2000)**



Nombre de cas déclarés

		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49
Province de Québec	1996	17	55	61	57	56	44
	1997	27	62	79	79	70	60
	1998	13	61	70	78	68	53
	1999	29	89	99	82	86	70
	2000	38	91	102	88	116	84


**Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes:
par groupe d'âge, Québec (1997-2000)**




Taux d'incidence par 100 000

		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49
Province de Québec	1996	6,6	22,4	22,9	17,4	16,5	7,6
	1997	10,4	24,8	30,3	24,9	20,5	10,1
	1998	5,1	23,9	27,2	25,6	19,9	8,7
	1999	11,4	34,2	38,9	28,1	25,3	11,3
	2000	15,2	34,4	40,1	31,4	34,3	13,3


Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée par groupe d'âge,
Québec (1996-2000)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée,
Québec (1990-2000)




Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1996-2000)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes, Québec (1990-2000)



Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par groupe d'âge,
Québec (1996-2000)



Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes,
Québec (1990-2000)



Nombre et pourcentage de cas déclarés de gonorrhée causée par un *Neisseria gonorrhoeae* producteur de pénicillinase (NGPP) ¹ par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1996 - 2000)

Région socio-sanitaire		Femmes		Hommes		Manquant		Total	
		Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Bas St-Laurent	1996	0	-	0	-	0	-	0	-
	1997	0	-	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1998	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	2000	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0	-	1	16,7	0	-	1	16,7
	1997	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	3	60,0	0	-	3	33,3
	1999	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	2000	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
Québec	1996	1	25,0	1	8,3	0	-	2	12,5
	1997	0	0,0	2	8,7	0	-	2	7,7
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	1	5,3	2	4,5	0	-	3	4,8
	2000	0	0,0	1	2,4	0	-	1	2,2
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0	0,0	1	33,3	0	-	1	25,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	2000	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Estrie	1996	0	-	3	100,0	0	-	3	100,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	2000	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Montréal centre	1996	2	2,2	21	10,1	3	33,3	26	8,5
	1997	9	13,6	20	7,2	0	0,0	29	8,3
	1998	2	4,3	15	5,9	0	0,0	17	5,5
	1999	3	4,1	21	6,9	0	0,0	24	6,3
	2000	1	1,4	55	15,0	0	0,0	56	12,6
Outaouais	1996	1	20,0	1	25,0	0	-	2	22,2
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	1	16,7	0	-	1	7,7
	1999	0	0,0	1	5,9	0	-	1	4,3
	2000	0	0,0	4	22,2	0	0,0	4	17,4
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	1	25,0	0	-	1	14,3
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	0,0	0	-	0	-	0	0,0
	2000	0	-	0	-	0	-	0	-
Côte-Nord	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	-	0	-	0	0,0
	1999	0	-	0	-	0	-	0	-
	2000	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Nord-du- Québec	1996	0	-	0	-	0	-	0	-
	1997	0	-	0	-	0	-	0	-
	1998	0	-	0	-	0	-	0	-
	1999	0	-	0	-	0	-	0	-
	2000	0	-	0	-	0	-	0	-

(1): On inclut ici les cas confirmés de NGPP par le LSPQ ainsi que les cas déclarés comme étant causés par une souche "B-Lactame positive" mais non-confirmée par le LSPQ. Certains doublons ne peuvent pas être éliminés de la banque dépersonnalisée.

-: Aucun cas de gonorrhée déclaré

Nombre et pourcentage de cas déclarés de gonorrhée causée par un *Neisseria gonorrhoeae* producteur de pénicillinase (NGPP)
¹ par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995 - 1999) suite

Région socio-sanitaire		Femmes		Hommes		Manquant		Total	
		Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Gaspésie/ Iles de la madeleine	1996	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	-	0	-	0	-	0	-
	1999	0	-	0	-	0	-	0	-
	2000	0	-	0	-	0	-	0	-
Chaudière/ Appalaches	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	-	1	20,0	0	-	1	20,0
	2000	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
Laval	1996	0	0,0	2	15,4	0	-	2	12,5
	1997	0	0,0	1	12,5	0	-	1	7,7
	1998	0	0,0	1	7,7	0	-	1	5,9
	1999	0	0,0	1	6,3	0	-	1	5,6
	2000	0	0,0	2	15,4	0	-	2	11,8
Lanaudière	1996	1	16,7	0	0,0	0	-	1	11,1
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	1	14,3	0	-	1	12,5
	1999	1	25,0	1	9,1	0	-	2	13,3
	2000	0	0,0	2	22,2	0	-	2	18,2
Laurentides	1996	1	100,0	0	0,0	0	-	1	12,5
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	2000	0	0,0	2	20,0	0	-	2	14,3
Montérégie	1996	0	0,0	3	7,1	0	-	3	6,3
	1997	0	0,0	5	10,6	0	-	5	7,6
	1998	1	7,7	1	2,9	0	0,0	2	4,2
	1999	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	2000	0	0,0	3	8,3	0	0,0	3	6,3
Kativik	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	2000	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Terres Cries/ Baie-James	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	0,0	0	-	0	-	0	0,0
	2000	0	0,0	0	-	0	-	0	0,0
Province de Québec	1996	6	4,1	33	10,2	3	33,3	42	8,8
	1997	9	6,5	29	7,1	0	0,0	38	6,8
	1998	3	2,6	22	5,9	0	0,0	25	5,1
	1999	5	3,6	27	5,6	0	0,0	32	5,1
	2000	1	0,8	69	12,8	0	0,0	70	10,4

(1): On inclus ici les cas confirmés de NGPP par le LSPQ ainsi que les cas déclarés comme étant causés par une souche "B-Lactame positive" mais non-confirmée par le LSPQ . Certains doublons ne peuvent pas être éliminés de la banque dépersonnalisée.

-: Aucun cas de gonorrhée déclaré

Résistance aux antibiotiques rapportée dans les déclarations MADO, Québec, 1996-2000

	1996	1997	1998	1999	2000
Résistance à la pénicilline ou production de pénicillinase ¹	19	15	89	21	9
Résistance à la tétracycline	13	64	50	44	28
Résistance à la tétracycline et sensibilité intermédiaire à la pénicilline	6	9	14	14	14
Résistance à la pénicilline et à la tétracycline	27	38	33	25	79
Résistance à la pénicilline et à la tétracycline et production de pénicillinase	19	20	12	18	56
Sensibilité intermédiaire à la pénicilline ou à la tétracycline ² ou au deux	19	49	50	87	63
Total des cas de gonorrhées déclarés	478	556	495	624	673

1. Huit de ces déclarations rapportaient aussi une résistance à la pénicilline et une sensibilité intermédiaire à la tétracycline avec ou sans production de pénicillinase.

2. De ces 267 déclarations, 212 rapportaient une sensibilité intermédiaire à la pénicilline et à la tétracycline, 36 à la pénicilline seulement et 19 à la tétracycline seulement.

Nombre de gonorrhée déclarées chez les hommes selon le site d'infection,
Québec, 1996-2000

Site d'infection	Nombre	Pourcentage des cas
Gonorrhée génitale	1 869	87, 7
Gonorrhée oculaire	5	0,2
Gonorrhée "autre"	258	12,1
Rectale	140 ¹	
Pharyngée	102 ²	
Articulaire	2	
Site non préci	14	
Total	2 132	

1: Deux de ces individus souffraient simultanément d'une infection pharyngée.

2: Trois de ces individus souffraient simultanément d'une infection rectale.

Nombre de gonorrhées rectales et pharyngées déclarées chez les hommes et proportion par rapport au nombre total de gonorrhées déclarées, Québec, 1996-2000

	1996	1997	1998	1999	2000
Proportion des gonorrhées déclarées comme étant "autres"	40/324 12,3%	59/410 14,4%	41/373 11,0%	50/485 10,3%	68/540 14,0%
Proportion des gonorrhées "autres", déclarées sans que le site ne soit précisé	6/40 15,0%	2/59 3,4%	3/43 7,0%	0/49 0,0%	3/68 4,4%
Proportion des gonorrhées déclarées comme étant rectales	19/325 5,8%	32/410 7,8%	25/373 6,7%	32/485 6,6%	34/540 6,3%
Proportion des gonorrhées déclarées comme étant pharyngées	15/325 4,6%	28/410 6,8%	13/373 3,5%	18/485 3,7%	31/540 5,7%

On trouvera dans cette section :

Hépatites B

- Le type de validation des cas d'hépatite B déclarés par année (**VALIDhb**) T95

Hépatites B aiguës

- L'histogramme du taux d'incidence (TI) provincial (**hbaprov**) et de ses variations annuelles (**hbaVARan**) T96
- L'histogramme du taux d'incidence de chacune des régions (**hbaNUMÉRO**)..... T98
- Deux tableaux donnant les nombres de cas déclarés et les TI correspondants par année, région et sexe (**NBrssHBa** et **TlrssHBa**) T116
- La distribution des nombres de cas déclarés et des TI correspondants par âge, région et sexe (**NBâgeHBAtot1** à **TIâgeHBAhom2**) T118
- La variation du nombre de cas déclarés et des TI correspondants par âge et sexe (**varNBâgeHBafem** à **varTIâgeHBAhom**) T130
- Le taux d'incidence moyen par groupe d'âge et sexe ainsi que l'évolution des TI par groupe d'âge et sexe (**évoÂGEhbaTOT**, **évoÂGEhbaFEM** et **évoÂGEhbaHOM**) T134

Hépatites B chroniques

- Un tableau donnant les nombres de cas déclarés par année, région et sexe (**NBrssHBc**) T137
- La distribution des nombres de cas déclarés et des TI correspondants par âge, région et sexe (**NBâgeHBCtot1** à **NBâgeHBChom2**) T138


Hépatites B de type non précisé

- Un tableau donnant les nombres de cas déclarés par année, région et sexe (**NBrssHBnp**) T144

Type de validation des cas d'hépatite B déclarés, Québec, 1996-2000

	1996	1997	1998	1999	2000
Nombre de cas déclarés	1 548	1 488	1 293	1 299	1 296
Nombre de cas déclarés sur la base de signes "cliniques"	413	447	412	522	666
Nombre de cas déclarés dont le type de validation est connu	1 437	1 338	1 164	1 161	1 155
Pourcentages des cas dont le type de validation est "clinique" parmi ceux dont le type de validation est connu	28,7	33,4	35,4	45,0	57,7

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	142	303	0	445
1991	156	266	0	422
1992	143	311	0	454
1993	133	318	0	451
1994	112	232	0	344

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	66	201	0	267
1996	76	203	0	279
1997	69	157	0	226
1998	58	119	0	177
1999	52	113	0	165
2000	46	136	0	182




Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence *

	Femmes	Hommes	Total
1991	9,9	-12,2	-5,2
1992	-8,3	16,9	7,6
1993	-7,0	2,3	-0,7
1994	-15,8	-27,0	-23,7
1995	-44,3	-19,2	-27,1
1996	14,2	0,2	3,7
1997	-9,9	-23,3	-19,6
1998	-16,5	-24,8	-22,3
1999	-11,0	-5,7	-7,4
2000	-12,1	19,5	9,6

*: (taux année courante)-(taux année antérieure)/(taux année antérieure) *100

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région du Bas-St-Laurent




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	0	3	0	3
1991	0	2	0	2
1992	1	1	0	2
1993	0	1	0	1
1994	0	2	0	2

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	0	0	0
1996	1	9	0	10
1997	1	1	0	2
1998	0	3	0	3
1999	1	1	0	2
2000	0	3	0	3

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région du Saguenay/Lac St-Jean




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	3	4	0	7
1991	3	3	0	6
1992	1	2	0	3
1993	4	2	0	6
1994	0	2	0	2

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	2	0	0	2
1996	2	4	0	6
1997	0	4	0	4
1998	0	1	0	1
1999	0	3	0	3
2000	1	1	0	2

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région de Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	24	59	0	83
1991	29	46	0	75
1992	28	62	0	90
1993	18	63	0	81
1994	9	32	0	41

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	12	30	0	42
1996	13	22	0	35
1997	14	28	0	42
1998	5	12	0	17
1999	4	13	0	17
2000	5	12	0	17

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région de la Mauricie/Centre du Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	8	14	0	22
1991	3	10	0	13
1992	7	11	0	18
1993	0	10	0	10
1994	3	7	0	10

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	4	21	0	25
1996	6	7	0	13
1997	4	6	0	10
1998	5	6	0	11
1999	1	8	0	9
2000	3	3	0	6

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région de l'Estrie




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	0	1	0	1
1991	2	5	0	7
1992	7	7	0	14
1993	9	20	0	29
1994	3	5	0	8

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	2	7	0	9
1996	2	4	0	6
1997	1	2	0	3
1998	2	3	0	5
1999	5	4	0	9
2000	1	9	0	10

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région de Montréal centre




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	47	117	0	164
1991	55	85	0	140
1992	47	127	0	174
1993	49	129	0	178
1994	45	103	0	148

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	24	77	0	101
1996	26	90	0	116
1997	29	55	0	84
1998	25	46	0	71
1999	21	37	0	58
2000	23	65	0	88

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région de l'Outaouais




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	3	5	0	8
1991	5	10	0	15
1992	3	11	0	14
1993	2	4	0	6
1994	3	6	0	9

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	4	10	0	14
1996	1	4	0	5
1997	2	2	0	4
1998	1	7	0	8
1999	2	4	0	6
2000	1	3	0	4

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région de l'Abitibi/Témiscamingue




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	7	5	0	12
1991	7	6	0	13
1992	0	3	0	3
1993	3	3	0	6
1994	0	1	0	1

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	3	0	3
1996	0	0	0	0
1997	0	3	0	3
1998	1	2	0	3
1999	0	0	0	0
2000	0	2	0	2

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région de la Côte-Nord




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	0	4	0	4
1991	0	4	0	4
1992	2	1	0	3
1993	0	1	0	1
1994	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	1	0	1
1996	1	1	0	2
1997	0	0	0	0
1998	0	0	0	0
1999	0	1	0	1
2000	0	1	0	1

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région Nord-du-Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	0	0	0	0
1991	0	0	0	0
1992	0	1	0	1
1993	0	1	0	1
1994	1	0	0	1

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	0	0	0
1996	0	0	0	0
1997	0	0	0	0
1998	1	0	0	1
1999	0	0	0	0
2000	1	1	0	2


Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région de la Gaspésie/Iles de la Madeleine



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	0	0	0	0
1991	0	1	0	1
1992	0	1	0	1
1993	0	1	0	1
1994	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	0	0	0
1996	0	0	0	0
1997	0	0	0	0
1998	0	0	0	0
1999	0	0	0	0
2000	0	1	0	1

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région Chaudière/Appalaches




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	7	12	0	19
1991	7	8	0	15
1992	8	12	0	20
1993	3	5	0	8
1994	6	2	0	8

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	4	6	0	10
1996	2	6	0	8
1997	3	3	0	6
1998	1	4	0	5
1999	0	2	0	2
2000	1	0	0	1

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région de Laval




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	12	16	0	28
1991	14	10	0	24
1992	7	13	0	20
1993	10	13	0	23
1994	6	16	0	22

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	3	11	0	14
1996	7	8	0	15
1997	2	6	0	8
1998	1	4	0	5
1999	1	5	0	6
2000	1	2	0	3

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région de Lanaudière




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	1	7	0	8
1991	1	8	0	9
1992	5	6	0	11
1993	6	9	0	15
1994	5	4	0	9

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	1	5	0	6
1996	1	6	0	7
1997	1	8	0	9
1998	4	5	0	9
1999	3	5	0	8
2000	2	2	0	4

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région des Laurentides




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	7	13	0	20
1991	5	24	0	29
1992	10	13	0	23
1993	5	11	0	16
1994	10	24	0	34

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	5	12	0	17
1996	5	6	0	11
1997	2	5	0	7
1998	5	5	0	10
1999	1	2	0	3
2000	2	3	0	5

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région de la Montérégie




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	23	43	0	66
1991	25	44	0	69
1992	16	40	0	56
1993	24	45	0	69
1994	21	28	0	49

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	5	18	0	23
1996	8	36	0	44
1997	10	34	0	44
1998	7	20	0	27
1999	13	28	0	41
2000	5	27	0	32

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région Nunavik




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	0	0	0	0
1991	0	0	0	0
1992	1	0	0	1
1993	0	0	0	0
1994	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	0	0	0
1996	1	0	0	1
1997	0	0	0	0
1998	0	0	0	0
1999	0	0	0	0
2000	0	1	0	1

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-2000)
Région Terres Cries/Baie-James



Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	0	0	0	0
1991	0	0	0	0
1992	0	0	0	0
1993	0	0	0	0
1994	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	0	0	0
1996	0	0	0	0
1997	0	0	0	0
1998	0	1	0	1
1999	0	0	0	0
2000	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996	1	9	0	10
	1997	1	1	0	2
	1998	0	3	0	3
	1999	1	1	0	2
	2000	0	3	0	3
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	2	4	0	6
	1997	0	4	0	4
	1998	0	1	0	1
	1999	0	3	0	3
	2000	1	1	0	2
Québec	1996	13	22	0	35
	1997	14	28	0	42
	1998	5	12	0	17
	1999	4	13	0	17
	2000	5	12	0	17
Mauricie/ Centre du Québec	1996	6	7	0	13
	1997	4	6	0	10
	1998	5	6	0	11
	1999	1	8	0	9
	2000	3	3	0	6
Estrie	1996	2	4	0	6
	1997	1	2	0	3
	1998	2	3	0	5
	1999	5	4	0	9
	2000	1	9	0	10
Montréal centre	1996	26	90	0	116
	1997	29	55	0	84
	1998	25	46	0	71
	1999	21	37	0	58
	2000	23	65	0	88
Outaouais	1996	1	4	0	5
	1997	2	2	0	4
	1998	1	7	0	8
	1999	2	4	0	6
	2000	1	3	0	4
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0	0	0	0
	1997	0	3	0	3
	1998	1	2	0	3
	1999	0	0	0	0
	2000	0	2	0	2
Côte-Nord	1996	1	1	0	2
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	1	0	1
	2000	0	1	0	1
Nord-du- Québec	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	1	0	0	1
	1999	0	0	0	0
	2000	1	1	0	2

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la Madeleine	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	1	0	1
Chaudière/ Appalaches	1996	2	6	0	8
	1997	3	3	0	6
	1998	1	4	0	5
	1999	0	2	0	2
	2000	1	0	0	1
Laval	1996	7	8	0	15
	1997	2	6	0	8
	1998	1	4	0	5
	1999	1	5	0	6
	2000	1	2	0	3
Lanaudière	1996	1	6	0	7
	1997	1	8	0	9
	1998	4	5	0	9
	1999	3	5	0	8
	2000	2	2	0	4
Laurentides	1996	5	6	0	11
	1997	2	5	0	7
	1998	5	5	0	10
	1999	1	2	0	3
	2000	2	3	0	5
Montérégie	1996	8	36	0	44
	1997	10	34	0	44
	1998	7	20	0	27
	1999	13	28	0	41
	2000	5	27	0	32
Nunavik	1996	1	0	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	1	0	1
Terres Cries/ Baie-James	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	1	0	1
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Province de Québec	1996	76	203	0	279
	1997	69	157	0	226
	1998	58	119	0	177
	1999	52	113	0	165
	2000	46	136	0	182

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996	1,0	8,9	0,0	4,9
	1997	1,0	1,0	0,0	1,0
	1998	0,0	3,0	0,0	1,5
	1999	1,0	1,0	0,0	1,0
	2000	0,0	3,1	0,0	1,5
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	1,4	2,8	0,0	2,1
	1997	0,0	2,8	0,0	1,4
	1998	0,0	0,7	0,0	0,3
	1999	0,0	2,1	0,0	1,0
	2000	0,7	0,7	0,0	0,7
Québec	1996	3,9	7,0	0,0	5,4
	1997	4,2	8,9	0,0	6,5
	1998	1,5	3,8	0,0	2,6
	1999	1,2	4,1	0,0	2,6
	2000	1,5	3,8	0,0	2,6
Mauricie/ Centre du Québec	1996	2,4	2,9	0,0	2,7
	1997	1,6	2,5	0,0	2,0
	1998	2,0	2,5	0,0	2,2
	1999	0,4	3,3	0,0	1,8
	2000	1,2	1,2	0,0	1,2
Estrie	1996	1,4	2,9	0,0	2,1
	1997	0,7	1,4	0,0	1,1
	1998	1,4	2,1	0,0	1,8
	1999	3,4	2,8	0,0	3,1
	2000	0,7	6,4	0,0	3,5
Montréal centre	1996	2,7	10,1	0,0	6,3
	1997	3,0	6,2	0,0	4,5
	1998	2,6	5,1	0,0	3,8
	1999	2,2	4,1	0,0	3,1
	2000	2,4	7,2	0,0	4,7
Outaouais	1996	0,6	2,5	0,0	1,6
	1997	1,2	1,2	0,0	1,2
	1998	0,6	4,3	0,0	2,4
	1999	1,2	2,4	0,0	1,8
	2000	0,6	1,8	0,0	1,2
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	3,7	0,0	1,9
	1998	1,3	2,4	0,0	1,9
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	2,4	0,0	1,2
Côte-Nord	1996	2,0	1,9	0,0	1,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	1,9	0,0	1,0
	2000	0,0	1,9	0,0	1,0
Nord-du- Québec	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	10,5	0,0	0,0	5,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	10,6	9,7	0,0	10,1

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la madeleine	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	2,0	0,0	1,0
Chaudière/ Appalaches	1996	1,0	3,1	0,0	2,1
	1997	1,6	1,5	0,0	1,6
	1998	0,5	2,1	0,0	1,3
	1999	0,0	1,0	0,0	0,5
	2000	0,5	0,0	0,0	0,3
Laval	1996	4,0	4,7	0,0	4,3
	1997	1,1	3,5	0,0	2,3
	1998	0,6	2,3	0,0	1,4
	1999	0,5	2,8	0,0	1,7
	2000	0,5	1,1	0,0	0,8
Lanaudière	1996	0,5	3,1	0,0	1,8
	1997	0,5	4,0	0,0	2,3
	1998	2,0	2,4	0,0	2,2
	1999	1,5	2,4	0,0	1,9
	2000	1,0	0,9	0,0	1,0
Laurentides	1996	2,2	2,7	0,0	2,5
	1997	0,9	2,2	0,0	1,5
	1998	2,1	2,1	0,0	2,1
	1999	0,4	0,8	0,0	0,6
	2000	0,8	1,2	0,0	1,0
Montérégie	1996	1,2	5,4	0,0	3,3
	1997	1,5	5,0	0,0	3,2
	1998	1,0	2,9	0,0	2,0
	1999	1,8	4,0	0,0	2,9
	2000	0,7	3,8	0,0	2,3
Nunavik	1996	21,2	0,0	0,0	10,6
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	19,4	0,0	9,5
Terres Cries/ Baie-James	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	23,0	0,0	12,1
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1996	2,0	5,6	0,0	3,8
	1997	1,8	4,3	0,0	3,0
	1998	1,5	3,2	0,0	2,4
	1999	1,4	3,0	0,0	2,2
	2000	1,2	3,6	0,0	2,4

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0	0	1	3	1	1	0	3	1	0	0	10
	1997	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
	1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	2000	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	6
	1997	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
	2000	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Québec	1996	0	0	4	4	9	5	1	8	2	2	0	35
	1997	0	0	2	7	9	6	6	8	1	3	0	42
	1998	0	0	0	2	3	1	1	8	1	1	0	17
	1999	0	1	0	2	2	1	1	8	2	0	0	17
	2000	0	1	1	2	0	1	2	5	4	1	0	17
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0	0	1	0	2	2	2	3	2	1	0	13
	1997	0	0	0	0	1	0	3	3	1	2	0	10
	1998	1	0	1	0	0	1	4	4	0	0	0	11
	1999	1	0	1	1	0	0	0	4	1	1	0	9
	2000	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	0	6
Estrie	1996	1	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	6
	1997	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	1998	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	5
	1999	0	0	1	1	1	1	3	1	1	0	0	9
	2000	0	0	0	0	3	1	2	2	2	0	0	10
Montréal centre	1996	0	1	3	16	16	20	20	19	14	7	0	116
	1997	0	0	3	13	12	16	11	13	9	7	0	84
	1998	0	1	4	13	8	11	4	16	6	8	0	71
	1999	3	1	2	5	2	9	6	19	7	4	0	58
	2000	1	0	5	16	8	13	14	22	5	4	0	88
Outaouais	1996	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	5
	1997	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	4
	1998	0	0	1	0	0	0	1	3	3	0	0	8
	1999	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	6
	2000	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	4
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	1998	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Côte-Nord	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Nord-du Québec	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Chaudière/ Appalaches	1996	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	0	8
	1997	0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	6
	1998	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	5
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Laval	1996	0	0	3	3	2	2	1	2	1	1	0	15
	1997	0	0	0	2	2	1	0	2	1	0	0	8
	1998	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	5
	1999	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	6
	2000	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Lanaudière	1996	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	0	7
	1997	0	0	1	2	1	0	0	3	1	1	0	9
	1998	0	0	0	0	1	2	0	3	3	0	0	9
	1999	1	0	1	0	0	0	2	2	1	1	0	8
	2000	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4
Laurentides	1996	0	0	0	0	0	4	1	2	4	0	0	11
	1997	0	0	0	2	0	0	1	2	1	1	0	7
	1998	0	0	1	1	0	2	2	2	1	1	0	10
	1999	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3
	2000	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	5
Montréal	1996	3	2	3	1	6	3	10	5	5	6	0	44
	1997	3	0	3	2	6	4	6	10	4	6	0	44
	1998	1	0	2	2	5	3	4	1	4	5	0	27
	1999	1	0	5	4	6	6	2	8	7	2	0	41
	2000	0	0	0	4	1	5	2	11	5	4	0	32
Nunavik	1996	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Terres Cries/ Baie James	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1996	4	3	15	32	37	40	40	50	37	21	0	279
	1997	3	0	10	30	36	28	30	44	23	22	0	226
	1998	3	1	11	23	19	22	23	38	21	16	0	177
	1999	6	2	10	14	16	19	18	47	23	10	0	165
	2000	4	2	8	24	16	22	23	52	20	11	0	182

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0,0	0,0	6,3	24,8	9,3	6,8	0,0	8,9	4,5	0,0	0,0	4,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	4,1	2,5	0,0	1,5
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,9	0,0	0,0	1,0
	2000	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	3,7	0,0	0,0	1,5
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	3,6	2,2	3,2	4,7	0,0	2,1
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	2,1	3,1	2,3	0,0	1,4
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,9	2,2	0,0	1,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Québec	1996	0,0	0,0	9,3	9,1	19,4	9,2	1,7	7,4	2,7	1,8	0,0	5,4
	1997	0,0	0,0	4,7	15,8	19,9	11,5	10,3	7,3	1,3	2,7	0,0	6,5
	1998	0,0	0,0	0,0	4,5	6,8	2,0	1,7	7,2	1,2	0,9	0,0	2,6
	1999	0,0	1,4	0,0	4,5	4,6	2,1	1,8	7,1	2,3	0,0	0,0	2,6
	2000	0,0	1,4	2,5	4,4	0,0	2,2	3,6	4,4	4,4	0,8	0,0	2,6
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0,0	0,0	2,8	0,0	6,9	5,3	4,6	3,9	3,6	1,1	0,0	2,7
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	7,0	3,8	1,7	2,2	0,0	2,0
	1998	3,8	0,0	2,8	0,0	0,0	2,9	9,5	5,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	1999	3,9	0,0	2,9	3,1	0,0	0,0	0,0	4,9	1,6	1,1	0,0	1,8
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	2,4	1,5	2,1	0,0	1,2
Estrie	1996	5,8	0,0	0,0	5,4	0,0	4,6	0,0	4,6	3,3	0,0	0,0	2,1
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	2,2	3,1	0,0	0,0	1,1
	1998	0,0	0,0	4,9	5,1	0,0	4,9	4,2	0,0	2,9	0,0	0,0	1,8
	1999	0,0	0,0	4,9	5,0	5,8	5,2	12,8	2,2	2,8	0,0	0,0	3,1
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	5,4	8,7	4,3	5,4	0,0	0,0	3,5
Montréal centre	1996	0,0	0,5	2,8	12,7	10,6	12,0	12,6	7,0	6,9	1,9	0,0	6,3
	1997	0,0	0,0	2,8	10,3	8,2	9,8	6,9	4,7	4,3	1,9	0,0	4,5
	1998	0,0	0,5	3,8	10,2	5,7	7,0	2,5	5,7	2,8	2,1	0,0	3,8
	1999	3,0	0,5	1,9	3,9	1,5	5,9	3,7	6,7	3,2	1,1	0,0	3,1
	2000	1,0	0,0	4,7	12,3	6,0	8,9	8,8	7,6	2,2	1,0	0,0	4,7
Outaouais	1996	0,0	0,0	0,0	4,7	4,2	0,0	3,2	3,9	0,0	0,0	0,0	1,6
	1997	0,0	0,0	0,0	4,6	4,2	0,0	3,2	0,0	0,0	2,3	0,0	1,2
	1998	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	3,2	5,5	8,3	0,0	0,0	2,4
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	3,6	3,1	3,6	0,0	0,0	0,0	1,8
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	1,7	2,5	0,0	0,0	1,2
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	9,0	9,3	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	1,9
	1998	0,0	0,0	0,0	8,8	9,4	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Côte-Nord	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	1,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	2000	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Nord-du Québec	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	60,8	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	1,0
Chaudière/ Appalaches	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	5,8	3,2	4,9	1,6	0,0	2,1
	1997	0,0	0,0	3,4	0,0	4,2	0,0	2,9	1,6	4,7	0,0	0,0	1,6
	1998	4,4	0,0	3,4	3,8	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,6	0,0	0,5
	2000	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Laval	1996	0,0	0,0	13,0	13,6	8,1	6,5	3,1	3,7	2,5	1,9	0,0	4,3
	1997	0,0	0,0	0,0	9,0	8,3	3,3	0,0	3,6	2,4	0,0	0,0	2,3
	1998	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	6,1	1,8	2,3	0,0	0,0	1,4
	1999	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	3,6	6,1	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Lanaudière	1996	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	2,7	2,5	1,6	4,9	2,0	0,0	1,8
	1997	0,0	0,0	3,7	8,7	4,0	0,0	0,0	4,6	2,3	1,9	0,0	2,3
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	5,9	0,0	4,4	6,4	0,0	0,0	2,2
	1999	3,8	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	4,9	2,9	2,0	1,8	0,0	1,9
	2000	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	1,4	1,9	0,0	0,0	1,0
Laurentides	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	2,2	2,8	8,4	0,0	0,0	2,5
	1997	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	2,2	2,7	2,0	1,6	0,0	1,5
	1998	0,0	0,0	3,3	3,6	0,0	5,0	4,3	2,6	1,9	1,5	0,0	2,1
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,6
	2000	3,2	0,0	0,0	0,0	3,3	2,7	2,1	1,2	0,0	0,0	0,0	1,0
Montréal	1996	3,3	1,1	3,1	1,2	6,4	2,5	8,0	2,3	3,4	3,2	0,0	3,3
	1997	3,4	0,0	3,1	2,3	6,5	3,5	4,8	4,5	2,5	3,1	0,0	3,2
	1998	1,1	0,0	2,1	2,2	5,4	2,7	3,2	0,4	2,4	2,5	0,0	2,0
	1999	1,2	0,0	5,3	4,3	6,5	5,6	1,6	3,5	4,0	1,0	0,0	2,9
	2000	0,0	0,0	0,0	4,2	1,1	4,8	1,6	4,7	2,7	1,9	0,0	2,3
Nunavik	1996	0,0	0,0	0,0	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,4	0,0	0,0	0,0	9,5
Terres Cries/ Baie James	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1996	0,9	0,3	3,0	6,6	7,1	6,2	5,9	4,3	4,6	1,7	0,0	3,8
	1997	0,7	0,0	2,0	6,1	7,1	4,5	4,4	3,7	2,7	1,8	0,0	3,0
	1998	0,7	0,1	2,2	4,6	3,8	3,7	3,4	3,1	2,4	1,3	0,0	2,4
	1999	1,4	0,2	2,0	2,8	3,2	3,3	2,7	3,8	2,5	0,8	0,0	2,2
	2000	0,9	0,2	1,6	4,7	3,2	4,0	3,5	4,1	2,1	0,8	0,0	2,4

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Québec	1996	0	0	3	2	4	1	0	1	2	0	0	13
	1997	0	0	2	4	3	4	1	0	0	0	0	14
	1998	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	5
	1999	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	4
	2000	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	5
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0	0	1	0	1	0	1	2	1	0	0	6
	1997	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	4
	1998	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	5
	1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	2000	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3
Estrie	1996	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1998	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	1999	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	5
	2000	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Montréal centre	1996	0	0	0	6	2	1	7	5	2	3	0	26
	1997	0	0	3	5	4	5	3	3	2	4	0	29
	1998	0	0	3	8	2	3	0	5	2	2	0	25
	1999	1	0	2	3	1	4	1	7	1	1	0	21
	2000	1	0	2	8	1	2	4	3	1	1	0	23
Outaouais	1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Côte-Nord	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord-du Québec	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/ Appalaches	1996	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	1997	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Laval	1996	0	0	2	1	1	1	0	1	0	1	0	7
	1997	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1999	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Lanaudière	1996	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	4
	1999	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
	2000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Laurentides	1996	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	5
	1997	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
	1998	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	5
	1999	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	2000	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
Montérégie	1996	1	1	2	0	1	0	1	0	0	2	0	8
	1997	3	0	1	0	2	0	1	3	0	0	0	10
	1998	1	0	2	1	1	0	1	0	0	1	0	7
	1999	1	0	3	0	1	2	1	1	3	1	0	13
	2000	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	5
Nunavik	1996	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/ Baie James	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1996	2	1	8	10	9	7	12	13	8	6	0	76
	1997	3	0	7	13	12	9	8	9	4	4	0	69
	1998	2	0	7	11	5	7	5	13	3	5	0	58
	1999	3	0	8	5	4	7	4	13	6	2	0	52
	2000	3	0	4	11	3	6	5	10	2	2	0	46

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	1,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	1,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	6,4	0,0	0,0	1,4
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,7
Québec	1996	0,0	0,0	14,2	9,2	17,6	3,8	0,0	1,8	5,2	0,0	0,0	3,9
	1997	0,0	0,0	9,5	18,4	13,5	15,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	3,5	0,0	1,5	0,0	1,5
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	3,5	2,2	0,0	0,0	1,2
	2000	0,0	0,0	5,2	4,5	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	1,5
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0,0	0,0	5,7	0,0	7,2	0,0	4,7	5,3	3,6	0,0	0,0	2,4
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	9,4	2,6	0,0	0,0	0,0	1,6
	1998	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	7,6	0,0	0,0	0,0	2,0
	1999	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	2,4	3,1	0,0	0,0	1,2
Estrie	1996	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,7
	1998	0,0	0,0	10,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	1999	0,0	0,0	10,0	10,3	0,0	0,0	8,5	4,4	5,6	0,0	0,0	3,4
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Montréal centre	1996	0,0	0,0	0,0	9,7	2,7	1,2	8,9	3,6	1,9	1,4	0,0	2,7
	1997	0,0	0,0	5,7	8,0	5,7	6,4	3,8	2,1	1,8	1,8	0,0	3,0
	1998	0,0	0,0	5,7	12,8	2,9	4,0	0,0	3,5	1,8	0,9	0,0	2,6
	1999	2,0	0,0	3,8	4,7	1,5	5,5	1,3	4,8	0,9	0,4	0,0	2,2
	2000	2,1	0,0	3,8	12,5	1,5	2,8	5,1	2,0	0,8	0,4	0,0	2,4
Outaouais	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	1997	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	1,2
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,6
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	2,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du Québec	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	123,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/ Appalaches	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	5,0	0,0	0,0	1,0
	1997	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	1,6
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Laval	1996	0,0	0,0	17,8	9,4	8,3	6,7	0,0	3,7	0,0	3,3	0,0	4,0
	1997	0,0	0,0	0,0	9,3	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,6
	1999	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,5
Lanaudière	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1997	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	3,0	4,4	0,0	0,0	2,0
	1999	7,9	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	2000	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Laurentides	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Montérégie	1996	2,3	1,1	4,3	0,0	2,2	0,0	1,6	0,0	0,0	1,9	0,0	1,2
	1997	7,0	0,0	2,1	0,0	4,4	0,0	1,6	2,7	0,0	0,0	0,0	1,5
	1998	2,4	0,0	4,3	2,3	2,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,9	0,0	1,0
	1999	2,4	0,0	6,5	0,0	2,2	3,8	1,6	0,9	3,4	0,9	0,0	1,8
	2000	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,7
Nunavik	1996	0,0	0,0	0,0	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/ Baie James	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1996	0,9	0,2	3,3	4,2	3,5	2,2	3,6	2,2	2,0	0,9	0,0	2,0
	1997	1,4	0,0	2,8	5,4	4,8	3,0	2,4	1,5	0,9	0,6	0,0	1,8
	1998	0,9	0,0	2,9	4,5	2,0	2,4	1,5	2,1	0,7	0,7	0,0	1,5
	1999	1,4	0,0	3,3	2,0	1,6	2,5	1,2	2,1	1,3	0,3	0,0	1,4
	2000	1,4	0,0	1,7	4,4	1,2	2,2	1,5	1,6	0,4	0,3	0,0	1,2

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0	0	1	3	1	1	0	2	1	0	0	9
	1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	2000	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	4
	1997	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
	2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Québec	1996	0	0	1	2	5	4	1	7	0	2	0	22
	1997	0	0	0	3	6	2	5	8	1	3	0	28
	1998	0	0	0	2	1	1	1	6	1	0	0	12
	1999	0	1	0	2	1	1	1	6	1	0	0	13
	2000	0	1	0	1	0	1	2	2	4	1	0	12
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	0	7
	1997	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	6
	1998	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	6
	1999	1	0	0	1	0	0	0	4	1	1	0	8
	2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3
Estrie	1996	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	4
	1997	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
	1999	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	4
	2000	0	0	0	0	2	1	2	2	2	0	0	9
Montréal centre	1996	0	1	3	10	14	19	13	14	12	4	0	90
	1997	0	0	0	8	8	11	8	10	7	3	0	55
	1998	0	1	1	5	6	8	4	11	4	6	0	46
	1999	2	1	0	2	1	5	5	12	6	3	0	37
	2000	0	0	3	8	7	11	10	19	4	3	0	65
Outaouais	1996	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4
	1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
	1998	0	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	7
	1999	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	4
	2000	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	1998	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Côte-Nord	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Nord-du Québec	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Chaudière/ Appalaches	1996	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	6
	1997	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
	1998	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laval	1996	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0	8
	1997	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	6
	1998	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	4
	1999	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	5
	2000	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Lanaudière	1996	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	6
	1997	0	0	1	1	1	0	0	3	1	1	0	8
	1998	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	5
	1999	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	5
	2000	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Laurentides	1996	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	6
	1997	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	5
	1998	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	5
	1999	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	2000	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3
Montérégie	1996	2	1	1	1	5	3	9	5	5	4	0	36
	1997	0	0	2	2	4	4	5	7	4	6	0	34
	1998	0	0	0	1	4	3	3	1	4	4	0	20
	1999	0	0	2	4	5	4	1	7	4	1	0	28
	2000	0	0	0	2	1	3	2	11	5	3	0	27
Nunavik	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Terres Cries/ Baie James	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1996	2	2	7	22	28	33	28	37	29	15	0	203
	1997	0	0	3	17	24	19	22	35	19	18	0	157
	1998	1	1	4	12	14	15	18	25	18	11	0	119
	1999	3	2	2	9	12	12	14	34	17	8	0	113
	2000	1	2	4	13	13	16	18	42	18	9	0	136


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0,0	0,0	12,3	48,0	18,3	13,6	0,0	11,7	8,8	0,0	0,0	8,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	8,0	5,9	0,0	3,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	1,0
	2000	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	7,2	0,0	0,0	3,1
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	10,6	0,0	2,8
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	4,1	6,2	5,2	0,0	2,8
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	5,7	5,1	0,0	2,1
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Québec	1996	0,0	0,0	4,6	8,9	21,1	14,4	3,4	13,2	0,0	4,5	0,0	7,0
	1997	0,0	0,0	0,0	13,4	26,0	7,5	17,0	14,9	2,6	6,6	0,0	8,9
	1998	0,0	0,0	0,0	8,9	4,4	3,9	3,4	11,0	2,5	0,0	0,0	3,8
	1999	0,0	2,7	0,0	8,8	4,5	4,1	3,5	10,8	2,4	0,0	0,0	4,1
	2000	0,0	2,8	0,0	4,4	0,0	4,3	7,0	3,6	9,1	2,1	0,0	3,8
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	10,3	4,6	2,5	3,7	2,6	0,0	2,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	5,0	3,5	5,2	0,0	2,5
	1998	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,7	14,2	2,4	0,0	0,0	0,0	2,5
	1999	7,6	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	9,6	3,2	2,5	0,0	3,3
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	4,9	0,0	1,2
Estrie	1996	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	9,0	6,6	0,0	0,0	2,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	6,2	0,0	0,0	1,4
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	8,4	0,0	5,9	0,0	0,0	2,1
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	10,2	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	10,6	17,2	8,5	10,7	0,0	0,0	6,4
Montréal centre	1996	0,0	1,0	5,6	15,7	18,0	21,9	16,3	10,6	12,6	2,7	0,0	10,1
	1997	0,0	0,0	0,0	12,6	10,7	13,0	9,9	7,5	7,1	2,0	0,0	6,2
	1998	0,0	1,0	1,9	7,8	8,3	9,8	4,9	8,1	3,9	4,0	0,0	5,1
	1999	3,8	1,0	0,0	3,1	1,4	6,4	6,1	8,7	5,7	2,0	0,0	4,1
	2000	0,0	0,0	5,6	12,2	10,1	14,6	12,3	13,5	3,7	1,9	0,0	7,2
Outaouais	1996	0,0	0,0	0,0	9,2	8,4	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	2,5
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	1,2
	1998	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	16,2	0,0	0,0	4,3
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	6,3	3,5	0,0	0,0	0,0	2,4
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	1,8
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	17,5	18,3	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	3,7
	1998	0,0	0,0	0,0	17,2	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Côte-Nord	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	1,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	2000	0,0	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Nord-du Québec	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	2,0
Chaudière/ Appalaches	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	5,7	6,3	4,9	3,7	0,0	3,1
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	5,8	3,1	0,0	0,0	0,0	1,5
	1998	8,6	0,0	6,6	7,3	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	3,6	0,0	1,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laval	1996	0,0	0,0	8,4	17,5	7,9	6,3	6,2	3,8	5,2	0,0	0,0	4,7
	1997	0,0	0,0	0,0	8,7	8,1	6,5	0,0	7,3	5,0	0,0	0,0	3,5
	1998	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	12,1	0,0	4,8	0,0	0,0	2,3
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	6,9	12,0	3,4	0,0	0,0	0,0	2,8
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	1,1
Lanaudière	1996	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	5,0	3,1	9,4	4,3	0,0	3,1
	1997	0,0	0,0	7,0	8,4	8,1	0,0	0,0	9,0	4,4	4,1	0,0	4,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	5,8	8,4	0,0	0,0	2,4
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	5,6	4,0	3,9	0,0	2,4
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	3,8	0,0	0,0	0,9
Laurentides	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	2,7
	1997	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	4,3	2,6	3,9	3,5	0,0	2,2
	1998	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	5,0	4,3	2,5	3,6	0,0	0,0	2,1
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,8
	2000	6,3	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	1,2
Montréal	1996	4,3	1,1	2,0	2,2	10,5	5,0	14,3	4,6	6,7	4,9	0,0	5,4
	1997	0,0	0,0	4,1	4,4	8,5	6,9	7,8	6,3	5,0	7,1	0,0	5,0
	1998	0,0	0,0	0,0	2,2	8,5	5,3	4,7	0,9	4,8	4,6	0,0	2,9
	1999	0,0	0,0	4,1	8,4	10,6	7,3	1,5	6,0	4,6	1,1	0,0	4,0
	2000	0,0	0,0	0,0	4,1	2,1	5,6	3,1	9,3	5,5	3,2	0,0	3,8
Nunavik	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	19,4
Terres Cries/ Baie James	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	222,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1996	0,8	0,4	2,7	8,9	10,5	10,1	8,2	6,4	7,3	2,9	0,0	5,6
	1997	0,0	0,0	1,2	6,8	9,2	6,0	6,4	5,9	4,5	3,4	0,0	4,3
	1998	0,4	0,2	1,6	4,7	5,4	4,9	5,3	4,1	4,1	2,1	0,0	3,2
	1999	1,3	0,4	0,8	3,5	4,7	4,1	4,1	5,5	3,7	1,5	0,0	3,0
	2000	0,5	0,4	1,6	4,9	5,1	5,7	5,3	6,7	3,8	1,6	0,0	3,6


**Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés d'hépatite B chez les femmes par
groupe d'âge, Québec (1997-2000)**



Nombre de cas déclarés

		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49
Province de Québec	1996	8	10	9	7	12	13
	1997	7	13	12	9	8	9
	1998	7	11	5	7	5	13
	1999	8	5	4	7	4	13
	2000	4	11	3	6	5	10


**Pourcentages annuels de variation du taux d'incidence de cas déclarés d'hépatite B chez les femmes par
groupe d'âge, Québec (1997-2000)**



Taux d'incidence par 100 000

		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49
Province de Québec	1996	3,3	4,2	3,5	2,2	3,6	2,2
	1997	2,8	5,4	4,8	3,0	2,4	1,5
	1998	2,9	4,5	2,0	2,4	1,5	2,1
	1999	3,3	2,0	1,6	2,5	1,2	2,1
	2000	1,7	4,4	1,2	2,2	1,5	1,6


Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés d'hépatite B chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1997-2000)



Nombre de cas déclarés

		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49
Province de Québec	1996	7	22	28	33	28	37
	1997	3	17	24	19	22	35
	1998	4	12	14	15	18	25
	1999	2	9	12	12	14	34
	2000	4	13	13	16	18	42


**Pourcentages annuels de variation du taux d'incidence de cas déclarés d'hépatite B chez les hommes:
par groupe d'âge, Québec (1997-2000)**




Taux d'incidence par 100 000

		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49
Province de Québec	1996	2,7	8,9	10,5	10,1	8,2	6,4
	1997	1,2	6,8	9,2	6,0	6,4	5,9
	1998	1,6	4,7	5,4	4,9	5,3	4,1
	1999	0,8	3,5	4,7	4,1	4,1	5,5
	2000	1,6	4,9	5,1	5,7	5,3	6,7


Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë par groupe d'âge,
Québec (1996-2000)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë,
Québec (1990-2000)





Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1996-2000)



Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes, Québec (1990-2000)





Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996	2	4	0	6
	1997	4	7	0	11
	1998	3	4	0	7
	1999	3	6	0	9
	2000	3	9	0	12
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	4	3	0	7
	1997	8	9	0	17
	1998	10	13	0	23
	1999	1	2	0	3
	2000	3	3	0	6
Québec	1996	21	36	0	57
	1997	24	52	0	76
	1998	25	49	0	74
	1999	26	51	0	77
	2000	17	34	0	51
Mauricie/ Centre du Québec	1996	13	25	0	38
	1997	11	19	0	30
	1998	28	14	0	42
	1999	9	9	0	18
	2000	12	14	1	27
Estrie	1996	6	9	0	15
	1997	8	13	0	21
	1998	7	15	0	22
	1999	8	11	0	19
	2000	9	13	0	22
Montréal centre	1996	297	398	2	697
	1997	262	351	1	614
	1998	236	302	0	538
	1999	264	331	0	595
	2000	239	307	0	546
Outaouais	1996	7	27	1	35
	1997	13	17	0	30
	1998	7	14	0	21
	1999	16	17	0	33
	2000	6	19	0	25
Abitibi/ Témiscamingue	1996	2	3	0	5
	1997	4	4	0	8
	1998	1	5	0	6
	1999	2	0	0	2
	2000	2	5	0	7
Côte-Nord	1996	1	4	0	5
	1997	3	2	0	5
	1998	2	3	0	5
	1999	2	1	0	3
	2000	0	3	0	3
Nord-du- Québec	1996	0	0	0	0
	1997	2	0	0	2
	1998	0	2	0	2
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la Madeleine	1996	0	2	0	2
	1997	1	3	0	4
	1998	3	3	0	6
	1999	2	2	0	4
	2000	1	4	0	5
Chaudière/ Appalaches	1996	5	13	0	18
	1997	7	16	0	23
	1998	0	7	0	7
	1999	3	10	0	13
	2000	2	5	0	7
Laval	1996	21	20	0	41
	1997	24	31	0	55
	1998	16	23	0	39
	1999	17	22	0	39
	2000	22	43	0	65
Lanaudière	1996	7	15	0	22
	1997	7	23	0	30
	1998	5	13	0	18
	1999	2	13	0	15
	2000	5	19	0	24
Laurentides	1996	21	27	0	48
	1997	9	23	0	32
	1998	9	17	0	26
	1999	5	15	0	20
	2000	8	24	0	32
Montérégie	1996	48	79	0	127
	1997	50	71	0	121
	1998	50	71	0	121
	1999	49	78	0	127
	2000	45	62	0	107
Nunavik	1996	1	0	0	1
	1997	1	0	0	1
	1998	3	4	0	7
	1999	0	0	0	0
	2000	2	1	0	3
Terres Cries/ Baie-James	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Province de Québec	1996	456	665	3	1124
	1997	438	641	1	1080
	1998	405	559	0	964
	1999	409	568	0	977
	2000	376	565	1	942

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	1	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	6
	1997	1	0	0	1	0	0	0	3	2	4	0	11
	1998	2	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	7
	1999	1	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	9
	2000	0	0	1	0	0	0	1	4	4	2	0	12
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	2	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	7
	1997	2	0	0	0	2	1	0	3	5	4	0	17
	1998	2	0	0	1	1	0	4	10	2	3	0	23
	1999	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
	2000	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	0	6
Québec	1996	2	0	2	3	4	7	7	16	11	5	0	57
	1997	2	1	1	4	6	11	7	23	15	6	0	76
	1998	3	1	2	9	8	7	10	18	11	5	0	74
	1999	0	1	5	10	6	10	10	21	10	4	0	77
	2000	1	0	2	5	3	4	7	10	13	6	0	51
Mauricie/ Centre du Québec	1996	1	0	2	3	2	4	4	10	7	5	0	38
	1997	2	0	0	2	3	6	3	10	3	1	0	30
	1998	2	1	0	1	3	2	6	12	8	7	0	42
	1999	1	0	0	1	1	3	2	6	1	3	0	18
	2000	1	1	0	2	2	3	1	9	5	3	0	27
Estrie	1996	0	1	0	1	1	1	2	5	3	1	0	15
	1997	2	0	0	2	2	4	6	3	2	0	0	21
	1998	0	1	2	2	3	1	0	3	8	2	0	22
	1999	0	0	0	3	2	0	2	8	2	2	0	19
	2000	0	1	1	2	2	5	1	3	5	2	0	22
Montréal centre	1996	7	12	33	53	110	109	103	163	65	42	0	697
	1997	6	14	20	66	94	92	81	121	70	49	1	614
	1998	5	14	26	56	85	79	62	109	57	44	1	538
	1999	6	17	24	38	89	101	80	120	64	56	0	595
	2000	3	4	26	56	83	80	80	96	64	54	0	546
Outaouais	1996	1	0	1	3	7	5	4	8	4	1	1	35
	1997	0	2	1	0	1	4	5	7	3	7	0	30
	1998	1	0	0	0	2	5	3	5	3	1	1	21
	1999	2	4	0	0	6	0	6	7	6	2	0	33
	2000	0	0	0	1	2	5	6	4	3	4	0	25
Abitibi/ Témiscamingue	1996	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5
	1997	1	0	0	0	1	1	0	3	2	0	0	8
	1998	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	6
	1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	2000	0	0	0	0	1	0	1	2	3	0	0	7
Côte-Nord	1996	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	5
	1997	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	5
	1998	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	5
	1999	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	2000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
Nord-du Québec	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	4
	1998	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	6
	1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4
	2000	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	5
Chaudière/ Appalaches	1996	0	0	1	0	2	1	2	6	3	3	0	18
	1997	1	0	0	4	4	1	2	6	2	3	0	23
	1998	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	7
	1999	0	1	2	0	0	0	2	2	5	1	0	13
	2000	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	7
Laval	1996	0	1	1	2	4	8	6	13	3	3	0	41
	1997	2	2	2	1	2	3	7	13	9	14	0	55
	1998	1	0	1	4	4	3	3	13	7	3	0	39
	1999	2	0	2	1	5	6	6	8	6	3	0	39
	2000	0	4	2	6	4	8	6	18	10	7	0	65
Lanaudière	1996	0	1	1	1	1	4	2	8	3	1	0	22
	1997	0	1	0	0	3	3	4	12	6	1	0	30
	1998	0	0	0	0	0	1	5	4	7	1	0	18
	1999	0	1	0	0	0	0	1	3	8	2	0	15
	2000	1	0	0	1	0	2	2	6	10	2	0	24
Laurentides	1996	3	2	1	0	4	6	9	14	4	5	0	48
	1997	0	0	0	4	6	0	3	10	7	2	0	32
	1998	0	1	0	1	2	5	4	5	5	3	0	26
	1999	0	0	0	1	0	5	3	7	3	1	0	20
	2000	1	0	0	2	2	6	2	11	5	3	0	32
Montérégie	1996	4	3	4	4	7	10	15	46	26	8	0	127
	1997	2	3	4	9	7	8	10	51	18	8	1	121
	1998	6	4	6	11	11	8	12	34	17	12	0	121
	1999	2	2	7	8	10	13	11	37	21	16	0	127
	2000	1	0	1	11	11	13	7	27	26	10	0	107
Nunavik	1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	1998	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	0	7
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
Terres Cries/ Baie James	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1996	24	20	46	71	145	159	156	293	134	75	1	1124
	1997	23	23	28	94	132	135	128	268	146	101	2	1080
	1998	22	22	38	86	119	116	112	227	135	85	2	964
	1999	14	26	40	62	119	139	125	225	134	93	0	977
	2000	9	10	33	88	110	130	114	195	154	99	0	942

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	1997	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4
	1998	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	1999	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3
	2000	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4
	1997	1	0	0	0	2	0	0	1	3	1	0	8
	1998	1	0	0	1	0	0	1	3	2	2	0	10
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	2000	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3
Québec	1996	2	0	1	2	3	0	3	3	5	2	0	21
	1997	1	1	1	1	3	4	3	4	4	2	0	24
	1998	2	0	1	6	5	3	3	1	4	0	0	25
	1999	0	1	1	5	3	5	2	6	2	1	0	26
	2000	1	0	0	2	2	2	3	1	4	2	0	17
Mauricie/ Centre du Québec	1996	1	0	2	1	0	0	2	2	3	2	0	13
	1997	0	0	0	1	0	3	1	6	0	0	0	11
	1998	2	0	0	0	1	1	4	10	6	4	0	28
	1999	1	0	0	0	1	2	1	4	0	0	0	9
	2000	0	1	0	0	1	1	0	3	3	3	0	12
Estrie	1996	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	6
	1997	2	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	8
	1998	0	1	1	0	0	0	0	1	3	1	0	7
	1999	0	0	0	3	1	0	1	2	0	1	0	8
	2000	0	1	1	2	1	1	0	1	2	0	0	9
Montréal centre	1996	5	6	17	32	53	49	41	57	25	12	0	297
	1997	3	8	12	40	45	40	27	41	27	19	0	262
	1998	4	9	14	29	44	40	26	31	20	18	1	236
	1999	3	7	13	22	50	46	36	47	20	20	0	264
	2000	2	1	13	37	44	38	30	32	20	22	0	239
Outaouais	1996	1	0	1	0	3	1	0	0	1	0	0	7
	1997	0	0	1	0	1	2	4	3	1	1	0	13
	1998	1	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	7
	1999	2	4	0	0	5	0	2	2	1	0	0	16
	2000	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	6
Abitibi/ Témiscamingue	1996	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	1997	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	4
	1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	2000	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Côte-Nord	1996	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
	1998	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
	1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord-du Québec	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	2000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Chaudière/ Appalaches	1996	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	5
	1997	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	0	7
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Laval	1996	0	0	0	1	3	5	5	7	0	0	0	21
	1997	2	1	1	1	1	0	4	5	4	5	0	24
	1998	1	0	1	2	2	0	1	5	2	2	0	16
	1999	2	0	1	0	1	3	2	3	3	2	0	17
	2000	0	2	0	5	2	2	3	6	0	2	0	22
Lanaudière	1996	0	0	0	1	0	2	1	2	1	0	0	7
	1997	0	0	0	0	1	1	1	3	1	0	0	7
	1998	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	5
	1999	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	2000	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	5
Laurentides	1996	3	2	1	0	1	2	2	7	1	2	0	21
	1997	0	0	0	2	4	0	0	1	2	0	0	9
	1998	0	1	0	1	1	1	1	2	2	0	0	9
	1999	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	5
	2000	0	0	0	1	2	1	0	2	2	0	0	8
Montérégie	1996	1	2	1	2	5	7	5	14	7	4	0	48
	1997	2	2	2	5	4	5	4	18	5	3	0	50
	1998	4	3	2	5	3	3	2	17	6	5	0	50
	1999	0	0	3	3	6	3	6	14	8	6	0	49
	2000	1	0	0	6	6	8	2	12	7	3	0	45
Nunavik	1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	1998	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Terres Cries/ Baie James	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1996	18	10	24	39	70	69	59	96	46	25	0	456
	1997	15	12	17	52	64	61	45	87	50	35	0	438
	1998	17	14	19	45	57	51	41	76	50	34	1	405
	1999	9	12	18	33	67	60	51	84	43	32	0	409
	2000	5	5	15	55	60	54	41	62	43	36	0	376

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1996	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	4
	1997	0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	0	7
	1998	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	4
	1999	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	6
	2000	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	0	9
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
	1997	1	0	0	0	0	1	0	2	2	3	0	9
	1998	1	0	0	0	1	0	3	7	0	1	0	13
	1999	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	2000	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
Québec	1996	0	0	1	1	1	7	4	13	6	3	0	36
	1997	1	0	0	3	3	7	4	19	11	4	0	52
	1998	1	1	1	3	3	4	7	17	7	5	0	49
	1999	0	0	4	5	3	5	8	15	8	3	0	51
	2000	0	0	2	3	1	2	4	9	9	4	0	34
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0	0	0	2	2	4	2	8	4	3	0	25
	1997	2	0	0	1	3	3	2	4	3	1	0	19
	1998	0	1	0	1	2	1	2	2	2	3	0	14
	1999	0	0	0	1	0	1	1	2	1	3	0	9
	2000	1	0	0	1	1	2	1	6	2	0	0	14
Estrie	1996	0	1	0	1	1	0	2	2	1	1	0	9
	1997	0	0	0	2	2	1	5	1	2	0	0	13
	1998	0	0	1	2	3	1	0	2	5	1	0	15
	1999	0	0	0	0	1	0	1	6	2	1	0	11
	2000	0	0	0	0	1	4	1	2	3	2	0	13
Montréal centre	1996	1	6	16	21	57	59	62	106	40	30	0	398
	1997	3	6	8	26	49	51	54	80	43	30	1	351
	1998	1	5	12	27	41	39	36	78	37	26	0	302
	1999	3	10	11	16	39	55	44	73	44	36	0	331
	2000	1	3	13	19	39	42	50	64	44	32	0	307
Outaouais	1996	0	0	0	3	4	3	4	8	3	1	1	27
	1997	0	2	0	0	0	2	1	4	2	6	0	17
	1998	0	0	0	0	1	4	2	2	3	1	1	14
	1999	0	0	0	0	1	0	4	5	5	2	0	17
	2000	0	0	0	0	0	4	4	4	3	4	0	19
Abitibi/ Témiscamingue	1996	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
	1997	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4
	1998	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	5
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	5
Côte-Nord	1996	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	1997	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	1998	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
	1999	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	2000	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
Nord-du Québec	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1996-2000) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1996	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
	1998	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	2000	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	4
Chaudière/ Appalaches	1996	0	0	0	0	2	1	2	5	2	1	0	13
	1997	1	0	0	3	3	0	2	4	1	2	0	16
	1998	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	7
	1999	0	1	2	0	0	0	2	2	2	1	0	10
	2000	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	5
Laval	1996	0	1	1	1	1	3	1	6	3	3	0	20
	1997	0	1	1	0	1	3	3	8	5	9	0	31
	1998	0	0	0	2	2	3	2	8	5	1	0	23
	1999	0	0	1	1	4	3	4	5	3	1	0	22
	2000	0	2	2	1	2	6	3	12	10	5	0	43
Lanaudière	1996	0	1	1	0	1	2	1	6	2	1	0	15
	1997	0	1	0	0	2	2	3	9	5	1	0	23
	1998	0	0	0	0	0	1	3	4	5	0	0	13
	1999	0	1	0	0	0	0	0	2	8	2	0	13
	2000	0	0	0	1	0	2	2	5	7	2	0	19
Laurentides	1996	0	0	0	0	3	4	7	7	3	3	0	27
	1997	0	0	0	2	2	0	3	9	5	2	0	23
	1998	0	0	0	0	1	4	3	3	3	3	0	17
	1999	0	0	0	1	0	4	3	5	2	0	0	15
	2000	1	0	0	1	0	5	2	9	3	3	0	24
Montérégie	1996	3	1	3	2	2	3	10	32	19	4	0	79
	1997	0	1	2	4	3	3	6	33	13	5	1	71
	1998	2	1	4	6	8	5	10	17	11	7	0	71
	1999	2	2	4	5	4	10	5	23	13	10	0	78
	2000	0	0	1	5	5	5	5	15	19	7	0	62
Nunavik	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Terres Cries/ Baie James	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1996	5	10	22	32	75	88	97	197	88	50	1	665
	1997	8	11	11	42	68	73	83	181	96	66	2	641
	1998	5	8	19	41	62	65	71	151	85	51	1	559
	1999	5	14	22	29	52	79	74	141	91	61	0	568
	2000	4	5	18	32	50	76	73	133	111	63	0	565

Nombre de cas déclarés d'hépatite B de type non-précisé par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996	2	0	0	2
	1997	0	3	0	3
	1998	0	1	0	1
	1999	1	2	0	3
	2000	1	2	0	3
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	1	4	0	5
	1997	1	3	0	4
	1998	0	0	0	0
	1999	1	0	0	1
	2000	0	3	0	3
Québec	1996	1	2	0	3
	1997	2	1	0	3
	1998	0	1	0	1
	1999	0	1	0	1
	2000	5	9	0	14
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0	1	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	4	4	0	8
	1999	1	4	0	5
	2000	3	4	0	7
Estrie	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Montréal centre	1996	17	90	3	110
	1997	23	107	18	148
	1998	24	78	19	121
	1999	33	94	5	132
	2000	23	103	7	133
Outaouais	1996	2	8	0	10
	1997	1	5	0	6
	1998	0	11	0	11
	1999	4	4	0	8
	2000	0	0	0	0
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	1	0	1
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Côte-Nord	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Nord-du- Québec	1996	0	1	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la Madeleine	1996	1	0	0	1
	1997	0	6	0	6
	1998	2	2	0	4
	1999	1	0	0	1
	2000	1	2	0	3
Chaudière/ Appalaches	1996	2	3	0	5
	1997	1	3	0	4
	1998	2	1	0	3
	1999	1	3	0	4
	2000	3	5	0	8
Laval	1996	1	1	0	2
	1997	0	2	0	2
	1998	0	1	0	1
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Lanaudière	1996	1	1	0	2
	1997	3	0	0	3
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	1	0	1
Laurentides	1996	0	1	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Montérégie	1996	0	1	0	1
	1997	0	3	0	3
	1998	0	0	1	1
	1999	0	1	0	1
	2000	0	0	0	0
Nunavik	1996	0	1	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Terres Cries/ Baie-James	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	1	0	0	1
	2000	0	0	0	0
Province de Québec	1996	28	114	3	145
	1997	31	133	18	182
	1998	32	100	20	152
	1999	43	109	5	157
	2000	36	129	7	172

On trouvera dans cette section :

Syphilis

- Le nombre de cas déclarés de syphilis « anciennes » devenues symptomatiques selon le type de syphilis et le sexe (**SYPHtypeANC**)..... T145
- Le nombre de syphilis « récentes » et « anciennes » selon le type de syphilis et le sexe (**SYPHrécANC**)..... T146

Syphilis récente

- L'histogramme du taux d'incidence (TI) provincial des syphilis récentes (**syrprov**) T147
- L'histogramme du TI de Montréal-Centre des syphilis récentes (**syr06**)..... T148
- Deux tableaux donnant les nombres de cas déclarés et les TI correspondants par année, région et sexe (**NBrssSYr** et **TlrssSYr**) T149
- La distribution des nombres de cas déclarés et des TI correspondants par âge et sexe (**ÂGEsyphrTOT**)..... T151

Syphilis ancienne

- Un tableau donnant les nombres de cas déclarés par année, région et sexe (**NBrssSYa**)..... T152

Nombre de cas déclarés d'infection syphilitique "ancienne" devenue symptomatique par type de syphilis et le sexe, Québec, 1996-2000


Type de syphilis	Sexe inconnu	Hommes	Femmes	Total
Cardiovasculaire	0	2	1	3
Neurologique symptomatique	0	9	2	11
Symptomatique tardive	0	1	0	1
Total	0	12	3	15

Nombre de cas déclarés d'infection "récente"¹ et "ancienne" asymptomatique selon le type de syphilis et le sexe, Québec, 1996-2000

Type de syphilis	Nb de cas sexe non précisé	Femmes		Hommes		Nb total de cas
		Nb de cas	Âge médian	Nb de cas	Âge médian	
Primaire	0	2 ⁽²⁾		9 ⁽³⁾	46	11
Secondaire	0	2		11	37	13
Latente (1 an ou moins)	0	6	30,5	4	42,5	10
Latente (> 1 an)	0	73 ⁽⁴⁾	58,5	89 ⁽⁵⁾	45,5	162
Neuro. Asympto.	0	1		9	39	10
Total	0	84		122		206

1. Un cas congénital.
2. Un cas chez les 35 à 39 ans et un cas chez les 60 ans ou plus.
3. Trois cas chez les 15 à 39 ans, deux cas chez les 40-49 ans et quatre cas chez les 50 ans ou plus.
4. Dont 26 % des cas chez les 30 à 59 ans et 50 % des cas chez les 60 ans ou plus.
5. Dont 53 % des cas chez les 30 à 59 ans et 35 % des cas chez les 60 ans ou plus.

Taux d'incidence des cas déclarés de syphilis récente par sexe (1990-1999)
Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	20	40	1	61
1991	20	44	0	64
1992	14	26	0	40
1993	6	12	0	18
1994	4	15	0	19

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	5	6	0	11
1996	1	10	0	11
1997	4	5	0	9
1998	1	2	0	3
1999	2	3	0	5
2000	2	4	0	6

Taux d'incidence des cas déclarés de syphilis récente par sexe (1990-2000)
Région de Montréal centre



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	10	21	1	32
1991	18	27	0	45
1992	11	15	0	26
1993	3	5	0	8
1994	2	5	0	7

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	4	4	0	8
1996	0	6	0	6
1997	2	2	0	4
1998	0	1	0	1
1999	1	2	0	3
2000	2	4	0	6

Nombre de cas déclarés de syphilis récente par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Québec	1996	1	1	0	2
	1997	1	0	0	1
	1998	0	0	0	0
	1999	1	0	0	1
	2000	0	0	0	0
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0	0	0	0
	1997	0	1	0	1
	1998	1	1	0	2
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Estrie	1996	0	0	0	0
	1997	0	1	0	1
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Montréal centre	1996	0	6	0	6
	1997	2	2	0	4
	1998	0	1	0	1
	1999	1	2	0	3
	2000	2	4	0	6
Outaouais	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0	0	0	0
	1997	0	1	0	1
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Côte-Nord	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Nord-du- Québec	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la Madeleine	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Chaudière/ Appalaches	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Laval	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	1	0	1
	2000	0	0	0	0
Lanaudière	1996	0	2	0	2
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Laurentides	1996	0	0	0	0
	1997	1	0	0	1
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Montérégie	1996	0	1	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Nunavik	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Terres Cries/ Baie-James	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Province de Québec	1996	1	10	0	11
	1997	4	5	0	9
	1998	1	2	0	3
	1999	2	3	0	5
	2000	2	4	0	6

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Québec	1996	0,3	0,3	0,0	0,3
	1997	0,3	0,0	0,0	0,2
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,3	0,0	0,0	0,2
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Mauricie/ Centre du Québec	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,4	0,0	0,2
	1998	0,4	0,4	0,0	0,4
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Estrie	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,7	0,0	0,4
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Montréal centre	1996	0,0	0,7	0,0	0,3
	1997	0,2	0,2	0,0	0,2
	1998	0,0	0,1	0,0	0,1
	1999	0,1	0,2	0,0	0,2
	2000	0,2	0,4	0,0	0,3
Outaouais	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	1,2	0,0	0,6
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du- Québec	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la madeleine	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/ Appalaches	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Laval	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,6	0,0	0,3
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Lanaudière	1996	0,0	1,0	0,0	0,5
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Laurentides	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,4	0,0	0,0	0,2
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Montérégie	1996	0,8	0,1	0,0	0,1
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Nunavik	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/ Baie-James	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1996	0,0	0,3	0,0	0,1
	1997	0,1	0,1	0,0	0,1
	1998	0,0	0,1	0,0	0,0
	1999	0,1	0,1	0,0	0,1
	2000	0,1	0,1	0,0	0,1

Nombre de cas déclarés de syphilis récente par sexe, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1996-2000)

	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Femmes												
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	4
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
2000	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
Hommes												
1996	0	0	0	1	0	2	1	2	2	1	1	10
1997	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	5
1998	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3
2000	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4
Total												
1996	0	0	0	1	0	2	1	2	3	1	1	11
1997	0	0	0	0	1	1	1	0	4	1	1	9
1998	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
1999	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	5
2000	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	6

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par sexe, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1996-2000)

	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Femmes												
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1
Hommes												
1996	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,8	0,3	0,6	0,3	0,3	0,2	0,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,2	0,0	0,2	0,1
Total												
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Nombre de cas déclarés de syphilis ancienne par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1996-2000)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	1	2	0	3
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1996	1	0	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Québec	1996	1	1	0	2
	1997	0	2	0	2
	1998	1	2	0	3
	1999	0	1	0	1
	2000	0	0	0	0
Mauricie/ Centre du Québec	1996	2	2	0	4
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Estrie	1996	1	0	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	2	0	0	2
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Montréal centre	1996	15	18	0	33
	1997	10	11	0	21
	1998	10	14	0	24
	1999	4	9	0	13
	2000	4	10	0	14
Outaouais	1996	0	0	0	0
	1997	2	1	0	3
	1998	1	0	0	1
	1999	1	2	0	3
	2000	2	0	0	2
Abitibi/ Témiscamingue	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Côte-Nord	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Nord-du- Québec	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la Madeleine	1996	0	0	0	0
	1997	0	1	0	1
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Chaudière/ Appalaches	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Laval	1996	1	0	0	1
	1997	2	1	0	3
	1998	5	1	0	6
	1999	1	2	0	3
	2000	0	0	0	0
Lanaudière	1996	1	0	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Laurentides	1996	0	0	0	0
	1997	0	1	0	1
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	2	1	0	3
Montérégie	1996	2	3	0	5
	1997	2	1	0	3
	1998	0	0	0	0
	1999	0	1	0	1
	2000	0	2	0	2
Nunavik	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Terres Cries/ Baie-James	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
	2000	0	0	0	0
Province de Québec	1996	24	24	0	48
	1997	16	18	0	34
	1998	20	19	0	39
	1999	6	15	0	21
	2000	8	13	0	21

Annexe

**Surveillance périodique des MTS, période 11 :
du 31 décembre 2000 au 3 novembre 2001**

													1	2	3	4	5	6																				
													PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001																									
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2001 courant	2000 courant	1999 courant	Région	1999 cumulatif	2000 cumulatif	2001 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 01 vs 00 (%)					
				+	+								3	14	15	Bas St-Laurent 01	129	118	145					+	+	+	+	+	+	+								
									+				15	26	41	Saguenay/ Lac St-Jean 02	275	294	265			+	+															
		+	+	+		+	+		+	+	+	+	95	64	81	Québec 03	696	667	850	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			27,4					
		+	+					+	+	+	+	+	54	45	17	Mauricie/ Bois-Francis 04	320	445	516	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+								
		+											34	29	21	Estrie 05													+									
		+														Montréal- centre 06	DONNÉES CUMULATIVES À LA FIN DE LA PÉRIODE COURANTE On a ici les nombres cumulatifs de cas déclarés entre le début de l'année de déclaration et à la fin de la période 11 pour 2001, 2000 et 1999.										+											
															Outaouais 07	+				+											+							
															Abitibi/ Témiscamingue 08																							
															Côte-Nord 09																							
																Nord-du-Québec 10																						
																Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11				+	+									+								
													30	19	15	Chaudière/ Appalaches 12														+								
													31	29	32	Laval 13	255	321	339			+								+								
													33	32	32	Lanaudière 14	349	335	344	+																		
													31	51	42	Laurentides 15	353	454	522	+	+									+								
				+	+	+	+	+	+	+	+	+	87	110	112	Montréal 16	857	969	1110			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
		+	+			+	+	+		+			31	27	9	Nunavik 17	216	204	303			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		48,5					
													5	9	10	Terres Cries/Baie James 18	77	56	55																			
		+	+				+		+	+			775	748	716	Province de Québec	6771	7355	8404			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		14,3					

Un + ici indique un excès de cas déclarés pendant la période courante (période 11 dans notre exemple) par rapport à la période comparable des deux années précédentes.

On indique les excès de cas des 10 périodes précédentes aussi mais seules les données de la période 11 sont affichées (aux colonnes 1, 2 et 3).

DONNÉES DE LA PÉRIODE COURANTE

On a ici les nombres de cas déclarés pendant la période 11 de 2001, 2000 et 1999

DONNÉES CUMULATIVES À LA FIN DE LA PÉRIODE COURANTE

On a ici les nombres cumulatifs de cas déclarés entre le début de l'année de déclaration et à la fin de la période 11 pour 2001, 2000 et 1999.

Un + ici indique un excès de cas déclarés du début de l'année jusqu'à la fin de la période courante (période 11 dans notre exemple) par rapport au total observé à pareille date les deux années précédentes.

On indique les excès de cas cumulatifs des 10 périodes précédentes aussi mais seules les données cumulatives de la période 11 sont affichées (aux colonnes 4, 5 et 6).

Le pourcentage d'excès de cas est calculé lorsque pertinent. On évite de le faire en particulier face à de trop petits nombre de cas.

Il n'est calculé que sur les nombres cumulatifs de cas déclarés.

(Cumul 2001 - Cumul 2000) / Cumul 2000 X100

Chlamydia (génitale)

PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001

													PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001																				
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2001 courant	2000 courant	1999 courant	Région	1999 cumulatif	2000 cumulatif	2001 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 01 vs 00 (%)
				+	+				+				3	14	15	Bas St-Laurent 01	129	118	145						+	+	+	+	+	+	+		22,9
										+			15	26	41	Saguenay/ Lac St-Jean 02	275	294	265				+	+									
		+	+	+		+	+			+	+	+	95	64	81	Québec 03	696	667	850	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		27,4
		+	+					+	+	+	+	+	54	45	17	Mauricie/ Bois-Francs 04	320	445	516	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		16,0
		+	+		+	+	+	+		+			34	29	21	Estrie 05	285	321	357					+	+	+	+	+	+	+	+		11,2
		+	+	+		+	+						251	208	211	Montréal- centre 06	2055	2149	2502				+		+	+	+	+	+	+	+		16,4
			+							+	+	+	36	34	43	Outaouais 07	287	323	383	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		18,6
							+	+		+			27	30	11	Abitibi/ Témiscamingue 08	154	214	203														
													11	15	21	Côte-Nord 09	232	212	178														
						+					+		0	0	2	Nord-du-Québec 10	21	13	14														
							+		+	+	+	+	1	6	1	Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11	21	47	76	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		61,7
		+				+	+		+	+	+		30	19	15	Chaudière/ Appalaches 12	189	213	242				+	+	+	+	+	+	+	+	+		13,6
				+				+			+		31	29	32	Laval 13	255	321	339		+			+	+	+		+	+	+		5,6	
		+						+		+		+	33	32	32	Lanaudière 14	349	335	344	+		+		+	+	+	+	+	+			2,7	
								+	+	+	+	+	31	51	42	Laurentides 15	353	454	522	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		15,0
			+	+	+	+	+			+	+		87	110	112	Montréal 16	857	969	1110			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		14,6
		+	+			+	+	+	+		+		31	27	9	Nunavik 17	216	204	303			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		48,5
													5	9	10	Terres Cries/Baie James 18	77	56	55														
		+	+				+			+	+		775	748	716	Province de Québec	6771	7355	8404			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		14,3

Un + signifie un excès de cas observés en 2001 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 31 décembre 2000 et la dernière se termine le 29 décembre 2001.

Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Chlamydia (génitale)

PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001

													PÉRIODE 11: du 7 octobre au 5 novembre 2001																				
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2001 courant	2000 courant	1999 courant	Région	1999 cumulatif	2000 cumulatif	2001 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 01 vs 00 (%)
				+									3	7	11	Bas St-Laurent 01	85	79	89								+	+	+	+			12,7
										+		+	11	19	34	Saguenay/ Lac St-Jean 02	203	214	196	+		+	+	+	+								-8,4
		+	+	+			+				+	+	66	45	61	Québec 03	501	478	590	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		23,4
			+					+	+	+	+		34	34	14	Mauricie/ Bois-Francs 04	229	320	357		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		11,6
		+			+	+	+	+		+			24	20	17	Estrie 05	204	229	252					+	+	+	+	+	+	+	+		10,0
		+	+	+		+	+						176	160	150	Montréal- centre 06	1457	1611	1742						+	+	+	+	+	+	+		8,1
			+							+	+	+	30	24	39	Outaouais 07	229	246	282	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		14,6
										+			25	26	9	Abitibi/ Témiscamingue 08	114	172	160														-7,0
													11	9	15	Côte-Nord 09	178	153	144														-5,9
						+							0	0	2	Nord-du-Québec 10	14	9	7														
							+		+	+	+	+	1	5	1	Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11	18	33	54	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		63,6
		+				+			+	+	+		19	14	9	Chaudière/ Appalaches 12	135	152	167			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		9,9
				+			+	+		+	+		20	21	23	Laval 13	176	236	240			+		+	+	+		+	+	+		1,7	
								+					22	23	24	Lanaudière 14	252	258	237			+											-8,1
								+	+	+	+	+	21	38	30	Laurentides 15	265	345	404	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		17,1
			+	+	+	+		+		+	+		67	86	84	Montréal 16	638	737	818		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		11,0
		+				+	+	+	+		+		27	23	9	Nunavik 17	151	149	224		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		50,3
										+			5	9	10	Terres Cries/Baie James 18	71	54	50														-7,4
			+				+			+			562	563	542	Province de Québec	4920	5475	6013		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		9,8

Un + signifie un excès de cas observés en 2001 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 31 décembre 2000 et la dernière se termine le 29 décembre 2001.

Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Chlamydia (génitale)

PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001

PÉRIODE 11: du 7 octobre au 5 novembre 2001																																		
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2001 courant	2000 courant	1999 courant	Région	1999 cumulatif	2000 cumulatif	2001 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 01 vs 00 (%)	
				+	+		+	+	+	+			0	7	4	Bas St-Laurent 01	44	39	56					+	+	+	+	+	+	+	+			43,6
													4	7	7	Saguenay/ Lac St-Jean 02	72	80	66															-17,5
		+	+			+	+	+		+	+		29	19	20	Québec 03	195	189	259				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		37,0
		+	+		+				+	+	+		20	11	3	Mauricie/ Bois-Francs 04	86	119	158				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		32,8
		+	+			+						+	10	9	4	Estrie 05	81	92	105	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		14,1
		+	+	+									71	48	61	Montréal- centre 06	591	529	744				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		40,6
			+	+		+		+	+	+	+	+	6	10	4	Outaouais 07	58	76	101	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		32,9
						+	+	+		+			2	4	2	Abitibi/ Témiscamingue 08	40	42	43				+			+	+				+			2,4
													0	6	6	Côte-Nord 09	54	59	34															-42,4
						+	+				+		0	0	0	Nord-du-Québec 10	7	4	7								+	+						
							+			+		+	0	1	0	Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11	3	14	22	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		57,1
		+			+	+	+						11	5	6	Chaudière/ Appalaches 12	54	61	75						+	+	+	+	+	+	+	+		23,0
		+			+			+			+		11	8	9	Laval 13	79	85	99			+						+	+	+	+		16,5	
		+		+						+	+	+	11	9	8	Lanaudière 14	97	77	107	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		39,0
								+			+		10	13	12	Laurentides 15	88	109	118					+						+	+			8,3
			+	+	+	+	+		+	+	+	+	20	24	28	Montréal 16	218	231	292	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		26,4
			+		+		+	+	+				4	4	0	Nunavik 17	65	55	79					+	+	+	+	+	+	+	+	+		43,6
				+							+		0	0	0	Terres Cries/Baie James 18	6	2	5															
		+	+	+			+			+	+		209	185	174	Province de Québec	1838	1863	2370			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		27,2

Un + signifie un excès de cas observés en 2001 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 31 décembre 2000 et la dernière se termine le 29 décembre 2001.

Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Gonorrhée
PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001

PÉRIODE 11: du 7 octobre au 5 novembre 2001																																	
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2001 courant	2000 courant	1999 courant	Région	1999 cumulatif	2000 cumulatif	2001 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 01 vs 00 (%)
													0	0	2	Bas St-Laurent 01	5	4	2														
		+									+		1	0	0	Saguenay/ Lac St-Jean 02	4	2	4														
							+				+	+	0	8	3	Québec 03	47	38	35	+	+	+	+	+	+	+	+						
									+	+	+		1	6	0	Mauricie/ Bois-Francs 04	4	18	12				+	+	+	+	+	+	+				
		+			+								5	1	0	Estrie 05	6	7	10												+		
		+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	46	38	38	Montréal- centre 06	319	360	460	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		27,8
				+				+					1	2	3	Outaouais 07	20	21	20														
		+											1	0	0	Abitibi/ Témiscamingue 08	1	0	2												+		
											+		0	0	0	Côte-Nord 09	0	3	1			+											
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	0	0														
													0	0	0	Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11	0	0	0														
													0	0	1	Chaudière/ Appalaches 12	2	3	2														
		+	+		+							+	3	2	0	Laval 13	12	16	14	+													
		+				+	+						2	0	1	Lanaudière 14	15	11	19						+	+	+	+	+	+			
				+							+		0	1	1	Laurentides 15	16	10	14			+	+	+	+				+				
			+	+					+				2	5	4	Montréal 16	66	46	46														
									+				0	1	0	Nunavik 17	13	19	12														
													0	0	0	Terres Cries/Baie James 18	0	2	1							+							
			+	+	+			+	+	+	+	+	62	64	53	Province de Québec	530	560	654	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			16,8

Un + signifie un excès de cas observés en 2001 par rapport aux deux années antérieures.
Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 31 décembre 2000 et la dernière se termine le 29 décembre 2001.
Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Gonorrhée
PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001

													PÉRIODE 11: du 7 octobre au 5 novembre 2001																				
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2001 courant	2000 courant	1999 courant	Région	1999 cumulatif	2000 cumulatif	2001 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 01 vs 00 (%)
													0	0	0	Bas St-Laurent 01	0	0	0														
													0	0	0	Saguenay/ Lac St-Jean 02	0	0	0														
													0	1	0	Québec 03	11	2	0														
										+	+		0	2	0	Mauricie/ Bois-Francs 04	1	4	3		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
					+								0	0	0	Estrie 05	1	3	1														
		+	+	+	+				+	+	+		8	5	6	Montréal- centre 06	58	61	75	+	+	+	+				+	+	+	+			23,0
								+					0	0	2	Outaouais 07	5	4	4														
		+											1	0	0	Abitibi/ Témiscamingue 08	1	0	2											+			
													0	0	0	Côte-Nord 09	0	1	0														
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	0	0														
													0	0	0	Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11	0	0	0														
													0	0	0	Chaudière/ Appalaches 12	0	0	0														
		+	+		+								3	1	0	Laval 13	2	4	7										+	+			
						+							0	0	0	Lanaudière 14	4	2	3						+								
											+		0	0	0	Laurentides 15	4	3	6		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
			+						+				0	3	1	Montréal 16	15	10	11														
									+				0	1	0	Nunavik 17	9	11	7														
													0	0	0	Terres Cries/Baie James 18	0	2	1							+							
			+	+					+	+			12	13	9	Province de Québec	111	107	120				+	+	+			+	+	+			12,1

Un + signifie un excès de cas observés en 2001 par rapport aux deux années antérieures.
Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 31 décembre 2000 et la dernière se termine le 29 décembre 2001.
Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Gonorrhée
PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001

													2001 courant	2000 courant	1999 courant	Région	1999 cumulatif	2000 cumulatif	2001 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 01 vs 00 (%)
													0	0	2	Bas St-Laurent 01	5	4	2														
		+									+		1	0	0	Saguenay/ Lac St-Jean 02	4	2	4														
								+			+	+	0	7	3	Québec 03	36	36	35	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
					+				+				1	4	0	Mauricie/ Bois-Francs 04	3	14	9				+	+									
		+			+						+		5	1	0	Estrie 05	5	4	9		+	+	+	+						+			
		+	+	+			+	+	+	+	+	+	37	33	32	Montréal- centre 06	259	295	381	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		29,2	
				+					+				1	2	1	Outaouais 07	15	16	16									+	+				
													0	0	0	Abitibi/ Témiscamingue 08	0	0	0														
											+		0	0	0	Côte-Nord 09	0	2	1		+												
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	0	0														
													0	0	0	Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11	0	0	0														
													0	0	1	Chaudière/ Appalaches 12	2	3	2														
											+		0	1	0	Laval 13	10	12	7	+													
		+	+	+			+	+					2	0	1	Lanaudière 14	11	9	16						+	+	+	+	+	+			
				+							+		0	1	1	Laurentides 15	12	7	8														
			+	+									2	1	3	Montréal 16	51	35	35														
													0	0	0	Nunavik 17	4	8	5														
													0	0	0	Terres Cries/Baie James 18	0	0	0														
			+	+				+	+	+	+	+	49	50	44	Province de Québec	417	447	530	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		18,6	

Un + signifie un excès de cas observés en 2001 par rapport aux deux années antérieures.
Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 31 décembre 2000 et la dernière se termine le 29 décembre 2001.
Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Hépatite B
PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001

PÉRIODE 11: du 1 ^{er} octobre au 3 novembre 2001																																		
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2001 courant	2000 courant	1999 courant	Région	1999 cumulatif	2000 cumulatif	2001 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 01 vs 00 (%)	
													1	2	3	Bas St-Laurent 01	12	16	3															
		+		+	+		+			+			1	0	0	Saguenay/ Lac St-Jean 02	6	7	15			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
			+							+			4	7	11	Québec 03	89	67	76			+	+		+									
							+				+		3	2	3	Mauricie/ Bois-Francs 04	29	35	25		+			+										
						+						+	1	5	5	Estrie 05	28	28	27	+	+	+			+	+			+					
		+	+	+	+		+			+	+		60	51	58	Montréal- centre 06	695	638	735		+	+			+	+	+	+	+	+	+			15,2
		+			+								6	0	1	Outaouais 07	41	25	30															
		+	+	+									1	0	0	Abitibi/ Témiscamingue 08	1	9	9															
													0	0	0	Côte-Nord 09	4	4	5											+	+			
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	2	0															
											+		0	1	0	Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11	4	6	6		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
					+					+			1	2	1	Chaudière/ Appalaches 12	16	15	11															
					+								0	6	3	Laval 13	38	57	34															
										+			0	1	1	Lanaudière 14	22	22	10															
						+							0	1	2	Laurentides 15	23	32	37										+	+	+			
										+			7	12	15	Montréal 16	162	119	95															
													0	0	0	Nunavik 17	0	4	0															
													0	0	0	Terres Cries/Baie James 18	1	0	0															
							+			+			85	90	103	Province de Québec	1171	1086	1118			+												2,9

Un + signifie un excès de cas observés en 2001 par rapport aux deux années antérieures.
Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 31 décembre 2000 et la dernière se termine le 29 décembre 2001.
Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Hépatite B
PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001

PÉRIODE 11: du 1 ^{er} octobre au 3 novembre 2001																																		
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2001 courant	2000 courant	1999 courant	Région	1999 cumulatif	2000 cumulatif	2001 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 01 vs 00 (%)	
					+								1	0	1	Bas St-Laurent 01	5	3	2															
													0	0	0	Saguenay/ Lac St-Jean 02	1	3	6		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
										+	+		1	1	3	Québec 03	27	23	29				+	+	+	+	+	+	+	+	+			
			+							+			1	1	1	Mauricie/ Bois-Francs 04	12	17	9															
							+			+			1	3	2	Estrie 05	11	9	9															
		+	+	+			+						32	15	21	Montréal- centre 06	278	230	287									+		+				24,8
		+											2	0	0	Outaouais 07	21	7	8															
		+		+						+			1	0	0	Abitibi/ Témiscamingue 08	1	2	5				+	+	+	+	+	+	+	+	+			
				+						+			0	0	0	Côte-Nord 09	2	0	4									+	+	+				
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	1	0															
											+		0	0	0	Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11	1	1	2		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
					+					+			1	1	1	Chaudière/ Appalaches 12	3	6	5			+					+							
													0	3	1	Laval 13	14	18	10															
					+			+		+			0	0	1	Lanaudière 14	4	5	6			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
					+					+			0	0	0	Laurentides 15	5	9	13			+		+	+	+	+	+	+	+	+			
			+							+			2	3	5	Montréal 16	58	43	34															
													0	0	0	Nunavik 17	0	2	0															
													0	0	0	Terres Cries/Baie James 18	1	0	0															
		+	+							+			42	27	36	Province de Québec	444	379	429															13,2

Un + signifie un excès de cas observés en 2001 par rapport aux deux années antérieures.
Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 31 décembre 2000 et la dernière se termine le 29 décembre 2001.
Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Hépatite B
PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001

TABLE 17 - du 1 ^{er} octobre au 31 novembre													2001 courant	2000 courant	1999 courant	Région	1999 cumulatif	2000 cumulatif	2001 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 01 vs 00 (%)
													0	2	2	Bas St-Laurent 01	7	13	1														
		+		+			+			+			1	0	0	Saguenay/ Lac St-Jean 02	5	4	9			+	+		+	+	+	+	+	+			
			+				+			+	+		3	6	8	Québec 03	62	44	47	+		+											
							+	+			+		2	1	2	Mauricie/ Bois-Francs 04	17	17	16		+	+	+	+	+	+							
							+					+	0	2	3	Estrie 05	17	19	18	+	+	+			+	+		+					
					+	+				+	+		27	36	36	Montréal- centre 06	411	402	435		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		8,2	
		+			+								4	0	1	Outaouais 07	20	18	22											+			
			+										0	0	0	Abitibi/ Témiscamingue 08	0	7	4														
													0	0	0	Côte-Nord 09	2	4	1														
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	1	0														
													0	1	0	Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11	3	5	4			+	+	+	+	+		+					
													0	1	0	Chaudière/ Appalaches 12	13	9	6														
					+								0	3	2	Laval 13	24	39	24														
													0	1	0	Lanaudière 14	18	17	4														
				+		+	+				+		0	1	2	Laurentides 15	18	23	24										+	+			
													5	9	10	Montréal 16	104	76	61														
													0	0	0	Nunavik 17	0	2	0														
													0	0	0	Terres Cries/Baie James 18	0	0	0														
							+						42	63	66	Province de Québec	721	700	676			+									-3,4		

Un + signifie un excès de cas observés en 2001 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 31 décembre 2000 et la dernière se termine le 29 décembre 2001.

Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Syphilis récente
PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001

PÉRIODE 11: du 7 octobre au 5 novembre 2001																																	
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2001 courant	2000 courant	1999 courant	Région	1999 cumulatif	2000 cumulatif	2001 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 01 vs 00 (%)
													0	0	0	Bas St-Laurent 01	0	0	0														
								+					0	0	0	Saguenay/ Lac St-Jean 02	0	0	1					+	+	+	+	+	+	+			
					+								0	0	0	Québec 03	1	0	0														
													0	0	0	Mauricie/ Bois-Francs 04	0	0	1									+	+	+			
													0	0	0	Estrie 05	0	0	0														
							+	+			+		0	0	0	Montréal- centre 06	2	3	11		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
											+		0	0	0	Outaouais 07	0	0	1		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
													0	0	0	Abitibi/ Témiscamingue 08	0	0	0														
													0	0	0	Côte-Nord 09	0	0	0														
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	0	0														
													0	0	0	Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11	0	0	0														
													0	0	0	Chaudière/ Appalaches 12	0	0	0														
													0	0	0	Laval 13	0	0	0														
													0	0	0	Lanaudière 14	0	0	0														
												+	0	0	0	Laurentides 15	0	0	0														
													0	0	0	Montréal 16	0	0	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
													0	0	0	Nunavik 17	0	0	0														
													0	0	0	Terres Cries/Baie James 18	0	0	0														
					+		+	+			+	+	0	0	0	Province de Québec	3	3	15	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Un + signifie un excès de cas observés en 2001 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 31 décembre 2000 et la dernière se termine le 29 décembre 2001.

Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Syphilis récente
PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001

													PERIODE 11 : du 7 octobre au 3 novembre 2001																				
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2001 courant	2000 courant	1999 courant	Région	1999 cumulatif	2000 cumulatif	2001 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 01 vs 00 (%)
													0	0	0	Bas St-Laurent 01	0	0	0														
													0	0	0	Saguenay/ Lac St-Jean 02	0	0	0														
													0	0	0	Québec 03	1	0	0														
													0	0	0	Mauricie/ Bois-Francs 04	0	0	0														
													0	0	0	Estrie 05	0	0	0														
													0	0	0	Montréal- centre 06	1	2	0														
													0	0	0	Outaouais 07	0	0	0														
													0	0	0	Abitibi/ Témiscamingue 08	0	0	0														
													0	0	0	Côte-Nord 09	0	0	0														
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	0	0														
													0	0	0	Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11	0	0	0														
													0	0	0	Chaudière/ Appalaches 12	0	0	0														
													0	0	0	Laval 13	0	0	0														
													0	0	0	Lanaudière 14	0	0	0														
													0	0	0	Laurentides 15	0	0	0														
													0	0	0	Montréal 16	0	0	0														
													0	0	0	Nunavik 17	0	0	0														
													0	0	0	Terres Cries/Baie James 18	0	0	0														
													0	0	0	Province de Québec	2	2	0														

Un + signifie un excès de cas observés en 2001 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 31 décembre 2000 et la dernière se termine le 29 décembre 2001.

Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Syphilis récente
PÉRIODE 11: du 7 octobre au 3 novembre 2001

													PÉRIODE 11 : du 7 octobre au 3 novembre 2001																				
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2001 courant	2000 courant	1999 courant	Région	1999 cumulatif	2000 cumulatif	2001 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 01 vs 00 (%)
													0	0	0	Bas St-Laurent 01	0	0	0														
								+					0	0	0	Saguenay/ Lac St-Jean 02	0	0	1					+	+	+	+	+	+	+			
					+								0	0	0	Québec 03	0	0	0								+	+					
													0	0	0	Mauricie/ Bois-Francs 04	0	0	1									+	+	+			
													0	0	0	Estrie 05	0	0	0														
							+	+			+		0	0	0	Montréal- centre 06	1	1	11		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
											+		0	0	0	Outaouais 07	0	0	1		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
													0	0	0	Abitibi/ Témiscamingue 08	0	0	0														
													0	0	0	Côte-Nord 09	0	0	0														
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	0	0														
													0	0	0	Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11	0	0	0														
													0	0	0	Chaudière/ Appalaches 12	0	0	0														
													0	0	0	Laval 13	0	0	0														
													0	0	0	Lanaudière 14	0	0	0														
												+	0	0	0	Laurentides 15	0	0	0														
													0	0	0	Montréal 16	0	0	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
													0	0	0	Nunavik 17	0	0	0														
													0	0	0	Terres Cries/Baie James 18	0	0	0														
					+		+	+			+	+	0	0	0	Province de Québec	1	1	15	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

Un + signifie un excès de cas observés en 2001 par rapport aux deux années antérieures.
Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 31 décembre 2000 et la dernière se termine le 29 décembre 2001.
Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Titres déjà parus dans la collection
Analyses et surveillance

1. *Surveillance du cancer au Québec : Nouveaux cas déclarés au fichier des tumeurs et mortalité : Année 1993* (édité en 1996).
2. *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1994* (édité en 1997).
3. *L'accessibilité au condom en milieu scolaire québécois – Enquête auprès des CLSC et des directions d'écoles secondaires* (édité en 1997).
4. *Indicateurs sociosanitaires : Le Québec et ses régions* (édité en 1997).
5. *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1995* (édité en 1997).
6. *La mortalité au Québec – Disparités et évolution de 1975-1977 à 1993-1995* (édité en 1998).
7. *Évaluation de l'application du programme public de services dentaires préventifs* (édité en 1998).
8. *Étude 1994-1995 sur la santé buccodentaire des adultes québécois de 35 à 44 ans* (édité en 1998).
9. *Profil des traumatismes au Québec : De 1991 à 1995* (édité en 1998).
10. *Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1996* (édité en 1998).
11. *Étude 1996-1997 sur la santé buccodentaire des élèves québécois de 11-12 et 13-14 ans* (édité en 1999).
12. *Éducation à la sexualité et à la prévention des MTS/SIDA dans les centres de réadaptation des centres jeunesse du Québec – Enquête nationale auprès des centres jeunesse et des directions régionales de la santé publique* (édité en 1999).
13. *Surveillance de la mortalité au Québec : 1976-1997* (édité en 2000).
14. *Surveillance de la mortalité au Québec : 1977-1998* (édité en 2001).
15. *Projections d'incidence de cancer et de mortalité par cancer au Québec pour l'année 2001* (édité en 2001).
16. *Surveillance des maladies infectieuses et des intoxications chimiques à déclaration obligatoire au Québec, de 1990 à 1999* (édité en 2001).
17. *Analyse des cas d'infection génitale par Chlamydia trachomatis, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec par année civile : 1995-1999* (édité en 2001).
18. *Étude 1998-1999 sur la santé buccodentaire des élèves québécois de 5-6 et de 7-8 ans* (édité en 2001).
19. *Évaluation du programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement, de 1995 à 1999* (édité en 2001).
20. *Portrait de l'infection par le VIH et du sida au Québec, décembre 2001* (édité en 2001).
21. *Surveillance du cancer au Québec : nouveaux cas déclarés au fichier des tumeurs et mortalité par cancer de 1992 à 1998* (édité en 2002).

