

ANALYSE DES CAS DE CHLAMYDIOSE,
DE GONORRÉE, D'INFECTION PAR LE VIRUS
DE L'HÉPATITE B ET DE SYPHILIS
DÉCLARÉS AU QUÉBEC PAR ANNÉE CIVILE

1994 -1998

MTS

SEPTEMBRE 1999

Québec

Ministère de
la Santé et des
Services sociaux



Centre de
coordination
sur le sida

Auteurs :

Raymond Parent

- Direction régionale de la santé publique de Québec, Beauport
- Centre de recherche, Pavillon Saint-Sacrement, Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, Québec

Michel Alary

- Direction régionale de la santé publique de Québec, Beauport
- Centre de recherche, Pavillon Saint-Sacrement, Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, Québec
- Groupe de recherche en épidémiologie de l'Université Laval, Sainte-Foy

Cette analyse a été financée par le Centre québécois de coordination sur le sida et soutenue par le Laboratoire de santé publique du Québec du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Édition produite par :

La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux

Des frais d'administration sont exigés pour obtenir d'autres exemplaires de ce document. Ces frais vous seront facturés à la livraison :

Faites parvenir votre commande par télécopieur : **(418) 644-4574**

soit par courriel : **communications@msss.gouv.qc.ca**

ou par la poste : **Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction des communications
1075, chemin Sainte-Foy, 16^e étage
Québec (Québec)
G1S 2M1**

Le présent document peut être consulté à la section documentation du site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'adresse est : **www.msss.gouv.qc.ca**

Dépôt légal

Bibliothèque nationale du Québec, 2000

Bibliothèque nationale du Canada, 2000

ISBN 2-550-36009-5

© Gouvernement du Québec

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source soit mentionnée.

AVANT-PROPOS

Le présent rapport expose les données sur les cas de chlamydie, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec au cours des cinq dernières années, soit entre le 1^{er} janvier 1994 et le 31 décembre 1998. Ces données sont nécessaires pour le suivi de l'ampleur de la problématique des maladies transmissibles sexuellement (MTS). La répartition régionale des MTS et l'analyse qui en est faite permettent d'orienter les interventions et de planifier les ressources nécessaires dans la lutte contre les MTS.

Le rapport s'adresse principalement aux responsables régionaux de la lutte contre les MTS, mais aussi à toutes les organisations, associations ou personnes qui ont un mandat dans la lutte contre les MTS, afin de les aider dans leurs interventions.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux est responsable du programme de surveillance des MTS qui s'effectue en collaboration avec plusieurs partenaires, médecins traitants, laboratoires déclarants ainsi que les directions régionales de la santé publique responsables de la collecte, de la saisie et du transfert des informations, que nous tenons à remercier ici.

Un programme de surveillance comprend la collecte des données, leur validation, l'analyse des données et la diffusion de l'information. La diffusion de ce document fait donc partie intégrante du programme de surveillance des MTS.



REMERCIEMENTS

Nous aimerions remercier :

toutes les personnes qui se chargent d'alimenter et de gérer le système des maladies à déclaration obligatoire dans chacune des régions sociosanitaires ainsi qu'au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) ;

les docteurs Sylvie Venne et Michèle Dupont qui ont revu et corrigé le manuscrit ;

la direction du LSPQ ainsi que monsieur Pierre Turcotte et madame Johanne Lefebvre pour avoir soutenu le sondage traitant de l'implantation dans les laboratoires médicaux du Québec des techniques d'amplification génique pour le dépistage de la chlamydie ;

madame Myrto Mondor qui a aidé à la conception du cadre d'analyse ;

monsieur Florian Gosselin, madame Louise Ringuette, madame Louiselle Clément et monsieur René Jean, pour nous avoir aidé à monter des fichiers d'analyse valides ;

tous les individus qui ont partagé leur expertise et commenté les tendances observées, en particulier les docteurs Robert Remis, Jean Vincelette et Jean-François Proulx ainsi que mesdames Christina Smeja et Marie-Paule Gauthier.



Table des matières

	Page
Liste des tableaux et des graphiques	iii
Introduction.....	1
1. Faits saillants	2
2. Notes techniques	3
3. Analyse générale	4
3.1 Les chlamydioses	5
3.2 Les gonorrhées.....	6
3.3 Les hépatites B.....	9
3.4 Les syphilis	9
4. Discussion	11
Conclusion	16
Tableaux et graphiques	T1-T131
Annexe 1 Le dépistage de la chlamydiose par amplification génique	
Annexe 2 Surveillance périodique des MTS au 14 août 1999	

Liste des tableaux et des graphiques

SECTION TEXTE

– Nombre de cas déclarés par année d'épisode et maladie, Québec (1994-1998)	4
– Caractéristiques d'âge et de sexe des cas déclarés, Québec (1994-1998)	5
– Type de chlamydiose, sexe des patients et type de cas déclaré, Québec (1994-1998)	5
– Évolution de la chlamydiose au Québec (1997-1999)	6
– Évolution de la gonorrhée au Québec (1997-1999)	7
– Déclaration des gonorrhées chez les hommes par site d'infection, Québec (1994-1998)	8
– Nombre de gonorrhées rectales et pharyngées déclarées chez les hommes, et proportion par rapport au nombre total de gonorrhées déclarées, Québec (1994-1998)	8
– Type de validation des cas d'hépatite B déclarés, Québec (1994-1998)	9
– Nombre de cas déclarés d'infection syphilitique « ancienne » devenue symptomatique par type de syphilis et sexe, Québec (1994-1998)	10
– Nombre de cas déclarés d'infection syphilitique « récente » et ancienne asymptomatique par type de syphilis et sexe, Québec (1994-1998)	10

SECTION TABLEAUX ET GRAPHIQUES

– Mesure des tendances centrales de l'âge des cas déclarés par sexe et type de maladie, Québec (1998)	T1
---	----

Chlamydirose

– Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose par sexe Province de Québec(1994-1998)	T2
– Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose, Province de Québec (1995-1998)	T3
– Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose par sexe Chacune des régions (1994-1998)	T4
– Évolution par sexe des taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose, Québec (1988-1998)	T22
– Nombre de cas déclarés de chlamydirose par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)	T23
– Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydirose par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)	T24
– Nombre de cas déclarés de chlamydirose par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge Québec (1994-1998)	T25
Suite	T26
– Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydirose par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge Québec (1994-1998).....	T27
Suite	T28
– Nombre de cas déclarés de chlamydirose chez les femmes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge Québec (1994-1998).....	T29
Suite	T30
– Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydirose chez les femmes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T31
Suite	T32
– Nombre de cas déclarés de chlamydirose chez les hommes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998).....	T33
Suite	T34
– Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydirose chez les hommes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T35
Suite	T36
– Taux d'incidence moyen des cas déclarés de chlamydirose par groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T37
– Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose, Québec (1991-1998)	T37
– Taux d'incidence moyen des cas déclarés de chlamydirose chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T38

- Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de chlamydiae chez les femmes, Québec (1991-1998)..... T38
- Taux d'incidence moyen des cas déclarés de chlamydiae chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1994-1998) T39
- Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de chlamydiae chez les hommes, Québec (1991-1998)..... T39

Gonorrhée

- Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe Province de Québec (1994-1998)..... T40
- Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée, Province de Québec (1995-1998)..... T41
- Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe Chacune des régions (1994-1998) T42
- Évolution par sexe des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée, Québec (1984-1998)..... T60
- Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998) T61
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)..... T62
- Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)..... T63
Suite T64
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)..... T65
Suite T66
- Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)..... T67
Suite T68
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998) T69
Suite T70
- Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)..... T71
Suite T72
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998) T73
Suite T74

– Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée par groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T75
– Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée, Québec (1991-1998)	T75
– Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T76
– Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes, Québec (1991-1998)	T76
– Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T77
– Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes, Québec (1991-1998)	T77
– Nombre et pourcentage de cas déclarés de gonorrhée causée par un <i>Neisseria gonorrhoeae</i> producteur de pénicillinase (NGPP) par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)	T78
Suite	T79

Hépatite B aiguë

– Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe Province de Québec (1994-1998)	T80
– Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë, Province de Québec (1995-1998)	T81
– Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe Chacune des régions sexe (1994-1998)	T82
– Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)	T100
– Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)	T101
– Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T102
Suite	T103
– Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T104
Suite	T105
– Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T106
Suite	T107

– Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T108
Suite	T109
– Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998).....	T110
Suite	T111
– Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T112
Suite	T113
– Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë par groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T114
– Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë, Québec (1991-1998)	T114
– Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T115
– Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes, Québec (1991-1998).....	T115
– Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1994-1998).....	T116
– Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes, Québec (1991-1998).....	T116

Hépatite B chronique

– Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)	T117
– Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998).....	T118
Suite	T119
– Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les femmes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T120
Suite	T121
– Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les hommes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)	T122
Suite	T123

Hépatite B de type non précisé

– Nombre de cas déclarés d'hépatite B de type non précisé par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)	T124
--	------

Syphilis récente

- Taux d'incidence des cas déclarés de syphilis récente par sexe
Province de Québec (1994-1998) T125
Autres régions, Québec, Montréal-Centre T126
- Nombre de cas déclarés de syphilis récente par région sociosanitaire, année d'épisode
et sexe, Québec (1994-1998) T128
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par région
sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998) T129
- Nombre de cas déclarés de syphilis récente par sexe, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1994-1998) T130
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par sexe,
année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998) T130

Syphilis ancienne

- Nombre de cas déclarés de syphilis ancienne par région sociosanitaire, année
d'épisode et sexe, Québec (1994-1998) T131



Introduction

Certaines maladies transmises sexuellement (MTS) sont répertoriées dans le système québécois des maladies à déclaration obligatoire (MADO). Un système informatisé (implanté en 1989-1990) relie chacune des dix-huit régions sociosanitaires de la province à une plate-forme commune d'enregistrement des cas déclarés située au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ). L'agrégation des données dépersonnalisées permet de décrire l'épidémiologie des maladies déclarées au Québec.

Nous traiterons des cas de chlamydie, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au cours des cinq dernières années, soit entre le 1^{er} janvier 1994 et le 31 décembre 1998. Nous détaillerons l'incidence de ces maladies en fonction de l'âge, du sexe et de la région sociosanitaire de résidence des personnes atteintes.

Nous ajoutons cette année au rapport une section qui traite de l'implantation dans les laboratoires médicaux du Québec des techniques d'amplification génique pour la recherche de la chlamydie. Un court questionnaire a été envoyé au printemps 1998 aux laboratoires médicaux qui participent au programme de contrôle de la qualité du LSPQ.

Nous surveillons maintenant périodiquement le nombre de cas déclarés. Cette surveillance se fait toutes les quatre semaines et nous annexons aux rapports de surveillance les données recueillies entre le 3 janvier 1999 et la fin de la 8^e période, le 14 août 1999. Nous nous y référerons quand nous traiterons des tendances de la chlamydie et de la gonorrhée.



1

Faits saillants

– La chlamydie est la MTS la plus fréquemment déclarée au Québec avec 35 410 cas rapportés entre 1994 et 1998. L'hépatite B et la gonorrhée suivent avec respectivement 8 010 et 2 885 cas.

– Au début des années 1990, l'incidence de la chlamydie diminuait d'environ 15 % par année. Le rythme de cette baisse a constamment ralenti depuis 1995 et nous observons cette année une augmentation des taux d'incidence des cas déclarés dans la majorité des régions sociosanitaires du Québec. L'augmentation touche plusieurs groupes d'âge et les deux sexes, bien que la hausse observée chez les hommes soit plus marquée.

– Nous ne pouvons pas éliminer la possibilité que les augmentations observées dans l'incidence de la chlamydie soient causées par une augmentation réelle de la vitesse de propagation de la maladie dans plusieurs régions. Toutefois, il est aussi possible, quoique cette hypothèse reste à vérifier, que la disponibilité de techniques plus performantes et moins invasives influence au moins en partie l'évolution observée des taux d'incidence, en particulier pour les hommes.

– L'augmentation du taux d'incidence des gonorrhées en 1997 ne s'est pas poursuivie en 1998 mais semble réapparaître en 1999. L'augmentation de 1997 résultait donc peut-être des fluctuations normales de l'incidence de cette maladie. Il sera toutefois nécessaire de rester aux aguets puisque à la fin de la 8^e période de déclaration en 1999 (le 14 août), 83 cas (41 %) supplémentaires ont été déclarés comparativement à la période correspondante de 1998.

– L'éradication de la transmission indigène de la syphilis semble plus que jamais à portée de main. Seulement trois cas de transmission récente de syphilis ont été déclarés en 1998.



2

Notes techniques

- a) La déclaration anonyme de la gonorrhée et de la syphilis rend difficile la détection des cas déclarés plus d'une fois. Pour les gonorrhées résistantes aux antibiotiques, le personnel du LSPQ fait toutefois certaines vérifications quant aux « doublons démographiques » puisque tous les laboratoires du Québec informent mensuellement le LSPQ du nombre de souches isolées dans le cadre du programme de surveillance du gonocoque résistant aux antibiotiques. On compare ainsi le nombre de déclarations au nombre de souches rapportées par les laboratoires. Ces vérifications ne sont pas faites dans les cas de syphilis. Les doublons dans les déclarations nominales de chlamydioses et d'hépatite B sont plus facilement trouvables.
- b) Étant donné le faible nombre de cas, nous ne présentons que quelques histogrammes dans le cas des syphilis récentes (définies à la page 10).
- c) Nous ne calculons pas les taux d'incidence des hépatites B chroniques et des syphilis anciennes. Les taux générés ne seraient que le reflet du rythme de détection des cas.
- d) Les tableaux contiennent les cas pour lesquels la variable d'intérêt n'a pas été catégorisée. Pour faciliter les comparaisons, des taux ont été générés à partir de ces cas. Le dénominateur est toujours ici la population de référence à laquelle peut s'appliquer le numérateur observé. Ce taux s'ajoute aux taux produits pour les cas où la valeur de la variable n'est pas manquante. Un exemple : en 1997, 14 cas de chlamydiose ont été déclarés au Québec sans que le sexe du patient ne soit précisé dans les informations disponibles, pour un taux de 0,2 par 100,000 si on reporte ce nombre de cas sur l'ensemble de la population québécoise.
- e) Nous ne présentons pas les taux d'incidence ajustés dans chaque région sur la structure d'âge provinciale. L'exercice de l'an dernier nous avait amenés à conclure que cet ajustement n'avait pas d'impact significatif en dehors des régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James où les taux ajustés étaient respectivement inférieurs d'environ 15 % et 30 %. Nous sommes en contact avec des répondants de ces deux régions et examinerons avec eux les données de 1998.

3

Analyse générale

Certaines MTS à déclaration obligatoire sont très peu fréquentes. Il s'agit de la lymphogranulomatose vénérienne (un cas dans Lanaudière en 1994 ; un cas dans la région de Québec en 1996 et un cas dans la région du Saguenay-Lac Saint-Jean en 1997), du chancre mou (un cas au Saguenay-Lac Saint-Jean en 1994, un cas montréalais en 1995 ; un cas dans la région de Québec en 1996), du granulome inguinal (aucun cas entre 1994 et 1998) et de l'herpès néonatal (deux cas montréalais en 1996 et 1998, un cas dans les Laurentides en 1994 et deux cas dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine en 1995 et en 1997).

Les chlamydioses, les gonorrhées, les hépatites B et les syphilis sont les MTS à déclaration obligatoire les plus fréquentes. Elles représentaient 43,8 % (10 681/24 391) des cas de MADO déclarés en 1994 et 32,6 % (9 161/28 065) des cas déclarés en 1998. On retrouve ci-dessous leur répartition par année tandis que le tableau suivant montre les caractéristiques d'âge et de sexe de l'ensemble des cas.

Nombre de cas déclarés par année d'épisode et maladie, Québec (1994-1998)

Nombre de cas (pourcentage)					
	Chlamydia	Gonorrhée	Hépatite B	Syphilis	Total
1994	7 925 (74,2)	750 (7,0)	1 903 (17,8)	103 (1,0)	10 681 (100,0)
1995	7 074 (74,8)	607 (6,4)	1 691 (17,9)	80 (0,9)	9 452 (100,0)
1996	6 681 (76,1)	479 (5,5)	1 556 (17,7)	63 (0,7)	8 779 (100,0)
1997	6 466 (75,3)	556 (6,5)	1 508 (17,6)	52 (0,6)	8 582 (100,0)
1998	7 265 (79,3)	493 (5,4)	1 352 (14,8)	51 (0,6)	9 161 (100,0)
Total	35 410 (75,9)	2 885 (6,2)	8 010 (17,2)	349 (0,8)	46 655 (100,0)

Caractéristiques d'âge et de sexe des cas (1) déclarés, Québec (1994-1998)

Nombre de cas déclarés pour lesquels l'âge du patient est connu	45 932 (98,5 %)
Nombre de cas déclarés pour lesquels le sexe du patient est connu	46 504 (99,7 %)
Nombre de cas déclarés chez les hommes	16 392 (35,2 %)
Hommes d'âge connu	16 149 (98,5 %)
Nombre de cas déclarés chez les femmes	30 112 (64,8 %)
Femmes d'âge connu	29 725 (98,7 %)
Âge médian (moyen) des cas déclarés chez les femmes (2)	21 ans (23,6 %)
Âge médian (moyen) des cas déclarés Chez les hommes (2)	28 ans (30,8 %)

(1) 46 655 cas de chlamydirose, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis ont été déclarés entre 1994 et 1998.

(2) La médiane est la mesure de tendance centrale à retenir à cause des valeurs extrêmes observées.

3.1 Les chlamydioses

Le prochain tableau présente le type de chlamydirose déclarée ainsi que le sexe des individus atteints au cours des cinq dernières années. Les tableaux et graphiques des pages T2 à T39 décrivent la distribution de ces cas par année, région sociosanitaire, sexe et groupe d'âge.

Type de chlamydirose⁽¹⁾, sexe des patients et type de cas déclaré, Québec (1994-1998)

Nombre de cas déclarés chez les femmes	26 239 (74,2 %)
Nombre de cas déclarés chez les hommes	9 112 (25,8 %)
Nombre de cas génitaux	34 763 (99,7 %)
Nombre de cas oculaires	79 (0,2 %)
Nombre de cas pulmonaires	26 (0,1 %)

(1) Un total de 35 410 cas ont été déclarés entre 1994 et 1998.

Le taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie a augmenté au Québec tel qu'on le voit ci-dessous.

Évolution de la chlamydie au Québec (1997-1999)

Années	Observation	Données
1997	La baisse du taux d'incidence (TI) provincial n'est plus que de 4 % par rapport à 1996 Augmentation des TI dans cinq régions	1994 vs 1993 : -22 % 1995 vs 1994 : -12 % 1996 vs 1995 : - 6 % 1997 vs 1996 : - 4 % Bas-Saint-Laurent (F) Québec (H + F) Montréal (H + F) Laval (H) Lanaudière (F)
1998	Maintien de l'augmentation dans les cinq régions et nouvelles augmentations dans neuf autres régions	Le TI provincial passe de 86,7 par 100 000 PA à 96,7 (une augmentation de 12 % : 20 % chez les hommes et 9 % chez les femmes).
1999	Maintien de l'augmentation du nombre de cas déclarés dans huit régions (au 6 juin 1999)	Les augmentations (excès de cas par rapport à 1997 et 1998) touchent les hommes et les femmes. L'augmentation est de 10 % par rapport à 1998 (3 601 cas vs 3 284).

N. B. Les données de 1999 sont issues d'activités de surveillance mises en place en février 1999. On traite ici des banques MADDO ouvertes aux corrections et à la validation des cas.

Le lecteur trouvera en annexe les résultats d'un sondage que nous avons mené auprès des laboratoires médicaux du Québec afin de documenter l'implantation des tests d'amplification génique dans la détection de *Chlamydia trachomatis*. Nous aborderons les conclusions qui peuvent être tirées de ce sondage dans la discussion présentée plus loin.

3.2 Les gonorrhées

On retrouve aux tableaux des pages T40 à T77 la distribution des cas déclarés de gonorrhée par année, sexe, âge et région sociosanitaire de résidence. On en décrit ci-après l'évolution entre 1997 et 1999.

Évolution de la gonorrhée au Québec (1997-1999)

Années	Observation	Données
1997	Augmentation des taux d'incidence (TI) dans trois régions	L'augmentation touche presque exclusivement les hommes de Québec, de Montréal et de la Montérégie. Le TI provincial chez les hommes passe de 8,9 à 11,2 par 100 000 PA (une augmentation de 25 %).
1998	Baisse des TI partout	Le TI provincial chez les hommes passe de 11,2 à 10,1 par 100 000 PA (une baisse de 10 %).
1999	Augmentation du nombre de cas déclarés dans cinq régions (au 6 juin 1999)	Les augmentations (excès de cas par rapport à 1997 et 1998) touchent presque exclusivement les hommes. L'augmentation du nombre de cas déclarés chez les hommes dans la province est de 34 % par rapport à 1998 (274 cas vs 204).

N. B. Les données de 1999 sont issues d'activités de surveillance mises en place en février 1999. On traite ici des banques MADO ouvertes aux corrections et à la validation des cas.

L'augmentation observée en 1999 repose sur un nombre total de cas déclarés de plus en plus petit. On parle en effet ici d'un nombre excédentaire de 70 cas au 6 juin 1999. La hausse observée dans certaines régions est donc difficilement interprétable. Elle a beau, par exemple, être de 80 % en Outaouais, on ne parle pour cette région que de quatre cas excédentaires observés en 1999 par rapport à 1998.

Les tableaux des pages T78 et T79 donnent la distribution des cas causés par des souches productrices de pénicillinase (NGPP). C'est le LSPQ qui, depuis 1987, est responsable de la surveillance des cas de gonorrhée causés par des souches résistantes aux antibiotiques. La concordance entre les souches de NGPP reçues au LSPQ et celles qui sont déclarées dans les banques MADO est vérifiée depuis 1991. Une fois l'antibiorésistance confirmée, le personnel du LSPQ vérifie la conformité de la déclaration correspondante. Le LSPQ émet un rapport annuel intitulé *Surveillance des souches de Neisseria gonorrhoeae résistantes aux antibiotiques dans la province de Québec*. Le lecteur intéressé à en savoir plus est invité à consulter ce rapport déposé annuellement au LSPQ. Le nombre de cas a continué de baisser en 1998.

Le système MADO permet la déclaration de gonorrhées « génito-urinaires », « oculaires » ou « autres ». La grande majorité de ces dernières (224/262 entre 1994 et 1998) sont déclarées chez des hommes. Les deux tableaux qui suivent donnent le détail de la distribution de ces cas déclarés chez les hommes.

Déclaration des gonorrhées chez les hommes par site d'infection, Québec (1994-1998)

Site d'infection	Nombre	Pourcentage des cas
Gonorrhée génitale	1 824	88,8
Gonorrhée oculaire	6	0,3
Gonorrhée « autre »	224	10,9
Rectale	121 ⁽¹⁾	
Pharyngée	76 ⁽²⁾	
Articulaire	2	
Site non précisé	25	
Total	2 054	

(1) 4 de ces individus souffraient simultanément d'une infection pharyngée.

(2) 7 de ces individus souffraient simultanément d'une infection rectale.

On constatera dans le prochain tableau qu'après la hausse observée en 1997, le nombre de cas pharyngés a diminué pour revenir au nombre observé en 1996, tandis que le nombre de cas rectaux reste plus élevé qu'en 1996 mais a diminué par rapport à 1997. Après avoir atteint un sommet de 26,7 % des cas (8/30) en 1995, la proportion des gonorrhées « autres » touchant des sites d'infection non précisés, était de 15 % en 1996, de seulement 1,7 % (1/58) en 1997 et de 7 % en 1998.

Parmi les 197 hommes chez qui une gonorrhée rectale ou pharyngée a été déclarée entre 1994 et 1998, 88 (44,6 %) sont âgés de 20 à 29 ans et 70 (35,6 %) sont âgés de 30 à 39 ans. Pour 12 des 197 cas (6,1 %), une souche productrice de pénicillinase a été déclarée au fichier. La majorité des cas (92,9 %) sont déclarés à Montréal (183/197 cas). Parmi les 14 autres, 7 (3,6 %) ont été déclarés en Montérégie.

Nombre de gonorrhées rectales et pharyngées déclarées chez les hommes et proportion par rapport au nombre total de gonorrhées déclarées, Québec (1994-1998)

	1994	1995	1996	1997	1998
Proportion des gonorrhées déclarées comme étant « autres »	52/515 10,1 %	30/431 7,0 %	40/325 12,3 %	59/410 14,2 %	43/373 11,5 %
Proportion des gonorrhées « autres » déclarées sans que le site ne soit précisé	6/52 11,5 %	8/30 26,7 %	6/40 15,0 %	2/59 1,7 %	3/43 7,0 %
Proportion des gonorrhées déclarées comme étant rectales	37/515 7,2 %	11/431 2,6 %	19/325 5,8 %	32/410 7,8 %	26/373 7,0 %
Proportion des gonorrhées déclarées comme étant pharyngées	13/515 2,5 %	12/431 2,8 %	15/325 4,6 %	28/410 6,8 %	15/373 4,0 %

3.3 L'hépatite B

Les tableaux des pages T80 à T124 décrivent la distribution par région sociosanitaire, sexe et âge des cas d'hépatite B déclarés. Le tableau qui suit détaille le type de validation des cas déclarés. On constate que depuis 1993, la proportion des cas caractérisés en épisodes chroniques et aigus et validés sur la base d'indices cliniques (sans résultats de laboratoire à l'appui) a augmenté jusqu'en 1996, est restée stable en 1997 et a légèrement augmenté en 1998.

Type de validation des cas d'hépatite B déclarés, Québec (1994-1998)

	1994	1995	1996	1997	1998
Nombre de cas déclarés	1 903	1 691	1 556	1508	1352
Nombre de cas déclarés avec une validation « clinique »	443	599	607	585	562
Nombre de cas déclarés et dont le type de validation est connu	1 823	1 556	1 377	1333	1 192
Pourcentages des cas dont le type de validation est « clinique » parmi ceux dont le type de validation est connu	24,3	38,5	44,1	43,9	47,1

3.4 La syphilis

Les infections syphilitiques peuvent être déclarées dans neuf catégories différentes au Québec. La présentation clinique de ces infections étant très complexe, il y a un fort potentiel d'erreur de classification des cas déclarés. Ces erreurs sont rarement corrigées puisque aucun effort systématique de validation des cas enregistrés n'est fait. Elles ont un effet important puisque les nombres de cas déclarés sont relativement petits. Il est donc difficile d'interpréter les tendances observées.

Nous avons catégorisé les cas de syphilis déclarés en cas « récents » ou « anciens » :

- Cas « récents » :
 - infection primaires, secondaire et latentes d'un an ou moins.
- Cas « anciens » :
 - infections asymptomatiques :
 - latentes de plus d'un an et neurologiques ;
 - infections devenues symptomatiques ;
 - symptomatiques tardives, neurologiques et cardiovasculaires.

Les tableaux suivants présentent les cas de syphilis par sexe et stade de la maladie. Le nombre de cas déclarés de syphilis ancienne devenue symptomatique est relativement peu élevé. Le nombre de cas déclarés sans que le stade de la maladie ne soit précisé est plus grand, avec 31 cas entre 1994 et 1998. La distribution des cas d'infection récente déclarés est présentée aux pages T125 à T132, tandis que celle des syphilis anciennes est à la page T131. On remarquera que le nombre de cas d'infections récentes était inférieur à dix en 1997, n'était que de trois en 1998 et de deux au 14 août 1999.

Nombre de cas déclarés d'infection syphilitique « ancienne » devenue symptomatique par type de syphilis et sexe, Québec (1994-1998)

Type de syphilis	Sexe inconnu	Hommes	Femmes	Total
Cardiovasculaire	0	1	1	2
Neurologique symptomatique	0	11	5	16
Symptomatique tardive	0	2	1	3
Total	0	14	7	21

Nombre de cas déclarés d'infection syphilitique « récente »⁽¹⁾ et ancienne asymptomatique par type de syphilis et sexe, Québec (1994-1998)

Type de syphilis	Nb de cas « sexe manquant »	Femmes		Hommes		Nb total de cas
		Nb de cas	Âge médian	Nb de cas	Âge médian	
Primaire	0	4 ⁽²⁾	30	19 ⁽³⁾	36	23
Secondaire	0	3	22	12	47,5	15
Latente (1 an ou moins)	0	8	30,5	8	38	16
Latente (> 1 an)	0	115 ⁽⁴⁾	55	109 ⁽⁵⁾	42	224
Neurologique asymptomatique	0	7	80	11	42	18
Total	0	137		159		296

(1) 1 cas congénital : déclaré en 1994 chez un nourrisson à Montréal.

(2) 50 % des cas chez les 15-34 ans.

(3) 47 % des cas chez les 15-34 ans.

(4) 58 % des cas chez les 40 ans ou plus.

(5) 61 % des cas chez les 40 ans ou plus.

4

Discussion

Les limites du système MADO

Au 31 décembre 1998, un total de 102 019 cas de chlamydirose, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis avaient été déclarés depuis 1990 dans le système des maladies à déclaration obligatoire. Ce système de surveillance passif a ses limites et l'interprétation des tendances qu'on en dégage doit tenir compte de plusieurs facteurs dont :

- la disponibilité régionale des nouveaux tests diagnostics ;
- les activités régionales de prévention et de promotion de la santé ;
- l'évolution des pratiques médicales ;
- l'application des définitions nosologiques ;
- les changements de procédures de saisie, de validation et de nettoyage de données.

La vérification systématique de la validité des cas déclarés et l'évaluation de la sous-déclaration permettraient de mesurer l'ampleur de certains de ces biais potentiels.

Validité des observations

Les données d'incidence issues du système MADO n'indiquent pas le rythme réel de la propagation des pathogènes surveillés. L'analyse des données recueillies dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles nous indique en effet qu'entre 1993 et 1995, il y avait chez les femmes et chez les hommes, respectivement, 1,6 et 4,3 fois plus de cas traités que de cas déclarés dans les banques MADO¹. La mise à jour de ces données indique que ces proportions se sont maintenues en 1996 et 1997.

Les données issues de la banque du programme de gratuité des médicaments ont toutefois leurs propres limites. Il s'agit d'une banque de données administratives dans laquelle le diagnostic n'est pas disponible. De plus, les observations tirées de cette source

1. C. POULIN, M. ALARY, M.C. AUDET, *Évaluation du programme de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement*. 1^{er} avril 1992-31 décembre 1995. Rapport de recherche déposé au CQCS.

ne sont représentatives que des personnes qui ont décidé de profiter de ce programme et non de toutes les personnes infectées. Elle nous permet toutefois de confirmer que les taux observés à partir des banques MADO sont d'importantes sous-estimations des taux d'incidence réels.

Les taux d'incidence des hépatites B continuent de descendre cette année. La syphilis n'est pour ainsi dire plus détectée, seulement trois cas d'infection récente (tous validés) ayant été déclarés en 1998. La section qui suit traite de l'évolution de la chlamydie et de la gonorrhée ces dernières années.

Les chlamydioses

Comme presque partout au Canada, les taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie et de gonorrhée ont récemment augmenté au Québec (tel qu'on l'a constaté à la dernière réunion nationale ayant traité des stratégies et des objectifs canadiens dans la recherche sur les MTS à Ottawa, les 25 et 26 février 1999).

Déjà en 1997, on remarquait que le rythme de la baisse des taux d'incidence de la chlamydie continuait de ralentir. On notait dans un rapport antérieur que la baisse moins marquée observée chez les hommes reflétait probablement mieux l'évolution de la maladie dans la population générale. Le début des activités de surveillance de cette maladie, en 1988, s'est fait de concert avec plusieurs programmes de dépistage (devenus plus accessibles). Cela a mené à la détection initiale d'un mélange de cas incidents, mais aussi prévalents chez les femmes. Celles-ci ont souvent des infections silencieuses qui ne sont détectées qu'à l'occasion de visites médicales faites pour d'autres raisons. Le bassin de ces cas, infectés depuis quelques années, a rapidement diminué à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

La baisse constante des taux d'incidence provinciaux s'est toutefois arrêtée chez les hommes entre 1997 et 1998. Nous observons en 1997 une augmentation des taux d'incidence dans cinq régions sociosanitaires. En 1998, elle persiste dans les mêmes régions et en touche neuf nouvelles (parmi lesquelles certaines ont de petits nombres de cas). Pour la première fois depuis dix ans, les taux d'incidence provinciaux augmentent, en particulier chez les hommes, mais aussi chez les femmes en 1998.

En 1999, les données de monitoring des cas rapportés à chaque période nous indiquent que l'augmentation persiste. Comparativement à la période correspondante en 1998, les nombres de cas déclarés dans les régions de Montréal et de Lanaudière avaient augmenté respectivement d'environ 21 % et 53 % au milieu de l'été 1999.

Comment interpréter ces tendances ? Relèvent-elles d'une accélération de l'épidémie, d'une meilleure détection des cas ou d'une meilleure déclaration des cas détectés ?

Nous n'avons pas de raison de croire que la sous-déclaration des cas détectés ait varié de façon importante ces dernières années. Une meilleure détection des cas nous semble plausible. Les tests d'amplification génique maintenant disponibles sont plus sensibles et spécifiques que les méthodes immuno-enzymatiques, d'immunofluorescence ou de culture cellulaire pour la recherche de *Chlamydia trachomatis*. Une meilleure sensibilité des nouveaux tests pourrait engendrer en un nombre plus grand de tests positifs trouvés, surtout si de nombreux laboratoires amélioreraient la spécificité de leurs tests immunoenzymatiques par des méthodes d'immunobloquage, réduisant ainsi le nombre de résultats faussement positifs.

Nous avons tenté de mesurer dans chaque région la proportion des tests faits par amplification génique au cours des dernières années. Nous voulions aussi mesurer la proportion des tests trouvés positifs. Malheureusement, le personnel de plusieurs laboratoires n'est pas encore en mesure de produire facilement ces données.

Toutefois, la grande majorité des laboratoires médicaux de la région de Montréal disposaient des données demandées pour 1997 et 1998 et il semble que l'amplification génique n'ait pas amené d'augmentation marquée de la positivité des tests (environ 3 %). On observe par contre à Montréal une augmentation marquée en 1998 du nombre de tests demandés (près de 8 500 tests excédentaires pour 1997). Celle-ci de plus de 10 %, pourrait expliquer à elle seule l'augmentation du nombre de cas détectés. Cela n'exclut pas pour autant la possibilité qu'il y ait une réelle augmentation de la vitesse de transmission de cette maladie.

Les tests d'amplification génique peuvent être faits sur des échantillons d'urine dont le prélèvement est très peu invasif. Cela n'explique toutefois pas l'augmentation observée dans le nombre de tests faits en 1998 puisque très peu de laboratoires offrent pour l'instant le dépistage à partir de prélèvements urinaires (dont la préparation au laboratoire coûte plus cher). Certains médecins sont toutefois au fait de la meilleure performance des nouveaux tests et en prescrivent peut-être plus qu'auparavant, même si les analyses urinaires ne sont pas encore largement disponibles.

Pour certaines régions, il est possible que l'augmentation du nombre de cas déclarés soit en partie due aux activités de dépistage dans les milieux de vie des personnes à risque et aux activités de notifications des partenaires. Des activités de ce type ont été menées en particulier en Estrie, en Outaouais et à Québec. Il nous est impossible de déterminer la proportion des cas excédentaires attribuables à ces activités.

Nous avons aussi reçu suffisamment de réponses au sondage concernant l'amplification génique des régions de l'Outaouais, de l'Abitibi, de la Côte-Nord et des Laurentides. Parmi celles-ci, des augmentations de cas déclarés de chlamydie sont observées partout, sauf en Abitibi. Dans les trois autres régions, les augmentations observées reposent sur de trop petits nombres de cas (ou sur des approximations) pour qu'on puisse mesurer l'effet de l'implantation des tests géniques. Dans ces régions, le volume de tests n'a pas augmenté entre 1997 et 1998.

Une partie de l'accroissement observé à Montréal est attribuable à l'augmentation des activités de dépistage, mais il reste à savoir quelle proportion de l'augmentation de l'incidence est attribuable à ces activités, à Montréal comme ailleurs. Il sera important d'étudier ce phénomène : il est possible que le nombre de tests augmente encore, au fur et à mesure que les laboratoires offriront la détection des MTS par des moyens non invasifs. En 1998, plus du tiers des laboratoires médicaux interrogés traitaient leurs prélèvements par amplification génique. En 2000, ce sera plus de la moitié.

Les gonorrhées

Après avoir chuté fortement entre 1985 et 1989, le taux d'incidence de la gonorrhée a semblé atteindre un niveau plancher au milieu des années 1990.

On pense toucher maintenant à la transmission dans les « groupes noyaux » dont le risque de contracter la maladie est plus élevé. Or, le Canada et le Québec visent maintenant l'éradication de la transmission indigène de cette infection. Il faudra donc cibler les campagnes auprès des individus à risque et y consacrer les ressources nécessaires si on veut réduire le taux de 6,6 par 100 000 PA observé en 1998.

Le plus petit nombre de cas déclarés rend les taux d'incidence plus fluctuants. Il est possible que l'augmentation observée chez les hommes en 1997 ne soit qu'une fluctuation autour d'un taux stable.

Nous observons toutefois en 1999 une augmentation du nombre de cas de gonorrhée déclarés jusqu'au 19 juin 1999. Cette augmentation touche surtout les hommes. Elle est observée à nouveau dans les régions qui présentaient des augmentations en 1997, soit Montréal, Québec et la Montérégie. S'ajoutent en 1999 les régions de l'Outaouais et de Lanaudière. Les données de 1999 sont toutefois celles des banques MADO encore ouvertes et auxquelles des corrections sont apportées tous les jours. La surveillance par période génère ainsi des données moins solides qui doivent être interprétées avec prudence, pour la gonorrhée comme pour la chlamydie.

La transmission de la gonorrhée est-elle en voie d'accélération au Québec ? Il est possible que nous observions des flambées locales au sein de groupes à risque. Il est aussi possible que d'autres facteurs (tels que la meilleure détection ou la meilleure déclaration des cas) jouent des rôles qui restent à mesurer. Nous disposons de moins de données que dans le cas de la chlamydia, mais nous resterons vigilants quant à l'instabilité observée des taux.



Conclusion

Les tendances des MTS observées par le système MADDO indiquent une hausse de l'incidence de la chlamydie et de la gonorrhée. Les tendances décrites ici sont toutefois celles de sous-estimations importantes des taux réels puisque le système de surveillance souffre beaucoup de sous-déclaration. Le « traitement épidémiologique » par exemple (antibiothérapie syndromique sans test de laboratoire) est tout à fait indiqué pour de nombreux patients mais ceux-ci ne sont alors pas inscrits dans le système de déclaration.

Nous pouvons toutefois pointer des situations préoccupantes. Les augmentations d'incidence devront être recherchées au moyen de sources de données complémentaires puisqu'elles demeurent pour l'instant possiblement attribuables à une augmentation réelle de la vitesse de transmission de la chlamydie et de la gonorrhée.

Un surplus d'activités de dépistage pourrait causer une augmentation de l'incidence des cas déclarés. Cette augmentation pourrait masquer une baisse du taux réel ou aller de pair avec une hausse de ce taux.

Des fluctuations normales autour d'un taux d'incidence de cas déclarés stable pourraient aussi expliquer les tendances observées. Si tel est le cas, nous aurons à faire plus et mieux si nous voulons voir l'incidence de ces maladies baisser encore.

Nous devons être en mesure à court terme de mieux interpréter ces tendances, surtout si les augmentations observées persistent.

Vos commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez les faire parvenir à M. Raymond Parent au (418) 666-7000 (poste 218), ou à : rparent@cspq.qc.ca

Mesures des tendances centrales de l'âge des cas déclarés par sexe et type de maladie, Québec (1998)

	Chlamydiae	Gonorrhée	Hépatite B (1)	Hépatite B aiguë	Hépatite B chronique	Syphilis récente (2)	Syphilis ancienne (3)	Total des cas
Femmes								
Nombre de cas (4)	5 207	111	512	59	413	1	20	5 854
Age (années)								
médian	20	20	34	32	34		73	21
moyen	21,9	22,1	36,5	34,9	36,1		63,6	23,3
écart-type	6	8,1	16,8	18	16,3		24,8	9,1
étendue totale	<1-90	7-62	<1-90	<1-85	<1-90		25-92	<1-92
étendue 1er-99e percentile	14-43	14-55	<1-83	<1-85	<1-78		25-92	14-61
Hommes								
Nombre de cas (4)	1 952	361	810	119	568	2	19	3 149
Age (années)								
médian	24	31	39	38	40		49	27
moyen	25,9	32,2	39,7	39,4	39,8		49,8	30,4
écart-type	7,6	9,3	13,7	14,1	13,9		17,7	11,6
étendue totale	<1-88	<1-83	<1-78	<1-76	<1-78		22-84	<1-88
étendue 1er-99e percentile	16-51	18-57	7-73	6-72	6-73		22-84	15-66
Valeurs-p								
vs moyennes (5)	0,0001	<0,0001	0,0003	0,1012	0,0002		0,546	0,0001
vs médianes (6)	0,0001	0,0001	0,0001	0,0142	0,0001		0,0616	0,0001

(1): Total des cas


(2): Syphilis primaire, secondaire et latente de moins d'un an. L'homme infecté avait 31 ans et les deux femmes, 33 et 39 ans.

(3): Syphilis latente de plus d'un an et cérébrale asymptomatique.

(4): Nombre de cas pour lesquels les données étaient disponibles pour les calculs.

(5): Test de Student comparant la moyenne d'âge des cas déclarés chez les femmes à celle des cas déclarés chez les hommes.


(6): Test de Wilcoxon comparant la médiane d'âge des cas déclarés chez les femmes à celle des cas déclarés chez les hommes.



Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	5840	2074	11	7925
1995	5295	1768	11	7074
1996	5018	1654	9	6681
1997	4817	1635	14	6466
1998	5269	1981	14	7264

**Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose
(1995-1998), Province de Québec**




Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence *

	Femmes	Hommes	Total
1995	-10,1	-15,5	-11,5
1996	-6,0	-7,2	-6,3
1997	-4,7	-1,9	-4,0
1998	8,6	20,2	11,5


*: (taux année courante)-(taux année antérieure)/(taux année antérieure) *100

Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région du Bas-St-Laurent



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1993	139	79	0	218
1994	131	74	0	205
1995	98	66	0	164
1996	118	64	0	182
1998	144	101	0	245


NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	304	109	3	416
1995	280	90	3	373
1996	277	83	5	365
1997	195	72	5	272
1998	206	72	3	281

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise

Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose par sexe (1994-1998)
Région de Québec



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	548	201	0	749
1995	416	148	0	564
1996	413	159	0	572
1997	472	177	0	649
1998	534	211	0	745

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région de la Mauricie/Bois-Francs



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	354	144	0	498
1995	272	126	0	398
1996	318	95	0	413
1997	254	90	0	344
1998	318	140	2	460

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région de l'Estrie



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	216	83	0	299
1995	239	73	0	312
1996	235	70	0	305
1997	202	76	0	278
1998	198	98	1	297

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région de Montréal centre



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	1341	464	5	1810
1995	1336	441	7	1784
1996	1267	447	4	1718
1997	1344	483	8	1835
1998	1502	576	7	2085

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région de l'Outaouais



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	310	68	0	378
1995	270	60	0	330
1996	228	50	0	278
1997	187	50	0	237
1998	223	59	0	282

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région de l'Abitibi/Témiscamingue



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	266	96	0	362
1995	208	85	0	293
1996	210	76	0	286
1997	173	48	0	221
1998	147	49	0	196

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région de la Côte-Nord



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	226	74	0	300
1995	225	65	0	290
1996	197	64	0	261
1997	146	68	0	214
1998	173	55	0	228

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région Nord-du-Québec



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	25	17	0	42
1995	28	6	0	34
1996	15	8	0	23
1997	10	3	0	13
1998	12	1	0	13

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région de la Gaspésie/Iles de la Madeleine



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	79	29	1	109
1995	62	18	0	80
1996	60	10	0	70
1997	42	14	0	56
1998	22	9	0	31

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région Chaudière/Appalaches



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	165	66	0	231
1995	116	47	0	163
1996	160	59	0	219
1997	145	69	0	214
1998	172	60	0	232

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région de Laval



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	199	82	2	283
1995	165	72	1	238
1996	132	50	0	182
1997	187	47	0	234
1998	200	84	0	284

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région de Lanaudière



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	236	89	0	325
1995	169	60	0	229
1996	176	63	0	239
1997	221	52	0	273
1998	189	66	0	255

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région des Laurentides



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	356	139	0	495
1995	332	110	0	442
1996	298	86	0	384
1997	273	63	0	336
1998	299	97	0	396


NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise

Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1994-1998)
Région de la Montérégie




Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	759	282	0	1041
1995	738	235	0	973
1996	590	196	0	786
1997	588	183	1	772
1998	651	217	1	869

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise




Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	218	49	0	267
1995	205	50	0	255
1996	261	65	0	326
1997	193	66	0	259
1998	158	72	0	230

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	99	3	0	102
1995	103	8	0	111
1996	83	7	0	90
1997	67	10	0	77
1998	121	14	0	135

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise



Nombre de cas déclarés de chlamydie par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1994 139	79	0	218
	1995 131	74	0	205
	1996 98	66	0	164
	1997 118	64	0	182
	1998 144	101	0	245
Saguenay/Lac St-Jean	1994 304	109	3	416
	1995 280	90	3	373
	1996 277	83	5	365
	1997 195	72	5	272
	1998 206	72	3	281
Québec	1994 548	201	0	749
	1995 416	148	0	564
	1996 413	159	0	572
	1997 472	177	0	649
	1998 534	211	0	745
Mauricie/Bois-Francis	1994 354	144	0	498
	1995 272	126	0	398
	1996 318	95	0	413
	1997 254	90	0	344
	1998 318	140	2	460
Estrie	1994 216	83	0	299
	1995 239	73	0	312
	1996 235	70	0	305
	1997 202	76	0	278
	1998 198	98	1	297
Montréal centre	1994 1341	464	5	1810
	1995 1336	441	7	1784
	1996 1267	447	4	1718
	1997 1344	483	8	1835
	1998 1502	576	7	2085
Outaouais	1994 310	68	0	378
	1995 270	60	0	330
	1996 228	50	0	278
	1997 187	50	0	237
	1998 223	59	0	282
Abitibi/Témiscamingue	1994 266	96	0	362
	1995 208	85	0	293
	1996 210	76	0	286
	1997 173	48	0	221
	1998 147	49	0	196
Côte-Nord	1994 226	74	0	300
	1995 225	65	0	290
	1996 197	64	0	261
	1997 146	68	0	214
	1998 173	55	0	228
Nord-du-Québec	1994 25	17	0	42
	1995 28	6	0	34
	1996 15	8	0	23
	1997 10	3	0	13
	1998 12	1	0	13

Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1994 79	29	1	109
	1995 62	18	0	80
	1996 60	10	0	70
	1997 42	14	0	56
	1998 22	9	0	31
Chaudière/Appalaches	1994 165	66	0	231
	1995 116	47	0	163
	1996 160	59	0	219
	1997 145	69	0	214
	1998 172	60	0	232
Laval	1994 199	82	2	283
	1995 165	72	1	238
	1996 132	50	0	182
	1997 187	47	0	234
	1998 200	84	0	284
Lanaudière	1994 236	89	0	325
	1995 169	60	0	229
	1996 176	63	0	239
	1997 221	52	0	273
	1998 189	66	0	255
Laurentides	1994 356	139	0	495
	1995 332	110	0	442
	1996 298	86	0	384
	1997 273	63	0	336
	1998 299	97	0	396
Montréal	1994 759	282	0	1041
	1995 738	235	0	973
	1996 590	196	0	786
	1997 588	183	1	772
	1998 651	217	1	869
Nunavik	1994 218	49	0	267
	1995 205	50	0	255
	1996 261	65	0	326
	1997 193	66	0	259
	1998 158	72	0	230
Terres Cries/Baie-James	1994 99	3	0	102
	1995 103	8	0	111
	1996 83	7	0	90
	1997 67	10	0	77
	1998 121	14	0	135
Province de Québec	1994 5840	2074	11	7925
	1995 5295	1768	11	7074
	1996 5018	1654	9	6681
	1997 4817	1635	14	6466
	1998 5269	1981	14	7264

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total	
Bas St-Laurent	1994	132,6	77,4	0,0	105,4
	1995	125,5	73,0	0,0	99,7
	1996	94,4	65,6	0,0	80,2
	1997	114,2	64,1	0,0	89,6
	1998	140,1	101,9	0,0	121,4
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	208,8	74,8	1,0	142,8
	1995	192,8	62,0	1,0	128,4
	1996	191,4	57,4	1,7	126,1
	1997	135,2	50,0	1,7	94,4
	1998	143,4	50,2	1,0	97,9
Québec	1994	166,0	64,5	0,0	116,7
	1995	125,4	47,3	0,0	87,5
	1996	123,9	50,6	0,0	88,4
	1997	141,1	56,2	0,0	99,9
	1998	159,0	66,7	0,0	114,2
Mauricie/ Bois-Francs	1994	144,3	60,2	0,0	102,8
	1995	110,5	52,5	0,0	81,8
	1996	128,7	39,4	0,0	84,6
	1997	102,5	37,2	0,0	70,2
	1998	128,0	57,6	0,4	93,6
Estrie	1994	152,2	60,3	0,0	107,0
	1995	167,5	52,8	0,0	111,0
	1996	163,9	50,4	0,0	108,0
	1997	140,2	54,5	0,0	98,0
	1998	136,8	69,9	0,4	104,3
Montréal centre	1994	140,4	52,5	0,3	98,4
	1995	139,5	49,7	0,4	96,7
	1996	131,9	50,2	0,2	92,8
	1997	139,5	54,0	0,4	98,8
	1998	155,4	64,2	0,4	111,9
Outaouais	1994	200,8	44,5	0,0	123,1
	1995	171,8	38,6	0,0	105,5
	1996	142,6	31,6	0,0	87,4
	1997	115,0	31,1	0,0	73,3
	1998	134,9	36,2	0,0	85,9
Abitibi/ Témiscamingue	1994	344,9	119,1	0,0	229,5
	1995	269,1	105,0	0,0	185,2
	1996	271,0	93,6	0,0	180,2
	1997	222,9	58,9	0,0	138,9
	1998	189,0	59,9	0,0	122,9
Côte-Nord	1994	442,9	136,7	0,0	285,2
	1995	442,4	120,4	0,0	276,6
	1996	388,7	118,9	0,0	249,7
	1997	289,2	126,7	0,0	205,5
	1998	344,0	102,9	0,0	219,8
Nord-du- Québec	1994	257,0	159,4	0,0	206,0
	1995	289,6	56,7	0,0	167,9
	1996	155,9	76,0	0,0	114,2
	1997	104,5	28,6	0,0	64,9
	1998	125,9	9,6	0,0	65,1

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la madeleine	1994	149,7	54,6	0,9	103,0
	1995	118,5	34,2	0,0	76,2
	1996	115,6	19,2	0,0	67,3
	1997	81,6	27,1	0,0	54,3
	1998	43,1	17,6	0,0	30,3
Chaudière/ Appalaches	1994	86,3	34,5	0,0	60,4
	1995	60,4	24,4	0,0	42,4
	1996	83,1	30,6	0,0	56,8
	1997	75,1	35,6	0,0	55,3
	1998	88,8	30,9	0,0	59,8
Laval	1994	116,8	49,0	0,6	83,8
	1995	95,4	42,5	0,3	69,5
	1996	75,3	29,1	0,0	52,4
	1997	105,3	27,0	0,0	66,6
	1998	111,3	47,7	0,0	79,8
Lanaudière	1994	128,2	47,5	0,0	87,5
	1995	89,8	31,3	0,0	60,3
	1996	91,6	32,1	0,0	61,6
	1997	112,8	26,0	0,0	68,9
	1998	94,7	32,3	0,0	63,2
Laurentides	1994	167,9	65,1	0,0	116,4
	1995	152,7	50,2	0,0	101,3
	1996	133,9	38,3	0,0	85,9
	1997	119,9	27,4	0,0	73,4
	1998	128,5	41,3	0,0	84,7
Montréal	1994	115,9	43,6	0,0	80,0
	1995	111,0	35,7	0,0	73,6
	1996	87,4	29,4	0,0	58,5
	1997	85,8	27,0	0,1	56,7
	1998	93,7	31,6	0,1	62,9
Nunavik	1994	5011,5	1095,5	0,0	3026,2
	1995	4517,4	1087,0	0,0	2790,5
	1996	5532,0	1376,0	0,0	3452,7
	1997	3946,0	1362,8	0,0	2660,8
	1998	3130,6	1451,9	0,0	2298,6
Terres Cries/ Baie-James	1994	2410,5	67,7	0,0	1194,9
	1995	2538,2	181,0	0,0	1309,4
	1996	2068,8	159,2	0,0	1070,2
	1997	1684,7	228,5	0,0	921,7
	1998	3078,9	321,5	0,0	1629,6
Province de Québec	1994	158,3	57,8	0,2	108,9
	1995	142,4	48,9	0,1	96,4
	1996	133,8	45,3	0,1	90,3
	1997	127,5	44,5	0,2	86,7
	1998	138,5	53,5	0,2	96,7

Nombre de cas déclarés de chlamydie par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	2	1	62	91	23	18	12	5	1	0	3	218
	1995	0	0	76	85	28	6	5	4	0	0	1	205
	1996	1	1	54	63	18	12	5	3	3	0	4	164
	1997	0	2	58	83	23	12	2	2	0	0	0	182
	1998	2	0	85	104	28	14	5	7	0	0	0	245
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	1	6	137	153	57	21	13	8	0	0	20	416
	1995	1	3	133	142	39	25	5	7	2	1	15	373
	1996	1	6	160	121	34	16	8	6	2	0	11	365
	1997	1	0	88	106	39	11	11	5	0	0	11	272
	1998	0	2	88	103	35	25	9	4	2	2	11	281
Québec	1994	1	7	204	276	133	48	34	26	4	2	14	749
	1995	0	4	155	231	94	40	15	13	2	1	9	564
	1996	2	5	154	258	73	38	11	20	6	2	3	572
	1997	1	5	189	269	84	54	18	20	3	4	2	649
	1998	0	5	224	278	120	58	36	15	4	2	3	745
Mauricie/ Bois-Francis	1994	1	3	161	158	83	42	22	16	1	3	8	498
	1995	0	4	131	149	44	35	16	17	1	1	0	398
	1996	1	6	136	138	61	28	18	18	3	2	2	413
	1997	1	3	123	130	50	15	11	3	0	1	7	344
	1998	0	5	123	203	72	29	11	8	1	0	8	460
Estrie	1994	0	8	100	120	28	21	12	5	3	1	1	299
	1995	0	1	110	119	41	15	8	8	4	2	4	312
	1996	2	1	90	120	45	20	11	14	2	0	0	305
	1997	1	1	96	106	42	11	17	3	1	0	0	278
	1998	0	1	91	125	42	18	15	5	0	0	0	297
Montréal centre	1994	10	20	566	592	273	162	69	66	6	5	41	1810
	1995	6	24	534	629	271	157	60	44	10	2	47	1784
	1996	5	14	469	607	285	155	64	47	12	2	58	1718
	1997	4	20	538	623	295	139	71	57	11	4	73	1835
	1998	1	18	624	762	332	154	82	35	15	2	60	2085
Outaouais	1994	0	3	119	124	60	31	20	17	2	0	2	378
	1995	1	1	96	125	46	25	20	12	2	0	2	330
	1996	2	3	95	96	43	16	7	6	0	0	10	278
	1997	0	3	70	90	39	14	11	4	1	0	5	237
	1998	2	4	81	97	52	17	10	7	7	0	5	282
Abitibi/ Témiscamingue	1994	2	7	159	91	48	31	14	6	3	1	0	362
	1995	3	4	115	78	47	23	9	11	2	1	0	293
	1996	2	1	111	103	25	28	8	5	2	1	0	286
	1997	0	6	100	62	31	11	7	3	1	0	0	221
	1998	0	2	94	60	23	15	1	1	0	0	0	196
Côte-Nord	1994	3	11	113	81	50	24	9	8	1	0	0	300
	1995	4	5	113	83	55	20	6	3	0	1	0	290
	1996	0	5	94	91	33	26	9	2	0	0	1	261
	1997	2	6	79	72	27	14	9	2	1	0	2	214
	1998	1	8	75	76	39	18	6	3	0	1	1	228
Nord-du Québec	1994	1	1	16	12	7	4	0	0	0	0	1	42
	1995	0	0	21	7	0	2	2	1	0	0	1	34
	1996	0	0	6	10	3	3	0	0	1	0	0	23
	1997	0	0	8	1	2	1	1	0	0	0	0	13
	1998	0	0	7	3	0	1	1	1	0	0	0	13

Nombre de cas déclarés de chlamydie par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1994-1998) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0	2	29	31	16	13	7	6	1	0	4	109
	1995	0	1	21	28	8	12	6	0	1	1	2	80
	1996	0	1	22	30	5	8	2	1	0	0	1	70
	1997	1	1	19	12	10	3	3	5	0	0	2	56
	1998	0	0	8	9	7	3	1	2	1	0	0	31
Chaudière/ Appalaches	1994	0	1	74	69	40	22	12	9	0	0	4	231
	1995	1	0	44	62	34	11	5	3	2	0	1	163
	1996	0	1	67	80	33	21	12	3	0	1	1	219
	1997	0	0	71	73	33	17	12	2	1	0	5	214
	1998	1	2	62	95	35	22	5	5	1	0	4	232
Laval	1994	2	4	122	86	33	18	7	5	3	2	1	283
	1995	3	2	85	86	36	16	4	4	1	0	1	238
	1996	0	2	71	64	20	10	8	5	1	1	0	182
	1997	1	4	99	79	28	9	5	6	2	0	1	234
	1998	0	5	94	105	41	18	11	4	2	3	1	284
Lanaudière	1994	4	4	122	86	48	23	16	16	2	1	3	325
	1995	1	8	81	70	31	12	9	13	2	0	2	229
	1996	0	2	101	83	26	10	10	6	0	0	1	239
	1997	2	1	108	91	23	21	8	9	0	0	10	273
	1998	0	10	101	85	32	11	10	4	1	0	1	255
Laurentides	1994	2	9	172	177	64	22	27	13	6	0	3	495
	1995	2	6	143	156	77	23	26	7	2	0	0	442
	1996	1	6	132	136	47	21	22	5	13	1	0	384
	1997	0	4	120	108	64	13	18	6	3	0	0	336
	1998	0	3	135	144	57	18	23	12	3	1	0	396
Montérégie	1994	4	16	379	335	130	74	44	32	10	1	16	1041
	1995	2	14	360	356	125	59	22	22	5	2	6	973
	1996	1	9	277	280	110	46	18	31	5	0	9	786
	1997	0	8	288	279	98	45	20	19	10	1	4	772
	1998	0	9	339	329	111	42	20	14	3	1	1	869
Nunavik	1994	2	10	84	90	47	16	8	5	2	1	2	267
	1995	1	2	64	80	53	35	11	5	1	2	1	255
	1996	1	5	90	89	68	42	16	10	4	1	0	326
	1997	0	7	61	77	45	43	15	8	2	1	0	259
	1998	2	8	49	57	43	36	26	7	0	0	2	230
Terres Cries/ Baie James	1994	0	3	42	32	16	7	0	0	0	0	2	102
	1995	0	3	40	43	19	3	0	1	0	0	2	111
	1996	0	4	30	35	13	5	0	1	1	0	1	90
	1997	0	0	29	26	17	3	2	0	0	0	0	77
	1998	0	1	45	45	27	9	1	3	2	0	2	135
Province de Québec	1994	35	116	2661	2604	1156	597	326	243	45	17	125	7925
	1995	25	82	2322	2529	1048	519	229	175	37	14	94	7074
	1996	19	72	2159	2404	942	505	229	183	55	11	102	6681
	1997	14	71	2144	2287	950	436	241	154	36	11	122	6466
	1998	9	83	2325	2680	1096	508	273	137	42	12	99	7264

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1994	16,7	3,5	395,6	769,4	189,7	107,8	64,0	15,3	4,9	0,0	1,5	105,4
	1995	0,0	0,0	482,0	706,3	249,3	37,7	27,1	12,0	0,0	0,0	0,5	99,7
	1996	9,1	3,7	341,3	519,9	166,6	81,1	27,4	8,9	13,4	0,0	2,0	80,2
	1997	0,0	7,7	371,0	678,4	217,9	87,2	11,4	5,8	0,0	0,0	0,0	89,6
	1998	19,9	0,0	561,4	829,9	268,5	111,1	29,4	20,0	0,0	0,0	0,0	121,4
Saguenay/Lac St-Jean	1994	5,4	13,6	564,3	851,0	307,3	81,1	46,5	18,2	0,0	0,0	6,9	142,8
	1995	5,6	7,1	536,1	771,9	224,7	100,2	18,1	15,5	6,7	2,4	5,2	128,4
	1996	5,8	14,7	643,7	636,7	203,2	68,6	29,1	13,1	6,5	0,0	3,8	126,1
	1997	6,0	0,0	358,8	536,3	237,0	51,0	41,0	10,6	0,0	0,0	3,8	94,4
	1998	0,0	5,2	367,6	504,8	212,8	127,0	34,5	8,3	6,0	4,5	3,8	97,9
Québec	1994	2,7	9,6	482,7	607,8	268,9	84,4	58,4	25,2	5,8	1,9	2,2	116,7
	1995	0,0	5,5	364,1	516,8	197,3	71,4	25,7	12,3	2,8	0,9	1,4	87,5
	1996	5,7	7,0	359,8	585,1	157,2	69,9	18,8	18,6	8,0	1,8	0,5	88,4
	1997	2,9	7,0	443,0	608,9	185,6	103,2	31,0	18,3	3,8	3,5	0,3	99,9
	1998	0,0	7,0	534,4	626,0	271,6	116,0	62,6	13,5	4,8	1,7	0,5	114,2
Mauricie/Bois-Francis	1994	3,4	4,6	466,6	554,8	263,7	103,2	51,2	21,6	2,0	3,4	1,7	102,8
	1995	0,0	6,3	370,5	516,1	146,9	88,6	37,1	22,4	1,9	1,1	0,0	81,8
	1996	3,6	9,6	380,2	467,2	210,6	73,7	41,8	23,2	5,5	2,2	0,4	84,6
	1997	3,7	4,9	342,6	427,2	176,6	41,7	25,7	3,8	0,0	1,1	1,4	70,2
	1998	0,0	8,2	347,9	644,1	258,7	85,4	26,1	9,9	1,7	0,0	1,6	93,6
Estrie	1994	0,0	21,1	489,8	653,4	143,3	90,7	50,7	11,9	10,8	2,1	0,4	107,0
	1995	0,0	2,7	531,9	643,8	218,4	66,0	33,6	18,6	13,7	4,1	1,4	111,0
	1996	11,6	2,7	430,0	643,2	246,0	91,2	45,9	31,9	6,5	0,0	0,0	108,0
	1997	5,9	2,7	460,3	553,6	236,0	51,8	71,5	6,7	3,1	0,0	0,0	98,0
	1998	0,0	2,7	443,1	634,0	241,1	89,1	63,3	11,0	0,0	0,0	0,0	104,3
Montréal centre	1994	9,0	10,7	543,7	451,7	165,9	95,1	45,0	25,3	3,1	1,4	2,2	98,4
	1995	5,4	12,7	509,3	491,9	172,2	92,5	38,5	16,5	5,1	0,5	2,5	96,7
	1996	4,6	7,3	442,0	483,1	188,0	93,0	40,3	17,3	5,9	0,5	3,1	92,8
	1997	3,8	10,2	505,7	495,1	202,7	85,2	44,6	20,7	5,3	1,1	3,9	98,8
	1998	1,0	9,0	585,5	599,2	236,1	97,7	51,3	12,5	7,0	0,5	3,2	111,9
Outaouais	1994	0,0	7,2	591,8	584,7	233,1	101,2	68,0	35,9	6,9	0,0	0,7	123,1
	1995	4,4	2,3	472,8	584,5	186,4	81,2	66,1	24,4	6,6	0,0	0,6	105,5
	1996	8,9	6,9	461,1	446,4	178,7	52,6	22,6	11,8	0,0	0,0	3,1	87,4
	1997	0,0	6,8	334,1	413,3	164,8	47,1	35,1	7,6	2,9	0,0	1,5	73,3
	1998	9,2	8,9	381,7	439,8	221,5	59,3	31,5	12,9	19,3	0,0	1,5	85,9
Abitibi/Témiscamingue	1994	17,2	29,0	1290,2	861,7	398,4	207,3	93,9	26,1	21,8	4,9	0,0	229,5
	1995	26,3	16,8	924,1	729,4	412,8	156,4	59,9	46,1	14,0	4,8	0,0	185,2
	1996	18,1	4,2	890,8	942,3	227,7	197,5	52,7	20,5	13,3	4,8	0,0	180,2
	1997	0,0	25,8	796,2	559,4	288,5	81,1	46,3	11,9	6,3	0,0	0,0	138,9
	1998	0,0	8,6	757,3	530,3	215,3	117,3	6,7	3,9	0,0	0,0	0,0	122,9
Côte-Nord	1994	41,2	73,2	1348,9	1067,5	583,2	241,6	92,2	49,0	9,1	0,0	0,0	285,2
	1995	56,6	34,2	1359,0	1090,7	683,1	204,2	62,0	18,0	0,0	8,5	0,0	276,6
	1996	0,0	35,1	1150,0	1186,0	429,4	274,2	92,4	11,9	0,0	0,0	1,0	249,7
	1997	30,4	43,0	990,1	930,4	360,4	153,8	94,6	11,7	8,3	0,0	1,9	205,5
	1998	15,7	58,3	969,9	976,2	530,6	208,6	63,7	17,4	0,0	7,7	1,0	219,8
Nord-du Québec	1994	51,7	28,1	871,5	839,7	457,2	191,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	206,0
	1995	0,0	0,0	1108,2	465,7	0,0	101,4	102,0	32,5	0,0	0,0	4,9	167,9
	1996	0,0	0,0	317,0	648,9	232,4	165,2	0,0	0,0	49,6	0,0	0,0	114,2
	1997	0,0	0,0	433,8	62,5	158,5	60,5	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9
	1998	0,0	0,0	379,0	181,1	0,0	67,0	53,8	31,0	0,0	0,0	0,0	65,1

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1994-1998) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0,0	14,2	369,1	460,8	234,3	145,5	73,4	36,2	9,2	0,0	3,8	103,0
	1995	0,0	7,3	276,3	412,9	124,3	140,3	63,7	0,0	8,9	5,4	1,9	76,2
	1996	0,0	7,6	294,7	443,7	81,2	99,3	21,3	5,8	0,0	0,0	1,0	67,3
	1997	18,2	7,8	259,0	179,9	165,6	39,7	33,0	28,8	0,0	0,0	1,9	54,3
	1998	0,0	0,0	112,9	136,7	117,0	43,1	11,3	11,5	7,9	0,0	0,0	30,3
Chaudière/Appalaches	1994	0,0	1,8	254,6	285,6	156,9	66,9	35,2	15,1	0,0	0,0	1,0	60,4
	1995	4,0	0,0	148,6	251,7	139,9	34,1	14,6	4,9	5,2	0,0	0,3	42,4
	1996	0,0	1,9	223,6	321,6	138,2	67,9	35,0	4,8	0,0	1,6	0,3	56,8
	1997	0,0	0,0	238,0	285,4	139,4	57,8	35,4	3,2	2,3	0,0	1,3	55,3
	1998	4,4	3,9	210,7	362,2	147,8	79,4	14,9	7,8	2,2	0,0	1,0	59,8
Laval	1994	8,8	9,2	551,1	381,1	126,6	56,8	22,9	9,8	8,0	4,0	0,3	83,8
	1995	13,4	4,5	375,8	385,3	142,8	50,8	12,7	7,6	2,6	0,0	0,3	69,5
	1996	0,0	4,5	307,5	289,6	80,8	32,4	24,8	9,3	2,5	1,9	0,0	52,4
	1997	4,6	8,8	423,2	354,6	115,8	29,9	15,3	10,9	4,8	0,0	0,3	66,6
	1998	0,0	10,8	398,3	463,6	173,0	61,9	33,4	7,0	4,7	5,3	0,3	79,8
Lanaudière	1994	14,5	7,3	479,0	416,9	183,1	62,1	43,3	27,2	5,5	2,1	0,8	87,5
	1995	3,7	14,2	310,3	326,1	123,2	32,3	23,7	21,2	5,2	0,0	0,5	60,3
	1996	0,0	3,5	375,5	375,1	104,8	27,5	25,4	9,5	0,0	0,0	0,3	61,6
	1997	7,6	1,7	396,7	393,8	93,0	59,4	20,0	13,8	0,0	0,0	2,5	68,9
	1998	0,0	16,9	369,2	354,1	129,1	32,4	24,7	5,9	2,1	0,0	0,2	63,2
Laurentides	1994	6,3	15,1	615,2	708,7	202,5	52,0	65,9	19,7	14,2	0,0	0,7	116,4
	1995	6,3	9,8	497,9	608,9	251,7	53,8	61,1	10,2	4,5	0,0	0,0	101,3
	1996	3,2	9,6	446,4	519,5	156,3	49,6	49,5	7,0	27,4	1,6	0,0	85,9
	1997	0,0	6,2	395,9	399,5	214,0	31,4	39,6	8,1	5,9	0,0	0,0	73,4
	1998	0,0	4,5	441,2	514,8	189,9	45,0	49,6	15,6	5,6	1,5	0,0	84,7
Montérégie	1994	4,4	9,0	410,3	395,0	134,8	61,7	36,9	15,4	7,5	0,6	1,2	80,0
	1995	2,2	7,8	382,3	416,0	132,9	49,2	18,1	10,3	3,6	1,1	0,5	73,6
	1996	1,1	5,0	290,0	322,4	117,9	39,1	14,4	14,3	3,4	0,0	0,7	58,5
	1997	0,0	4,4	300,9	314,0	105,8	39,2	15,9	8,6	6,3	0,5	0,3	56,7
	1998	0,0	4,9	355,6	361,8	120,0	37,8	15,8	6,2	1,8	0,5	0,1	62,9
Nunavik	1994	177,6	469,9	9940,8	10526,3	5615,3	2139,0	1307,2	635,3	422,8	242,7	22,7	3026,2
	1995	94,1	88,1	7529,4	9378,7	6148,5	4257,9	1760,0	567,5	221,7	432,9	10,9	2790,5
	1996	95,7	215,4	10181,0	10194,7	7709,8	5078,6	2305,5	1062,7	867,7	194,6	0,0	3452,7
	1997	0,0	298,9	6732,9	8415,3	5184,3	4976,9	2018,8	820,5	386,8	188,3	0,0	2660,8
	1998	182,0	345,6	5179,7	6202,4	4694,3	4230,3	3274,6	672,4	0,0	0,0	20,0	2298,6
Terres Cries/Baie James	1994	0,0	163,2	4692,7	3463,2	1968,0	998,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	1194,9
	1995	0,0	163,5	4651,2	4668,8	2339,9	443,1	0,0	130,0	0,0	0,0	23,6	1309,4
	1996	0,0	220,8	3654,1	3850,4	1629,1	704,2	0,0	131,2	185,2	0,0	11,9	1070,2
	1997	0,0	0,0	3485,6	3002,3	2063,1	432,3	352,7	0,0	0,0	0,0	0,0	921,7
	1998	0,0	57,5	5590,1	5590,1	3237,4	1291,2	170,4	365,0	366,3	0,0	24,1	1629,6
Province de Québec	1994	7,3	12,5	542,5	543,0	207,2	89,7	49,9	21,9	6,0	1,5	1,7	108,9
	1995	5,3	8,8	466,7	527,2	195,8	78,6	34,6	15,4	4,8	1,2	1,3	96,4
	1996	4,1	7,7	428,7	499,4	180,6	78,6	34,0	15,8	6,8	0,9	1,4	90,3
	1997	3,1	7,6	424,7	467,6	186,3	70,1	35,7	13,0	4,2	0,9	1,6	86,7
	1998	2,0	8,8	463,3	537,5	218,3	85,2	40,5	11,3	4,7	1,0	1,3	96,7

Nombre de cas déclarés de chlamydie chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	2	1	49	46	17	9	7	5	1	0	2	139
	1995	0	0	59	47	15	5	3	2	0	0	0	131
	1996	1	1	37	38	7	7	4	0	1	0	2	98
	1997	0	2	46	50	13	5	2	0	0	0	0	118
	1998	2	0	65	50	13	7	2	5	0	0	0	144
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0	6	123	108	24	12	10	6	0	0	15	304
	1995	1	3	115	97	31	15	2	3	1	1	11	280
	1996	0	6	146	85	20	7	5	2	1	0	5	277
	1997	1	0	78	73	21	4	6	3	0	0	9	195
	1998	0	1	75	77	21	13	7	3	1	1	7	206
Québec	1994	1	6	174	204	76	33	27	15	3	1	8	548
	1995	0	4	135	169	56	27	10	10	0	1	4	416
	1996	2	5	129	188	45	18	6	13	3	1	3	413
	1997	1	5	168	189	56	30	8	11	2	1	1	472
	1998	0	4	193	205	74	34	16	4	2	0	2	534
Mauricie/ Bois-Francis	1994	1	3	140	107	45	25	14	10	1	2	6	354
	1995	0	4	109	98	26	20	7	7	1	0	0	272
	1996	1	6	120	104	41	17	10	12	3	2	2	318
	1997	0	3	111	92	28	8	4	2	0	1	5	254
	1998	0	5	100	141	46	15	4	2	1	0	4	318
Estrie	1994	0	8	85	86	14	13	6	2	1	0	1	216
	1995	0	1	92	85	31	10	7	5	3	2	3	239
	1996	1	1	87	89	33	9	7	8	0	0	0	235
	1997	0	1	81	75	28	6	8	2	1	0	0	202
	1998	0	1	78	76	20	12	8	3	0	0	0	198
Montréal centre	1994	6	20	490	448	167	96	43	39	3	2	27	1341
	1995	2	22	474	497	178	85	25	17	4	0	32	1336
	1996	4	13	412	478	178	80	34	23	6	0	39	1267
	1997	2	20	481	479	179	66	33	29	4	4	47	1344
	1998	1	18	563	563	203	75	24	13	7	2	33	1502
Nunavik	1994	0	3	107	99	47	20	15	15	2	0	2	310
	1995	1	1	80	100	38	22	16	8	2	0	2	270
	1996	1	3	85	77	29	14	7	3	0	0	9	228
	1997	0	2	65	72	25	10	8	2	0	0	3	187
	1998	2	4	74	80	42	8	5	0	3	0	5	223
Abitibi/ Témiscamingue	1994	1	7	129	59	37	17	10	4	2	0	0	266
	1995	1	4	90	54	34	12	7	5	0	1	0	208
	1996	0	1	99	68	15	16	6	4	1	0	0	210
	1997	0	6	84	46	24	7	4	2	0	0	0	173
	1998	0	2	80	43	11	10	1	0	0	0	0	147
Côte-Nord	1994	1	11	93	66	34	13	4	3	1	0	0	226
	1995	3	4	102	59	39	10	5	2	0	1	0	225
	1996	0	5	76	71	23	15	5	1	0	0	1	197
	1997	1	5	64	46	16	7	6	0	0	0	1	146
	1998	0	7	68	52	23	15	5	2	0	0	1	173
Nord-du Québec	1994	1	1	13	5	4	1	0	0	0	0	0	25
	1995	0	0	19	4	0	2	1	1	0	0	1	28
	1996	0	0	6	6	2	1	0	0	0	0	0	15
	1997	0	0	7	0	1	1	1	0	0	0	0	10
	1998	0	0	7	3	0	1	1	0	0	0	0	12

Nombre de cas déclarés de chlamydie chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0	2	24	25	10	9	5	3	0	0	1	79
	1995	0	1	19	23	4	9	2	0	1	1	2	62
	1996	0	1	20	27	3	7	1	0	0	0	1	60
	1997	0	1	17	10	8	1	2	2	0	0	1	42
	1998	0	0	8	5	5	1	0	2	1	0	0	22
Chaudière/ Appalaches	1994	0	1	64	47	29	11	7	5	0	0	1	165
	1995	1	0	35	43	25	6	3	1	1	0	1	116
	1996	0	1	61	52	20	14	7	3	0	1	1	160
	1997	0	0	62	51	15	7	6	1	0	0	3	145
	1998	1	2	54	66	25	15	2	2	1	0	4	172
Laval	1994	0	4	99	57	19	11	5	1	1	1	1	199
	1995	1	2	69	58	22	10	2	0	1	0	0	165
	1996	0	2	56	45	14	7	5	2	1	0	0	132
	1997	1	3	90	60	18	4	4	5	1	0	1	187
	1998	0	4	80	72	22	10	5	2	1	3	1	200
Lanaudière	1994	3	4	107	62	29	14	8	7	1	0	1	236
	1995	0	7	64	44	26	9	7	10	1	0	1	169
	1996	0	2	83	55	18	5	9	3	0	0	1	176
	1997	1	1	95	67	18	18	5	8	0	0	8	221
	1998	0	10	87	57	15	10	6	3	0	0	1	189
Laurentides	1994	0	9	141	128	35	14	18	6	4	0	1	356
	1995	0	6	125	115	53	13	16	2	2	0	0	332
	1996	1	6	121	99	30	15	14	3	8	1	0	298
	1997	0	4	107	87	50	9	11	3	2	0	0	273
	1998	0	2	120	109	42	11	11	3	1	0	0	299
Montréal	1994	2	15	313	241	72	50	31	19	4	0	12	759
	1995	0	14	312	272	75	35	14	9	3	0	4	738
	1996	1	9	238	205	74	23	12	19	3	0	6	590
	1997	0	8	252	215	55	24	13	12	5	0	4	588
	1998	0	8	301	228	73	24	10	4	1	1	1	651
Nunavik	1994	2	8	73	71	37	12	8	3	1	1	2	218
	1995	1	1	57	63	46	26	5	2	1	2	1	205
	1996	0	5	83	69	48	33	10	9	3	1	0	261
	1997	0	7	52	57	33	26	9	7	1	1	0	193
	1998	2	8	33	46	31	22	14	1	0	0	1	158
Terres Cries/ Baie James	1994	0	3	40	32	16	7	0	0	0	0	1	99
	1995	0	3	39	42	14	2	0	1	0	0	2	103
	1996	0	3	27	33	12	5	0	1	1	0	1	83
	1997	0	0	27	22	14	3	1	0	0	0	0	67
	1998	0	1	42	41	22	8	0	3	2	0	2	121
Province de Québec	1994	20	112	2264	1891	712	367	218	143	25	7	81	5840
	1995	11	77	1995	1870	713	318	132	85	21	9	64	5295
	1996	12	70	1886	1789	612	293	142	106	31	6	71	5018
	1997	7	68	1887	1691	602	236	131	89	16	7	83	4817
	1998	8	77	2028	1914	688	291	121	52	21	7	62	5269

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1994	34,1	7,1	646,7	795,7	282,2	107,1	74,4	31,1	9,8	0,0	1,9	132,6
	1995	0,0	0,0	771,4	801,8	269,1	62,7	32,3	12,1	0,0	0,0	0,0	125,5
	1996	18,7	7,6	479,2	647,6	131,1	93,8	43,5	0,0	9,0	0,0	1,9	94,4
	1997	0,0	15,6	603,6	845,3	248,7	72,1	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	114,2
	1998	41,0	0,0	868,9	831,1	251,5	111,0	23,2	28,6	0,0	0,0	0,0	140,1
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0,0	27,9	1053,4	1248,1	261,9	94,0	72,9	28,1	0,0	0,0	10,3	208,8
	1995	11,4	14,4	969,6	1093,8	365,4	122,3	14,7	13,7	6,6	4,3	7,6	192,8
	1996	0,0	30,0	1223,9	926,5	247,0	60,9	36,5	8,9	6,4	0,0	3,5	191,4
	1997	12,4	0,0	663,5	772,2	263,6	37,4	45,1	13,1	0,0	0,0	6,2	135,2
	1998	0,0	5,3	649,6	790,7	263,8	133,6	54,2	12,8	6,0	4,0	4,9	143,4
Québec	1994	5,6	16,8	835,5	912,9	315,5	118,7	92,6	28,6	8,4	1,6	2,4	166,0
	1995	0,0	11,3	644,2	765,8	240,9	98,6	34,5	18,7	0,0	1,5	1,2	125,4
	1996	11,8	14,2	612,1	866,5	197,8	67,7	20,7	23,9	7,7	1,5	0,9	123,9
	1997	6,1	14,3	801,9	867,6	252,2	117,2	27,9	19,9	4,9	1,5	0,3	141,1
	1998	0,0	11,4	939,0	933,6	341,7	138,4	56,7	7,1	4,7	0,0	0,6	159,0
Mauricie/ Bois-Francs	1994	7,1	9,5	830,0	778,8	295,8	124,9	65,8	27,5	3,9	4,0	2,4	144,3
	1995	0,0	13,0	631,2	702,6	179,9	103,2	32,7	18,8	3,8	0,0	0,0	110,5
	1996	7,4	19,8	689,8	725,0	294,2	91,5	46,7	31,6	10,9	3,8	0,8	128,7
	1997	0,0	10,1	637,3	622,0	205,7	45,5	18,8	5,1	0,0	1,9	2,0	102,5
	1998	0,0	17,1	581,3	922,2	342,3	91,4	19,0	5,0	3,3	0,0	1,6	128,0
Estrie	1994	0,0	43,2	861,5	943,8	146,0	112,8	50,8	9,6	7,0	0,0	0,7	152,2
	1995	0,0	5,5	922,4	926,3	337,5	88,2	59,1	23,5	20,3	7,1	2,1	167,5
	1996	11,9	5,5	863,7	964,9	366,7	82,5	58,5	37,0	0,0	0,0	0,0	163,9
	1997	0,0	5,5	800,2	798,0	317,5	57,2	67,5	9,1	6,1	0,0	0,0	140,2
	1998	0,0	5,6	781,4	790,8	230,8	120,0	67,7	13,4	0,0	0,0	0,0	136,8
Montréal centre	1994	11,2	21,9	950,8	682,7	209,8	116,8	56,1	28,9	2,9	0,9	2,8	140,4
	1995	3,7	23,9	911,7	780,2	233,2	104,1	32,2	12,4	3,8	0,0	3,3	139,5
	1996	7,6	13,9	782,1	241,4	99,9	43,1	16,5	5,6	0,0	0,0	4,1	131,9
	1997	3,9	21,0	912,4	770,0	253,0	84,1	41,9	20,5	3,6	1,8	4,9	139,5
	1998	2,0	18,6	1063,0	898,4	297,5	98,8	30,4	9,0	6,2	0,9	3,4	155,4
Outaouais	1994	0,0	14,7	1080,6	944,7	360,7	130,0	102,2	64,5	14,0	0,0	1,3	200,8
	1995	9,0	4,8	800,2	950,5	304,1	142,8	105,4	33,1	13,3	0,0	1,3	171,8
	1996	9,2	14,0	836,2	725,4	238,9	91,7	45,0	12,0	0,0	0,0	5,6	142,6
	1997	0,0	9,2	630,1	667,0	209,3	66,7	51,1	7,7	0,0	0,0	1,8	115,0
	1998	18,9	18,1	704,6	730,4	357,0	54,9	31,6	0,0	16,9	0,0	3,0	134,9
Abitibi/ Témiscamingue	1994	17,7	60,2	2143,9	1156,0	625,3	233,3	140,0	36,8	29,8	0,0	0,0	344,9
	1995	18,0	34,8	1486,4	1046,7	611,0	167,6	97,5	44,2	0,0	9,2	0,0	269,1
	1996	0,0	8,8	1645,1	1281,8	280,3	233,3	82,0	34,6	13,6	0,0	0,0	271,0
	1997	0,0	53,2	1397,4	857,4	454,9	106,9	54,6	16,8	0,0	0,0	0,0	222,9
	1998	0,0	17,9	1354,3	781,5	212,8	161,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0
Côte-Nord	1994	28,2	149,9	2329,1	1833,8	817,5	265,8	86,0	38,4	19,2	0,0	0,0	442,9
	1995	87,8	55,9	2596,1	1634,3	999,0	208,7	108,0	25,1	0,0	16,4	0,0	442,4
	1996	0,0	71,8	1968,9	1963,5	622,1	323,0	107,8	12,4	0,0	0,0	2,0	388,7
	1997	31,3	73,2	1708,0	1261,3	448,7	158,4	131,2	0,0	0,0	0,0	2,0	289,2
	1998	0,0	104,5	1862,0	1424,7	668,6	357,2	110,1	24,2	0,0	0,0	2,0	344,0
Nord-du Québec	1994	107,0	56,6	1477,3	724,6	518,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,0
	1995	0,0	0,0	2130,0	535,5	0,0	213,0	108,1	68,6	0,0	0,0	10,3	289,6
	1996	0,0	0,0	663,0	785,3	322,6	112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,9
	1997	0,0	0,0	777,8	0,0	164,5	124,8	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	104,5
	1998	0,0	0,0	777,8	369,9	0,0	137,2	109,4	0,0	0,0	0,0	0,0	125,9

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0,0	29,0	641,4	753,5	294,5	200,9	106,2	37,5	0,0	0,0	1,9	149,7
	1995	0,0	14,9	523,8	692,1	126,0	209,4	42,8	0,0	18,0	10,1	3,8	118,5
	1996	0,0	15,4	555,4	819,7	98,3	173,4	21,4	0,0	0,0	0,0	1,9	115,6
	1997	0,0	16,0	477,0	304,1	267,6	26,5	44,2	24,0	0,0	0,0	1,9	81,6
	1998	0,0	0,0	234,8	153,6	169,1	28,6	0,0	23,7	16,1	0,0	0,0	43,1
Chaudière/Appalaches	1994	0,0	3,7	453,6	408,6	236,3	68,1	41,9	17,2	0,0	0,0	0,5	86,3
	1995	8,3	0,0	244,4	365,9	214,5	38,2	18,0	3,3	5,3	0,0	0,5	60,4
	1996	0,0	3,9	419,8	436,8	175,2	93,4	41,6	9,8	0,0	2,9	0,5	83,1
	1997	0,0	0,0	430,6	418,1	132,7	49,1	36,0	3,2	0,0	0,0	1,6	75,1
	1998	9,1	8,0	379,8	528,5	221,7	111,9	12,2	6,3	4,5	0,0	2,1	88,8
Laval	1994	0,0	18,8	917,2	523,7	150,5	70,6	32,5	3,9	5,2	3,6	0,6	116,8
	1995	9,2	9,3	628,2	538,6	179,7	65,0	12,7	0,0	5,0	0,0	0,0	95,4
	1996	0,0	9,1	499,7	421,6	116,3	46,7	31,0	7,3	4,9	0,0	0,0	75,3
	1997	9,5	13,5	791,5	556,4	152,8	27,4	24,5	17,9	4,7	0,0	0,6	105,3
	1998	0,0	17,8	697,0	658,5	191,1	71,1	30,4	7,0	4,5	9,4	0,6	111,3
Lanaudière	1994	22,3	15,0	882,5	619,4	217,7	75,6	43,6	24,5	5,7	0,0	0,5	128,2
	1995	0,0	25,7	516,1	421,4	204,4	48,3	37,2	33,5	5,4	0,0	0,5	89,8
	1996	0,0	7,2	649,5	511,8	144,4	27,4	46,4	9,7	0,0	0,0	0,5	91,6
	1997	7,8	3,6	737,7	598,1	145,6	101,3	25,5	25,0	0,0	0,0	4,1	112,8
	1998	0,0	34,9	670,7	490,6	121,8	58,5	30,3	9,1	0,0	0,0	0,5	94,7
Laurentides	1994	0,0	30,7	1049,3	1048,7	222,4	66,0	89,2	18,6	19,4	0,0	0,5	167,9
	1995	0,0	19,9	908,2	921,5	348,6	60,5	76,4	5,9	9,2	0,0	0,0	152,7
	1996	6,5	19,5	845,8	779,8	200,2	71,0	63,8	8,6	34,5	3,0	0,0	133,9
	1997	0,0	12,7	728,8	664,3	335,0	43,6	49,2	8,3	8,1	0,0	0,0	119,9
	1998	0,0	6,2	810,6	806,5	281,1	55,5	48,1	8,0	3,8	0,0	0,0	128,5
Montréal	1994	4,5	17,2	694,7	585,5	151,3	84,4	52,4	18,3	6,1	0,0	1,8	115,9
	1995	0,0	16,0	678,3	652,7	162,5	59,2	23,2	8,5	4,3	0,0	0,6	111,0
	1996	2,3	10,2	511,7	483,7	161,7	39,8	19,4	17,5	4,1	0,0	0,9	87,4
	1997	0,0	9,0	541,0	495,4	121,2	42,5	20,9	10,8	6,4	0,0	0,6	85,8
	1998	0,0	8,9	647,2	513,1	161,5	44,0	16,0	3,5	1,2	0,9	0,1	93,7
Nunavik	1994	374,5	751,2	16898,1	16210,0	9113,3	3260,9	2857,1	852,3	396,8	448,4	46,0	5011,5
	1995	197,6	88,0	12925,2	14253,4	10900,5	6190,5	1872,7	490,2	423,7	772,2	22,0	4517,4
	1996	0,0	432,9	18043,5	14806,9	10933,9	8128,1	3246,8	2097,9	1145,0	352,1	0,0	5532,0
	1997	0,0	588,7	11063,8	11850,3	7621,2	6103,3	2639,3	1594,5	339,0	339,0	0,0	3946,0
	1998	374,5	677,4	6693,7	9407,0	6595,7	5459,1	3753,4	209,6	0,0	0,0	19,8	3130,6
Terres Cries/Baie James	1994	0,0	334,4	9195,4	7239,8	4507,0	2102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	2410,5
	1995	0,0	341,3	9443,1	9090,9	4046,2	647,2	0,0	280,1	0,0	0,0	49,3	2538,2
	1996	0,0	341,7	7031,3	7349,7	3314,9	1597,4	0,0	280,9	358,4	0,0	24,9	2068,8
	1997	0,0	0,0	6940,9	5314,0	3713,5	934,6	392,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1684,7
	1998	0,0	122,0	10714,3	10677,1	5714,3	2580,6	0,0	804,3	724,6	0,0	50,9	3078,9
Province de Québec	1994	8,6	24,7	946,2	804,4	260,6	112,2	67,2	25,8	6,6	1,0	2,2	158,3
	1995	4,8	17,0	822,6	795,7	272,3	98,3	40,2	15,0	5,4	1,3	1,7	142,4
	1996	5,4	15,4	767,9	760,1	239,8	93,1	42,5	18,3	7,6	0,9	1,9	133,8
	1997	3,2	14,9	767,4	707,5	241,3	77,4	39,3	15,0	3,7	1,0	2,2	127,5
	1998	3,7	16,8	827,9	786,6	280,6	99,8	36,3	8,6	4,7	1,0	1,6	138,5

Nombre de cas déclarés de chlamydie chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0	0	13	45	6	9	5	0	0	0	1	79
	1995	0	0	17	38	13	1	2	2	0	0	1	74
	1996	0	0	17	25	11	5	1	3	2	0	2	66
	1997	0	0	12	33	10	7	0	2	0	0	0	64
	1998	0	0	20	54	15	7	3	2	0	0	0	101
Saguenay/Lac St-Jean	1994	1	0	14	44	33	9	3	2	0	0	3	109
	1995	0	0	17	45	8	10	3	4	1	0	2	90
	1996	1	0	14	35	14	9	3	4	1	0	2	83
	1997	0	0	8	33	17	7	5	2	0	0	0	72
	1998	0	1	12	26	14	12	2	1	1	1	2	72
Québec	1994	0	1	30	72	57	15	7	11	1	1	6	201
	1995	0	0	20	62	38	13	5	3	2	0	5	148
	1996	0	0	25	70	28	20	5	7	3	1	0	159
	1997	0	0	21	80	28	24	10	9	1	3	1	177
	1998	0	1	31	73	46	24	20	11	2	2	1	211
Mauricie/Bois-Francis	1994	0	0	21	51	38	17	8	6	0	1	2	144
	1995	0	0	22	51	18	15	9	10	0	1	0	126
	1996	0	0	16	34	20	11	8	6	0	0	0	95
	1997	1	0	12	38	22	7	7	1	0	0	2	90
	1998	0	0	23	60	26	14	7	6	0	0	4	140
Estrie	1994	0	0	15	34	14	8	6	3	2	1	0	83
	1995	0	0	18	34	10	5	1	3	1	0	1	73
	1996	1	0	3	31	12	11	4	6	2	0	0	70
	1997	1	0	15	31	14	5	9	1	0	0	0	76
	1998	0	0	13	48	22	6	7	2	0	0	0	98
Montréal centre	1994	4	0	76	141	105	66	26	27	3	3	13	464
	1995	4	2	59	131	93	72	35	27	6	2	10	441
	1996	1	1	57	129	107	74	29	24	6	2	17	447
	1997	2	0	56	143	116	73	38	28	7	0	20	483
	1998	0	0	61	199	128	79	58	22	8	0	21	576
Outaouais	1994	0	0	12	25	13	11	5	2	0	0	0	68
	1995	0	0	16	25	8	3	4	4	0	0	0	60
	1996	1	0	10	19	14	2	0	3	0	0	1	50
	1997	0	1	5	18	14	4	3	2	1	0	2	50
	1998	0	0	7	17	10	9	5	7	4	0	0	59
Abitibi/Témiscamingue	1994	1	0	30	32	11	14	4	2	1	1	0	96
	1995	2	0	25	24	13	11	2	6	2	0	0	85
	1996	2	0	12	35	10	12	2	1	1	1	0	76
	1997	0	0	16	16	7	4	3	1	1	0	0	48
	1998	0	0	14	17	12	5	0	1	0	0	0	49
Côte-Nord	1994	2	0	20	15	16	11	5	5	0	0	0	74
	1995	1	1	11	24	16	10	1	1	0	0	0	65
	1996	0	0	18	20	10	11	4	1	0	0	0	64
	1997	1	1	15	26	11	7	3	2	1	0	1	68
	1998	1	1	7	24	16	3	1	1	0	1	0	55
Nord-du Québec	1994	0	0	3	7	3	3	0	0	0	0	1	17
	1995	0	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	6
	1996	0	0	0	4	1	2	0	0	1	0	0	8
	1997	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Nombre de cas déclarés de chlamydie chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0	0	5	6	6	4	2	3	1	0	2	29
	1995	0	0	2	5	4	3	4	0	0	0	0	18
	1996	0	0	2	3	2	1	1	1	0	0	0	10
	1997	1	0	2	2	2	2	1	3	0	0	1	14
	1998	0	0	0	4	2	2	1	0	0	0	0	9
Chaudière/Appalaches	1994	0	0	10	22	11	11	5	4	0	0	3	66
	1995	0	0	9	19	9	5	2	2	1	0	0	47
	1996	0	0	6	28	13	7	5	0	0	0	0	59
	1997	0	0	9	22	18	10	6	1	1	0	2	69
	1998	0	0	8	29	10	7	3	3	0	0	0	60
Laval	1994	2	0	23	29	13	6	2	4	2	1	0	82
	1995	2	0	16	28	14	6	2	3	0	0	1	72
	1996	0	0	15	19	6	3	3	3	0	1	0	50
	1997	0	1	9	19	10	5	1	1	1	0	0	47
	1998	0	1	14	33	19	8	6	2	1	0	0	84
Lanaudière	1994	1	0	15	24	19	9	8	9	1	1	2	89
	1995	1	1	17	26	5	3	2	3	1	0	1	60
	1996	0	0	18	28	8	5	1	3	0	0	0	63
	1997	1	0	13	24	5	3	3	1	0	0	2	52
	1998	0	0	14	28	17	1	4	1	1	0	0	66
Laurentides	1994	2	0	31	49	29	8	9	7	2	0	2	139
	1995	2	0	18	41	24	10	10	5	0	0	0	110
	1996	0	0	11	37	17	6	8	2	5	0	0	86
	1997	0	0	13	21	14	4	7	3	1	0	0	63
	1998	0	1	15	35	15	7	12	9	2	1	0	97
Montérégie	1994	2	1	66	94	58	24	13	13	6	1	4	282
	1995	2	0	48	84	50	24	8	13	2	2	2	235
	1996	0	0	39	75	36	23	6	12	2	0	3	196
	1997	0	0	36	63	43	21	7	7	5	1	0	183
	1998	0	1	37	101	38	18	10	10	2	0	0	217
Nunavik	1994	0	2	11	19	10	4	0	2	1	0	0	49
	1995	0	1	7	17	7	9	6	3	0	0	0	50
	1996	1	0	7	20	20	9	6	1	1	0	0	65
	1997	0	0	9	20	12	17	6	1	1	0	0	66
	1998	0	0	16	11	12	14	12	6	0	0	1	72
Terres Cries/Baie James	1994	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	1995	0	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	8
	1996	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	7
	1997	0	0	2	4	3	0	1	0	0	0	0	10
	1998	0	0	3	4	5	1	1	0	0	0	0	14
Province de Québec	1994	15	4	397	709	442	229	108	100	20	10	40	2074
	1995	14	5	325	658	335	201	97	89	16	5	23	1768
	1996	7	2	273	614	330	211	86	77	24	5	25	1654
	1997	7	3	254	594	347	200	110	65	20	4	31	1635
	1998	1	6	295	763	407	217	152	85	21	5	29	1981


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1994	0,0	0,0	160,6	744,2	98,4	108,6	53,6	0,0	0,0	0,0	1,0	77,4
	1995	0,0	0,0	209,4	615,7	229,8	12,6	21,9	11,9	0,0	0,0	1,0	73,0
	1996	0,0	0,0	209,9	400,1	201,3	68,2	11,0	17,6	17,6	0,0	2,0	65,6
	1997	0,0	0,0	149,7	522,2	187,7	102,5	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	64,1
	1998	0,0	0,0	261,1	828,7	285,1	111,3	36,0	11,4	0,0	0,0	0,0	101,9
Saguenay/Lac St-Jean	1994	10,5	0,0	111,1	471,8	351,7	68,5	21,1	8,9	0,0	0,0	2,1	74,8
	1995	0,0	0,0	131,3	472,3	90,1	78,8	21,5	17,3	6,7	0,0	1,4	62,0
	1996	11,3	0,0	108,3	356,0	162,1	76,0	21,7	16,9	6,5	0,0	1,4	57,4
	1997	0,0	0,0	62,6	320,0	200,3	64,3	37,0	8,3	0,0	0,0	0,0	50,0
	1998	0,0	5,1	96,8	243,7	165,0	120,6	15,2	4,1	5,9	5,2	1,4	50,2
Québec	1994	0,0	2,7	139,9	312,2	224,6	51,6	24,1	21,6	3,0	2,3	1,9	64,5
	1995	0,0	0,0	92,5	274,0	155,7	45,3	17,1	5,8	5,7	0,0	1,6	47,3
	1996	0,0	0,0	115,0	312,5	118,2	72,1	17,0	13,2	8,2	2,2	0,0	50,6
	1997	0,0	0,0	96,7	357,3	121,4	89,9	34,0	16,7	2,6	6,6	0,3	56,2
	1998	0,0	2,7	145,1	325,2	204,1	94,4	68,2	20,1	4,9	4,3	0,3	66,7
Mauricie/Bois-Francs	1994	0,0	0,0	119,1	346,0	233,7	82,2	36,9	15,9	0,0	2,7	0,8	60,2
	1995	0,0	0,0	121,6	341,8	116,2	74,4	41,5	25,8	0,0	2,6	0,0	52,5
	1996	0,0	0,0	87,1	223,8	133,1	56,7	36,9	15,2	0,0	0,0	0,0	39,4
	1997	7,2	0,0	64,9	243,0	149,6	38,0	32,4	2,5	0,0	0,0	0,8	37,2
	1998	0,0	0,0	126,7	369,8	180,7	79,7	33,1	14,6	0,0	0,0	1,6	57,6
Estrie	1994	0,0	0,0	142,2	367,4	140,6	68,7	50,6	14,0	14,6	4,9	0,0	60,3
	1995	0,0	0,0	168,1	365,3	104,3	43,8	8,3	13,8	6,9	0,0	0,7	52,8
	1996	11,2	0,0	27,6	328,6	129,1	99,8	33,3	27,0	13,2	0,0	0,0	50,4
	1997	11,5	0,0	139,8	318,0	156,0	46,6	75,5	4,4	0,0	0,0	0,0	54,5
	1998	0,0	0,0	123,2	475,0	251,2	58,8	59,0	8,7	0,0	0,0	0,0	69,9
Montréal centre	1994	7,0	0,0	144,6	215,4	123,6	74,8	33,8	21,5	3,3	2,1	1,5	52,5
	1995	7,0	2,1	111,6	204,2	114,7	81,7	44,8	20,9	6,5	1,4	1,1	49,7
	1996	1,8	1,0	106,7	203,1	137,5	85,5	36,4	18,2	6,3	1,3	1,9	50,2
	1997	3,7	0,0	104,4	224,7	155,1	86,2	47,2	21,0	7,1	0,0	2,2	54,0
	1998	0,0	0,0	113,8	308,5	176,9	96,7	71,6	16,2	7,9	0,0	2,3	64,2
Outaouais	1994	0,0	0,0	117,6	233,1	102,3	72,2	33,9	8,3	0,0	0,0	0,0	44,5
	1995	0,0	0,0	155,2	230,1	65,7	19,5	26,6	16,0	0,0	0,0	0,0	38,6
	1996	8,7	0,0	95,8	174,5	117,4	13,2	0,0	11,6	0,0	0,0	0,6	31,6
	1997	0,0	4,4	47,0	163,9	119,4	27,2	19,2	7,5	5,8	0,0	1,2	31,1
	1998	0,0	0,0	65,3	153,2	85,4	63,8	31,5	25,6	21,6	0,0	0,0	36,2
Abitibi/Témiscamingue	1994	16,7	0,0	475,7	586,5	179,4	182,6	51,5	16,5	14,2	10,4	0,0	119,1
	1995	34,2	0,0	391,3	433,7	223,4	145,7	25,5	47,9	27,2	0,0	0,0	105,0
	1996	35,2	0,0	186,2	622,1	177,7	164,0	25,4	7,8	12,9	10,1	0,0	93,6
	1997	0,0	0,0	244,3	279,8	128,0	57,0	38,6	7,5	12,3	0,0	0,0	58,9
	1998	0,0	0,0	215,2	292,4	217,7	76,1	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	59,9
Côte-Nord	1994	53,6	0,0	456,2	376,0	362,5	218,1	97,9	58,8	0,0	0,0	0,0	136,7
	1995	27,4	13,4	250,8	600,0	385,7	199,9	19,8	11,5	0,0	0,0	0,0	120,4
	1996	0,0	0,0	417,2	493,0	250,7	227,4	78,5	11,4	0,0	0,0	0,0	118,9
	1997	29,5	14,0	354,4	635,4	280,3	149,4	60,8	22,5	15,8	0,0	1,9	126,7
	1998	30,5	14,2	171,5	580,4	409,2	67,7	20,5	11,1	0,0	16,1	0,0	102,9
Nord-du Québec	1994	0,0	0,0	313,8	947,2	394,7	275,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	159,4
	1995	0,0	0,0	199,4	396,8	0,0	0,0	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7
	1996	0,0	0,0	0,0	514,8	149,0	216,2	0,0	0,0	89,5	0,0	0,0	76,0
	1997	0,0	0,0	105,9	123,0	152,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	0,0	0,0	0,0	9,6


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998) suite



Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0,0	0,0	121,5	176,0	174,8	89,8	41,4	34,9	18,3	0,0	3,8	54,6
	1995	0,0	0,0	50,3	144,6	122,6	70,5	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2
	1996	0,0	0,0	51,8	86,5	64,4	24,9	21,2	11,3	0,0	0,0	0,0	19,2
	1997	35,4	0,0	53,0	59,1	65,6	52,9	21,9	33,3	0,0	0,0	1,9	27,1
	1998	0,0	0,0	0,0	120,2	66,1	57,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
Chaudière/Appalaches	1994	0,0	0,0	66,8	173,8	83,2	65,7	28,7	13,1	0,0	0,0	1,6	34,5
	1995	0,0	0,0	58,9	147,6	71,1	30,3	11,5	6,4	5,1	0,0	0,0	24,4
	1996	0,0	0,0	38,9	215,9	104,2	43,9	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
	1997	0,0	0,0	58,3	164,4	145,5	66,1	34,8	3,1	4,6	0,0	1,0	35,6
	1998	0,0	0,0	52,6	211,1	80,6	48,9	17,6	9,2	0,0	0,0	0,0	30,9
Laval	1994	17,1	0,0	202,8	248,2	96,7	37,2	13,2	15,9	10,9	4,5	0,0	49,0
	1995	17,3	0,0	137,5	242,4	107,9	37,2	12,8	11,6	0,0	0,0	0,6	42,5
	1996	0,0	0,0	126,2	166,3	47,2	18,9	18,5	11,3	0,0	4,2	0,0	29,1
	1997	0,0	4,3	74,9	165,3	80,6	32,3	6,1	3,7	5,0	0,0	0,0	27,0
	1998	0,0	4,2	115,5	281,7	155,9	53,3	36,3	7,1	4,8	0,0	0,0	47,7
Lanaudière	1994	7,1	0,0	112,4	226,0	147,3	48,6	43,0	29,8	5,4	4,6	1,1	47,5
	1995	7,1	3,5	124,0	235,9	40,2	16,2	10,4	9,6	5,0	0,0	0,5	31,3
	1996	0,0	0,0	127,5	246,1	64,8	27,6	5,0	9,3	0,0	0,0	0,0	32,1
	1997	7,4	0,0	90,6	201,6	40,5	17,1	14,8	3,0	0,0	0,0	1,0	26,0
	1998	0,0	0,0	97,3	226,1	136,3	5,9	19,4	2,9	4,2	0,0	0,0	32,3
Laurentides	1994	12,3	0,0	213,5	383,7	182,8	37,9	43,2	20,7	9,3	0,0	0,9	65,1
	1995	12,2	0,0	120,4	312,0	156,0	47,0	46,3	14,2	0,0	0,0	0,0	50,2
	1996	0,0	0,0	72,1	274,4	112,6	28,3	35,5	5,5	20,6	0,0	0,0	38,3
	1997	0,0	0,0	83,2	150,6	93,4	19,2	30,4	7,9	3,9	0,0	0,0	27,4
	1998	0,0	3,0	95,0	242,1	99,5	34,8	51,1	22,9	7,3	3,4	0,0	41,3
Montérégie	1994	4,2	1,1	139,5	215,4	118,8	39,6	21,7	12,5	8,9	1,3	0,6	43,6
	1995	4,3	0,0	99,6	191,3	104,4	39,4	13,0	12,2	2,8	2,5	0,3	35,7
	1996	0,0	0,0	79,6	168,7	75,7	38,4	9,5	11,1	2,7	0,0	0,4	29,4
	1997	0,0	0,0	73,3	138,6	91,0	36,0	10,9	6,3	6,3	1,2	0,0	27,0
	1998	0,0	1,1	75,8	217,2	80,4	31,8	15,5	8,8	2,4	0,0	0,0	31,6
Nunavik	1994	0,0	188,1	2663,4	4556,4	2320,2	1052,6	0,0	459,8	452,5	0,0	0,0	1095,5
	1995	0,0	88,3	1711,5	4136,3	1590,9	2238,8	1676,0	634,2	0,0	0,0	0,0	1087,0
	1996	186,6	0,0	1650,9	4914,0	4514,7	2137,8	1554,4	195,3	502,5	0,0	0,0	1376,0
	1997	0,0	0,0	2064,2	4608,3	2758,6	3881,3	1492,5	186,6	450,5	0,0	0,0	1362,8
	1998	0,0	0,0	3532,0	2558,1	2690,6	3125,0	2850,4	1063,8	0,0	0,0	20,2	1451,9
Terres Cries/Baie James	1994	0,0	0,0	434,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	67,7
	1995	0,0	0,0	223,7	217,9	1073,0	271,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0
	1996	0,0	107,1	686,5	434,8	229,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,2
	1997	0,0	0,0	451,5	885,0	671,1	0,0	320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	228,5
	1998	0,0	0,0	726,4	950,1	1113,6	258,4	313,5	0,0	0,0	0,0	0,0	321,5
Province de Québec	1994	6,1	0,8	158,0	290,0	155,3	67,7	32,8	18,1	5,4	2,0	1,1	57,8
	1995	5,8	1,1	127,4	268,9	122,5	59,8	29,0	15,6	4,2	1,0	0,6	48,9
	1996	3,0	0,4	105,8	249,6	123,9	64,3	25,3	13,2	6,0	1,0	0,7	45,3
	1997	3,0	0,6	98,1	237,5	133,2	63,0	32,2	10,9	4,8	0,8	0,8	44,5
	1998	0,4	1,2	114,9	298,8	158,4	71,3	44,5	14,0	4,8	0,9	0,8	53,5

**Taux d'incidence moyen des cas déclarés de chlamydie par groupe d'âge,
Québec (1994-1998)**




**Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie,
Québec (1991-1998)**







Taux d'incidence moyen des cas déclarés de chlamydie chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1994-1998)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie chez les hommes, Québec (1991-1998)



Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Province de Québec



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	229	515	6	750
1995	171	431	5	607
1996	145	325	9	479
1997	139	410	7	556
1998	112	373	8	493




Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence *

	Femmes	Hommes	Total
1995	-25,9	-17,0	-19,7
1996	-15,9	-25,2	-21,7
1997	-4,9	25,2	15,2
1998	-20,0	-9,7	-12,0


*: (taux année courante)-(taux année antérieure)/(taux année courante) *100

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région du Bas-St-Laurent



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	2	4	0	6
1995	2	4	0	6
1996	0	0	0	0
1997	0	6	1	7
1998	0	5	0	5


NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	4	8	0	12
1995	1	5	0	6
1996	0	6	0	6
1997	0	4	0	4
1998	4	5	0	9

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région de Québec



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	7	48	0	55
1995	1	26	0	27
1996	4	12	0	16
1997	3	23	0	26
1998	6	23	0	29

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région de la Mauricie/Bois-Francs



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	11	8	0	19
1995	2	6	0	8
1996	1	3	0	4
1997	8	4	0	12
1998	2	6	0	8

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région de l'Estrie



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	4	8	0	12
1995	3	4	0	7
1996	0	3	0	3
1997	1	7	0	8
1998	0	2	0	2

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région de Montréal centre



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	107	325	6	438
1995	98	292	5	395
1996	89	209	9	307
1997	66	279	6	351
1998	46	255	7	308

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région de l'Outaouais



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	5	8	0	13
1995	4	5	0	9
1996	5	4	0	9
1997	4	9	0	13
1998	7	6	0	13

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région de l'Abitibi/Témiscamingue



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	2	3	0	5
1995	8	8	0	16
1996	6	8	0	14
1997	3	4	0	7
1998	5	1	0	6


NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région de la Côte-Nord



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	3	3	0	6
1995	2	5	0	7
1996	3	6	0	9
1997	4	2	0	6
1998	2	0	0	2


NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	2	0	0	2
1995	0	0	0	0
1996	0	0	0	0
1997	0	0	0	0
1998	0	0	0	0

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région de la Gaspésie/Iles de la Madeleine



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	1	0	0	1
1995	0	2	0	2
1996	0	3	0	3
1997	0	1	0	1
1998	0	0	0	0

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région Chaudière/Appalaches



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	5	11	0	16
1995	0	7	0	7
1996	2	3	0	5
1997	1	2	0	3
1998	0	4	0	4

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région de Laval



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	4	16	0	20
1995	5	12	0	17
1996	3	13	0	16
1997	5	8	0	13
1998	4	13	0	17


NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région de Lanaudière



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	7	10	0	17
1995	3	4	0	7
1996	6	3	0	9
1997	1	1	0	2
1998	1	7	0	8


NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	3	8	0	11
1995	7	7	0	14
1996	1	7	0	8
1997	3	5	0	8
1998	5	8	0	13

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région de la Montérégie



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	15	35	0	50
1995	11	36	0	47
1996	6	42	0	48
1997	19	47	0	66
1998	13	34	1	48

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région Nunavik



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	37	20	0	57
1995	17	6	0	23
1996	15	2	0	17
1997	17	6	0	23
1998	9	2	0	11


NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1994-1998)
Région Terres Cries/Baie-James



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	10	0	0	10
1995	7	2	0	9
1996	4	1	0	5
1997	4	2	0	6
1998	8	2	0	10

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise



Taux d'incidence par 100 000

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Femmes	83,8	85,7	70,1	55,6	35,4	19,9	18,8	11,4	8,4	7,0	6,2	4,6	3,9	3,7	2,9
Hommes	128,0	121,8	92,3	70,6	40,0	27,9	33,9	27,3	18,7	13,9	14,4	11,9	8,9	11,2	10,1
Total	105,6	103,5	87,5	66,6	40,8	24,6	27,4	19,6	13,6	10,5	10,3	8,3	6,5	7,5	6,6

Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total	Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1994 2	4	0	6	Gaspésie/ Îles de la madeleine	1994 1	0	0	1
	1995 2	4	0	6		1995 0	2	0	2
	1996 0	0	0	0		1996 0	3	0	3
	1997 0	6	1	7		1997 0	1	0	1
	1998 0	5	0	5		1998 0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1994 4	8	0	12	Chaudière/ Appalaches	1994 5	11	0	16
	1995 1	5	0	6		1995 0	7	0	7
	1996 0	6	0	6		1996 2	3	0	5
	1997 0	4	0	4		1997 1	2	0	3
	1998 4	5	0	9		1998 0	4	0	4
Québec	1994 7	48	0	55	Laval	1994 4	16	0	20
	1995 1	26	0	27		1995 5	12	0	17
	1996 4	12	0	16		1996 3	13	0	16
	1997 3	23	0	26		1997 5	8	0	13
	1998 6	23	0	29		1998 4	13	0	17
Mauricie/ Bois-Francs	1994 11	8	0	19	Lanaudière	1994 7	10	0	17
	1995 2	6	0	8		1995 3	4	0	7
	1996 1	3	0	4		1996 6	3	0	9
	1997 8	4	0	12		1997 1	1	0	2
	1998 2	6	0	8		1998 1	7	0	8
Estrie	1994 4	8	0	12	Laurentides	1994 3	8	0	11
	1995 3	4	0	7		1995 7	7	0	14
	1996 0	3	0	3		1996 1	7	0	8
	1997 1	7	0	8		1997 3	5	0	8
	1998 0	2	0	2		1998 5	8	0	13
Montréal centre	1994 107	325	6	438	Montréal	1994 15	35	0	50
	1995 98	292	5	395		1995 11	36	0	47
	1996 89	209	9	307		1996 6	42	0	48
	1997 66	279	6	351		1997 19	47	0	66
	1998 46	255	7	308		1998 13	34	1	48
Outaouais	1994 5	8	0	13	Nunavik	1994 37	20	0	57
	1995 4	5	0	9		1995 17	6	0	23
	1996 5	4	0	9		1996 15	2	0	17
	1997 4	9	0	13		1997 17	6	0	23
	1998 7	6	0	13		1998 9	2	0	11
Abitibi/ Témiscamingue	1994 2	3	0	5	Terres Cries/ Baie-James	1994 10	0	0	10
	1995 8	8	0	16		1995 7	2	0	9
	1996 6	8	0	14		1996 4	1	0	5
	1997 3	4	0	7		1997 4	2	0	6
	1998 5	1	0	6		1998 8	2	0	10
Côte-Nord	1994 3	3	0	6	Province de Québec	1994 229	515	6	750
	1995 2	5	0	7		1995 171	431	5	607
	1996 3	6	0	9		1996 145	325	9	479
	1997 4	2	0	6		1997 139	410	7	556
	1998 2	0	0	2		1998 112	373	8	493
Nord-du-Québec	1994 2	0	0	2					
	1995 0	0	0	0					
	1996 0	0	0	0					
	1997 0	0	0	0					
	1998 0	0	0	0					

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1994	1,9	3,9	0,0	2,9
	1995	1,9	3,9	0,0	2,9
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	6,0	0,5	3,4
	1998	0,0	5,0	0,0	2,5
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	2,7	5,5	0,0	4,1
	1995	0,7	3,4	0,0	2,1
	1996	0,0	4,1	0,0	2,1
	1997	0,0	2,8	0,0	1,4
	1998	2,8	3,5	0,0	3,1
Québec	1994	2,1	15,4	0,0	8,6
	1995	0,3	8,3	0,0	4,2
	1996	1,2	3,8	0,0	2,5
	1997	0,9	7,3	0,0	4,0
	1998	1,8	7,3	0,0	4,4
Mauricie/ Bois-Francs	1994	4,5	3,3	0,0	3,9
	1995	0,8	2,5	0,0	1,6
	1996	0,4	1,2	0,0	0,8
	1997	3,2	1,7	0,0	2,5
	1998	0,8	2,5	0,0	1,6
Estrie	1994	2,8	5,8	0,0	4,3
	1995	2,1	2,9	0,0	2,5
	1996	0,0	2,2	0,0	1,1
	1997	0,7	5,0	0,0	2,8
	1998	0,0	1,4	0,0	0,7
Montréal centre	1994	11,2	36,8	0,3	23,8
	1995	10,2	32,9	0,3	21,4
	1996	9,3	23,5	0,5	16,6
	1997	6,8	31,2	0,3	18,9
	1998	4,8	28,4	0,4	16,5
Outaouais	1994	3,2	5,2	0,0	4,2
	1995	2,5	3,2	0,0	2,9
	1996	3,1	2,5	0,0	2,8
	1997	2,5	5,6	0,0	4,0
	1998	4,2	3,7	0,0	4,0
Abitibi/ Témiscamingue	1994	2,6	3,7	0,0	3,2
	1995	10,3	9,9	0,0	10,1
	1996	7,7	9,9	0,0	8,8
	1997	3,9	4,9	0,0	4,4
	1998	6,4	1,2	0,0	3,8
Côte-Nord	1994	5,9	5,5	0,0	5,7
	1995	3,9	9,3	0,0	6,7
	1996	5,9	11,1	0,0	8,6
	1997	7,9	3,7	0,0	5,8
	1998	4,0	0,0	0,0	1,9
Nord-du- Québec	1994	20,6	0,0	0,0	9,8
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la Madeleine	1994	1,9	0,0	0,0	0,9
	1995	0,0	3,8	0,0	1,9
	1996	0,0	5,8	0,0	2,9
	1997	0,0	1,9	0,0	1,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/ Appalaches	1994	2,6	5,7	0,0	4,2
	1995	0,0	3,6	0,0	1,8
	1996	1,0	1,6	0,0	1,3
	1997	0,5	1,0	0,0	0,8
	1998	0,0	2,1	0,0	1,0
Laval	1994	2,3	9,6	0,0	5,9
	1995	2,9	7,1	0,0	5,0
	1996	1,7	7,6	0,0	4,6
	1997	2,8	4,6	0,0	3,7
	1998	2,2	7,4	0,0	4,8
Lanaudière	1994	3,8	5,3	0,0	4,6
	1995	1,6	2,1	0,0	1,8
	1996	3,1	1,5	0,0	2,3
	1997	0,5	0,5	0,0	0,5
	1998	0,5	3,4	0,0	2,0
Laurentides	1994	1,4	3,7	0,0	2,6
	1995	3,2	3,2	0,0	3,2
	1996	0,4	3,1	0,0	1,8
	1997	1,3	2,2	0,0	1,7
	1998	2,1	3,4	0,0	2,8
Montérégie	1994	2,3	5,4	0,0	3,8
	1995	1,7	5,5	0,0	3,6
	1996	0,9	6,3	0,0	3,6
	1997	2,8	6,9	0,0	4,8
	1998	1,9	5,0	0,1	3,5
Nunavik	1994	850,6	447,1	0,0	646,0
	1995	374,6	130,4	0,0	251,7
	1996	317,9	42,3	0,0	180,0
	1997	347,6	123,9	0,0	236,3
	1998	178,3	40,3	0,0	109,9
Terres Cries/ Baie-James	1994	243,5	0,0	0,0	117,2
	1995	172,5	45,3	0,0	106,2
	1996	99,7	22,7	0,0	59,5
	1997	100,6	45,7	0,0	71,8
	1998	203,6	45,9	0,0	120,7
Province de Québec	1994	6,2	14,4	0,1	10,3
	1995	4,6	11,9	0,1	8,3
	1996	3,9	8,9	0,1	6,5
	1997	3,7	11,2	0,1	7,5
	1998	2,9	10,1	0,1	6,6

Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	6
	1995	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	6
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	2	0	0	0	1	2	1	0	1	7
	1998	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0	0	0	5	2	4	1	0	0	0	0	12
	1995	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	6
	1996	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0	6
	1997	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4
	1998	0	0	0	5	0	0	2	2	0	0	0	9
Québec	1994	0	0	1	10	19	9	4	10	2	0	0	55
	1995	0	0	0	4	5	9	2	5	1	1	0	27
	1996	0	0	1	4	4	3	3	0	1	0	0	16
	1997	0	0	1	2	6	7	4	6	0	0	0	26
	1998	0	0	5	7	3	2	8	4	0	0	0	29
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0	1	0	7	3	4	2	2	0	0	0	19
	1995	0	0	1	2	2	2	0	1	0	0	0	8
	1996	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	4
	1997	0	2	0	5	2	2	1	0	0	0	0	12
	1998	0	0	0	4	2	1	0	1	0	0	0	8
Estrie	1994	0	0	0	3	3	4	1	1	0	0	0	12
	1995	0	0	0	3	0	1	0	2	0	1	0	7
	1996	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
	1997	0	0	3	1	1	0	0	0	3	0	0	8
	1998	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Montréal centre	1994	0	2	55	91	98	95	39	38	10	1	9	438
	1995	1	5	45	77	72	74	42	41	11	3	24	395
	1996	0	1	39	66	49	46	46	29	12	2	17	307
	1997	0	3	45	61	54	61	54	43	12	3	15	351
	1998	0	3	27	45	58	65	45	30	14	2	19	308
Outaouais	1994	0	1	4	4	2	1	0	1	0	0	0	13
	1995	0	0	2	1	2	3	1	0	0	0	0	9
	1996	0	0	1	2	2	2	1	0	1	0	0	9
	1997	0	0	2	6	2	0	2	0	0	0	1	13
	1998	0	0	4	4	1	0	1	1	2	0	0	13
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	5
	1995	0	0	2	5	3	3	3	0	0	0	0	16
	1996	0	0	2	3	2	3	2	0	1	1	0	14
	1997	0	0	0	2	1	2	0	0	2	0	0	7
	1998	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	6
Côte-Nord	1994	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	6
	1995	0	0	0	2	2	0	1	2	0	0	0	7
	1996	0	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0	9
	1997	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	6
	1998	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Nord-du Québec	1994	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1994-1998) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1995	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	1996	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/ Appalaches	1994	0	0	2	3	2	2	4	2	1	0	0	16
	1995	0	0	2	1	2	0	0	0	0	1	1	7
	1996	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	5
	1997	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	1998	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4
Laval	1994	0	0	3	2	4	4	2	5	0	0	0	20
	1995	0	0	1	6	4	3	2	1	0	0	0	17
	1996	0	0	5	1	5	2	0	3	0	0	0	16
	1997	0	0	3	4	1	3	2	0	0	0	0	13
	1998	0	0	2	4	1	3	4	2	1	0	0	17
Lanaudière	1994	0	0	3	1	8	1	1	1	2	0	0	17
	1995	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	7
	1996	0	0	0	2	4	0	1	2	0	0	0	9
	1997	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	3	2	1	0	2	0	0	0	8
Laurentides	1994	0	0	4	0	1	0	1	2	2	1	0	11
	1995	0	0	1	3	4	2	3	1	0	0	0	14
	1996	0	0	0	3	3	0	1	0	1	0	0	8
	1997	0	0	2	1	2	2	1	0	0	0	0	8
	1998	0	0	3	5	1	1	1	2	0	0	0	13
Montérégie	1994	1	0	11	5	13	11	4	2	2	0	1	50
	1995	0	0	7	9	10	7	4	7	2	0	1	47
	1996	0	1	8	6	4	9	7	11	2	0	0	48
	1997	0	1	15	11	12	7	8	8	4	0	0	66
	1998	0	0	6	14	10	4	6	7	0	1	0	48
Nunavik	1994	0	0	17	23	9	3	1	1	1	0	2	57
	1995	0	0	10	7	1	1	2	1	0	0	1	23
	1996	0	0	2	5	4	2	4	0	0	0	0	17
	1997	0	1	4	7	5	3	1	1	1	0	0	23
	1998	0	1	2	4	3	0	1	0	0	0	0	11
Terres Cries/ Baie James	1994	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	0	10
	1995	0	1	3	3	1	1	0	0	0	0	0	9
	1996	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	5
	1997	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	6
	1998	1	0	0	6	1	1	0	1	0	0	0	10
Province de Québec	1994	1	4	111	163	170	142	60	65	20	2	12	750
	1995	2	7	76	127	109	112	62	65	14	6	27	607
	1996	0	3	64	99	83	71	67	49	21	4	18	479
	1997	0	8	82	105	91	88	75	64	23	3	17	556
	1998	1	4	53	105	84	82	70	55	17	3	19	493

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0,0	0,0	6,4	8,5	8,2	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	1995	0,0	0,0	0,0	16,6	8,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	5,7	5,8	4,2	0,0	0,5	3,4
	1998	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	7,9	5,9	5,7	0,0	0,0	0,0	2,5
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0,0	0,0	0,0	27,8	10,8	15,4	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	2,1
	1996	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,3	0,0	6,5	3,2	0,0	0,0	2,1
	1997	0,0	0,0	0,0	5,1	6,1	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	1,4
	1998	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	7,7	4,2	0,0	0,0	0,0	3,1
Québec	1994	0,0	0,0	2,4	22,0	38,4	15,8	6,9	9,7	2,9	0,0	0,0	8,6
	1995	0,0	0,0	0,0	8,9	10,5	16,1	3,4	4,7	1,4	0,9	0,0	4,2
	1996	0,0	0,0	2,3	9,1	8,6	5,5	5,1	0,0	1,3	0,0	0,0	2,5
	1997	0,0	0,0	2,3	4,5	13,3	13,4	6,9	5,5	0,0	0,0	0,0	4,0
	1998	0,0	0,0	11,9	15,8	6,8	4,0	13,9	3,6	0,0	0,0	0,0	4,4
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0,0	1,5	0,0	24,6	9,5	9,8	4,7	2,7	0,0	0,0	0,0	3,9
	1995	0,0	0,0	2,8	6,9	6,7	5,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6
	1996	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	5,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	1997	0,0	3,3	0,0	16,4	7,1	5,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	1998	0,0	0,0	0,0	12,7	7,2	2,9	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,6
Estrie	1994	0,0	0,0	0,0	16,3	15,4	17,3	4,2	2,4	0,0	0,0	0,0	4,3
	1995	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	4,4	0,0	4,6	0,0	2,0	0,0	2,5
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	1,1
	1997	0,0	0,0	14,4	5,2	5,6	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	2,8
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Montréal centre	1994	0,0	1,1	52,8	69,4	59,5	55,7	25,4	14,6	5,1	0,3	0,5	23,8
	1995	0,9	2,6	42,9	60,2	45,7	43,6	27,0	15,4	5,6	0,8	1,3	21,4
	1996	0,0	0,5	36,8	52,5	32,3	27,6	29,0	10,7	5,9	0,5	0,9	16,6
	1997	0,0	1,5	42,3	48,5	37,1	37,4	33,9	15,6	5,8	0,8	0,8	18,9
	1998	0,0	1,5	25,3	35,4	41,3	41,2	28,1	10,7	6,5	0,5	1,0	16,5
Outaouais	1994	0,0	2,4	19,9	18,9	7,8	3,3	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	4,2
	1995	0,0	0,0	9,8	4,7	8,1	9,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	1996	0,0	0,0	4,9	9,3	8,3	6,6	3,2	0,0	3,1	0,0	0,0	2,8
	1997	0,0	0,0	9,5	27,6	8,4	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,3	4,0
	1998	0,0	0,0	18,9	18,1	4,3	0,0	3,2	1,8	5,5	0,0	0,0	4,0
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0,0	0,0	16,2	9,5	8,3	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	1995	0,0	0,0	16,1	46,8	26,4	20,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
	1996	0,0	0,0	16,1	27,4	18,2	21,2	13,2	0,0	6,6	4,8	0,0	8,8
	1997	0,0	0,0	0,0	18,0	9,3	14,7	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	4,4
	1998	0,0	0,0	24,2	8,8	9,4	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
Côte-Nord	1994	0,0	0,0	23,9	13,2	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
	1995	0,0	0,0	0,0	26,3	24,8	0,0	10,3	12,0	0,0	0,0	0,0	6,7
	1996	0,0	0,0	48,9	13,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
	1997	0,0	7,2	12,5	25,8	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
	1998	0,0	0,0	12,9	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Nord-du Québec	1994	0,0	0,0	108,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1994-1998) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	1995	0,0	0,0	0,0	14,7	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1996	0,0	0,0	13,4	14,8	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/Appalaches	1994	0,0	0,0	6,9	12,4	7,8	6,1	11,7	3,4	2,7	0,0	0,0	4,2
	1995	0,0	0,0	6,8	4,1	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,3	1,8
	1996	0,0	0,0	0,0	8,0	4,2	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,3
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,8
	1998	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	7,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,0
Laval	1994	0,0	0,0	13,6	8,9	15,3	12,6	6,5	9,8	0,0	0,0	0,0	5,9
	1995	0,0	0,0	4,4	26,9	15,9	9,5	6,4	1,9	0,0	0,0	0,0	5,0
	1996	0,0	0,0	21,7	4,5	20,2	6,5	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	4,6
	1997	0,0	0,0	12,8	18,0	4,1	10,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
	1998	0,0	0,0	8,5	17,7	4,2	10,3	12,1	3,5	2,3	0,0	0,0	4,8
Lanaudière	1994	0,0	0,0	11,8	4,8	30,5	2,7	2,7	1,7	5,5	0,0	0,0	4,6
	1995	3,7	1,8	7,7	4,7	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
	1996	0,0	0,0	0,0	9,0	16,1	0,0	2,5	3,2	0,0	0,0	0,0	2,3
	1997	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998	0,0	0,0	0,0	12,5	8,1	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	2,0
Laurentides	1994	0,0	0,0	14,3	0,0	3,2	0,0	2,4	3,0	4,7	1,7	0,0	2,6
	1995	0,0	0,0	3,5	11,7	13,1	4,7	7,1	1,5	0,0	0,0	0,0	3,2
	1996	0,0	0,0	0,0	11,5	10,0	0,0	2,2	0,0	2,1	0,0	0,0	1,8
	1997	0,0	0,0	6,6	3,7	6,7	4,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
	1998	0,0	0,0	9,8	17,9	3,3	2,5	2,2	2,6	0,0	0,0	0,0	2,8
Montérégie	1994	1,1	0,0	11,9	5,9	13,5	9,2	3,4	1,0	1,5	0,0	0,1	3,8
	1995	0,0	0,0	7,4	10,5	10,6	5,8	3,3	3,3	1,4	0,0	0,1	3,6
	1996	0,0	0,6	8,4	6,9	4,3	7,6	5,6	5,1	1,3	0,0	0,0	3,6
	1997	0,0	0,5	15,7	12,4	13,0	6,1	6,3	3,6	2,5	0,0	0,0	4,8
	1998	0,0	0,0	6,3	15,4	10,8	3,6	4,7	3,1	0,0	0,5	0,0	3,5
Nunavik	1994	0,0	0,0	2011,8	2690,1	1075,3	401,1	163,4	127,1	211,4	0,0	22,7	646,0
	1995	0,0	0,0	1176,5	820,6	116,0	121,7	320,0	113,5	0,0	0,0	10,9	251,7
	1996	0,0	0,0	226,2	572,7	453,5	241,8	576,4	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
	1997	0,0	42,7	441,5	765,0	576,0	347,2	134,6	102,6	193,4	0,0	0,0	236,3
	1998	0,0	43,2	211,4	435,3	327,5	0,0	125,9	0,0	0,0	0,0	0,0	109,9
Terres Cries/Baie James	1994	0,0	0,0	446,9	541,1	123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2
	1995	0,0	54,5	348,8	325,7	123,2	147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,2
	1996	0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	175,4	0,0	0,0	0,0	11,9	59,5
	1997	0,0	0,0	360,6	230,9	121,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8
	1998	110,1	0,0	0,0	745,3	119,9	143,5	0,0	121,7	0,0	0,0	0,0	120,7
Province de Québec	1994	0,2	0,4	22,6	34,0	30,5	21,3	9,2	5,9	2,7	0,2	0,2	10,3
	1995	0,4	0,8	15,3	26,5	20,4	17,0	9,4	5,7	1,8	0,5	0,4	8,3
	1996	0,0	0,3	12,7	20,6	15,9	11,0	9,9	4,2	2,6	0,3	0,2	6,5
	1997	0,0	0,9	16,2	21,5	17,8	14,1	11,1	5,4	2,7	0,2	0,2	7,5
	1998	0,2	0,4	10,6	21,1	16,7	13,8	10,4	4,5	1,9	0,2	0,3	6,6

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	1995	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
	1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Québec	1994	0	0	1	4	0	1	1	0	0	0	0	7
	1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1996	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	4
	1997	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3
	1998	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0	1	0	6	3	0	1	0	0	0	0	11
	1995	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	1996	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	2	0	4	1	0	1	0	0	0	0	8
	1998	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Estrie	1994	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4
	1995	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montréal centre	1994	0	2	38	36	9	10	2	5	2	1	2	107
	1995	1	5	39	26	12	4	7	0	0	0	4	98
	1996	0	1	34	26	9	10	5	2	0	0	2	89
	1997	0	3	31	18	3	4	1	3	3	0	0	66
	1998	0	3	20	10	6	3	2	0	1	0	1	46
Outaouais	1994	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	5
	1995	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4
	1996	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	5
	1997	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	4
	1998	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	7
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	1995	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	8
	1996	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	6
	1997	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
	1998	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	5
Côte-Nord	1994	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	1995	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	1996	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	1997	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4
	1998	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Nord-du Québec	1994	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/ Appalaches	1994	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laval	1994	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	4
	1995	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	5
	1996	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	1997	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5
	1998	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
Lanaudière	1994	0	0	3	1	2	0	0	0	1	0	0	7
	1995	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	1996	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	6
	1997	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Laurentides	1994	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3
	1995	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	7
	1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	1998	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5
Montérégie	1994	1	0	8	2	2	1	0	0	0	0	1	15
	1995	0	0	4	0	3	2	2	0	0	0	0	11
	1996	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	6
	1997	0	1	12	5	1	0	0	0	0	0	0	19
	1998	0	0	3	5	4	0	0	0	0	1	0	13
Nunavik	1994	0	0	13	15	4	2	1	0	0	0	2	37
	1995	0	0	7	6	1	1	1	0	0	0	1	17
	1996	0	0	2	5	3	2	3	0	0	0	0	15
	1997	0	1	4	4	4	2	1	0	1	0	0	17
	1998	0	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	9
Terres Cries/ Baie James	1994	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	0	10
	1995	0	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	7
	1996	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	4
	1997	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
	1998	0	0	0	5	1	1	0	1	0	0	0	8
Province de Québec	1994	1	4	79	77	26	18	6	8	4	1	5	229
	1995	1	7	60	49	23	10	11	5	0	0	5	171
	1996	0	3	47	43	22	14	8	4	1	0	3	145
	1997	0	8	56	41	12	9	4	4	4	0	1	139
	1998	0	4	40	42	14	4	2	2	2	1	1	112

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1995	0,0	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0,0	0,0	0,0	34,7	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,7
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
Québec	1994	0,0	0,0	4,8	17,9	0,0	3,6	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,3
	1996	0,0	0,0	0,0	9,2	4,4	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	1,2
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	3,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,9
	1998	0,0	0,0	14,6	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0,0	3,2	0,0	43,7	19,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
	1995	0,0	0,0	5,8	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	1996	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	1997	0,0	6,7	0,0	27,0	7,3	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	1998	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Estrie	1994	0,0	0,0	0,0	11,0	10,4	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	1995	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	2,1
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montréal centre	1994	0,0	2,2	73,7	54,9	11,3	12,2	2,6	3,7	1,9	0,5	0,2	11,2
	1995	1,9	5,4	75,0	40,8	15,7	4,9	9,0	0,0	0,0	0,0	0,4	10,2
	1996	0,0	1,1	64,5	41,8	12,2	12,5	6,3	1,4	0,0	0,0	0,2	9,3
	1997	0,0	3,1	58,8	28,9	4,2	5,1	1,3	2,1	2,7	0,0	0,0	6,8
	1998	0,0	3,1	37,8	16,0	8,8	4,0	2,5	0,0	0,9	0,0	0,1	4,8
Outaouais	1994	0,0	4,9	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	3,2
	1995	0,0	0,0	20,0	9,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	1996	0,0	0,0	9,8	18,8	8,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	1997	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5
	1998	0,0	0,0	38,1	9,1	0,0	0,0	0,0	3,7	5,6	0,0	0,0	4,2
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0,0	0,0	16,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
	1995	0,0	0,0	33,0	38,8	35,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
	1996	0,0	0,0	33,2	18,9	37,4	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
	1997	0,0	0,0	0,0	18,6	19,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
	1998	0,0	0,0	50,8	18,2	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
Côte-Nord	1994	0,0	0,0	25,0	27,8	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	1995	0,0	0,0	0,0	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
	1996	0,0	0,0	51,8	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	1997	0,0	14,6	0,0	54,8	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
	1998	0,0	0,0	27,4	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Nord-du Québec	1994	0,0	0,0	227,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0,0	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/ Appalaches	1994	0,0	0,0	7,1	8,7	8,1	6,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laval	1994	0,0	0,0	9,3	0,0	7,9	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	2,3
	1995	0,0	0,0	9,1	18,6	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	1996	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
	1997	0,0	0,0	26,4	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	1998	0,0	0,0	17,4	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
Lanaudière	1994	0,0	0,0	24,7	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	3,8
	1995	0,0	3,7	8,1	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
	1996	0,0	0,0	0,0	9,3	24,1	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	3,1
	1997	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Laurentides	1994	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	1,4
	1995	0,0	0,0	7,3	16,0	6,6	4,7	4,8	3,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	1997	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	1998	0,0	0,0	13,5	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
Montréal	1994	2,2	0,0	17,8	4,9	4,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,3
	1995	0,0	0,0	8,7	0,0	6,5	3,4	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
	1996	0,0	1,1	6,5	2,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	1997	0,0	1,1	25,8	11,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	1998	0,0	0,0	6,5	11,3	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,9
Nunavik	1994	0,0	0,0	3009,3	3424,7	985,2	543,5	357,1	0,0	0,0	0,0	46,0	850,6
	1995	0,0	0,0	1587,3	1357,5	237,0	238,1	374,5	0,0	0,0	0,0	22,0	374,6
	1996	0,0	0,0	434,8	1073,0	683,4	492,6	974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,9
	1997	0,0	84,1	851,1	831,6	923,8	469,5	293,3	0,0	339,0	0,0	0,0	347,6
	1998	0,0	84,7	405,7	818,0	425,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,3
Terres Cries/ Baie James	1994	0,0	0,0	919,5	1131,2	281,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,5
	1995	0,0	113,8	484,3	649,4	289,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,5
	1996	0,0	0,0	0,0	668,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	99,7
	1997	0,0	0,0	771,2	241,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,6
	1998	0,0	0,0	0,0	1302,1	259,7	322,6	0,0	268,1	0,0	0,0	0,0	203,6
Province de Québec	1994	0,4	0,9	33,0	32,8	9,5	5,5	1,8	1,4	1,1	0,1	0,1	6,2
	1995	0,4	1,5	24,7	20,9	8,8	3,1	3,3	0,9	0,0	0,0	0,1	4,6
	1996	0,0	0,7	19,1	18,3	8,6	4,4	2,4	0,7	0,2	0,0	0,1	3,9
	1997	0,0	1,8	22,8	17,2	4,8	3,0	1,2	0,7	0,9	0,0	0,0	3,7
	1998	0,0	0,9	16,3	17,3	5,7	1,4	0,6	0,3	0,4	0,1	0,0	2,9

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4
	1995	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	2	0	0	0	1	2	1	0	0	6
	1998	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0	0	0	2	1	4	1	0	0	0	0	8
	1995	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	5
	1996	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0	6
	1997	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4
	1998	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	5
Québec	1994	0	0	0	6	19	8	3	10	2	0	0	48
	1995	0	0	0	4	5	9	2	4	1	1	0	26
	1996	0	0	1	2	3	3	3	0	0	0	0	12
	1997	0	0	1	2	5	6	4	5	0	0	0	23
	1998	0	0	2	4	3	2	8	4	0	0	0	23
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0	0	0	1	0	4	1	2	0	0	0	8
	1995	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	6
	1996	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
	1997	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4
	1998	0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	6
Estrie	1994	0	0	0	2	2	2	1	1	0	0	0	8
	1995	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	4
	1996	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
	1997	0	0	3	0	1	0	0	0	3	0	0	7
	1998	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Montréal centre	1994	0	0	16	54	89	81	37	33	8	0	7	325
	1995	0	0	6	51	58	69	35	41	11	3	18	292
	1996	0	0	5	39	40	36	38	27	12	2	10	209
	1997	0	0	14	42	51	57	52	40	9	2	12	279
	1998	0	0	7	34	52	62	43	30	13	2	12	255
Outaouais	1994	0	0	1	4	2	1	0	0	0	0	0	8
	1995	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	5
	1996	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	4
	1997	0	0	2	3	2	0	2	0	0	0	0	9
	1998	0	0	0	3	1	0	1	0	1	0	0	6
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3
	1995	0	0	0	3	1	1	3	0	0	0	0	8
	1996	0	0	0	2	0	2	2	0	1	1	0	8
	1997	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4
	1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Côte-Nord	1994	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3
	1995	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	5
	1996	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	6
	1997	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord-du Québec	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	1996	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/Appalaches	1994	0	0	1	2	1	1	3	2	1	0	0	11
	1995	0	0	2	1	2	0	0	0	0	1	1	7
	1996	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3
	1997	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	1998	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4
Laval	1994	0	0	2	2	3	4	2	3	0	0	0	16
	1995	0	0	0	4	2	3	2	1	0	0	0	12
	1996	0	0	2	1	5	2	0	3	0	0	0	13
	1997	0	0	0	2	1	3	2	0	0	0	0	8
	1998	0	0	0	2	1	3	4	2	1	0	0	13
Lanaudière	1994	0	0	0	0	6	1	1	1	1	0	0	10
	1995	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	4
	1996	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3
	1997	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	2	2	1	0	2	0	0	0	7
Laurentides	1994	0	0	2	0	1	0	1	2	1	1	0	8
	1995	0	0	0	1	3	1	2	0	0	0	0	7
	1996	0	0	0	3	2	0	1	0	1	0	0	7
	1997	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	5
	1998	0	0	1	2	1	1	1	2	0	0	0	8
Montérégie	1994	0	0	3	3	11	10	4	2	2	0	0	35
	1995	0	0	3	9	7	5	2	7	2	0	1	36
	1996	0	0	5	5	3	9	7	11	2	0	0	42
	1997	0	0	3	6	11	7	8	8	4	0	0	47
	1998	0	0	3	8	6	4	6	7	0	0	0	34
Nunavik	1994	0	0	4	8	5	1	0	1	1	0	0	20
	1995	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0	6
	1996	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	1997	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	6
	1998	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Terres Cries/Baie James	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	1998	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Province de Québec	1994	0	0	31	85	144	120	54	57	16	1	7	515
	1995	1	0	16	78	84	101	51	60	14	6	20	431
	1996	0	0	17	55	61	57	56	45	20	4	10	325
	1997	0	0	26	63	79	79	70	60	19	2	12	410
	1998	1	0	13	61	70	78	68	53	15	2	12	373


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0,0	0,0	0,0	16,5	16,4	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	8,4	0,0	0,0	6,0
	1998	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	15,9	12,0	11,4	0,0	0,0	0,0	5,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0,0	0,0	0,0	21,4	10,7	30,4	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	3,4
	1996	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	8,4	0,0	12,7	6,5	0,0	0,0	4,1
	1997	0,0	0,0	0,0	9,7	11,8	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	2,8
	1998	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	15,2	8,1	0,0	0,0	0,0	3,5
Québec	1994	0,0	0,0	0,0	26,0	74,9	27,5	10,3	19,7	6,0	0,0	0,0	15,4
	1995	0,0	0,0	0,0	17,7	20,5	31,4	6,8	7,7	2,9	2,3	0,0	8,3
	1996	0,0	0,0	4,6	8,9	12,7	10,8	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
	1997	0,0	0,0	4,6	8,9	21,7	22,5	13,6	9,3	0,0	0,0	0,0	7,3
	1998	0,0	0,0	9,4	17,8	13,3	7,9	27,3	7,3	0,0	0,0	0,0	7,3
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	19,3	4,6	5,3	0,0	0,0	0,0	3,3
	1995	0,0	0,0	0,0	6,7	12,9	9,9	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,5
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	1997	0,0	0,0	0,0	6,4	6,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
	1998	0,0	0,0	0,0	12,3	13,9	5,7	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,5
Estrie	1994	0,0	0,0	0,0	21,6	20,1	17,2	8,4	4,7	0,0	0,0	0,0	5,8
	1995	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	2,9
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	2,2
	1997	0,0	0,0	28,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	5,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Montréal centre	1994	0,0	0,0	30,4	82,5	104,8	91,8	48,1	26,2	8,7	0,0	0,8	36,8
	1995	0,0	0,0	11,3	79,5	71,5	78,3	44,8	31,8	11,8	2,0	2,0	32,9
	1996	0,0	0,0	9,4	61,4	51,4	41,6	47,6	20,5	12,6	1,3	1,1	23,5
	1997	0,0	0,0	26,1	66,0	68,2	67,3	64,6	29,9	9,2	1,3	1,3	31,2
	1998	0,0	0,0	13,1	52,7	71,9	75,9	53,1	22,1	12,8	1,3	1,3	28,4
Outaouais	1994	0,0	0,0	9,8	37,3	15,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	19,5	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	6,6	6,5	0,0	6,2	0,0	0,0	2,5
	1997	0,0	0,0	18,8	27,3	17,1	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
	1998	0,0	0,0	0,0	27,0	8,5	0,0	6,3	0,0	5,4	0,0	0,0	3,7
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0,0	0,0	15,9	0,0	16,3	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
	1995	0,0	0,0	0,0	54,2	17,2	13,2	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
	1996	0,0	0,0	0,0	35,5	0,0	27,3	25,4	0,0	12,9	10,1	0,0	9,9
	1997	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	14,3	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	4,9
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Côte-Nord	1994	0,0	0,0	22,8	0,0	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	0,0	19,8	23,1	0,0	0,0	0,0	9,3
	1996	0,0	0,0	46,4	24,6	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
	1997	0,0	0,0	23,6	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du Québec	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	28,9	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
	1996	0,0	0,0	25,9	28,8	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/Appalaches	1994	0,0	0,0	6,7	15,8	7,6	6,0	17,2	6,6	5,4	0,0	0,0	5,7
	1995	0,0	0,0	13,1	7,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,5	3,6
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	3,2	0,0	3,7	0,0	1,6
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	14,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	2,1
Laval	1994	0,0	0,0	17,6	17,1	22,3	24,8	13,2	12,0	0,0	0,0	0,0	9,6
	1995	0,0	0,0	0,0	34,6	15,4	18,6	12,8	3,9	0,0	0,0	0,0	7,1
	1996	0,0	0,0	16,8	8,8	39,3	12,6	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	7,6
	1997	0,0	0,0	0,0	17,4	8,1	19,4	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
	1998	0,0	0,0	0,0	17,1	8,2	20,0	24,2	7,1	4,8	0,0	0,0	7,4
Lanaudière	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5	5,4	5,4	3,3	5,4	0,0	0,0	5,3
	1995	7,1	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	1996	0,0	0,0	0,0	8,8	8,1	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998	0,0	0,0	0,0	16,1	16,0	5,9	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	3,4
Laurentides	1994	0,0	0,0	13,8	0,0	6,3	0,0	4,8	5,9	4,6	3,8	0,0	3,7
	1995	0,0	0,0	0,0	7,6	19,5	4,7	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	1996	0,0	0,0	0,0	22,2	13,2	0,0	4,4	0,0	4,1	0,0	0,0	3,1
	1997	0,0	0,0	0,0	7,2	13,3	4,8	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	1998	0,0	0,0	6,3	13,8	6,6	5,0	4,3	5,1	0,0	0,0	0,0	3,4
Montérégie	1994	0,0	0,0	6,3	6,9	22,5	16,5	6,7	1,9	3,0	0,0	0,0	5,4
	1995	0,0	0,0	6,2	20,5	14,6	8,2	3,3	6,6	2,8	0,0	0,2	5,5
	1996	0,0	0,0	10,2	11,2	6,3	15,0	11,1	10,1	2,7	0,0	0,0	6,3
	1997	0,0	0,0	6,1	13,2	23,3	12,0	12,5	7,2	5,0	0,0	0,0	6,9
	1998	0,0	0,0	6,1	17,2	12,7	7,1	9,3	6,2	0,0	0,0	0,0	5,0
Nunavik	1994	0,0	0,0	968,5	1918,5	1160,1	263,2	0,0	229,9	452,5	0,0	0,0	447,1
	1995	0,0	0,0	733,5	243,3	0,0	0,0	279,3	211,4	0,0	0,0	0,0	130,4
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	225,7	0,0	259,1	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3
	1997	0,0	0,0	0,0	691,2	229,9	228,3	0,0	186,6	0,0	0,0	0,0	123,9
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	224,2	0,0	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3
Terres Cries/Baie James	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	223,7	0,0	0,0	271,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,7	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
	1997	0,0	0,0	0,0	221,2	223,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7
	1998	213,7	0,0	0,0	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9
Province de Québec	1994	0,0	0,0	12,3	34,8	50,6	35,5	16,4	10,3	4,4	0,2	0,2	14,4
	1995	0,4	0,0	6,3	31,9	30,7	30,0	15,3	10,5	3,7	1,2	0,6	11,9
	1996	0,0	0,0	6,6	22,4	22,9	17,4	16,5	7,7	5,0	0,8	0,3	8,9
	1997	0,0	0,0	10,0	25,2	30,3	24,9	20,5	10,1	4,5	0,4	0,3	11,2
	1998	0,4	0,0	5,1	23,9	27,2	25,6	19,9	8,7	3,4	0,4	0,3	10,1


Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée par groupe d'âge,
Québec (1994-1998)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée,
Québec (1991-1998)




Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1994-1998)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes, Québec (1991-1998)



Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1994-1998)



Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes, Québec (1991-1998)



Nombre et pourcentage de cas déclarés de gonorrhée causée par un *Neisseria gonorrhoeae* producteur de pénicillinase (NGPP) ¹ par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994 - 1998)

Région socio-sanitaire		Femmes		Hommes		Manquant		Total	
		Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Bas St-Laurent	1994	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1995	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1996	0	-	0	-	0	-	0	-
	1997	0	-	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1998	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0	0,0	1	12,5	0	-	1	8,3
	1995	0	0,0	1	20,0	0	-	1	16,7
	1996	0	-	1	16,7	0	-	1	16,7
	1997	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	3	60,0	0	-	3	33,3
Québec	1994	1	14,3	0	0,0	0	-	1	1,8
	1995	0	0,0	2	7,7	0	-	2	7,4
	1996	1	25,0	1	8,3	0	-	2	12,5
	1997	0	0,0	2	8,7	0	-	2	7,7
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Mauricie/ Bois-Francs	1994	0	0,0	1	12,5	0	-	1	5,3
	1995	0	0,0	2	33,3	0	-	2	25,0
	1996	0	0,0	1	33,3	0	-	1	25,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Estrie	1994	1	25,0	3	37,5	0	-	4	33,3
	1995	0	0,0	1	25,0	0	-	1	14,3
	1996	0	-	3	100,0	0	-	3	100,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	-	1	50,0	0	-	1	50,0
Montréal centre	1994	8	7,5	17	5,2	0	0,0	25	5,7
	1995	6	6,1	13	4,5	0	0,0	19	4,8
	1996	2	2,2	21	10,0	3	33,3	26	8,5
	1997	9	13,6	20	7,2	0	0,0	29	8,3
	1998	2	4,3	15	5,9	0	0,0	17	5,5
Outaouais	1994	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1995	0	0,0	2	40,0	0	-	2	22,2
	1996	1	20,0	1	25,0	0	-	2	22,2
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	1	16,7	0	-	1	7,7
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1995	1	12,5	1	12,5	0	-	2	12,5
	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	1	25,0	0	-	1	14,3
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Côte-Nord	1994	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1995	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	-	0	-	0	0,0
Nord-du- Québec	1994	0	0,0	0	-	0	-	0	0,0
	1995	0	-	0	-	0	-	0	-
	1996	0	-	0	-	0	-	0	-
	1997	0	-	0	-	0	-	0	-
	1998	0	-	0	-	0	-	0	-

(1): On inclus ici les cas confirmés de NGPP par le LSPQ ainsi que les cas déclarés comme étant causés par une souche "B-Lactame positive" mais non-confirmée par le LSPQ . Certains doublons ne peuvent pas être éliminés de la banque dépersonnalisée.


-.: Aucun cas de gonorrhée déclaré

Nombre et pourcentage de cas déclarés de gonorrhée causée par un *Neisseria gonorrhoeae* producteur de pénicillinase (NGPP) ¹ par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994 - 1998) suite

Région socio-sanitaire		Femmes		Hommes		Manquant		Total	
		Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Gaspésie/ Iles de la madeleine	1994	0	0,0	0	-	0	-	0	0,0
	1995	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1996	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	-	0	-	0	-	0	-
Chaudière/ Appalaches	1994	0	0,0	1	9,1	0	-	1	6,3
	1995	0	-	1	14,3	0	-	1	14,3
	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
Laval	1994	0	0,0	1	6,3	0	-	1	5,0
	1995	0	0,0	3	25,0	0	-	3	17,6
	1996	0	0,0	2	15,4	0	-	2	12,5
	1997	0	0,0	1	12,5	0	-	1	7,7
	1998	0	0,0	1	7,7	0	-	1	5,9
Lanaudière	1994	1	14,3	1	10,0	0	-	2	11,8
	1995	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1996	1	16,7	0	0,0	0	-	1	11,1
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	1	14,3	0	-	1	12,5
Laurentides	1994	1	33,3	1	12,5	0	-	2	18,2
	1995	2	28,6	1	14,3	0	-	3	21,4
	1996	1	100,0	0	0,0	0	-	1	12,5
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Montérégie	1994	1	6,7	2	5,7	0	-	3	6,0
	1995	0	0,0	2	5,6	0	-	2	4,3
	1996	0	0,0	3	7,1	0	-	3	6,3
	1997	0	0,0	5	10,6	0	-	5	7,6
	1998	1	7,7	1	2,9	0	0,0	2	4,2
Kativik	1994	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1995	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Terres Cries/ Baie-James	1994	0	0,0	0	-	0	-	0	0,0
	1995	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Province de Québec	1994	13	5,7	28	5,4	0	0,0	41	5,5
	1995	9	5,3	29	6,7	0	0,0	38	6,3
	1996	6	4,1	33	10,2	3	33,3	42	8,8
	1997	9	6,5	29	7,1	0	0,0	38	6,8
	1998	3	2,7	23	6,2	0	0,0	26	5,3


(1): On inclut ici les cas confirmés de NGPP par le LSPQ ainsi que les cas déclarés comme étant causés par une souche "B-Lactame positive" mais non-confirmée par le LSPQ. Certains doublons ne peuvent pas être éliminés de la banque dépersonnalisée.

-: Aucun cas de gonorrhée déclaré



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	112	232	0	344
1995	66	201	0	267
1996	75	197	0	272
1997	72	158	1	231
1998	59	119	0	178


**Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë
(1995-1998), Province de Québec**



Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence *


	Femmes	Hommes	Total
1995	-41,6	-14,1	-23,0
1996	12,7	-2,8	1,1
1997	-4,7	-20,4	-15,7
1998	-18,6	-25,3	-23,5

*: (taux année courante)-(taux année antérieure)/(taux année antérieure) *100




Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	0	2	0	2
1995	0	0	0	0
1996	1	9	0	10
1997	1	1	0	2
1998	0	3	0	3

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise




Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	0	2	0	2
1995	2	0	0	2
1996	2	3	0	5
1997	0	4	0	4
1998	0	1	0	1

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise




Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	9	32	0	41
1995	12	30	0	42
1996	12	21	0	33
1997	13	28	0	41
1998	5	11	0	16

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise




Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	3	7	0	10
1995	4	21	0	25
1996	6	8	0	14
1997	5	6	0	11
1998	5	6	0	11

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise




Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	3	5	0	8
1995	2	7	0	9
1996	2	4	0	6
1997	1	2	0	3
1998	2	3	0	5

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise




Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	45	103	0	148
1995	24	77	0	101
1996	26	85	0	111
1997	29	56	1	86
1998	26	47	0	73

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	3	6	0	9
1995	4	10	0	14
1996	1	4	0	5
1997	2	2	0	4
1998	1	7	0	8


NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	0	1	0	1
1995	0	3	0	3
1996	0	0	0	0
1997	0	3	0	3
1998	1	2	0	3

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1994-1998)
Région de la Côte-Nord



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	0	0	0	0
1995	0	1	0	1
1996	1	1	0	2
1997	0	0	0	0
1998	0	0	0	0

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1994-1998)
Région Nord-du-Québec



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	1	0	0	1
1995	0	0	0	0
1996	0	0	0	0
1997	0	0	0	0
1998	1	0	0	1

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1994-1998)
Région de la Gaspésie/Iles de la Madeleine



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	0	0	0	0
1995	0	0	0	0
1996	0	0	0	0
1997	0	0	0	0
1998	0	0	0	0

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1994-1998)
Région Chaudière/Appalaches




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	6	2	0	8
1995	4	6	0	10
1996	2	6	0	8
1997	3	3	0	6
1998	1	4	0	5

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1994-1998)
Région de Laval



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	6	16	0	22
1995	3	11	0	14
1996	7	8	0	15
1997	3	6	0	9
1998	1	4	0	5

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1994-1998)
Région de Lanaudière



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	5	4	0	9
1995	1	5	0	6
1996	1	6	0	7
1997	1	8	0	9
1998	4	5	0	9

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise


Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1994-1998)
Région des Laurentides



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	10	24	0	34
1995	5	12	0	17
1996	5	6	0	11
1997	2	5	0	7
1998	5	5	0	10


NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1994-1998)
Région de la Montérégie




Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	21	28	0	49
1995	5	18	0	23
1996	8	36	0	44
1997	12	34	0	46
1998	7	20	0	27

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	0	0	0	0
1995	0	0	0	0
1996	1	0	0	1
1997	0	0	0	0
1998	0	0	0	0

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	0	0	0	0
1995	0	0	0	0
1996	0	0	0	0
1997	0	0	0	0
1998	0	1	0	1

NB: Le "total ajusté" est le taux d'incidence ajusté sur la structure d'âge de l'ensemble de la population québécoise

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1994 0	2	0	2
	1995 0	0	0	0
	1996 1	9	0	10
	1997 1	1	0	2
	1998 0	3	0	3
Saguenay/Lac St-Jean	1994 0	2	0	2
	1995 2	0	0	2
	1996 2	3	0	5
	1997 0	4	0	4
	1998 0	1	0	1
Québec	1994 9	32	0	41
	1995 12	30	0	42
	1996 12	21	0	33
	1997 13	28	0	41
	1998 5	11	0	16
Mauricie/Bois-Francs	1994 3	7	0	10
	1995 4	21	0	25
	1996 6	8	0	14
	1997 5	6	0	11
	1998 5	6	0	11
Estrie	1994 3	5	0	8
	1995 2	7	0	9
	1996 2	4	0	6
	1997 1	2	0	3
	1998 2	3	0	5
Montréal centre	1994 45	103	0	148
	1995 24	77	0	101
	1996 26	85	0	111
	1997 29	56	1	86
	1998 26	47	0	73
Outaouais	1994 3	6	0	9
	1995 4	10	0	14
	1996 1	4	0	5
	1997 2	2	0	4
	1998 1	7	0	8
Abitibi/Témiscamingue	1994 0	1	0	1
	1995 0	3	0	3
	1996 0	0	0	0
	1997 0	3	0	3
	1998 1	2	0	3
Côte-Nord	1994 0	0	0	0
	1995 0	1	0	1
	1996 1	1	0	2
	1997 0	0	0	0
	1998 0	0	0	0
Nord-du-Québec	1994 1	0	0	1
	1995 0	0	0	0
	1996 0	0	0	0
	1997 0	0	0	0
	1998 1	0	0	1

Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la madeleine	1994 0	0	0	0
	1995 0	0	0	0
	1996 0	0	0	0
	1997 0	0	0	0
	1998 0	0	0	0
Chaudière/Appalaches	1994 6	2	0	8
	1995 4	6	0	10
	1996 2	6	0	8
	1997 3	3	0	6
	1998 1	4	0	5
Laval	1994 6	16	0	22
	1995 3	11	0	14
	1996 7	8	0	15
	1997 3	6	0	9
	1998 1	4	0	5
Lanaudière	1994 5	4	0	9
	1995 1	5	0	6
	1996 1	6	0	7
	1997 1	8	0	9
	1998 4	5	0	9
Laurentides	1994 10	24	0	34
	1995 5	12	0	17
	1996 5	6	0	11
	1997 2	5	0	7
	1998 5	5	0	10
Montréal	1994 21	28	0	49
	1995 5	18	0	23
	1996 8	36	0	44
	1997 12	34	0	46
	1998 7	20	0	27
Nunavik	1994 0	0	0	0
	1995 0	0	0	0
	1996 1	0	0	1
	1997 0	0	0	0
	1998 0	0	0	0
Terres Cries/Baie-James	1994 0	0	0	0
	1995 0	0	0	0
	1996 0	0	0	0
	1997 0	0	0	0
	1998 0	1	0	1
Province de Québec	1994 112	232	0	344
	1995 66	201	0	267
	1996 75	197	0	272
	1997 72	158	1	231
	1998 59	119	0	178

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B, par région socio-sanitaire					
Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1994	0,0	2,0	0,0	1,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	1,0	8,9	0,0	4,9
	1997	1,0	1,0	0,0	1,0
	1998	0,0	3,0	0,0	1,5
Saguenay/Lac St-Jean	1994	0,0	1,4	0,0	0,7
	1995	1,4	0,0	0,0	0,7
	1996	1,4	2,1	0,0	1,7
	1997	0,0	2,8	0,0	1,4
	1998	0,0	0,7	0,0	0,3
Québec	1994	2,7	10,3	0,0	6,4
	1995	3,6	9,6	0,0	6,5
	1996	3,6	6,7	0,0	5,1
	1997	3,9	8,9	0,0	6,3
	1998	1,5	3,5	0,0	2,5
Mauricie/Bois-Francis	1994	1,2	2,9	0,0	2,1
	1995	1,6	8,7	0,0	5,1
	1996	2,4	3,3	0,0	2,9
	1997	2,0	2,5	0,0	2,2
	1998	2,0	2,5	0,0	2,2
Estrie	1994	2,1	3,6	0,0	2,9
	1995	1,4	5,1	0,0	3,2
	1996	1,4	2,9	0,0	2,1
	1997	0,7	1,4	0,0	1,1
	1998	1,4	2,1	0,0	1,8
Montréal centre	1994	4,7	11,7	0,0	8,0
	1995	2,5	8,7	0,0	5,5
	1996	2,7	9,5	0,0	6,0
	1997	3,0	6,3	0,1	4,6
	1998	2,7	5,2	0,0	3,9
Outaouais	1994	1,9	3,9	0,0	2,9
	1995	2,5	6,4	0,0	4,5
	1996	0,6	2,5	0,0	1,6
	1997	1,2	1,2	0,0	1,2
	1998	0,6	4,3	0,0	2,4
Abitibi/Témiscamingue	1994	0,0	1,2	0,0	0,6
	1995	0,0	3,7	0,0	1,9
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	3,7	0,0	1,9
	1998	1,3	2,4	0,0	1,9
Côte-Nord	1994	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	1,9	0,0	1,0
	1996	2,0	1,9	0,0	1,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du-Québec	1994	10,3	0,0	0,0	4,9
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	10,5	0,0	0,0	5,0

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la madeleine	1994	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/ Appalaches	1994	3,1	1,0	0,0	2,1
	1995	2,1	3,1	0,0	2,6
	1996	1,0	3,1	0,0	2,1
	1997	1,6	1,5	0,0	1,6
	1998	0,5	2,1	0,0	1,3
Laval	1994	3,5	9,6	0,0	6,5
	1995	1,7	6,5	0,0	4,1
	1996	4,0	4,7	0,0	4,3
	1997	1,7	3,5	0,0	2,6
	1998	0,6	2,3	0,0	1,4
Lanaudière	1994	2,7	2,1	0,0	2,4
	1995	0,5	2,6	0,0	1,6
	1996	0,5	3,1	0,0	1,8
	1997	0,5	4,0	0,0	2,3
	1998	2,0	2,4	0,0	2,2
Laurentides	1994	4,7	11,2	0,0	8,0
	1995	2,3	5,5	0,0	3,9
	1996	2,2	2,7	0,0	2,5
	1997	0,9	2,2	0,0	1,5
	1998	2,1	2,1	0,0	2,1
Montréal	1994	3,2	4,3	0,0	3,8
	1995	0,8	2,7	0,0	1,7
	1996	1,2	5,4	0,0	3,3
	1997	1,8	5,0	0,0	3,4
	1998	1,0	2,9	0,0	2,0
Nunavik	1994	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	21,2	0,0	0,0	10,6
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/ Baie-James	1994	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	23,0	0,0	12,1
Province de Québec	1994	3,0	6,5	0,0	4,7
	1995	1,8	5,6	0,0	3,6
	1996	2,0	5,4	0,0	3,7
	1997	1,9	4,3	0,0	3,1
	1998	1,6	3,2	0,0	2,4

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	1	3	1	1	0	3	1	0	0	10
	1997	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	1995	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	1996	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	5
	1997	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Québec	1994	1	0	3	3	5	11	3	7	4	4	0	41
	1995	0	0	2	2	11	9	4	8	4	2	0	42
	1996	0	0	3	4	8	5	1	8	2	2	0	33
	1997	0	0	2	7	8	6	6	8	1	3	0	41
	1998	0	0	0	2	3	0	1	8	1	1	0	16
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0	0	1	0	1	0	2	4	1	0	1	10
	1995	0	1	1	2	3	3	5	7	2	1	0	25
	1996	0	0	1	0	2	3	2	3	2	1	0	14
	1997	0	0	0	0	1	0	3	4	1	2	0	11
	1998	1	0	1	0	0	2	3	4	0	0	0	11
Estrie	1994	0	0	0	1	1	1	3	1	1	0	0	8
	1995	0	0	0	0	2	3	1	2	0	1	0	9
	1996	1	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	6
	1997	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	1998	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	5
Montréal centre	1994	1	0	2	18	35	30	17	26	10	9	0	148
	1995	1	2	7	14	14	19	12	14	11	7	0	101
	1996	0	1	3	14	15	19	20	19	14	6	0	111
	1997	0	0	3	13	14	16	11	13	9	7	0	86
	1998	0	1	5	13	8	11	4	17	6	8	0	73
Outaouais	1994	0	1	0	1	0	3	3	0	1	0	0	9
	1995	0	0	2	2	1	3	1	4	0	1	0	14
	1996	0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	5
	1997	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	4
	1998	0	0	1	0	0	0	1	3	3	0	0	8
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1995	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	1998	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
Côte-Nord	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord-du Québec	1994	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1994-1998) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/Appalaches	1994	1	0	1	3	0	0	1	2	0	0	0	8
	1995	0	0	0	1	1	0	2	4	1	1	0	10
	1996	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	0	8
	1997	0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	6
	1998	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	5
Laval	1994	0	0	2	2	2	4	1	5	4	2	0	22
	1995	1	0	0	1	4	2	2	2	1	1	0	14
	1996	0	0	3	3	2	2	1	2	1	1	0	15
	1997	0	0	0	2	2	1	0	2	2	0	0	9
	1998	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	5
Lanaudière	1994	0	1	1	0	1	2	1	2	1	0	0	9
	1995	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	0	6
	1996	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	0	7
	1997	0	0	1	2	1	0	0	3	1	1	0	9
	1998	0	0	0	0	1	2	0	3	3	0	0	9
Laurentides	1994	0	1	2	2	5	7	2	7	5	3	0	34
	1995	1	0	2	1	3	1	7	1	0	1	0	17
	1996	0	0	0	0	0	4	1	2	4	0	0	11
	1997	0	0	0	2	0	0	1	2	1	1	0	7
	1998	0	0	1	1	0	2	2	2	1	1	0	10
Montérégie	1994	1	2	2	7	12	9	7	4	5	0	0	49
	1995	0	0	1	3	1	7	6	4	1	0	0	23
	1996	3	2	3	1	6	3	10	5	5	6	0	44
	1997	4	0	3	2	6	5	6	10	4	6	0	46
	1998	1	0	2	2	5	3	4	1	4	5	0	27
Nunavik	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/Baie James	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Province de Québec	1994	4	5	14	38	64	67	42	59	32	18	1	344
	1995	3	3	20	28	40	47	41	49	21	15	0	267
	1996	4	3	14	29	35	40	40	50	37	20	0	272
	1997	4	0	10	30	37	29	30	45	24	22	0	231
	1998	3	1	12	23	19	22	22	39	21	16	0	178

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	6,3	24,8	9,3	6,8	0,0	8,9	4,5	0,0	0,0	4,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	4,1	2,5	0,0	1,5
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,7
	1995	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,2	3,2	4,7	0,0	1,7
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	2,1	3,1	2,3	0,0	1,4
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Québec	1994	2,7	0,0	7,1	6,6	10,1	19,3	5,2	6,8	5,8	3,7	0,0	6,4
	1995	0,0	0,0	4,7	4,5	23,1	16,1	6,9	7,6	5,5	1,8	0,0	6,5
	1996	0,0	0,0	7,0	9,1	17,2	9,2	1,7	7,4	2,7	1,8	0,0	5,1
	1997	0,0	0,0	4,7	15,8	17,7	11,5	10,3	7,3	1,3	2,7	0,0	6,3
	1998	0,0	0,0	0,0	4,5	6,8	0,0	1,7	7,2	1,2	0,9	0,0	2,5
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0,0	0,0	2,9	0,0	3,2	0,0	4,7	5,4	2,0	0,0	0,2	2,1
	1995	0,0	1,6	2,8	6,9	10,0	7,6	11,6	9,2	3,8	1,1	0,0	5,1
	1996	0,0	0,0	2,8	0,0	6,9	7,9	4,6	3,9	3,6	1,1	0,0	2,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	7,0	5,1	1,7	2,2	0,0	2,2
	1998	3,8	0,0	2,8	0,0	0,0	5,9	7,1	5,0	0,0	0,0	0,0	2,2
Estrie	1994	0,0	0,0	0,0	5,4	5,1	4,3	12,7	2,4	3,6	0,0	0,0	2,9
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	13,2	4,2	4,6	0,0	2,0	0,0	3,2
	1996	5,8	0,0	0,0	5,4	0,0	4,6	0,0	4,6	3,3	0,0	0,0	2,1
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	2,2	3,1	0,0	0,0	1,1
	1998	0,0	0,0	4,9	5,1	0,0	4,9	4,2	0,0	2,9	0,0	0,0	1,8
Montréal centre	1994	0,9	0,0	1,9	13,7	21,3	17,6	11,1	10,0	5,1	2,5	0,0	8,0
	1995	0,9	1,1	6,7	10,9	8,9	11,2	7,7	5,3	5,6	1,9	0,0	5,5
	1996	0,0	0,5	2,8	11,1	9,9	11,4	12,6	7,0	6,9	1,6	0,0	6,0
	1997	0,0	0,0	2,8	10,3	9,6	9,8	6,9	4,7	4,3	1,9	0,0	4,6
	1998	0,0	0,5	4,7	10,2	5,7	7,0	2,5	6,1	2,8	2,1	0,0	3,9
Outaouais	1994	0,0	2,4	0,0	4,7	0,0	9,8	10,2	0,0	3,5	0,0	0,0	2,9
	1995	0,0	0,0	9,8	9,4	4,1	9,7	3,3	8,1	0,0	2,5	0,0	4,5
	1996	0,0	0,0	0,0	4,7	4,2	0,0	3,2	3,9	0,0	0,0	0,0	1,6
	1997	0,0	0,0	0,0	4,6	4,2	0,0	3,2	0,0	0,0	2,3	0,0	1,2
	1998	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	3,2	5,5	8,3	0,0	0,0	2,4
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	1995	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	1,9
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	9,0	9,3	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	1,9
	1998	0,0	0,0	0,0	8,8	9,4	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Côte-Nord	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	1,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du Québec	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1994-1998) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/ Appalaches	1994	4,0	0,0	3,4	12,4	0,0	0,0	2,9	3,4	0,0	0,0	0,0	2,1
	1995	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0	5,9	6,5	2,6	1,6	0,0	2,6
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	5,8	3,2	4,9	1,6	0,0	2,1
	1997	0,0	0,0	3,4	0,0	4,2	0,0	2,9	1,6	4,7	0,0	0,0	1,6
	1998	4,4	0,0	3,4	3,8	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Laval	1994	0,0	0,0	9,0	8,9	7,7	12,6	3,3	9,8	10,6	4,0	0,0	6,5
	1995	4,5	0,0	0,0	4,5	15,9	6,3	6,4	3,8	2,6	1,9	0,0	4,1
	1996	0,0	0,0	13,0	13,6	8,1	6,5	3,1	3,7	2,5	1,9	0,0	4,3
	1997	0,0	0,0	0,0	9,0	8,3	3,3	0,0	3,6	4,8	0,0	0,0	2,6
	1998	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	6,1	1,8	2,3	0,0	0,0	1,4
Lanaudière	1994	0,0	1,8	3,9	0,0	3,8	5,4	2,7	3,4	2,8	0,0	0,0	2,4
	1995	0,0	0,0	7,7	4,7	0,0	0,0	0,0	3,3	2,6	0,0	0,0	1,6
	1996	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	2,7	2,5	1,6	4,9	2,0	0,0	1,8
	1997	0,0	0,0	3,7	8,7	4,0	0,0	0,0	4,6	2,3	1,9	0,0	2,3
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	5,9	0,0	4,4	6,4	0,0	0,0	2,2
Laurentides	1994	0,0	1,7	7,2	8,0	15,8	16,5	4,9	10,6	11,9	5,2	0,0	8,0
	1995	3,1	0,0	7,0	3,9	9,8	2,3	16,5	1,5	0,0	1,7	0,0	3,9
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	2,2	2,8	8,4	0,0	0,0	2,5
	1997	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	2,2	2,7	2,0	1,6	0,0	1,5
	1998	0,0	0,0	3,3	3,6	0,0	5,0	4,3	2,6	1,9	1,5	0,0	2,1
Montérégie	1994	1,1	1,1	2,2	8,3	12,4	7,5	5,9	1,9	3,7	0,0	0,0	3,8
	1995	0,0	0,0	1,1	3,5	1,1	5,8	4,9	1,9	0,7	0,0	0,0	1,7
	1996	3,3	1,1	3,1	1,2	6,4	2,5	8,0	2,3	3,4	3,2	0,0	3,3
	1997	4,5	0,0	3,1	2,3	6,5	4,4	4,8	4,5	2,5	3,1	0,0	3,4
	1998	1,1	0,0	2,1	2,2	5,4	2,7	3,2	0,4	2,4	2,5	0,0	2,0
Nunavik	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/ Baie James	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
Province de Québec	1994	0,8	0,5	2,9	7,9	11,5	10,1	6,4	5,3	4,3	1,5	0,0	4,7
	1995	0,6	0,3	4,0	5,8	7,5	7,1	6,2	4,3	2,7	1,3	0,0	3,6
	1996	0,9	0,3	2,8	6,0	6,7	6,2	5,9	4,3	4,6	1,6	0,0	3,7
	1997	0,9	0,0	2,0	6,1	7,3	4,7	4,4	3,8	2,8	1,8	0,0	3,1
	1998	0,7	0,1	2,4	4,6	3,8	3,7	3,3	3,2	2,4	1,3	0,0	2,4

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	1996	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Québec	1994	0	0	2	0	2	2	0	1	1	1	0	9
	1995	0	0	1	2	2	2	0	2	2	1	0	12
	1996	0	0	2	2	4	1	0	1	2	0	0	12
	1997	0	0	2	4	2	4	1	0	0	0	0	13
	1998	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	5
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3
	1995	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
	1996	0	0	1	0	1	0	1	2	1	0	0	6
	1997	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	5
	1998	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	5
Estrie	1994	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	1995	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	1996	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1998	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Montréal centre	1994	0	0	2	5	11	8	7	5	4	3	0	45
	1995	0	1	2	5	2	2	2	5	2	3	0	24
	1996	0	0	0	6	2	1	7	5	2	3	0	26
	1997	0	0	3	5	4	5	3	3	2	4	0	29
	1998	0	0	4	8	2	3	0	5	2	2	0	26
Outaouais	1994	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
	1995	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	4
	1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Côte-Nord	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord-du Québec	1994	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/Appalaches	1994	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	6
	1995	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4
	1996	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	1997	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Laval	1994	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0	6
	1995	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
	1996	0	0	2	1	1	1	0	1	0	1	0	7
	1997	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Lanaudière	1994	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	5
	1995	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1996	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	4
Laurentides	1994	0	0	0	0	2	2	1	2	2	1	0	10
	1995	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	5
	1996	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	5
	1997	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
	1998	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	5
Montérégie	1994	1	1	2	1	5	3	4	2	2	0	0	21
	1995	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	5
	1996	1	1	2	0	1	0	1	0	0	2	0	8
	1997	4	0	1	0	2	1	1	3	0	0	0	12
	1998	1	0	2	1	1	0	1	0	0	1	0	7
Nunavik	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/Baie James	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1994	2	2	10	8	21	18	17	13	14	7	0	112
	1995	1	2	6	11	8	9	7	12	5	5	0	66
	1996	2	1	7	10	9	7	12	13	8	6	0	75
	1997	4	0	7	13	11	10	8	10	5	4	0	72
	1998	2	0	8	11	5	7	5	13	3	5	0	59

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	1,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	6,4	0,0	0,0	1,4
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Québec	1994	0,0	0,0	9,6	0,0	8,3	7,2	0,0	1,9	2,8	1,6	0,0	2,7
	1995	0,0	0,0	4,8	9,1	8,6	7,3	0,0	3,7	5,4	1,5	0,0	3,6
	1996	0,0	0,0	9,5	9,2	17,6	3,8	0,0	1,8	5,2	0,0	0,0	3,6
	1997	0,0	0,0	9,5	18,4	9,0	15,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	3,5	0,0	1,5	0,0	1,5
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,9	0,0	0,0	1,2
	1995	0,0	3,3	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	2,7	0,0	1,9	0,0	1,6
	1996	0,0	0,0	5,7	0,0	7,2	0,0	4,7	5,3	3,6	0,0	0,0	2,4
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	9,4	5,1	0,0	0,0	0,0	2,0
	1998	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	7,6	0,0	0,0	0,0	2,0
Estrie	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	4,8	7,0	0,0	0,0	2,1
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	1,4
	1996	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,7
	1998	0,0	0,0	10,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Montréal centre	1994	0,0	0,0	3,9	7,6	13,8	9,7	9,1	3,7	3,9	1,4	0,0	4,7
	1995	0,0	1,1	3,8	7,8	2,6	2,4	2,6	3,6	1,9	1,4	0,0	2,5
	1996	0,0	0,0	0,0	9,7	2,7	1,2	8,9	3,6	1,9	1,4	0,0	2,7
	1997	0,0	0,0	5,7	8,0	5,7	6,4	3,8	2,1	1,8	1,8	0,0	3,0
	1998	0,0	0,0	7,6	12,8	2,9	4,0	0,0	3,5	1,8	0,9	0,0	2,7
Outaouais	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,8	0,0	7,0	0,0	0,0	1,9
	1995	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	13,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	1997	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Côte-Nord	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	2,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du Québec	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	123,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/ Appalaches	1994	8,1	0,0	7,1	17,4	0,0	0,0	6,0	3,4	0,0	0,0	0,0	3,1
	1995	0,0	0,0	0,0	8,5	8,6	0,0	0,0	3,3	5,3	0,0	0,0	2,1
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	5,0	0,0	0,0	1,0
	1997	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	1,6
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Laval	1994	0,0	0,0	9,3	0,0	7,9	6,4	0,0	0,0	5,2	7,2	0,0	3,5
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	6,4	3,8	0,0	0,0	0,0	1,7
	1996	0,0	0,0	17,8	9,4	8,3	6,7	0,0	3,7	0,0	3,3	0,0	4,0
	1997	0,0	0,0	0,0	9,3	8,5	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	1,7
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,6
Lanaudière	1994	0,0	3,7	8,2	0,0	0,0	5,4	5,4	0,0	5,7	0,0	0,0	2,7
	1995	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1997	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	3,0	4,4	0,0	0,0	2,0
Laurentides	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
Montérégie	1994	2,2	1,1	4,4	2,4	10,5	5,1	6,8	1,9	3,0	0,0	0,0	3,2
	1995	0,0	0,0	2,2	2,4	0,0	3,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	1996	2,3	1,1	4,3	0,0	2,2	0,0	1,6	0,0	0,0	1,9	0,0	1,2
	1997	9,3	0,0	2,1	0,0	4,4	1,8	1,6	2,7	0,0	0,0	0,0	1,8
	1998	2,4	0,0	4,3	2,3	2,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,9	0,0	1,0
Nunavik	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/ Baie James	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1994	0,9	0,4	4,2	3,4	7,7	5,5	5,2	2,3	3,7	1,0	0,0	3,0
	1995	0,4	0,4	2,5	4,7	3,1	2,8	2,1	2,1	1,3	0,7	0,0	1,8
	1996	0,9	0,2	2,9	4,2	3,5	2,2	3,6	2,2	2,0	0,9	0,0	2,0
	1997	1,8	0,0	2,8	5,4	4,4	3,3	2,4	1,7	1,2	0,6	0,0	1,9
	1998	0,9	0,0	3,3	4,5	2,0	2,4	1,5	2,1	0,7	0,7	0,0	1,6

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	1	3	1	1	0	2	1	0	0	9
	1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3
	1997	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4
	1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Québec	1994	1	0	1	3	3	9	3	6	3	3	0	32
	1995	0	0	1	0	9	7	4	6	2	1	0	30
	1996	0	0	1	2	4	4	1	7	0	2	0	21
	1997	0	0	0	3	6	2	5	8	1	3	0	28
	1998	0	0	0	2	1	0	1	6	1	0	0	11
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	1	7
	1995	0	0	1	2	2	3	5	6	2	0	0	21
	1996	0	0	0	0	1	3	1	1	1	1	0	8
	1997	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	6
	1998	0	0	1	0	0	2	2	1	0	0	0	6
Estrie	1994	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	5
	1995	0	0	0	0	2	2	1	1	0	1	0	7
	1996	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	4
	1997	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Montréal centre	1994	1	0	0	13	24	22	10	21	6	6	0	103
	1995	1	1	5	9	12	17	10	9	9	4	0	77
	1996	0	1	3	8	13	18	13	14	12	3	0	85
	1997	0	0	0	8	9	11	8	10	7	3	0	56
	1998	0	1	1	5	6	8	4	12	4	6	0	47
Outaouais	1994	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0	6
	1995	0	0	1	2	1	1	0	4	0	1	0	10
	1996	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4
	1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
	1998	0	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	7
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1995	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	1998	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Côte-Nord	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord-du Québec	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/Appalaches	1994	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
	1995	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	6
	1996	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	6
	1997	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
	1998	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4
Laval	1994	0	0	1	2	1	3	1	5	3	0	0	16
	1995	1	0	0	1	3	2	1	1	1	1	0	11
	1996	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0	8
	1997	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	6
	1998	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	4
Lanaudière	1994	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	4
	1995	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	5
	1996	0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	6
	1997	0	0	1	1	1	0	0	3	1	1	0	8
	1998	0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	5
Laurentides	1994	0	1	2	2	3	5	1	5	3	2	0	24
	1995	0	0	2	0	2	1	6	0	0	1	0	12
	1996	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	6
	1997	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	5
	1998	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	5
Montérégie	1994	0	1	0	6	7	6	3	2	3	0	0	28
	1995	0	0	0	2	1	5	5	4	1	0	0	18
	1996	2	1	1	1	5	3	9	5	5	4	0	36
	1997	0	0	2	2	4	4	5	7	4	6	0	34
	1998	0	0	0	1	4	3	3	1	4	4	0	20
Nunavik	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/Baie James	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Province de Québec	1994	2	3	4	30	43	49	25	46	18	11	1	232
	1995	2	1	14	17	32	38	34	37	16	10	0	201
	1996	2	2	7	19	26	33	28	37	29	14	0	197
	1997	0	0	3	17	25	19	22	35	19	18	0	158
	1998	1	1	4	12	14	15	17	26	18	11	0	119


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1993-1997)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	12,3	48,0	18,3	13,6	0,0	11,7	8,8	0,0	0,0	8,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	8,0	5,9	0,0	3,0
Saguenay/Lac St-Jean	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	4,4	0,0	0,0	0,0	1,4
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	10,6	0,0	2,1
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	4,1	6,2	5,2	0,0	2,8
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Québec	1994	5,4	0,0	4,7	13,0	11,8	31,0	10,3	11,8	9,0	7,0	0,0	10,3
	1995	0,0	0,0	4,6	0,0	36,9	24,4	13,7	11,5	5,7	2,3	0,0	9,6
	1996	0,0	0,0	4,6	8,9	16,9	14,4	3,4	13,2	0,0	4,5	0,0	6,7
	1997	0,0	0,0	0,0	13,4	26,0	7,5	17,0	14,9	2,6	6,6	0,0	8,9
	1998	0,0	0,0	0,0	8,9	4,4	0,0	3,4	11,0	2,5	0,0	0,0	3,5
Mauricie/Bois-Francis	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	9,2	8,0	0,0	0,0	0,4	2,9
	1995	0,0	0,0	5,5	13,4	12,9	14,9	23,1	15,5	7,7	0,0	0,0	8,7
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	15,5	4,6	2,5	3,7	2,6	0,0	3,3
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	5,0	3,5	5,2	0,0	2,5
	1998	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	11,4	9,4	2,4	0,0	0,0	0,0	2,5
Estrie	1994	0,0	0,0	0,0	10,8	10,0	8,6	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	17,5	8,3	4,6	0,0	4,8	0,0	5,1
	1996	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	9,0	6,6	0,0	0,0	2,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	6,2	0,0	0,0	1,4
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	8,4	0,0	5,9	0,0	0,0	2,1
Montréal centre	1994	1,7	0,0	0,0	19,9	28,3	24,9	13,0	16,7	6,5	4,1	0,0	11,7
	1995	1,8	1,0	9,5	14,0	14,8	19,3	12,8	7,0	9,7	2,7	0,0	8,7
	1996	0,0	1,0	5,6	12,6	16,7	20,8	16,3	10,6	12,6	2,0	0,0	9,5
	1997	0,0	0,0	0,0	12,6	12,0	13,0	9,9	7,5	7,1	2,0	0,0	6,3
	1998	0,0	1,0	1,9	7,8	8,3	9,8	4,9	8,8	3,9	4,0	0,0	5,2
Outaouais	1994	0,0	4,7	0,0	9,3	0,0	13,1	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
	1995	0,0	0,0	9,7	18,4	8,2	6,5	0,0	16,0	0,0	5,6	0,0	6,4
	1996	0,0	0,0	0,0	9,2	8,4	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	2,5
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	1,2
	1998	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	16,2	0,0	0,0	4,3
Abitibi/Témiscamingue	1994	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	1995	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	3,7
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	17,5	18,3	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	3,7
	1998	0,0	0,0	0,0	17,2	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Côte-Nord	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	1,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du Québec	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/Appalaches	1994	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	1,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	9,6	0,0	3,8	0,0	3,1
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	5,7	6,3	4,9	3,7	0,0	3,1
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	5,8	3,1	0,0	0,0	0,0	1,5
	1998	8,6	0,0	6,6	7,3	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
Laval	1994	0,0	0,0	8,8	17,1	7,4	18,6	6,6	19,9	16,3	0,0	0,0	9,6
	1995	8,6	0,0	0,0	8,7	23,1	12,4	6,4	3,9	5,3	4,4	0,0	6,5
	1996	0,0	0,0	8,4	17,5	7,9	6,3	6,2	3,8	5,2	0,0	0,0	4,7
	1997	0,0	0,0	0,0	8,7	8,1	6,5	0,0	7,3	5,0	0,0	0,0	3,5
	1998	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	12,1	0,0	4,8	0,0	0,0	2,3
Lanaudière	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	5,4	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	2,1
	1995	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	5,0	0,0	0,0	2,6
	1996	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	5,0	3,1	9,4	4,3	0,0	3,1
	1997	0,0	0,0	7,0	8,4	8,1	0,0	0,0	9,0	4,4	4,1	0,0	4,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	5,8	8,4	0,0	0,0	2,4
Laurentides	1994	0,0	3,3	13,8	15,7	18,9	23,7	4,8	14,8	13,9	7,6	0,0	11,2
	1995	0,0	0,0	13,4	0,0	13,0	4,7	27,8	0,0	0,0	3,7	0,0	5,5
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	2,7
	1997	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	4,3	2,6	3,9	3,5	0,0	2,2
	1998	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	5,0	4,3	2,5	3,6	0,0	0,0	2,1
Montérégie	1994	0,0	1,1	0,0	13,7	14,3	9,9	5,0	1,9	4,5	0,0	0,0	4,3
	1995	0,0	0,0	0,0	4,6	2,1	8,2	8,1	3,8	1,4	0,0	0,0	2,7
	1996	4,3	1,1	2,0	2,2	10,5	5,0	14,3	4,6	6,7	4,9	0,0	5,4
	1997	0,0	0,0	4,1	4,4	8,5	6,9	7,8	6,3	5,0	7,1	0,0	5,0
	1998	0,0	0,0	0,0	2,2	8,5	5,3	4,7	0,9	4,8	4,6	0,0	2,9
Nunavik	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/Baie James	1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	222,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
Province de Québec	1994	0,8	0,6	1,6	12,3	15,1	14,5	7,6	8,3	4,9	2,2	0,0	6,5
	1995	0,8	0,2	5,5	6,9	11,7	11,3	10,2	6,5	4,2	2,0	0,0	5,6
	1996	0,8	0,4	2,7	7,7	9,8	10,1	8,2	6,4	7,3	2,7	0,0	5,4
	1997	0,0	0,0	1,2	6,8	9,6	6,0	6,4	5,9	4,5	3,4	0,0	4,3
	1998	0,4	0,2	1,6	4,7	5,4	4,9	5,0	4,3	4,1	2,1	0,0	3,2


Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë par groupe d'âge,
Québec (1994-1998)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë,
Québec (1991-1998)





Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1994-1998)



Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes, Québec (1991-1998)





Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1994 3	4	0	7
	1995 2	1	0	3
	1996 2	3	0	5
	1997 3	7	0	10
	1998 3	5	0	8
Saguenay/Lac St-Jean	1994 2	5	0	7
	1995 2	3	0	5
	1996 3	3	0	6
	1997 8	8	0	16
	1998 10	12	0	22
Québec	1994 16	46	0	62
	1995 14	48	0	62
	1996 20	31	0	51
	1997 25	54	0	79
	1998 24	48	0	72
Mauricie/Bois-Francs	1994 8	25	0	33
	1995 18	20	0	38
	1996 13	22	0	35
	1997 10	20	0	30
	1998 31	10	0	41
Estrie	1994 11	22	0	33
	1995 7	26	0	33
	1996 6	10	0	16
	1997 8	13	0	21
	1998 8	18	0	26
Montréal centre	1994 324	442	1	767
	1995 289	387	1	677
	1996 280	363	2	645
	1997 256	340	1	597
	1998 236	296	0	532
Outaouais	1994 4	17	0	21
	1995 11	16	0	27
	1996 6	27	1	34
	1997 13	17	0	30
	1998 8	14	0	22
Abitibi/Témiscamingue	1994 2	2	0	4
	1995 5	3	0	8
	1996 2	3	0	5
	1997 4	5	0	9
	1998 1	5	0	6
Côte-Nord	1994 5	1	0	6
	1995 2	0	0	2
	1996 1	4	0	5
	1997 3	3	0	6
	1998 2	3	0	5
Nord-du-Québec	1994 0	2	0	2
	1995 0	0	0	0
	1996 0	0	0	0
	1997 2	0	0	2
	1998 0	1	0	1

Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la madeleine	1994 0	0	0	0
	1995 0	0	0	0
	1996 0	2	0	2
	1997 2	3	0	5
	1998 3	3	0	6
Chaudière/Appalaches	1994 4	8	0	12
	1995 17	17	0	34
	1996 5	12	0	17
	1997 7	15	0	22
	1998 0	10	0	10
Laval	1994 21	31	0	52
	1995 14	25	0	39
	1996 20	20	0	40
	1997 23	31	0	54
	1998 18	26	0	44
Lanaudière	1994 6	22	0	28
	1995 1	1	0	2
	1996 7	15	0	22
	1997 7	22	0	29
	1998 5	14	0	19
Laurentides	1994 15	41	0	56
	1995 24	44	0	68
	1996 23	27	0	50
	1997 9	23	0	32
	1998 11	19	0	30
Montréal	1994 52	93	0	145
	1995 70	80	0	150
	1996 51	78	0	129
	1997 50	74	0	124
	1998 51	81	0	132
Nunavik	1994 1	0	0	1
	1995 0	0	0	0
	1996 1	0	0	1
	1997 0	0	0	0
	1998 3	4	0	7
Terres Cries/Baie-James	1994 0	0	0	0
	1995 0	2	0	2
	1996 0	0	0	0
	1997 0	0	0	0
	1998 0	0	0	0
Province de Québec	1994 474	761	1	1236
	1995 476	673	1	1150
	1996 440	620	3	1063
	1997 430	635	1	1066
	1998 414	569	0	983

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	2	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	7
	1995	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
	1996	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	5
	1997	0	0	0	1	0	0	0	3	2	4	0	10
	1998	2	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	8
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0	0	0	0	0	2	0	4	0	1	0	7
	1995	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	5
	1996	1	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	6
	1997	2	0	0	0	2	1	0	3	4	4	0	16
	1998	2	0	0	1	1	0	4	9	2	3	0	22
Québec	1994	2	2	1	3	8	5	9	14	14	4	0	62
	1995	4	2	2	3	5	9	4	19	10	4	0	62
	1996	1	0	1	3	4	7	6	14	10	5	0	51
	1997	2	1	1	4	7	12	7	24	15	6	0	79
	1998	3	1	2	9	10	6	9	18	9	5	0	72
Mauricie/ Bois-Francis	1994	1	1	2	3	2	3	4	12	4	1	0	33
	1995	2	1	0	3	5	3	10	5	7	2	0	38
	1996	1	0	2	3	1	3	3	10	7	5	0	35
	1997	2	0	0	2	4	6	3	9	3	1	0	30
	1998	1	1	0	2	3	2	7	12	6	7	0	41
Estrie	1994	0	1	0	0	4	4	7	13	1	3	0	33
	1995	0	1	0	4	3	4	5	7	8	1	0	33
	1996	0	1	0	1	1	1	3	5	3	1	0	16
	1997	2	0	0	2	2	4	6	3	2	0	0	21
	1998	0	1	2	2	4	2	0	5	8	2	0	26
Montréal centre	1994	5	17	31	76	114	123	114	161	65	54	7	767
	1995	11	22	38	64	93	104	107	133	59	44	2	677
	1996	5	12	30	49	103	102	95	147	60	41	1	645
	1997	5	14	21	65	87	92	81	116	66	49	1	597
	1998	5	15	25	55	83	78	63	109	55	43	1	532
Outaouais	1994	0	0	0	3	4	2	2	5	4	1	0	21
	1995	1	0	1	2	1	5	2	13	2	0	0	27
	1996	1	0	1	3	7	5	4	8	3	1	1	34
	1997	0	2	1	0	1	4	5	7	3	7	0	30
	1998	1	0	0	0	2	6	3	5	3	1	1	22
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4
	1995	0	0	1	0	1	0	1	2	2	1	0	8
	1996	2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5
	1997	1	0	0	0	1	1	0	4	2	0	0	9
	1998	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	6
Côte-Nord	1994	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0	6
	1995	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	1996	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	5
	1997	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	6
	1998	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	5
Nord-du Québec	1994	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1994-1998) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	5
	1998	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	6
Chaudière/ Appalaches	1994	0	0	0	1	0	0	5	3	1	2	0	12
	1995	0	0	0	0	0	2	2	13	11	6	0	34
	1996	0	0	1	0	1	1	1	5	3	3	2	17
	1997	1	0	0	4	3	1	2	6	2	3	0	22
	1998	0	0	0	0	1	1	0	6	1	1	0	10
Laval	1994	0	1	3	2	2	9	7	14	11	3	0	52
	1995	0	1	4	1	6	6	5	10	3	3	0	39
	1996	0	1	1	2	4	7	6	13	4	2	0	40
	1997	2	2	2	1	2	3	7	13	8	14	0	54
	1998	1	0	1	4	5	4	4	14	8	3	0	44
Lanaudière	1994	1	0	0	1	1	3	3	8	10	0	1	28
	1995	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	1996	0	1	1	1	1	4	2	8	3	1	0	22
	1997	0	1	1	0	3	3	4	11	5	1	0	29
	1998	0	0	0	0	0	1	5	6	6	1	0	19
Laurentides	1994	1	4	3	5	3	7	6	15	7	4	1	56
	1995	1	1	2	4	7	13	6	19	10	5	0	68
	1996	3	2	1	0	4	6	9	15	5	5	0	50
	1997	0	0	0	4	6	0	3	10	7	2	0	32
	1998	0	2	0	1	2	6	4	6	6	3	0	30
Montérégie	1994	4	5	5	10	10	16	19	49	19	8	0	145
	1995	5	5	11	8	24	13	11	37	24	12	0	150
	1996	4	3	4	4	8	10	16	47	25	8	0	129
	1997	1	3	4	10	7	8	11	53	18	8	1	124
	1998	5	5	6	12	12	11	13	36	20	12	0	132
Nunavik	1994	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	0	7
Terres Cries/ Baie James	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1994	17	31	45	107	150	178	176	304	138	81	9	1236
	1995	28	34	59	91	145	160	156	260	137	78	2	1150
	1996	20	20	42	67	137	150	147	276	127	73	4	1063
	1997	20	23	31	94	126	136	130	265	139	100	2	1066
	1998	20	25	37	87	123	122	114	236	133	84	2	983

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	1995	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1996	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
	1998	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	1995	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	1996	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
	1997	1	0	0	0	2	0	0	1	3	1	0	8
	1998	1	0	0	1	0	0	1	3	2	2	0	10
Québec	1994	1	2	0	2	3	3	1	2	2	0	0	16
	1995	2	1	1	2	1	1	3	2	0	1	0	14
	1996	1	0	1	2	3	0	3	3	5	2	0	20
	1997	1	1	1	1	4	4	3	4	4	2	0	25
	1998	2	0	1	6	6	3	3	1	2	0	0	24
Mauricie/ Bois-Francis	1994	1	0	1	2	1	1	0	2	0	0	0	8
	1995	1	1	0	3	3	1	4	1	2	2	0	18
	1996	1	0	2	1	0	0	2	2	3	2	0	13
	1997	0	0	0	1	0	3	1	5	0	0	0	10
	1998	1	0	0	1	1	1	5	11	6	5	0	31
Estrie	1994	0	1	0	0	2	1	0	4	1	2	0	11
	1995	0	1	0	2	0	2	0	0	2	0	0	7
	1996	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	6
	1997	2	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	8
	1998	0	1	1	0	0	0	0	2	3	1	0	8
Montréal centre	1994	1	5	17	41	60	62	44	51	22	20	1	324
	1995	7	14	20	34	44	39	47	49	16	19	0	289
	1996	4	6	16	31	51	46	37	52	23	13	1	280
	1997	2	8	12	40	41	40	28	39	27	19	0	256
	1998	4	10	13	29	45	40	24	31	21	18	1	236
Outaouais	1994	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	4
	1995	1	0	0	2	1	0	1	5	1	0	0	11
	1996	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	6
	1997	0	0	1	0	1	2	4	3	1	1	0	13
	1998	1	0	0	0	1	2	1	3	0	0	0	8
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	1995	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	5
	1996	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	1997	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	4
	1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Côte-Nord	1994	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	5
	1995	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	1996	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
	1998	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
Nord-du Québec	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997) suite

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
Chaudière/ Appalaches	1994	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	4
	1995	0	0	0	0	0	0	1	3	8	5	0	17
	1996	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	5
	1997	0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	0	7
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laval	1994	0	0	2	0	1	5	3	6	3	1	0	21
	1995	0	1	3	1	1	2	1	3	1	1	0	14
	1996	0	0	0	1	3	4	5	7	0	0	0	20
	1997	2	1	1	1	1	0	4	5	3	5	0	23
	1998	1	0	1	2	2	1	1	6	2	2	0	18
Lanaudière	1994	1	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	6
	1995	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1996	0	0	0	1	0	2	1	2	1	0	0	7
	1997	0	0	0	0	1	1	1	3	1	0	0	7
	1998	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	5
Laurentides	1994	1	2	1	1	1	2	0	5	2	0	0	15
	1995	0	0	2	2	1	6	0	9	4	0	0	24
	1996	3	2	1	0	1	2	2	8	2	2	0	23
	1997	0	0	0	2	4	0	0	1	2	0	0	9
	1998	0	2	0	1	1	1	1	3	2	0	0	11
Montérégie	1994	3	1	1	4	5	8	7	14	5	4	0	52
	1995	5	3	6	4	9	7	5	15	12	4	0	70
	1996	1	2	1	2	6	7	6	15	7	4	0	51
	1997	1	2	2	6	4	5	4	18	5	3	0	50
	1998	3	3	2	5	3	4	3	17	6	5	0	51
Nunavik	1994	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3
Terres Cries/ Baie James	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1994	10	11	22	55	74	87	56	92	38	28	1	474
	1995	19	22	33	50	61	59	64	88	48	32	0	476
	1996	15	10	23	38	69	65	56	93	44	26	1	440
	1997	12	12	17	53	61	61	47	84	49	34	0	430
	1998	15	16	18	46	59	54	41	80	49	35	1	414

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997)

Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1994	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	4
	1995	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1996	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
	1997	0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	0	7
	1998	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	5
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	5
	1995	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
	1996	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
	1997	1	0	0	0	0	1	0	2	1	3	0	8
	1998	1	0	0	0	1	0	3	6	0	1	0	12
Québec	1994	1	0	1	1	5	2	8	12	12	4	0	46
	1995	2	1	1	1	4	8	1	17	10	3	0	48
	1996	0	0	0	1	1	7	3	11	5	3	0	31
	1997	1	0	0	3	3	8	4	20	11	4	0	54
	1998	1	1	1	3	4	3	6	17	7	5	0	48
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0	1	1	1	1	2	4	10	4	1	0	25
	1995	1	0	0	0	2	2	6	4	5	0	0	20
	1996	0	0	0	2	1	3	1	8	4	3	0	22
	1997	2	0	0	1	4	3	2	4	3	1	0	20
	1998	0	1	0	1	2	1	2	1	0	2	0	10
Estrie	1994	0	0	0	0	2	3	7	9	0	1	0	22
	1995	0	0	0	2	3	2	5	7	6	1	0	26
	1996	0	1	0	1	1	0	3	2	1	1	0	10
	1997	0	0	0	2	2	1	5	1	2	0	0	13
	1998	0	0	1	2	4	2	0	3	5	1	0	18
Montréal centre	1994	4	12	14	35	54	61	70	109	43	34	6	442
	1995	4	8	18	30	49	64	60	84	43	25	2	387
	1996	1	6	14	17	52	55	58	95	37	28	0	363
	1997	3	6	9	25	46	51	53	77	39	30	1	340
	1998	1	5	12	26	38	38	39	78	34	25	0	296
Outaouais	1994	0	0	0	1	3	2	2	5	3	1	0	17
	1995	0	0	1	0	0	5	1	8	1	0	0	16
	1996	0	0	0	3	4	3	4	8	3	1	1	27
	1997	0	2	0	0	0	2	1	4	2	6	0	17
	1998	0	0	0	0	1	4	2	2	3	1	1	14
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	1995	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
	1996	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
	1997	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	1998	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	5
Côte-Nord	1994	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	1997	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3
	1998	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
Nord-du Québec	1994	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1993-1997) suite


Région socio-sanitaire		0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
	1998	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Chaudière/ Appalaches	1994	0	0	0	1	0	0	4	1	1	1	0	8
	1995	0	0	0	0	0	2	1	10	3	1	0	17
	1996	0	0	0	0	1	1	1	4	2	1	2	12
	1997	1	0	0	3	2	0	2	4	1	2	0	15
	1998	0	0	0	0	1	1	0	6	1	1	0	10
Laval	1994	0	1	1	2	1	4	4	8	8	2	0	31
	1995	0	0	1	0	5	4	4	7	2	2	0	25
	1996	0	1	1	1	1	3	1	6	4	2	0	20
	1997	0	1	1	0	1	3	3	8	5	9	0	31
	1998	0	0	0	2	3	3	3	8	6	1	0	26
Lanaudière	1994	0	0	0	0	1	2	3	7	8	0	1	22
	1995	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1996	0	1	1	0	1	2	1	6	2	1	0	15
	1997	0	1	1	0	2	2	3	8	4	1	0	22
	1998	0	0	0	0	0	1	3	6	4	0	0	14
Laurentides	1994	0	2	2	4	2	5	6	10	5	4	1	41
	1995	1	1	0	2	6	7	6	10	6	5	0	44
	1996	0	0	0	0	3	4	7	7	3	3	0	27
	1997	0	0	0	2	2	0	3	9	5	2	0	23
	1998	0	0	0	0	1	5	3	3	4	3	0	19
Montérégie	1994	1	4	4	6	5	8	12	35	14	4	0	93
	1995	0	2	5	4	15	6	6	22	12	8	0	80
	1996	3	1	3	2	2	3	10	32	18	4	0	78
	1997	0	1	2	4	3	3	7	35	13	5	1	74
	1998	2	2	4	7	9	7	10	19	14	7	0	81
Nunavik	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4
Terres Cries/ Baie James	1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1994	7	20	23	52	76	91	120	211	100	53	8	761
	1995	9	12	26	41	84	100	92	172	89	46	2	673
	1996	5	10	19	28	68	83	91	183	83	47	3	620
	1997	8	11	14	41	65	74	83	181	90	66	2	635
	1998	5	9	19	41	64	68	73	156	84	49	1	569

Nombre de cas déclarés d'hépatite B de type non-précisé par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1994	2	5	0	7
	1995	0	0	0	0
	1996	2	1	0	3
	1997	1	3	0	4
	1998	0	1	0	1
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	2	3	0	5
	1995	2	7	0	9
	1996	2	4	0	6
	1997	1	4	0	5
Québec	1998	0	0	0	0
	1994	15	32	0	47
	1995	5	12	0	17
	1996	3	7	0	10
	1997	2	1	0	3
Mauricie/ Bois-Francis	1998	3	5	0	8
	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
Estrie	1998	5	9	0	14
	1994	1	2	0	3
	1995	1	1	0	2
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
Montréal centre	1998	0	0	0	0
	1994	65	144	3	212
	1995	35	139	5	179
	1996	38	136	3	177
	1997	32	123	18	173
Outaouais	1998	29	98	19	146
	1994	4	6	0	10
	1995	4	9	1	14
	1996	3	8	0	11
	1997	1	5	0	6
Abitibi/ Témiscamingue	1998	0	11	0	11
	1994	0	0	0	0
	1995	2	1	0	3
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
Côte-Nord	1998	0	1	0	1
	1994	0	1	0	1
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
Nord-du- Québec	1998	0	0	0	0
	1994	0	0	0	0
	1995	0	1	0	1
	1996	0	1	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Iles de la madeleine	1994	2	5	0	7
	1995	4	6	0	10
	1996	1	0	0	1
	1997	0	6	0	6
	1998	2	2	0	4
Chaudière/ Appalaches	1994	1	3	0	4
	1995	2	3	0	5
	1996	2	3	0	5
	1997	1	3	0	4
Laval	1998	2	1	0	3
	1994	0	2	0	2
	1995	1	0	0	1
	1996	1	1	0	2
	1997	0	2	0	2
Lanaudière	1998	0	1	0	1
	1994	5	14	0	19
	1995	8	22	0	30
	1996	1	1	0	2
	1997	3	2	0	5
Laurentides	1998	0	1	0	1
	1994	0	1	0	1
	1995	0	0	0	0
	1996	0	1	0	1
	1997	0	0	0	0
Montréal région	1998	0	0	0	0
	1994	2	1	0	3
	1995	1	0	0	1
	1996	0	1	0	1
	1997	0	3	0	3
Nunavik	1998	0	0	1	1
	1994	0	1	0	1
	1995	1	1	0	2
	1996	0	1	0	1
	1997	0	0	0	0
Terres Cries/ Baie-James	1998	0	0	0	0
	1994	1	0	0	1
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
Province de Québec	1998	0	0	0	0
	1994	100	220	3	323
	1995	66	202	6	274
	1996	53	165	3	221
	1997	41	152	18	211
	1998	41	130	20	191


Taux d'incidence des cas déclarés de syphilis récente par sexe (1994-1998)
Province de Québec



Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	4	15	0	19
1995	5	6	0	11
1996	1	11	0	12
1997	4	5	0	9
1998	1	2	0	3


Taux d'incidence des cas déclarés de syphilis récente par sexe (1994-1998)
Région de Québec



Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	0	8	0	8
1995	0	1	0	1
1996	1	1	0	2
1997	1	0	0	1
1998	0	0	0	0

Taux d'incidence des cas déclarés de syphilis récente par sexe (1994-1998)
Région de Montréal centre



Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1994	2	5	0	7
1995	4	4	0	8
1996	0	7	0	7
1997	2	2	0	4
1998	0	1	0	1

Nombre de cas déclarés de syphilis récente par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
Québec	1994	0	8	0	8
	1995	0	1	0	1
	1996	1	1	0	2
	1997	1	0	0	1
	1998	0	0	0	0
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	1	0	1
Estrie	1994	1	1	0	2
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	1	0	1
	1998	0	0	0	0
Montréal centre	1994	2	5	0	7
	1995	4	4	0	8
	1996	0	7	0	7
	1997	2	2	0	4
	1998	0	1	0	1
Outaouais	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
Abitibi/ Témiscamingue	1994	0	0	0	0
	1995	1	0	0	1
	1996	0	0	0	0
	1997	0	1	0	1
	1998	0	0	0	0
Côte-Nord	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
Nord-du- Québec	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Iles de la madeleine	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
Chaudière/ Appalaches	1994	0	1	0	1
	1995	0	1	0	1
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
Laval	1994	0	0	0	0
	1995	1	0	0	1
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
Lanaudière	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	2	0	2
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
Laurentides	1994	0	1	0	1
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	1	0	0	1
	1998	0	0	0	0
Montérégie	1994	1	0	0	1
	1995	0	0	0	0
	1996	0	1	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
Nunavik	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
Terres Cries/ Baie-James	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
Province de Québec	1994	4	15	0	19
	1995	5	6	0	11
	1996	1	11	0	12
	1997	4	5	0	9
	1998	1	2	0	3

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1994	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0
Québec	1994	0,0	2,6	1,2
	1995	0,0	0,3	0,2
	1996	0,3	0,3	0,3
	1997	0,3	0,0	0,2
	1998	0,0	0,0	0,0
Mauricie/ Bois-Francis	1994	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,4	0,2
Estrie	1994	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,7	0,4
	1998	0,0	0,0	0,0
Montréal centre	1994	0,2	0,6	0,4
	1995	0,4	0,5	0,4
	1996	0,0	0,8	0,4
	1997	0,2	0,2	0,2
	1998	0,0	0,1	0,1
Outaouais	1994	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0
Abitibi/ Témiscamingue	1994	1,3	0,0	0,6
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	1,2	0,6
	1998	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1994	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0
Nord-du- Québec	1994	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0

Région socio-sanitaire	Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la madeleine	1994	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0
Chaudière/ Appalaches	1994	0,0	0,5	0,3
	1995	0,0	0,5	0,3
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0
Laval	1994	0,0	0,0	0,0
	1995	0,6	0,0	0,3
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0
Lanaudière	1994	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	1,0	0,5
	1997	0,0	0,0	0,0
Laurentides	1994	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,4	0,0	0,2
	1998	0,0	0,0	0,0
Montréal est	1994	0,2	0,0	0,1
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,1	0,1
	1997	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0
Nunavik	1994	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/ Baie-James	1994	0,0	0,0	0,0
	1995	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1994	0,1	0,4	0,3
	1995	0,1	0,2	0,1
	1996	0,0	0,3	0,2
	1997	0,1	0,1	0,1
	1998	0,0	0,1	0,0

Nombre de cas déclarés de syphilis récente par sexe, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)

	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Femmes												
1994	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	4
1995	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	5
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	4
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Hommes												
1994	0	0	0	0	0	2	4	0	4	1	4	15
1995	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	6
1996	0	0	0	1	0	2	1	3	2	1	1	11
1997	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	5
1998	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Total												
1994	0	0	0	1	1	2	4	0	4	1	6	19
1995	0	0	0	0	5	1	1	1	2	0	1	11
1996	0	0	0	1	0	2	1	3	3	1	1	12
1997	0	0	0	0	1	1	1	0	4	1	1	9
1998	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par sexe, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1994-1998)

	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Femmes												
1994	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hommes												
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,2	0,0	0,7	0,3	0,8	0,4
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,3	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2
1996	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,8	0,3	0,9	0,3	0,3	0,2	0,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
Total												
1993	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,6	0,0	0,4	0,1	0,5	0,3
1994	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
1995	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Nombre de cas déclarés de syphilis ancienne par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1994-1998)

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1994	0	0	0	0
	1995	1	0	0	1
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	1	2	0	3
Saguenay/ Lac St-Jean	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	1	0	0	1
	1997	0	0	0	0
Québec	1998	0	0	0	0
	1994	1	1	0	2
	1995	0	1	0	1
	1996	1	1	0	2
	1997	0	2	0	2
Mauricie/ Bois-Francs	1998	1	2	0	3
	1994	1	0	0	1
	1995	1	0	0	1
	1996	2	2	0	4
	1997	0	0	0	0
Estrie	1998	0	0	0	0
	1994	0	1	0	1
	1995	0	0	0	0
	1996	1	0	0	1
	1997	0	0	0	0
Montréal centre	1998	2	0	0	2
	1994	18	27	0	45
	1995	24	18	0	42
	1996	15	17	0	32
	1997	10	11	0	21
Outaouais	1998	10	14	0	24
	1994	0	0	0	0
	1995	2	0	0	2
	1996	0	0	0	0
	1997	2	1	0	3
Abitibi/ Témiscamingue	1998	1	0	0	1
	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
Côte-Nord	1998	0	0	0	0
	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
Nord-du- Québec	1998	0	0	0	0
	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0

Région socio-sanitaire		Femmes	Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la madeleine	1994	0	0	0	0
	1995	1	0	0	1
	1996	0	0	0	0
	1997	0	1	0	1
	1998	0	0	0	0
Chaudière/ Appalaches	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
Laval	1998	0	0	0	0
	1994	3	3	0	6
	1995	2	1	0	3
	1996	1	0	0	1
	1997	2	1	0	3
Lanaudière	1998	6	1	0	7
	1994	0	1	0	1
	1995	0	0	0	0
	1996	1	0	0	1
	1997	0	0	0	0
Laurentides	1998	0	0	0	0
	1994	3	2	0	5
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	1	0	1
Montréal région	1998	0	0	0	0
	1994	2	1	0	3
	1995	2	4	0	6
	1996	2	3	0	5
	1997	2	1	0	3
Nunavik	1998	0	0	0	0
	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
Terres Cries/ Baie-James	1998	0	0	0	0
	1994	0	0	0	0
	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
Province de Québec	1998	0	0	0	0
	1994	28	36	0	64
	1995	33	24	0	57
	1996	24	23	0	47
	1997	16	18	0	34
	1998	21	19	0	40

Annexe 1

Le dépistage de la chlamydie par amplification génique

Les augmentations observées dans les taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie nous ont amenés à nous questionner sur l'impact potentiel de l'implantation des nouvelles techniques de laboratoire dans le diagnostic de cette infection. Ces nouvelles techniques d'amplification génique (LCR/PCR) étant plus sensibles que celles qu'elles remplacent, nous voulions savoir si leur introduction pouvait expliquer les tendances observées. Nous avons questionné les laboratoires médicaux du Québec à propos de l'implantation de ces techniques.

Sur les 126 questionnaires envoyés, 109 ont été retournés. Parmi les laboratoires répondants, 106 offrent les tests de dépistage de la chlamydie, que ce soit dans leurs installations (74) ou par l'envoi des prélèvements dans un autre laboratoire (32).

Parmi ceux qui offrent le test, 23 le font par des méthodes d'amplification génique tandis que les 51 autres se servent de méthodes enzymatiques, d'immunofluorescence ou de culture cellulaire.

Parmi les laboratoires qui envoient leurs spécimens à l'extérieur, 21 le font vers des laboratoires se servant de test d'amplification génique et 8 autres vers des laboratoires qui ne s'en servent pas (les autres prélèvements sont envoyés vers des laboratoires qui n'ont pas répondu au questionnaire).

On a ainsi 44 sites offrant le dépistage de la chlamydie et dont les prélèvements sont analysés par des méthodes d'amplification génique et 59 sites dont les prélèvements sont analysés par d'autres méthodes. L'implantation des techniques d'amplification génique est par ailleurs récente puisque 16 des 23 laboratoires qui s'en servent ne le font que depuis 1997 ou 1998 (les autres laboratoires s'en servant depuis 1994 (1 laboratoire), 1995 (2) ou 1996 (4)). En l'an 2000, les spécimens de 64 des 103 laboratoires seront analysés par amplification génique. On trouvera dans le tableau qui suit le détail des réponses faites dans chacune des régions quant aux tests utilisés pour le dépistage de la chlamydie.

Tests de laboratoire utilisés en 1999 dans le dépistage de la chlamydie par région sociosanitaire

Région sociosanitaire	Nombre de laboratoires interrogés	Nombre de laboratoires ayant répondu	Dépistage ¹ par				Nombre de laboratoires qui implanteront le PCR en 2000
			PCR	EIA	IFA	Culture cellulaire	
Bas-Saint-Laurent	8	6	3	2	0	0	1
Saguenay-Lac Saint-Jean	6	5	0	4	1	0	1
Québec	13	13	10	3	0	0	2
Mauricie-Bois-Francs	10	8	3	4	0	0	1
Estrie	8	7	4	1	0	0	0
Montréal	28	24 ²	11	8	0	1	2
Outaouais	5	5	2	0	1	0	2
Abitibi-Témiscamingue	6	5	0	4	1 ³	0	1
Côte-Nord	6	6	0	4	0	0	0
Nord-du-Québec	3	3	0	2	0	0	0
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	5	3	1	2	1 ³	0	0
Chaudière-Appalaches	6	5	0	5	0	0	1
Laval	1	0	-	-	-	-	-
Lanaudière	2	1	1	0	0	0	1
Laurentides	6	5	3	2	1 ³	0	3
Montérégie	11	10	4	6	3 ³	0	1
Nunavik	2	2	1	0	0	0	1
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1	1	1	0	0	0	1

1. Les tests sont faits sur place ou envoyés dans un autre laboratoire.

2. Seulement 3 laboratoires n'offrent pas le dépistage de la chlamydie.

3. La somme des méthodes utilisées dans chaque laboratoire est parfois supérieure au nombre de laboratoires ayant répondu parce que quelques laboratoires se servent de plus d'une méthode de dépistage.

On retrouvera dans le prochain tableau le détail des réponses données dans chacune des régions à propos du nombre de tests faits en 1997 et 1998 et de la positivité de ceux-ci.

Nombre de tests de dépistage de la chlamydiae faits en 1997 et 1998 et positivité de ces tests par région sociosanitaire

Région sociosanitaire	Nombre de laboratoires interrogés	Nombre de tests (nombre de laboratoire ayant répondu)				Pourcentage des tests positifs (nombre de laboratoire ayant répondu)			
		1997		1998		1997		1998	
Bas Saint-Laurent	8	1 358	(2)	1 249	(2)	3,5	(2)	2,6	(2)
Saguenay-Lac Saint-Jean	6	6 824	(5)	6 647	(5)	3,0	(5)	3,3	(5)
Québec	13	28 937	(13)	29 527	(13)	2,5	(12)	3,2	(13)
Mauricie-Bois-Francs	10	6 716	(3)	6 693	(3)	2,2	(2)	2,1	(1)
Estrie	8	7 216	(5)	13 283	(5)	1,7	(5)	2,3	(5)
Montréal	28	74 344	(17)	84 612 ¹	(19)	3,3	(14)	3,1	(16)
Outaouais	5	12 176	(5)	11 701	(5)	2,0	(5)	2,1	(5)
Abitibi-Témiscamingue	6	9 458	(5)	8 782	(5)	2,4	(4)	2,2	(4)
Côte-Nord	6	5 745	(6)	5 525	(6)	4,3	(6)	4,4	(6)
Nord-du-Québec	3	-	(0)	-	(0)	-	(0)	-	(0)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	5	1 455	(2)	1 450	(2)	1,2	(1)	2,0	(1)
Chaudière-Appalaches	6	3 930	(4)	4 484	(4)	3,1	(1)	3,1	(1)
Laval	1	-	(0)	-	(0)	-	(0)	-	(0)
Lanaudière	2	4 421	(1)	4 462	(1)	1,9	(1)	2,4	(1)
Laurentides	6	16 716	(5)	16 204	(5)	2,8	(5)	2,8	(5)
Montérégie	11	16 182	(10)	17 025	(10)	2,7	(9)	2,7	(10)
Nunavik	2	-	(0)	-	(0)	-	(0)	-	(0)
Terres-Cries-de-la-Baie-James	1	-	(0)	1 100	(1)	-	(0)	7,0	(1)

1. 82 812 si on se limite aux 17 laboratoires qui disposaient des données pour 1997.

Si on applique la positivité rapportée par chaque laboratoire interrogé au nombre de tests faits, on obtient le nombre de tests positifs trouvés qu'on peut additionner pour chaque région. On peut ensuite comparer ce total au nombre de cas déclarés dans les banques MADO en 1997 et 1998. Cette comparaison est faite à titre indicatif seulement puisque les données proviennent de deux sources différentes. Le système MADO souffre de sous-déclaration et plusieurs laboratoires n'ont pas été en mesure de calculer le nombre de tests ainsi que la positivité de ces tests.

Nombre de cas de chlamydie déclarés et nombre de tests positifs rapportés par les laboratoires par région sociosanitaire, 1997-1998

Région sociosanitaire ¹	Nb de chlamydioses déclarées		Nb de tests <i>Chlamydia</i> positifs rapportés		Nb de tests positifs rapportés / nb de cas déclarés*100	
	1997	1998	1997	1998	1997	1998
Bas Saint-Laurent	182	245	47	32	26	13
Saguenay-Lac Saint-Jean	272	281	205	220	75	78
Québec	649	745	723	945	>100	>100
Mauricie-Bois Francs	344	460	91	68	26	15
Estrie	278	297	123	309	44	>100
Montréal	1835	2085	1965	2298	>100	>100
Outaouais	237	282	245	240	>100	85
<i>Abitibi-Témiscamingue</i>	221	196	192	215	87	>100
Côte-Nord	214	228	247	241	>100	>100
Nord-du-Québec	13	13	-	-	-	-
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	56	31	14	22	25	71
Chaudière-Appalaches	214	232	29	34	14	15
Laval	234	284	0	0	0	0
Lanaudière	273	255	86	110	32	43
Laurentides	336	396	465	472	>100	>100
Montréal	772	869	434	457	56	53
Nunavik	259	230	-	-	-	-
Terres-Cries-de-la-Baie-James	77	135	-	-	-	-
Province de Québec	6466	7264	4438	5086	71	73

1. Les territoires dont les noms sont en caractères gras sont ceux où on observe une hausse des taux d'incidence de la chlamydie en 1998. Ceux dont les noms sont en italiques sont ceux pour lesquels nous disposons d'un nombre de tests positifs rapportés supérieur ou comparable au nombre de cas déclarés.

Dans la majorité des régions, les nombres de tests positifs rapportés par les laboratoires participants représentent une trop petite proportion des cas déclarés pour qu'on puisse juger de l'effet des nouvelles méthodes d'analyse sur l'incidence des cas déclarés. Il en va autrement des régions de Québec, de Montréal, de l'Outaouais, de l'Abitibi, de la Côte-Nord et des Laurentides.

Dans la région de Québec, on observe une augmentation de la positivité rapportée par les laboratoires, celle-ci passant de 2,5 % à 3,2 %. Cette augmentation pourrait être associée à l'implantation de l'amplification génique qui a eu lieu en 1998 pour sept des dix laboratoires qui rapportent l'utilisation de ce test pour leurs dépistages.

Dans la région de l'Outaouais, le PCR a été implanté en mars 1998 au pavillon Hull du centre hospitalier régional. Nous ne disposons pas des données de 1996 mais constatons que le nombre de tests faits dans cette région a baissé de 12 176 en 1997 à 11 701 en 1998. La positivité des tests est passée de 2 % en 1997 à 2,1 % en 1998.

Dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, les méthodes d'amplification génique ne sont pas encore utilisées et le nombre de tests a baissé, passant de 9 617 en 1996, à 9 458 et 8 782 en 1997, et en 1998. La positivité des tests était de 2,2 % en 1997 et de 2,4 % en 1998. L'incidence de la chlamydie n'y a pas augmenté.

Dans la région de la Côte-Nord, les méthodes d'amplification génique ne sont pas encore implantées. Il nous est impossible de nous prononcer sur le nombre de tests effectués et sur la positivité de ces tests puisque certaines des données fournies sont des approximations.

Dans la région des Laurentides, la technique PCR a été implantée dans un premier laboratoire en juin 1998. Le nombre de tests dans l'ensemble de la région y est passé de 16 176 en 1997 (avec une positivité de 2,8 %) à 16 204 en 1998 (avec une positivité de 2,8 %).

Dans la région de Montréal, le PCR était déjà implanté en 1994 et plusieurs laboratoires ont suivi le mouvement. On y rapportait avoir fait 84 612 tests de chlamydie en 1998, dont 82 812 ont été rapportés par des laboratoires qui disposaient également des données pour 1997. De ces tests, 66 160 ont été faits par PCR, soit 80 %, alors que c'était 51 % en 1997 (38 244/74 344).

La positivité des tests était de 3,1 % en 1997 (1 965/64 406) et de 3,3 % en 1998 (2 298/70 466). En 1997, la positivité était de 3,1 % (949/30 469) pour les tests faits par d'autres méthodes que l'amplification génique et de 3,0 % (1 016/33 937) pour les tests faits par PCR. En 1998, la positivité de ces tests était respectivement de 2,8 % (294/10 603) et de 3,3 % (2 004/59 863).

Dans les régions qui se servent des nouvelles méthodes, très peu de laboratoires offrent l'analyse sur des prélèvements urinaires. À Montréal, par exemple, seulement sept laboratoires nous ont rapporté offrir l'analyse des urines et ces analyses ne représentent qu'une faible partie des tests effectués (habituellement 5 % ou moins).

Ces résultats sont abordés dans la section Discussion du rapport.

Annexe 2
Surveillance par période des MTS
au 14 août 1999

Chlamydia (génitale)

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999

													1999																				
TABLEAU 1 - Évolution de la production de la forêt d'été, par région, 1997-1999													1997	1998	1999																		
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1999	1998	1997	Régions	1997	1998	1999	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 1999 vs 1998 (%)
													5	15	14	Bas-Saint-Laurent 01	93	140	92														
						+		+					21	16	16	Saguenay- Lac-Saint-Jean 02	154	175	179									+					
						+	+		+		+	+	48	47	46	Québec 03	357	431	470			+	+	+	+	+	+	+	+				9,0
								+	+				26	33	14	Mauricie- Bois-Francs 04	198	261	248							+							
						+	+		+	+		+	13	18	15	Estrie 05	156	173	203	+			+	+	+	+	+	+	+	+			17,3
						+	+	+	+	+	+	+	190	160	171	Montréal- Centre 06	1064	1195	1440	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				20,5
						+	+		+			+	30	27	16	Outaouais 07	142	174	195	+					+	+	+	+					12,1
						+			+				15	12	14	Abitibi- Témiscamingue 08	133	120	110														
											+		15	10	19	Côte-Nord 09	152	130	169					+	+	+	+	+					30,0
						+			+				3	4	0	Nord-du-Québec 10	7	8	14							+	+	+					
													0	0	6	Gaspésie-Iles-de-la- Madeleine 11	39	19	13														
												+	15	22	9	Chaudière- Appalaches 12	136	143	137	+			+	+									
							+	+		+		+	12	14	19	Laval 13	139	144	155	+			+	+	+	+	+	+	+				7,6
							+	+	+			+	26	30	16	Lanaudière 14	162	162	248	+	+	+	+	+	+	+	+	+					53,1
							+	+			+		20	36	8	Laurentides 15	206	238	249			+	+	+		+	+	+					4,6
						+			+	+	+	+	100	68	59	Montréal 16	462	515	588	+	+	+	+	+	+	+	+	+					14,2
												+	14	23	18	Nunavik 17	189	152	170	+				+									
													0	9	4	Terres-Cries-de-la-Baie- James 18	44	86	52														
						+	+	+	+		+	+	553	544	464	Province de Québec	3833	4266	4732	+	+	+	+	+	+	+	+	+					10,9

Un + signifie un excès de cas observés en 1999 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 3 janvier 1999 et la dernière se termine le 1^{er} janvier 2000.

Les données ont été extraites de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Chlamydia (génitale)

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999

PÉRIODE 6 : du 3 janvier au 14 août 1999																																	
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1999 courant	1998 courant	1997 courant	Régions	1997 cumulatif	1998 cumulatif	1999 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 1999 vs 1998 (%)
												+	3	12	10	Bas-Saint-Laurent 01	58	84	61	+													
					+		+						16	13	11	Saguenay- Lac-Saint-Jean 02	111	133	129														
						+	+	+		+	+		31	31	37	Québec 03	259	306	335		+	+	+	+	+	+	+	+					
					+		+					+	23	21	10	Mauricie- Bois-Francis 04	144	181	177	+	+				+								
						+	+		+	+		+	10	15	11	Estrie 05	109	115	145	+		+	+	+	+	+	+	+					
					+	+	+			+	+	+	132	118	112	Montréal- Centre 06	779	867	1018	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
					+			+				+	24	21	14	Outaouais 07	113	138	149	+					+	+	+	+					
									+				8	9	12	Abitibi- Témiscamingue 08	102	88	80														
											+		11	5	13	Côte-Nord 09	106	94	131					+	+	+	+	+	+				
						+				+			3	4	0	Nord-du-Québec 10	5	7	9								+	+					
													0	0	3	Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine 11	30	14	11														
												+	11	15	6	Chaudière- Appalaches 12	92	102	98	+		+	+										
							+	+		+			8	10	15	Laval 13	109	104	105							+	+						
						+	+				+	+	22	24	11	Lanaudière 14	133	122	182	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
						+	+						14	28	5	Laurentides 15	164	183	190		+	+	+			+	+	+					
					+			+	+	+		+	81	53	50	Montérégie 16	360	374	443	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
											+		9	16	14	Nunavik 17	140	106	118	+													
													0	8	4	Terres-Cries-de-la-Baie- James 18	40	80	47														
					+	+	+			+		+	406	403	338	Province de Québec	2854	3098	3428	+	+	+	+	+	+	+	+	+					

Un + signifie un excès de cas observés en 1999 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 3 janvier 1999 et la dernière se termine le 1^{er} janvier 2000.

Les données ont été extraites de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Chlamydia (génitale)

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999																																	
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1999 courant	1998 courant	1997 courant	Régions	1997 cumulatif	1998 cumulatif	1999 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 1999 vs 1998 (%)
													2	3	4	Bas-Saint-Laurent 01	35	56	31														
						+	+						5	3	5	Saguenay- Lac-Saint-Jean 02	43	41	50							+	+	+					
					+	+		+		+		+	17	16	9	Québec 03	98	125	135		+	+	+	+	+	+	+	+					
							+	+					3	12	4	Mauricie- Bois-Francis 04	54	80	66														
													3	3	4	Estrie 05	47	58	58	+		+											
						+	+	+	+	+	+	+	57	41	59	Montréal- Centre 06	281	323	416	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
								+	+				6	6	2	Outaouais 07	29	36	46	+						+	+	+					
					+				+				7	3	2	Abitibi- Témiscamingue 08	31	32	30														
													4	5	6	Côte-Nord 09	46	36	38														
						+			+			+	0	0	0	Nord-du-Québec 10	2	1	5					+	+	+	+	+					
										+			0	0	3	Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine 11	9	5	2														
									+			+	4	7	3	Chaudière- Appalaches 12	44	41	39	+		+	+										
								+	+	+			4	4	4	Laval 13	30	40	50	+		+	+	+	+	+	+	+					
						+		+	+		+	+	4	6	5	Lanaudière 14	29	40	66	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
						+				+		+	6	8	3	Laurentides 15	42	55	59		+	+	+			+	+	+					
					+	+	+	+					19	15	9	Montérégie 16	102	141	145	+	+	+						+					
												+	5	7	4	Nunavik 17	49	46	52	+				+		+	+	+					
								+					0	1	0	Terres-Cries-de-la-Baie- James 18	4	6	5														
					+	+	+	+				+	146	140	126	Province de Québec	975	1162	1293	+	+	+		+	+	+	+						

Un + signifie un excès de cas observés en 1999 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 3 janvier 1999 et la dernière se termine le 1^{er} janvier 2000.

Les données ont été extraites de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Gonorrhée

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999

PÉRIODE 6 : du 3 janvier au 14 août 1999																																	
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1999 courant	1998 courant	1997 courant	Régions	1997 cumulatif	1998 cumulatif	1999 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 1999 vs 1998 (%)
													0	0	1	Bas-Saint-Laurent 01	6	3	2														
							+					+	0	0	0	Saguenay- Lac-Saint-Jean 02	4	6	4	+	+	+											
						+	+		+	+	+	+	3	5	1	Québec 03	12	15	27	+	+	+	+	+	+	+	+						80,0
													2	2	0	Mauricie- Bois-Francis 04	9	6	4														
							+	+					0	0	1	Estrie 05	4	1	4								+						
						+			+		+	+	23	19	30	Montréal- Centre 06	210	164	224	+	+	+	+	+	+	+	+	+					36,6
					+	+			+			+	2	0	1	Outaouais 07	2	7	14	+	+	+	+	+	+	+	+	+					100,0
							+						0	0	0	Abitibi- Témiscamingue 08	6	2	1														
													0	0	0	Côte-Nord 09	4	2	0														
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	0	0														
													0	0	0	Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine 11	1	0	0														
													0	0	0	Chaudière- Appalaches 12	1	3	1														
						+			+	+			1	1	0	Laval 13	10	7	10														
					+	+			+		+	+	2	0	0	Lanaudière 14	2	4	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+					150,0
							+					+	0	1	0	Laurentides 15	6	11	9	+													
						+		+	+	+	+		6	5	12	Montérégie 16	38	22	46		+	+	+	+	+	+	+	+					109,1
													0	2	7	Nunavik 17	13	6	4														
													0	0	0	Terres-Cries-de-la-Baie- James 18	3	9	0														
						+				+	+	+	39	35	53	Province de Québec	331	268	360	+	+	+	+	+	+	+	+	+					34,3

Un + signifie un excès de cas observés en 1999 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 3 janvier 1999 et la dernière se termine le 1^{er} janvier 2000.

Les données ont été extraites de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Gonorrhée

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999

PÉRIODE 6 : du 3 janvier au 14 août 1999																																	
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1999 courant	1998 courant	1997 courant	Régions	1997 cumulatif	1998 cumulatif	1999 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 1999 vs 1998 (%)
													0	0	0	Bas-Saint-Laurent 01	0	0	0														
													0	0	0	Saguenay- Lac-Saint-Jean 02	0	3	0														
					+						+		1	0	0	Québec 03	1	2	6		+	+	+	+	+	+	+						
													1	2	0	Mauricie- Bois-Francis 04	7	2	1														
													0	0	0	Estrie 05	1	0	1														
					+	+	+					+	8	3	2	Montréal- Centre 06	41	24	43	+								+					
						+							0	0	0	Outaouais 07	0	3	2														
							+						0	0	0	Abitibi- Témiscamingue 08	3	1	1														
													0	0	0	Côte-Nord 09	2	2	0														
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	0	0														
													0	0	0	Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine 11	0	0	0														
													0	0	0	Chaudière- Appalaches 12	1	0	0														
									+				0	0	0	Laval 13	4	2	2														
						+						+	0	0	0	Lanaudière 14	1	0	2	+							+	+					
							+						0	1	0	Laurentides 15	1	4	3														
								+					1	4	3	Montréal 16	13	7	8														
													0	1	5	Nunavik 17	9	4	2														
													0	0	0	Terres-Cries-de-la-Baie- James 18	2	7	0														
						+						+	11	11	10	Province de Québec	86	61	71	+													

Un + signifie un excès de cas observés en 1999 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 3 janvier 1999 et la dernière se termine le 1^{er} janvier 2000.

Les données ont été extraites de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Gonorrhée

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1999 courant	1998 courant	1997 courant	Régions	1997 cumulatif	1998 cumulatif	1999 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 1999 vs 1998 (%)
													0	0	1	Bas-Saint-Laurent 01	6	3	2														
						+						+	0	0	0	Saguenay- Lac-Saint-Jean 02	4	3	4														
						+	+		+	+		+	2	5	1	Québec 03	11	13	21		+	+	+	+	+	+	+						61,5
					+				+				1	0	0	Mauricie- Bois-Francis 04	2	4	3														
							+	+					0	0	1	Estrie 05	3	1	3	+		+				+							
						+			+		+	+	15	16	27	Montréal- Centre 06	166	138	180	+	+	+	+	+	+	+	+						30,4
					+			+	+			+	2	0	1	Outaouais 07	2	4	12	+				+	+	+	+	+					
													0	0	0	Abitibi- Témiscamingue 08	3	1	0														
													0	0	0	Côte-Nord 09	2	0	0														
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	0	0														
													0	0	0	Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine 11	1	0	0														
													0	0	0	Chaudière- Appalaches 12	0	3	1	+		+											
						+					+	+	1	1	0	Laval 13	6	5	8	+		+					+	+					
						+	+			+		+	2	0	0	Lanaudière 14	1	4	8	+	+	+	+	+		+	+						
							+					+	0	0	0	Laurentides 15	5	7	6		+	+											
						+		+	+	+	+	+	5	1	9	Montérégie 16	25	15	38	+	+	+	+	+	+	+	+						153,3
													0	1	2	Nunavik 17	4	2	2	+					+								
													0	0	0	Terres-Cries-de-la-Baie- James 18	1	2	0														
						+			+	+	+	+	28	24	42	Province de Québec	242	205	288	+	+	+	+	+	+	+	+						40,5

Un + signifie un excès de cas observés en 1999 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 3 janvier 1999 et la dernière se termine le 1^{er} janvier 2000.

Les données ont été extraites de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Hépatite B

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1999 courant	1998 courant	1997 courant	Régions	1997 cumulatif	1998 cumulatif	1999 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 1999 vs 1998 (%)
					+					+			3	1	0	Bas-Saint-Laurent 01	8	7	9				+				+						
									+				0	0	6	Saguenay- Lac-Saint-Jean 02	17	13	5														
					+		+				+		7	7	7	Québec 03	79	59	66	+													
					+						+		3	1	4	Mauricie- Bois-Francs 04	26	32	25	+													
					+				+		+		2	1	0	Estrie 05	15	20	17	+													
					+						+		67	65	60	Montréal- Centre 06	549	482	499	+	+												
					+	+		+		+			1	3	3	Outaouais 07	24	28	34		+		+	+	+	+	+						
													0	0	2	Abitibi- Témiscamingue 08	6	5	1														
													0	0	1	Côte-Nord 09	4	5	3		+	+											
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	1	0														
													1	0	1	Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine 11	5	6	3														
					+						+		2	0	1	Chaudière- Appalaches 12	20	12	14	+													
											+		2	2	4	Laval 13	46	26	28	+													
					+		+			+			1	2	3	Lanaudière 14	30	12	19														
								+					1	4	4	Laurentides 15	23	21	17														
										+	+		8	11	10	Montréal 16	112	102	115	+	+	+	+	+	+	+	+						
													0	1	0	Nunavik 17	0	3	0														
													0	0	0	Terres-Cries-de-la-Baie- James 18	0	1	0														
											+		98	98	106	Province de Québec	964	835	855	+	+												

Un + signifie un excès de cas observés en 1999 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 3 janvier 1999 et la dernière se termine le 1^{er} janvier 2000.

Les données ont été extraites de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Hépatite B

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1999 courant	1998 courant	1997 courant	Régions	1997 cumulatif	1998 cumulatif	1999 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 1999 vs 1998 (%)
					+						+		3	1	0	Bas-Saint-Laurent 01	3	2	4								+						
													0	0	3	Saguenay- Lac-Saint-Jean 02	6	4	1														
					+						+		2	1	3	Québec 03	25	23	21	+	+	+											
											+		1	0	1	Mauricie- Bois-Francs 04	7	22	11	+													
							+	+			+		0	1	0	Estrie 05	6	7	6	+													
					+				+	+	+	+	31	28	15	Montréal- Centre 06	198	187	211	+	+	+	+	+			+						
					+	+	+				+		1	0	1	Outaouais 07	11	5	17		+	+	+	+	+	+	+	+					
													0	0	1	Abitibi- Témiscamingue 08	2	1	1														
													0	0	1	Côte-Nord 09	2	2	2						+	+							
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	1	0														
					+								1	0	0	Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine 11	2	2	1														
								+					0	0	0	Chaudière- Appalaches 12	7	2	2														
						+					+		0	2	2	Laval 13	15	12	10	+													
													0	1	0	Lanaudière 14	7	3	3														
								+					0	1	2	Laurentides 15	7	7	4														
									+	+	+		4	4	3	Montréal 16	36	36	45	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
													0	1	0	Nunavik 17	0	1	0														
													0	0	0	Terres-Cries-de-la-Baie- James 18	0	0	0														
					+				+	+	+	+	43	40	32	Province de Québec	334	317	339	+	+	+	+	+			+						

Un + signifie un excès de cas observés en 1999 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 3 janvier 1999 et la dernière se termine le 1^{er} janvier 2000.

Les données ont été extraites de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Hépatite B

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1999 courant	1998 courant	1997 courant	Régions	1997 cumulatif	1998 cumulatif	1999 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 1999 vs 1998 (%)
								+		+			0	0	0	Bas-Saint-Laurent 01	5	5	5														
									+				0	0	3	Saguenay- Lac-Saint-Jean 02	11	9	4														
								+				+	5	6	4	Québec 03	54	36	45	+													
						+						+	2	1	3	Mauricie- Bois-Francs 04	19	10	14	+													
					+				+			+	2	0	0	Estrie 05	9	13	11	+													
												+	35	37	43	Montréal- Centre 06	347	277	284	+	+												
						+			+				0	3	2	Outaouais 07	13	23	17														
													0	0	1	Abitibi- Témiscamingue 08	4	4	0														
													0	0	0	Côte-Nord 09	2	3	1														
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	0	0														
													0	0	1	Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine 11	3	4	2														
					+				+				2	0	1	Chaudière- Appalaches 12	13	10	12														
												+	2	0	2	Laval 13	31	14	18	+													
						+		+					1	1	3	Lanaudière 14	23	9	16														
													1	3	2	Laurentides 15	16	14	13														
											+	+	4	7	7	Montérégie 16	76	65	70	+	+	+	+										
													0	0	0	Nunavik 17	0	2	0														
													0	0	0	Terres-Cries-de-la-Baie- James 18	0	1	0														
											+		54	58	72	Province de Québec	626	499	512	+													

Un + signifie un excès de cas observés en 1999 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 3 janvier 1999 et la dernière se termine le 1^{er} janvier 2000.

Les données ont été extraites de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Syphilis récente

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1999 courant	1998 courant	1997 courant	Régions	1997 cumulatif	1998 cumulatif	1999 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 1999 vs 1998 (%)
													0	0	0	Bas-Saint-Laurent 01	0	0	0														
													0	0	0	Saguenay- Lac-Saint-Jean 02	0	0	0														
													0	0	0	Québec 03	1	0	1														
													0	0	0	Mauricie- Bois-Francs 04	1	1	0														
													0	0	0	Estrie 05	0	0	0														
									+				0	0	0	Montréal- Centre 06	2	1	1														
													0	0	0	Outaouais 07	0	0	0														
													0	0	0	Abitibi- Témiscamingue 08	0	0	0														
													0	0	0	Côte-Nord 09	0	0	0														
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	0	0														
													0	0	0	Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine 11	0	0	0														
													0	0	0	Chaudière- Appalaches 12	0	0	0														
													0	0	0	Laval 13	0	0	0														
													0	0	0	Lanaudière 14	0	0	0														
													0	0	0	Laurentides 15	1	0	0														
													0	0	0	Montérégie 16	0	0	0														
													0	0	0	Nunavik 17	0	0	0														
													0	0	0	Terres-Cries-de-la-Baie- James 18	0	0	0														
													0	0	0	Province de Québec	5	2	2														

Un + signifie un excès de cas observés en 1999 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 3 janvier 1999 et la dernière se termine le 1^{er} janvier 2000.

Les données ont été extraites de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Syphilis récente

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999

PERIODE 6. du 1 ^{er} janvier au 14 août 1999													1999 courant	1998 courant	1997 courant	Régions	1997 cumulatif	1998 cumulatif	1999 cumulatif														Excès 1999 vs 1998 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Un + signifie un excès de cas observés en 1999 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 3 janvier 1999 et la dernière se termine le 1^{er} janvier 2000.

Les données ont été extraites de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Syphilis récente

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999

PÉRIODE 8: du 3 janvier au 14 août 1999																																	
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1999 courant	1998 courant	1997 courant	Régions	1997 cumulatif	1998 cumulatif	1999 cumulatif	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Excès 1999 vs 1998 (%)
													0	0	0	Bas-Saint-Laurent 01	0	0	0														
													0	0	0	Saguenay- Lac-Saint-Jean 02	0	0	0														
													0	0	0	Québec 03	0	0	0														
													0	0	0	Mauricie- Bois-Francis 04	1	0	0														
													0	0	0	Estrie 05	0	0	0														
									+				0	0	0	Montréal- Centre 06	1	1	1														
													0	0	0	Outaouais 07	0	0	0														
													0	0	0	Abitibi- Témiscamingue 08	0	0	0														
													0	0	0	Côte-Nord 09	0	0	0														
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	0	0														
													0	0	0	Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine 11	0	0	0														
													0	0	0	Chaudière- Appalaches 12	0	0	0														
													0	0	0	Laval 13	0	0	0														
													0	0	0	Lanaudière 14	0	0	0														
													0	0	0	Laurentides 15	0	0	0														
													0	0	0	Montérégie 16	0	0	0														
													0	0	0	Nunavik 17	0	0	0														
													0	0	0	Terres-Cries-de-la-Baie- James 18	0	0	0														
									+				0	0	0	Province de Québec	2	1	1														

Un + signifie un excès de cas observés en 1999 par rapport aux deux années antérieures.

Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 3 janvier 1999 et la dernière se termine le 1^{er} janvier 2000.

Les données ont été extraites de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.