


INFORMATION SUR LES CHIRURGIES UROLOGIQUES



*Hydrocèle - Orchiectomie -
Spermatocèle - Varicocèle -
Vasovasostomie*

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Adresse postale

5415, boul. de l'Assomption
Montréal QC H1T 2M4
Téléphone: (514) 252-3400

Rendez-vous

Pour prendre rendez-vous à la clinique externe d'urologie, communiquez au :

Centre de rendez-vous **(514) 252-3578**

au bureau des urologues
Polyclinique Maisonneuve-Rosemont, bureau 220
(514) 255-9006

- Dr Guy Bélair
- Dr Jocelyne Tessier
- Dr Erik Schick
- Dr Martine Jolivet Tremblay
- Dr Line Leboeuf

Votre prochain rendez-vous est le

Endroit :

- Vous aurez un pansement retenu par un support scrotal. Il est possible qu'il y ait un drain dans la plaie selon le type de chirurgie que vous aurez.
- Attendez l'aide de l'infirmière pour vous assister lors de votre premier lever.

Au retour à la maison

- Vous pourrez reprendre progressivement une alimentation normale selon votre tolérance.
- La douche et le bain sont permis le lendemain de l'intervention, sauf s'il y a présence de drain ou si l'indication contraire est émise par votre médecin.
- Dans ces interventions, sauf pour la cure de varicocèle, généralement le chirurgien referme la plaie avec des points fondants, lesquels disparaîtront au cours de la semaine suivant l'intervention. Sinon, les points seront enlevés lors de votre rendez-vous à la clinique ou au bureau ou par l'infirmière du CLSC.
- Les premiers jours après l'intervention, vous pourrez recouvrir votre plaie d'un petit pansement si cela vous rend plus confortable.

- Si un support scrotal augmente votre confort, vous pouvez continuer à le porter à votre sortie de l'hôpital pendant quelques jours. Pour les interventions qui touchent le scrotum, il ne faut pas vous inquiéter s'il est enflé, bleuté et qu'un léger écoulement persiste au niveau des points pendant quelques jours.
- Si vous avez de la douleur, vous pouvez prendre les comprimés tel que prescrit ou un (1) à deux (2) comprimés d'acétaminophène 325 mg aux quatre (4) heures (Tylénol, Atasol, etc.).
- Votre médecin vous renseignera quant à la durée de votre convalescence, votre retour au travail ou à certaines activités. En général, vous pouvez compter environ deux (2) semaines.
- Les relations sexuelles sont permises trois (3) semaines après l'intervention ou lorsque les douleurs sont disparues.

Quels sont les signes de complications à surveiller à la maison?

- Si l'enflure et l'écoulement progressent quelques jours après l'intervention et que la douleur persiste ou s'accroît, il faudra communiquer avec votre médecin.
- Si la fièvre atteint ou dépasse 38°C.

Bonne convalescence!

Pour toute question concernant votre chirurgie, vous pouvez contacter en tout temps Info-santé au CLSC au (514) 376-4141 ou laisser un message à votre urologue au bureau au (514) 255-9006 ou à l'hôpital au (514) 252-3822.