

PORTRAIT DE SANTÉ DES TERRITOIRES DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

MARIA-CHAPDELAINE

Service recherche, connaissance, surveillance
Agence de santé et de services sociaux

Préparé par :

Régis Couture, agent de recherche sociosanitaire
Valérie Larouche, programmeur-analyste

Révisé le 3 mars 2005

INTRODUCTION

Ce document réunit, sous forme abrégée, diverses données sociosanitaires relatives au territoire Maria-Chapdelaine. La plupart de ces données sont tirées du *Tableau synoptique des indicateurs sociosanitaires par territoire* du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce document, diffusé à l'automne 2003, décrit la situation régionale et intrarégionale et présente les aspects méthodologiques, la bibliographie complète ainsi que la définition des 87 indicateurs ou groupes d'indicateurs inclus au tableau synoptique.

Pour le présent document, seuls les indicateurs les plus pertinents pour l'élaboration des plans d'action locaux en santé publique ont été retenus. Les indicateurs ont été mis à jour lorsque des données plus récentes étaient disponibles, ce qui peut laisser apparaître de légères différences par rapport au tableau synoptique diffusé antérieurement.

La démarche est avant tout descriptive. Les données du territoire sont comparées à celles de l'ensemble de la région et du Québec.

BRÈVE DESCRIPTION DU TERRITOIRE

En 2004, le secteur Maria-Chapdelaine comptait 26 623 résidants, une forte diminution par rapport à 1996 (28 045 habitants). La majorité (55 %) de la population habite dans le milieu urbain défini par Dolbeau-Mistassini et le reste dans une douzaine de localités de moins de 4 000 habitants dont huit inférieures à 1 000 personnes. Dans cette zone, la densité de la population est très faible et s'élève à 8 habitants au kilomètre carré.

Sur le plan de l'économie, plus de la moitié de la main-d'œuvre (60 %) de Maria-Chapdelaine appartient au secteur tertiaire (transport, commerce, hôtellerie, services et soins), proportion bien inférieure à la région (70 %) et au Québec (74 %). Le secteur secondaire (industrie et construction) suit avec 23 % de la main-d'œuvre. Enfin, le secteur primaire (agriculture et exploitation des forêts) apparaît nettement plus important que dans l'ensemble de la région et du Québec : il occupe 18 % des travailleurs comparativement à 7 % pour l'ensemble de la région et 4 % pour la province. Le commerce de détail (1 505) représente la plus importante source d'emplois tertiaires, suivi des services sociaux et de santé (930), des services d'enseignement (675) et des services d'hébergement et de restauration (650).

PROFIL SOCIO SANITAIRE

Démographie

La distribution par âge de la population s'avère tout à fait équivalente à celle du Québec : 13,8 % de personnes âgées de 65 ans et plus, 21,2 % de jeunes de moins de 18 ans et 65,1 % de personnes de 18 à 64 ans. Le territoire a connu la baisse de population la plus spectaculaire de son histoire entre 1996 et 2001 (-3,8 %), tout comme la région (-3,0 %), tandis que la population québécoise augmentait de 1,4 %, tendance démographique qui devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Cette situation de déficit démographique grave représente un défi majeur à court et long terme. La fécondité du territoire est très faible, semblable à la région et au Québec : en 1999-2001, le nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer s'élevait à 1,51 par rapport à 1,40 dans la région et 1,43 au Québec.

La population de Maria-Chapdelaine est extrêmement homogène, francophone à 99,7 % et presque sans immigrants (0,4 %), une réalité évidemment très différente de la province qui compte 83,7 % de francophones et 9,4 % d'immigrants. Les personnes vivant seules (un facteur souvent associé à la

pauvreté) constituent 11,2 % de la population de 15 ans et plus, une proportion comparable à la région (12,0 %), mais beaucoup moins élevée qu'au Québec (15,2 %).

Conditions socio-économiques

Le secteur Maria-Chapdelaine s'avère le plus souvent défavorisé en comparaison à la province. La proportion d'individus peu scolarisés (34 % n'ont pas obtenu un diplôme d'études secondaires) est bien plus élevée que la moyenne régionale et provinciale (24 %). Il s'agit d'un facteur de risque important, tant au plan social que sanitaire. De plus, ce territoire compte en proportion deux fois moins de diplômés universitaires que la province (6 % contre 14 %). Ces réalités se traduisent au plan du revenu moyen (22 419 \$), bien inférieur à la moyenne québécoise (27 067 \$), et de la dépendance économique (pour chaque 100 \$ de revenu d'emploi, 30 autres dollars proviennent de transferts gouvernementaux alors que pour l'ensemble du Québec 19 \$ sont transférés).

En 2001, le tableau de l'emploi correspond bien à ce portrait puisque deux fois plus de résidents de Maria-Chapdelaine sont au chômage (16 % contre 14 % au Saguenay–Lac-Saint-Jean et 8 % au Québec). En corollaire, le taux d'emploi (48 %) se situe au même niveau que le taux régional, mais bien en dessous du taux québécois (59 %).

Curieusement, le territoire compte moins de population sous le seuil de faible revenu (14,8 % en 2001, contre 15,6 % pour la région et 19,1 % pour la province) alors que la proportion d'adultes de 18-64 ans prestataires du programme d'assistance-emploi est similaire partout (entre 8 % et 9 %). Parmi ces prestataires, le territoire et la région comptent une plus forte proportion de cas chroniques, individus ayant cumulé 10 ans ou plus de prestations (57 % et 58 % contre 51 % pour le Québec).

Du côté environnement social, la population régionale semblait, en 1998, plus satisfaite de sa vie sociale que celle de l'ensemble du Québec (seulement 10 % se disent insatisfaits contre 13 %). Au recensement de 2001, la proportion de familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans est plus faible (16 % dans Maria-Chapdelaine contre 23 % au Québec).

Comportements délétères et facteurs de risque

La plupart des données de ce domaine proviennent de l'enquête psychosociale de 2000 (qui fournit des données par territoire local) et des enquêtes générales de Santé Québec (seulement des données régionales).

Sur le plan de l'alimentation, 11,9 % de la population de Maria-Chapdelaine (et 13,4 % de la région) considèrent leurs habitudes alimentaires comme médiocres, un chiffre moins élevé que pour l'ensemble des Québécois (15,7 %). Cette proportion est plus élevée chez les 25-44 ans, les plus pauvres, les sédentaires, les fumeurs, les personnes qui perçoivent leur état de santé comme médiocre et celles qui montrent un niveau élevé de détresse psychologique. La tendance laisse prévoir une diminution de ce pourcentage.

Pour ce qui est du tabagisme, le territoire compte la même proportion de fumeurs que la région (30 %), un chiffre supérieur au taux provincial (27 %). On y trouve à peu près la même proportion de gros fumeurs (un paquet par jour ou plus), soit 12 %. Cependant, le taux de cessation tabagique est bien plus élevé dans le territoire (58 %) et dans la région (56 %) qu'au Québec (50 %). Comme partout au Canada, le tabagisme diminue fortement et de manière régulière depuis quelques années, tendance qui devrait se poursuivre à moyen terme. Certains sous-groupes de la population montrent un niveau de risque associé au tabac nettement supérieur : ainsi, la prévalence du tabagisme est plus élevée chez les 18-24 ans, les moins scolarisés, les moins fortunés, les célibataires, les séparés ou divorcés, les personnes avec une perception

médiocre de leur santé et celles qui montrent un niveau élevé de détresse psychologique. Enfin, elle s'avère fortement associée à d'autres comportements délétères comme la sédentarité, la consommation élevée d'alcool et l'usage de drogue illégale.

La proportion des 18 ans et plus ayant pris 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine est du même ordre dans Maria-Chapdelaine (9,6 %) qu'au Saguenay–Lac-Saint-Jean (8,9 %) ou au Québec (8,4 %). Par contre, la proportion de résidents du secteur qui ont consommé de façon importante 5 fois ou plus dans la dernière année (38,5 %) se situe bien au-dessus du Québec (28,6 %) et du taux régional (33,0 %). Certains groupes se démarquent par des indicateurs de consommation d'alcool plus élevés (hommes, 18-24 ans, célibataires, personnes plus à l'aise financièrement) qui sont également associés à d'autres facteurs de risque sociosanitaires (tabagisme, sédentarité et usage de drogue illégale).

Environ 27 % de la population adulte présente un excès de poids, un niveau similaire à celui de la région (26 %) et de la province (29 %). Le surpoids est en augmentation depuis quelques années et touche plus particulièrement certains sous-groupes : les hommes, les personnes de 45 ans ou plus et celles qui ont une scolarité primaire. L'excès de poids s'avère associé à la sédentarité et à un état de santé perçu comme médiocre.

La sédentarité (activité physique de loisir insuffisante) affecte environ la moitié de la population. Le secteur Maria-Chapdelaine se situe un peu au-dessus de la moyenne (57 % contre 50 % pour la région et 49 % pour le Québec). La prévalence élevée de la sédentarité varie en fonction de caractéristiques personnelles (veuf, séparé ou divorcé, faible scolarité, pauvreté relative, milieu rural) et est associée à plusieurs autres facteurs de risque à la santé (tabagisme, excès de poids et poids insuffisant). Les personnes avec un état de santé médiocre sont également plus souvent sédentaires.

Services de santé

Pour ce qui est des services préventifs, la région occupe une position avantageuse sous quelques aspects par rapport à la province. Ainsi, la participation aux programmes dentaires des moins de 10 ans est sensiblement plus élevée dans la région (59 % contre 51 % au Québec). Les recommandations pour la mammographie aux deux ans sont plus suivies dans Maria-Chapdelaine (67 %) que dans la région (60 %) et au Québec (63 %). Cette mesure préventive s'avère en augmentation. Par contre, la vaccination des personnes âgées contre la grippe paraît insuffisante : elle atteint 76 % de la population cible dans la région (58 % au Québec) mais seulement 62 % dans le territoire. De plus, une proportion inférieure de femmes de la région (52 %) avaient subi un test de PAP comparativement au Québec (63 %) lors de la dernière année disponible.

Phénomène bien connu, la région manque de médecins spécialistes, un déficit d'environ 30 % par rapport au Québec (sans doute encore plus accentué pour Maria-Chapdelaine). Enfin, pour l'ensemble des budgets de santé, depuis toujours, la région reçoit une part inéquitable par rapport au Québec ou à certaines régions. Ainsi, en 2002-2003, les dépenses de santé *per capita* se chiffraient à 2 412 \$ pour le résident du Saguenay–Lac-Saint-Jean, contre 2 742 \$ pour le Québécois moyen (les habitants de Montréal, Québec et la Gaspésie recevaient respectivement 3 624 \$, 3 397 \$ et 3 160 \$ par personne en services de santé).

État de santé global

L'Enquête psychosociale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de 2000 montre que dans Maria-Chapdelaine la proportion de la population de 18 ans et plus percevant son état de santé comme médiocre atteint 8 %, une proportion similaire à celle de la région ou du Québec (11 %). Parmi les groupes à prévalence plus élevée se trouvent les personnes de 65 ans ou plus, celles qui n'ont qu'une scolarité primaire et celles qui perçoivent leur niveau économique comme moins bon. Cette plus forte prévalence est associée au

tabagisme, à la sédentarité, à la consommation d'alcool, de même qu'à la présence d'idées suicidaires et de détresse psychologique.

Pour la période 1995-1999, l'espérance de vie à la naissance atteint 76,7 ans dans le territoire comme au Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit plus d'une année d'espérance de vie de moins que le Québécois type (77,9 ans), une différence importante. Pour tous les groupes d'âges, les taux de mortalité du territoire et de la région s'avèrent plus élevés que ceux du Québec.

État de santé physique

En 1998, les problèmes de santé les plus souvent mentionnés par la population régionale non institutionnalisée étaient les maux de tête (11,4 %), l'arthrite ou le rhumatisme (11,2 %) et diverses allergies (10,4 %), comme pour le Québec. Suivaient l'hypertension artérielle (9,0 %) et les allergies cutanées (8,0 %). Enfin, les troubles digestifs fonctionnels, les affections respiratoires (autres que l'asthme), l'asthme et les maladies cardiaques affectaient chacun de 4 % à 6 % de la population adulte. Pour ce qui est des différences avec la province, la région comptait nettement moins de cas de maux de dos (7,6 % contre 10,2 %) et de rhinite allergique (6,4 % contre 9,4 %).

Durant la période 1994-1998, l'incidence des cancers observés est similaire dans Maria-Chapdelaine à la région et à l'ensemble du Québec. Le cancer du sein chez la femme est le plus répandu dans le territoire (121 cas par 100 000 femmes) suivi de celui du poumon (90). Par ordre de fréquence, dans Maria-Chapdelaine, suivent les cancers de la prostate (85 cas par 100 000), du côlon-rectum (59), de la vessie (23), de l'estomac (19) et du pancréas (15). À remarquer que pour toutes les formes de cancers (sauf le pancréas), la région dans son ensemble montre des taux d'incidence bien supérieurs au Québec.

Par ailleurs, la mortalité pour l'ensemble des causes se révèle plus grande dans Maria-Chapdelaine qu'au Québec (784 décès par 100 000 contre 726), notamment pour les cancers (243 contre 216) et les traumatismes non intentionnels (57 contre 27). Les décès par traumatismes non intentionnels (et principalement par accident de la route) s'avèrent particulièrement coûteux en termes d'années potentielles de vie perdues, le double du Québec : 1 491 années par 100 000 habitants contre 686 au Québec. Au total, le territoire (et la région) dépasse largement le Québec pour presque toutes les causes d'années potentielles de vie perdues : pour l'ensemble des causes (7 012 années pour Maria-Chapdelaine et 6 022 pour la province), les cancers (2 154 et 1 839), les maladies de l'appareil circulatoire (1 297 et 1 136 années) et les traumatismes déjà mentionnés.

Enfin, les indicateurs de santé dentaire décrivent un portrait négatif pour la région par rapport au Québec, avec en moyenne beaucoup plus de dents permanentes cariées, absentes ou obturées, tant en deuxième année scolaire (9,0 contre 5,8 au Québec) qu'en sixième (2,6 contre 1,9).

État de santé mentale

Une portion légèrement plus faible des habitants de Maria-Chapdelaine (8 %) dépasse le seuil symptomatologique élevé de la détresse psychologique (contre 10 % pour la région et 11 % dans la province). Cette situation varie beaucoup selon divers facteurs et la détresse psychologique touche plus fréquemment les femmes, les jeunes de 18-24 ans, les moins scolarisés, les séparés ou divorcés, les veufs ou veuves et les célibataires, ainsi que les personnes qui perçoivent leur niveau économique comme inférieur. La détresse psychologique s'avère associée aux comportements délétères (tabagisme, sédentarité, consommation d'alcool et usage de drogue illégale) de même qu'à un état de santé physique médiocre.

Les idéations suicidaires sont aussi fréquentes dans Maria-Chapdelaine que pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean ou le Québec : environ 4 % des personnes interrogées avaient songé sérieusement à s’enlever la vie au cours de l’année ayant précédé l’enquête. Les analyses désignent divers groupes plus vulnérables aux pensées suicidaires : les hommes, les séparés ou divorcés et les personnes qui perçoivent leur statut économique comme inférieur. Plusieurs comportements délétères y sont également associés (tabagisme, sédentarité, consommation d’alcool et usage de drogue illégale), de même qu’une perception de son état de santé comme médiocre et un indice élevé de détresse psychologique.

	Québec	Saguenay– Lac-St-Jean				Maria-Chapdelaine		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an
	A	A	B	C	D	A	B	D
CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES								
Structure par âge								
<i>1. Population 2004</i>								
Total, (n)					277 049			26 623
0 - 5 ans (% , n)	5,9	5,3	↘		14 672	5,8		1 531
6-17 ans (% , n)	14,6	14,8	↘		40 885	15,4		4 091
18 - 64 ans (% , n)	65,9	66,3	↘		183 703	65,1		17 333
65 ans et plus (% , n)	13,6	13,6	↗		37 789	13,8		3 668
0 - 5 ans	5,9	5,3	↘		14 672	5,8		1 531
6 - 11 ans	7,1	6,8	↘		18 701	6,9		1 827
12 - 17 ans	7,6	8,0	↘		22 184	8,5		2 264
18 - 24 ans	9,2	10,1	↘		27 986	10,5		2 783
25 - 44 ans	29,2	26,4	↘		73 247	25,8		6 858
45 - 64 ans	27,5	29,8	↗		82 470	28,9		7 692
65 - 74 ans	7,5	7,9	↗		21 957	7,8		2 070
75 - 84 ans	4,7	4,6	↗		12 751	4,7		1 259
85 ans et plus	1,4	1,1	↗		3 081	1,3		339
Mouvement de la population								
<i>2. Taux d'accroissement de la population (%) 1996 à 2001</i>								
	1,4	-3,0	↘		-1 677	-3,8		-210
<i>3. Indice synthétique de fécondité (enfants par femme)</i>								
<i>Qc : 1997-1999; SLSJ : 1999-2001</i>	1,43	1,40	s.o.		—	1,51	s.o.	—
CONDITIONS SOCIOCULTURELLES								
Modalités de vie								
<i>4. Population de 15 ans et plus vivant seule (%) 2001</i>								
Sexes réunis	15,2	12,0			26 905	11,2		2 400
Hommes	13,9	11,0			12 195	11,4		1 230
Femmes	16,4	13,0			14 720	11,1		1 170
<i>6. Population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial de fait (%) 2001</i>								
Actuellement mariés	40,3	43,7			100 305	45,1		9 905
Partenaires en union libre	17,0	16,7			38 370	16,2		3 550
Autres : célibataires, séparés, divorcés et veufs	42,7	39,6			90 860	38,8		8 515
Langues								
<i>7. Population selon la langue parlée à la maison (%) 1996</i>								
Français	83,7	99,4			280 940	99,7		27 495
Anglais	10,3	0,4			1 145	0,2		65
Autres	6,0	0,1			415	0,1		30
Immigration								
<i>8. Immigrants (%) 1996</i>								
	9,4	0,6			1 610	0,4		105

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ⇔; diminution ↘.
Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observé ou estimation de la population touchée calculée sur la base du recensement de 2001 (Statistique Canada).

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

	Québec	Saguenay– Lac-St-Jean				Maria-Chapdelaine		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an
	A	A	B	C	D	A	B	D
CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES								
Scolarité								
9. a. Population de 20 à 64 ans ayant un niveau de scolarité inférieur au certificat d'études secondaires (%) 2001								
Total	23,5	23,9	↗		41 040	33,9		5 510
20 - 34 ans	16,0	15,8	↗		7 785	18,5		860
35 - 44 ans	20,7	21,8	↗		10 555	32,7		1 525
45 - 64 ans	31,1	30,6	↗		22 700	45,0		3 125
b. Population de 15 ans et plus ayant un diplôme universitaire (%) 2001	14,0	9,2			20 845	6,3		1 355
Revenu								
10. Revenu personnel par habitant (moyenne en dollars courants) 2002	27 067	23 361	↗		—	22 419		—
11. Rapport de dépendance économique (\$ par 100\$ de revenu d'emploi) 2002								
Sexes réunis	19,4	24,2			—	30,3		—
Hommes	13,6	17,5			—	22,7		—
Femmes	29,2	39,6			—	50,6		—
12. Population vivant sous le seuil de faible revenu (%) 2001	19,1	15,6			42 170	14,8		3 875
13. Adultes de 18 à 64 ans prestataires du programme d'assistance-emploi (%) 2004								
18 - 64 ans	8,0	8,8			16 095	7,7		1 338
18 - 24 ans	6,0	7,2			2 012	6,4		177
25 - 34 ans	7,5	8,8			2 725	6,4		182
35 - 44 ans	8,0	8,5			3 599	7,2		288
45 - 54 ans	8,2	8,7			4 213	7,5		342
55 - 64 ans	10,0	10,5			3 546	11,1		349
14. Répartition des adultes prestataires du programme d'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (%) 2004								
Moins de 2 ans	14,6	11,6			1 861	11,9		160
2 - 3 ans	10,0	8,3			1 331	8,9		119
4 - 9 ans	24,1	21,7			3 501	22,3		299
10 ans et plus	51,3	58,4			9 408	56,8		761
Emploi								
16. Taux d'emploi (%) 2001	58,9	50,8			116 652	48,0		10 548
17. Taux de chômage (%) 2001	8,2	13,7			18 485	16,3		2 056
18. Population active expérimentée selon le secteur d'activité (%) 2001								
Secteur primaire	3,9	7,0			8 945	17,7		2 110
Secteur manufacturier et de la construction	22,2	23,1			29 470	22,6		2 695
Secteur tertiaire	73,9	69,9			89 140	59,7		7 110
ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ADAPTATION SOCIALE								
Soutien social								
20. Population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale (%) 1998	13,1	10,4	(-)	↗	23 871	n.d.		2 350

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ↔; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observé ou estimation de la population touchée calculée sur la base du recensement de 2001 (Statistique Canada).

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

	Québec	Saguenay– Lac-St-Jean				Maria-Chapdelaine		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an
	A	A	B	C	D	A	B	D
ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ADAPTATION SOCIALE (SUITE)								
Réalités familiales								
<i>21. Familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille (%) 2001</i>								
Total	100,0	100,0	s.o.		35 570	100,0	s.o.	3 555
Couples mariées	50,5	54,1	s.o.		19 265	56,7	s.o.	2 015
Couples vivant en union libre	26,8	27,6	s.o.		9 825	27,3	s.o.	970
Familles monoparentales	22,7	18,2	s.o.		6 480	16,0	s.o.	570
<i>22. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (%) 1996</i>	17,6	13,2	s.o.		9 700	13,4	s.o.	1 025
HABITUDES DE VIE, FACTEURS DE RISQUE ET COMPORTEMENTS PRÉVENTIFS								
Alimentation								
<i>32. Population de 18 à 74 ans percevant avoir des habitudes alimentaires médiocres (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>	15,7	13,4	(–) ↘		27 181	11,9 {n.s.}		2 366
Tabagisme								
<i>33. Fumeurs actuels de 18 ans et plus (%) 2000</i>	27,3	29,9	(+) ↘		64 818	29,8 {n.s.}		6 316
<i>34. Fumeurs quotidiens de 18 ans et plus dont l'âge initial du tabagisme quotidien est inférieur à 15 ans (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>	41,2	51,4	(+) ↗		29 902	40,4 {–}		2 350
<i>35. Fumeurs de 25 cigarettes ou plus par jour chez les 18 ans et plus (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>	10,9	11,6	(n.s.) ↘		25 221	11,7 {n.s.}		2 481
<i>36. Population de 18 ans et plus ayant cessé de fumer (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>	50,0	56,4	(+) ↗		122 441	58,0 {n.s.}		12 293
Consommation d'alcool								
<i>37. Population de 18 ans et plus ayant pris 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>	8,4	8,9	(n.s.) ⇔		19 219	9,6 {n.s.}		2 040
<i>38. Population de 18 ans et plus présentant une consommation élevée d'alcool 5 fois ou plus au cours d'une année (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>	28,6	33,0	(+) ⇔		57 109	38,5 {+}		6 566
Poids corporel								
<i>39. Population de 18 ans et plus présentant un excès de poids (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>	28,8	26,4	(–) ↗		57 304	27,0 {n.s.}		5 726
Activité physique								
<i>40. Population de 18 ans et plus ayant des activités physiques de loisir insuffisantes (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>	49,2	49,5	(n.s.) ⇔		107 383	57,2 {+}		12 119
Naissances vivantes								
<i>43. Naissances ayant un retard de croissance intra-utérine (%) Qc : 1999-2001; SLSJ : 2001-2003</i>	7,0	6,5	s.o.		484	9,2 s.o.		74
<i>44. Naissances de faible poids (%) Qc : 1999-2001; SLSJ : 2001-2003</i>								
Total, moins de 2 500g	5,6	5,3	s.o.		389	6,6 s.o.		53
Moins de 1 500g	0,9	0,8	s.o.		56	1,4 s.o.		11
1 500 - 2 499g	4,7	4,5	s.o.		333	5,2 s.o.		42
<i>45. Naissances prématurées (%) Qc : 1999-2001; SLSJ : 2001-2003</i>	7,6	7,2	s.o.		539	6,2 s.o.		60

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ⇔; diminution ↘. Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observé ou estimation de la population touchée calculée sur la base du recensement de 2001 (Statistique Canada).

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

	Québec	Saguenay– Lac-St-Jean				Maria-Chapdelaine		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an
	A	A	B	C	D	A	B	D
HABITUDES DE VIE, FACTEURS DE RISQUE ET COMPOTEMENTS PRÉVENTIFS (SUITE)								
46. Répartition des naissances selon la scolarité de la mère (%) Qc : 1999-2001; SLSJ : 2001-2003								
Moins de 11 ans	13,3	10,6	s.o.		767	14,6	s.o.	111
11 - 15 ans	56,3	60,3	s.o.		4 365	65,3	s.o.	495
16 ans et plus	30,4	29,2	s.o.		2 112	20,1	s.o.	152
SERVICES DE SANTÉ								
47.0 Dépenses per capita en service de santé (\$) 2002-2003	2742	2412	(-)		—	n.d.		—
Services préventifs								
47. Taux de participation au programme de services dentaires pour les enfants de 0 à 9 ans (%) 2001	51,2	59,2			17 974	n.d.		—
48. Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie (%) 1999-2000	63,0	60,0	(n.s.)	↗	14 519	67,0		1 906
49. Femmes de 15 ans et plus ayant subi un test de PAP (%) 1998	63,4	52,5	(-)	↘	61 092	n.d.		5 883
50. Personnes de 65 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe (%) Qc : 2001-2002; SLSJ : 2002-2003	58,0	75,9	s.o.		27 031	61,7	s.o.	2 006
Services de première ligne								
51. Population ayant consommé trois médicaments différents et plus (%) 1998								
Sexes réunis	17,0	16,2	(n.s.)	↗	45 078	n.d.		4 358
Hommes	12,2	10,6	s.o.		14 643	n.d.		1 482
Femmes	21,7	21,9	s.o.		30 691	n.d.		2 998
54. Nombre de médecins ou dentistes et spécialistes en chirurgie buccale par 100 000 habitants								
a. Inscrits à la RAMQ au 31 décembre 2001								
Ensemble des médecins et dentistes	245	198	s.o.		568	n.d.		—
Spécialistes	100	69	s.o.		198	n.d.		—
Omnipraticiens	100	94	s.o.		269	n.d.		—
Dentistes et spécialistes en chirurgie buccale	45	35	s.o.		101	n.d.		—
b. Médecins actifs résidents au 31 mars 2003								
Ensemble des médecins	n.d.	155	s.o.		441	117	s.o.	32
Spécialistes	n.d.	63	s.o.		180	26	s.o.	7
Omnipraticiens	n.d.	92	s.o.		261	91	s.o.	25
ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL								
66. Population de 18 ans et plus percevant son état de santé comme médiocre (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000	11,3	10,8	(n.s.)	↘	23 429	8,1 {n.s.}		1 718
67. Espérance de vie à la naissance (en années) 1995-1999								
Sexes réunis	77,9	76,7	(-)		—	76,7	(-)	—
Hommes	74,6	73,4	(-)		—	73,0	(-)	—
Femmes	81,1	79,9	(-)		—	80,9	(n.s.)	—

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ↔; diminution ↘.
Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observé ou estimation de la population touchée calculée sur la base du recensement de 2001 (Statistique Canada).

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

	Québec	Saguenay– Lac-St-Jean				Maria-Chapdelaine		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an
	A	A	B	C	D	A	B	D
ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL (SUITE)								
68. <i>Espérance de vie en bonne santé - sans limitations d'activités</i> (en années) Qc : 1998; SLSJ : 2000								
Sexes réunis	66,8	66,9	s.o.	—	—	66,5	s.o.	—
Hommes	65,4	65,4	s.o.	—	—	64,8	s.o.	—
Femmes	68,1	68,4	s.o.	—	—	68,4	s.o.	—
ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE								
Limitations d'activités								
72. <i>Population ayant une limitation d'activités à long terme (%)</i> 1998	9,3	6,9	(-) ⇔	19 200	—	n.d.	—	1 856
Prévalence et incidence des problèmes								
74. a. <i>Prévalence des principaux problèmes de santé (%) 1998</i>								
Maux de tête	11,8	11,4	(n.s.) ↗	31 722	—	n.d.	—	3 067
Arthrite ou rhumatisme	11,8	11,2	(n.s.) ↗	31 165	—	n.d.	—	3 013
Maux de dos ou de la colonne	10,2	7,6	(-) ↗	21 148	—	n.d.	—	2 044
Rhinite allergique	9,4	6,4	(-) ↗	17 809	—	n.d.	—	1 722
Allergies ou affections cutanées	9,1	8,0	(n.s.) ⇔	22 261	—	n.d.	—	2 152
Autres allergies	10,3	10,4	(n.s.)	28 939	—	n.d.	—	2 798
Hypertension artérielle	8,5	9,0	(n.s.) ↗	25 043	—	n.d.	—	2 421
Maladies cardiaques	4,6	4,2	(n.s.) ⇔	11 687	—	n.d.	—	1 130
Troubles digestifs fonctionnels	5,0	5,5	(n.s.) ⇔	15 304	—	n.d.	—	1 480
Asthme	5,0	5,3	(n.s.) ↗	14 748	—	n.d.	—	1 426
Autres affections respiratoires	5,4	5,5	(n.s.) ↗	15 304	—	n.d.	—	1 480
b. <i>Prévalence du diabète (%), ajustée selon l'âge 2001-2002</i>								
	5,8	5,2	(-) ↗	10 998	—	4,7	(-) ↗	907
Morbidité selon la cause								
77. <i>Taux ajusté d'incidence des cancers (p. 100 000) 1994-1998</i>								
Ensemble des sièges (CIM-9: 140-208)	453	493	(+) ⇔	1 306	—	471	(n.s.)	120
Sein chez la femme (174)	110	126	(+) ↗	184	—	121	(n.s.)	16
Prostate (185)	99	111	(+) ⇔	121	—	85	(n.s.)	9
Poumon (162)	76	89	(+) ⇔	234	—	90	(n.s.)	23
Côlon et rectum (153-154)	56	63	(+) ⇔	167	—	59	(n.s.)	15
Vessie (188)	21	26	(+) ⇔	66	—	23	(n.s.)	6
Estomac (151)	11	16	(+) ↗	41	—	19	(+)	5
Pancréas (157)	11	13	(n.s.) ⇔	32	—	15	(n.s.)	4
Mortalité selon la cause								
78. <i>Taux ajusté de mortalité selon la cause (p. 100 000) 1994-1998</i>								
Toutes causes (CIM-9: 000-999)	726	788	(+) ↗	1 960	—	784	(+)	191
Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	257	263	(n.s.) ↗	634	—	284	(n.s.)	67
Cancers (140-208)	216	243	(+) ↗	627	—	243	(+)	60
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	65	74	(+) ⇔	173	—	53	(n.s.)	12
Traumatismes non intentionnels (E800-E949)	27	39	(+) ↗	105	—	57	(+)	15
Maladies de l'appareil digestif (520-579)	26	28	(n.s.) ⇔	69	—	22	(n.s.)	5

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ⇔; diminution ↘.
Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observé ou estimation de la population touchée calculée sur la base du recensement de 2001 (Statistique Canada).

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

	Québec	Saguenay– Lac-St-Jean				Maria-Chapdelaine		
	Indic	Indic	Test	Prév	N/an	Indic	Test	N/an
	A	A	B	C	D	A	B	D
ÉTAT DE SANTÉ PHYSIQUE (SUITE)								
<i>79. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (p. 100 000) 1994-1998</i>								
Cardiopathies ischémiques (410-414)	149	144 (n.s.)	↘		354	148 (n.s.)		35
Maladies vasculaires cérébrales (430-438)	45	53 (+)	↘		124	57 (n.s.)		13
Maladies des artères (440-448)	14	17 (+)	↘		42	16 (n.s.)		4
Insuffisance cardiaque (428)	15	15 (n.s.)	↔		34	22 (n.s.)		5
<i>80. Taux ajusté de mortalité par cancers (p. 100 000) 1994-1998</i>								
Poumon (162)	65	77 (+)	↔		200	76 (n.s.)		19
Sein, chez la femme (174)	32	35 (n.s.)	↔		51	32 (n.s.)		4
Côlon et rectum (153-154)	26	29 (n.s.)	↔		74	26 (n.s.)		6
Prostate (185)	29	27 (n.s.)	↔		24	27 (n.s.)		3
Pancréas (157)	11	12 (n.s.)	↔		31	13 (n.s.)		3
Estomac (151)	9	12 (+)	↘		31	14 (n.s.)		3
<i>81. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (p. 100 000) 1994-1998</i>								
Maladies pulmonaires obstructives chroniques (490-496)	37	47 (+)	↔		112	42 (n.s.)		10
Pneumonies et gripes (480-487)	19	20 (n.s.)			45	8 (-)		2
<i>82. Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels (p. 100 000) 1994-1998</i>								
Accidents de véhicules-moteurs (E810-E819)	10	17 (+)	↔		49	25 (+)		7
Chutes accidentelles (E880-E888)	8	10 (+)	↔		22	8 (n.s.)		2
<i>83. Taux ajusté de mortalité par suicide (p. 100 000) 1994-1998</i>								
	19	21 (+)	↗		63	24 (n.s.)		7
<i>84. Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (p. 100 000) 1994-1998</i>								
Toutes causes (CIM-9: 000-999)	6 022	6 886 (+)			3 794	7 012 (+)		376
Cancers (140-208)	1 839	2 053 (+)			1 131	2 154 (+)		114
Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	1 136	1 202 (+)			656	1 297 (+)		66
Traumatismes non intentionnels (E800-E949)	686	1 019 (+)			579	1 491 (+)		87
Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	210	217 (+)			119	122 (-)		6
Maladies de l'appareil digestif (520-579)	168	177 (+)			96	62 (-)		3
Santé dentaire								
<i>85. Indice de surfaces de dents permanentes cariées, absentes ou obturées chez les enfants de 2^e et 6^e année (%) 1998-1999</i>								
2 ^e année scolaire	5,8	9,0 (+)			—	n.d.		—
6 ^e année scolaire	1,9	2,6 (+)			—	n.d.		—
ÉTAT DE SANTÉ MENTALE								
<i>86. Population de 18 ans et plus dont la détresse psychologique dépasse le seuil symptomatologique élevé (%) Qc : 1987; SLSJ : 2000</i>								
Sexes réunis	10,7	10,4 (n.s.)	↔		22 637	7,8 {n.s.}		1 643
Hommes	n.d.	6,9 s.o.			7 364	4,7 s.o.		498
Femmes	n.d.	13,9 s.o.			15 325	10,9 s.o.		1 149
<i>87. Population de 18 ans et plus présentant des idées suicidaires sérieuses et récentes (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000</i>								
	3,7	4,4 (n.s.)	↔		9 482	3,6 {n.s.}		760

Colonne A (Indic) : résultat de l'indicateur pour le territoire identifié.

Colonne B (Test) : différence significative au seuil $P \leq 0,05$ par rapport à la valeur québécoise (résultats entre parenthèses) ou par rapport à la valeur régionale (résultats entre accolades).

Colonne C (Prév) : prévision à court terme de l'évolution de la valeur de l'indicateur régional, soit de la période indiquée jusqu'en 2005-2006 : augmentation ↗; stabilité ↔; diminution ↘.
Cette information diffère de la tendance.

Colonne D (N/an) : nombre annuel moyen de cas observé ou estimation de la population touchée calculée sur la base du recensement de 2001 (Statistique Canada).

Signes : n.d. (non disponible); — (ne s'applique pas); s.o. (sans objet); n.s. (non significatif).

NOTES MÉTHODOLOGIQUES

1. Population selon l'âge (%) 2004

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population d'un groupe d'âge donné par rapport à la population totale. ¹

Sources : Institut de la Statistique du Québec (ISQ), *Perspectives démographiques selon le territoire de CLSC, édition 2003*, janvier 2005.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 160, indicateur no 2.

2. Taux d'accroissement de la population (%) 1996 à 2001

Définition : Rapport (en pourcentage), pour une période donnée, de la différence d'effectifs de population au début et à la fin de la période, à la population au milieu de la même période. ¹

Sources : Statistique Canada, Recensement 1996, données géocodées, fichier R02TSB01, Beyond 20/20; Statistique Canada, Recensement 2001, produit no 95F0486XCB01001 au catalogue, Ottawa, diffusion juillet 2002.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 158, indicateur no 1.

3. Indice synthétique de fécondité (enfants par femme) Qc : 1997-1999; SLSJ : 1999-2001

Définition : Nombre moyen d'enfants qu'aurait une cohorte de femmes dans l'hypothèse où ces femmes seraient soumises tout au long de leur période de procréation aux taux de fécondité par âge observés durant une période donnée. L'indice synthétique de fécondité peut être interprété comme le nombre moyen d'enfants par femme. ¹

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des naissances vivantes; DSP-02, Système d'information sur les naissances vivantes du SLSJ.
DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 166, indicateur no 4.

4. Population de 15 ans et plus vivant seule (%) 2001

Définition : Proportion (en pourcentage) des personnes de 15 ans et plus vivant seules dans leur logement par rapport au total des personnes de 15 ans et plus dans les ménages privés. ¹

Source : Statistique Canada, Recensement 2001, produit 95FO315XC801001 au catalogue, Ottawa, diffusion janvier 2004.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 176, indicateur no 9.

6. Population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial de fait (%) 2001

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial de fait, par rapport à la population totale de 15 ans et plus. ^{1,2}

Source : Statistique Canada, Recensement 2001.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 170, indicateur no 6.

2. Le nombre d'individus composant la catégorie «Autres» a été déduit en croisant les données sur l'état matrimonial (légal) et celles sur les unions libres, soit en soustrayant le nombre de personnes mariées à celui des personnes ne vivant pas en union libre.

7. Population selon la langue parlée à la maison (%) 1996

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population selon la langue parlée à la maison, par rapport à la population totale ayant déclaré une seule langue parlée à la maison excluant les pensionnaires vivant en institution. ¹

Source : Statistique Canada, Profil de base du recensement 1996, données géocodées, Beyond 20/20.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 180, indicateur no 11.

8. Immigrants (%) 1996

Définition : Proportion (en pourcentage) d'immigrants reçus, par rapport à la population totale excluant les pensionnaires vivant en institution. ¹

Source : Statistique Canada, Profil de base du recensement 1996, données géocodées, Beyond 20/20.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 182, indicateur no 12.

9. a. Population de 20 à 64 ans ayant un niveau de scolarité inférieur au certificat d'études secondaires (%) 2001

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population du groupe d'âges spécifié ayant atteint un niveau de scolarité primaire (complété ou non) ou secondaire non complété par rapport à la population totale du groupe d'âges excluant les pensionnaires vivant en institution.^{1,2}

Source : Statistique Canada, Recensement 2001.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 184, indicateur no 13 avec la modification ci-après.
2. Compte tenu des données disponibles, nous référons à la population de 20 à 64 ans pour cet indicateur.

b. Population de 15 ans et plus ayant un diplôme universitaire (%) 2001

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 15 ans et plus ayant obtenu un diplôme universitaire par rapport à la population totale de 15 ans et plus excluant les pensionnaires vivant en institution.¹

Source : Statistique Canada, Recensement 2001, produit no 95F0380XCB2001001 au catalogue, Ottawa, diffusion janvier 2004.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 184, indicateur no 13.

10. Revenu personnel par habitant (moyenne en dollars courants) 2002

Définition : Rapport, pour une année donnée, du revenu personnel total de l'ensemble de la population d'un territoire donné à la population totale de ce territoire au milieu de la même année.^{1,2}

Source : ISQ, 2004. http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/profil02/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/rev02.htm

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 192, indicateur no 17.
2. Le chiffre qui apparaît pour le territoire correspond au revenu personnel moyen dans la sous-région Saguenay. L'ISQ ne fournit les données que par MRC ou territoire équivalent, soit la MRC-du-Fjord et Ville Saguenay. Une somme pondérée selon le poids démographique de ces deux entités dans la sous-région Saguenay a été calculée pour obtenir le revenu personnel moyen dans la sous-région Saguenay.

11. Rapport de dépendance économique (\$ par 100 \$ de revenu d'emploi) 2002

Définition : Représente les paiements de transferts gouvernementaux par tranche de 100 \$ de revenu d'emploi total d'un territoire donné.¹

Le rapport de dépendance économique permet d'évaluer la redistribution des revenus par l'État et d'évaluer la dépendance relative des gens à l'égard des transferts gouvernementaux.

Source : Statistique Canada, Division des données régionales et administratives, *Profils de dépendance économique*, 2004.

Note : 1. Le chiffre qui apparaît pour le territoire correspond au rapport de dépendance économique de la sous-région Saguenay. L'ISQ ne fournit les données que par MRC ou territoire équivalent, soit la MRC-du-Fjord et Ville Saguenay. Une somme pondérée selon le poids démographique de ces deux entités dans la sous-région Saguenay a été calculée pour obtenir le rapport de dépendance économique de la sous-région Saguenay.

12. Population vivant sous le seuil de faible revenu (%) 2001

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population sous le seuil de faible revenu (SFR) dans les ménages privés par rapport à la population totale dans les ménages privés.^{1,2}

Selon Statistique Canada, le SFR ne doit pas être considéré comme un seuil de pauvreté. Il permet plutôt d'identifier la proportion de la population qui s'en tire moins bien au plan économique.

Source : Statistique Canada, Fichier 95F0492XCB01001, Beyond 20/20.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 194, indicateur no 18.
2. Statistique Canada fournit les données sur la base des MRC. Ainsi, pour les territoires La Baie, Chicoutimi et Jonquière, le chiffre qui apparaît correspond à la proportion observée dans la sous-région Saguenay, la donnée n'étant disponible que pour cette entité géographique.

13. Adultes de 18 à 64 ans prestataires du programme d'assistance-emploi (%) 2004

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population du groupe d'âges spécifié ayant bénéficié d'une prestation d'assistance-emploi, pour un mois d'une année donnée, par rapport à la population totale du groupe d'âges. ^{1,2,3}

Sources : NUMÉRATEUR : MESSF, Direction de la recherche, de l'évaluation et de la statistique, mars 2004 (mise à jour juin 2004).
DÉNOMINATEUR : Institut de la Statistique du Québec, *Perspectives démographiques, Québec et ses régions, 2001-2051, édition 2003*.

Notes :
1. INSPQ (2001), p. 196, indicateur no 19.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre total de prestataires adultes pour la région est inférieur de 367 à la somme des prestataires adultes des territoires sociosanitaires. Cette différence est due au fait que les données par territoires sociosanitaires produites par le MESSF incluent une partie des prestataires adultes vivant en institution (hébergés), ce qui n'est pas le cas pour les données par région produites par le MESSF.

14. Répartition des adultes prestataires du programme d'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (%) 2004

Définition : Proportion (en pourcentage) des adultes bénéficiant d'une prestation d'assistance-emploi pour un mois donné selon le nombre d'années cumulatives depuis 1975 où ils recevaient des prestations, par rapport à la population adulte bénéficiant d'une prestation d'assistance-emploi pendant ce mois. ^{1,2,3}

Les personnes de moins de 18 ans qui sont soutien de famille (6 cas dans la région en 2004) sont incluses dans les données.

Sources : NUMÉRATEUR : MESSF, Direction de la recherche, de l'évaluation et de la statistique, mars 2004 (mise à jour juin 2004).
DÉNOMINATEUR : Institut de la Statistique du Québec, *Perspectives démographiques, Québec et ses régions, 2001-2051, édition 2003*.

Notes :
1. INSPQ (2001), p. 198, indicateur no 20.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Pour chaque sous-catégorie, le nombre de prestataires dans les CLSC est sous-estimé en raison des données manquantes dans le fichier (réf. indicateur 13, note 3).

16. Taux d'emploi (%) 2001

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 15 ans et plus occupée, par rapport à la population totale de 15 ans et plus excluant les pensionnaires vivant en institution. ^{1,2,3}

Source : Statistique Canada, Recensement 2001.

Notes :
1. INSPQ (2001), p. 226, indicateur no 34. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires de CLSC en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

17. Taux de chômage (%) 2001

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 15 ans et plus en chômage, par rapport à la population active totale de 15 ans et plus excluant les pensionnaires vivant en institution. ^{1,2}

Source : Statistique Canada, Recensement 2001.

Notes :
1. INSPQ (2001), p. 190, indicateur no 16.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

18. Population active expérimentée selon le secteur d'activité (%) 2001

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 15 ans et plus occupant un emploi, selon le secteur d'activité, par rapport à la population totale active expérimentée de 15 ans et plus. ^{1,2}

Source : Statistique Canada, Recensement 2001.

Notes :
1. INSPQ (2001), p. 186, indicateur no 14.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

20. Population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale (%) 1998

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population se déclarant insatisfaite de sa vie sociale, par rapport à la population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés.^{1,2}

Source : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 298, indicateur no 69.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

21. Familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille (%) 2001

Définition : Proportion (en pourcentage) de familles de recensement avec au moins un enfant jamais marié de 17 ans ou moins selon la structure de la famille, par rapport au total des familles de recensement avec au moins un enfant jamais marié de 17 ans ou moins.¹

Source : Statistique Canada, Recensement 2001, produit 95FO316XCBO1001 au catalogue, Ottawa, diffusion janvier 2004.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 172, indicateur no 7.

22. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (%) 1996

Définition : Proportion (en pourcentage) d'enfants jamais mariés de 17 ans ou moins vivant dans des familles de recensement composées d'un parent seul, par rapport à la population totale d'enfants jamais mariés de 17 ans ou moins vivant dans les familles de recensement.¹

Source : Statistique Canada, Recensement 1996, données géocodées, tableau R02T4B96.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 174, indicateur no 8.

32. Population de 18 à 74 ans percevant avoir des habitudes alimentaires médiocres (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 18 à 74 ans percevant avoir des habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises, par rapport à la population totale des 18 à 74 ans dans les ménages privés.^{1,2,3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 202, indicateur no 22. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires de CLSC en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

33. Fumeurs actuels de 18 ans et plus (%) 2000

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 18 ans et plus fumant la cigarette, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.

Les fumeurs actuels comprennent les «fumeurs réguliers» («quotidiens») qui fument au moins une cigarette par jour, tous les jours et les fumeurs occasionnels.^{1,2,3}

Sources : DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000; Statistique Canada, Enquête de surveillance sur l'usage du tabac au Canada (ESUTC).

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 206, indicateur no 24. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires de CLSC en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

34. Fumeurs quotidiens de 18 ans et plus dont l'âge initial du tabagisme quotidien est inférieur à 15 ans (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (en pourcentage) des fumeurs qui ont commencé à fumer tous les jours avant l'âge de 15 ans par rapport à l'ensemble des personnes de 18 ans et plus qui fument tous les jours.^{1,2}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
2. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires de CLSC en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

35. Fumeurs de 25 cigarettes ou plus par jour chez les 18 ans et plus (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 18 ans et plus fumant 25 cigarettes ou plus par jour, par rapport au nombre total de personnes de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1, 2, 3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes :
1. Cet indicateur est similaire à l'indicateur 24 de l'INSPQ (2001 : p. 206). Ce dernier concerne cependant la population de 15 ans et plus; exclut du groupe à risque les personnes qui fument exactement un paquet par jour (25 cigarettes); et se limite aux personnes qui fument chaque jour.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires de CLSC en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

36. Population de 18 ans et plus ayant cessé de fumer (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (en pourcentage) des anciens fumeurs par rapport à l'ensemble des personnes de 18 ans et plus qui fument ou ont déjà fumé.^{1, 2}

Cet indicateur est aussi appelé le taux de cessation tabagique.

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes :
1. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
2. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires de CLSC en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

37. Population de 18 ans et plus ayant pris 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 18 ans et plus ayant pris 14 consommations d'alcool et plus, au cours des sept jours ayant précédé l'enquête, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1, 2, 3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes :
1. INSPQ (2001), p. 208, indicateur no 25. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires de CLSC en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

38. Population de 18 ans et plus présentant une consommation élevée d'alcool 5 fois ou plus au cours d'une année (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 18 ans et plus ayant pris cinq consommations ou plus d'alcool en une même occasion au moins cinq fois au cours des douze derniers mois ayant précédé l'enquête, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1, 2, 3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes :
1. INSPQ (2001), p. 210, indicateur no 26. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires de CLSC en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

39. Population de 18 ans et plus présentant un excès de poids (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 18 ans et plus présentant un excès de poids, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés à l'exclusion des femmes enceintes.^{1, 2, 3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes :
1. INSPQ (2001), p. 226, indicateur no 34. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires de CLSC en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

40. Population de 18 ans et plus ayant des activités physiques de loisir insuffisantes (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 18 ans et plus qui n'a fait aucune activité physique ou qui en a fait de 1 à 3 fois par mois (à raison de 20 à 30 minutes par séance), au cours des trois mois précédant l'enquête, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1, 2, 3}

Ces personnes peuvent aussi être qualifiées de sédentaires ou inactives.

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes :

1. INSPQ (2001), p. 204, indicateur no 23. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires de CLSC en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

43. Naissances ayant un retard de croissance intra-utérine (%) Qc : 1999-2001; SLSJ : 2001-2003

Définition : Proportion (en pourcentage), pour une période donnée, de naissances vivantes de poids insuffisant pour l'âge gestationnel, par rapport au total des naissances vivantes dont le poids et l'âge gestationnel sont connus, durant la même période

Un nouveau-né ayant un retard de croissance intra-utérine est un nouveau-né dont le poids est insuffisant compte tenu de son âge gestationnel. Cette notion s'appuie sur des courbes de croissance in-utéro.

Le calcul de l'indicateur ne s'applique qu'aux naissances vivantes simples et gémellaires dont l'âge gestationnel se situe entre 22 et 42 semaines. Les combinaisons improbables d'âge gestationnel et de poids à la naissance ainsi que les naissances dont le poids est inférieur à 500g sont également exclues.¹

Sources : MSSS, Fichiers des naissances vivantes; DSP-02, Système d'information sur les naissances vivantes du SLSJ.

Note :

1. INSPQ (2001), p. 222, indicateur no 32.

44. Naissances de faible poids (%) Qc : 1999-2001; SLSJ : 2001-2003

Définition : Proportion (en pourcentage), pour une période donnée, de naissances vivantes de poids inférieur à 2 500 grammes, par rapport au total des naissances vivantes dont le poids à la naissance est connu, durant la même période

Les nouveau-nés dont le poids est inférieur à 2 500 grammes sont considérés de faible poids et ceux dont le poids est inférieur à 1 500 grammes sont considérés de très faible poids (OMS, 1990).¹

Sources : MSSS, Fichiers des naissances vivantes; DSP-02, Système d'information sur les naissances vivantes du SLSJ.

Note :

1. INSPQ (2001), p. 218, indicateur no 30.

45. Naissances prématurées (%) Qc : 1999-2001; SLSJ : 2001-2003

Définition : Proportion (en pourcentage), pour une période donnée, de naissances vivantes d'âge gestationnel inférieur à 37 semaines révolues, par rapport au total des naissances vivantes dont l'âge gestationnel est connu, durant la même période.¹

Sources : MSSS, Fichiers des naissances vivantes; DSP-02, Système d'information sur les naissances vivantes du SLSJ.

Note :

1. INSPQ (2001), p. 220, indicateur no 31.

46. Répartition des naissances selon la scolarité de la mère (%) Qc : 1999-2001; SLSJ : 2001-2003

Définition : Répartition (en pourcentage), pour une période donnée, de naissances vivantes selon le nombre d'années de scolarité de la mère, par rapport au nombre total des naissances vivantes dont la scolarité de la mère est connue durant la même période.

Le nombre d'années de scolarité correspond au plus haut niveau de scolarité complété avec succès.¹

Sources : MSSS, Fichiers des naissances vivantes; DSP-02, Système d'information sur les naissances vivantes du SLSJ.

Note :

1. INSPQ (2001), p. 216, indicateur no 29.

47.0 Dépenses per capita en services de santé (\$) 2002-2003

Définition : Dépenses réelles brutes affectées à la mission santé et services sociaux divisées par le nombre d'habitants.

Source : Données financières du MSSS.

<http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/statisti/statinternet.nsf/15fcven3a4dc217f2a852568e20053b19b/e2e4f7a27d3ab0c585256e77006cb591?opendocument&highlight=0,capita>

47. Taux de participation au programme de services dentaires pour les enfants de 0 à 9 ans (%) 2001

Définition : Rapport (en pourcentage), pour une année donnée, du nombre de participants de 0 à 9 ans au programme de services dentaires pour les enfants, au nombre total d'enfants de 0 à 9 ans inscrits à la RAMQ et admissibles au programme de la même année. ¹

Source : RAMQ, (2002). Statistiques annuelles 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 272, indicateur no 57.

48. Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie (%) 1999-2000

Définition : Proportion (en pourcentage) des femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie ou plus, au cours d'une période de deux ans, par rapport à la population totale de femmes de 50 à 69 ans. ¹

Source : Centre d'expertise en dépistage (INSPQ), données juillet 2002.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 276, indicateur no 59. Les données proposées ici proviennent des données de facturation à la RAMQ et non des Enquêtes de Santé Québec (ISQ). Elles concernent les femmes qui ont passé une mammographie tous types confondus : dépistage ou diagnostic

49. Femmes de 15 ans et plus ayant subi un test de PAP (%) 1998

Définition : Proportion (en pourcentage) de femmes de 15 ans et plus ayant subi un test de dépistage du cancer du col utérin (test de PAP ou test de Papanicolaou) au cours de la période de deux ans ayant précédé l'enquête, par rapport à la population totale de femmes de 15 ans et plus dans les ménages privés. ^{1,2}

Source : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 274, indicateur no 58.

2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

50. Personnes de 65 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe (%) Qc : 2001-2002; SLSJ : 2002-2003

Définition : Proportion (en pourcentage) de personnes de 65 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la grippe au cours de la campagne annuelle de vaccination (novembre à février) par rapport à la population totale de 65 ans et plus dans les ménages privés. ¹

Sources : NUMÉRATEUR (SLSJ) : DSP-02, Bilan de la campagne de vaccination contre l'influenza et le pneumocoque 2002-2003, (Gagnon L., 2003).

DÉNOMINATEUR (SLSJ) : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

INDICATEUR QUÉBEC : Priorités nationales de santé publique 1997-2002, 5^e bilan, (MSSS, 2003).

Note : 1. INSPQ (2001), p. 278, indicateur no 60. Les données proposées ici proviennent de rapport administratif et non des Enquêtes de Santé Québec (ISQ).

51. Population ayant consommé trois médicaments différents et plus (%) 1998

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population totale ayant consommé trois médicaments différents et plus durant la période de deux jours ayant précédé l'enquête, par rapport à la population totale dans les ménages privés. ^{1,2}

Source : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 280, indicateur no 61.

2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

54. Nombre de médecins ou dentistes et spécialistes en chirurgie buccale par 100 000 habitants

Définition : **a. Inscrits à la RAMQ au 31 décembre 2001** : Rapport du nombre de médecins ou de dentistes et spécialistes en chirurgie buccale, à la population totale correspondante de la même année. Seuls les dispensateurs (médecins ou dentistes et spécialistes en chirurgie buccale) qui ont demandé un paiement à la RAMQ au cours de l'année sont pris en considération dans le calcul de l'indicateur. ¹

b. Médecins actifs résidants au 31 mars 2003 : Rapport, pour une année donnée, du nombre de médecins tel que comptabilisés par la RRSSS-02 au plan des effectifs médicaux, à la population totale correspondante de la même année. ¹

Les médecins comptabilisés sont ceux qui combler un des différents postes autorisés en vertu du plan régional d'effectifs médicaux. Il s'agit donc de médecins qui sont installés dans la région; qui détiennent la plupart du temps un statut de membre actif dans un des établissements du SLSJ et qui ont une pratique jugée «active» dans la région.

Sources : NUMÉRATEUR a : RAMQ, Statistiques annuelles 2001, tableau 2.23 (RAMQ, 2002).

NUMÉRATEUR b : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

DÉNOMINATEUR a : RRSSS-02, Évolution du nombre de médecins spécialistes et omnipraticiens au Saguenay-Lac-St-Jean (02), Compilations régionales, DCS, avril 2003.

DÉNOMINATEUR b : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 264, indicateur no 53.

66. Population de 18 ans et plus percevant son état de santé comme médiocre (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 18 ans et plus se percevant en moyenne ou mauvaise santé, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés.^{1, 2, 3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes :
1. INSPQ (2001), p. 290, indicateur no 65. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires de CLSC en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.

67. Espérance de vie à la naissance (en années) 1995-1999

Définition : Nombre moyen d'années que peut espérer vivre un nouveau-né dans l'hypothèse où les taux de mortalité par âge observés durant une période déterminée demeurent stables dans le temps.¹

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.
DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 326, indicateur no 81.

68. Espérance de vie en bonne santé - sans limitations d'activités (en années) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Nombre moyen d'années à vivre en bonne santé à la naissance dans l'hypothèse d'une stabilisation des taux par âge d'incapacité, de mortalité et d'institutionnalisation, observés durant une période déterminée.¹

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000 ; MSSS, Fichiers des décès; Statistique Canada, Recensement 1996, données géocodées, tableau 0496; MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 328, indicateur no 82.

72. Population ayant une limitation d'activités à long terme (%) 1998

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population ayant une limitation d'activités à long terme, par rapport à la population totale dans les ménages privés.^{1, 2}

Source : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires

Notes :
1. INSPQ (2001), p. 320, indicateur no 78.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

74. a. Prévalence des principaux problèmes de santé (%) 1998

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population présentant au moins un problème de santé dans une catégorie donnée de problèmes, par rapport à la population totale dans les ménages privés.^{1, 2}

Selon Santé Québec, les problèmes déclarés peuvent être des maladies ou des affections de courte ou de longue durée ou simplement des symptômes. Dans environ 80% des cas, les problèmes rapportés auraient été confirmés par un médecin.

Source : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires

Notes :
1. INSPQ (2001), p. 292, indicateur no 66.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine

b. Prévalence du diabète (% , ajustée selon l'âge) 2001-2002

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 20 ans et plus présentant un diabète, estimée à partir de fichiers administratifs de la RAMQ et du fichier MED-ÉCHO. Les prévalences sont ajustées selon la structure par âge de la population du Québec en 2001 pour permettre la comparaison entre les divers territoires géographiques.¹

Source : INSPQ, décembre 2004.

Note : 1. La définition de cas de diabète fait encore l'objet de validation et la méthodologie permettant de les identifier est sujette à changement au fil du temps.

77. Taux ajusté d'incidence des cancers (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer, à la population annuelle moyenne de la même période. ¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des tumeurs du Québec.
DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 310, indicateur no 74.

78. Taux ajusté de mortalité selon la cause (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès, pour une cause spécifique, à la population annuelle moyenne de la même période. ¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.
DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 336, indicateur no 86.

79. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès par maladies de l'appareil circulatoire, à la population annuelle moyenne de la même période. ¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.
DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 342, indicateur no 88.

80. Taux ajusté de mortalité par cancers (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès par tumeurs malignes, à la population annuelle moyenne de la même période. ¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.
DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 340, indicateur no 87.

81. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès par maladies de l'appareil respiratoire, à la population annuelle moyenne de la même période. ¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.
DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 344, indicateur no 89.

82. Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès par traumatismes non intentionnels, à la population annuelle moyenne de la même période. ¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.
DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 346, indicateur no 90.

83. Taux ajusté de mortalité par suicide (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès par suicide, à la population annuelle moyenne de la même période. ¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 348, indicateur no 91.

84. Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (p. 100 000) 1994-1998

Définition : Rapport, pour une période donnée, de la somme des années de vie perdues avant 75 ans, à la population moyenne âgée de moins de 75 ans. ¹ Taux ajusté sur la structure d'âge de la population québécoise de 1996, sexes réunis.

Les codes CIM-9 pour chaque cause spécifique retenue apparaissent entre parenthèses.

Sources : NUMÉRATEUR : MSSS, Fichiers des décès.

DÉNOMINATEUR : MSSS, Service du développement de l'information, DGI, février 2001.

Note : 1. INSPQ (2001), p. 350, indicateur no 92.

85. Indice de surfaces de dents permanentes cariées, absentes ou obturées chez les enfants de 2^e et 6^e année (%) 1998-1999

Définition : Rapport (en pourcentage) de la somme des surfaces des dents cariées, absentes ou obturées chez les enfants de 2^e et 6^e année, au nombre total d'enfants examinés de 2^e et 6^e année scolaire. ¹

Source : Enquête de santé dentaire (INSPQ, 2001).

Note : 1. INSPQ (2001), p. 294, indicateur no 67.

86. Population de 18 ans et plus dont la détresse psychologique dépasse le seuil symptomatologique (%) Qc : 1987; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 18 ans et plus se situant dans la catégorie « Symptomatologie élevée » (30 points ou plus) au cours de la semaine de référence, par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés. ^{1,2}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. L'indice de détresse psychologique reprend l'un des indicateurs de santé mentale utilisés par Santé Québec dans son enquête de 1987. Il s'agit d'une échelle de mesure, utilisée couramment en épidémiologie psychiatrique et en recherche clinique, construite à partir du Psychological Symptom Index (PSI) décrivant divers états symptomatiques et construite d'après 29 énoncés (Ilfeld, 1973, 1978).
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.

87. Population de 18 ans et plus présentant des idées suicidaires sérieuses et récentes (%) Qc : 1998; SLSJ : 2000

Définition : Proportion (en pourcentage) de la population de 18 ans et plus ayant eu des idées suicidaires sérieuses au cours des douze derniers mois (y compris les personnes ayant tenté de se suicider durant la même période), par rapport à la population totale de 18 ans et plus dans les ménages privés. ^{1,2,3}

Sources : ISQ, Enquête sociale et de santé 1998, Banque de données préliminaires; DSP-02, Enquête psychosociale du SLSJ 2000.

Notes : 1. INSPQ (2001), p. 302, indicateur no 71. Nos données portent sur la population de 18 ans et plus. De plus, dans le calcul de prévalence des idéations suicidaires récentes, nous avons inclus, contrairement à ce que fait l'INSPQ, les personnes ayant tenté de s'enlever la vie au cours de la même période.
2. St-Ludger-de-Milot (93080) a été inclus dans le territoire Maria-Chapdelaine.
3. Le nombre calculé pour la région est différent de la somme des nombres des territoires de CLSC en raison principalement de facteurs de pondération différents aux deux échelles.