INSTITUT
DE LA STATISTIQUE
DU QUÉBEC

www.stat.gouv.qc.ca

SANTÉ

Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008 : analyse des données régionales

Recueil statistique

Québec

Pour tout renseignement concernant l'ISQ
et les données statistiques dont il dispose,
s'adresser à :

Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)
G1R 5T4
Téléphone : 418 691-2401

ou

Téléphone : 1 800 463-4090
(sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Site Web : www.stat.gouv.qc.ca

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
1er trimestre 2010
ISBN 978-2-550-58443-8 (version imprimée)
ISBN 978-2-550-58442-1 (PDF)

© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec

Toute reproduction est interdite
sans l'autorisation du gouvernement du Québec.
www.stat.gouv.qc.ca/droits_auteur.htm

Mars 2010

AVANT-PROPOS

L'institut de la statistique du Québec présente le premier *Recueil statistique* constitué à partir des données de l'*Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*. Cette enquête, menée entre mai et septembre 2008, a été mise sur pied en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Aux fins de cette enquête et pour la toute première fois au Québec, environ 8 700 personnes de 16 régions sociosanitaires qui ont reçu un traitement pour soigner un cancer se sont prononcées sur la qualité des services reçus tout au long de leur parcours de soins. Ce premier recueil accompagne les données présentées dans le rapport intitulé *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008 : portrait statistique des personnes ayant reçu un traitement*. Ce recueil fournit des données régionales à toutes les organisations vouées à l'amélioration de la qualité des services.

Cette publication a pour objectif de répondre aux besoins de toutes les personnes qui participent à l'organisation des services de lutte contre le cancer au Québec et de celles dont le mandat est de mettre en place, à l'échelle régionale, des programmes visant à améliorer la qualité des services offerts aux personnes atteintes de cancer.

Le directeur général,

Stéphane Mercier

*Produire une information statistique pertinente, fiable et objective, comparable, actuelle, intelligible et accessible, c'est là l'engagement « **qualité** » de l'Institut de la statistique du Québec.*

Cette publication a été réalisée par :

Issouf Traoré, Gaëtane Dubé et Luc Côté
Institut de la statistique du Québec

Sous la coordination de :

Ghyslaine Neill et Jasline Flores
Institut de la statistique du Québec

Ont assuré la vérification, la révision linguistique et l'édition :

Marie-Ève Cantin
Nicole Descroisselles
Maude Dumont
Gabrielle Tardif
Institut de la statistique du Québec

L'*Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008* a été subventionnée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication :

Direction des statistiques de santé
Institut de la statistique du Québec
1200, avenue McGill College, bureau 500
Montréal (Québec) H3B 4J8

Téléphone : 514 873-4749
ou
1 800 463-4090
(sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Télécopieur : 514 864-9919

Citation suggérée pour le recueil :

Traoré, Issouf, Gaëtane Dubé, Luc Côté (2010). *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008 : analyse des données régionales. Recueil statistique,* Québec, Institut de la statistique du Québec, 889 p.

Signes conventionnels :

– Néant ou zéro
.. Donnée non disponible
... N'ayant pas lieu de figurer
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 25

Région 01 Bas-Saint-Laurent 27
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée 28
2. Caractéristiques de santé de la population visée 29
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services 32
3.1 Avant les traitements 32
3.2 pendant les traitements 42
3.3 après les traitements 68
4. Changements des habitudes de vie de la population visée 72
5. Satisfaction globale de la population visée 78

Région 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 81
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée 82
2. Caractéristiques de santé de la population visée 83
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services 86
3.1 Avant les traitements 86
3.2 pendant les traitements 96
3.3 après les traitements 122
4. Changements des habitudes de vie de la population visée 126
5. Satisfaction globale de la population visée 132

Région 03 Capitale-Nationale 135
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée 136
2. Caractéristiques de santé de la population visée 137
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services 140
3.1 Avant les traitements 140
3.2 pendant les traitements 150
3.3 après les traitements 176
4. Changements des habitudes de vie de la population visée 180
5. Satisfaction globale de la population visée 186

Région 04 Mauricie et Centre-du-Québec 189
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée 190
2. Caractéristiques de santé de la population visée 191
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services 194
3.1 Avant les traitements 194
3.2 pendant les traitements 204
3.3 après les traitements 230
4. Changements des habitudes de vie de la population visée 234
5. Satisfaction globale de la population visée 240

Région 05 Estrie ... 243
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée ... 244
2. Caractéristiques de santé de la population visée ... 245
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services ... 248
3.1 Avant les traitements ... 248
3.2 pendant les traitements ... 258
3.3 après les traitements ... 284
4. Changements des habitudes de vie de la population visée ... 288
5. Satisfaction globale de la population visée ... 294

Région 06 Montréal ... 297
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée ... 298
2. Caractéristiques de santé de la population visée ... 299
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services ... 302
3.1 Avant les traitements ... 302
3.2 pendant les traitements ... 312
3.3 après les traitements ... 338
4. Changements des habitudes de vie de la population visée ... 342
5. Satisfaction globale de la population visée ... 348

Région 07 Outaouais ... 351
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée ... 352
2. Caractéristiques de santé de la population visée ... 353
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services ... 356
3.1 Avant les traitements ... 356
3.2 pendant les traitements ... 366
3.3 après les traitements ... 392
4. Changements des habitudes de vie de la population visée ... 396
5. Satisfaction globale de la population visée ... 402

Région 08 Abitibi-Témiscamingue ... 405
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée ... 406
2. Caractéristiques de santé de la population visée ... 407
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services ... 410
3.1 Avant les traitements ... 410
3.2 pendant les traitements ... 420
3.3 après les traitements ... 446
4. Changements des habitudes de vie de la population visée ... 450
5. Satisfaction globale de la population visée ... 456

Région 09 Côte-Nord ... 459
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée ... 460
2. Caractéristiques de santé de la population visée ... 461
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services ... 464
3.1 Avant les traitements ... 464
3.2 pendant les traitements ... 474
3.3 après les traitements ... 500

4. Changements des habitudes de vie de la population visée 504
5. Satisfaction globale de la population visée 510

Région 10 Nord-du-Québec 513
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée 514
2. Caractéristiques de santé de la population visée 515
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services 518
3.1 Avant les traitements 518
3.2 pendant les traitements 528
3.3 après les traitements 554
4. Changements des habitudes de vie de la population visée 558
5. Satisfaction globale de la population visée 564

Région 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 567
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée 568
2. Caractéristiques de santé de la population visée 569
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services 572
3.1 Avant les traitements 572
3.2 pendant les traitements 582
3.3 après les traitements 608
4. Changements des habitudes de vie de la population visée 612
5. Satisfaction globale de la population visée 618

Région 12 Chaudière-Appalaches 621
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée 622
2. Caractéristiques de santé de la population visée 623
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services 626
3.1 Avant les traitements 626
3.2 pendant les traitements 636
3.3 après les traitements 662
4. Changements des habitudes de vie de la population visée 666
5. Satisfaction globale de la population visée 672

Région 13 Laval 675
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée 676
2. Caractéristiques de santé de la population visée 677
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services 680
3.1 Avant les traitements 680
3.2 pendant les traitements 690
3.3 après les traitements 716
4. Changements des habitudes de vie de la population visée 720
5. Satisfaction globale de la population visée 726

Région 14 Lanaudière 729
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée 730
2. Caractéristiques de santé de la population visée 731

3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services 734
3.1 Avant les traitements 734
3.2 pendant les traitements 744
3.3 après les traitements 770
4. Changements des habitudes de vie de la population visée 774
5. Satisfaction globale de la population visée 780

Région 15 Laurentides 783
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée 784
2. Caractéristiques de santé de la population visée 785
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services 788
3.1 Avant les traitements 788
3.2 pendant les traitements 798
3.3 après les traitements 824
4. Changements des habitudes de vie de la population visée 828
5. Satisfaction globale de la population visée 834

Région 16 Montérégie 837
1. Caractéristiques sociodémographiques de la population visée 838
2. Caractéristiques de santé de la population visée 839
3. Parcours des personnes visées par l'enquête dans le continuum de soins et de services 842
3.1 Avant les traitements 842
3.2 pendant les traitements 852
3.3 après les traitements 878
4. Changements des habitudes de vie de la population visée 882
5. Satisfaction globale de la population visée 888

LISTE DES TABLEAUX

RÉGION 01 BAS-SAINT-LAURENT

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 28

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 29

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 30

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 32

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008..... 34

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 36

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 38

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008..... 40

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 42

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 44

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 46

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 48

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 50

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 54

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 56

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 58

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 60

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 62

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 64

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 66

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 68

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 72

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008..... 76

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008 78

RÉGION 02 SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 82

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 83

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 84

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 86

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 88

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 90

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 92

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 94

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 96

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 98

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 100

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 102

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 104

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 108

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 110

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 112

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 114

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 116

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 118

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 120

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 122

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 126

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 130

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008 132

RÉGION 03 CAPITALE-NATIONALE

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 136

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 137

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 138

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 140

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008..... 142

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 144

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008..... 146

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008..... 148

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008..... 150

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 152

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008.. 154

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 156

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008..... 158

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008..... 162

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008..... 164

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 166

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008..... 168

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008..... 170

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 172

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008..... 174

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 176

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 180

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008..... 184

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008 186

RÉGION 04 MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 190

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 191

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 192

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 194

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 196

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 198

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 200

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 202

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 204

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 206

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 208

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 210

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 212

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 216

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 218

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 220

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 222

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 224

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 226

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 228

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 230

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 234

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 238

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 240

RÉGION 05 ESTRIE

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Estrie et ensemble du Québec, 2008 .. 244

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Estrie et ensemble du Québec, 2008 245

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Estrie et ensemble du Québec, 2008 246

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 248

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 250

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 252

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 254

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 256

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 258

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 260

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 262

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 264

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 266

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 270

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 272

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 274

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 276

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 278

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 280

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 282

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 284

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 288

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 292

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008 294

RÉGION 06 MONTRÉAL

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Montréal et ensemble du Québec, 2008 298

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Montréal et ensemble du Québec, 2008 299

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Montréal et ensemble du Québec, 2008..... 300

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008 302

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008 304

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008 306

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008..... 308

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008 310

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008..... 312

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008.... 314

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008..... 316

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008.... 318

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008..... 320

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008..... 324

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008..... 326

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008 328

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008..... 330

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008..... 332

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008 334

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008..... 336

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008..... 338

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008..... 342

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008 346

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008 348

RÉGION 07 OUTAOUAIS

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 352

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 353

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 354

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 356

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 358

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 360

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 362

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 364

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 366

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 368

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 370

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 372

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 374

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 378

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 380

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 382

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 384

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 386

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 388

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 390

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 392

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 396

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 400

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008 402

RÉGION 08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 406

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 407

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 408

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 410

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008..... 412

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008..... 414

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 416

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008..... 418

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 420

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 422

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 424

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 426

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 428

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 432

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 434

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 436

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 438

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 440

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 442

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 444

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 446

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 450

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008..... 454

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008 456

RÉGION 09 CÔTE-NORD

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 460

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 461

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 462

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 464

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 466

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 468

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 470

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008..... 472

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 474

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 476

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 478

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 480

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 482

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 486

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 488

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 490

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 492

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 494

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 496

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 498

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 500

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 504

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 508

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008 510

RÉGION 10 NORD-DU-QUÉBEC

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 514

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 515

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 516

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 518

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 520

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 522

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 524

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008..... 526

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 528

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 530

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 532

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 534

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 536

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 540

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 542

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 544

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 546

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 548

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 550

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 552

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 554

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 558

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 562

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008 564

RÉGION 11 GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 568

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 569

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 570

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 572

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 574

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 576

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 578

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 580

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 582

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 584

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 586

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 588

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 590

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 594

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 596

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 598

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 600

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 602

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 604

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 606

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 608

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 612

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 616

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008 618

RÉGION 12 CHAUDIÈRE-APPALACHES

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 622

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 623

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 624

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 626

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008..... 628

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008..... 630

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 632

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008..... 634

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 636

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 638

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 640

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 642

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 644

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 648

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 650

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 652

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 654

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 656

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 658

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 660

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 662

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 666

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008..... 670

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008 672

RÉGION 13 LAVAL

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Laval et ensemble du Québec, 2008... 676

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Laval et ensemble du Québec, 2008..... 677

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Laval et ensemble du Québec, 2008 678

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008..... 680

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 682

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 684

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 686

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 688

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 690

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 692

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 694

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 696

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 698

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 702

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 704

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008..... 706

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 708

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 710

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 712

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 714

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 716

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008..... 720

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008 724

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008..... 726

RÉGION 14 LANAUDIÈRE

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 730

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 731

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 ... 732

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 734

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008..... 736

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 738

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 740

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008..... 742

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 744

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 746

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 748

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 750

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 752

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 756

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 758

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 760

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 762

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 764

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 766

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 768

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 770

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 774

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 778

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008 780

RÉGION 15 LAURENTIDES

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 784

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 785

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 786

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 788

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 790

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 792

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 794

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 796

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 798

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 800

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 802

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 804

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 806

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 810

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 812

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 814

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 816

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 818

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 820

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 822

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 824

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 828

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 832

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008 834

RÉGION 16 MONTÉRÉGIE

Tableau 1 Répartition des patients selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 838

Tableau 2 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 839

Tableau 3 Répartition des patients selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 840

Tableau 4 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 842

Tableau 5 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 844

Tableau 6 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 846

Tableau 7 Proportion des patients mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 848

Tableau 8 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 850

Tableau 9 Proportion des patients ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 852

Tableau 10 Proportion des patients ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 854

Tableau 11 Proportion des patients ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 856

Tableau 12 Proportion des patients ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 858

Tableau 13 Répartition des patients selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 860

Tableau 14 Proportion des patients informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 864

Tableau 15 Proportion des patients ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 866

Tableau 16 Répartition des patients selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 868

Tableau 17 Répartition des patients selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 870

Tableau 18 Répartition des patients selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 872

Tableau 19 Répartition des patients selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 874

Tableau 20 Proportion des patients ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 876

Tableau 21 Répartition des patients selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 878

Tableau 22 Répartition des patients selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 882

Tableau 23 Répartition des patients selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 886

Tableau 24 Répartition des patients selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008 888

INTRODUCTION

En 2008, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) confiait à l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) le mandat de réaliser une enquête sur la qualité des services de lutte contre le cancer au Québec. Développée conjointement par la Direction des études et des analyses du MSSS et la Direction des statistiques de santé de l'ISQ, l'*Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer* vise principalement à dresser un portrait statistique de la qualité des services offerts aux personnes ayant reçu un traitement contre cette maladie. Plus spécifiquement, l'enquête cherche à documenter le parcours des personnes âgées de 18 ans et plus ayant reçu entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006 au moins un des trois principaux traitements visés par l'enquête;

- dégager les éléments susceptibles d'améliorer la qualité des services à partir du point de vue des personnes atteintes de cancer;
- générer des données représentatives à l'échelle provinciale et régionale;
- suivre dans le temps les changements dans la qualité des soins et des services offerts aux personnes atteintes de cancer.

Ce recueil statistique présente les résultats pour chacune des 16 régions sociosanitaires retenues dans l'enquête. Il agit ainsi à titre de complément de l'analyse des données provinciales que l'on retrouve dans une autre publication de l'ISQ intitulée *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008 : portrait statistique des personnes ayant reçu un traitement*. Avant de procéder à la présentation de ces résultats, rappelons certains grands paramètres méthodologiques de l'enquête[1].

À PROPOS DE L'ENQUÊTE

La population visée par l'enquête est composée des personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu des traitements[2] (chirurgie, chimiothérapie[3] ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006[4] pour soigner un cancer[5] Sont exclues de la population visée l'ensemble des personnes vivant dans les régions crie et inuite (régions sociosanitaires 17 et 18), celles qui sont décédées avant ou pendant la période de collecte, les personnes en phase terminale au moment de la collecte, celles qui déclarent ne pas avoir eu de traitements entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, de même que celles qui affirment ne pas avoir eu de cancer.

Comme il n'existe pas de base de sondage pouvant contenir l'ensemble des personnes visées par la présente enquête, elle a été construite à partir de deux sources de données administratives[6] :

Le fichier Med-Écho qui renferme les données médico-hospitalières, cliniques et démographiques des patients hospitalisés dans les établissements québécois de soins généraux et spécialisés.

Le fichier des services rémunérés à l'acte de la RAMQ qui comprend l'ensemble des services facturés par les médecins[7]. Ce fichier jumelé au fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA) permet de disposer de l'adresse de presque toutes les personnes possédant une carte d'assurance maladie. Bien que le médecin n'ait pas l'obligation d'inscrire un diagnostic pour être rémunéré, celui-ci constitue néanmoins une variable disponible. Soulignons toutefois que la RAMQ ne procède à aucune validation

1. Pour en savoir plus sur la méthodologie de l'enquête, voir : Gaëtane Dubé, Luc Côté, Monique Bordeleau, Linda Cazale et Issouf Traoré (2010). *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008 : portrait statistique des personnes ayant reçu un traitement*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 130 p.
2. Précisons que pour être sélectionnées, les personnes devaient avoir reçu au Québec au moins un des traitements visés par l'enquête; ceux reçus à l'extérieur du Québec n'ont pas été pris en compte dans l'analyse des données.
3. Seul le traitement de chimiothérapie par voie intraveineuse a été examiné dans la présente enquête.
4. Le choix de la période de référence répond aux préoccupations exprimées par le MSSS quant au fait d'être le plus près possible du temps 0 de l'implantation des équipes interdisciplinaires. Par ailleurs, certaines contraintes liées à l'utilisation de données administratives reposant sur le même système de classification des maladies (CIM-9 versus CIM-10) ont également milité en faveur du choix de cette période de référence.
5. Le terme cancer couvre les diagnostics 140 à 208 de la 9e classification internationale des maladies (CIM-9).
6. Pour plus d'information sur la base de sondage, veuillez vous référer à : Gaëtane Dubé, Luc Côté, Monique Bordeleau, Linda Cazale et Issouf Traoré (2010). *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008 : portrait statistique des personnes ayant reçu un traitement*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 130 p.
7. Soulignons ici que les services rendus par des médecins salariés ne sont pas compris dans ce fichier. Cela dit, il semble que peu de médecins travaillent à salaire dans le domaine de l'oncologie selon la RAMQ.

de cette variable; le diagnostic peut donc se révéler incorrect ou même absent.

Étant donné le sujet de l'enquête, la collecte au moyen d'un questionnaire autoadministré, acheminé par voie postale, a été privilégiée; de fait, cette méthode a été jugée moins intrusive qu'un appel téléphonique. Toutefois, toutes les personnes sélectionnées se sont vu offrir la possibilité de participer à l'enquête au moyen d'une entrevue téléphonique. Finalement, 84 % des répondants ont opté pour le mode autoadministré, tandis que 16 % ont choisi la collecte par téléphone. La procédure d'envoi des documents de l'enquête (lettre, questionnaire, formulaire de consentement, enveloppe de retour) s'est déroulée du 28 au 30 mai 2008 et la collecte a pris fin le 7 septembre 2008. Au total, sur les 14 790 personnes sélectionnées, 8 753 ont rempli le questionnaire.

PRÉSENTATION ET VENTILATION DES TABLEAUX STATISTIQUES

Comme mentionné précédemment, les tableaux de ce recueil statistique permettent de dresser un portrait des personnes ayant reçu des traitements entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006 pour chacune des 16 régions sociosanitaires retenues dans l'enquête. Ce recueil présente ainsi les caractéristiques sociodémographiques et de santé de ces personnes, leur parcours dans le continuum de soins et de services, les changements apportés dans leurs habitudes de vie de même que leur satisfaction globale à l'égard des soins et des services reçus.

CONCEPTS STATISTIQUES

Interprétation de l'intervalle de confiance à 95 %

Les estimations obtenues par le biais d'une enquête par sondage ne sont pas des valeurs exactes et sont entachées d'une erreur d'échantillonnage. L'intervalle de confiance à 95 % est l'une des mesures de précision des estimations retenues. Il s'interprète de la façon suivante : « Si l'on tirait un échantillon de la population visée un grand nombre de fois selon le même plan de sondage, 95 % des échantillons sélectionnés fourniraient un intervalle de confiance contenant la vraie valeur du paramètre de cette population. »

L'intervalle de confiance permet également d'établir dans quelle mesure les modalités de la variable de croisement se démarquent entre elles lorsqu'une comparaison des intervalles de confiance est faite. Avant de procéder à un tel examen, il importe toutefois de vérifier si la variable d'analyse est significativement associée à la variable de croisement[8]. Pour chacun des croisements effectués dans le cadre de ce recueil, lorsqu'une association significative était observée entre la variable d'analyse et la variable de croisement, nous l'avons illustré à l'aide d'une lettre en exposant. Ainsi, la lettre « p » en exposant à une variable indique une association significative entre cette dernière et la variable de croisement pour la donnée provinciale et la lettre « r » indique une telle association pour la donnée régionale. D'autre part, pour une valeur donnée de la variable d'analyse, une différence (significative au seuil de 0,05) était notée entre deux modalités de la variable de croisement si les intervalles de confiance concernant chacune des modalités comparées étaient disjoints. Dans les cas limites, c'est-à-dire lorsque les intervalles de confiance se recoupaient à peine, un test devait être effectué afin de déterminer si la différence entre les proportions était significative.

Interprétation du coefficient de variation

Le coefficient de variation (CV) est une mesure relative qui permet de quantifier la précision de l'estimation et, de ce fait, contribue à faciliter l'interprétation de celle-ci. Plus le CV est élevé, moins l'estimation est précise et inversement. Les estimations dont le CV est inférieur à 15 % sont présentées dans ce recueil sans commentaire parce qu'elles sont suffisamment précises. Celles dont le CV se situe entre 15 % et 25 % sont marquées d'un astérisque (*) et doivent être interprétées avec prudence. Finalement, les estimations dont le CV est supérieur à 25 % sont marquées d'un double astérisque (**) pour en signaler l'imprécision, et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

8. Pour chacun des croisements présentés dans ce recueil, un test du khi-deux avec ajustement de Satterthwaite a été effectué afin de mesurer la vraisemblance de l'hypothèse d'indépendance entre la variable d'analyse et la variable de croisement. Sont considérées comme statistiquement significatives les associations dont le seuil observé du test est inférieur à 0,05.

Région 01

BAS-SAINT-LAURENT

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	46,5	.. ; ..
Femmes	53,9	53,5	.. ; ..
Âge			
18 à 49 ans	18,9	15,3	12,7 ; 17,9
50 à 59 ans	24,9	25,6	22,8 ; 28,4
60 à 69 ans	29,8	31,4	27,7 ; 35,1
70 ans et plus	26,5	27,8	25,4 ; 30,1
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	100,0	;
Anglais	10,6	-	;
Autres	3,0	-	;
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	35,9	32,1 ; 39,8
Diplôme d'études secondaires	24,7	25,4	21,9 ; 29,0
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	26,2	22,8 ; 29,7
Diplôme d'études universitaires	20,6	12,4	9,8 ; 15,0
Occupation principale			
En emploi	29,3	25,0	22,0 ; 28,0
Étudiant	1,7	1,1**	0,4 ; 2,2
Retraité	55,8	60,1	56,6 ; 63,5
À la maison	7,2	7,0	5,2 ; 9,3
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	3,6*	2,4 ; 5,3
Congé de maternité / autres	3,6	3,2*	1,9 ; 5,1
Situation familiale			
Vit seul	24,1	23,0	19,6 ; 26,4
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	55,6	51,8 ; 59,5
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	12,5	10,0 ; 15,1
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	4,1*	2,5 ; 6,3
Autres	4,8	4,8*	3,2 ; 6,9
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	12,9	10,2 ; 16,0
Revenu suffisant	61,4	56,5	52,4 ; 60,5
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	30,6	26,8 ; 34,5
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	4,1*	2,6 ; 6,2
2	21,1	15,9	12,9 ; 19,2
3	20,1	14,6	11,7 ; 18,0
4	19,4	21,5	18,0 ; 25,0
5 - très défavorisé	17,6	43,9	39,8 ; 48,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	13,5	10,8 ; 16,1	17,9	13,4 ; 23,1	9,6*	6,7 ; 13,3
Génital féminin	5,5	...	10,2	4,1*	2,7 ; 6,0	...	;	7,7*	5,0 ; 11,2
Prostate	15,9	34,4	...	15,2	13,0 ; 17,5	32,8	28,0 ; 37,5	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	7,5	5,7 ; 9,7	9,5*	6,6 ; 13,1	5,8*	3,6 ; 8,7
Sein	26,5	0,4**	48,8	28,9	26,5 ; 31,3	0,8**	0,0 ; 4,4	53,3	48,9 ; 57,7
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	5,7*	4,0 ; 7,9	8,5*	5,4 ; 12,6	3,3**	1,5 ; 6,0
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	5,7*	4,0 ; 7,9	7,7*	4,8 ; 11,8	3,9**	2,2 ; 6,4
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	19,4	16,3 ; 22,4	22,8	17,7 ; 27,9	16,4	12,6 ; 20,7
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	84,7	81,2 ; 87,7	87,1	82,0 ; 91,2	82,5	77,8 ; 86,6
Récidive	7,4	7,5	7,3	6,4*	4,4 ; 8,9	5,9**	3,2 ; 9,7	6,9*	4,4 ; 10,2
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	8,9	6,6 ; 11,7	7,0*	4,0 ; 11,1	10,6*	7,3 ; 14,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	8,6	6,6 ; 11,1	9,3*	6,1 ; 13,4	8,1*	5,5 ; 11,4
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	19,9	17,2 ; 22,5	5,2**	2,9 ; 8,7	32,1	27,8 ; 36,4
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	71,5	68,2 ; 74,8	85,5	80,6 ; 89,6	59,8	55,0 ; 64,6
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	49,9	45,7 ; 54,1	50,7	44,4 ; 57,0	49,2	43,8 ; 54,7
Non	58,8	56,6	60,7	50,1	45,9 ; 54,3	49,3	43,0 ; 55,6	50,8	45,3 ; 56,2
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	98,7	97,4 ; 99,5	98,6	96,5 ; 99,6	98,8	96,7 ; 99,7
Non	8,3	8,5	8,0	1,3**	0,5 ; 2,6	1,4**	0,4 ; 3,5	1,2**	0,3 ; 3,3
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	10,0	7,7 ; 12,8	10,8*	7,0 ; 15,8	9,3*	6,5 ; 12,8
Très bon	29,2	29,3	29,1	28,2	24,4 ; 32,1	28,6	22,7 ; 34,6	27,9	22,9 ; 32,8
Bon	34,9	34,2	35,5	37,0	33,1 ; 40,8	38,3	32,2 ; 44,3	35,9	30,7 ; 41,0
Moyen	18,8	17,8	19,6	20,2	16,8 ; 23,5	18,3	13,6 ; 23,9	21,8	17,3 ; 26,2
Mauvais	5,6	5,7	5,5	4,6*	3,1 ; 6,6	4,0**	2,0 ; 7,0	5,2*	3,1 ; 8,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p]
13,5	10,8 ; 16,1	3,4**	0,7 ; 9,8	12,0*	7,4 ; 18,1	14,7*	10,3 ; 20,1	18,9*	12,7 ; 26,6	Colorectal
4,1*	2,7 ; 6,0	6,8**	2,6 ; 14,1	4,8**	2,2 ; 9,0	2,4**	0,7 ; 5,8	3,9**	1,4 ; 8,5	Génital féminin
15,2	13,0 ; 17,5	4,6**	1,3 ; 11,1	10,5*	6,5 ; 16,0	22,6	17,1 ; 28,1	17,2*	12,3 ; 23,0	Prostate
7,5	5,7 ; 9,7	8,7**	3,7 ; 16,7	12,0*	7,6 ; 17,6	6,5**	3,6 ; 10,8	3,9**	1,5 ; 8,0	Hématopoïétique
28,9	26,5 ; 31,3	44,5	35,6 ; 53,3	34,9	28,6 ; 41,2	25,2	19,6 ; 30,7	19,0	13,7 ; 25,3	Sein
5,7*	4,0 ; 7,9	13,2**	6,6 ; 22,8	7,2**	3,7 ; 12,5	3,5**	1,4 ; 6,9	2,7**	0,8 ; 6,7	ORL (Tête et cou)
5,7*	4,0 ; 7,9	-	;	3,6**	1,4 ; 7,5	10,2*	6,4 ; 15,1	5,9**	2,5 ; 11,5	Broncho-pulmonaire
19,4	16,3 ; 22,4	18,9*	11,6 ; 28,3	15,0*	9,9 ; 21,5	14,9*	10,5 ; 20,4	28,5	21,1 ; 36,9	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
84,7	81,2 ; 87,7	88,4	80,4 ; 93,9	85,9	79,8 ; 90,7	80,5	74,0 ; 86,1	86,1	78,5 ; 91,8	Premier cancer
6,4*	4,4 ; 8,9	6,1**	2,3 ; 12,8	6,4**	3,3 ; 11,1	7,8**	4,3 ; 12,8	5,1**	1,9 ; 10,8	Récidive
8,9	6,6 ; 11,7	5,5**	1,9 ; 12,0	7,7**	4,0 ; 13,0	11,7*	7,6 ; 17,0	8,8**	4,5 ; 15,2	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]
8,6	6,6 ; 11,1	2,0**	0,3 ; 7,0	11,2*	6,8 ; 17,0	13,6*	9,3 ; 18,9	4,2**	1,6 ; 9,0	Sous traitement
19,9	17,2 ; 22,5	30,0	21,5 ; 39,6	22,0	16,5 ; 27,4	17,6	12,7 ; 23,4	14,7*	9,5 ; 21,3	Sans traitement avec médication
71,5	68,2 ; 74,8	68,0	58,8 ; 77,1	66,9	60,0 ; 73,8	68,9	62,5 ; 75,3	81,1	74,0 ; 86,9	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p]
49,9	45,7 ; 54,1	45,7	35,0 ; 56,4	48,0	40,7 ; 55,4	52,3	45,2 ; 59,3	51,4	42,3 ; 60,4	Oui
50,1	45,9 ; 54,3	54,3	43,6 ; 65,0	52,0	44,6 ; 59,3	47,7	40,7 ; 54,8	48,6	39,6 ; 57,7	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p]
98,7	97,4 ; 99,5	96,3	89,5 ; 99,2	98,8	95,9 ; 99,9	99,1	96,6 ; 99,9	99,5	96,8 ; 100,0	Oui
1,3**	0,5 ; 2,6	3,7**	0,8 ; 10,5	1,2**	0,1 ; 4,1	0,9**	0,1 ; 3,4	0,5**	0,0 ; 3,2	Non
										Perception de l'état de santé[p]
10,0	7,7 ; 12,8	8,1**	3,3 ; 16,2	8,5**	4,6 ; 14,1	9,3*	5,9 ; 13,8	13,3*	7,9 ; 20,6	Excellent
28,2	24,4 ; 32,1	31,2*	21,5 ; 41,0	32,4	25,1 ; 39,6	28,9	22,5 ; 35,9	22,0*	14,9 ; 30,7	Très bon
37,0	33,1 ; 40,8	48,0	37,6 ; 58,4	29,9	23,3 ; 37,1	32,3	26,1 ; 38,5	42,7	33,9 ; 51,5	Bon
20,2	16,8 ; 23,5	11,6**	5,9 ; 20,0	23,4	17,2 ; 30,6	23,2	17,5 ; 28,9	18,5*	12,1 ; 26,5	Moyen
4,6*	3,1 ; 6,6	1,0**	0,0 ; 5,0	5,9**	2,8 ; 10,9	6,4**	3,5 ; 10,5	3,4**	1,0 ; 8,0	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	49,0	44,8;53,1	60,9	48,7;72,2
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	51,0	46,9;55,2	39,1	27,8;51,3
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	41,8	35,0;48,5	27,1**	14,0;43,8
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	19,7	14,3;26,0	11,9**	3,8;26,3
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	18,5	13,6;24,3	27,8*	15,1;43,8
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	20,1	14,5;25,6	33,3**	17,6;52,1
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	44,9	39,2;50,5	52,8*	32,7;72,3
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	14,9	10,8;19,7	14,8**	4,0;34,2
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	14,5	10,8;18,9	19,0**	7,2;37,1
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	15,8	12,4;19,7	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	9,9*	6,6;14,3	13,4**	3,5;31,9
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	52,4	47,4;57,3	48,3	33,7;63,2
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	24,4	20,2;28,6	24,9*	13,6;39,3
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	15,2	11,4;19,7	18,2**	8,1;32,8
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	8,0*	5,3;11,5	8,6**	2,8;19,4
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	86,2	83,0;89,0	89,8	80,8;95,5
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	10,7	8,2;13,7	9,0**	3,8;17,6
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	3,1**	1,7;5,1	1,2**	0,0;6,3
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	1,6**	0,7;3,1	-	;
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	98,4	96,9;99,3	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7 *	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
58,1*	36,2;77,8	16,8*	10,2;25,3	69,1	53,3;82,3	53,6	46,6;60,6	74,7	53,9;89,5	20,3**	7,9;39,0	50,2	40,0;60,3	Oui
41,9*	22,2;63,8	83,2	74,7;89,8	30,9*	17,7;46,7	46,4	39,4;53,4	25,3**	10,5;46,1	79,7	61,0;92,1	49,8	39,7;60,0	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
51,1**	14,2;87,1	26,2**	4,3;63,7	31,9**	13,9;54,9	60,5	48,1;72,0	50,8*	26,6;74,7	-	;	32,5*	18,3;49,4	2 semaines et moins
11,4**	0,2;53,4	20,9**	2,7;57,2	15,7**	3,9;37,4	17,7**	9,8;28,4	19,6**	5,8;42,5	38,6**	1,0;94,5	31,3**	16,3;49,8	Plus de 2 semaines à 1 mois
11,4**	0,2;50,3	18,9**	1,9;56,2	29,6**	12,8;51,8	11,4**	5,2;20,8	15,0**	3,0;38,9	61,4**	5,5;99,0	13,1**	4,2;28,3	Plus d'un mois à 3 mois
26,0**	2,8;69,0	34,0**	8,0;70,2	22,8**	8,1;44,9	10,4**	4,5;19,5	14,6**	2,7;39,0	-	;	23,2**	10,7;40,5	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
28,2**	4,4;67,8	64,0	54,0;73,9	28,0**	7,3;59,2	21,3*	13,3;31,3	76,2*	27,5;98,7	58,0*	36,6;77,4	45,5*	30,2;61,5	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
9,7**	0,2;44,1	17,3*	10,0;26,8	50,8**	23,7;77,6	5,5**	1,8;12,4	-	;	16,1**	4,1;38,0	18,6**	7,7;35,1	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
62,1**	24,8;90,9	8,5**	3,6;16,5	6,6**	0,1;32,4	8,8**	4,0;16,2	12,3**	0,1;62,2	14,4**	3,7;34,1	22,1**	11,1;36,9	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	56,4	45,9;66,9	-	;	-	;	3,5**	0,4;12,5	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
-	;	10,3**	4,0;20,7	14,6**	1,8;43,4	7,9**	3,0;16,5	11,5**	0,1;60,3	11,5**	2,2;31,0	10,3**	3,2;23,2	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
62,1**	27,4;89,4	22,7*	12,9;35,4	50,6*	32,4;68,7	69,6	60,1;79,1	51,0*	28,2;73,5	61,6*	37,2;82,3	54,5	42,3;66,6	2 semaines et moins
28,6**	5,9;64,2	38,7*	26,1;52,6	19,8**	7,1;39,6	20,9*	13,0;30,9	8,6**	0,9;29,0	23,8**	7,6;48,6	24,0*	14,4;35,9	Plus de 2 semaines à 1 mois
9,3**	0,2;42,5	28,2*	16,8;42,1	17,7**	6,9;34,3	7,5**	3,1;15,0	19,8**	5,5;43,9	14,6**	3,1;37,3	10,6**	4,5;20,2	Plus d'un mois à 3 mois
-	;	10,4**	3,8;21,7	11,9**	3,2;28,1	2,0**	0,3;6,8	20,6**	5,6;45,7	-	;	11,0**	4,4;21,6	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
100,0	;	84,5	74,9;91,5	68,2	52,1;81,6	90,7	85,6;94,5	67,7	47,3;84,1	93,1	75,7;99,3	86,0	77,0;92,5	Oui, tout à fait
-	;	13,4**	7,0;22,3	23,5**	11,9;38,9	8,1*	4,6;13,0	26,3**	11,1;47,1	-	;	9,3**	4,3;17,2	Oui, en partie
-	;	2,1**	0,3;7,0	8,3**	1,5;23,6	1,2**	0,2;4,1	6,0**	0,6;20,9	6,9**	0,7;24,3	4,6**	1,4;11,0	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]
-	;	-	;	5,6**	0,7;18,9	2,7**	0,9;6,4	3,6**	0,1;18,2	-	;	0,9**	0,0;4,3	Oui
100,0	;	100,0	;	94,4	81,1;99,3	97,3	93,6;99,1	96,4	81,8;99,9	100,0	;	99,1	95,7;100,0	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	15,3	12,5;18,4	8,5**	3,4;16,8
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	25,7	22,1;29,3	12,7**	6,0;22,5
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	30,6	26,9;34,3	60,9	48,9;72,1
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	24,9	21,2;28,5	14,4**	7,0;25,1
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	2,1**	1,1;3,6	1,1**	0,0;6,2
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	0,3**	0,1;1,1	-	;
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	1,2**	0,5;2,3	2,5**	0,3;8,7
Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	90,0	87,4;92,3	97,6	91,0;99,8
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	10,0	7,7;12,6	2,4**	0,2;9,0
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	95,9	93,9;97,4	97,5	91,1;99,7
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	4,1*	2,6;6,1	2,5**	0,3;8,9
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	94,7	92,6;96,4	95,0	87,4;98,7
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	5,3*	3,6;7,4	5,0**	1,3;12,6
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	96,8	95,1;98,0	98,9	93,8;100,0
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	3,2*	2,0;4,9	1,1**	0,0;6,2
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	70,4	66,6;74,1	61,5	49,5;72,5
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	29,6	25,9;33,4	38,5	27,5;50,5
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	66,7	62,8;70,6	67,5	54,6;78,6
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	33,3	29,4;37,2	32,5*	21,4;45,4
Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	68,4	63,9;72,8	57,5	42,3;71,6
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	31,6	27,2;36,1	42,5*	28,4;57,7
Contact pour du soutien pratique[3, p, r]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	75,8	72,2;79,5	76,1	63,9;85,8
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	24,2	20,5;27,8	23,9*	14,2;36,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3. On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
7,8**	0,8;26,9	10,4**	4,8;18,9	17,2**	7,4;31,7	24,0	18,1;30,8	3,3**	0,1;16,7	14,9**	5,2;31,1	15,2**	8,5;24,4	Médecin de famille
5,2**	0,1;27,1	46,8	36,6;57,1	43,4*	28,5;59,3	15,8*	10,5;22,3	30,5**	15,1;49,9	35,9*	19,7;54,9	26,5*	17,7;36,9	Médecin spécialiste du cancer
10,0**	1,0;33,5	6,5**	2,5;13,3	16,9**	7,8;30,2	47,9	40,7;55,1	10,1**	2,1;26,6	9,3**	2,0;24,7	23,5*	15,9;32,5	Chirurgien
73,4	49,6;90,1	34,2*	23,9;44,5	13,8**	5,1;28,0	8,2*	4,8;12,9	53,5*	34,1;72,1	39,9*	22,2;59,7	31,4	22,4;40,5	Autre médecin spécialiste
3,5**	0,1;18,1	2,0**	0,2;7,3	4,0**	0,5;14,0	1,8**	0,4;5,2	-	;	-	;	3,3**	0,7;9,1	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	2,5**	0,1;12,2	0,5**	0,0;2,7	-	;	-	;	-	;	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	-	;	2,3**	0,1;11,6	1,7**	0,3;4,9	2,7**	0,1;13,8	-	;	-	;	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]
96,4	83,3;99,9	98,0	93,1;99,7	87,2	73,8;95,2	86,3	80,1;91,1	77,0	56,3;91,1	88,4	72,3;96,9	88,2	80,3;93,7	En personne
3,6**	0,1;16,7	2,0**	0,3;6,9	12,8**	4,8;26,2	13,7*	8,9;19,9	23,0**	8,9;43,7	11,6**	3,1;27,7	11,8**	6,3;19,7	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
100,0	;	94,8	87,9;98,4	89,7	75,4;97,2	96,7	92,8;98,8	88,8	70,0;97,8	100,0	;	96,7	91,7;99,1	Oui
-	;	5,2**	1,6;12,1	10,3**	2,8;24,6	3,3**	1,2;7,2	11,2**	2,2;30,0	-	;	3,3**	0,9;8,3	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
100,0	;	95,8	89,8;98,8	84,6	69,1;94,3	95,2	91,2;97,8	92,5	74,0;99,2	100,0	;	94,5	89,2;97,7	Oui
-	;	4,2**	1,2;10,2	15,4**	5,7;30,9	4,8**	2,2;8,8	7,5**	0,8;26,0	-	;	5,5**	2,3;10,8	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
100,0	;	95,8	89,9;98,8	95,2	84,2;99,3	96,3	92,3;98,6	97,0	84,0;99,9	100,0	;	95,8	90,6;98,6	Oui
-	;	4,2**	1,2;10,1	4,8**	0,7;15,8	3,7**	1,4;7,7	3,0**	0,1;16,0	-	;	4,2**	1,4;9,4	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]
55,4*	32,5;76,8	85,3	75,7;92,1	76,0	60,6;87,6	83,2	77,0;88,3	53,2*	35,0;70,8	71,2	49,8;87,3	50,9	41,1;60,8	Oui
44,6*	23,2;67,5	14,7**	7,9;24,3	24,0**	12,4;39,4	16,8*	11,7;23,0	46,8*	29,2;65,0	28,8**	12,7;50,2	49,1	39,2;58,9	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]
68,7*	44,3;87,3	49,5	39,4;59,5	82,1	68,4;91,7	81,9	75,6;87,1	71,4	52,6;86,1	37,1*	20,8;55,9	58,2	48,6;67,8	Oui
31,3**	12,7;55,7	50,5	40,5;60,6	17,9**	8,3;31,6	18,1*	12,9;24,4	28,6**	13,9;47,4	62,9	44,1;79,2	41,8	32,2;51,4	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]
56,4*	29,1;81,1	58,4	42,8;72,9	78,9	62,7;90,3	83,0	76,0;88,7	49,3*	27,4;71,4	83,6	54,8;97,5	54,7	41,2;68,2	Oui
43,6**	18,9;70,9	41,6*	27,1;57,2	21,1**	9,7;37,3	17,0*	11,3;24,0	50,7*	28,6;72,6	16,4**	2,5;45,2	45,3*	31,8;58,8	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p, r]
85,4	61,8;97,2	66,4	56,4;76,4	81,3	67,6;91,0	81,7	75,2;87,1	69,5	48,4;85,8	90,7	73,4;98,4	67,9	58,4;77,5	Oui
14,6**	2,8;38,2	33,6*	23,6;43,6	18,7**	9,0;32,4	18,3*	12,9;24,8	30,5**	14,2;51,6	9,3**	1,6;26,6	32,1*	22,5;41,6	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	12,4	9,3;16,1	14,2**	5,5;28,1
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	87,6	83,9;90,7	85,8	71,9;94,5
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	46,2	41,5;50,8	39,9*	25,7;55,4
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	53,8	49,2;58,5	60,1	44,6;74,3
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	6,3*	4,1;9,1	1,6**	0,0;8,7
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	93,7	90,9;95,9	98,4	91,3;100,0
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	4,2*	2,5;6,7	5,5**	1,1;15,1
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	95,8	93,3;97,5	94,5	84,9;98,9
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	10,5*	7,6;14,1	7,2**	1,9;17,8
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	89,5	85,9;92,4	92,8	82,2;98,1
Autre professionnel de la santé[r]													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	5,4*	3,4;8,1	1,7**	0,0;9,4
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	94,6	91,9;96,6	98,3	90,6;100,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7 *	4,0;7,9	5,7 *	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]
11,9**	1,8;34,6	10,9**	3,5;24,0	18,4**	7,3;35,3	13,2*	8,2;19,7	6,4**	0,2;30,5	15,8**	1,9;46,7	8,9**	3,4;18,1	Oui
88,1	65,4;98,2	89,1	76,0;96,5	81,6	64,7;92,7	86,8	80,3;91,8	93,6	69,5;99,8	84,2	53,3;98,1	91,1	81,9;96,6	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
31,5**	10,9;59,4	38,7*	24,9;54,0	61,5	42,5;78,3	59,8	52,0;67,6	31,4**	13,4;54,7	69,0*	38,6;90,7	24,3*	13,6;38,1	Oui
68,5*	40,6;89,1	61,3	46,0;75,1	38,5*	21,7;57,5	40,2	32,4;48,0	68,6	45,3;86,6	31,0**	9,3;61,4	75,7	61,9;86,4	Non
														Psychologue[p]
6,8**	0,2;32,3	4,3**	0,5;14,4	15,5**	5,1;32,9	7,8**	4,1;13,3	4,0**	0,0;22,9	7,6**	0,1;37,7	3,9**	0,9;10,3	Oui
93,2	67,7;99,8	95,7	85,6;99,5	84,5	67,1;94,9	92,2	86,7;95,9	96,0	77,1;100,0	92,4	62,3;99,9	96,1	89,7;99,1	Non
														Travailleur social[p]
-	;	2,1**	0,1;10,4	11,3**	2,9;27,4	5,7**	2,6;10,4	-	;	-	;	1,4**	0,0;7,2	Oui
100,0	;	97,9	89,6;99,9	88,7	72,6;97,1	94,3	89,6;97,4	100,0	;	100,0	;	98,6	92,8;100,0	Non
														Médecin[p]
12,7**	1,4;39,8	6,5**	1,4;17,7	15,0**	5,4;30,7	6,7**	3,1;12,2	11,5**	1,9;32,7	7,8**	0,2;37,4	20,8**	10,7;34,5	Oui
87,3	60,2;98,6	93,5	82,3;98,6	85,0	69,3;94,6	93,3	87,8;96,9	88,5	67,3;98,1	92,2	62,6;99,8	79,2	65,5;89,3	Non
														Autre professionnel de la santé[r]
-	;	2,1**	0,0;12,5	14,9**	4,9;31,7	7,5**	3,5;13,7	4,0**	0,1;20,3	-	;	3,9**	0,8;10,9	Oui
100,0	;	97,9	87,5;100,0	85,1	68,3;95,1	92,5	86,3;96,5	96,0	79,7;99,9	100,0	;	96,1	89,1;99,2	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	30,7	27,1;34,3	31,9*	21,5;43,8
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	69,3	65,7;72,9	68,1	56,2;78,5
Médecin spécialiste du cancer[p]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	39,4	35,7;43,2	42,2	30,6;53,8
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	60,6	56,8;64,3	57,8	46,2;69,4
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	24,9	21,2;28,7	23,9*	14,6;35,4
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	75,1	71,3;78,8	76,1	64,6;85,4
Autre médecin spécialiste[p]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	14,7	11,9;18,0	20,9*	11,6;33,0
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	85,3	82,0;88,1	79,1	67,0;88,4
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	4,9*	3,2;7,0	2,4**	0,1;12,1
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	95,1	93,0;96,8	97,6	87,9;99,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
9,1**	1,0;30,6	13,8**	7,3;23,0	53,2	38,5;67,5	46,0	38,8;53,3	25,8**	12,3;43,8	20,4**	7,9;39,3	19,6*	11,8;29,7	Oui
90,9	69,4;99,0	86,2	77,0;92,7	46,8*	32,5;61,5	54,0	46,7;61,2	74,2	56,2;87,7	79,6	60,7;92,1	80,4	70,3;88,2	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p]
43,7*	22,3;66,9	38,5	28,7;48,3	46,7*	31,3;62,6	38,7	31,6;45,8	39,3*	21,2;59,8	45,6*	27,5;64,5	34,0	25,4;42,6	Oui
56,3*	33,1;77,7	61,5	51,7;71,3	53,3	37,4;68,7	61,3	54,2;68,4	60,7*	40,2;78,8	54,4*	35,5;72,5	66,0	57,4;74,6	Non
														Médecin de famille[p]
28,3**	10,2;53,7	22,5*	14,4;32,4	21,3**	10,9;35,4	27,6	20,9;35,2	13,6**	3,7;31,9	37,5**	18,8;59,3	24,0*	15,1;34,9	Oui
71,7	46,3;89,8	77,5	67,6;85,6	78,7	64,6;89,1	72,4	64,8;79,1	86,4	68,1;96,3	62,5*	40,7;81,2	76,0	65,1;84,9	Non
														Autre médecin spécialiste[p]
13,8**	2,9;35,3	12,6**	6,8;20,8	8,6**	2,3;20,7	12,4*	7,8;18,5	9,8**	1,9;26,6	19,4**	6,7;39,5	18,6*	10,9;28,6	Oui
86,2	64,7;97,1	87,4	79,2;93,2	91,4	79,3;97,7	87,6	81,5;92,2	90,2	73,4;98,1	80,6	60,5;93,3	81,4	71,4;89,1	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
13,8**	3,0;34,9	2,0**	0,2;7,3	4,0**	0,5;13,2	7,7**	4,1;13,0	-	;	5,8**	0,6;20,5	4,4**	1,3;10,5	Oui
86,2	65,1;97,0	98,0	92,7;99,8	96,0	86,8;99,5	92,3	87,0;95,9	100,0	;	94,2	79,5;99,4	95,6	89,5;98,7	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	82,7	79,3;85,7	82,2	71,7;90,0
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	12,0	9,5;14,5	10,5**	4,9;19,2
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	5,3*	3,4;7,7	7,3**	2,3;16,6
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	77,2	73,6;80,8	82,4	70,3;91,1
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	11,4	9,0;14,3	9,3**	3,2;20,0
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	11,3	8,7;14,4	8,3**	2,7;18,5
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	82,1	77,8;85,9	86,8	73,1;95,1
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	12,5	9,1;16,5	6,6**	1,6;17,0
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	5,4*	3,3;8,4	6,6**	1,2;19,2
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	61,8	57,1;66,6	56,7	41,7;70,9
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	17,2	13,8;21,0	20,4**	10,5;34,0
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	21,0	16,9;25,0	22,9**	12,5;36,3
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	40,0	36,2;43,9	39,3*	27,6;52,0
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	18,9	15,8;22,4	17,1**	8,0;30,3
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	13,1	10,4;16,2	18,1*	10,3;28,3
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	11,0	8,4;14,0	8,1**	3,2;16,3
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	17,0	13,8;20,5	17,4**	9,2;28,7
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	74,2	67,4;80,2	80,4	58,7;93,9
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	16,4*	11,5;22,4	12,7**	2,5;33,7
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	9,3*	5,7;14,2	6,9**	0,7;23,7
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	11,6	9,1;14,5	9,4**	3,7;19,0
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	88,4	85,5;90,9	90,6	81,0;96,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
92,2	75,2;99,0	84,6	75,6;91,3	81,5	66,9;91,6	85,2	78,7;90,4	72,0	52,7;86,8	79,0	59,9;91,8	80,6	71,5;87,8	Oui, tout à fait
7,8**	1,0;24,8	12,0**	6,0;20,9	13,9**	5,3;27,8	13,5*	8,8;19,3	22,5**	9,6;40,9	11,6**	2,8;29,0	7,9**	3,7;14,4	Oui, en partie
-	;	3,3**	0,7;9,1	4,6**	0,7;14,7	1,3**	0,0;6,9	5,5**	0,5;20,3	9,4**	2,1;24,7	11,5**	5,7;20,0	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
87,4	66,4;97,6	83,3	74,1;90,3	79,6	64,5;90,4	78,4	71,5;84,4	46,2*	28,4;64,7	85,2	68,3;95,1	71,5	61,5;80,1	Oui, tout à fait
8,3**	0,9;27,9	6,6**	2,5;13,8	9,9**	3,1;22,1	13,9*	9,2;19,8	29,9**	15,2;48,4	2,5**	0,1;13,7	11,1**	6,0;18,4	Oui, en partie
4,2**	0,1;21,4	10,1**	4,6;18,4	10,5**	3,5;22,9	7,7**	3,9;13,4	23,9**	10,7;42,2	12,3**	3,3;29,2	17,4*	10,5;26,4	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
81,7	54,0;96,4	85,1	72,6;93,4	87,7	70,5;96,8	73,6	64,4;81,5	94,8	72,9;99,9	95,1	72,6;99,9	79,8	66,6;89,6	Oui
11,7**	1,4;36,6	13,0**	5,4;25,0	9,7**	2,1;25,7	17,8*	10,9;26,7	5,2**	0,1;27,1	-	;	15,5**	7,0;28,2	Non, il ne voulait pas
6,6**	0,2;32,1	1,9**	0,0;10,0	2,6**	0,0;14,9	8,6**	4,0;15,6	-	;	4,9**	0,1;27,4	4,7**	0,9;13,4	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
70,2*	42,4;90,1	57,4	45,2;69,7	66,9	47,5;82,9	62,5	54,8;70,3	51,1*	28,5;73,4	65,1*	42,2;83,8	66,5	54,7;77,0	Oui, tout à fait
23,7**	6,4;51,2	13,3**	6,4;23,7	11,0**	2,4;28,7	17,7*	12,1;24,5	23,2**	8,1;45,9	15,8**	4,5;35,7	16,6*	9,3;26,4	Oui, en partie
6,1**	0,1;30,0	29,2*	18,7;41,7	22,1**	9,3;40,5	19,8*	13,5;27,4	25,7**	9,7;48,4	19,1**	6,0;40,4	16,9**	9,0;27,8	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
29,2**	11,4;53,4	39,6	29,6;49,6	52,3	36,4;67,9	52,0	44,9;59,0	25,7**	11,4;45,1	29,6**	14,1;49,5	27,0*	18,5;37,0	Oui, une infirmière pivot en oncologie
21,1**	7,0;43,2	16,9*	9,9;26,3	17,6**	7,5;32,8	22,7	17,1;29,2	8,9**	1,8;24,2	14,6**	4,5;32,4	20,1*	13,0;29,0	Oui, un autre professionnel de la santé
20,7**	6,7;42,9	14,5*	8,3;22,9	14,0**	5,8;26,8	6,9**	3,8;11,5	23,0**	9,7;41,9	18,9**	6,2;39,2	11,9**	6,1;20,1	Oui, un membre du personnel administratif
12,0**	2,4;31,8	10,3**	4,8;18,6	7,9**	1,7;21,3	9,0*	5,3;14,2	11,7**	2,3;31,5	15,1**	4,6;33,4	15,8**	8,7;25,4	Oui, un médecin
17,0**	4,3;39,8	18,7*	11,1;28,5	8,1**	2,4;19,0	9,4**	5,2;15,3	30,7**	14,6;51,0	21,8**	8,7;41,0	25,2*	16,5;35,6	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
82,8*	29,6;99,8	70,5	53,9;83,8	74,9*	45,2;93,6	66,4	53,8;77,6	45,2**	10,4;84,1	62,8*	34,2;86,0	95,1	83,1;99,4	Oui, tout à fait
17,2**	0,2;70,4	22,2**	10,6;38,2	6,2**	0,1;33,4	23,5*	13,7;35,8	21,4**	2,1;61,5	30,9**	10,3;59,3	-	;	Oui, en partie
-	;	7,3**	1,6;19,8	18,9**	3,9;46,4	10,1**	4,0;20,2	33,3**	3,9;79,0	6,3**	0,1;31,8	4,9**	0,6;16,9	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]
11,6**	2,4;30,5	14,8*	8,3;23,7	21,4**	10,3;36,8	14,0*	9,6;19,5	10,7**	2,5;27,1	2,9**	0,0;17,2	5,9**	2,3;12,0	Oui
88,4	69,5;97,6	85,2	76,3;91,7	78,6	63,2;89,7	86,0	80,5;90,4	89,3	72,9;97,5	97,1	82,8;100,0	94,1	88,0;97,7	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	81,6	79,2;84,1	98,8	93,3;100,0
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	18,4	15,9;20,8	1,2**	0,0;6,7
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	34,9	31,0;38,8	3,9**	0,8;11,1
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	65,1	61,2;69,0	96,1	88,9;99,2
Lieu de la chirurgie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	78,7	74,9;82,5	83,5	72,7;91,4
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	21,3	17,5;25,1	16,5**	8,6;27,3
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	66,2	60,2;72,2	57,4	39,4;74,1
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	11,0*	7,5;15,5	16,2**	5,8;32,9
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	22,8	17,9;27,7	26,4**	13,6;43,0
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	73,4	69,4;77,5	69,8	58,3;79,8
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	10,1	7,5;13,2	11,5**	5,3;21,0
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	16,5	13,1;20,4	18,6*	10,3;29,7
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	96,6	94,4;98,1	94,8	85,5;99,0
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	3,4**	1,9;5,6	5,2**	1,0;14,5
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	92,2	89,1;94,6	90,3	81,0;96,0
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	7,3*	4,9;10,3	9,7**	4,0;19,0
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	0,6**	0,1;1,7	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7 *	4,0;7,9	5,7 *	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
92,5	74,3;99,2	57,3	49,3;65,2	22,9**	11,9;37,6	95,2	90,8;97,9	70,2	51,9;84,7	71,8	54,5;85,4	95,5	90,2;98,4	Oui
7,5**	0,8;25,7	42,7	34,8;50,7	77,1	62,4;88,1	4,8**	2,1;9,2	29,8**	15,3;48,1	28,2**	14,6;45,5	4,5**	1,6;9,8	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
10,2**	1,1;33,9	4,3**	0,5;14,9	67,0*	28,5;93,4	58,7	51,3;66,1	27,1**	10,2;50,8	14,3**	1,9;42,3	43,4	32,5;54,2	Oui
89,8	66,1;98,9	95,7	85,1;99,5	33,0**	6,6;71,5	41,3	33,9;48,7	72,9	49,2;89,8	85,7	57,7;98,1	56,6	45,8;67,5	Non
														Lieu de la chirurgie[p, r]
64,2*	41,4;83,1	79,1	66,1;88,9	62,3**	26,6;90,1	87,1	81,5;91,6	50,3*	27,4;73,1	65,7*	42,9;84,3	76,0	66,5;83,9	Hôpital de la région de résidence
35,8**	16,9;58,6	20,9**	11,1;33,9	37,7**	9,9;73,4	12,9*	8,4;18,5	49,7*	26,9;72,6	34,3**	15,7;57,1	24,0*	16,1;33,5	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
61,9**	26,7;89,6	55,3*	34,4;75,0	60,8**	24,8;89,6	69,8	61,0;78,7	59,9*	33,4;82,7	75,0*	44,1;94,0	73,8	60,3;84,6	Oui, tout à fait
15,4**	1,8;46,2	10,9**	2,5;27,9	10,1**	0,2;47,7	10,0**	4,9;17,6	10,4**	1,0;34,8	-	;	11,0**	4,0;22,7	Oui, en partie
22,7**	2,8;61,2	33,8**	17,1;54,1	29,2**	5,8;65,8	20,1*	13,0;29,0	29,7**	10,4;56,4	25,0**	6,0;55,9	15,2**	6,9;27,5	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
59,6*	36,5;79,9	86,4	73,4;94,6	73,7*	39,2;94,6	74,7	67,6;80,9	72,5	48,2;89,8	70,7	47,0;88,3	71,8	61,1;81,0	Oui, tout à fait
19,9**	7,0;39,9	9,7**	3,2;21,3	-	;	7,1**	3,8;12,0	8,9**	1,2;27,7	7,8**	0,8;26,8	13,6**	7,1;22,9	Oui, en partie
20,6**	5,9;44,7	3,9**	0,4;13,9	26,3**	5,4;60,8	18,2*	12,7;24,8	18,6**	4,9;42,2	21,5**	6,9;44,5	14,5**	7,6;24,3	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
90,0	65,9;99,0	100,0	;	100,0	;	96,3	92,3;98,6	92,0	73,0;99,1	100,0	;	98,1	92,7;99,8	Oui
10,0**	1,0;34,1	-	;	-	;	3,7**	1,4;7,7	8,0**	0,9;27,0	-	;	1,9**	0,2;7,3	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
95,1	75,2;99,9	91,8	80,0;97,8	100,0	;	93,9	88,9;97,1	84,4	58,8;97,1	96,0	78,5;99,9	90,3	81,0;96,0	Oui, tout à fait
4,9**	0,1;24,8	8,2**	2,2;20,0	-	;	5,6**	2,5;10,4	15,6**	2,9;41,2	4,0**	0,1;21,5	7,9**	2,8;16,9	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	0,5**	0,0;3,0	-	;	-	;	1,8**	0,2;7,0	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	41,4	39,1;43,8	54,1	43,5;64,8
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	58,6	56,2;60,9	45,9	35,2;56,5
Lieu de la chimiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	79,2	74,0;84,4	72,2	55,2;85,5
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	20,8	15,6;26,0	27,8**	14,5;44,8
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	54,9	48,6;61,2	44,6*	28,1;62,0
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	22,0	17,0;27,0	30,0*	16,4;46,7
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	23,1	17,8;28,4	25,4**	13,0;41,7
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	68,7	61,2;76,2	59,3*	39,6;77,0
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	14,1*	8,9;20,8	19,3**	7,2;37,8
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	17,3*	11,8;24,0	21,4**	8,4;40,6
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	59,0	52,7;65,3	53,0*	36,1;69,4
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	31,8	25,8;37,9	37,7*	22,4;55,0
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	9,2*	5,9;13,5	9,3**	2,6;22,4
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	88,8	84,2;92,5	90,6	77,6;97,4
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	10,0*	6,6;14,4	9,4**	2,6;22,4
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	1,2**	0,2;3,5	-	;
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	89,3	84,6;93,0	87,7	73,9;95,8
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	9,1*	5,7;13,5	12,3**	4,2;26,1
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	1,6**	0,4;4,0	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
39,7**	20,4;61,7	-	;	91,4	79,5;97,6	54,8	48,6;61,1	37,8*	21,6;56,3	44,0*	27,1;62,0	26,4*	18,7;35,4	Oui
60,3*	38,3;79,6	100,0	;	8,6**	2,4;20,5	45,2	38,9;51,4	62,2	43,7;78,4	56,0*	38,0;72,9	73,6	64,6;81,3	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p]
51,3**	15,1;86,5	-	;	72,9	55,5;86,4	87,1	79,1;92,8	59,6*	27,3;86,6	81,5	51,3;96,9	88,6	70,1;97,6	Hôpital de la région de résidence
48,7**	13,5;84,9	-	;	27,1**	13,6;44,5	12,9**	7,2;20,9	40,4**	13,4;72,7	18,5**	3,1;48,7	11,4**	2,4;29,9	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
36,2**	6,9;76,6	-	;	46,5*	29,9;63,7	62,6	53,4;71,8	67,2*	34,6;90,8	52,4**	22,7;80,9	57,0*	32,3;79,4	Moins de 30 minutes
-	;	-	;	21,2**	9,3;38,3	25,3*	17,3;34,7	-	;	5,9**	0,1;32,5	24,2**	9,0;46,5	De 30 à 60 minutes
63,8**	23,4;93,1	-	;	32,3*	17,3;50,5	12,1**	6,6;19,7	32,8**	9,2;65,4	41,7**	15,3;72,2	18,7**	4,5;43,9	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
59,9**	11,6;96,2	-	;	70,9	50,0;86,9	73,2	61,1;83,1	54,7**	10,7;93,5	67,8*	29,0;93,8	77,0*	42,2;96,2	Oui, tout à fait
20,1**	0,2;76,8	-	;	7,5**	0,9;24,8	11,8**	4,9;22,8	31,8**	2,1;82,6	22,2**	2,6;61,0	8,2**	0,1;41,9	Oui, en partie
20,0**	0,3;76,3	-	;	21,6**	8,2;41,6	15,0**	7,7;25,4	13,5**	0,1;64,0	10,1**	0,2;46,0	14,8**	1,1;49,3	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
80,1*	39,0;98,4	-	;	40,7*	23,3;60,0	53,7	44,1;63,2	92,4	63,2;99,8	82,1	54,1;96,6	76,8	55,5;91,3	Moins de 30 minutes
19,9**	1,6;61,0	-	;	56,5*	37,7;74,0	33,1	24,0;42,3	7,6**	0,2;36,8	12,4**	1,2;40,9	10,9**	2,2;29,0	De 30 à 60 minutes
-	;	-	;	2,8**	0,1;14,9	13,2**	7,2;21,6	-	;	5,5**	0,1;29,2	12,3**	2,2;33,7	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
69,4*	32,0;93,9	-	;	84,0	68,1;94,0	89,5	81,8;94,8	84,3	51,4;98,4	100,0	;	92,8	76,4;99,1	Oui, tout à fait
30,6**	6,1;68,0	-	;	10,8**	3,1;25,1	9,6**	4,6;17,0	15,7**	1,6;48,6	-	;	7,2**	0,9;23,6	Oui, en partie
-	;	-	;	5,2**	0,5;18,5	0,9**	0,0;5,1	-	;	-	;	-	;	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
100,0	;	-	;	82,9	67,6;93,0	94,2	88,2;97,8	85,7	54,3;98,6	87,4	59,5;98,7	82,9	60,9;95,4	Oui, tout à fait
-	;	-	;	17,1**	7,0;32,4	4,8**	1,6;10,5	7,3**	0,1;35,8	12,6**	1,3;40,5	9,0**	1,2;28,5	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	1,0**	0,0;5,2	7,1**	0,1;37,9	-	;	8,0**	0,8;27,9	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	50,6	48,0;53,1	24,9*	15,9;35,8
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	49,4	46,9;52,0	75,1	64,2;84,1
Lieu de la radiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	55,0	49,5;60,4	39,5**	19,0;63,1
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	45,0	39,6;50,5	60,5*	36,9;81,0
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	31,9	26,6;37,1	23,7**	6,6;51,1
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	19,0	14,6;24,1	26,5**	8,6;52,8
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	49,1	43,2;55,0	49,8*	25,1;74,5
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	63,7	57,6;69,8	43,3**	17,8;71,7
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	16,7	12,3;21,9	25,7**	7,2;54,2
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	19,6	14,4;25,6	31,0**	10,0;60,1
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	77,6	73,0;82,2	88,4	63,3;98,7
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	13,7	10,0;18,1	6,4**	0,2;30,1
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	8,7*	5,7;12,6	5,2**	0,1;27,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
34,8**	17,4;55,8	56,7	49,0;64,4	30,5*	17,1;46,8	84,5	78,4;89,4	81,7	64,8;92,8	30,8*	16,7;48,1	20,7*	13,9;29,0	Oui
65,2	44,2;82,6	43,3	35,6;51,0	69,5	53,2;82,9	15,5*	10,6;21,6	18,3**	7,2;35,2	69,2	51,9;83,3	79,3	71,0;86,1	Non
														Lieu de la radiothérapie[p]
45,5**	12,7;81,6	60,4	46,3;73,4	57,7*	27,0;84,6	50,3	42,6;57,9	65,7	44,6;83,0	73,2*	37,0;95,0	66,0	43,9;84,0	Hôpital de la région de résidence
54,5**	18,4;87,3	39,6*	26,6;53,7	42,3**	15,4;73,0	49,7	42,1;57,4	34,3**	17,0;55,4	26,8**	5,0;63,0	34,0**	16,0;56,1	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
12,3**	0,2;56,9	23,1*	13,2;35,9	27,8**	7,3;59,0	31,9	24,9;38,9	42,1*	23,2;62,9	60,6**	25,0;89,3	40,5**	18,6;65,6	Moins de 30 minutes
45,5**	10,0;85,0	30,4*	18,7;44,2	20,5**	3,8;51,5	13,6*	8,6;20,1	20,2**	6,8;41,3	18,9**	1,7;57,0	12,2**	2,1;33,8	De 30 à 60 minutes
42,1**	8,7;82,4	46,5	33,0;60,0	51,7**	21,7;80,8	54,5	46,6;62,5	37,7*	20,0;58,1	20,6**	1,9;60,5	47,3*	24,9;70,5	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
79,4**	21,2;99,8	56,7	41,1;71,3	46,2**	14,1;81,0	66,7	58,0;75,3	75,7	48,9;93,0	74,7*	32,5;97,2	66,0*	41,0;85,9	Oui, tout à fait
-	;	24,2**	12,6;39,5	32,6**	6,5;71,0	14,9*	9,0;22,7	14,4**	2,3;40,2	-	;	9,9**	0,9;34,0	Oui, en partie
20,6**	0,2;78,8	19,1**	8,4;34,8	21,1**	2,5;59,0	18,4*	11,7;26,9	9,8**	1,2;31,3	25,3**	2,8;67,5	24,0**	7,5;49,5	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
78,7*	37,1;98,2	66,5	51,8;79,3	76,2*	44,5;94,9	79,4	72,2;85,5	72,4	49,3;89,1	79,7*	44,1;97,4	86,4	64,4;97,3	Oui, tout à fait
21,3**	1,8;62,9	21,0**	10,5;35,4	16,3**	2,0;47,9	11,2*	6,7;17,2	24,4**	9,0;46,7	9,0**	0,2;42,8	4,2**	0,1;23,2	Oui, en partie
-	;	12,5**	4,8;25,0	7,5**	0,1;37,9	9,4**	5,3;15,2	3,3**	0,0;18,7	11,2**	0,4;46,0	9,3**	1,2;29,3	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Douleur et malaises ressentis[p, r]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	57,1	53,1;61,0	74,0	61,5;84,1
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	42,9	39,0;46,9	26,0*	15,9;38,5
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	29,4	24,4;34,4	22,9*	12,8;35,9
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	44,6	39,0;50,2	56,3	43,4;69,2
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	26,0	21,4;30,6	20,8**	11,0;34,0
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	83,4	78,8;87,3	81,4	67,9;90,9
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	13,9	10,3;18,2	13,1**	5,2;25,9
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	2,7**	1,0;5,6	5,5**	1,1;15,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p, r]
66,4*	42,0;85,7	36,9	27,2;46,6	72,3	56,5;84,9	60,4	53,6;67,3	68,6	49,9;83,7	49,3*	28,9;69,8	45,8	35,9;55,7	Oui
33,6**	14,3;58,0	63,1	53,4;72,8	27,7*	15,1;43,5	39,6	32,7;46,4	31,4**	16,3;50,1	50,7*	30,2;71,1	54,2	44,3;64,1	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
20,3**	4,5;48,5	19,8**	8,2;36,9	25,8**	11,3;45,5	33,9	25,3;42,6	46,0*	24,2;68,9	54,3*	26,8;80,1	23,5**	11,6;39,5	Sévères
53,7*	26,3;79,5	32,9**	17,5;51,6	56,9*	37,7;74,7	39,6	30,4;48,9	38,4**	18,3;62,0	25,4**	7,1;53,8	47,0*	31,5;62,9	Modérés
26,0**	6,9;55,6	47,3*	29,7;65,4	17,3**	5,8;36,2	26,4*	18,6;35,5	15,6**	3,4;39,1	20,3**	4,1;49,7	29,5*	16,7;45,2	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
81,2	52,9;96,3	80,3	62,7;92,0	78,3	59,4;91,2	93,6	87,0;97,4	75,1	52,2;90,9	87,6	59,6;98,8	73,4	57,2;86,0	Oui, tout à fait
18,8**	3,7;47,1	16,9**	6,5;33,3	21,7**	8,8;40,6	6,4**	2,6;13,0	24,9**	9,1;47,8	6,0**	0,1;32,2	18,8**	9,0;32,8	Oui, en partie
-	;	2,8**	0,0;16,9	-	;	-	;	-	;	6,3**	0,2;30,6	7,7**	1,5;21,6	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	91,3	88,3;93,7	95,4	86,4;99,2
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	5,5*	3,6;7,8	3,1**	0,3;11,3
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	3,2**	1,7;5,5	1,5**	0,0;8,2
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	7,3	5,3;9,7	4,9**	1,3;12,2
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	92,7	90,3;94,7	95,1	87,8;98,7
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	75,2	71,4;78,9	77,9	66,9;86,6
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	23,3	19,6;27,0	22,1*	13,4;33,1
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	1,5**	0,7;2,8	-	;
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	72,6	69,1;76,1	74,1	61,7;84,2
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	27,4	23,9;30,9	25,9*	15,8;38,3
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p, r]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	39,8	36,2;43,5	31,8*	20,7;44,7
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	16,0	13,1;18,9	13,7**	6,3;24,7
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	44,2	40,5;47,8	54,6	42,5;66,6
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	81,2	76,9;85,1	86,3	73,3;94,6
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	14,4	11,0;18,5	10,8**	3,5;23,7
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	4,3*	2,7;6,6	2,9**	0,4;10,1
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	68,5	63,4;73,5	74,9	60,0;86,4
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	31,5	26,5;36,6	25,1**	13,6;40,0
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	90,0	87,2;92,3	92,6	84,3;97,3
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	9,5	7,2;12,2	7,4**	2,7;15,7
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	0,5**	0,1;1,5	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
93,4	68,1;99,8	81,2	68,1;90,5	94,9	82,0;99,5	93,5	88,3;96,9	96,9	83,9;99,9	95,5	77,4;99,9	84,7	72,4;93,0	Oui, tout à fait
6,6**	0,2;31,9	11,7**	4,6;23,3	5,1**	0,5;18,0	5,0**	2,2;9,5	3,1**	0,1;16,1	4,5**	0,1;22,6	4,9**	0,9;14,3	Oui, en partie
-	;	7,1**	1,9;17,4	-	;	1,5**	0,2;5,1	-	;	-	;	10,4**	3,8;21,6	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
-	;	5,3**	1,7;12,0	12,8**	4,2;27,9	8,5*	4,9;13,4	13,4**	4,2;29,4	9,6**	1,8;26,5	5,4**	2,0;11,5	Oui
100,0	;	94,7	88,0;98,3	87,2	72,1;95,8	91,5	86,6;95,1	86,6	70,6;95,8	90,4	73,5;98,2	94,6	88,5;98,0	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
63,3*	40,9;82,2	76,9	66,1;85,7	63,6	47,7;77,6	76,9	70,2;82,8	61,4	42,2;78,3	84,5	66,7;95,1	78,6	68,1;87,0	Oui, toujours
36,7**	17,8;59,1	20,9*	12,5;31,4	34,3*	20,5;50,3	21,5	15,7;28,2	35,9*	19,6;54,9	15,5**	4,9;33,3	19,3*	11,4;29,6	Oui, la plupart du temps
-	;	2,2**	0,3;7,8	2,1**	0,0;11,2	1,6**	0,4;4,4	2,7**	0,1;14,6	-	;	2,0**	0,2;7,2	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
67,6*	42,7;86,9	65,1	55,4;74,8	86,5	73,7;94,6	88,6	82,6;93,1	67,9	49,2;83,2	62,5*	41,0;80,9	52,4	42,4;62,5	Oui
32,4**	13,1;57,3	34,9	25,2;44,6	13,5**	5,4;26,3	11,4*	6,9;17,4	32,1**	16,8;50,8	37,5**	19,1;59,0	47,6	37,5;57,6	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p, r]
20,4**	6,6;42,2	26,9*	18,6;36,5	58,2	42,2;73,0	58,6	51,4;65,8	53,8*	34,8;72,1	19,1**	7,2;37,4	24,4*	16,0;34,6	Oui
17,7**	4,7;40,2	13,7**	7,4;22,4	26,2*	14,3;41,3	13,8*	9,2;19,6	16,4**	6,2;32,6	24,5**	10,4;44,2	16,0*	9,1;25,3	Non, mais il aurait aimé l'être
62,0*	39,2;81,4	59,5	49,9;69,0	15,7**	6,2;30,4	27,6	21,3;34,7	29,8**	15,1;48,3	56,4*	37,3;74,2	59,6	49,5;69,6	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
88,1	62,6;98,6	85,9	73,8;93,8	69,8	52,0;84,0	80,8	72,4;87,5	79,9	59,2;93,1	73,4	51,0;89,4	82,2	70,7;90,5	Oui, tout à fait
11,9**	1,4;37,4	12,5**	5,2;24,0	25,7**	12,5;43,3	13,7*	8,0;21,4	6,9**	0,8;23,4	22,6**	7,9;45,0	14,4**	6,8;25,8	Oui, en partie
-	;	1,7**	0,0;8,9	4,5**	0,6;14,5	5,6**	2,3;11,0	13,2**	2,8;34,1	4,0**	0,1;18,7	3,4**	0,7;10,0	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
86,6	59,9;98,3	64,3	47,6;78,8	77,4	58,0;90,8	61,6	52,4;70,8	66,6*	38,3;88,2	78,7	53,5;94,0	66,2	50,4;79,7	Oui
13,4**	1,7;40,1	35,7*	21,2;52,4	22,6**	9,2;42,0	38,4	29,2;47,6	33,4**	11,8;61,7	21,3**	6,0;46,5	33,8*	20,3;49,6	Non
														Patient traité de manière respectueuse
96,5	81,9;99,9	91,4	83,4;96,3	89,2	76,5;96,4	91,1	85,7;94,9	63,7	44,3;80,4	92,7	73,3;99,4	91,8	83,8;96,7	Oui, toujours
3,5**	0,1;18,1	7,5**	3,0;15,0	10,8**	3,6;23,5	8,9*	5,1;14,3	36,3*	19,6;55,7	7,3**	0,6;26,7	6,3**	2,1;13,9	Oui, la plupart du temps
-	;	1,1**	0,0;5,8	-	;	-	;	-	;	-	;	1,9**	0,2;6,8	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	1,1**	0,4;2,4	-	;
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	6,1*	4,2;8,6	8,9**	2,5;21,0
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	1,1**	0,4;2,3	-	;
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	91,7	89,1;93,8	91,1	79,0;97,5
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	76,7	73,1;80,3	68,9	55,7;80,1
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	20,0	16,6;23,5	30,0*	19,0;43,0
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	3,3*	2,0;5,1	1,1**	0,0;6,4
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	91,3	88,6;93,6	87,2	75,8;94,5
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	8,2	6,0;10,9	12,8**	5,5;24,2
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	0,5**	0,1;1,4	-	;
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	76,5	71,1;81,8	88,9	72,8;97,2
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	23,5	18,2;28,9	11,1**	2,8;27,2
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	3,0*	1,8;4,8	5,0**	1,3;12,6
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	97,0	95,2;98,2	95,0	87,4;98,7
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	78,2	74,2;82,2	85,5	72,2;94,0
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	9,2*	6,6;12,5	-	;
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	12,6	9,6;16,1	14,5**	6,0;27,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
-	;	1,3**	0,0;7,0	2,7**	0,1;13,8	0,5**	0,0;2,7	2,9**	0,1;15,5	3,0**	0,0;17,5	1,1**	0,0;6,5	Oui, souvent
4,5**	0,2;21,1	4,3**	1,2;10,9	4,3**	0,5;14,5	7,2**	4,0;11,9	2,9**	0,1;15,9	3,0**	0,1;15,8	7,2**	2,1;16,7	Oui, parfois
-	;	1,0**	0,0;5,5	2,7**	0,1;14,5	2,3**	0,6;5,8	-	;	-	;	-	;	Oui, une seule fois
95,5	78,9;99,8	93,3	86,0;97,5	90,4	78,3;97,0	90,0	84,7;93,9	94,3	80,1;99,4	94,1	78,8;99,4	91,7	82,1;97,1	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
68,7	45,9;86,4	84,4	75,1;91,2	69,3	53,2;82,6	81,4	75,1;86,7	73,0	53,8;87,4	69,0	47,9;85,5	76,4	66,1;84,8	Oui, toujours
27,3**	10,6;50,6	10,8**	5,3;19,1	28,8*	16,0;44,7	15,7*	10,7;21,7	23,9**	10,0;43,5	31,0**	14,5;52,1	18,0*	10,4;28,1	Oui, la plupart du temps
4,0**	0,1;21,6	4,8**	1,2;12,2	1,9**	0,0;10,1	2,9**	0,9;6,8	3,2**	0,1;16,9	-	;	5,6**	1,9;12,2	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
91,8	72,6;99,1	96,6	90,2;99,3	76,1	60,2;88,0	93,0	87,9;96,4	96,8	83,1;99,9	87,6	70,1;96,8	92,9	85,7;97,2	Oui, toujours
8,2**	0,9;27,4	3,4**	0,7;9,8	23,9**	12,0;39,8	7,0**	3,6;12,1	3,2**	0,1;16,9	9,2**	1,7;26,0	5,3**	1,8;11,9	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	3,2**	0,1;17,1	1,7**	0,2;5,8	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]
84,1*	30,9;99,8	66,3	46,7;82,5	75,6	51,5;91,7	78,3	68,0;86,5	81,5	52,1;96,7	67,3*	35,0;90,7	71,0	53,6;84,8	Oui
15,9**	0,2;69,1	33,7**	17,5;53,3	24,4**	8,3;48,5	21,7*	13,5;32,0	18,5**	3,3;47,9	32,7**	9,3;65,0	29,0**	15,2;46,4	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
-	;	2,2**	0,2;7,8	6,8**	1,2;19,6	3,4**	1,2;7,5	-	;	3,0**	0,1;14,9	1,8**	0,2;6,5	Oui
100,0	;	97,8	92,2;99,8	93,2	80,4;98,8	96,6	92,5;98,8	100,0	;	97,0	85,1;99,9	98,2	93,5;99,8	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
100,0	;	74,3	61,5;84,6	80,1	63,0;91,6	81,7	74,3;87,7	54,7*	31,7;76,3	57,2*	32,9;79,1	76,9	64,0;87,0	Oui, tout à fait
-	;	8,3**	2,9;17,8	12,9**	3,7;29,7	9,8*	5,5;15,7	23,8**	8,4;46,9	20,7**	5,8;45,4	8,3**	2,5;19,3	Oui, en partie
-	;	17,4**	9,1;29,0	7,0**	0,9;22,7	8,5**	4,4;14,6	21,5**	6,8;44,6	22,1**	5,8;49,1	14,8**	7,2;25,6	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	82,1	78,7;85,1	86,4	76,1;93,5
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	17,9	14,9;21,3	13,6**	6,5;23,9
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	16,2	13,2;19,6	10,0**	4,1;19,7
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	83,8	80,4;86,8	90,0	80,3;95,9
Médecin spécialiste[p]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	16,2	13,3;19,5	11,2**	5,1;20,4
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	83,8	80,5;86,7	88,8	79,6;94,9
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	31,5	27,8;35,2	34,4*	22,7;47,7
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	68,5	64,8;72,2	65,6	52,3;77,3
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	12,3	9,6;15,4	17,6*	9,9;27,9
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	87,7	84,6;90,4	82,4	72,1;90,1
CLSC[p]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	20,0	16,7;23,3	17,8*	10,0;28,2
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	80,0	76,7;83,3	82,2	71,8;90,0
Urgence d'un hôpital[p, r]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	25,8	22,1;29,5	42,8	30,9;54,6
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	74,2	70,5;77,9	57,2	45,4;69,1
Unité de soins d'un hôpital[p]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	7,4*	5,3;10,0	5,4**	1,5;13,2
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	92,6	90,0;94,7	94,6	86,8;98,5
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	1,5**	0,7;2,8	1,1**	0,0;5,7
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	98,5	97,2;99,3	98,9	94,3;100,0
Autre contact[r]													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	0,9**	0,3;2,0	-	;
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	99,1	98,0;99,7	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7 *	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]
92,2	73,0;99,2	77,5	66,6;86,3	85,7	71,6;94,5	84,7	78,4;89,8	74,1	53,5;89,0	81,8	61,0;94,3	77,1	66,2;85,9	Oui
7,8**	0,8;27,0	22,5*	13,7;33,4	14,3**	5,5;28,4	15,3*	10,2;21,6	25,9**	11,0;46,5	18,2**	5,7;39,0	22,9*	14,1;33,8	Non
														Médecin de famille[p]
26,6**	10,2;49,7	21,9*	14,1;31,5	8,4**	2,1;21,0	16,6*	11,3;23,0	6,3**	0,7;22,0	21,3**	6,8;44,2	17,5**	9,4;28,4	Oui
73,4	50,3;89,8	78,1	68,5;85,9	91,6	79,0;97,9	83,4	77,0;88,7	93,7	78,0;99,3	78,7	55,8;93,2	82,5	71,6;90,6	Non
														Médecin spécialiste[p]
13,6**	2,7;35,8	22,8*	14,7;32,7	12,3**	3,9;27,3	19,5*	13,8;26,2	14,1**	3,5;33,9	13,6**	3,6;32,3	12,6**	6,7;21,0	Oui
86,4	64,2;97,3	77,2	67,3;85,3	87,7	72,7;96,1	80,5	73,8;86,2	85,9	66,1;96,5	86,4	67,7;96,4	87,4	79,0;93,3	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
20,9**	7,1;42,6	12,2**	6,2;20,9	47,1*	30,7;64,0	48,1	40,9;55,2	25,7**	10,7;46,6	26,5**	12,0;45,9	17,7*	10,7;26,7	Oui
79,1	57,4;92,9	87,8	79,1;93,8	52,9*	36,0;69,3	51,9	44,8;59,1	74,3	53,4;89,3	73,5	54,1;88,0	82,3	73,3;89,3	Non
														Info-Santé[p]
19,9**	5,2;44,9	8,7**	3,8;16,3	5,9**	0,7;20,1	11,5*	7,4;16,8	4,0**	0,1;20,1	13,5**	3,7;31,6	15,5**	7,9;26,1	Oui
80,1	55,1;94,8	91,3	83,7;96,2	94,1	79,9;99,3	88,5	83,2;92,6	96,0	79,9;99,9	86,5	68,4;96,3	84,5	73,9;92,1	Non
														CLSC[p]
38,5**	18,8;61,4	21,6*	13,5;31,8	22,1**	10,8;37,6	19,9*	14,0;26,8	29,6**	14,1;49,6	3,0**	0,1;16,1	17,5*	10,2;27,0	Oui
61,5*	38,6;81,2	78,4	68,2;86,5	77,9	62,4;89,2	80,1	73,2;86,0	70,4	50,4;85,9	97,0	83,9;99,9	82,5	73,0;89,8	Non
														Urgence d'un hôpital[p, r]
20,5**	6,3;43,5	19,2*	11,4;29,2	37,7*	22,4;55,0	27,4	21,0;34,4	13,6**	3,6;32,3	13,1**	3,3;31,6	20,1*	12,2;30,1	Oui
79,5	56,5;93,7	80,8	70,8;88,6	62,3	45,0;77,6	72,6	65,6;79,0	86,4	67,7;96,4	86,9	68,4;96,7	79,9	69,9;87,8	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p]
3,7**	0,1;19,3	5,7**	1,8;13,1	7,2**	1,6;18,9	8,1**	4,5;13,1	-	;	10,6**	2,4;27,4	11,0**	5,4;19,3	Oui
96,3	80,7;99,9	94,3	86,9;98,2	92,8	81,1;98,4	91,9	86,9;95,5	100,0	;	89,4	72,6;97,6	89,0	80,7;94,6	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
-	;	1,1**	0,0;6,2	-	;	2,6**	0,8;6,1	-	;	-	;	2,0**	0,2;7,1	Oui
100,0	;	98,9	93,8;100,0	100,0	;	97,4	93,9;99,2	100,0	;	100,0	;	98,0	92,9;99,8	Non
														Autre contact[r]
4,2**	0,1;22,9	-	;	2,3**	0,0;13,0	0,5**	0,0;2,9	3,2**	0,1;17,1	-	;	1,1**	0,0;5,6	Oui
95,8	77,1;99,9	100,0	;	97,7	87,0;100,0	99,5	97,1;100,0	96,8	82,9;99,9	100,0	;	98,9	94,4;100,0	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	72,3	68,2;76,3	72,1	58,0;83,6
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	11,1	8,4;14,2	12,3**	5,0;24,1
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	16,6	13,3;20,4	15,6**	7,3;27,6
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	52,6	47,8;57,3	48,3	33,9;62,9
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	15,5	12,3;19,1	21,5**	11,5;34,7
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	31,9	27,6;36,2	30,2*	17,7;45,4
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	54,5	49,8;59,3	59,8	46,8;72,8
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	19,0	15,5;23,0	19,0**	9,7;32,0
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	26,5	22,3;30,6	21,2**	11,6;33,7
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	51,0	46,1;55,9	47,0*	31,2;63,2
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	16,2	12,7;20,1	24,9**	12,7;41,0
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	32,8	28,2;37,5	28,1*	15,7;43,6
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	66,6	62,5;70,7	75,8	63,2;85,8
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	14,4	11,4;18,0	17,7**	8,8;30,1
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	19,0	15,5;22,8	6,6**	1,8;16,1
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	63,3	58,6;67,9	61,8	47,3;75,0
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	18,6	14,9;22,7	21,2**	11,4;34,2
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	18,1	14,6;22,1	17,0**	8,2;29,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7 *	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
63,5*	28,2;90,4	63,3	48,8;76,2	76,0	60,3;87,8	82,7	75,8;88,4	59,1*	38,3;77,7	76,3	51,5;92,5	61,9	48,9;73,8	Oui, tout à fait
27,0**	4,8;63,8	14,8**	6,9;26,4	14,8**	5,8;29,0	9,7*	5,6;15,3	14,7**	4,3;33,2	9,3**	0,9;31,9	4,9**	1,3;12,6	Oui, en partie
9,5**	0,2;43,4	22,0**	12,0;35,0	9,2**	2,6;21,8	7,6**	3,8;13,1	26,2**	11,8;45,7	14,4**	2,9;37,3	33,1*	21,7;46,2	Non
														La sexualité[p]
69,6*	42,0;89,7	79,4	69,3;87,3	42,9*	23,8;63,8	51,4	42,7;60,2	23,3**	7,6;47,2	45,6**	22,8;69,8	39,2*	26,8;52,7	Oui, tout à fait
18,1**	3,7;45,1	14,6**	7,8;24,2	13,8**	4,2;30,5	15,5*	10,0;22,5	11,4**	2,1;31,2	14,8**	2,9;38,5	13,6**	6,4;24,4	Oui, en partie
12,3**	1,3;39,4	6,0**	2,0;13,4	43,3*	25,3;62,7	33,0	25,1;40,9	65,4*	41,6;84,6	39,7**	17,9;64,9	47,2	34,3;60,2	Non
														Les émotions[p]
54,3*	26,7;80,0	59,4	47,2;71,6	43,9*	27,8;61,0	59,3	51,2;67,4	45,2*	23,3;68,5	59,0*	36,4;79,1	43,7	30,9;56,4	Oui, tout à fait
31,7**	10,1;61,5	18,5**	9,8;30,3	24,3**	12,2;40,4	20,6*	14,5;27,8	12,9**	2,2;35,6	12,2**	2,5;32,1	15,3**	7,2;27,1	Oui, en partie
14,0**	1,2;46,2	22,1*	12,4;34,6	31,8*	17,3;49,5	20,1*	13,9;27,7	42,0**	20,3;66,1	28,8**	11,8;51,8	41,0*	28,5;53,6	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
41,8**	14,6;73,3	65,5	52,6;76,8	40,0*	22,5;59,6	54,3	46,1;62,5	36,9**	15,6;62,8	55,2*	30,2;78,3	41,8*	28,1;55,4	Oui, tout à fait
39,7**	12,3;72,9	16,1**	8,4;26,7	11,1**	2,3;29,1	14,7*	9,4;21,4	8,7**	0,9;30,1	17,0**	3,3;43,4	13,6**	5,7;25,8	Oui, en partie
18,5**	1,7;56,6	18,5*	10,5;29,2	48,9*	30,0;68,0	31,0	23,4;38,6	54,4*	29,7;77,6	27,8**	9,3;54,3	44,7*	30,6;59,4	Non
														Les besoins alimentaires[p]
60,4*	30,9;85,2	58,9	46,7;71,0	76,5	60,8;88,3	70,1	62,3;77,2	54,1*	34,9;72,5	63,3*	40,5;82,4	59,3	46,3;72,2	Oui, tout à fait
25,0**	6,1;55,4	16,2**	8,0;28,0	9,6**	2,7;22,9	12,9*	8,1;19,2	22,2**	9,2;40,9	16,1**	4,4;37,0	9,6**	3,9;18,7	Oui, en partie
14,6**	1,5;45,5	24,9*	14,7;37,7	13,9**	5,3;27,5	17,0*	11,3;24,0	23,7**	9,5;44,0	20,6**	6,9;42,1	31,2*	19,6;44,8	Non
														Les activités courantes[p]
50,7**	21,6;79,5	69,7	56,4;81,0	56,2	39,6;71,9	68,0	60,7;75,4	50,9*	29,7;71,8	61,6*	38,6;81,3	61,4	47,1;74,4	Oui, tout à fait
42,1**	15,7;72,3	13,1**	5,7;24,3	16,1**	5,8;32,7	20,1*	13,9;27,6	19,7**	6,5;41,0	23,8**	8,4;46,9	12,9**	5,8;23,8	Oui, en partie
7,2**	0,1;38,9	17,2**	9,1;28,3	27,7*	15,2;43,5	11,9*	7,0;18,3	29,4**	12,9;51,1	14,6**	3,3;36,1	25,6*	14,5;39,7	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	91,3	88,7;93,5	97,4	90,8;99,7
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	7,6	5,5;10,2	2,6**	0,3;9,2
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	1,0**	0,3;2,4	-	;
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	69,8	65,9;73,7	77,3	65,6;86,5
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	26,9	23,2;30,7	21,5*	12,4;33,3
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	1,6**	0,7;3,0	-	;
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	1,7**	0,8;3,2	1,2**	0,0;6,6
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	75,5	71,8;79,1	84,6	74,6;91,7
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	14,5	11,7;17,6	7,7**	2,8;16,5
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	10,0	7,5;13,0	7,7**	2,8;16,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
96,1	79,2;99,9	91,4	83,8;96,2	85,0	71,3;93,8	94,0	89,7;96,9	76,1	56,2;90,2	84,5	65,4;95,5	91,2	82,1;96,6	Oui, tout à fait
3,9**	0,1;20,8	6,5**	2,4;13,5	12,3**	4,5;25,5	6,0**	3,1;10,3	21,0**	7,7;41,1	15,5**	4,5;34,6	7,0**	2,5;15,2	Oui, en partie
-	;	2,2**	0,3;7,6	2,7**	0,1;14,4	-	;	2,9**	0,1;15,1	-	;	1,8**	0,1;9,0	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
45,1*	24,5;67,0	79,6	69,4;87,7	54,0	38,2;69,2	67,3	60,8;73,9	65,1	46,3;81,0	77,9	60,0;90,4	72,3	61,8;81,3	Toujours
41,9*	22,0;63,9	15,1**	8,1;24,8	41,3*	26,2;57,8	31,0	24,7;37,4	25,5**	11,7;44,1	22,1**	9,6;40,0	26,0*	17,4;36,1	La plupart du temps
13,0**	2,6;34,4	2,1**	0,3;7,5	4,7**	0,6;15,7	0,5**	0,0;3,0	-	;	-	;	0,9**	0,0;4,7	À l'occasion
-	;	3,2**	0,7;8,7	-	;	1,1**	0,1;4,0	9,4**	1,7;26,4	-	;	0,8**	0,0;4,3	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
45,3*	23,3;68,8	69,7	59,9;79,4	72,9	56,1;85,9	74,6	67,3;81,0	71,4	52,1;86,3	88,1	71,0;97,0	80,1	70,5;87,6	Oui, tout à fait
31,3**	13,9;53,7	21,6*	13,3;31,9	9,7**	2,7;22,9	16,0*	11,0;22,3	12,3**	3,5;28,5	8,3**	1,8;22,3	12,0**	6,3;20,2	Oui, en partie
23,4**	8,0;46,6	8,8**	3,9;16,5	17,5**	7,2;33,0	9,3*	5,4;14,9	16,3**	5,0;35,5	3,6**	0,1;19,8	7,9**	3,3;15,6	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	79,4	76,0;82,8	80,6	69,7;89,0
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	12,3	9,6;15,5	9,1**	3,7;17,8
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	8,3	6,3;10,7	10,3**	4,3;19,9
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	89,2	85,8;92,1	92,2	83,1;97,3
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	8,4*	5,9;11,5	7,8**	2,7;16,9
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	2,4**	1,0;4,6	-	;
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	78,2	73,1;83,4	64,7	48,8;78,5
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	11,5*	7,9;16,1	14,6**	5,5;29,1
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	10,2*	6,8;14,6	20,8**	10,0;35,7
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	55,0	49,5;60,6	51,8*	27,7;75,3
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	23,8	19,1;28,6	32,9**	12,8;59,1
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	21,1	16,8;25,5	15,2**	2,5;41,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
86,4	65,4;97,1	78,1	67,5;86,5	70,3	54,4;83,2	75,3	68,0;81,6	76,7	55,2;91,3	78,6	60,1;91,3	89,6	81,1;95,2	Aucun report
13,6**	2,9;34,6	12,2**	6,1;21,0	20,9**	10,3;35,6	13,8*	8,9;20,1	7,8**	0,9;25,6	18,5**	6,6;37,1	7,8**	2,9;16,2	Un report
-	;	9,7**	4,5;17,9	8,8**	2,4;21,4	10,9*	6,7;16,4	15,5**	4,1;36,2	2,9**	0,1;16,0	2,6**	0,6;7,3	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
90,5	69,3;98,9	83,7	70,0;92,9	90,9	57,1;99,8	89,7	83,8;94,0	89,7	65,6;99,0	90,8	69,1;99,0	88,4	79,0;94,6	Aucun report
9,5**	1,1;30,7	12,6**	4,8;25,4	9,1**	0,2;42,9	8,7**	4,6;14,6	-	;	9,2**	1,0;30,9	7,7**	3,2;15,1	Un report
-	;	3,7**	0,4;13,3	-	;	1,6**	0,4;4,6	10,3**	1,0;34,4	-	;	3,9**	0,6;12,7	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
40,7**	10,2;77,9	-	;	83,9	69,4;93,4	80,4	71,6;87,4	92,7	65,8;99,8	86,1	59,0;98,1	83,9	64,3;95,2	Aucun report
42,9**	11,4;79,5	-	;	8,8**	2,5;20,8	12,3**	6,7;20,2	7,3**	0,2;34,2	7,4**	0,2;35,7	2,9**	0,1;15,9	Un report
16,4**	0,6;61,2	-	;	7,3**	1,5;20,4	7,3**	3,3;13,8	-	;	6,4**	0,2;31,1	13,2**	3,4;31,5	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
62,7**	20,6;93,6	47,2	34,1;60,2	69,8*	37,7;91,8	51,4	43,6;59,1	67,1	45,7;84,3	62,6**	27,3;90,0	69,4*	44,4;88,1	Aucun report
24,2**	2,0;68,9	23,7*	13,5;36,9	15,1**	1,5;47,2	25,7	19,1;33,2	15,9**	4,1;37,3	37,4**	10,0;72,7	12,8**	2,5;34,1	Un report
13,2**	0,1;61,2	29,1*	17,5;43,1	15,2**	1,6;47,0	22,9	16,8;30,1	17,0**	5,3;36,8	-	;	17,8**	4,2;42,3	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	11,2	8,6;14,3	7,2**	2,5;15,6
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	8,1*	5,8;10,9	10,6**	3,7;22,7
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	80,7	77,0;84,1	82,2	70,0;91,0
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	39,0	35,3;42,8	63,2	50,8;74,4
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	7,3	5,3;9,6	6,2**	1,6;15,4
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	53,7	49,7;57,7	30,6*	20,1;42,9
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	59,9	56,1;63,8	69,4	57,2;79,9
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	3,1*	1,8;4,9	-	;
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	36,9	33,3;40,6	30,6*	20,1;42,8
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	12,1	9,8;14,5	8,4**	3,0;18,0
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	7,3*	5,2;9,8	6,8**	2,2;15,2
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	80,6	77,4;83,7	84,8	73,3;92,7
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	16,8	13,8;20,1	17,2**	8,2;30,3
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	5,1*	3,4;7,4	7,7**	2,4;17,4
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	78,1	74,8;81,5	75,1	61,8;85,6
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	38,5	34,6;42,4	52,4	40,0;64,8
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	4,6*	3,0;6,7	5,0**	1,2;12,9
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	56,9	52,9;60,9	42,6	30,4;54,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
8,3**	0,8;29,0	3,3**	0,5;10,4	16,9**	7,0;31,8	19,0*	13,6;25,3	11,0**	2,0;30,2	-	;	9,4**	4,3;17,3	Oui
9,0**	1,0;29,9	4,5**	1,3;11,1	8,0**	1,7;21,7	12,5*	7,7;18,9	11,9**	3,0;28,9	3,4**	0,0;19,3	1,8**	0,2;6,7	Non, mais il aurait souhaité le consulter
82,7	59,9;95,5	92,1	83,8;97,0	75,1	58,5;87,6	68,5	61,5;75,5	77,2	58,2;90,4	96,6	80,7;100,0	88,7	80,5;94,3	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
45,3*	24,3;67,7	20,0*	11,5;30,9	49,0	34,3;63,8	36,5	29,7;43,3	65,2	46,1;81,3	40,8*	23,1;60,3	26,7*	18,4;36,4	Oui
-	;	3,3**	0,7;9,4	19,9**	9,7;34,2	9,2*	5,4;14,4	9,5**	1,9;25,9	9,3**	1,6;27,0	2,9**	0,4;10,2	Non, mais il aurait souhaité le consulter
54,7*	32,3;75,7	76,8	65,5;85,8	31,1*	18,6;46,0	54,2	47,3;61,2	25,3**	11,0;44,9	49,9*	30,8;69,0	70,4	60,0;79,4	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
62,0*	38,3;82,2	40,8	30,3;51,3	79,6	63,8;90,8	63,8	56,7;70,9	57,5*	37,5;75,9	60,7*	39,9;79,1	54,7	44,0;65,4	Oui
4,7**	0,1;24,1	4,2**	1,1;10,7	3,4**	0,1;16,7	3,4**	1,3;7,1	-	;	2,8**	0,1;14,3	4,5**	1,2;11,3	Non, mais il aurait souhaité le consulter
33,3**	14,3;57,4	55,0	44,3;65,6	16,9**	7,2;31,5	32,8	25,8;39,7	42,5*	24,1;62,5	36,5**	18,7;57,6	40,7	30,0;51,5	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
7,5**	1,0;23,7	2,3**	0,3;8,0	26,1**	13,8;41,8	16,8*	12,0;22,6	14,3**	4,9;30,2	15,0**	4,8;32,4	9,4**	4,6;16,6	Oui
-	;	6,5**	2,4;13,6	12,5**	4,3;26,3	9,5*	5,7;14,6	7,0**	0,8;23,7	9,4**	1,8;25,9	3,7**	0,7;11,1	Non, mais il aurait souhaité le consulter
92,5	76,3;99,0	91,2	83,6;96,1	61,4	45,3;75,9	73,7	66,8;79,9	78,7	60,6;91,1	75,6	56,4;89,4	86,9	78,5;92,9	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
16,6**	4,7;37,1	2,1**	0,2;7,9	31,9*	18,5;48,0	17,9*	12,6;24,3	23,4**	10,2;41,9	9,2**	1,8;25,2	20,6*	12,6;30,7	Oui
-	;	5,2**	1,8;11,5	9,6**	2,6;22,9	5,1**	2,3;9,6	-	;	9,3**	1,9;25,2	2,8**	0,6;7,9	Non, mais il aurait souhaité le consulter
83,4	62,9;95,3	92,7	85,6;96,9	58,5	43,2;72,7	77,0	70,0;83,0	76,6	58,1;89,8	81,4	63,4;93,1	76,6	66,3;85,1	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
44,6*	23,9;66,7	20,3*	13,0;29,4	50,4*	34,5;66,2	40,4	33,8;47,0	40,1*	23,0;59,2	33,2**	17,6;52,0	35,0	24,7;45,2	Oui
4,2**	0,1;22,9	4,3**	1,2;10,5	5,5**	0,7;18,4	5,8**	2,8;10,2	2,7**	0,0;15,5	6,0**	0,5;22,5	2,7**	0,3;9,9	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
51,2*	29,1;73,1	75,4	65,6;83,7	44,1*	29,0;59,9	53,8	46,9;60,7	57,2	39,0;74,1	60,8	41,4;78,0	62,4	51,9;72,8	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	9,7	7,6;12,2	9,3**	3,7;18,4
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	10,4	8,0;13,3	10,0**	3,8;20,3
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	79,8	76,7;82,9	80,8	68,4;89,9
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	11,6	9,0;14,1	5,2**	1,3;13,2
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	8,0*	5,8;10,8	10,8**	3,7;23,1
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	80,4	77,3;83,6	84,1	72,0;92,4
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	19,9	16,7;23,5	13,1**	6,1;23,7
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	13,7	11,0;16,7	12,2**	5,6;22,1
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	66,4	62,6;70,2	74,7	62,5;84,6
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	28,0	24,5;31,4	19,8*	11,2;31,2
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	3,5*	2,0;5,6	4,5**	0,5;16,2
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	68,5	64,8;72,2	75,7	62,9;85,8
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	16,2	13,3;19,4	15,0**	7,6;25,5
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	9,4	7,1;12,1	8,3**	3,0;17,4
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	74,5	71,0;78,0	76,7	65,1;86,0
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	16,1	13,1;19,5	23,0*	13,4;35,3
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	5,0*	3,3;7,2	4,1**	0,9;11,0
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	78,9	75,5;82,3	72,9	60,6;83,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
3,5**	0,1;18,1	1,0**	0,0;5,2	18,1**	7,7;33,4	16,3*	11,3;22,5	8,6**	1,9;22,6	5,5**	0,7;18,5	6,3**	2,4;12,8	Oui
8,3**	0,9;28,2	2,1**	0,3;7,2	18,6**	8,1;34,1	16,4*	11,4;22,5	13,6**	3,5;32,2	8,6**	1,9;23,0	4,7**	1,4;11,3	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
88,2	67,2;97,9	96,9	91,6;99,3	63,3	46,6;78,0	67,3	61,0;73,5	77,9	60,2;90,3	85,9	70,5;95,1	89,0	81,4;94,3	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
8,6**	1,3;26,2	3,1**	0,6;8,9	8,4**	2,3;20,2	20,6	15,0;27,0	11,4**	3,1;27,0	12,1**	3,1;29,3	10,5**	5,3;18,1	Oui
4,9**	0,1;26,5	7,4**	3,2;14,3	10,3**	3,2;23,1	9,0**	5,0;14,5	6,6**	0,8;22,2	9,6**	1,6;27,8	4,8**	1,1;12,6	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
86,5	65,8;97,0	89,5	81,8;94,7	81,3	66,7;91,5	70,5	63,2;77,0	82,0	64,8;93,1	78,3	58,7;91,6	84,8	75,4;91,6	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
20,9**	7,1;42,5	15,4**	8,3;25,2	21,7**	10,9;36,4	19,9*	14,1;26,8	28,2**	13,4;47,5	22,6**	9,6;41,1	24,1*	15,3;34,8	Oui
8,4**	1,1;27,0	7,4**	3,2;14,3	26,9*	14,7;42,2	16,1*	11,1;22,1	19,9**	8,5;36,6	8,9**	1,6;25,5	11,1**	5,3;19,7	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
70,6	48,8;87,2	77,2	67,1;85,4	51,4	36,3;66,4	64,1	57,1;71,0	51,9*	33,2;70,2	68,5	48,0;84,8	64,8	54,8;74,9	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
32,2**	14,8;54,3	21,9*	14,1;31,6	20,4**	9,5;35,7	42,8	35,4;50,2	36,5*	20,4;55,2	13,0**	3,5;30,6	18,8*	11,7;27,7	Oui
-	;	1,1**	0,0;5,9	12,2**	4,2;26,1	4,4**	1,9;8,6	-	;	-	;	2,8**	0,5;8,7	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
67,8	45,7;85,2	77,0	67,2;85,0	67,4	51,1;81,1	52,8	45,3;60,3	63,5	44,8;79,6	87,0	69,4;96,5	78,4	69,2;86,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
9,0**	1,2;28,3	3,2**	0,7;9,2	15,9**	6,4;30,7	22,1	16,1;29,1	13,4**	4,2;29,4	10,0**	2,0;27,0	22,7*	13,8;33,9	Oui
8,6**	1,1;27,4	5,3**	1,7;12,1	18,6**	7,7;34,8	13,8*	9,1;19,7	5,9**	0,7;19,8	3,1**	0,1;16,9	5,7**	1,9;12,8	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
82,4	61,4;94,8	91,4	84,0;96,2	65,5	48,7;79,9	64,1	57,0;71,2	80,7	63,6;92,2	86,9	68,8;96,6	71,6	60,5;81,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
16,4**	4,0;39,0	6,4**	2,4;13,4	24,3**	12,9;39,2	18,6*	13,3;25,0	8,9**	1,7;24,5	9,6**	1,9;26,1	16,1*	9,1;25,5	Oui
4,2**	0,1;21,6	2,2**	0,2;7,9	5,6**	0,7;18,4	7,4**	3,9;12,6	3,0**	0,1;16,0	-	;	6,1**	1,6;15,2	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
79,4	56,5;93,6	91,4	83,7;96,3	70,1	54,9;82,6	73,9	67,2;80,0	88,1	72,3;96,7	90,4	73,9;98,1	77,8	66,7;86,5	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	5,4*	3,8;7,6	3,6**	0,7;10,2
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	94,6	92,4;96,2	96,4	89,8;99,3
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	8,8**	1,8;24,0	30,6**	0,2;93,4
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	91,2	76,0;98,2	69,4**	6,6;99,8
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	8,8**	1,5;25,3	-	;
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	91,2	74,7;98,5	100,0	;
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	27,0**	13,2;45,2	30,6**	0,2;93,4
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	73,0	54,8;86,8	69,4**	6,6;99,8
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	19,5**	7,1;38,7	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	80,5	61,3;92,9	100,0	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	32,7**	16,4;52,9	30,6**	0,2;93,4
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	67,3	47,1;83,6	69,4**	6,6;99,8
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	19,1**	7,5;36,7	34,7**	0,3;95,6
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	80,9	63,3;92,5	65,3**	4,4;99,7
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	41,6*	23,8;61,1	34,7**	0,3;95,6
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	58,4*	38,9;76,2	65,3**	4,4;99,7
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	34,9*	18,7;54,1	69,4**	6,6;99,8
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	65,1	45,9;81,3	30,6**	0,2;93,4
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	22,5**	9,1;42,0	-	;
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	77,5	58,0;90,9	100,0	;
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	9,7**	1,8;27,2	-	;
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	90,3	72,8;98,2	100,0	;
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	-	;	-	;
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	100,0	;	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]
8,6**	1,0;28,7	2,9**	0,6;8,4	2,1**	0,1;10,2	10,3*	6,2;15,9	-	;	-	;	5,1**	1,9;11,0	Oui
91,4	71,3;99,0	97,1	91,6;99,4	97,9	89,8;99,9	89,7	84,1;93,8	100,0	;	100,0	;	94,9	89,0;98,1	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	-	;	-	;	11,5**	1,4;35,9	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	88,5	64,1;98,6	-	;	-	;	100,0	;	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	-	;	-	;	17,0**	2,8;45,9	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	83,0	54,1;97,2	-	;	-	;	100,0	;	Non
														Psychologue
51,2**	1,1;99,1	-	;	-	;	39,8**	16,4;67,2	-	;	-	;	-	;	Oui
48,8**	0,9;98,9	100,0	;	100,0	;	60,2*	32,8;83,6	-	;	-	;	100,0	;	Non
														Travailleur social
-	;	33,3**	0,4;93,6	-	;	12,4**	1,1;41,2	-	;	-	;	51,2**	8,8;92,2	Oui
100,0	;	66,7**	6,4;99,6	100,0	;	87,6	58,8;98,9	-	;	-	;	48,8**	7,8;91,2	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
-	;	-	;	100,0	;	45,1**	18,4;74,0	-	;	-	;	16,7**	0,2;68,7	Oui
100,0	;	100,0	;	-	;	54,9**	26,0;81,6	-	;	-	;	83,3*	31,3;99,8	Non
														Médicaments
-	;	33,3**	0,4;93,6	100,0	;	12,3**	1,3;39,3	-	;	-	;	16,7**	0,2;68,7	Oui
100,0	;	66,7**	6,4;99,6	-	;	87,7	60,7;98,7	-	;	-	;	83,3*	31,3;99,8	Non
														Services de transport
48,8**	0,9;98,9	33,3**	0,4;93,4	-	;	42,8**	16,7;72,2	-	;	-	;	49,9**	10,0;89,9	Oui
51,2**	1,1;99,1	66,7**	6,6;99,6	100,0	;	57,2*	27,8;83,3	-	;	-	;	50,1**	10,1;90,0	Non
														Services d'aide à domicile
48,8**	0,9;98,9	-	;	-	;	29,9**	9,2;59,3	-	;	-	;	48,1**	8,9;89,2	Oui
51,2**	1,1;99,1	100,0	;	100,0	;	70,1*	40,7;90,8	-	;	-	;	51,9**	10,8;91,1	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
-	;	33,3**	0,4;93,3	-	;	18,7**	3,4;47,9	-	;	-	;	49,9**	10,0;89,9	Oui
100,0	;	66,7**	6,7;99,6	100,0	;	81,3	52,1;96,6	-	;	-	;	50,1**	10,1;90,0	Non
														Soins infirmiers à domicile
-	;	-	;	-	;	12,4**	1,1;41,2	-	;	-	;	16,7**	0,2;68,7	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	87,6	58,8;98,9	-	;	-	;	83,3*	31,3;99,8	Non
														Autres services ou ressources
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	-	;	-	;	100,0	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	96,9	94,8;98,3	93,8	82,9;98,7
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	3,1**	1,7;5,2	6,2**	1,3;17,1
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	38,8	34,6;43,1	23,1*	12,7;36,7
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	10,9	8,4;13,9	19,2**	9,9;32,1
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	30,7	26,6;34,8	33,2*	20,7;47,8
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	19,5	16,2;23,3	24,4*	14,0;37,6
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	28,7	24,9;32,4	19,9**	10,4;32,9
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	25,3	21,5;29,1	45,4	32,5;58,4
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	23,6	20,0;27,3	12,4**	4,9;24,5
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	22,4	18,8;26,0	22,3**	11,8;36,1
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	7,7*	5,5;10,4	3,5**	0,4;12,5
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	6,9	5,0;9,2	9,0**	3,4;18,6
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	17,9	14,8;21,4	17,5**	8,5;30,4
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	10,4	7,8;13,5	19,3**	8,8;34,3
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	47,4	42,9;51,8	41,1*	28,8;53,4
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	9,8	7,3;12,7	9,6**	3,0;21,5
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	0,4**	0,0;1,5	1,7**	0,0;9,8
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	6,4*	4,5;8,7	4,2**	0,9;11,6
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	93,2	90,8;95,1	94,1	85,6;98,3
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	86,6	83,3;89,5	82,5	70,4;91,1
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	12,1	9,4;15,2	14,0**	6,4;25,4
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	1,3**	0,5;2,7	3,5**	0,5;11,8

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
100,0	;	96,3	86,3;99,6	97,7	88,2;99,9	98,1	94,2;99,7	100,0	;	100,0	;	94,6	87,2;98,4	Oui
-	;	3,7**	0,4;13,7	2,3**	0,1;11,8	1,9**	0,3;5,8	-	;	-	;	5,4**	1,6;12,8	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
27,0**	10,6;49,9	48,5	37,6;59,4	76,1	58,3;89,0	33,8	26,5;41,1	37,9*	21,1;57,0	40,5*	22,5;60,5	36,8*	26,0;48,7	Médecin spécialiste du cancer
9,6**	0,9;32,6	5,8**	1,9;13,0	5,8**	0,7;19,7	14,0*	9,1;20,2	5,7**	0,7;19,3	11,8**	3,4;27,0	9,1**	3,9;17,5	Médecin de famille
46,5*	24,2;69,8	33,0*	23,1;43,0	5,1**	0,6;17,1	26,4	19,9;33,8	33,1**	16,8;53,0	25,6**	11,5;44,8	40,7	30,5;50,9	Autre médecin spécialiste
16,9**	4,5;38,9	12,7**	6,5;21,6	13,0**	3,9;29,4	25,8	19,0;33,5	23,3**	10,5;41,1	22,2**	8,2;43,0	13,3*	7,5;21,4	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
16,7**	4,4;38,7	40,2	30,6;49,8	65,3	48,7;79,6	18,5*	13,0;25,2	25,8**	11,4;45,4	25,8**	12,3;43,7	30,1*	19,9;41,8	Médecin spécialiste du cancer
20,6**	5,5;45,9	17,0*	9,9;26,4	10,6**	2,8;25,5	29,0	22,3;36,5	8,8**	1,9;23,5	25,5**	11,4;44,9	25,6*	17,1;35,8	Médecin de famille
35,6**	15,7;59,9	23,2*	15,3;32,8	4,8**	0,6;15,9	26,7	20,5;33,5	29,1**	13,9;48,9	21,5**	8,6;40,5	30,2*	20,6;39,7	Autre médecin spécialiste
27,1**	10,6;50,2	19,6*	12,2;28,9	19,4**	8,5;35,2	25,8	19,5;32,9	36,2**	19,0;56,4	27,2**	11,7;48,2	14,2*	8,1;22,4	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
5,9**	0,1;29,9	5,4**	1,8;12,1	2,5**	0,1;12,6	7,8**	4,2;12,9	-	;	8,0**	1,6;22,1	16,5**	9,0;26,7	Au besoin
9,1**	1,2;28,4	2,1**	0,3;7,2	14,8**	5,3;30,4	6,1**	3,0;10,7	15,5**	4,9;33,5	10,4**	2,7;25,5	3,6**	1,0;9,0	À tous les mois
8,9**	0,9;30,2	14,3**	7,5;23,7	26,3**	14,0;42,1	17,1*	11,9;23,5	28,0**	13,1;47,7	16,9**	5,9;34,8	18,2*	10,9;27,8	À tous les 2 ou 3 mois
18,1**	4,6;42,0	6,6**	2,4;13,8	6,0**	0,7;20,2	11,1*	6,7;17,1	11,8**	3,2;28,1	6,1**	0,7;20,8	8,1**	3,7;15,1	À tous les 4 mois
44,5*	23,8;66,7	57,3	47,6;66,9	43,9*	27,3;61,7	48,8	41,2;56,3	24,4**	10,5;43,9	58,5	39,9;75,5	46,1	35,9;56,2	À tous les 6 mois
13,5**	2,9;34,5	14,4**	7,9;23,4	6,4**	0,7;21,7	9,1*	5,2;14,6	20,3**	6,8;41,5	-	;	7,5**	3,1;14,7	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	0,9**	0,0;5,6	Trop long
4,4**	0,1;23,2	5,2**	1,8;11,4	17,1**	7,1;32,3	8,2**	4,5;13,3	8,9**	1,7;24,7	-	;	3,7**	0,7;10,8	Trop court
95,6	76,8;99,9	94,8	88,6;98,2	82,9	67,7;92,9	91,8	86,7;95,5	91,1	75,3;98,3	100,0	;	95,3	88,1;98,8	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
89,1	64,3;98,9	90,8	82,2;96,2	82,6	66,4;93,1	84,7	78,3;89,8	85,8	65,0;96,7	87,8	70,6;96,9	89,3	81,1;94,7	Tout à fait capable
5,9**	0,1;29,9	9,2**	3,8;17,8	17,4**	6,9;33,6	14,1*	9,2;20,3	14,2**	3,3;35,0	12,2**	3,1;29,4	8,9**	3,8;17,0	En partie capable
5,0**	0,1;24,9	-	;	-	;	1,2**	0,2;4,1	-	;	-	;	1,9**	0,2;6,8	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	58,3	54,2;62,4	53,5	40,9;66,2
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	19,4	16,1;23,0	19,6**	10,8;31,4
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	22,4	18,8;25,9	26,8*	16,1;40,0
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	52,0	43,3;60,6	41,7**	13,7;74,3
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	48,0	39,4;56,7	58,3**	25,7;86,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
75,2	49,4;92,2	54,1	43,9;64,3	47,0*	30,7;63,7	57,6	49,8;65,4	46,1*	27,1;66,1	53,0*	33,1;72,3	71,7	61,2;80,7	Oui, tout à fait
8,9**	1,0;29,5	17,7*	10,4;27,3	25,2**	12,4;42,2	25,3	18,8;32,7	21,1**	8,0;40,8	11,5**	2,6;29,5	13,5**	7,4;22,1	oui, en partie
15,9**	3,0;41,5	28,2*	19,4;38,4	27,8**	14,6;44,7	17,1*	11,5;24,1	32,7**	16,3;52,9	35,4*	18,9;55,0	14,8**	8,2;23,7	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
38,0**	4,5;84,4	52,7**	22,5;81,6	53,1**	20,3;84,0	54,6	41,2;68,1	28,7**	2,5;75,8	46,5**	6,3;90,8	65,3*	38,1;86,7	Oui
62,0**	15,6;95,5	47,3**	18,4;77,5	46,9**	16,0;79,7	45,4*	31,9;58,8	71,3**	24,2;97,5	53,5**	9,2;93,7	34,7**	13,3;61,9	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Sport ou activité physique[p, r]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	25,1	21,9;28,2	36,8*	25,5;49,3
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	40,9	36,9;44,9	31,0*	20,3;43,3
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	34,1	30,1;38,0	32,2*	21,7;44,2
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	29,6	26,1;33,1	30,6*	20,1;42,7
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	33,1	29,3;36,9	29,7*	18,9;42,4
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	37,3	33,3;41,3	39,8*	27,4;53,2
Modification de l'alimentation[p]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	49,2	45,2;53,2	66,2	53,4;77,5
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	21,9	18,5;25,4	15,1**	7,3;26,6
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	28,9	25,2;32,6	18,7**	10,0;30,4
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	11,9	9,4;14,8	7,7**	2,6;16,8
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	8,6	6,4;11,1	3,7**	0,7;11,1
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	79,6	76,3;82,8	88,6	78,6;95,0
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	0,7**	0,2;2,0	1,5**	0,0;8,0
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	1,8**	0,8;3,2	-	;
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	97,5	95,8;98,6	98,5	92,0;100,0
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	7,9	5,8;10,4	9,6**	3,8;19,1
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	8,2	6,2;10,7	5,0**	1,4;12,3
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	83,9	80,6;86,8	85,4	74,9;92,7
Gestion du stress[p]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	38,9	35,0;42,8	44,4	32,3;56,6
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	22,6	19,2;26,0	21,7*	12,1;34,1
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	38,5	34,7;42,4	33,9*	23,4;45,7

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p, r]
23,7**	9,4;44,3	12,3**	6,7;20,1	23,7**	12,7;38,2	37,4	30,8;44,0	15,4**	5,0;33,1	17,9**	6,7;35,4	14,9*	8,4;23,7	Oui
30,1**	12,7;53,0	52,4	42,3;62,6	24,5**	13,0;39,5	33,0	26,3;39,8	60,5	41,0;77,8	51,3*	32,6;69,7	49,8	39,4;60,3	Non
46,2*	25,7;67,7	35,3	25,3;45,2	51,8	36,0;67,3	29,6	23,2;36,7	24,1**	10,6;42,8	30,8**	14,8;51,1	35,2	25,6;44,9	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
46,7*	25,7;68,5	21,1*	13,0;31,4	35,6*	22,4;50,5	33,3	26,4;40,1	21,8**	9,2;40,0	29,6**	14,1;49,5	26,6*	18,4;36,3	Oui
22,0**	7,0;45,5	37,8	27,7;47,9	27,3*	15,1;42,5	27,8	21,4;34,9	36,7*	20,2;55,7	27,6**	13,8;45,5	44,8	34,6;54,9	Non
31,3**	14,0;53,6	41,1	30,9;51,2	37,2*	22,7;53,6	38,9	32,1;45,8	41,5*	24,0;60,8	42,8*	24,4;62,8	28,6*	19,4;39,3	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p]
57,4*	34,8;77,9	36,1	26,4;45,9	51,9	36,5;67,0	50,4	43,6;57,2	55,7*	37,3;73,0	39,6*	22,7;58,5	44,3	34,7;54,0	Oui
15,2**	3,1;38,7	37,9	27,8;48,1	17,2**	7,4;31,9	15,9*	10,9;22,0	20,6**	8,4;38,7	25,2**	11,6;43,6	25,4*	17,3;35,0	Non
27,5**	11,8;48,6	25,9*	17,7;35,5	30,9*	18,1;46,3	33,7	27,0;40,4	23,7**	10,3;42,3	35,3**	18,2;55,6	30,2*	20,9;39,5	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
3,5**	0,1;16,3	10,7**	5,1;19,1	7,9**	2,2;19,0	8,1*	4,7;12,7	22,1**	9,9;39,3	32,4**	15,7;53,1	15,6*	9,4;23,6	Oui
10,2**	1,3;31,8	10,2**	4,8;18,6	7,5**	1,7;19,9	9,0*	5,3;14,2	7,3**	0,9;24,0	5,5**	0,5;20,3	11,2**	5,9;18,8	Non
86,3	64,9;97,1	79,1	69,6;86,8	84,6	70,5;93,7	82,9	76,5;88,2	70,7	53,1;84,7	62,2*	40,9;80,4	73,3	63,4;81,7	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	1,0**	0,0;5,7	-	;	0,5**	0,0;2,6	-	;	-	;	1,4**	0,0;7,4	Oui
6,1**	0,2;29,5	3,0**	0,6;8,2	-	;	3,0**	1,0;6,6	-	;	-	;	1,0**	0,0;5,1	Non
93,9	70,5;99,8	96,1	90,3;98,9	100,0	;	96,5	92,9;98,6	100,0	;	100,0	;	97,7	91,8;99,7	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
-	;	6,3**	2,3;13,3	4,0**	0,5;14,1	4,6**	2,1;8,7	23,4**	9,9;42,6	14,8**	5,4;30,1	9,5**	4,6;16,9	Oui
10,6**	1,3;33,2	16,8*	10,0;25,6	1,9**	0,0;11,2	7,4**	3,8;12,6	7,4**	0,8;25,0	11,3**	2,6;28,5	6,0**	2,4;12,1	Non
89,4	66,8;98,7	76,9	67,5;84,6	94,0	82,7;98,9	88,0	82,1;92,5	69,2	49,1;85,0	74,0	55,1;88,0	84,5	75,9;90,9	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p]
56,0*	33,3;77,0	23,4*	15,8;32,5	41,9*	27,8;57,0	49,9	42,7;57,2	44,0*	25,9;63,4	19,6**	8,0;36,8	30,5*	21,2;39,8	Oui
26,9**	9,8;51,2	22,3*	14,4;31,9	28,1*	16,0;42,9	17,9*	12,7;24,2	19,6**	7,2;38,9	30,2**	15,5;48,6	25,9*	17,6;35,8	Non
17,1**	4,4;39,7	54,3	44,8;63,8	30,1*	17,3;45,6	32,2	25,1;39,3	36,3*	19,8;55,6	50,3*	31,4;69,1	43,6	33,3;53,8	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	44,7	40,6;48,8	49,2	37,1;61,3
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	16,6	13,5;20,1	15,7**	7,9;26,8
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	38,8	34,9;42,6	35,1*	24,3;47,3
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	0,9**	0,3;2,0	-	;
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	99,1	98,0;99,7	100,0	;
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	0,7**	0,1;1,9	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	99,3	98,1;99,9	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]
39,1**	19,7;61,3	25,7*	17,0;36,0	59,0	42,7;73,9	49,5	41,9;57,0	60,7	41,2;78,0	29,9**	15,7;47,7	45,0	35,0;55,1	Oui
17,7**	4,9;39,9	37,8	28,3;47,2	3,4**	0,1;16,3	8,1**	4,1;14,1	10,3**	2,0;28,1	23,8**	10,0;43,4	17,4*	10,6;26,1	Non
43,2*	24,1;63,9	36,6	27,1;46,0	37,7*	23,5;53,6	42,4	35,3;49,5	29,0**	14,1;48,2	46,3*	28,7;64,6	37,6	27,8;47,4	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
-	;	-	;	4,6**	0,5;15,7	2,0**	0,5;4,9	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	95,4	84,3;99,5	98,0	95,1;99,5	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autre
-	;	-	;	-	;	1,1**	0,0;5,5	-	;	-	;	1,8**	0,3;6,0	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	98,9	94,5;100,0	100,0	;	100,0	;	98,2	94,0;99,7	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	64,5	56,6;72,5	66,3*	39,6;87,0
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	35,5	27,5;43,4	33,7**	13,0;60,4
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	78,5	73,5;83,5	82,8	67,2;93,1
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	21,5	16,5;26,5	17,2**	6,9;32,8
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	49,5	40,5;58,5	74,8*	35,3;96,6
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	50,5	41,5;59,5	25,2**	3,4;64,7
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	28,2*	19,9;37,9	43,0**	16,8;72,5
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	71,8	62,1;80,1	57,0*	27,5;83,2
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	14,8*	9,8;20,9	15,6**	3,1;40,1
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	85,2	79,1;90,2	84,4	59,9;96,9
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	50,4	43,8;56,9	45,4*	25,4;66,5
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	49,6	43,1;56,2	54,6*	33,5;74,6
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	69,8	64,2;75,5	80,3	62,8;92,0
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	30,2	24,5;35,8	19,7**	8,0;37,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
83,5	49,0;98,4	53,9**	24,4;81,5	58,8*	28,9;84,5	64,2	48,7;77,7	42,8**	11,7;78,9	85,7*	36,0;99,8	66,2*	42,3;85,2	Oui
16,5**	1,6;51,0	46,1**	18,5;75,6	41,2**	15,5;71,1	35,8*	22,3;51,3	57,2**	21,1;88,3	14,3**	0,2;64,0	33,8**	14,8;57,7	Non
														Soutien de la famille ou des amis
91,8	60,9;99,8	60,0*	39,2;78,5	88,2	69,3;97,4	78,1	67,8;86,4	84,4	58,3;97,3	92,8	63,9;99,9	71,0	55,3;83,8	Oui
8,2**	0,2;39,1	40,0*	21,5;60,8	11,8**	2,6;30,7	21,9*	13,6;32,2	15,6**	2,7;41,7	7,2**	0,1;36,1	29,0*	16,2;44,7	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
100,0	;	41,1**	13,4;73,8	71,7*	28,7;96,6	52,8*	34,5;70,6	18,8**	1,8;56,3	49,4**	15,2;84,1	37,6**	19,5;58,6	Oui
-	;	58,9**	26,2;86,6	28,3**	3,4;71,3	47,2*	29,4;65,5	81,2*	43,7;98,2	50,6**	15,9;84,8	62,4*	41,4;80,5	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
51,6**	4,3;96,5	24,1**	4,4;58,3	23,9**	4,4;57,9	31,7*	17,7;48,7	-	;	-	;	25,6**	8,9;50,0	Oui
48,4**	3,5;95,7	75,9*	41,7;95,6	76,1*	42,1;95,6	68,3	51,3;82,3	100,0	;	100,0	;	74,4	50,0;91,1	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
31,8**	2,4;81,3	-	;	6,5**	0,1;35,3	20,8**	11,2;33,6	-	;	12,7**	0,1;64,4	16,9**	6,1;34,2	Oui
68,2**	18,7;97,6	100,0	;	93,5	64,7;99,9	79,2	66,4;88,8	100,0	;	87,3*	35,6;99,9	83,1	65,8;93,9	Non
														Exemple de l'entourage[p]
69,0*	31,5;93,8	45,3*	23,6;68,4	39,7**	18,9;63,6	59,8	48,6;70,9	46,6**	18,8;76,0	43,1**	10,1;81,6	42,2*	25,3;60,6	Oui
31,0**	6,2;68,5	54,7*	31,6;76,4	60,3*	36,4;81,1	40,2	29,1;51,4	53,4**	24,0;81,2	56,9**	18,4;89,9	57,8	39,4;74,7	Non
														Prière ou soutien spirituel[p]
84,3	53,1;98,2	60,7*	37,8;80,7	75,5	48,8;92,7	73,0	62,4;82,0	44,4**	19,1;72,1	75,5*	40,9;95,5	62,8	46,9;76,9	Oui
15,7**	1,8;46,9	39,3**	19,3;62,2	24,5**	7,3;51,2	27,0*	18,0;37,6	55,6*	27,9;80,9	24,5**	4,5;59,1	37,2*	23,1;53,1	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,5	10,8;16,1
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	0,2**	0,0;0,9	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	2,4**	1,3;4,2	1,1**	0,0;5,9
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	12,9	10,3;16,0	20,6*	11,7;32,4
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	36,5	32,5;40,4	37,8	27,2;49,4
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	48,0	43,8;52,1	40,5	28,7;52,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,1*	2,7;6,0	15,2	13,0;17,5	7,5	5,7;9,7	28,9	26,5;31,3	5,7*	4,0;7,9	5,7*	4,0;7,9	19,4	16,3;22,4	Ensemble des patients
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic
-	;	-	;	-	;	0,6**	0,0;3,0	-	;	-	;	-	;	Mauvaise
-	;	1,0**	0,0;5,2	2,1**	0,1;10,7	1,2**	0,1;4,5	10,1**	2,0;27,6	3,5**	0,1;19,0	4,5**	1,0;12,1	Passable
14,1**	2,6;37,6	16,4*	9,4;25,7	14,9**	5,8;29,3	6,6**	3,5;11,1	19,8**	8,5;36,5	6,8**	0,6;24,3	13,2**	7,0;22,2	Bonne
40,3**	20,5;62,8	34,4	24,7;44,2	30,4*	17,6;46,0	43,6	36,4;50,9	24,6**	10,2;44,8	31,2**	16,5;49,4	32,8*	22,9;42,7	Très bonne
45,6*	24,0;68,5	48,2	37,8;58,6	52,6	37,0;67,7	48,0	40,5;55,4	45,5*	27,2;64,7	58,5*	38,4;76,7	49,5	39,2;59,8	Excellente

Région 02

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	45,0	43,8 ; 46,2
Femmes	53,9	55,0	53,8 ; 56,2
Âge			
18 à 49 ans	18,9	19,1	16,4 ; 21,8
50 à 59 ans	24,9	25,0	21,8 ; 28,1
60 à 69 ans	29,8	31,1	27,5 ; 34,7
70 ans et plus	26,5	24,8	22,1 ; 27,5
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	98,8	97,5 ; 99,5
Anglais	10,6	0,9**	0,3 ; 2,1
Autres	3,0	0,3**	0,0 ; 1,3
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	27,4	24,1 ; 30,7
Diplôme d'études secondaires	24,7	25,9	22,2 ; 29,6
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	34,0	30,5 ; 37,5
Diplôme d'études universitaires	20,6	12,8	10,1 ; 15,4
Occupation principale			
En emploi	29,3	25,3	22,2 ; 28,3
Étudiant	1,7	2,3**	1,3 ; 3,9
Retraité	55,8	55,5	52,3 ; 58,8
À la maison	7,2	11,4	8,9 ; 13,9
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	2,1**	1,1 ; 3,6
Congé de maternité / autres	3,6	3,4*	2,2 ; 4,9
Situation familiale			
Vit seul	24,1	21,8	18,6 ; 24,9
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	54,4	50,7 ; 58,2
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	16,3	13,5 ; 19,0
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	3,8*	2,3 ; 5,8
Autres	4,8	3,8*	2,4 ; 5,5
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	18,7	15,4 ; 22,3
Revenu suffisant	61,4	62,4	58,6 ; 66,3
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	18,9	15,9 ; 21,9
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	3,7*	2,4 ; 5,5
2	21,1	16,6	13,7 ; 19,9
3	20,1	18,7	15,6 ; 22,1
4	19,4	30,0	26,5 ; 33,5
5 - très défavorisé	17,6	31,0	27,4 ; 34,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	12,5	10,0 ; 14,9	16,8	12,6 ; 21,7	8,9*	6,1 ; 12,4
Génital féminin	5,5	...	10,2	4,7*	3,2 ; 6,6	...	;	8,6*	5,9 ; 12,0
Prostate	15,9	34,4	...	15,2	12,9 ; 17,5	33,8	28,8 ; 38,9	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	9,1	7,0 ; 11,4	11,9*	8,6 ; 16,0	6,7*	4,3 ; 9,8
Sein	26,5	0,4**	48,8	30,0	27,4 ; 32,6	0,3**	0,0 ; 1,9	54,3	49,6 ; 59,0
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	6,1*	4,4 ; 8,2	5,9*	3,5 ; 9,1	6,3*	4,1 ; 9,1
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	5,3*	3,7 ; 7,3	6,3*	3,9 ; 9,6	4,4**	2,5 ; 7,3
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	17,2	14,3 ; 20,0	24,9	20,0 ; 29,9	10,8*	7,7 ; 14,6
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	88,1	85,7 ; 90,5	88,3	83,9 ; 91,9	87,9	83,9 ; 91,2
Récidive	7,4	7,5	7,3	5,5*	3,8 ; 7,7	5,4**	2,9 ; 9,2	5,6*	3,4 ; 8,6
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	6,4	4,7 ; 8,5	6,3*	3,9 ; 9,5	6,5*	4,1 ; 9,7
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	12,0	9,4 ; 14,9	14,2*	10,1 ; 19,2	10,2*	7,2 ; 14,0
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	25,3	22,1 ; 28,6	7,0*	4,2 ; 10,8	39,8	34,7 ; 44,9
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	62,7	59,0 ; 66,3	78,8	74,0 ; 83,6	50,0	44,8 ; 55,2
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	51,8	47,9 ; 55,7	55,7	49,6 ; 61,8	48,7	43,7 ; 53,8
Non	58,8	56,6	60,7	48,2	44,3 ; 52,1	44,3	38,2 ; 50,4	51,3	46,2 ; 56,3
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	97,1	95,5 ; 98,3	96,7	93,6 ; 98,6	97,5	95,1 ; 98,9
Non	8,3	8,5	8,0	2,9*	1,7 ; 4,5	3,3**	1,4 ; 6,4	2,5**	1,1 ; 4,9
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	11,7	9,2 ; 14,3	12,6*	9,0 ; 17,0	11,0*	7,8 ; 15,0
Très bon	29,2	29,3	29,1	28,4	24,8 ; 32,0	26,6	21,2 ; 32,0	29,8	24,9 ; 34,7
Bon	34,9	34,2	35,5	36,5	32,7 ; 40,3	38,0	32,6 ; 43,5	35,3	30,1 ; 40,5
Moyen	18,8	17,8	19,6	19,0	15,8 ; 22,5	18,4	13,9 ; 23,8	19,4	15,2 ; 24,2
Mauvais	5,6	5,7	5,5	4,4*	3,0 ; 6,3	4,3**	2,3 ; 7,3	4,5**	2,5 ; 7,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p, r]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p]
12,5	10,0 ; 14,9	3,2**	0,9 ; 8,3	8,9*	5,1 ; 14,2	14,5*	10,2 ; 19,7	20,7*	14,0 ; 28,8	Colorectal
4,7*	3,2 ; 6,6	6,9**	3,0 ; 13,2	6,3**	3,3 ; 10,8	3,5**	1,5 ; 6,9	3,0**	0,6 ; 8,5	Génital féminin
15,2	12,9 ; 17,5	0,9**	0,0 ; 4,5	10,7*	6,6 ; 16,1	23,6	18,1 ; 29,1	20,4	14,9 ; 26,8	Prostate
9,1	7,0 ; 11,4	16,6*	10,4 ; 24,5	9,3*	5,7 ; 14,2	4,5**	2,2 ; 8,2	8,6**	4,5 ; 14,7	Hématopoïétique
30,0	27,4 ; 32,6	37,3	29,4 ; 45,2	36,8	30,4 ; 43,2	27,1	21,5 ; 32,6	21,1*	14,9 ; 28,5	Sein
6,1*	4,4 ; 8,2	10,6**	5,7 ; 17,5	7,0**	3,7 ; 11,8	5,1**	2,7 ; 8,8	2,9**	0,8 ; 7,1	ORL (Tête et cou)
5,3*	3,7 ; 7,3	3,2**	0,9 ; 7,8	6,8**	3,6 ; 11,5	6,5**	3,5 ; 10,9	3,8**	1,2 ; 8,6	Broncho-pulmonaire
17,2	14,3 ; 20,0	21,3*	14,1 ; 30,2	14,1*	9,1 ; 20,5	15,2*	10,7 ; 20,6	19,5*	12,9 ; 27,8	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
88,1	85,7 ; 90,5	95,5	90,0 ; 98,5	84,3	78,1 ; 89,4	90,2	85,4 ; 93,8	83,5	76,4 ; 89,2	Premier cancer
5,5*	3,8 ; 7,7	2,9**	0,6 ; 8,0	9,3**	5,2 ; 15,0	4,6**	2,1 ; 8,5	4,8**	1,8 ; 10,0	Récidive
6,4	4,7 ; 8,5	1,6**	0,2 ; 6,0	6,3**	3,2 ; 11,1	5,2**	2,7 ; 9,0	11,7*	6,9 ; 18,2	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]
12,0	9,4 ; 14,9	5,5**	2,0 ; 11,7	15,7*	10,4 ; 22,4	12,4*	8,3 ; 17,5	12,8*	7,6 ; 19,8	Sous traitement
25,3	22,1 ; 28,6	32,7	24,1 ; 41,2	24,9	18,3 ; 32,4	21,7	16,2 ; 28,0	24,6	18,0 ; 32,2	Sans traitement avec médication
62,7	59,0 ; 66,3	61,8	52,7 ; 70,9	59,4	51,6 ; 67,2	66,0	59,7 ; 72,3	62,6	54,6 ; 70,5	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p, r]
51,8	47,9 ; 55,7	49,5	39,7 ; 59,4	41,9	34,6 ; 49,2	55,1	48,8 ; 61,5	59,6	50,5 ; 68,6	Oui
48,2	44,3 ; 52,1	50,5	40,6 ; 60,3	58,1	50,8 ; 65,4	44,9	38,5 ; 51,2	40,4	31,4 ; 49,5	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]
97,1	95,5 ; 98,3	95,1	88,5 ; 98,5	94,2	89,5 ; 97,2	99,1	96,5 ; 99,9	99,4	96,5 ; 100,0	Oui
2,9*	1,7 ; 4,5	4,9**	1,5 ; 11,5	5,8**	2,8 ; 10,5	0,9**	0,1 ; 3,5	0,6**	0,0 ; 3,5	Non
										Perception de l'état de santé[p]
11,7	9,2 ; 14,3	17,1*	10,7 ; 25,3	12,3*	7,6 ; 18,4	9,0*	5,5 ; 13,8	10,5**	5,7 ; 17,2	Excellent
28,4	24,8 ; 32,0	34,3	25,4 ; 43,2	25,5	19,0 ; 33,0	29,8	23,6 ; 36,7	24,7*	17,6 ; 33,1	Très bon
36,5	32,7 ; 40,3	31,5	22,9 ; 40,0	35,1	28,3 ; 41,9	39,3	32,6 ; 46,0	38,4	29,9 ; 46,9	Bon
19,0	15,8 ; 22,5	13,7*	7,7 ; 21,9	19,8*	14,1 ; 26,5	16,7*	11,9 ; 22,5	25,2*	17,7 ; 33,9	Moyen
4,4*	3,0 ; 6,3	3,4**	1,0 ; 8,4	7,3**	3,9 ; 12,3	5,1**	2,6 ; 9,0	1,3**	0,0 ; 7,2	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	49,6	45,9;53,3	63,7	51,8;74,5
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	50,4	46,7;54,1	36,3*	25,5;48,2
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	41,7	34,7;48,7	44,6*	25,8;64,7
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	15,8*	11,3;21,2	13,3**	4,2;29,1
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	21,5	16,0;27,9	22,8**	9,8;41,1
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	21,0	15,5;27,4	19,3**	7,9;36,2
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	45,0	39,7;50,4	56,6*	36,3;75,4
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	11,5*	8,1;15,6	13,3**	2,8;34,5
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	13,6	10,1;17,7	15,6**	5,3;32,5
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	18,4	14,5;22,7	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	11,5*	8,2;15,6	14,5**	3,4;35,7
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	58,6	53,3;63,9	61,0	45,8;74,8
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	22,3	17,9;26,6	20,1**	8,9;36,1
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	12,6	9,3;16,7	9,0**	2,9;19,9
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	6,5*	4,2;9,5	10,0**	3,5;21,1
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	85,8	82,6;88,7	77,7	65,4;87,2
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	9,8	7,5;12,6	13,9**	6,6;24,6
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	4,4*	2,8;6,4	8,4**	2,8;18,5
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	2,0**	1,0;3,5	1,2**	0,0;7,2
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	98,0	96,5;99,0	98,8	92,8;100,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
65,8	46,2;82,2	15,7*	8,7;25,0	60,2	45,8;73,4	54,0	47,2;60,8	60,4	43,8;75,4	38,2*	22,0;56,6	51,6	41,6;61,6	Oui
34,2**	17,8;53,8	84,3	75,0;91,3	39,8*	26,6;54,2	46,0	39,2;52,8	39,6*	24,6;56,2	61,8	43,4;78,0	48,4	38,4;58,4	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
22,9**	4,3;55,8	28,8**	2,2;77,0	39,7**	20,0;62,1	44,1	32,8;55,3	26,9**	8,2;54,6	44,6**	12,7;80,3	53,0*	33,6;71,8	2 semaines et moins
8,2**	0,2;36,8	28,0**	2,2;75,9	10,9**	1,9;30,7	16,0**	8,4;26,4	23,6**	7,6;48,0	22,6**	2,0;65,2	16,0**	5,4;33,5	Plus de 2 semaines à 1 mois
35,8**	10,3;69,3	14,4**	0,3;60,6	22,7**	7,1;47,3	24,8*	15,2;36,6	22,1**	6,4;47,6	21,7**	2,1;62,5	7,6**	1,4;21,5	Plus d'un mois à 3 mois
33,1**	10,6;63,2	28,7**	2,2;76,9	26,7**	11,1;48,1	15,1**	7,7;25,8	27,4**	10,0;52,0	11,1**	0,2;51,1	23,4**	9,1;44,0	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
45,2**	14,1;79,4	60,9	50,5;71,3	58,2*	31,3;81,9	22,9*	14,4;33,4	33,4**	10,3;64,7	72,8	49,6;89,5	38,9*	24,8;54,5	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
-	;	21,6*	13,8;31,4	11,4**	1,4;35,8	1,1**	0,0;6,0	25,5**	7,0;54,2	-	;	14,9**	5,6;29,8	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
38,4**	9,7;75,1	16,3*	9,3;25,7	11,6**	1,2;38,2	7,1**	2,9;14,3	21,6**	4,6;51,3	8,9**	1,1;28,9	14,6**	6,1;27,9	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	62,5	52,5;72,6	-	;	4,7**	0,1;24,7	3,6**	0,5;11,9	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
16,4**	1,2;53,3	1,1**	0,0;6,3	18,9**	3,6;47,8	6,4**	2,6;12,7	19,5**	4,1;47,8	13,6**	2,8;34,9	28,0*	15,8;43,2	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
69,0*	44,2;87,7	30,2*	18,2;44,7	67,1	48,2;82,7	67,8	57,9;77,6	54,6*	31,3;76,6	57,1*	34,8;77,4	61,0	45,3;75,1	2 semaines et moins
21,7**	6,2;46,8	34,5*	22,4;48,3	16,3**	6,0;32,9	19,9*	12,4;29,3	26,1**	10,0;48,8	27,1**	11,2;49,1	16,9**	7,5;30,9	Plus de 2 semaines à 1 mois
4,7**	0,1;24,5	24,9*	14,0;38,8	16,5**	5,7;34,1	9,6**	4,2;18,2	10,8**	1,3;34,3	7,9**	0,7;28,8	12,1**	3,6;27,5	Plus d'un mois à 3 mois
4,7**	0,1;26,1	10,3**	4,1;20,7	-	;	2,7**	0,3;9,8	8,5**	0,8;29,1	7,9**	1,0;25,0	10,0**	2,9;23,4	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
73,8	51,4;89,7	90,0	82,4;95,0	79,9	67,1;89,4	90,2	84,2;94,5	89,7	74,6;97,4	79,9	60,7;92,5	87,0	77,9;93,3	Oui, tout à fait
23,2**	8,5;44,9	6,0**	2,3;12,7	16,7**	7,9;29,3	6,4**	3,2;11,1	8,3**	1,7;22,8	15,1**	4,9;32,2	7,9**	3,2;15,8	Oui, en partie
3,0**	0,0;17,2	4,0**	1,1;10,1	3,4**	0,5;11,2	3,4**	1,0;8,2	2,0**	0,0;10,9	5,0**	0,1;25,6	5,1**	1,4;12,6	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]
-	;	2,1**	0,2;7,5	1,7**	0,0;9,1	1,8**	0,3;5,2	-	;	2,7**	0,1;14,6	3,9**	1,0;10,0	Oui
100,0	;	97,9	92,5;99,8	98,3	90,9;100,0	98,2	94,8;99,7	100,0	;	97,3	85,4;99,9	96,1	90,0;99,0	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	21,4	18,4;24,5	14,8**	7,6;25,0
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	20,3	17,3;23,3	17,8**	9,7;28,7
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	31,0	27,3;34,7	61,6	49,0;73,2
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	22,5	19,3;25,8	2,2**	0,3;7,8
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	3,5*	2,1;5,3	3,6**	0,4;13,1
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	0,5**	0,1;1,7	-	;
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	0,7**	0,2;1,8	-	;
Façon d'annoncer le diagnostic[p]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	91,9	89,5;93,9	98,9	94,2;100,0
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	8,1	6,1;10,5	1,1**	0,0;5,8
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	95,9	94,0;97,3	95,6	89,1;98,8
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	4,1*	2,7;6,0	4,4**	1,2;10,9
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	93,4	91,2;95,3	92,7	84,8;97,3
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	6,6*	4,7;8,8	7,3**	2,7;15,2
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	96,0	94,2;97,3	96,6	90,4;99,3
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	4,0*	2,7;5,8	3,4**	0,7;9,6
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	69,2	65,6;72,7	63,0	50,4;74,4
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	30,8	27,3;34,4	37,0*	25,6;49,6
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	64,8	61,1;68,5	70,5	57,6;81,3
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	35,2	31,5;38,9	29,5*	18,7;42,4
Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	63,4	58,9;67,8	64,9	50,7;77,4
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	36,6	32,2;41,1	35,1*	22,6;49,3
Contact pour du soutien pratique[3, p, r]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	78,7	75,6;81,8	75,7	63,4;85,5
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	21,3	18,2;24,4	24,3*	14,5;36,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3. On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
13,5**	2,8;34,9	23,0*	15,5;32,1	29,3*	16,8;44,6	29,7	23,4;36,7	2,5**	0,1;12,5	21,9**	10,1;38,5	15,0*	8,7;23,4	Médecin de famille
-	;	34,6	25,7;43,6	32,2*	19,6;47,0	10,2*	6,2;15,7	19,8**	8,7;36,0	29,0**	13,9;48,5	23,8*	16,5;32,5	Médecin spécialiste du cancer
20,7**	7,5;41,1	13,9**	7,7;22,5	23,6*	13,9;35,8	39,2	32,6;45,9	30,0**	15,5;48,3	8,4**	1,4;24,8	23,7*	16,0;32,9	Chirurgien
65,8	44,4;83,3	26,4*	18,2;36,0	13,3**	5,3;25,9	11,7*	7,5;17,2	45,1*	28,0;63,1	35,4*	19,6;53,9	33,8	24,8;42,7	Autre médecin spécialiste
-	;	2,1**	0,1;10,7	1,7**	0,0;9,9	6,0**	3,1;10,4	2,5**	0,1;13,0	2,7**	0,1;14,1	2,8**	0,4;9,4	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	-	;	1,8**	0,3;5,5	-	;	-	;	-	;	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	-	;	-	;	1,3**	0,2;4,6	-	;	2,6**	0,0;15,6	0,9**	0,0;5,2	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p]
92,1	74,0;99,0	93,0	86,4;97,0	95,1	82,6;99,5	87,8	82,4;92,1	88,6	73,2;96,9	91,5	76,3;98,3	92,4	85,1;96,9	En personne
7,9**	1,0;26,0	7,0**	3,0;13,6	4,9**	0,5;17,4	12,2*	7,9;17,6	11,4**	3,1;26,8	8,5**	1,7;23,7	7,6**	3,1;14,9	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
93,3	75,7;99,4	94,9	88,7;98,2	94,4	83,2;99,0	96,2	92,5;98,4	100,0	;	94,4	80,1;99,4	97,2	91,9;99,4	Oui
6,7**	0,6;24,3	5,1**	1,8;11,3	5,6**	1,0;16,8	3,8**	1,6;7,5	-	;	5,6**	0,6;19,9	2,8**	0,6;8,1	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
89,2	70,7;97,9	93,9	87,7;97,5	94,3	82,9;99,0	93,2	88,7;96,4	100,0	;	88,4	72,7;96,8	93,8	87,0;97,7	Oui
10,8**	2,1;29,3	6,1**	2,5;12,3	5,7**	1,0;17,1	6,8**	3,6;11,3	-	;	11,6**	3,2;27,3	6,2**	2,3;13,0	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
93,3	75,7;99,4	95,9	90,2;98,8	98,3	91,1;100,0	96,0	92,2;98,3	94,2	79,3;99,4	91,4	76,3;98,3	97,1	91,7;99,4	Oui
6,7**	0,6;24,3	4,1**	1,2;9,8	1,7**	0,0;8,9	4,0**	1,7;7,8	5,8**	0,6;20,7	8,6**	1,7;23,7	2,9**	0,6;8,3	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]
77,9	59,8;90,5	80,4	71,1;87,7	69,8	56,2;81,2	82,0	75,8;87,3	55,0	38,3;70,9	57,2*	38,3;74,6	46,1	36,1;56,0	Oui
22,1**	9,5;40,2	19,6*	12,3;28,9	30,2*	18,8;43,8	18,0*	12,7;24,2	45,0*	29,1;61,7	42,8*	25,4;61,7	53,9	44,0;63,9	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]
51,9*	31,3;72,1	52,6	42,1;63,1	77,3	64,2;87,4	75,7	69,1;81,6	57,8	40,1;74,1	74,0	54,6;88,4	48,6	38,5;58,8	Oui
48,1*	27,9;68,7	47,4	36,9;57,9	22,7*	12,6;35,8	24,3	18,4;30,9	42,2*	25,9;59,9	26,0**	11,6;45,4	51,4	41,2;61,5	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]
67,7*	37,0;90,1	50,3	37,4;63,3	73,4	56,4;86,5	70,7	62,9;77,7	40,3**	19,6;64,1	81,6	58,8;95,0	45,6*	30,8;60,9	Oui
32,3**	9,9;63,0	49,7	36,7;62,6	26,6**	13,5;43,6	29,3	22,3;37,1	59,7*	35,9;80,4	18,4**	5,0;41,2	54,4	39,1;69,2	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p, r]
86,1	67,4;96,3	74,5	65,5;82,2	88,2	76,8;95,3	87,3	81,6;91,8	73,8	57,1;86,7	80,4	61,3;92,8	63,0	53,7;72,4	Oui
13,9**	3,7;32,6	25,5*	17,8;34,5	11,8**	4,7;23,2	12,7*	8,2;18,4	26,2**	13,3;42,9	19,6**	7,2;38,7	37,0	27,6;46,3	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	9,5*	6,6;13,2	9,0**	2,1;23,0
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	90,5	86,8;93,4	91,0	77,0;97,9
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	43,9	39,7;48,1	44,9*	31,5;58,3
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	56,1	51,9;60,3	55,1	41,7;68,5
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	7,5*	5,0;10,6	-	;
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	92,5	89,4;95,0	100,0	;
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	3,9**	2,1;6,4	-	;
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	96,1	93,6;97,9	100,0	;
Médecin[p, r]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	10,0	7,3;13,3	8,0**	2,1;20,0
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	90,0	86,7;92,7	92,0	80,0;97,9
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	2,6**	1,2;4,9	4,6**	0,5;15,7
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	97,4	95,1;98,8	95,4	84,3;99,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]
13,8**	1,2;45,8	5,7**	0,6;20,1	8,3**	1,6;23,5	14,0*	9,0;20,5	4,1**	0,1;21,3	3,9**	0,0;22,9	5,9**	1,3;16,0	Oui
86,2	54,2;98,8	94,3	79,9;99,4	91,7	76,5;98,4	86,0	79,5;91,0	95,9	78,7;99,9	96,1	77,1;100,0	94,1	84,0;98,7	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
52,2**	23,6;79,8	27,0*	15,8;40,8	69,3	52,3;83,2	47,1	39,6;54,5	23,3**	7,3;48,1	53,5*	31,9;74,1	30,9*	18,9;45,2	Oui
47,8**	20,2;76,4	73,0	59,2;84,2	30,7*	16,8;47,7	52,9	45,5;60,4	76,7	51,9;92,7	46,5*	25,9;68,1	69,1	54,8;81,1	Non
														Psychologue[p]
20,3**	3,3;52,8	3,9**	0,1;18,9	15,8**	5,6;32,1	9,4**	5,1;15,6	4,3**	0,1;22,6	-	;	7,2**	2,0;17,5	Oui
79,7	47,2;96,7	96,1	81,1;99,9	84,2	67,9;94,4	90,6	84,4;94,9	95,7	77,4;99,9	100,0	;	92,8	82,5;98,0	Non
														Travailleur social[p]
7,2**	0,1;37,2	1,5**	0,0;8,6	5,1**	0,5;18,7	5,4**	2,2;10,7	4,1**	0,1;21,3	-	;	5,6**	1,1;15,8	Oui
92,8	62,8;99,9	98,5	91,4;100,0	94,9	81,3;99,5	94,6	89,3;97,8	95,9	78,7;99,9	100,0	;	94,4	84,2;98,9	Non
														Médecin[p, r]
8,3**	0,2;37,9	16,2**	7,8;28,2	2,0**	0,0;11,3	8,8**	4,6;14,9	8,6**	0,9;29,1	31,8**	14,9;53,3	7,3**	2,0;17,9	Oui
91,7	62,1;99,8	83,8	71,8;92,2	98,0	88,7;100,0	91,2	85,1;95,4	91,4	70,9;99,1	68,2	46,7;85,1	92,7	82,1;98,0	Non
														Autre professionnel de la santé
-	;	1,7**	0,0;9,4	2,1**	0,0;12,1	4,4**	1,6;9,4	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	98,3	90,6;100,0	97,9	87,9;100,0	95,6	90,6;98,4	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	28,6	25,4;31,7	42,4	30,8;53,9
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	71,4	68,3;74,6	57,6	46,1;69,2
Médecin spécialiste du cancer[p, r]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	45,4	41,5;49,4	40,1*	28,3;52,0
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	54,6	50,6;58,5	59,9	48,0;71,7
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	25,2	21,8;28,7	20,7*	12,1;31,8
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	74,8	71,3;78,2	79,3	68,2;87,9
Autre médecin spécialiste[p]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	19,5	16,3;22,6	9,8**	4,0;19,1
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	80,5	77,4;83,7	90,2	80,9;96,0
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	2,7**	1,5;4,4	2,6**	0,3;9,0
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	97,3	95,6;98,5	97,4	91,0;99,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
27,1**	11,2;49,0	8,9**	4,4;15,8	49,3	34,7;64,1	34,5	28,1;40,9	18,0**	6,9;35,3	34,6*	18,4;53,9	16,1*	9,7;24,5	Oui
72,9	51,0;88,8	91,1	84,2;95,6	50,7	35,9;65,3	65,5	59,1;71,9	82,0	64,7;93,1	65,4	46,1;81,6	83,9	75,5;90,3	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p, r]
43,2*	24,1;63,9	51,9	41,6;62,2	65,8	51,2;78,5	50,2	43,1;57,3	36,5*	20,9;54,5	45,8*	27,0;65,6	27,1*	18,4;37,3	Oui
56,8*	36,1;75,9	48,1	37,8;58,4	34,2*	21,5;48,8	49,8	42,7;56,9	63,5	45,5;79,1	54,2*	34,4;73,0	72,9	62,7;81,6	Non
														Médecin de famille[p]
31,6**	15,0;52,5	22,6*	14,7;32,3	25,3*	14,5;38,8	27,9	21,8;34,8	16,0**	5,4;33,7	28,8**	13,9;47,9	26,5*	18,6;35,7	Oui
68,4	47,5;85,0	77,4	67,7;85,3	74,7	61,2;85,5	72,1	65,2;78,2	84,0	66,3;94,6	71,2	52,1;86,1	73,5	64,3;81,4	Non
														Autre médecin spécialiste[p]
10,7**	2,2;28,5	21,8*	14,2;31,1	7,3**	1,9;18,2	22,9	16,6;30,2	23,7**	11,1;41,0	31,7**	15,4;52,0	21,9*	14,5;31,1	Oui
89,3	71,5;97,8	78,2	68,9;85,8	92,7	81,8;98,1	77,1	69,8;83,4	76,3	59,0;88,9	68,3	48,0;84,6	78,1	68,9;85,5	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
3,4**	0,1;18,4	-	;	1,5**	0,0;9,4	3,6**	1,3;7,7	11,4**	3,3;26,2	3,0**	0,1;15,7	0,9**	0,0;5,1	Oui
96,6	81,6;99,9	100,0	;	98,5	90,6;100,0	96,4	92,3;98,7	88,6	73,8;96,7	97,0	84,3;99,9	99,1	94,9;100,0	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	85,9	83,1;88,6	86,3	75,8;93,5
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	8,7	6,6;11,2	9,9**	3,8;20,2
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	5,4*	3,7;7,6	3,8**	0,9;10,3
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	73,4	69,8;77,1	67,7	54,9;78,8
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	14,6	11,8;17,4	20,9*	11,8;32,9
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	12,0	9,5;14,9	11,3**	4,8;21,7
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	80,9	76,6;84,8	89,7	77,6;96,6
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	11,7	8,5;15,5	3,6**	0,4;13,2
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	7,4*	5,1;10,4	6,7**	1,3;18,8
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	58,8	54,5;63,2	68,7	55,9;79,6
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	13,6	10,5;17,1	14,5**	6,3;27,0
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	27,6	23,6;31,6	16,8**	8,6;28,3
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	36,8	32,9;40,6	39,3	28,7;49,9
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	10,7	8,3;13,1	6,1**	1,7;15,0
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	22,1	18,6;25,5	22,9*	13,5;34,6
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	9,3	7,0;11,9	7,9**	2,3;18,5
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	21,2	18,0;24,4	23,8*	14,5;35,2
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	81,3	75,2;86,5	82,5	60,6;95,1
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	14,4*	9,8;20,0	10,8**	1,8;31,0
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	4,3**	2,1;7,8	6,7**	0,7;23,3
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	18,5	15,4;21,9	10,7**	4,2;21,3
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	81,5	78,1;84,6	89,3	78,7;95,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
95,5	78,5;99,9	83,1	74,8;89,6	87,8	76,2;95,1	88,8	83,4;92,9	85,7	70,4;95,0	84,3	66,9;94,7	79,8	69,9;87,6	Oui, tout à fait
4,5**	0,1;21,5	8,9**	4,3;15,9	10,7**	3,9;22,3	9,6*	5,8;14,6	6,8**	1,3;19,1	8,3**	1,8;21,9	6,9**	2,5;14,7	Oui, en partie
-	;	7,9**	3,6;14,7	1,5**	0,0;7,9	1,6**	0,3;4,7	7,5**	1,2;22,2	7,5**	0,8;26,0	13,3**	7,1;22,0	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
81,1	61,7;93,4	77,8	68,6;85,4	74,5	61,7;84,8	77,8	70,8;83,8	61,5	44,3;76,9	77,1	57,4;90,7	66,3	54,3;76,9	Oui, tout à fait
7,6**	0,9;25,4	10,1**	5,1;17,6	17,4**	8,7;29,6	14,5*	9,8;20,4	17,3**	6,9;33,1	15,0**	4,7;32,7	13,5**	6,9;22,9	Oui, en partie
11,4**	2,1;31,3	12,1**	6,4;20,1	8,1**	2,7;17,8	7,7**	4,3;12,6	21,2**	9,2;38,5	7,9**	0,8;27,6	20,2*	11,7;31,3	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
100,0	;	72,1	59,0;83,0	82,9	66,6;93,4	77,5	69,0;84,6	66,1*	43,4;84,4	93,5	77,3;99,3	84,2	70,3;93,3	Oui
-	;	19,6**	10,5;31,8	12,9**	4,0;28,7	11,8**	6,5;19,1	21,3**	7,3;43,1	3,3**	0,1;17,0	12,3**	4,7;24,7	Non, il ne voulait pas
-	;	8,3**	2,7;18,7	4,2**	0,4;15,7	10,7*	6,0;17,3	12,6**	2,9;31,5	3,2**	0,1;17,5	3,5**	0,4;12,2	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
67,6*	39,4;88,7	53,8	42,6;64,9	70,8	53,7;84,5	55,1	46,7;63,5	46,0*	25,9;67,0	67,2	46,7;83,9	55,0	43,0;67,0	Oui, tout à fait
6,7**	0,1;34,0	8,5**	3,4;16,8	16,4**	6,1;32,7	15,8*	10,2;23,0	11,2**	2,4;29,2	3,1**	0,1;16,1	18,1**	9,3;30,3	Oui, en partie
25,7**	7,5;53,6	37,8	26,8;49,7	12,8**	4,5;26,8	29,1	21,9;37,2	42,9*	23,1;64,5	29,6**	13,7;50,4	26,8*	16,9;38,9	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
32,6**	15,0;54,7	35,2	26,2;44,3	48,4*	33,6;63,5	44,1	37,2;51,1	24,9**	12,4;41,5	36,3*	19,5;56,0	21,6*	14,0;31,0	Oui, une infirmière pivot en oncologie
7,2**	0,7;25,6	8,0**	3,6;14,9	1,7**	0,0;9,0	14,1*	9,6;19,6	10,5**	2,6;26,0	21,6**	8,7;40,6	13,4**	7,0;22,5	Oui, un autre professionnel de la santé
19,3**	6,5;39,8	14,3**	7,9;23,3	33,7*	21,6;47,6	20,2	14,8;26,4	31,3**	15,8;50,6	18,7**	6,8;37,1	23,8*	15,6;33,7	Oui, un membre du personnel administratif
8,4**	1,0;27,3	12,0**	6,5;19,7	6,2**	1,5;15,9	9,6*	6,0;14,5	2,5**	0,0;13,9	17,3**	5,9;35,7	9,1**	3,8;17,8	Oui, un médecin
32,5**	14,2;55,9	30,5	21,9;39,1	10,0**	3,7;20,8	12,0*	7,8;17,4	30,8**	15,7;49,7	6,1**	0,6;21,6	32,1	22,7;41,4	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
74,7*	32,6;97,2	79,4	59,1;92,6	70,5*	43,4;89,9	77,5	65,9;86,7	88,7	48,4;99,8	82,9	51,7;97,7	96,6	80,9;99,9	Oui, tout à fait
25,3**	2,8;67,4	20,6**	7,4;40,9	18,9**	4,3;45,0	16,5**	8,6;27,4	11,3**	0,2;51,6	8,6**	0,2;40,2	3,4**	0,1;19,1	Oui, en partie
-	;	-	;	10,6**	1,0;35,7	6,0**	1,7;14,4	-	;	8,5**	0,3;36,8	-	;	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]
-	;	25,6*	16,9;36,1	21,1**	10,7;35,1	29,1	22,5;36,4	2,4**	0,1;13,4	-	;	14,0**	7,3;23,3	Oui
100,0	;	74,4	63,9;83,1	78,9	64,9;89,3	70,9	63,6;77,5	97,6	86,6;99,9	100,0	;	86,0	76,7;92,=7	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	82,6	80,2;85,0	94,4	87,5;98,1
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	17,4	15,0;19,8	5,6**	1,9;12,5
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	29,2	25,0;33,4	4,9**	1,1;13,6
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	70,8	66,6;75,0	95,1	86,4;98,9
Lieu de la chirurgie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	90,0	87,3;92,3	94,0	86,3;98,1
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	10,0	7,7;12,7	6,0**	1,9;13,7
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	68,9	63,2;74,7	81,3	61,7;93,6
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	4,5**	2,0;8,4	8,5**	0,9;28,4
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	26,6	21,2;31,9	10,2**	2,5;25,6
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	69,3	65,1;73,5	66,6	54,7;77,1
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	14,9	11,7;18,6	19,4**	10,6;31,1
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	15,8	12,7;19,4	14,0**	6,6;25,0
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	97,5	95,7;98,7	100,0	;
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	2,5**	1,3;4,3	-	;
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	88,2	84,8;91,1	91,4	82,6;96,6
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	10,5	7,8;13,7	7,4**	2,6;16,0
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	1,3**	0,5;2,8	1,2**	0,0;6,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
92,0	73,5;99,1	58,5	50,4;66,5	40,7*	27,8;53,5	97,7	94,7;99,2	83,8	69,2;93,3	69,3	50,5;84,3	92,4	85,8;96,6	Oui
8,0**	0,9;26,5	41,5	33,5;49,6	59,3	46,5;72,2	2,3**	0,8;5,3	16,2**	6,7;30,8	30,7**	15,7;49,5	7,6**	3,4;14,2	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
11,7**	2,1;32,6	9,2**	2,3;23,0	80,3	54,7;95,0	38,1	30,4;45,9	14,5**	4,6;31,5	9,1**	1,0;30,1	43,2	32,5;53,9	Oui
88,3	67,4;97,9	90,8	77,0;97,7	19,7**	5,0;45,3	61,9	54,1;69,6	85,5	68,5;95,4	90,9	69,9;99,0	56,8	46,1;67,5	Non
														Lieu de la chirurgie[p, r]
97,0	82,6;100,0	69,7	56,4;80,9	100,0	;	93,8	89,7;96,6	94,2	81,1;99,2	91,4	72,3;98,9	85,3	76,4;91,9	Hôpital de la région de résidence
3,0**	0,0;17,4	30,3*	19,1;43,6	-	;	6,2**	3,4;10,3	5,8**	0,8;18,9	8,6**	1,1;27,7	14,7**	8,1;23,6	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
73,3*	27,4;97,7	45,5*	27,3;64,7	35,2**	9,4;69,8	72,2	62,0;81,0	51,0**	23,7;77,9	100,0	;	73,0	57,1;85,6	Oui, tout à fait
-	;	6,1**	0,6;21,1	-	;	3,6**	0,7;10,3	-	;	-	;	6,1**	1,3;16,8	Oui, en partie
26,7**	2,3;72,6	48,4*	29,8;67,3	64,8*	30,2;90,6	24,1*	15,8;34,2	49,0**	22,1;76,3	-	;	20,9**	9,5;36,8	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
78,4	54,2;93,5	68,5	54,1;80,7	69,8	47,5;86,8	66,2	59,6;72,8	73,2	52,0;88,6	81,7	59,5;94,7	71,1	59,9;80,7	Oui, tout à fait
3,1**	0,1;17,8	20,4**	10,5;33,8	-	;	19,3*	13,8;26,0	12,7**	3,2;30,8	9,2**	1,0;30,5	8,5**	3,6;16,5	Oui, en partie
18,5**	4,6;43,1	11,2**	4,0;23,2	30,2**	13,2;52,5	14,5*	10,0;20,0	14,2**	3,6;33,7	9,2**	1,1;29,7	20,4*	12,4;30,6	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
100,0	;	96,2	86,2;99,6	84,7	60,8;96,9	97,3	93,9;99,1	100,0	;	100,0	;	97,4	90,3;99,7	Oui
-	;	3,8**	0,4;13,8	15,3**	3,1;39,2	2,7**	0,9;6,1	-	;	-	;	2,6**	0,3;9,7	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
83,2	61,4;95,5	88,3	75,6;95,8	78,0	49,9;94,6	89,2	83,6;93,4	86,4	68,6;96,2	91,2	70,0;99,1	87,3	78,1;93,6	Oui, tout à fait
16,8**	4,5;38,6	11,7**	4,2;24,4	16,7**	3,2;42,9	10,3*	6,2;15,8	13,6**	3,8;31,4	4,5**	0,1;23,8	9,9**	4,5;18,2	Oui, en partie
-	;	-	;	5,3**	0,1;29,1	0,5**	0,0;3,1	-	;	4,3**	0,1;23,9	2,8**	0,3;10,1	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	41,4	38,3;44,6	50,7	39,8;61,5
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	58,6	55,4;61,7	49,3	38,5;60,2
Lieu de la chimiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	94,0	90,6;96,4	100,0	;
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	6,0*	3,6;9,4	-	;
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	70,6	65,3;75,8	67,3	51,2;80,8
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	18,5	14,1;23,5	28,2*	16,0;43,3
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	11,0*	7,6;15,2	4,5**	0,5;15,8
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	59,6	51,8;67,3	72,2	52,3;87,2
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	12,1*	7,4;18,4	13,7**	3,6;32,3
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	28,3	21,9;35,5	14,1**	4,2;31,7
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	42,5	36,6;48,4	52,2*	35,7;68,4
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	36,0	29,9;42,0	36,2*	21,3;53,4
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	21,6	16,9;26,3	11,5**	4,2;23,8
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	78,7	73,8;83,6	73,6	56,6;86,6
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	20,9	16,0;25,8	24,1**	11,4;41,4
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	0,4**	0,0;1,8	2,3**	0,1;11,3
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	90,9	86,7;94,2	91,7	79,7;97,8
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	6,6*	3,9;10,3	8,3**	2,2;20,3
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	2,5**	0,9;5,5	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
27,1**	12,7;46,2	3,8**	1,0;9,3	92,6	81,4;98,1	53,3	46,6;60,0	22,9**	11,1;38,9	67,1	49,0;82,2	23,1*	15,4;32,4	Oui
72,9	53,8;87,3	96,2	90,7;99,0	7,4**	1,9;18,6	46,7	40,0;53,4	77,1	61,1;88,9	32,9*	17,8;51,0	76,9	67,6;84,6	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p]
89,7	48,8;99,9	61,5**	4,1;99,4	89,3	76,5;96,5	98,2	93,7;99,8	77,0*	32,3;98,3	92,0	74,0;99,0	87,0	66,7;97,2	Hôpital de la région de résidence
10,3**	0,1;51,2	38,5**	0,6;95,9	10,7**	3,5;23,5	1,8**	0,2;6,3	23,0**	1,7;67,7	8,0**	1,0;26,0	13,0**	2,8;33,3	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
63,9**	25,0;92,4	100,0	;	57,4	41,0;72,7	80,7	72,7;87,2	58,3**	15,5;93,0	65,0*	42,0;83,8	65,5*	41,3;84,9	Moins de 30 minutes
25,8**	3,2;66,8	-	;	20,5**	9,7;35,6	12,9*	7,4;20,3	14,3**	0,2;62,5	18,9**	5,0;42,9	22,3**	7,7;44,4	De 30 à 60 minutes
10,3**	0,1;51,2	-	;	22,1**	10,3;38,6	6,4**	2,8;12,4	27,4**	2,2;74,8	16,1**	4,6;36,0	12,2**	2,4;32,7	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
78,5**	15,3;99,9	100,0	;	47,5*	27,2;68,5	63,7	49,7;76,1	14,8**	0,1;66,2	60,9*	30,1;86,3	46,7**	18,9;76,1	Oui, tout à fait
-	;	-	;	13,8**	3,6;32,8	14,3**	6,5;26,0	18,1**	0,3;71,7	5,9**	0,1;30,7	6,4**	0,2;30,3	Oui, en partie
21,5**	0,1;84,7	-	;	38,6**	20,0;60,1	22,0*	12,5;34,3	67,1**	16,4;97,8	33,2**	10,2;64,2	46,9**	19,1;76,2	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
43,8**	11,0;81,4	34,1**	0,3;94,8	37,2*	21,5;55,2	41,9	32,7;51,0	30,5**	1,9;81,6	38,7**	18,5;62,1	45,1*	23,0;68,7	Moins de 30 minutes
25,3**	2,8;67,5	38,5**	0,6;95,9	35,7*	20,4;53,5	36,0	27,0;45,0	42,5**	7,8;84,2	31,9**	13,2;56,2	42,2**	20,5;66,2	De 30 à 60 minutes
30,9**	6,3;68,1	27,4**	0,0;94,5	27,0**	13,9;44,0	22,2*	15,1;30,6	27,0**	1,9;75,5	29,4**	12,0;52,7	12,8**	2,8;32,7	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
58,3**	20,5;89,8	100,0	;	84,6	69,8;94,0	79,0	70,1;86,3	61,7**	20,5;92,9	74,3	51,0;90,6	90,9	70,4;98,9	Oui, tout à fait
41,7**	10,2;79,5	-	;	15,4**	6,0;30,2	21,0*	13,7;29,9	38,3**	7,1;79,5	25,7**	9,4;49,0	9,1**	1,1;29,6	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
79,4*	40,4;97,9	100,0	;	93,8	82,6;98,8	91,6	84,6;96,1	64,3**	22,2;94,1	92,7	65,6;99,8	91,0	69,7;99,0	Oui, tout à fait
20,6**	2,1;59,6	-	;	4,3**	0,4;15,5	5,5**	2,1;11,5	25,1**	2,2;69,7	-	;	9,0**	1,0;30,3	Oui, en partie
-	;	-	;	1,9**	0,1;9,8	2,9**	0,6;8,3	10,6**	0,1;54,5	7,3**	0,2;34,4	-	;	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	49,5	47,0;52,0	14,8**	7,7;24,9
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	50,5	48,0;53,0	85,2	75,1;92,3
Lieu de la radiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	87,1	83,1;90,5	100,0	;
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	12,9	9,5;16,9	-	;
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	48,9	43,4;54,3	36,7**	11,6;68,7
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	32,6	27,2;38,0	49,0**	19,5;79,1
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	18,6	14,7;23,0	14,3**	1,6;43,9
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	68,8	62,1;75,5	71,5*	35,5;94,2
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	10,2*	6,2;15,6	9,0**	0,1;46,3
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	21,0	15,6;26,4	19,5**	2,3;55,6
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	82,6	77,8;86,8	100,0	;
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	13,1	9,5;17,5	-	;
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	4,2**	2,2;7,2	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
33,5**	16,4;54,5	47,4	39,3;55,5	35,3*	22,1;50,3	83,9	78,6;88,3	78,2	61,7;90,0	39,3*	22,9;57,5	21,2*	14,3;29,5	Oui
66,5	45,5;83,6	52,6	44,5;60,7	64,7	49,7;77,9	16,1	11,7;21,4	21,8**	10,0;38,3	60,7	42,5;77,1	78,8	70,5;85,7	Non
														Lieu de la radiothérapie[p]
100,0	;	79,5	65,1;90,0	88,5	62,4;98,8	85,9	79,2;91,1	91,3	76,2;98,3	80,1	48,8;96,6	96,0	78,7;99,9	Hôpital de la région de résidence
-	;	20,5**	10,0;34,9	11,5**	1,2;37,6	14,1*	8,9;20,8	8,7**	1,7;23,8	19,9**	3,4;51,2	4,0**	0,1;21,3	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
64,1**	25,1;92,6	38,6*	24,1;54,8	73,0	46,9;90,9	51,9	44,2;59,6	45,3*	26,9;64,7	41,0**	15,0;71,4	34,5**	15,4;58,2	Moins de 30 minutes
35,9**	7,4;74,9	35,5*	21,7;51,2	22,3**	6,0;49,1	30,8	23,2;38,4	23,6**	10,0;42,9	38,6**	12,7;70,5	46,8*	25,0;69,5	De 30 à 60 minutes
-	;	25,9**	13,5;41,9	4,7**	0,1;25,6	17,3*	11,9;23,9	31,1**	15,0;51,3	20,5**	3,4;53,0	18,7**	5,1;41,9	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
79,8**	21,6;99,8	78,2	59,7;91,0	73,1*	39,1;94,3	66,3	56,7;75,9	47,4**	22,6;73,3	80,8*	43,5;98,0	71,1*	43,4;90,6	Oui, tout à fait
-	;	9,1**	1,7;25,6	20,0**	2,9;53,8	12,3**	6,4;20,8	5,9**	0,1;30,5	-	;	5,8**	0,1;30,2	Oui, en partie
20,2**	0,2;78,4	12,7**	3,5;29,6	6,9**	0,2;33,4	21,4*	13,7;30,8	46,7**	22,3;72,3	19,2**	2,0;56,5	23,1**	5,7;52,0	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
100,0	;	79,8	64,1;90,8	95,4	76,1;99,9	77,7	70,1;84,2	91,4	76,6;98,2	67,5*	34,7;91,1	90,8	71,2;98,8	Oui, tout à fait
-	;	17,6**	7,6;32,4	-	;	18,0*	12,1;25,3	6,0**	0,7;20,9	13,7**	1,1;45,8	5,0**	0,2;22,7	Oui, en partie
-	;	2,6**	0,1;13,4	4,6**	0,1;23,9	4,3**	1,8;8,7	2,6**	0,1;14,0	18,8**	2,1;54,2	4,2**	0,1;23,0	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Douleur et malaises ressentis[p, r]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	62,6	58,8;66,4	63,0	50,1;74,6
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	37,4	33,6;41,2	37,0*	25,4;49,9
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	30,3	25,4;35,2	40,0*	25,8;55,7
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	36,1	30,5;41,6	30,6*	17,5;46,6
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	33,7	28,5;38,8	29,3*	16,1;45,7
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	81,3	76,8;85,2	88,0	74,8;95,8
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	15,1	11,6;19,1	9,4**	2,7;22,1
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	3,6**	1,8;6,5	2,7**	0,1;13,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p, r]
69,4	47,8;86,2	43,2	32,6;53,7	87,0	74,6;94,7	69,8	63,1;76,6	56,1*	38,0;73,0	52,8*	34,7;70,4	55,3	44,9;65,8	Oui
30,6**	13,8;52,2	56,8	46,3;67,4	13,0**	5,3;25,4	30,2	23,4;36,9	43,9*	27,0;62,0	47,2*	29,6;65,3	44,7	34,2;55,1	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
20,4**	4,9;47,3	23,0**	10,4;40,6	23,9**	11,7;40,4	30,2	22,2;38,1	23,8**	8,0;47,8	51,9*	29,6;73,7	32,5*	20,1;47,1	Sévères
50,6*	26,0;75,0	33,2*	18,1;51,3	43,5*	28,3;59,6	35,4	26,7;44,0	34,9**	14,3;60,7	21,3**	5,8;46,7	37,5*	24,2;52,4	Modérés
29,0**	10,3;55,1	43,8*	26,8;62,0	32,6*	18,6;49,3	34,5	26,1;42,9	41,3**	18,4;67,3	26,8**	9,0;52,6	29,9*	17,5;45,0	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
90,1	66,4;99,1	89,4	74,9;97,0	86,2	72,8;94,6	76,4	67,9;83,5	67,2*	42,8;86,3	89,4	65,9;98,8	77,4	62,7;88,5	Oui, tout à fait
9,9**	0,9;33,6	10,6**	3,0;25,1	11,8**	4,2;24,8	17,3*	10,9;25,4	27,8**	10,2;52,5	10,6**	1,2;34,1	18,9**	9,0;33,0	Oui, en partie
-	;	-	;	2,0**	0,1;10,5	6,4**	2,7;12,4	5,0**	0,1;27,0	-	;	3,6**	0,1;19,2	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	91,0	87,8;93,6	93,7	84,2;98,3
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	5,4*	3,5;8,0	3,1**	0,4;10,5
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	3,6**	2,0;6,0	3,3**	0,4;11,7
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	7,5*	5,4;10,1	4,9**	1,5;11,6
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	92,5	89,9;94,6	95,1	88,4;98,5
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	76,6	73,0;80,2	79,0	66,7;88,3
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	22,6	19,0;26,1	19,6**	10,6;31,7
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	0,8**	0,3;1,9	1,4**	0,0;7,8
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	65,3	61,4;69,1	69,9	57,5;80,4
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	34,7	30,9;38,6	30,1*	19,6;42,5
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p, r]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	25,4	22,0;28,8	19,7*	11,3;30,9
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	19,3	16,2;22,5	15,0**	7,3;26,2
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	55,2	51,5;58,9	65,2	52,7;76,5
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	75,7	71,8;79,5	73,9	61,7;83,9
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	18,2	14,8;22,0	19,5**	10,5;31,4
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	6,1*	4,3;8,5	6,6**	2,1;15,0
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	62,5	57,4;67,7	78,0	62,9;89,0
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	37,5	32,3;42,6	22,0**	11,0;37,1
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	91,8	89,4;93,8	91,2	80,4;97,1
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	7,4	5,5;9,7	4,8**	0,9;14,0
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	0,8**	0,2;2,1	4,0**	0,4;14,6

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
90,4	67,2;99,1	94,1	83,8;98,8	96,5	87,8;99,6	90,5	84,3;94,8	85,4	65,9;96,1	92,2	72,3;99,3	85,5	72,6;93,9	Oui, tout à fait
9,6**	0,9;32,8	4,0**	0,5;13,0	3,5**	0,4;12,2	5,4**	2,4;10,2	7,7**	0,9;25,6	-	;	9,9**	3,0;22,4	Oui, en partie
-	;	1,9**	0,0;10,8	-	;	4,1**	1,3;9,6	7,0**	0,9;22,9	7,8**	0,7;27,7	4,6**	0,9;13,6	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
-	;	12,6**	6,5;21,5	10,1**	3,1;22,8	8,7*	5,3;13,5	7,8**	1,8;20,4	3,1**	0,0;17,8	4,7**	1,5;10,6	Oui
100,0	;	87,4	78,5;93,5	89,9	77,2;96,9	91,3	86,5;94,7	92,2	79,6;98,2	96,9	82,2;100,0	95,3	89,4;98,5	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
68,6	46,2;86,1	81,2	70,9;89,1	72,6	58,0;84,4	77,4	70,9;83,1	83,0	66,3;93,6	65,1	44,9;81,9	75,1	64,3;84,1	Oui, toujours
31,4**	13,9;53,8	16,5**	9,2;26,5	27,4*	15,6;42,0	22,6	16,9;29,1	14,1**	4,7;30,1	31,8**	15,8;51,6	24,9*	15,9;35,7	Oui, la plupart du temps
-	;	2,2**	0,3;7,5	-	;	-	;	2,9**	0,1;15,8	3,1**	0,1;17,6	-	;	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
48,4*	29,0;68,2	53,4	43,0;63,8	85,8	73,3;93,9	79,8	73,4;85,2	41,7*	25,5;59,3	73,2	54,5;87,3	43,4	33,5;53,4	Oui
51,6*	31,8;71,0	46,6	36,2;57,0	14,2**	6,1;26,7	20,2	14,8;26,6	58,3	40,7;74,5	26,8**	12,7;45,5	56,6	46,6;66,5	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p, r]
22,6**	8,5;43,4	17,4*	10,4;26,4	29,4*	17,4;43,9	38,0	30,8;45,1	19,2**	8,2;35,3	16,9**	6,3;33,6	16,5*	9,6;25,6	Oui
14,4**	3,3;35,6	17,0*	9,9;26,3	31,9*	18,6;47,9	20,7	15,0;27,3	17,9**	7,5;33,7	34,1*	18,4;52,8	12,1**	6,2;20,6	Non, mais il aurait aimé l'être
63,1*	41,4;81,4	65,7	56,1;75,2	38,7*	24,3;54,6	41,4	34,1;48,7	62,9	45,1;78,4	49,0*	30,7;67,5	71,4	61,3;80,1	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
64,1*	39,1;84,5	79,4	67,4;88,5	69,1	51,7;83,3	72,1	64,2;79,1	92,5	74,8;99,1	70,5	48,3;87,3	84,2	74,3;91,4	Oui, tout à fait
18,7**	4,1;45,2	13,3**	6,3;23,6	26,8**	13,4;44,3	21,0*	14,8;28,4	3,6**	0,1;18,1	25,8**	10,3;47,6	13,3**	6,6;23,0	Oui, en partie
17,2**	4,3;40,4	7,4**	2,4;16,6	4,1**	0,6;13,4	6,9**	3,4;12,0	4,0**	0,1;21,5	3,7**	0,1;20,3	2,5**	0,3;8,5	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
83,3	57,9;96,6	59,7	40,8;76,7	65,8	49,5;79,7	56,1	46,9;65,3	51,6*	26,2;76,4	54,0*	33,8;73,4	63,6	48,2;77,2	Oui
16,7**	3,4;42,1	40,3*	23,3;59,2	34,2*	20,3;50,5	43,9	34,7;53,1	48,4**	23,6;73,8	46,0*	26,6;66,2	36,4*	22,8;51,8	Non
														Patient traité de manière respectueuse
96,4	80,8;99,9	96,6	90,2;99,3	90,0	78,7;96,5	89,1	83,9;93,0	86,9	71,3;95,9	100,0	;	92,5	85,3;96,9	Oui, toujours
3,6**	0,1;19,2	2,3**	0,3;8,2	10,0**	3,5;21,3	10,5*	6,5;15,6	13,1**	4,1;28,7	-	;	7,5**	3,1;14,7	Oui, la plupart du temps
-	;	1,1**	0,0;5,7	-	;	0,5**	0,0;2,5	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	3,2*	1,8;5,1	2,8**	0,3;10,1
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	5,7*	3,9;8,0	2,8**	0,3;10,3
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	1,9**	1,0;3,4	-	;
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	89,2	86,3;91,7	94,4	86,0;98,5
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	74,6	71,1;78,1	68,0	54,4;79,7
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	19,0	15,8;22,4	21,3**	11,6;34,0
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	6,4*	4,5;8,8	10,7**	4,2;21,2
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	89,1	86,3;91,5	92,2	83,4;97,2
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	10,2	7,9;13,0	7,8**	2,8;16,6
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	0,6**	0,2;1,7	-	;
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	69,4	63,4;75,3	88,7	69,0;97,9
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	30,6	24,7;36,6	11,3**	2,1;31,0
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	4,9*	3,3;7,0	5,1**	1,5;12,3
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	95,1	93,0;96,7	94,9	87,7;98,5
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	71,1	66,3;76,0	78,5	64,1;89,2
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	7,8*	5,4;10,9	2,2**	0,1;11,3
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	21,1	16,5;25,6	19,3**	9,2;33,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
3,9**	0,1;20,6	3,8**	0,8;10,7	2,6**	0,1;13,8	2,8**	0,8;6,9	-	;	-	;	6,0**	1,9;13,9	Oui, souvent
3,9**	0,1;20,2	6,0**	1,9;14,0	11,4**	4,3;23,3	6,1**	3,0;10,7	5,7**	0,6;20,5	2,9**	0,1;15,3	4,7**	1,3;11,5	Oui, parfois
4,9**	0,1;24,1	1,2**	0,0;6,1	1,8**	0,0;9,5	2,7**	0,9;6,2	2,7**	0,1;14,4	2,9**	0,1;16,3	1,0**	0,0;5,4	Oui, une seule fois
87,3	67,3;97,3	88,9	79,5;95,0	84,2	70,7;93,2	88,4	82,7;92,8	91,6	76,3;98,4	94,2	79,9;99,4	88,3	79,3;94,3	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
82,9	60,0;95,7	78,0	67,6;86,4	61,3	46,1;75,0	76,7	69,9;82,6	81,7	65,6;92,5	68,4	49,8;83,6	77,1	66,8;85,5	Oui, toujours
17,1**	4,3;40,0	17,4*	9,7;27,7	30,1*	17,2;45,9	17,2*	12,2;23,1	11,1**	3,1;26,1	19,6**	7,6;37,8	19,0*	11,2;29,1	Oui, la plupart du temps
-	;	4,6**	1,2;11,5	8,6**	2,5;20,1	6,1**	3,1;10,8	7,1**	1,5;19,6	11,9**	3,3;27,8	3,9**	1,1;9,7	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
91,6	72,4;99,0	89,7	81,8;94,9	81,8	68,5;91,3	85,8	80,2;90,4	100,0	;	89,5	72,2;97,8	92,0	84,6;96,6	Oui, toujours
8,4**	1,0;27,6	9,1**	4,2;16,8	16,4**	7,4;29,6	13,7*	9,2;19,3	-	;	7,6**	1,0;24,7	8,0**	3,4;15,4	Oui, la plupart du temps
-	;	1,2**	0,0;6,8	1,8**	0,0;11,1	0,5**	0,0;2,8	-	;	2,8**	0,1;14,7	-	;	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]
100,0	;	60,5*	40,6;78,3	73,0	52,7;88,0	62,3	50,6;73,0	63,0**	27,6;90,3	59,5*	34,8;81,2	69,1	50,6;84,0	Oui
-	;	39,5*	21,7;59,4	27,0**	12,0;47,3	37,7	27,0;49,4	37,0**	9,7;72,4	40,5**	18,8;65,2	30,9**	16,0;49,4	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
3,1**	0,1;17,1	1,1**	0,0;5,8	8,7**	2,7;19,8	4,8**	2,2;8,9	4,1**	0,1;20,3	5,8**	0,6;20,4	6,4**	2,2;13,9	Oui
96,9	82,9;99,9	98,9	94,2;100,0	91,3	80,2;97,3	95,2	91,1;97,8	95,9	79,7;99,9	94,2	79,6;99,4	93,6	86,1;97,8	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
89,2	64,1;98,9	61,3	44,4;76,4	81,3	65,2;92,1	65,9	57,4;74,4	79,7	58,2;93,3	65,4*	42,7;84,0	71,1	57,9;82,2	Oui, tout à fait
5,4**	0,1;28,8	2,6**	0,1;14,6	8,0**	1,6;22,2	12,9*	7,8;19,6	-	;	12,8**	2,4;34,7	6,5**	1,6;16,9	Oui, en partie
5,4**	0,1;30,5	36,1*	21,5;52,9	10,7**	3,2;24,5	21,2*	14,2;29,8	20,3**	6,7;41,8	21,8**	7,5;43,8	22,3*	12,5;35,1	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	84,6	81,4;87,5	91,5	81,0;97,2
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	15,4	12,5;18,6	8,5**	2,8;19,0
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	12,9	10,1;16,1	10,4**	4,2;20,5
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	87,1	83,9;89,9	89,6	79,5;95,8
Médecin spécialiste[p]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	12,9	10,3;15,9	4,2**	0,9;11,6
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	87,1	84,1;89,7	95,8	88,4;99,1
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	33,1	29,6;36,6	38,3	27,2;50,4
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	66,9	63,4;70,4	61,7	49,6;72,8
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	10,0	7,7;12,6	7,2**	2,4;16,0
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	90,0	87,4;92,3	92,8	84,0;97,6
CLSC[p, r]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	22,4	18,9;25,9	33,3*	21,8;46,5
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	77,6	74,1;81,1	66,7	53,5;78,2
Urgence d'un hôpital[p, r]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	29,4	25,6;33,2	43,9	31,2;56,6
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	70,6	66,8;74,4	56,1	43,4;68,8
Unité de soins d'un hôpital[p]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	8,7	6,4;11,5	9,2**	3,3;19,4
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	91,3	88,5;93,6	90,8	80,6;96,7
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	4,2*	2,7;6,1	3,9**	0,9;10,8
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	95,8	93,9;97,3	96,1	89,2;99,1
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	0,7**	0,2;1,7	1,3**	0,0;6,8
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	99,3	98,3;99,8	98,7	93,2;100,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]
86,6	65,5;97,2	82,3	72,3;89,8	93,1	79,8;98,8	86,0	80,2;90,7	73,6	55,8;87,1	89,7	71,0;98,2	75,3	64,7;84,1	Oui
13,4**	2,8;34,5	17,7*	10,2;27,7	6,9**	1,2;20,2	14,0*	9,3;19,8	26,4**	12,9;44,2	10,3**	1,8;29,0	24,7*	15,9;35,3	Non
														Médecin de famille[p]
12,8**	2,4;34,4	19,5*	11,6;29,7	7,4**	1,9;18,5	11,8*	7,5;17,6	11,4**	2,6;29,0	7,6**	1,0;24,5	16,7*	9,4;26,5	Oui
87,2	65,6;97,6	80,5	70,3;88,4	92,6	81,5;98,1	88,2	82,4;92,5	88,6	71,0;97,4	92,4	75,5;99,0	83,3	73,5;90,6	Non
														Médecin spécialiste[p]
7,9**	0,9;26,5	19,7*	11,4;30,7	19,4**	9,2;34,0	15,7*	10,8;21,7	8,4**	1,5;24,2	5,8**	0,7;19,7	9,1**	3,6;18,2	Oui
92,1	73,5;99,1	80,3	69,3;88,6	80,6	66,0;90,8	84,3	78,3;89,2	91,6	75,8;98,5	94,2	80,3;99,3	90,9	81,8;96,4	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
29,4**	12,9;51,0	16,4*	9,4;25,8	49,4	34,7;64,2	40,9	34,0;47,7	14,2**	4,3;31,7	47,0*	29,1;65,5	22,0*	13,8;32,3	Oui
70,6	49,0;87,1	83,6	74,2;90,6	50,6	35,8;65,3	59,1	52,3;66,0	85,8	68,3;95,7	53,0*	34,5;70,9	78,0	67,7;86,2	Non
														Info-Santé[p]
17,1**	4,3;40,0	6,7**	2,4;14,3	10,8**	3,8;22,8	11,6*	7,5;16,7	11,4**	3,0;27,6	5,1**	0,6;17,6	10,5**	4,9;19,0	Oui
82,9	60,0;95,7	93,3	85,7;97,6	89,2	77,2;96,2	88,4	83,3;92,5	88,6	72,4;97,0	94,9	82,4;99,4	89,5	81,0;95,1	Non
														CLSC[p, r]
9,1**	0,9;30,9	30,7*	21,1;40,3	9,1**	3,0;20,0	19,4*	13,8;25,9	30,4**	15,5;49,1	17,6**	6,8;34,4	23,3*	14,7;33,9	Oui
90,9	69,1;99,1	69,3	59,7;78,9	90,9	80,0;97,0	80,6	74,1;86,2	69,6	50,9;84,5	82,4	65,6;93,2	76,7	66,1;85,3	Non
														Urgence d'un hôpital[p, r]
27,0**	10,3;50,3	13,0**	7,1;21,3	41,7*	27,7;56,7	26,7	20,5;33,7	6,0**	0,6;20,9	34,0*	19,1;51,6	39,4	28,9;50,0	Oui
73,0	49,7;89,7	87,0	78,7;92,9	58,3	43,3;72,3	73,3	66,3;79,5	94,0	79,1;99,4	66,0	48,4;80,9	60,6	50,0;71,1	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p]
3,8**	0,1;21,3	5,4**	1,7;12,4	9,7**	3,3;21,0	10,2*	6,1;15,6	8,9**	2,0;23,6	14,7**	5,1;30,6	7,1**	2,6;15,2	Oui
96,2	78,7;99,9	94,6	87,6;98,3	90,3	79,0;96,7	89,8	84,4;93,9	91,1	76,4;98,0	85,3	69,4;94,9	92,9	84,8;97,4	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
3,3**	0,1;17,3	-	;	6,6**	1,4;18,0	6,6**	3,5;11,0	2,8**	0,1;14,6	5,8**	0,7;19,8	2,1**	0,3;7,3	Oui
96,7	82,7;99,9	100,0	;	93,4	82,0;98,6	93,4	89,0;96,5	97,2	85,4;99,9	94,2	80,2;99,3	97,9	92,7;99,7	Non
														Autre contact
-	;	-	;	1,6**	0,0;9,3	1,1**	0,1;4,1	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	98,4	90,7;100,0	98,9	95,9;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	68,9	64,7;73,1	72,1	56,7;84,5
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	14,9	11,6;18,7	15,9**	6,6;30,3
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	16,2	13,1;19,8	12,0**	3,8;26,4
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	53,7	48,8;58,5	52,8	37,0;68,1
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	15,6	12,2;19,5	16,5**	7,3;30,1
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	30,7	26,6;34,9	30,8*	17,7;46,6
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	50,3	45,8;54,9	56,5	41,4;70,8
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	19,8	16,4;23,7	14,3**	5,4;28,7
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	29,8	26,0;33,6	29,2*	17,3;43,6
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	48,0	42,8;53,2	47,5*	31,5;63,8
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	15,6	12,3;19,4	12,8**	4,4;27,1
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	36,4	31,6;41,2	39,7*	24,9;56,1
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	56,2	51,7;60,8	66,2	52,5;78,2
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	18,3	14,9;22,1	14,0**	6,2;25,9
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	25,5	21,7;29,3	19,8**	10,5;32,2
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	54,8	50,1;59,5	63,7	48,5;77,1
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	23,1	18,9;27,2	17,4**	7,7;31,8
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	22,1	18,1;26,1	18,9**	9,0;33,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
75,1	48,5;92,4	52,1	39,6;64,5	71,6	57,3;83,3	75,2	68,0;81,4	68,1	45,8;85,6	63,4	42,4;81,2	63,7	50,4;75,7	Oui, tout à fait
-	;	9,9**	3,7;20,3	18,9**	8,5;33,9	14,6*	9,8;20,6	15,2**	3,6;37,2	21,6**	8,2;41,6	16,9**	8,0;29,8	Oui, en partie
24,9**	7,6;51,5	38,0*	25,8;51,5	9,5**	3,0;21,2	10,2*	6,3;15,5	16,7**	4,5;38,1	15,0**	4,2;34,3	19,4**	10,1;31,9	Non
														La sexualité[p]
65,4*	41,9;84,4	68,9	58,8;79,0	59,6	42,8;74,9	49,9	41,6;58,2	29,9**	12,1;53,7	46,0*	25,3;67,7	47,0	33,5;60,6	Oui, tout à fait
4,2**	0,1;22,6	16,3*	9,3;25,6	17,4**	6,8;33,6	16,7*	10,9;24,0	13,0**	2,7;33,9	11,7**	2,0;32,8	16,4**	7,5;29,6	Oui, en partie
30,4**	12,4;54,2	14,8**	7,9;24,3	23,1**	11,7;38,3	33,4	26,0;40,8	57,0*	33,8;78,2	42,3*	23,4;63,1	36,6*	23,6;51,1	Non
														Les émotions[p]
48,5*	25,0;72,5	47,4	35,8;59,0	56,6	41,4;71,0	52,0	43,9;60,0	50,8*	30,5;71,0	45,3*	26,2;65,6	42,3	30,4;54,2	Oui, tout à fait
28,6**	10,5;53,6	13,3**	6,3;23,7	32,1*	19,8;46,7	21,2*	15,0;28,5	22,0**	8,2;42,6	16,9**	5,8;35,1	15,7**	7,9;26,7	Oui, en partie
22,9**	6,4;49,4	39,3	27,9;51,6	11,3**	4,1;23,2	26,8	20,3;34,2	27,2**	11,6;48,4	37,7*	20,0;58,3	42,0	29,9;54,2	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
57,0*	30,9;80,6	48,1	36,4;59,8	53,0	37,5;68,1	50,3	41,8;58,9	37,5**	18,1;60,4	42,6**	21,6;65,7	41,2*	27,2;56,3	Oui, tout à fait
5,2**	0,1;27,4	15,1**	7,8;25,4	31,4*	18,3;47,1	15,8*	10,3;22,8	8,7**	0,9;29,4	11,9**	2,2;32,7	10,9**	4,0;22,6	Oui, en partie
37,8**	15,9;64,2	36,8*	25,3;49,4	15,6**	6,6;29,2	33,8	26,0;41,7	53,8*	31,2;75,3	45,5*	24,2;68,1	47,9*	33,1;62,9	Non
														Les besoins alimentaires[p]
62,7*	37,6;83,6	51,5	38,8;64,1	61,1	45,5;75,2	52,2	44,9;59,5	69,2	47,8;85,8	59,4*	38,5;78,0	49,0	36,1;62,0	Oui, tout à fait
14,3**	2,8;37,4	14,5**	6,6;26,4	25,3**	13,4;40,7	20,6	15,1;27,1	13,6**	3,6;32,0	13,6**	3,2;33,8	19,7**	10,7;31,7	Oui, en partie
23,0**	6,9;48,5	34,0*	22,7;46,9	13,6**	6,0;25,2	27,1	20,8;34,1	17,2**	5,2;37,4	27,0**	12,1;47,0	31,3*	19,5;45,2	Non
														Les activités courantes[p]
66,0*	39,3;86,9	41,5*	28,3;54,7	58,2	42,4;72,9	56,6	48,7;64,5	64,9	45,1;81,6	49,4*	26,8;72,1	46,6	33,2;59,9	Oui, tout à fait
4,3**	0,1;22,5	20,3**	9,9;34,7	31,0*	17,7;47,1	23,2*	16,5;31,0	26,0**	11,8;45,1	15,7**	3,8;37,6	30,6*	19,1;44,3	Oui, en partie
29,7**	10,3;56,6	38,2*	25,2;52,6	10,8**	4,0;22,1	20,2*	14,2;27,4	9,1**	1,8;25,0	34,9**	15,4;59,0	22,8**	12,0;37,1	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	92,4	89,9;94,5	88,8	78,6;95,2
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	6,8*	4,9;9,2	11,2**	4,8;21,4
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	0,7**	0,2;1,9	-	;
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	73,7	70,0;77,4	71,3	58,2;82,3
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	24,0	20,3;27,6	28,7*	17,7;41,8
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	1,5**	0,7;2,7	-	;
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	0,9**	0,3;1,9	-	;
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	73,6	69,9;77,4	72,3	60,0;82,6
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	15,4	12,5;18,6	12,5**	6,0;22,1
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	11,0	8,4;14,0	15,2**	7,4;26,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
95,1	74,6;99,9	96,7	90,6;99,3	89,0	76,3;96,3	92,0	86,9;95,6	94,4	80,1;99,5	91,5	76,8;98,2	92,9	84,4;97,6	Oui, tout à fait
4,9**	0,1;25,4	3,3**	0,7;9,4	9,3**	2,7;21,9	8,0**	4,4;13,1	5,6**	0,5;19,9	5,6**	0,6;19,2	4,4**	1,2;11,1	Oui, en partie
-	;	-	;	1,6**	0,0;9,4	-	;	-	;	3,0**	0,1;15,6	2,6**	0,3;9,7	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
59,2*	36,8;79,1	85,2	76,0;91,9	71,2	57,2;82,7	69,0	62,4;75,7	81,1	64,5;92,3	78,6	60,7;91,0	75,5	64,7;84,3	Toujours
40,8**	20,9;63,2	11,5**	5,5;20,4	22,2**	11,7;36,0	28,7	22,4;35,8	15,5**	5,5;31,9	15,5**	5,2;32,5	24,5*	15,7;35,3	La plupart du temps
-	;	1,1**	0,0;5,7	3,3**	0,4;11,3	1,6**	0,3;4,3	3,4**	0,1;16,9	5,9**	0,7;20,1	-	;	À l'occasion
-	;	2,2**	0,3;7,5	3,3**	0,3;13,2	0,7**	0,0;3,3	-	;	-	;	-	;	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
88,9	68,3;98,1	71,4	61,4;80,1	66,4	51,1;79,6	77,7	71,2;83,2	65,9	47,1;81,7	71,8	50,5;87,8	71,6	61,4;80,4	Oui, tout à fait
8,1**	0,8;28,1	18,9*	11,7;28,0	26,4**	14,2;42,0	13,3*	8,9;18,8	27,7**	13,7;45,8	22,2**	8,6;42,2	7,8**	3,2;15,4	Oui, en partie
3,1**	0,1;17,3	9,7**	4,8;17,0	7,1**	1,7;18,4	9,1*	5,3;14,3	6,4**	0,8;21,2	6,0**	0,6;21,6	20,6*	12,7;30,6	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	85,2	82,4;88,0	93,6	85,1;98,1
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	8,0	5,9;10,6	2,6**	0,2;9,8
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	6,8*	4,8;9,3	3,8**	0,7;11,0
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	90,3	87,4;92,8	92,2	82,5;97,5
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	6,8*	4,7;9,5	5,3**	1,0;15,1
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	2,8*	1,6;4,6	2,5**	0,3;9,3
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	85,4	80,5;89,4	93,1	81,6;98,5
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	7,7*	4,7;11,8	2,2**	0,0;12,1
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	6,9*	4,3;10,4	4,7**	0,6;15,8
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	70,0	64,9;75,1	81,2*	43,1;98,3
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	12,5	9,1;16,7	-	;
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	17,5	13,3;22,3	18,8**	1,7;56,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
100,0	;	71,0	60,0;80,4	86,2	73,3;94,4	84,7	78,5;89,7	92,5	80,3;98,3	84,3	66,8;94,8	85,6	76,8;92,0	Aucun report
-	;	15,1**	8,1;24,8	9,2**	3,0;20,3	8,2*	4,7;13,3	2,5**	0,1;12,7	9,2**	1,6;26,2	8,3**	3,6;15,9	Un report
-	;	13,9**	6,9;23,9	4,6**	0,6;15,6	7,0**	3,8;11,7	5,0**	0,7;16,0	6,5**	0,8;21,5	6,1**	2,2;13,0	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
89,4	70,0;98,2	75,2	60,5;86,5	90,4	69,7;98,8	95,8	92,1;98,1	90,3	73,1;98,2	86,8	65,7;97,3	88,3	79,7;94,1	Aucun report
10,6**	1,8;30,0	21,3**	10,7;35,8	-	;	4,2**	1,9;7,9	6,6**	0,7;23,3	-	;	6,7**	2,4;14,3	Un report
-	;	3,5**	0,4;12,2	9,6**	1,2;30,3	-	;	3,1**	0,1;16,2	13,2**	2,7;34,3	5,0**	1,6;11,7	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
88,2	46,2;99,8	78,5**	11,8;100,0	84,1	71,8;92,5	86,0	77,1;92,3	69,3*	29,9;94,6	82,5	59,9;95,4	81,8	58,1;95,3	Aucun report
-	;	21,5**	0,0;88,2	12,2**	4,8;24,2	7,7**	3,2;15,0	11,0**	0,1;55,6	-	;	14,1**	2,9;36,6	Un report
11,8**	0,2;53,8	-	;	3,7**	0,4;13,2	6,4**	2,6;12,6	19,7**	1,9;58,4	17,5**	4,6;40,1	4,1**	0,1;21,2	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
76,2*	33,4;97,8	44,2*	28,9;60,3	71,5	45,9;89,8	73,6	66,0;80,4	81,4	62,5;93,4	54,1**	24,2;81,9	78,6	55,4;93,2	Aucun report
-	;	13,7**	4,9;28,1	19,3**	5,0;43,8	12,8*	7,8;19,5	6,2**	0,7;21,5	27,4**	7,0;58,8	13,1**	2,7;34,4	Un report
23,8**	2,2;66,6	42,2*	27,3;58,2	9,2**	0,9;31,7	13,5*	8,6;20,0	12,4**	3,2;29,8	18,5**	2,4;52,2	8,3**	0,8;29,0	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	6,5*	4,6;8,9	5,9**	1,1;17,4
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	8,7	6,3;11,5	11,6**	4,8;22,4
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	84,8	81,4;87,8	82,5	70,4;91,2
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	26,8	23,3;30,3	52,3	39,8;64,8
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	11,7	8,9;15,0	15,1**	7,0;26,8
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	61,5	57,5;65,6	32,7*	21,8;45,1
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	57,8	53,8;61,8	62,0	49,5;73,4
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	2,4**	1,3;4,1	3,7**	0,7;10,7
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	39,8	35,7;43,9	34,3*	23,0;47,0
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	12,1	9,5;15,1	10,7**	4,2;21,5
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	8,1	5,9;10,6	5,6**	1,6;13,7
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	79,9	76,6;83,1	83,6	72,3;91,7
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	8,7	6,6;11,3	11,6**	5,3;21,3
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	5,3*	3,5;7,5	8,5**	2,8;18,5
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	86,0	82,9;88,8	79,9	68,0;88,9
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	38,2	34,1;42,3	47,7	34,9;60,4
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	5,3*	3,5;7,7	6,3**	1,6;15,9
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	56,5	52,4;60,6	46,0	33,8;58,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
3,4**	0,1;17,2	2,2**	0,3;8,0	3,5**	0,4;12,1	8,4**	4,6;13,8	6,0**	0,7;20,4	17,7**	6,6;35,3	5,9**	2,3;12,3	Oui
3,4**	0,0;19,2	8,7**	3,4;17,6	6,4**	1,2;18,4	12,5*	8,0;18,3	2,1**	0,0;11,6	5,8**	0,6;20,4	5,4**	1,5;13,5	Non, mais il aurait souhaité le consulter
93,3	76,0;99,4	89,1	79,7;95,1	90,1	78,1;96,8	79,1	72,1;85,0	91,8	77,5;98,4	76,5	57,5;90,0	88,6	80,1;94,4	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
3,7**	0,1;19,5	22,7*	14,5;32,6	45,4*	31,1;60,2	13,8*	9,1;19,6	40,7*	24,5;58,4	25,8**	12,7;43,0	26,6*	17,6;37,3	Oui
11,1**	2,3;29,1	7,3**	2,5;15,9	7,1**	1,4;19,7	17,8*	12,0;24,9	-	;	5,7**	0,6;19,7	10,6**	4,3;20,6	Non, mais il aurait souhaité le consulter
85,2	66,4;95,8	70,0	59,3;79,3	47,6*	32,8;62,7	68,5	61,2;75,7	59,3	41,6;75,5	68,5	51,2;82,8	62,9	51,2;73,5	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
55,2*	35,7;73,7	47,8	36,7;59,0	81,4	68,3;90,8	62,5	55,4;69,7	41,1*	24,8;59,0	66,8	48,5;82,0	43,1	32,6;53,7	Oui
3,2**	0,0;18,4	2,8**	0,3;9,9	-	;	3,9**	1,7;7,6	-	;	-	;	1,0**	0,0;5,4	Non, mais il aurait souhaité le consulter
41,6*	23,2;61,8	49,4	38,2;60,5	18,6**	9,2;31,7	33,6	26,5;40,7	58,9	41,0;75,2	33,2*	18,0;51,5	55,8	45,3;66,4	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
14,8**	3,7;35,5	8,0**	2,7;17,4	15,1**	6,2;29,1	15,8*	10,8;22,0	7,8**	1,5;22,2	8,7**	1,9;23,1	9,6**	4,1;18,4	Oui
4,7**	0,2;22,2	4,9**	1,4;11,8	6,8**	1,7;17,0	10,2*	6,1;15,7	8,6**	1,9;22,9	9,1**	1,8;25,0	9,5**	4,0;18,5	Non, mais il aurait souhaité le consulter
80,5	59,5;93,6	87,1	77,0;93,9	78,1	63,4;89,0	74,0	66,8;80,4	83,5	67,6;93,7	82,2	64,5;93,5	80,8	70,6;88,7	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
-	;	7,8**	2,6;17,0	17,6**	8,2;31,1	8,5*	4,9;13,7	2,8**	0,0;16,0	2,8**	0,1;14,5	9,2**	3,8;17,8	Oui
4,8**	0,2;22,9	3,9**	0,8;11,3	5,1**	1,1;14,2	7,1**	3,7;12,2	2,6**	0,1;14,1	2,8**	0,1;15,0	2,7**	0,3;9,8	Non, mais il aurait souhaité le consulter
95,2	77,1;99,8	88,4	78,2;94,9	77,3	63,2;88,0	84,4	77,9;89,5	94,6	81,1;99,4	94,3	81,5;99,3	88,2	78,7;94,4	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
11,9**	2,3;32,0	22,8*	14,2;33,5	37,6*	24,0;52,9	49,0	41,9;56,2	30,4*	16,6;47,4	42,2*	25,3;60,6	33,0*	23,2;42,7	Oui
11,6**	2,2;31,5	5,9**	1,9;13,3	1,5**	0,0;8,2	6,2**	3,0;11,0	5,3**	0,6;18,9	4,8**	0,6;16,6	3,0**	0,6;8,5	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
76,5	53,8;91,7	71,3	60,2;80,9	60,8	45,8;74,5	44,8	37,5;52,2	64,3	46,7;79,4	52,9*	35,6;69,7	64,0	54,1;74,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	8,5	6,4;11,0	8,0**	3,0;16,6
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	10,8	8,1;14,0	9,5**	3,6;19,2
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	80,7	77,0;84,0	82,6	71,4;90,7
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	7,2*	5,2;9,6	9,6**	3,8;19,1
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	9,3	7,0;12,1	5,6**	1,5;13,8
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	83,5	80,1;86,6	84,8	74,0;92,4
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	11,3	8,8;14,3	8,0**	2,3;19,2
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	12,1	9,5;15,1	7,2**	2,3;16,3
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	76,6	73,2;79,9	84,7	73,0;92,8
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	11,3	8,8;13,8	3,8**	0,8;10,9
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	3,4*	2,1;5,2	1,4**	0,0;7,2
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	85,3	82,2;88,1	94,8	87,0;98,6
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	9,5	7,0;12,4	12,7**	5,6;23,6
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	11,0	8,6;13,8	9,1**	3,4;18,9
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	79,6	76,2;82,9	78,2	66,8;87,1
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	16,6	13,6;19,9	28,3*	17,9;40,7
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	5,8*	4,1;8,0	7,6**	2,5;17,1
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	77,6	74,1;81,1	64,1	51,5;75,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
9,8**	1,6;28,6	1,1**	0,0;5,6	6,5**	1,7;16,0	14,6*	9,8;20,6	14,1**	4,9;29,4	8,4**	1,9;22,3	2,1**	0,3;7,0	Oui
4,5**	0,1;24,2	6,1**	2,0;13,7	12,3**	4,0;26,7	16,7*	11,4;23,1	-	;	17,1**	6,1;34,8	7,3**	2,5;15,9	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
85,7	65,2;96,5	92,8	84,9;97,3	81,3	66,9;91,3	68,7	61,7;75,8	85,9	70,6;95,1	74,5	55,8;88,3	90,6	82,1;96,0	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
6,4**	0,7;22,2	1,1**	0,0;6,6	3,2**	0,3;11,7	14,0*	9,4;19,8	-	;	6,1**	0,8;20,2	3,1**	0,6;9,0	Oui
7,7**	0,7;27,3	9,5**	4,1;18,1	11,7**	4,6;23,2	12,4*	8,1;17,9	5,7**	0,7;19,1	8,4**	1,8;22,3	6,6**	2,4;14,1	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
85,8	66,0;96,5	89,4	80,6;95,2	85,1	72,9;93,2	73,6	66,6;79,9	94,3	80,9;99,3	85,5	69,3;95,1	90,3	81,9;95,7	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
5,6**	0,1;27,9	8,0**	3,5;15,1	19,7**	9,2;34,5	13,3*	8,4;19,6	10,4**	2,9;24,7	5,5**	0,6;18,8	12,2**	6,5;20,2	Oui
3,1**	0,0;17,6	11,3**	5,5;19,7	11,8**	4,2;24,9	15,7*	10,8;21,7	10,2**	2,7;24,7	20,6**	8,5;38,4	9,9**	4,6;18,0	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
91,3	69,9;99,2	80,7	70,8;88,4	68,5	53,1;81,3	71,0	64,0;77,3	79,4	63,0;90,9	73,9	55,2;87,8	78,0	68,0;86,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
-	;	10,4**	5,0;18,4	19,5**	9,7;33,1	15,0*	10,5;20,4	18,0**	7,2;34,6	10,2**	2,5;25,6	6,7**	2,8;13,1	Oui
-	;	7,0**	2,5;15,1	1,5**	0,0;8,5	4,6**	2,0;8,7	-	;	-	;	4,0**	1,0;10,4	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
100,0	;	82,6	72,8;90,0	78,9	65,4;89,0	80,4	74,3;85,7	82,0	65,4;92,8	89,8	74,4;97,5	89,4	81,1;94,9	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
11,6**	2,3;30,7	2,4**	0,1;12,1	16,1**	6,9;30,1	10,7*	6,5;16,3	8,3**	1,8;22,5	7,2**	0,7;25,5	7,8**	3,3;15,2	Oui
6,2**	0,6;21,7	9,4**	3,9;18,1	13,0**	5,3;25,2	14,7*	9,9;20,7	10,7**	2,9;25,7	10,7**	2,6;26,5	7,0**	2,5;15,1	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
82,2	62,0;94,4	88,3	78,1;94,8	70,8	56,3;82,8	74,6	67,3;81,0	81,0	64,5;92,1	82,1	63,6;93,7	85,2	76,0;91,8	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
16,5**	4,4;37,9	14,8**	7,2;25,8	23,1**	11,4;39,0	14,2*	9,5;20,0	12,0**	3,1;29,1	18,2**	6,2;37,6	12,0**	6,3;20,3	Oui
-	;	6,0**	1,9;13,8	3,2**	0,4;11,4	6,6**	3,4;11,2	2,7**	0,1;13,8	11,2**	2,8;27,6	5,0**	1,6;11,5	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
83,5	62,1;95,6	79,2	67,7;88,0	73,7	58,1;85,8	79,2	72,6;84,9	85,3	67,4;95,5	70,6	51,1;85,8	83,0	73,9;89,9	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	4,5*	3,0;6,4	2,3**	0,4;7,3
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	95,5	93,6;97,0	97,7	92,7;99,6
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	..	;	..	;
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	..	;	..	;
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	19,2**	6,6;39,2	100,0	;
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	80,8	60,8;93,4	-	;
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	14,4**	3,9;33,5	-	;
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	85,6	66,5;96,1	100,0	;
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	9,6**	1,1;31,0	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	90,4	69,0;98,9	100,0	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	30,4**	12,7;53,6	-	;
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	69,6	46,4;87,3	100,0	;
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	13,5**	2,7;35,4	-	;
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	86,5	64,6;97,3	100,0	;
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	33,6**	15,2;56,6	-	;
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	66,4*	43,4;84,8	100,0	;
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	38,3**	18,3;61,8	100,0	;
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	61,7*	38,2;81,7	-	;
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	3,6**	0,1;18,8	-	;
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	96,4	81,2;99,9	100,0	;
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	34,5**	16,7;56,1	100,0	;
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	65,5	43,9;83,3	-	;
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	3,6**	0,1;17,4	-	;
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	96,4	82,6;99,9	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]
4,0**	0,1;21,0	2,2**	0,3;7,9	4,7**	1,0;13,1	8,4**	4,7;13,8	5,0**	0,5;18,4	-	;	2,4**	0,3;8,8	Oui
96,0	79,0;99,9	97,8	92,1;99,7	95,3	86,9;99,0	91,6	86,2;95,3	95,0	81,6;99,5	100,0	;	97,6	91,2;99,7	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Oui
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	-	;	-	;	26,3**	7,0;56,3	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	73,7*	43,7;93,0	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
														Psychologue
-	;	-	;	-	;	24,1**	6,2;52,9	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	75,9	47,1;93,8	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
														Travailleur social
-	;	-	;	-	;	16,1**	1,8;48,5	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	83,9	51,5;98,2	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
-	;	46,7**	0,5;99,0	68,2**	5,2;99,8	32,5**	9,3;64,8	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	53,3**	1,0;99,5	31,8**	0,2;94,8	67,5*	35,2;90,7	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
														Médicaments
-	;	-	;	-	;	6,1**	0,2;28,9	-	;	-	;	100,0	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	93,9	71,1;99,8	100,0	;	-	;	-	;	Non
														Services de transport
100,0	;	53,3**	1,0;99,5	31,8**	0,2;94,8	29,5**	7,7;61,7	100,0	;	-	;	-	;	Oui
-	;	46,7**	0,5;99,0	68,2**	5,2;99,8	70,5*	38,3;92,3	-	;	-	;	100,0	;	Non
														Services d'aide à domicile
-	;	-	;	31,8**	0,2;94,8	42,6**	16,4;72,3	-	;	-	;	61,7**	1,3;99,9	Oui
100,0	;	100,0	;	68,2**	5,2;99,8	57,4*	27,7;83,6	100,0	;	-	;	38,3**	0,1;98,7	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
-	;	-	;	-	;	6,0**	0,1;30,6	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	94,0	69,4;99,9	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
														Soins infirmiers à domicile
-	;	-	;	-	;	45,6**	19,7;73,4	-	;	-	;	38,3**	0,1;98,7	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	54,4*	26,6;80,3	100,0	;	-	;	61,7**	1,3;99,9	Non
														Autres services ou ressources
-	;	-	;	-	;	6,0**	0,1;29,2	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	94,0	70,8;99,9	100,0	;	-	;	100,0	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Suivi médical du patient établi[p, r]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	97,5	95,6;98,7	91,6	82,1;97,0
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	2,5**	1,3;4,4	8,4**	3,0;17,9
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	33,7	30,0;37,4	32,1*	19,1;47,4
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	11,0	8,4;14,0	13,9**	6,3;25,3
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	33,0	29,1;36,8	38,2*	24,2;53,9
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	22,4	19,1;25,6	15,8**	6,6;29,7
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	24,2	20,9;27,5	20,7**	10,9;33,8
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	25,5	21,7;29,3	36,8*	24,0;51,0
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	28,5	24,7;32,4	29,1*	17,4;43,2
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	21,8	18,5;25,1	13,5**	5,6;25,9
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	9,0	6,7;11,7	12,7**	5,6;23,7
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	6,1*	4,3;8,4	8,7**	3,1;18,4
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	20,1	16,8;23,4	26,4*	15,0;40,8
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	13,8	11,0;16,9	8,7**	3,0;18,6
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	42,9	38,6;47,2	33,7*	21,7;47,4
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	8,2	6,1;10,7	9,8**	3,3;21,3
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	0,7**	0,2;1,7	-	;
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	4,7*	3,1;6,7	6,8**	1,6;17,6
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	94,7	92,6;96,3	93,2	82,4;98,4
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	90,0	87,3;92,3	90,6	79,0;97,0
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	8,6	6,4;11,3	9,4**	3,0;21,0
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	1,4**	0,6;2,8	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
100,0	;	98,8	93,5;100,0	100,0	;	99,3	96,5;100,0	100,0	;	100,0	;	92,9	84,2;97,7	Oui
-	;	1,2**	0,0;6,5	-	;	0,7**	0,0;3,5	-	;	-	;	7,1**	2,3;15,8	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
10,4**	1,9;29,2	45,8	35,9;55,6	55,0	39,9;69,4	26,2	20,2;32,2	33,1*	18,4;50,6	34,8**	18,1;54,8	33,2*	22,9;43,5	Médecin spécialiste du cancer
-	;	10,7**	5,0;19,3	22,3**	11,8;36,3	10,3*	6,2;15,8	5,3**	0,6;18,0	15,3**	4,1;35,3	8,4**	3,9;15,2	Médecin de famille
57,2*	35,5;77,1	25,8*	16,6;36,9	-	;	34,2	27,4;41,1	49,2*	32,6;65,9	31,5**	15,9;50,9	39,1	28,9;49,2	Autre médecin spécialiste
32,3**	15,4;53,4	17,7*	10,6;27,1	22,7**	11,4;37,9	29,2	22,7;36,5	12,5**	3,9;27,8	18,5**	6,8;36,7	19,4*	12,0;28,7	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
3,3**	0,0;18,8	38,3	28,5;48,1	51,1	36,2;65,8	16,0*	11,1;22,0	15,6**	5,7;31,4	22,5**	9,9;40,3	24,5*	15,9;34,9	Médecin spécialiste du cancer
9,5**	1,0;31,8	15,8*	8,9;25,0	36,7*	23,5;51,6	31,4	24,6;38,1	12,3**	3,7;28,0	22,7**	9,0;42,7	20,4*	12,3;30,7	Médecin de famille
46,2*	26,7;66,6	28,6*	19,1;39,8	-	;	25,1	19,1;31,9	43,9*	27,4;61,5	31,7**	16,5;50,3	38,7	28,6;48,8	Autre médecin spécialiste
41,0*	22,3;61,9	17,3*	10,3;26,4	12,2**	4,6;24,8	27,5	21,3;34,4	28,1**	14,7;45,2	23,1**	9,5;42,7	16,5*	9,2;26,3	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
-	;	8,4**	3,7;16,0	-	;	11,2*	7,1;16,6	6,1**	0,7;20,5	6,3**	0,8;20,9	12,6**	6,0;22,6	Au besoin
-	;	5,3**	1,2;14,0	14,3**	5,8;27,8	4,9**	2,5;8,6	5,6**	0,7;18,3	11,9**	3,2;28,2	3,0**	0,7;8,2	À tous les mois
2,9**	0,0;17,3	19,3*	11,9;28,8	25,9*	14,1;40,8	15,0*	10,2;20,9	32,1*	17,8;49,3	29,2**	14,4;48,2	20,7*	12,9;30,5	À tous les 2 ou 3 mois
16,2**	5,1;35,1	26,0*	17,2;36,4	12,3**	4,6;25,2	14,9*	10,0;20,9	2,1**	0,0;11,8	13,8**	3,7;32,1	8,1**	3,2;16,3	À tous les 4 mois
69,3	47,6;86,2	36,7	26,9;46,6	45,8*	31,3;60,7	46,2	38,9;53,5	37,1*	22,6;53,5	31,3**	16,2;49,9	44,7	34,6;54,8	À tous les 6 mois
11,6**	2,2;31,2	4,3**	1,1;11,1	1,7**	0,1;8,4	7,8**	4,4;12,6	17,2**	6,4;34,1	7,6**	0,7;27,4	10,8**	5,6;18,4	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	-	;	1,8**	0,0;10,5	-	;	2,1**	0,0;11,2	3,2**	0,1;14,7	1,3**	0,0;7,1	Trop long
6,2**	0,6;21,9	5,5**	1,8;12,4	3,1**	0,4;11,0	5,7**	2,7;10,4	2,3**	0,1;12,8	-	;	3,2**	0,7;9,2	Trop court
93,8	78,1;99,4	94,5	87,6;98,2	95,0	85,6;99,1	94,3	89,6;97,3	95,6	84,3;99,5	96,8	85,3;99,9	95,5	88,8;98,7	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
90,7	73,3;98,4	95,3	88,6;98,7	89,5	79,4;95,8	85,8	79,5;90,8	94,7	82,1;99,4	90,9	74,7;98,3	90,1	82,1;95,4	Tout à fait capable
6,5**	0,6;22,9	3,5**	0,8;9,8	8,8**	3,1;18,7	12,9*	8,2;19,0	5,3**	0,6;17,9	5,9**	0,7;20,5	7,7**	3,2;15,0	En partie capable
2,9**	0,1;16,1	1,1**	0,0;6,8	1,6**	0,0;9,6	1,2**	0,2;4,3	-	;	3,2**	0,1;17,0	2,2**	0,2;8,1	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	60,1	56,0;64,3	63,0	49,4;75,2
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	14,1	11,3;17,3	12,3**	5,0;24,0
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	25,8	22,1;29,5	24,7*	14,7;37,2
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	46,5	37,8;55,2	48,5**	22,2;75,4
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	53,5	44,8;62,2	51,5**	24,6;77,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
57,5*	35,9;77,1	55,7	45,6;65,7	56,8	43,6;69,9	63,0	56,0;70,0	62,5	44,8;78,1	51,5*	33,6;69,1	61,3	50,9;71,7	Oui, tout à fait
13,7**	3,4;33,4	10,1**	4,8;18,2	19,7**	10,1;33,0	15,5*	10,5;21,8	18,6**	7,9;34,5	10,4**	2,2;27,6	12,5**	6,5;21,2	oui, en partie
28,8**	12,5;50,4	34,2	24,7;43,8	23,5**	12,4;38,1	21,4	15,5;28,4	18,9**	7,7;35,8	38,1*	21,4;57,1	26,1*	17,5;36,4	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
47,1**	7,1;90,4	13,7**	1,4;43,1	59,1*	27,7;85,8	54,2	39,3;68,5	12,6**	0,2;57,0	36,9**	6,3;78,8	59,4*	30,2;84,4	Oui
52,9**	9,6;92,9	86,3	56,9;98,6	40,9**	14,2;72,3	45,8*	31,5;60,7	87,4	43,0;99,8	63,1**	21,2;93,7	40,6**	15,6;69,8	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	28,7	24,9;32,4	23,1*	14,2;34,3
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	44,3	40,4;48,3	46,1	34,0;58,1
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	27,0	23,4;30,6	30,8*	20,9;42,1
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	25,7	22,2;29,1	22,9*	13,9;34,3
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	42,2	38,1;46,3	43,6	32,0;55,2
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	32,1	28,5;35,8	33,5*	23,2;45,0
Modification de l'alimentation[p, r]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	41,4	37,5;45,3	58,5	47,5;69,6
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	31,0	27,5;34,5	21,9*	13,3;32,8
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	27,6	24,0;31,2	19,5*	11,3;30,2
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	10,2	7,8;12,5	10,6**	5,1;18,9
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	7,7	5,7;10,1	4,0**	0,8;11,5
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	82,1	79,1;85,2	85,4	76,5;91,8
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	1,3**	0,5;2,8	-	;
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	0,7**	0,2;2,0	-	;
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	98,0	96,2;99,1	100,0	;
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	8,1	6,1;10,4	15,2*	8,5;24,4
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	9,1	6,8;11,8	6,5**	2,1;14,6
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	82,8	79,5;85,8	78,3	67,6;86,7
Gestion du stress[p, r]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	34,3	30,6;38,0	32,8*	21,6;45,6
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	24,2	20,8;27,6	15,7**	7,9;26,9
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	41,5	37,7;45,3	51,4	39,7;63,1

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p, r]
33,3**	15,7;55,0	13,8**	7,5;22,6	22,1**	11,5;36,1	40,1	32,9;47,3	36,2*	20,2;54,8	36,4*	20,3;55,2	23,1*	15,3;32,5	Oui
40,9*	22,2;61,8	52,2	42,3;62,2	58,1	44,7;71,6	32,3	25,6;39,0	54,0*	36,3;70,9	48,8*	30,9;67,0	46,0	35,5;56,5	Non
25,9**	10,3;47,8	34,0	25,3;42,7	19,8**	9,7;33,9	27,6	21,1;34,9	9,9**	2,7;23,7	14,7**	4,8;31,6	30,9*	21,3;40,5	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
34,5**	18,0;54,3	21,6*	13,9;31,0	22,6**	11,4;37,6	26,4	20,4;32,4	29,6**	15,2;47,6	29,7**	14,9;48,3	26,5*	18,1;36,5	Oui
46,7*	27,9;66,2	50,1	40,0;60,1	44,9*	31,3;58,5	38,4	31,1;45,6	31,7*	17,5;49,0	50,0*	31,9;68,2	39,7	30,0;49,5	Non
18,9**	6,9;37,5	28,4*	19,9;38,1	32,6*	20,0;47,3	35,2	28,1;42,3	38,7*	22,4;57,1	20,3**	7,8;39,2	33,7	24,6;42,9	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p]
44,7*	26,1;64,4	24,5*	15,9;35,0	40,4*	26,9;53,9	47,8	40,5;55,1	32,4**	17,3;50,8	26,1**	12,4;44,3	39,7	30,0;49,4	Oui
23,9**	9,4;44,8	41,4	31,4;51,5	37,9*	25,2;52,0	22,1	16,4;28,7	49,3*	32,0;66,8	39,2*	22,8;57,7	33,7	23,9;43,6	Non
31,4**	15,2;51,8	34,1	24,1;44,0	21,7**	10,9;36,3	30,1	23,4;36,9	18,3**	7,5;34,6	34,7*	18,8;53,5	26,5*	17,9;36,7	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
5,9**	0,8;19,3	9,2**	3,9;17,7	9,4**	3,2;20,2	8,2**	4,6;13,3	13,2**	4,6;27,6	25,5**	12,2;43,3	10,0**	4,7;18,1	Oui
6,6**	0,7;22,7	13,1**	7,1;21,5	15,6**	6,4;29,8	5,9**	2,9;10,3	4,4**	0,5;15,7	7,3**	0,6;26,7	6,3**	2,4;13,0	Non
87,5	70,6;96,6	77,8	67,7;85,9	75,0	60,1;86,5	85,9	79,9;90,7	82,4	66,5;92,8	67,1	47,9;82,9	83,7	74,5;90,7	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	2,1**	0,1;11,0	5,1**	0,6;17,2	0,6**	0,0;3,3	2,4**	0,0;13,7	-	;	0,9**	0,0;5,2	Oui
3,2**	0,0;18,2	-	;	-	;	0,5**	0,0;3,0	-	;	-	;	2,5**	0,2;9,3	Non
96,8	81,8;100,0	97,9	89,0;99,9	94,9	82,8;99,4	98,8	95,7;99,9	97,6	86,3;100,0	100,0	;	96,6	89,7;99,4	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
-	;	9,4**	4,2;17,4	15,4**	7,2;27,6	3,1**	1,1;6,6	9,4**	2,6;22,5	8,5**	1,8;22,9	8,2**	3,7;15,3	Oui
7,2**	0,8;24,2	13,3**	7,2;21,7	14,8**	6,8;26,6	4,0**	1,7;7,9	5,0**	0,7;16,3	2,8**	0,1;15,6	17,3**	9,6;27,7	Non
92,8	75,8;99,2	77,3	67,8;85,2	69,8	56,4;81,1	92,9	88,4;96,0	85,6	71,3;94,5	88,7	74,0;96,7	74,5	64,0;83,2	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p]
46,7*	26,8;67,4	22,1*	13,7;32,6	44,0*	29,6;59,1	43,9	36,9;51,0	26,1**	12,7;43,9	28,4**	14,2;46,6	24,9*	16,6;34,8	Oui
17,6**	5,9;36,8	27,7*	19,0;37,8	26,2*	15,1;40,1	19,9	14,6;26,1	24,4**	11,1;42,8	37,5*	20,7;56,9	31,8*	22,4;41,2	Non
35,7**	17,6;57,4	50,2	40,2;60,3	29,8*	18,0;44,0	36,2	29,7;42,7	49,4*	31,1;67,9	34,1**	17,2;54,6	43,3	33,3;53,3	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	44,3	40,4;48,2	44,0	32,2;55,7
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	14,1	11,4;16,8	9,4**	3,8;18,5
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	41,6	37,7;45,5	46,6	35,2;58,1
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	0,6**	0,2;1,5	-	;
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	99,4	98,5;99,8	100,0	;
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	-	;	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	100,0	;	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]
40,6*	21,7;61,8	23,5*	15,1;33,8	53,9	40,4;67,4	52,5	45,2;59,7	45,2*	28,1;63,1	42,4*	25,4;60,8	44,7	34,7;54,6	Oui
7,2**	1,0;22,9	34,6	25,2;44,1	17,9**	8,3;31,7	1,5**	0,3;4,1	18,6**	7,3;35,8	18,5**	6,7;37,0	18,6*	11,9;27,0	Non
52,2*	30,9;72,8	41,9	31,5;52,2	28,3*	16,4;42,8	46,1	38,9;53,2	36,2*	20,6;54,4	39,2*	22,0;58,6	36,7	27,0;46,4	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
-	;	-	;	1,6**	0,0;8,7	1,0**	0,1;3,5	2,8**	0,0;16,0	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	98,4	91,3;100,0	99,0	96,5;99,9	97,2	84,0;100,0	100,0	;	100,0	;	Non
														Autre
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	62,3	55,2;69,4	72,4	55,0;85,9
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	37,7	30,6;44,8	27,6**	14,1;45,0
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	84,5	79,4;88,7	87,5	73,6;95,7
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	15,5	11,3;20,6	12,5**	4,3;26,4
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	58,1	49,0;67,1	76,7	49,5;93,7
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	41,9	32,9;51,0	23,3**	6,3;50,5
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	38,7	28,8;48,6	69,8*	33,6;93,6
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	61,3	51,4;71,2	30,2**	6,4;66,4
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	15,7*	10,1;22,7	22,7**	4,3;55,2
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	84,3	77,3;89,9	77,3*	44,8;95,7
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	62,1	55,4;68,7	73,6	51,7;89,4
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	37,9	31,3;44,6	26,4**	10,6;48,3
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	72,5	67,3;77,8	85,2	67,1;95,6
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	27,5	22,2;32,7	14,8**	4,4;32,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
-	;	69,9*	42,7;89,6	76,4	50,3;93,0	54,1	41,9;66,3	83,7*	34,4;99,7	48,9**	19,1;79,3	64,9*	38,9;85,7	Oui
100,0	;	30,1**	10,4;57,3	23,6**	7,0;49,7	45,9	33,7;58,1	16,3**	0,3;65,6	51,1**	20,7;80,9	35,1**	14,3;61,1	Non
														Soutien de la famille ou des amis
85,1	53,1;98,5	85,2	64,2;96,4	79,1	58,3;92,6	88,5	80,0;94,2	81,7	58,3;95,2	79,7	58,2;93,3	79,6	63,5;90,9	Oui
14,9**	1,5;46,9	14,8**	3,6;35,8	20,9**	7,4;41,7	11,5**	5,8;20,0	18,3**	4,8;41,7	20,3**	6,7;41,8	20,4**	9,1;36,5	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
62,2**	11,4;97,4	50,5**	18,3;82,4	53,3**	20,3;84,3	62,6	42,9;79,6	57,7**	22,3;87,9	55,6*	29,2;79,9	45,5**	22,9;69,5	Oui
37,8**	2,6;88,6	49,5**	17,6;81,7	46,7**	15,7;79,7	37,4*	20,4;57,1	42,3**	12,1;77,7	44,4**	20,1;70,8	54,5*	30,5;77,1	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
-	;	42,0**	11,6;77,9	39,8**	9,1;78,2	36,7*	21,6;54,1	37,4**	0,4;96,1	27,3**	5,0;63,9	38,4**	13,9;68,1	Oui
100,0	;	58,0**	22,1;88,4	60,2**	21,8;90,9	63,3	45,9;78,4	62,6**	3,9;99,6	72,7*	36,1;95,0	61,6*	31,9;86,1	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
11,0**	0,1;53,1	12,2**	0,4;50,4	16,6**	1,7;50,6	23,0**	12,6;36,6	-	;	5,7**	0,1;28,3	10,6**	1,1;34,7	Oui
89,0	46,9;99,9	87,8	49,6;99,6	83,4	49,4;98,3	77,0	63,4;87,4	100,0	;	94,3	71,7;99,9	89,4	65,3;98,9	Non
														Exemple de l'entourage[p]
47,4**	16,1;80,3	54,6*	31,0;76,8	63,1*	37,7;84,1	63,7	53,2;74,1	67,0*	40,3;87,5	53,6*	28,3;77,7	62,8	42,4;80,3	Oui
52,6**	19,7;83,9	45,4*	23,2;69,0	36,9**	15,9;62,3	36,3	25,9;46,8	33,0**	12,5;59,7	46,4**	22,3;71,7	37,2*	19,7;57,6	Non
														Prière ou soutien spirituel[p]
66,4*	34,2;90,1	61,4*	37,9;81,5	63,4*	40,9;82,4	76,8	67,2;84,7	65,4*	39,2;86,1	68,7	46,0;86,2	74,2	54,7;88,5	Oui
33,6**	9,9;65,8	38,6**	18,5;62,1	36,6**	17,6;59,1	23,2*	15,3;32,8	34,6**	13,9;60,8	31,3**	13,8;54,0	25,8**	11,5;45,3	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,5	10,0;14,9
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	-	;	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	1,5**	0,7;2,7	1,2**	0,0;7,2
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	8,3	6,3;10,8	10,8**	4,3;21,4
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	38,8	34,7;42,9	37,9*	25,4;51,7
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	51,4	47,3;55,5	50,1	37,5;62,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région															
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
4,7*	3,2;6,6	15,2	12,9;17,5	9,1	7,0;11,4	30,0	27,4;32,6	6,1*	4,4;8,2	5,3*	3,7;7,3	17,2	14,3;20,0	Ensemble des patients	
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic	
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Mauvaise	
3,2**	0,1;17,2	1,1**	0,0;6,1	-	;	2,3**	0,6;5,5	-	;	2,8**	0,1;14,9	1,0**	0,0;5,5	Passable	
10,0**	1,9;27,7	3,1**	0,7;8,7	11,4**	4,2;23,4	6,9**	3,7;11,5	2,5**	0,1;12,9	15,7**	4,8;34,5	11,4**	5,8;19,4	Bonne	
40,3*	21,6;61,2	33,5*	23,7;43,4	33,9*	21,2;48,5	42,9	35,8;50,0	45,7*	29,0;63,2	31,8**	17,0;49,9	38,5	28,7;48,3	Très bonne	
46,5*	28,0;65,8	62,3	52,2;72,3	54,8	41,0;68,6	48,0	40,8;55,1	51,7*	34,4;68,7	49,7*	31,9;67,6	49,2	39,1;59,3	Excellente	

Région 03

CAPITALE-NATIONALE

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	46,5	45,3; 47,7
Femmes	53,9	53,5	52,3; 54,7
Âge			
18 à 49 ans	18,9	17,4	14,7; 20,1
50 à 59 ans	24,9	26,1	23,2; 29,1
60 à 69 ans	29,8	29,4	25,7; 33,0
70 ans et plus	26,5	27,1	24,5; 29,8
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	97,6	96,0; 98,7
Anglais	10,6	1,5**	0,6; 2,8
Autres	3,0	0,9**	0,3; 2,1
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	19,7	16,5; 22,9
Diplôme d'études secondaires	24,7	24,3	20,7; 28,0
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	30,4	26,6; 34,1
Diplôme d'études universitaires	20,6	25,6	21,9; 29,3
Occupation principale			
En emploi	29,3	30,3	27,0; 33,6
Étudiant	1,7	0,9**	0,3; 2,2
Retraité	55,8	56,4	52,8; 60,0
À la maison	7,2	7,1*	5,1; 9,6
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	2,6**	1,4; 4,3
Congé de maternité / autres	3,6	2,7*	1,6; 4,3
Situation familiale			
Vit seul	24,1	27,0	23,3; 30,6
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	46,4	42,4; 50,5
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	17,4	14,6; 20,3
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	3,6*	2,2; 5,5
Autres	4,8	5,6*	3,8; 7,9
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	22,6	19,0; 26,1
Revenu suffisant	61,4	62,2	58,1; 66,3
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	15,2	12,3; 18,5
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	34,5	30,4; 38,6
2	21,1	22,2	18,8; 25,6
3	20,1	15,3	12,4; 18,5
4	19,4	14,0	11,1; 17,2
5 - très défavorisé	17,6	14,0	11,2; 17,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	11,6	9,1 ; 14,1	15,1	11,2 ; 19,8	8,5*	5,7 ; 12,1
Génital féminin	5,5	...	10,2	6,5	4,7 ; 8,6	...	;	12,1	8,9 ; 16,0
Prostate	15,9	34,4	...	17,5	15,3 ; 19,8	37,6	32,8 ; 42,4	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	8,3	6,2 ; 10,7	8,4*	5,5 ; 12,2	8,1*	5,6 ; 11,3
Sein	26,5	0,4**	48,8	24,8	22,3 ; 27,3	0,4**	0,0 ; 2,2	46,1	41,6 ; 50,6
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	7,8	5,8 ; 10,1	6,5*	3,9 ; 10,0	8,9*	6,1 ; 12,4
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	4,8*	3,3 ; 6,9	6,1*	3,6 ; 9,6	3,7**	1,9 ; 6,4
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	18,7	15,6 ; 22,2	25,9	20,7 ; 31,1	12,5*	9,0 ; 16,8
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	84,1	80,7 ; 87,1	84,0	79,1 ; 88,2	84,1	79,3 ; 88,2
Récidive	7,4	7,5	7,3	7,3	5,3 ; 9,7	8,6*	5,4 ; 12,8	6,2*	3,8 ; 9,4
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	8,6	6,3 ; 11,4	7,4*	4,6 ; 11,0	9,7*	6,4 ; 13,9
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	10,5	8,1 ; 13,3	14,5*	10,4 ; 19,4	7,0*	4,5 ; 10,4
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	18,4	15,4 ; 21,4	6,0**	3,4 ; 9,7	29,0	24,1 ; 33,9
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	71,1	67,7 ; 74,6	79,5	74,6 ; 84,4	64,0	58,9 ; 69,0
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	45,0	40,9 ; 49,0	47,8	41,6 ; 54,0	42,5	37,0 ; 47,9
Non	58,8	56,6	60,7	55,0	51,0 ; 59,1	52,2	46,0 ; 58,4	57,5	52,1 ; 63,0
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	95,6	93,6 ; 97,1	94,7	90,9 ; 97,2	96,4	94,0 ; 98,1
Non	8,3	8,5	8,0	4,4*	2,9 ; 6,4	5,3**	2,8 ; 9,1	3,6**	1,9 ; 6,0
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	11,9	9,3 ; 14,8	14,2*	10,1 ; 19,1	9,8*	6,8 ; 13,6
Très bon	29,2	29,3	29,1	29,8	26,3 ; 33,4	29,7	24,2 ; 35,2	30,0	25,2 ; 34,8
Bon	34,9	34,2	35,5	36,4	32,4 ; 40,4	33,0	27,3 ; 38,7	39,4	34,1 ; 44,7
Moyen	18,8	17,8	19,6	17,8	14,5 ; 21,4	18,1	13,5 ; 23,5	17,4	13,2 ; 22,4
Mauvais	5,6	5,7	5,5	4,2*	2,6 ; 6,2	5,1**	2,6 ; 8,8	3,4**	1,7 ; 6,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p, r]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région											
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
										Siège du cancer[p]	
11,6	9,1 ; 14,1	3,8**	1,0 ; 9,6	9,1**	5,1 ; 14,7	10,3*	6,4 ; 15,6	20,4*	14,6 ; 27,4	Colorectal	
6,5	4,7 ; 8,6	7,0**	3,1 ; 13,2	6,7**	3,6 ; 11,2	5,4**	2,6 ; 9,6	7,1**	3,4 ; 13,0	Génital féminin	
17,5	15,3 ; 19,8	1,0**	0,0 ; 5,7	15,2*	10,3 ; 21,1	29,5	23,5 ; 35,5	17,4*	12,5 ; 23,2	Prostate	
8,3	6,2 ; 10,7	17,7*	10,8 ; 26,5	8,9**	4,8 ; 15,0	6,2**	3,2 ; 10,7	3,7**	1,5 ; 7,7	Hématopoïétique	
24,8	22,3 ; 27,3	35,2	26,7 ; 43,7	28,4	22,5 ; 34,2	20,8	15,5 ; 26,2	19,0*	13,5 ; 25,6	Sein	
7,8	5,8 ; 10,1	18,9*	12,1 ; 27,5	5,2**	2,2 ; 10,0	7,9**	4,3 ; 13,0	2,9**	0,7 ; 7,7	ORL (Tête et cou)	
4,8*	3,3 ; 6,9	1,0**	0,0 ; 5,0	4,6**	1,9 ; 9,3	5,9**	2,8 ; 10,8	6,3**	3,1 ; 11,3	Broncho-pulmonaire	
18,7	15,6 ; 22,2	15,5*	8,9 ; 24,3	21,9	15,8 ; 29,1	13,9*	9,2 ; 19,9	23,0*	16,3 ; 31,0	Autres cancers	
										Historique de la maladie[p]	
84,1	80,7 ; 87,1	90,6	83,0 ; 95,6	83,2	76,6 ; 88,5	86,2	79,9 ; 91,1	78,4	69,8 ; 85,5	Premier cancer	
7,3	5,3 ; 9,7	7,6**	3,2 ; 15,0	9,8*	5,8 ; 15,2	5,2**	2,2 ; 10,1	6,9**	3,3 ; 12,5	Récidive	
8,6	6,3 ; 11,4	1,7**	0,2 ; 5,9	7,0**	3,4 ; 12,6	8,6*	5,0 ; 13,6	14,7*	8,8 ; 22,5	Deuxième cancer	
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]	
10,5	8,1 ; 13,3	12,7**	7,1 ; 20,6	12,0*	7,4 ; 18,0	7,0**	3,6 ; 12,2	11,3*	6,6 ; 17,6	Sous traitement	
18,4	15,4 ; 21,4	23,1*	15,5 ; 32,2	18,0*	12,8 ; 24,3	16,6*	11,5 ; 22,9	17,6*	11,3 ; 25,4	Sans traitement avec médication	
71,1	67,7 ; 74,6	64,2	55,5 ; 73,0	70,0	63,1 ; 76,8	76,3	69,5 ; 82,3	71,1	62,8 ; 78,5	Sans traitement sans médication	
										Médecin de famille durant les traitements[p, r]	
45,0	40,9 ; 49,0	31,0*	21,6 ; 40,4	46,3	38,4 ; 54,3	43,8	36,3 ; 51,3	54,1	45,3 ; 62,9	Oui	
55,0	51,0 ; 59,1	69,0	59,6 ; 78,4	53,7	45,7 ; 61,6	56,2	48,7 ; 63,7	45,9	37,1 ; 54,7	Non	
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]	
95,6	93,6 ; 97,1	88,8	80,4 ; 94,4	95,5	90,9 ; 98,2	97,2	93,6 ; 99,1	98,5	94,4 ; 99,8	Oui	
4,4*	2,9 ; 6,4	11,2**	5,6 ; 19,6	4,5**	1,8 ; 9,1	2,8**	0,9 ; 6,4	1,5**	0,2 ; 5,6	Non	
										Perception de l'état de santé[p]	
11,9	9,3 ; 14,8	10,3**	5,2 ; 17,9	13,3*	8,6 ; 19,4	13,3*	8,5 ; 19,5	9,9**	5,4 ; 16,2	Excellent	
29,8	26,3 ; 33,4	27,2*	18,7 ; 37,1	24,5	18,5 ; 31,2	37,6	30,7 ; 44,6	28,4	21,1 ; 36,6	Très bon	
36,4	32,4 ; 40,4	37,9	28,5 ; 47,4	34,6	27,1 ; 42,0	32,8	26,0 ; 39,6	41,0	32,5 ; 49,5	Bon	
17,8	14,5 ; 21,4	19,7*	12,1 ; 29,3	21,0*	14,9 ; 28,3	13,3*	8,4 ; 19,6	18,1*	11,8 ; 26,0	Moyen	
4,2*	2,6 ; 6,2	4,9**	1,2 ; 12,6	6,6**	3,3 ; 11,8	3,0**	1,0 ; 6,8	2,6**	0,6 ; 6,9	Mauvais	

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	46,8	43,1;50,4	63,3	50,5;74,9
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	53,2	49,6;56,9	36,7*	25,1;49,5
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	38,9	32,5;45,3	37,5*	21,1;56,3
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	24,8	19,2;30,5	16,1**	5,7;33,0
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	19,6	14,7;25,4	27,7**	12,5;48,0
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	16,6	12,2;21,9	18,7**	6,8;37,3
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	43,8	38,1;49,4	50,9*	26,8;74,7
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	16,3	12,4;20,9	27,0**	8,9;53,4
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	14,7	10,9;19,1	3,9**	0,1;19,7
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	15,0	11,7;18,8	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	10,2*	7,0;14,3	18,1**	4,3;43,0
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	54,8	49,2;60,4	70,3	52,5;84,5
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	20,3	16,0;24,6	10,4**	2,5;26,1
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	17,5	13,4;22,3	5,4**	0,6;18,7
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	7,4*	4,8;10,8	13,9**	4,6;29,9
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	83,4	80,1;86,4	77,7	65,2;87,4
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	11,4	8,8;14,4	13,2**	6,1;24,0
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	5,2*	3,5;7,5	9,0**	3,0;19,8
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p, r]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	7,6	5,6;10,0	2,0**	0,0;11,3
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	92,4	90,0;94,4	98,0	88,7;100,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
48,6*	31,8;65,6	12,1**	6,5;20,1	72,7	58,2;84,4	50,2	42,5;58,0	60,2	44,2;74,7	24,3**	10,8;42,9	52,5	42,7;62,3	Oui
51,4*	34,4;68,2	87,9	79,9;93,5	27,3*	15,6;41,8	49,8	42,0;57,5	39,8*	25,3;55,8	75,7	57,1;89,2	47,5	37,7;57,3	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
38,8**	15,8;66,3	12,6**	0,1;58,3	39,1*	20,7;60,2	48,1	35,8;60,5	18,0**	5,5;38,9	82,5*	23,2;99,9	36,5*	21,6;53,6	2 semaines et moins
24,4**	6,1;53,8	16,6**	0,2;68,3	36,8**	18,7;58,2	21,2*	12,1;33,0	31,8**	13,5;55,5	-	;	29,6*	16,1;46,3	Plus de 2 semaines à 1 mois
12,0**	1,3;38,3	41,6**	8,4;82,1	11,8**	2,3;32,0	16,0**	8,1;27,2	27,0**	10,4;50,4	-	;	21,8**	10,6;37,0	Plus d'un mois à 3 mois
24,9**	6,4;54,3	29,2**	2,4;77,0	12,2**	2,3;33,0	14,7**	7,6;24,7	23,2**	8,1;45,7	17,5**	0,1;76,8	12,1**	4,1;26,1	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
15,2**	2,9;40,0	61,0	50,4;71,7	22,6**	3,8;56,6	25,2*	15,7;36,9	37,2**	14,8;64,6	81,6	56,5;95,6	39,0*	24,6;54,9	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
5,0**	0,1;27,6	23,7*	15,0;34,4	36,6**	12,2;67,5	2,5**	0,3;8,8	11,0**	1,0;37,2	8,8**	0,9;29,3	22,6**	11,4;37,6	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
69,8*	42,8;89,4	7,7**	3,0;15,6	7,6**	0,2;36,7	6,2**	2,1;13,9	40,7**	17,5;67,4	-	;	23,4**	11,6;39,1	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	59,8	48,9;70,8	5,5**	0,1;27,8	-	;	1,8**	0,0;9,6	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
10,0**	1,0;33,7	7,5**	3,1;14,9	33,2**	9,9;65,0	6,3**	2,2;13,5	5,5**	0,1;29,1	9,6**	1,1;31,3	13,3**	4,8;27,4	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
50,5*	25,4;75,4	24,6*	14,0;38,0	79,0	58,7;92,3	60,4	48,5;71,5	43,3*	23,5;64,9	80,8	55,9;95,1	51,9	39,5;64,4	2 semaines et moins
16,4**	3,1;42,4	32,5*	20,7;46,1	11,1**	2,1;30,0	18,2*	10,2;28,9	31,1**	13,7;53,4	14,5**	2,7;38,8	20,5**	10,8;33,7	Plus de 2 semaines à 1 mois
27,8**	9,3;54,4	33,6*	21,3;47,8	6,8**	0,9;22,3	17,7**	9,7;28,6	18,5**	5,9;39,2	-	;	17,9**	9,2;30,0	Plus d'un mois à 3 mois
5,4**	0,1;27,2	9,4**	3,0;20,9	3,2**	0,1;15,7	3,6**	0,7;10,4	7,1**	0,7;25,0	4,7**	0,1;24,8	9,6**	3,6;19,6	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
70,7	51,6;85,6	88,5	80,0;94,3	84,3	70,2;93,4	86,4	80,0;91,3	87,7	74,1;95,8	84,7	64,7;95,8	79,1	69,5;86,7	Oui, tout à fait
17,2**	6,3;34,6	8,9**	4,0;16,6	15,7**	6,6;29,8	10,8*	6,6;16,5	7,8**	1,7;20,7	12,0**	2,4;31,9	11,1**	5,5;19,2	Oui, en partie
12,1**	3,2;28,6	2,6**	0,3;9,0	-	;	2,8**	0,7;7,3	4,4**	0,5;15,3	3,3**	0,1;18,3	9,9**	4,6;18,0	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p, r]
14,3**	4,6;31,1	3,9**	1,1;9,7	6,3**	1,2;18,1	15,3*	10,0;22,0	2,4**	0,1;12,7	3,8**	0,1;19,4	5,2**	1,8;11,6	Oui
85,7	68,9;95,4	96,1	90,3;98,9	93,7	81,9;98,8	84,7	78,0;90,0	97,6	87,3;99,9	96,2	80,6;99,9	94,8	88,4;98,2	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	17,7	14,6;21,0	15,8**	7,5;28,0
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	35,9	32,1;39,8	24,2*	14,1;36,8
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	17,6	14,5;21,0	31,8*	20,4;45,1
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	23,9	20,5;27,3	21,1**	11,5;33,9
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	3,3*	2,1;5,1	5,4**	1,1;14,9
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	0,8**	0,3;1,8	1,7**	0,0;9,1
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	0,8**	0,2;2,0	-	;
Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	84,0	81,1;86,8	98,5	92,4;100,0
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	16,0	13,2;18,9	1,5**	0,0;7,6
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	93,4	91,1;95,3	88,8	77,9;95,5
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	6,6*	4,7;8,9	11,2**	4,5;22,1
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	92,2	89,8;94,2	89,1	78,5;95,7
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	7,8	5,8;10,2	10,9**	4,3;21,5
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	93,8	91,5;95,6	93,0	83,2;98,0
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	6,2*	4,4;8,5	7,0**	2,0;16,8
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	62,8	58,8;66,8	51,6	38,3;64,8
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	37,2	33,2;41,2	48,4	35,2;61,7
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	60,0	55,9;64,1	52,4	39,8;64,9
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	40,0	35,9;44,1	47,6	35,1;60,2
Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	58,8	53,8;63,9	41,6*	24,0;60,9
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	41,2	36,1;46,2	58,4*	39,1;76,0
Contact pour du soutien pratique[3, p]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	70,5	66,7;74,4	65,1	51,1;77,5
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	29,5	25,6;33,3	34,9*	22,5;48,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3. On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
16,4**	6,1;32,8	22,5*	15,2;31,4	9,8**	2,9;22,5	28,9	22,2;36,5	9,0**	2,6;20,9	11,5**	2,3;30,9	8,3**	3,6;15,7	Médecin de famille
16,7**	6,8;32,1	49,5	39,6;59,4	54,4	40,6;68,2	36,1	28,5;43,8	21,8**	10,5;37,4	34,4**	16,9;55,7	34,9	25,5;44,3	Médecin spécialiste du cancer
4,8**	0,5;17,4	10,9**	5,6;18,8	16,4**	7,4;29,8	18,7*	12,9;25,7	17,8**	8,3;31,5	10,7**	2,4;27,6	20,4*	13,5;29,0	Chirurgien
59,4	41,4;75,8	17,1*	10,4;25,6	15,3**	6,7;28,2	6,3**	3,1;11,2	51,4*	35,1;67,5	33,2**	16,6;53,5	32,8	23,9;41,7	Autre médecin spécialiste
-	;	-	;	4,1**	0,5;14,1	6,9**	3,5;11,9	-	;	7,0**	0,7;24,5	1,9**	0,2;6,6	Autre médecin non spécifié
2,6**	0,1;14,2	-	;	-	;	0,6**	0,0;3,6	-	;	3,2**	0,1;17,2	0,8**	0,0;4,4	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	-	;	-	;	2,4**	0,4;7,1	-	;	-	;	0,9**	0,0;5,3	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]
66,7	49,7;81,0	90,9	84,2;95,3	94,5	84,7;98,9	65,8	58,0;73,7	92,4	78,9;98,5	100,0	;	85,7	76,8;92,1	En personne
33,3*	19,0;50,3	9,1**	4,7;15,8	5,5**	1,1;15,3	34,2	26,3;42,0	7,6**	1,5;21,1	-	;	14,3**	7,9;23,2	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
82,9	67,7;93,0	97,1	91,4;99,5	89,7	77,6;96,5	95,3	90,7;98,1	97,7	87,6;99,9	95,8	80,0;99,9	93,4	86,9;97,2	Oui
17,1**	7,0;32,3	2,9**	0,5;8,6	10,3**	3,5;22,4	4,7**	1,9;9,3	2,3**	0,1;12,4	4,2**	0,1;20,0	6,6**	2,8;13,1	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
82,4	66,8;92,7	93,2	86,1;97,3	86,1	73,5;94,2	94,9	90,3;97,7	100,0	;	95,8	80,0;99,9	91,6	84,9;96,0	Oui
17,6**	7,3;33,2	6,8**	2,7;13,9	13,9**	5,8;26,5	5,1**	2,3;9,7	-	;	4,2**	0,1;20,0	8,4**	4,0;15,1	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
84,2	69,1;93,8	94,5	87,7;98,2	89,5	77,8;96,4	96,8	92,4;99,0	97,9	88,6;100,0	95,8	80,0;99,9	92,3	85,5;96,6	Oui
15,8**	6,2;30,9	5,5**	1,8;12,3	10,5**	3,6;22,2	3,2**	1,0;7,6	2,1**	0,0;11,4	4,2**	0,1;20,0	7,7**	3,4;14,5	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]
34,7*	19,5;52,5	82,8	74,0;89,6	72,3	58,3;83,8	70,7	62,5;78,0	46,9*	30,8;63,5	61,2*	40,4;79,4	52,9	43,0;62,8	Oui
65,3	47,5;80,5	17,2*	10,4;26,0	27,7*	16,2;41,7	29,3	22,0;37,5	53,1*	36,5;69,2	38,8*	20,6;59,6	47,1	37,2;57,0	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]
61,9	44,1;77,7	49,9	39,9;60,0	62,1	46,1;76,3	68,8	60,9;76,7	67,2	51,2;80,7	64,1*	42,4;82,3	56,4	46,8;66,1	Oui
38,1*	22,3;55,9	50,1	40,0;60,1	37,9*	23,7;53,9	31,2	23,3;39,1	32,8*	19,3;48,8	35,9**	17,7;57,6	43,6	33,9;53,2	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]
58,7*	37,3;78,0	47,2*	32,9;62,0	73,0	52,4;88,3	70,4	60,3;79,2	41,2*	22,0;62,5	72,0*	43,7;91,4	57,2	44,0;70,5	Oui
41,3*	22,0;62,7	52,8	38,0;67,1	27,0**	11,7;47,6	29,6*	20,8;39,7	58,8*	37,5;78,0	28,0**	8,6;56,3	42,8*	29,5;56,0	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p]
77,2	61,1;89,0	69,2	60,2;78,2	81,0	68,3;90,2	75,6	68,1;82,2	62,0	44,8;77,3	81,4	61,8;93,7	62,2	52,7;71,6	Oui
22,8**	11,0;38,9	30,8	21,8;39,8	19,0**	9,8;31,7	24,4	17,8;31,9	38,0*	22,7;55,2	18,6**	6,3;38,2	37,8	28,4;47,3	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	8,5*	5,8;12,0	3,5**	0,1;17,8
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	91,5	88,0;94,2	96,5	82,2;99,9
Infirmière pivot en oncologie[p]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	37,5	32,4;42,7	20,0**	7,5;39,1
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	62,5	57,3;67,6	80,0	60,9;92,5
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	5,9*	3,6;9,1	2,9**	0,1;15,0
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	94,1	90,9;96,4	97,1	85,0;99,9
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	10,5*	7,6;14,2	6,6**	0,7;22,9
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	89,5	85,8;92,4	93,4	77,1;99,3
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	8,1*	5,4;11,5	8,6**	1,8;23,2
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	91,9	88,5;94,6	91,4	76,8;98,2
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	3,0**	1,5;5,4	6,6**	0,8;22,1
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	97,0	94,6;98,5	93,4	77,9;99,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]
9,4**	1,2;29,7	10,6**	4,1;21,3	26,3**	10,5;48,2	8,0**	3,7;14,9	4,1**	0,1;20,7	6,1**	0,2;29,1	4,7**	1,1;12,3	Oui
90,6	70,3;98,8	89,4	78,7;95,9	73,7	51,8;89,5	92,0	85,1;96,3	95,9	79,3;99,9	93,9	70,9;99,8	95,3	87,7;98,9	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p]
46,7*	26,3;67,9	27,0*	14,9;42,3	38,9**	19,7;61,0	47,7	38,3;57,1	26,6**	11,5;47,1	42,5**	18,3;69,7	39,5*	26,4;53,7	Oui
53,3*	32,1;73,7	73,0	57,7;85,1	61,1*	39,0;80,3	52,3	42,9;61,7	73,4	52,9;88,5	57,5*	30,3;81,7	60,5	46,3;73,6	Non
														Psychologue[p]
-	;	3,6**	0,4;12,5	19,8**	6,2;41,8	6,5**	2,7;12,8	3,3**	0,1;17,6	-	;	7,1**	2,0;16,9	Oui
100,0	;	96,4	87,5;99,6	80,2	58,2;93,8	93,5	87,2;97,3	96,7	82,4;99,9	100,0	;	92,9	83,1;98,0	Non
														Travailleur social[p]
7,9**	0,9;26,2	-	;	11,6**	2,1;32,0	19,2*	12,5;27,5	7,7**	1,0;24,9	5,0**	0,1;26,0	10,7**	4,0;21,8	Oui
92,1	73,8;99,1	100,0	;	88,4	68,0;97,9	80,8	72,5;87,5	92,3	75,1;99,0	95,0	74,0;99,9	89,3	78,2;96,0	Non
														Médecin[p]
8,1**	0,9;26,9	5,9**	1,1;17,0	17,8**	5,8;37,5	2,8**	0,6;8,2	7,5**	0,9;25,0	18,9**	3,5;48,2	10,7**	4,0;21,7	Oui
91,9	73,1;99,1	94,1	83,0;98,9	82,2	62,5;94,2	97,2	91,8;99,4	92,5	75,0;99,1	81,1	51,8;96,5	89,3	78,3;96,0	Non
														Autre professionnel de la santé
3,9**	0,1;21,0	1,8**	0,1;9,1	-	;	2,0**	0,2;7,4	3,7**	0,1;18,4	5,8**	0,1;29,8	3,7**	0,4;13,3	Oui
96,1	79,0;99,9	98,2	90,9;99,9	100,0	;	98,0	92,6;99,8	96,3	81,6;99,9	94,2	70,2;99,9	96,3	86,7;99,6	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	21,0	17,7;24,3	16,2**	8,0;27,9
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	79,0	75,7;82,3	83,8	72,1;92,0
Médecin spécialiste du cancer[p, r]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	41,8	37,8;45,9	31,5*	19,4;45,7
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	58,2	54,1;62,2	68,5	54,3;80,6
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	18,0	15,0;21,1	24,8*	14,6;37,5
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	82,0	78,9;85,0	75,2	62,5;85,4
Autre médecin spécialiste[p, r]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	10,0	7,7;12,7	10,3**	4,4;19,9
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	90,0	87,3;92,3	89,7	80,1;95,6
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	3,1*	1,8;4,8	1,4**	0,0;8,9
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	96,9	95,2;98,2	98,6	91,1;100,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
26,9**	13,8;43,6	11,6**	5,9;19,8	30,4*	17,7;45,9	24,3	17,5;32,2	21,5**	10,3;36,9	42,2*	22,6;63,8	16,4*	10,0;24,5	Oui
73,1	56,4;86,2	88,4	80,2;94,1	69,6	54,1;82,3	75,7	67,8;82,5	78,5	63,1;89,7	57,8*	36,2;77,4	83,6	75,5;90,0	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p, r]
61,6	44,4;76,9	48,6	38,8;58,3	59,4	44,0;73,5	43,4	35,6;51,2	32,9*	19,0;49,3	36,4*	19,4;56,4	30,1*	21,0;39,3	Oui
38,4*	23,1;55,6	51,4	41,7;61,2	40,6*	26,5;56,0	56,6	48,8;64,4	67,1	50,7;81,0	63,6	43,6;80,6	69,9	60,7;79,0	Non
														Médecin de famille[p]
17,4**	6,7;34,0	21,9*	14,0;31,6	14,0**	6,0;26,5	23,8	17,1;31,6	13,6**	5,1;27,6	17,9**	5,6;38,6	6,7**	2,7;13,4	Oui
82,6	66,0;93,3	78,1	68,4;86,0	86,0	73,5;94,0	76,2	68,4;82,9	86,4	72,4;94,9	82,1	61,4;94,4	93,3	86,6;97,3	Non
														Autre médecin spécialiste[p, r]
5,5**	0,6;19,1	5,1**	1,6;11,6	2,3**	0,0;12,6	6,7**	3,2;12,1	22,9**	11,3;38,6	11,1**	2,8;27,1	18,0*	10,8;27,4	Oui
94,5	80,9;99,4	94,9	88,4;98,4	97,7	87,4;100,0	93,3	87,9;96,8	77,1	61,4;88,7	88,9	72,9;97,2	82,0	72,6;89,2	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
2,4**	0,1;13,3	-	;	2,0**	0,1;10,7	6,4**	2,9;12,0	4,5**	0,6;15,2	3,2**	0,1;17,7	2,7**	0,5;7,8	Oui
97,6	86,7;99,9	100,0	;	98,0	89,3;99,9	93,6	88,0;97,1	95,5	84,8;99,4	96,8	82,3;99,9	97,3	92,2;99,5	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	80,4	76,6;83,8	72,4	59,7;83,0
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	14,7	11,7;18,1	19,2**	10,2;31,4
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	4,9*	3,1;7,2	8,4**	2,7;18,7
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	71,0	67,1;74,8	73,0	60,1;83,5
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	16,3	13,3;19,8	14,1**	6,4;25,5
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	12,7	10,0;15,8	12,9**	5,8;23,9
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	78,6	74,0;83,2	82,7	66,9;93,0
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	13,6	9,9;18,0	10,6**	2,8;25,8
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	7,8*	5,2;11,2	6,7**	1,3;18,6
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	58,7	53,7;63,7	54,8*	36,9;71,8
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	11,5	8,5;15,2	10,3**	2,8;24,6
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	29,8	25,2;34,4	34,9*	19,5;53,0
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	36,3	32,3;40,4	28,6*	17,6;41,8
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	16,5	13,4;19,9	14,9**	7,1;26,4
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	15,9	13,0;19,2	10,5**	4,2;20,6
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	9,7	7,1;12,7	12,6**	5,5;23,6
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	21,7	18,1;25,3	33,4*	21,3;47,3
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	65,2	58,5;72,0	61,0*	34,4;83,5
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	16,2*	11,1;22,4	28,6**	9,1;56,7
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	18,6	13,5;24,6	10,5**	1,1;34,3
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	34,0	30,3;37,6	15,9**	7,8;27,5
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	66,0	62,4;69,7	84,1	72,5;92,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
78,9	62,9;90,3	86,0	77,0;92,5	72,2	57,5;84,0	82,8	75,8;88,4	82,8	66,8;93,2	81,3	62,4;93,3	79,9	70,3;87,5	Oui, tout à fait
18,4**	7,9;33,8	10,8**	5,2;19,1	25,7*	14,5;39,9	10,7*	6,5;16,2	17,2**	6,8;33,2	15,4**	4,3;35,2	13,6**	7,2;22,5	Oui, en partie
2,7**	0,0;15,5	3,2**	0,4;10,8	2,1**	0,1;11,1	6,6**	2,9;12,5	-	;	3,3**	0,1;18,3	6,5**	2,8;12,7	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
70,7	53,9;84,2	76,3	66,7;84,3	61,1	45,1;75,6	74,9	67,1;81,7	63,9	46,3;79,2	71,2	51,2;86,5	66,9	57,2;76,6	Oui, tout à fait
12,5**	4,3;26,6	17,2*	10,1;26,4	25,0**	13,5;39,8	14,9*	9,6;21,6	13,9**	5,2;27,9	25,5**	11,0;45,4	15,0*	8,8;23,3	Oui, en partie
16,7**	6,6;32,6	6,5**	2,4;13,8	13,9**	5,5;27,0	10,2*	5,9;16,0	22,2**	10,3;38,7	3,3**	0,1;16,5	18,1*	10,9;27,4	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
75,3	55,5;89,5	79,7	67,5;88,8	80,2	61,5;92,4	77,5	66,8;86,0	76,9	47,1;94,7	90,1	68,2;98,8	72,7	58,2;84,3	Oui
10,4**	2,1;28,1	15,4**	7,6;26,6	12,4**	3,5;28,8	11,8**	5,6;21,1	5,8**	0,1;31,3	9,9**	1,2;31,8	22,1**	11,5;36,2	Non, il ne voulait pas
14,3**	4,0;32,8	4,9**	1,0;13,7	7,4**	0,9;24,6	10,7**	5,0;19,4	17,3**	2,9;46,2	-	;	5,3**	1,0;15,4	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
61,8	43,7;77,7	64,6	51,9;75,9	48,3*	30,1;66,8	56,0	46,6;65,5	52,8*	33,7;71,4	65,9*	38,1;87,4	62,6	48,9;74,9	Oui, tout à fait
6,5**	0,7;22,0	9,6**	4,2;18,3	25,0**	11,0;44,4	12,4**	6,8;20,2	10,2**	2,2;26,9	10,7**	1,1;35,1	10,0**	3,9;20,2	Oui, en partie
31,8*	17,5;49,1	25,8*	15,7;38,1	26,7**	12,1;46,1	31,6	22,7;40,4	37,0**	19,3;57,7	23,4**	5,8;52,3	27,4*	16,8;40,4	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
33,6*	18,4;51,7	38,9	29,8;48,1	39,9*	25,6;55,5	41,2	33,6;48,8	23,9**	11,2;41,3	45,9*	26,3;66,5	34,0	24,4;43,6	Oui, une infirmière pivot en oncologie
18,8**	8,0;34,9	16,9*	10,1;25,8	5,9**	1,2;16,5	20,2*	13,9;27,8	6,8**	1,2;19,7	27,3**	11,1;49,5	17,3*	10,1;26,7	Oui, un autre professionnel de la santé
15,4**	4,8;33,4	15,1*	8,8;23,7	32,2*	19,3;47,6	14,4*	9,3;20,9	28,3**	14,6;45,8	3,3**	0,1;18,2	12,5**	6,4;21,2	Oui, un membre du personnel administratif
5,4**	0,6;18,8	7,3**	2,6;15,7	8,5**	2,2;20,8	4,7**	1,6;10,6	21,3**	10,3;36,3	11,1**	2,3;29,5	13,6**	7,6;22,0	Oui, un médecin
26,9**	13,0;45,1	21,7*	13,6;31,8	13,5**	5,2;26,8	19,6*	13,3;27,2	19,7**	7,9;37,5	12,3**	2,4;32,8	22,6*	14,8;32,0	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
55,4**	15,6;90,4	66,8	48,6;82,0	38,9**	15,4;67,1	66,0	53,0;77,5	74,5*	26,8;98,3	51,8**	4,8;96,2	80,6	60,2;93,5	Oui, tout à fait
22,0**	1,5;66,9	25,0**	11,5;43,3	7,0**	0,2;33,8	12,5**	5,7;23,0	13,5**	0,1;63,2	22,5**	0,1;84,4	8,6**	1,2;26,8	Oui, en partie
22,6**	1,5;68,2	8,2**	1,7;22,2	54,0*	27,0;79,4	21,5*	12,2;33,5	12,0**	0,1;60,7	25,7**	0,3;86,2	10,7**	2,3;28,1	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]
38,7*	24,0;55,1	41,5	32,1;50,9	27,5*	15,0;43,1	48,1	40,3;55,9	14,9**	5,8;29,4	46,8*	27,2;67,3	25,4*	17,1;35,3	Oui
61,3	44,9;76,0	58,5	49,1;67,9	72,5	56,9;85,0	51,9	44,1;59,7	85,1	70,6;94,2	53,2*	32,7;72,8	74,6	64,7;82,9	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	83,9	81,4;86,5	95,0	86,4;98,9
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	16,1	13,5;18,6	5,0**	1,1;13,6
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	22,9	19,1;26,7	5,7**	1,3;15,5
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	77,1	73,3;80,9	94,3	84,5;98,7
Lieu de la chirurgie[p]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	96,1	94,0;97,6	97,4	87,4;99,9
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	3,9*	2,4;6,0	2,6**	0,1;12,6
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	59,0	52,2;65,8	69,0*	41,4;89,3
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	6,8**	3,5;11,6	-	;
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	34,2	27,6;40,8	31,0**	10,7;58,6
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	69,0	64,6;73,4	66,3	51,6;78,9
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	15,1	11,9;18,8	21,6**	11,6;34,8
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	15,9	12,6;19,7	12,1**	4,4;25,3
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	96,0	93,5;97,7	100,0	;
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	4,0**	2,3;6,5	-	;
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	86,7	83,1;89,8	84,5	71,6;93,1
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	12,3	9,3;15,9	15,5**	6,9;28,4
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	0,9**	0,2;2,4	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
92,2	79,1;98,3	70,4	62,7;77,3	36,8*	23,1;52,3	96,3	92,1;98,7	89,9	76,9;97,0	66,6	46,0;83,5	93,3	87,0;97,2	Oui
7,8**	1,7;20,9	29,6	22,7;37,3	63,2	47,7;76,9	3,7**	1,3;7,9	10,1**	3,0;23,1	33,4**	16,5;54,0	6,7**	2,8;13,0	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
11,0**	2,8;26,9	11,3**	4,9;21,3	50,3**	22,7;77,7	28,3	21,1;36,4	12,5**	4,2;26,7	6,0**	0,1;30,0	40,6	30,4;50,7	Oui
89,0	73,1;97,2	88,7	78,7;95,1	49,7**	22,3;77,3	71,7	63,6;78,9	87,5	73,3;95,8	94,0	70,0;99,9	59,4	49,3;69,6	Non
														Lieu de la chirurgie[p]
100,0	;	98,5	91,8;100,0	95,1	73,1;99,9	94,2	89,4;97,3	97,4	85,5;100,0	88,8	66,4;98,4	95,7	89,5;98,8	Hôpital de la région de résidence
-	;	1,5**	0,0;8,2	4,9**	0,1;26,9	5,8**	2,7;10,6	2,6**	0,0;14,5	11,2**	1,6;33,6	4,3**	1,2;10,5	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
41,6**	16,3;70,7	64,0	43,6;81,3	62,3**	19,8;93,7	50,7	38,8;62,6	81,7*	43,5;98,4	60,5**	8,1;97,9	61,5	45,7;75,7	Oui, tout à fait
-	;	6,7**	0,7;23,0	-	;	7,5**	2,5;16,6	-	;	39,5**	2,1;91,9	10,2**	2,6;24,9	Oui, en partie
58,4*	29,3;83,7	29,3**	13,5;49,8	37,7**	6,3;80,2	41,7	29,8;53,7	18,3**	1,6;56,5	-	;	28,3**	14,8;45,4	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
51,5*	34,5;68,2	74,6	62,2;84,6	66,7*	37,5;88,7	70,6	62,5;77,8	89,0	72,7;97,3	64,9*	38,5;86,0	63,2	53,2;73,2	Oui, tout à fait
21,6**	9,8;38,4	18,6**	9,8;30,6	12,9**	1,6;39,3	12,7*	7,6;19,6	5,1**	0,6;17,5	24,4**	7,1;51,3	12,6**	6,6;21,1	Oui, en partie
26,9**	13,5;44,3	6,8**	1,8;17,0	20,4**	3,7;51,5	16,7*	11,0;23,9	5,9**	0,7;19,6	10,7**	1,0;36,4	24,2*	15,6;34,7	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
97,5	86,3;99,9	94,0	84,4;98,6	87,7	60,1;98,8	94,9	89,2;98,1	97,3	86,6;99,9	95,1	72,5;99,9	97,0	90,7;99,5	Oui
2,5**	0,1;13,7	6,0**	1,4;15,6	12,3**	1,2;39,9	5,1**	1,9;10,8	2,7**	0,1;13,4	4,9**	0,1;27,5	3,0**	0,5;9,3	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
88,2	71,1;97,0	86,8	76,4;93,8	80,2*	42,9;97,9	87,0	80,0;92,2	97,2	85,9;99,9	94,5	71,1;99,9	82,4	72,9;89,6	Oui, tout à fait
9,1**	1,8;25,1	13,2**	6,2;23,6	19,8**	2,1;57,1	12,4*	7,2;19,3	2,8**	0,1;14,1	5,5**	0,1;28,9	15,1*	8,4;24,2	Oui, en partie
2,7**	0,0;15,3	-	;	-	;	0,7**	0,0;3,7	-	;	-	;	2,5**	0,3;8,4	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	38,5	36,0;41,1	49,7	37,5;61,8
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	61,5	58,9;64,0	50,3	38,2;62,5
Lieu de la chimiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	96,2	92,9;98,2	100,0	;
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	3,8**	1,8;7,1	-	;
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	70,2	64,3;76,0	76,4	56,0;90,6
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	27,1	21,5;32,7	23,6**	9,4;44,0
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	2,7**	1,0;5,8	-	;
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	46,7	37,3;56,0	14,3**	1,8;43,0
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	16,4*	9,4;25,7	28,1**	7,0;60,1
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	36,9	27,8;46,1	57,6*	27,3;84,2
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	57,3	51,0;63,6	44,6*	27,1;63,2
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	34,7	28,5;41,0	47,3*	29,6;65,4
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	8,0*	4,6;12,7	8,1**	1,1;25,3
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	70,9	64,0;77,2	65,0	45,0;81,7
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	24,8	19,0;31,5	31,3**	15,6;50,9
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	4,3**	2,0;7,9	3,8**	0,1;19,7
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	88,3	83,0;92,3	78,1	58,6;91,4
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	8,8*	5,3;13,7	14,3**	4,1;32,6
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	2,9**	1,1;6,1	7,6**	0,8;26,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
36,5*	21,4;53,9	4,5**	1,4;10,7	88,6	76,9;95,6	50,7	43,3;58,2	20,0**	9,6;34,4	67,0	46,3;83,8	26,2*	18,5;35,2	Oui
63,5	46,1;78,6	95,5	89,3;98,6	11,4**	4,4;23,1	49,3	41,8;56,7	80,0	65,6;90,4	33,0**	16,2;53,7	73,8	64,8;81,5	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p]
93,7	65,3;99,9	100,0	;	95,6	85,2;99,4	95,2	87,9;98,7	100,0	;	94,4	72,0;99,9	95,8	77,7;99,9	Hôpital de la région de résidence
6,3**	0,1;34,7	-	;	4,4**	0,6;14,8	4,8**	1,3;12,1	-	;	5,6**	0,1;28,0	4,2**	0,1;22,3	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
73,7*	43,9;93,0	100,0	;	74,4	58,0;86,9	74,2	63,1;83,5	63,3**	23,8;92,6	50,4*	26,2;74,5	55,5*	32,8;76,6	Moins de 30 minutes
26,3**	7,0;56,1	-	;	23,1**	11,4;38,9	23,4*	14,7;34,0	36,7**	7,4;76,2	38,5**	16,8;64,2	40,4**	20,3;63,3	De 30 à 60 minutes
-	;	-	;	2,5**	0,1;12,1	2,4**	0,3;8,6	-	;	11,1**	1,4;34,6	4,1**	0,1;22,0	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
43,9**	12,1;79,9	54,4**	1,0;99,6	57,9*	30,0;82,5	51,6*	34,9;68,1	49,5**	3,5;96,2	47,3**	15,3;81,2	53,4**	21,5;83,4	Oui, tout à fait
12,2**	0,2;55,2	45,6**	0,4;99,0	14,5**	1,5;45,4	13,1**	4,3;28,3	-	;	29,9**	4,9;69,7	7,5**	0,2;36,4	Oui, en partie
44,0**	11,7;80,7	-	;	27,6**	7,9;57,2	35,2*	20,8;52,0	50,5**	3,8;96,5	22,8**	2,5;62,7	39,1**	11,0;74,0	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
51,3**	23,1;78,9	37,5**	0,7;95,1	35,7*	20,9;52,9	73,6	63,0;82,5	88,9	50,6;99,8	61,1*	34,7;83,4	49,9*	25,3;74,5	Moins de 30 minutes
42,4**	16,7;71,5	28,5**	0,1;93,8	50,7*	34,0;67,4	22,9*	14,4;33,3	11,1**	0,2;49,4	33,6**	12,9;60,3	34,2**	13,5;60,4	De 30 à 60 minutes
6,3**	0,1;32,9	34,0**	0,3;94,8	13,5**	4,4;29,4	3,6**	0,7;10,0	-	;	5,3**	0,1;27,4	15,9**	2,7;42,9	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
80,1	48,5;96,6	100,0	;	63,1	45,8;78,2	73,1	61,9;82,5	74,3*	31,7;97,2	70,9*	43,9;90,1	75,8	48,8;93,0	Oui, tout à fait
19,9**	3,4;51,5	-	;	30,1**	16,0;47,7	24,3*	15,3;35,2	25,7**	2,8;68,3	29,1**	9,9;56,1	9,3**	0,9;31,4	Oui, en partie
-	;	-	;	6,8**	1,3;19,4	2,7**	0,3;9,5	-	;	-	;	15,0**	2,5;41,1	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
81,0	51,3;96,6	100,0	;	88,7	75,6;96,2	96,3	89,6;99,2	100,0	;	83,6	57,0;97,0	78,1	54,8;92,9	Oui, tout à fait
19,0**	3,4;48,7	-	;	6,8**	1,3;19,2	3,7**	0,8;10,4	-	;	16,4**	3,0;43,0	13,6**	2,6;36,0	Oui, en partie
-	;	-	;	4,5**	0,4;17,0	-	;	-	;	-	;	8,4**	0,8;28,7	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	47,4	44,5;50,4	28,8*	17,6;42,3
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	52,6	49,6;55,5	71,2	57,7;82,4
Lieu de la radiothérapie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	95,2	92,1;97,3	100,0	;
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	4,8**	2,7;7,9	-	;
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	58,5	52,8;64,2	76,5	48,8;93,7
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	33,5	28,1;38,8	23,5**	6,3;51,2
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	8,0*	5,2;11,7	-	;
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	54,9	47,4;62,5	42,2**	11,7;78,0
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	11,4*	7,0;17,2	8,6**	0,1;43,0
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	33,7	26,6;40,8	49,3**	16,3;82,7
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	79,7	75,1;84,3	68,8*	39,7;89,9
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	11,5*	7,9;16,0	16,5**	3,1;42,8
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	8,8*	5,8;12,7	14,7**	2,1;42,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
35,8*	21,2;52,7	40,9	33,7;48,1	37,7*	23,4;53,7	80,9	73,8;86,7	65,7	49,1;79,9	44,9*	25,9;64,9	22,2*	15,2;30,6	Oui
64,2	47,3;78,8	59,1	51,9;66,3	62,3	46,3;76,6	19,1*	13,3;26,2	34,3*	20,1;50,9	55,1*	35,1;74,1	77,8	69,4;84,8	Non
														Lieu de la radiothérapie[p, r]
100,0	;	98,1	89,8;100,0	77,1	51,0;93,4	93,9	88,2;97,4	100,0	;	91,7	59,0;99,9	100,0	;	Hôpital de la région de résidence
-	;	1,9**	0,0;10,2	22,9**	6,6;49,0	6,1**	2,6;11,8	-	;	8,3**	0,1;41,0	-	;	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
51,6*	25,4;77,1	48,6*	33,5;63,9	61,7*	35,6;83,6	53,5	45,1;62,0	73,4	51,1;89,4	56,9**	22,9;86,6	74,0	48,8;91,2	Moins de 30 minutes
41,7**	17,1;69,9	33,6*	20,7;48,6	24,8**	7,3;51,8	38,8	31,0;46,7	26,6**	10,6;48,9	34,8**	9,4;69,1	21,7**	6,3;46,7	De 30 à 60 minutes
6,7**	0,1;35,4	17,8**	8,4;31,1	13,5**	2,0;38,8	7,6**	3,4;14,4	-	;	8,3**	0,1;41,0	4,3**	0,1;21,6	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
56,5**	15,7;91,4	54,7*	35,4;73,0	80,6*	42,1;98,2	45,4	34,5;56,2	51,1**	17,7;83,8	74,6*	32,6;97,2	87,1	56,9;98,9	Oui, tout à fait
29,7**	2,7;76,8	6,1**	0,8;19,4	-	;	18,2*	10,3;28,7	-	;	-	;	6,8**	0,1;34,9	Oui, en partie
13,9**	0,3;58,3	39,2*	22,0;58,7	19,4**	1,8;57,9	36,5	26,2;46,7	48,9**	16,2;82,3	25,4**	2,8;67,4	6,2**	0,0;35,7	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
66,2*	37,1;88,3	82,2	68,0;92,0	84,5	60,4;96,8	79,5	71,1;86,3	92,1	74,7;99,0	75,8*	41,9;95,4	78,4	57,2;92,3	Oui, tout à fait
6,5**	0,1;32,1	8,5**	2,3;20,6	10,0**	1,4;30,6	11,7**	6,5;19,1	7,9**	1,0;25,3	24,2**	4,6;58,1	12,4**	2,6;32,3	Oui, en partie
27,3**	7,7;56,8	9,3**	2,5;22,6	5,5**	0,1;27,1	8,8**	4,6;14,8	-	;	-	;	9,2**	0,9;31,6	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Douleur et malaises ressentis[p, r]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	54,7	50,8;58,6	60,7	46,1;73,9
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	45,3	41,4;49,2	39,3*	26,1;53,9
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	26,8	22,0;31,7	32,3*	18,1;49,4
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	40,5	35,1;45,9	38,3*	22,3;56,5
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	32,6	27,6;37,6	29,3**	15,7;46,3
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	80,9	75,8;85,3	83,4	67,5;93,6
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	15,5	11,6;20,1	14,0**	4,9;29,3
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	3,6**	1,9;6,3	2,6**	0,1;13,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p, r]
57,6	39,5;74,3	29,5*	21,0;39,2	67,9	52,3;81,0	62,3	54,5;70,1	59,5	42,4;75,1	85,9	67,5;96,1	46,9	37,1;56,7	Oui
42,4*	25,7;60,5	70,5	60,8;79,0	32,1*	19,0;47,7	37,7	29,9;45,5	40,5*	24,9;57,6	14,1**	3,9;32,5	53,1	43,3;62,9	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
30,6**	12,8;54,0	20,1**	6,8;40,9	36,1*	19,6;55,3	20,6*	12,7;30,5	37,1**	18,5;59,0	35,1**	16,2;58,2	20,5**	10,0;35,0	Sévères
51,1*	28,9;72,9	34,1**	17,5;54,3	25,4**	11,3;44,6	43,8	34,3;53,3	33,6**	15,3;56,5	46,6*	25,1;69,0	46,5*	32,0;61,4	Modérés
18,3**	4,8;41,8	45,8*	27,3;65,2	38,5*	21,6;57,8	35,6	26,5;44,8	29,3**	12,6;51,4	18,3**	5,2;40,7	33,1*	20,6;47,5	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
82,9	61,9;95,1	76,3	55,8;90,5	82,2	65,8;92,9	80,2	70,8;87,7	88,0	67,8;97,7	88,3	68,4;97,7	73,1	58,2;85,0	Oui, tout à fait
17,1**	4,9;38,1	13,3**	3,5;31,6	15,0**	5,3;30,7	15,8*	9,1;24,7	12,0**	2,3;32,2	11,7**	2,3;31,6	21,1**	10,2;36,2	Oui, en partie
-	;	10,4**	2,1;28,1	2,8**	0,1;14,4	4,0**	1,1;9,9	-	;	-	;	5,8**	0,6;19,8	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	91,4	88,1;93,9	93,2	77,5;99,2
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	7,1*	4,8;10,1	6,8**	0,8;22,5
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	1,5**	0,6;3,3	-	;
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	11,5	9,0;14,4	22,0**	12,0;35,0
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	88,5	85,6;91,0	78,0	65,0;88,0
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	68,9	65,1;72,8	64,2	51,0;76,1
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	29,8	26,0;33,6	35,8*	23,9;49,0
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	1,2**	0,5;2,6	-	;
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	62,0	58,3;65,7	53,5	40,5;66,6
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	38,0	34,3;41,7	46,5	33,4;59,5
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	15,9	13,0;19,1	16,7**	8,0;29,4
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	14,3	11,4;17,5	7,9**	2,5;18,0
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	69,8	66,2;73,5	75,3	61,7;86,1
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	75,8	71,5;80,1	79,9	65,0;90,4
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	17,1	13,7;20,9	14,0**	5,5;27,5
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	7,1*	4,6;10,4	6,2**	1,2;17,4
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	66,6	61,6;71,5	69,6	52,4;83,5
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	33,4	28,5;38,4	30,4*	16,5;47,6
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	87,3	84,2;90,0	75,8	62,7;86,0
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	11,9	9,2;14,9	24,2*	14,0;37,3
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	0,8**	0,2;2,1	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
87,3	67,1;97,3	87,2	75,6;94,7	93,8	82,8;98,7	92,7	86,5;96,6	93,3	76,1;99,3	76,9	51,9;92,9	95,5	87,7;99,0	Oui, tout à fait
12,7**	2,7;32,9	7,7**	2,0;19,1	6,2**	1,3;17,2	5,7**	2,2;11,6	3,2**	0,1;17,1	23,1**	7,1;48,1	4,5**	1,0;12,3	Oui, en partie
-	;	5,1**	1,0;14,3	-	;	1,6**	0,2;5,8	3,6**	0,1;18,9	-	;	-	;	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
9,4**	2,5;22,8	7,0**	2,9;13,8	14,2**	5,9;27,0	9,0**	4,8;15,1	14,0**	5,4;27,7	3,8**	0,1;19,9	12,9*	7,6;20,0	Oui
90,6	77,2;97,5	93,0	86,2;97,1	85,8	73,0;94,1	91,0	84,9;95,2	86,0	72,3;94,6	96,2	80,1;99,9	87,1	80,0;92,4	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
68,2	50,5;82,7	67,1	57,5;76,7	68,2	51,6;81,9	73,4	65,5;80,3	71,4	55,4;84,3	78,0	58,3;91,3	65,0	55,4;74,6	Oui, toujours
29,3**	15,5;46,7	29,9*	20,9;40,3	31,8*	18,1;48,4	25,9	19,0;33,9	23,8**	11,9;39,8	22,0**	8,7;41,7	35,0	25,4;44,6	Oui, la plupart du temps
2,5**	0,1;13,3	3,0**	0,6;8,9	-	;	0,7**	0,0;3,9	4,8**	0,6;16,5	-	;	-	;	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
56,3	39,1;72,3	72,7	63,1;80,9	73,7	59,6;85,0	77,3	70,0;83,5	31,1*	17,0;48,4	66,7	45,8;83,8	44,7	35,1;54,3	Oui
43,7*	27,7;60,9	27,3*	19,1;36,9	26,3*	15,0;40,4	22,7	16,5;30,0	68,9	51,6;83,0	33,3**	16,2;54,2	55,3	45,7;64,9	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]
16,7**	6,0;33,8	4,8**	1,6;10,6	29,6*	17,2;44,6	26,9	19,5;35,4	-	;	21,5**	8,6;40,4	10,1**	5,1;17,5	Oui
21,5**	9,7;38,2	10,2**	4,9;18,1	17,6**	8,3;30,8	18,9*	13,2;25,8	16,2**	6,5;31,2	12,2**	2,3;32,9	11,8**	6,1;19,9	Non, mais il aurait aimé l'être
61,8	43,5;77,9	85,1	76,3;91,5	52,8	37,9;67,4	54,2	45,9;62,5	83,8	68,8;93,5	66,4	46,0;83,1	78,1	69,3;85,4	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
72,9	54,0;87,2	81,2	69,4;89,9	67,4	48,7;82,8	75,8	66,3;83,7	76,7	56,2;90,9	83,7	62,5;95,6	70,0	57,7;80,4	Oui, tout à fait
20,6**	8,1;39,2	14,5**	6,8;26,0	16,6**	6,4;32,4	18,9*	11,8;28,0	13,2**	3,6;30,7	16,3**	4,4;37,5	20,1*	11,2;31,8	Oui, en partie
6,6**	0,8;22,2	4,3**	0,8;12,5	16,0**	5,3;33,9	5,3**	1,7;12,1	10,1**	2,0;27,3	-	;	10,0**	4,2;19,3	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
66,1	46,6;82,3	60,3	44,0;75,1	59,7*	39,3;78,0	63,6	53,5;73,7	74,1	48,8;91,3	91,1	70,2;99,0	65,9	51,6;78,2	Oui
33,9**	17,7;53,4	39,7*	24,9;56,0	40,3*	22,0;60,7	36,4	26,3;46,5	25,9**	8,7;51,2	8,9**	1,0;29,8	34,1*	21,8;48,4	Non
														Patient traité de manière respectueuse
80,1	65,2;90,7	89,1	80,5;94,8	85,1	71,8;93,8	94,4	89,1;97,6	90,6	77,2;97,5	89,5	71,5;98,0	84,8	76,3;91,1	Oui, toujours
19,9**	9,3;34,8	7,1**	2,6;14,9	14,9**	6,2;28,2	5,6**	2,4;10,9	9,4**	2,5;22,8	10,5**	2,0;28,5	14,3*	8,1;22,6	Oui, la plupart du temps
-	;	3,8**	0,7;11,1	-	;	-	;	-	;	-	;	1,0**	0,0;5,3	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	2,0**	1,0;3,6	2,8**	0,4;9,4
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	8,9	6,5;11,7	13,0**	5,7;24,2
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	1,0**	0,4;2,1	-	;
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	88,1	85,0;90,8	84,3	72,6;92,4
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	72,4	68,7;76,1	58,4	46,3;70,5
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	22,8	19,3;26,3	32,3*	21,2;45,2
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	4,8*	3,1;7,1	9,3**	3,1;20,2
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	86,7	83,5;89,5	81,7	69,2;90,7
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	11,4	8,8;14,5	14,7**	6,9;26,1
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	1,9**	0,8;3,8	3,6**	0,4;12,8
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	69,3	63,5;75,2	75,5	53,4;90,8
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	30,7	24,8;36,5	24,5**	9,2;46,6
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	4,8*	3,3;6,8	4,9**	1,0;13,7
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	95,2	93,2;96,7	95,1	86,3;99,0
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	74,2	69,4;79,0	71,8	54,6;85,3
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	7,7*	5,1;11,1	13,9**	4,5;29,9
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	18,1	14,1;22,7	14,3**	4,9;30,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
-	;	-	;	8,5**	2,2;21,1	1,3**	0,1;4,7	-	;	3,4**	0,1;19,1	2,7**	0,5;8,3	Oui, souvent
2,5**	0,1;13,0	11,5**	6,0;19,4	6,1**	1,2;17,4	6,4**	2,8;12,2	4,8**	0,6;16,2	6,4**	0,7;21,8	13,0**	7,0;21,4	Oui, parfois
-	;	-	;	1,9**	0,1;9,9	2,6**	0,7;6,4	2,6**	0,1;13,2	-	;	-	;	Oui, une seule fois
97,5	87,0;99,9	88,5	80,6;94,0	83,5	68,9;93,1	89,8	83,6;94,3	92,6	80,4;98,3	90,2	72,0;98,3	84,3	75,3;91,0	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
64,6	47,0;79,8	82,1	73,3;89,0	71,5	55,9;84,0	77,1	69,6;83,6	71,8	55,6;84,7	62,4*	41,3;80,6	71,4	60,9;80,4	Oui, toujours
32,9*	18,3;50,3	15,4*	9,1;23,8	26,8**	14,4;42,4	18,0*	12,1;25,3	23,4**	11,8;38,9	29,5**	13,4;50,4	23,0*	14,9;33,0	Oui, la plupart du temps
2,5**	0,1;13,5	2,4**	0,3;8,9	1,8**	0,0;9,7	4,9**	1,7;10,6	4,8**	0,5;17,1	8,1**	1,2;24,8	5,6**	2,0;12,0	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
80,9	64,0;92,3	86,1	77,6;92,3	83,4	68,9;93,0	86,4	79,8;91,5	87,9	74,4;95,8	96,2	80,4;99,9	91,1	83,7;95,9	Oui, toujours
19,1**	7,7;36,0	12,2**	6,4;20,6	10,2**	3,4;22,4	12,3*	7,4;18,9	9,8**	2,9;22,7	3,8**	0,1;19,6	8,0**	3,5;15,1	Oui, la plupart du temps
-	;	1,6**	0,0;8,8	6,4**	1,2;18,1	1,3**	0,1;5,0	2,3**	0,0;12,9	-	;	1,0**	0,0;5,4	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]
63,0*	38,3;83,5	67,3	51,0;81,1	69,8*	44,7;88,4	66,6	52,5;78,9	67,8*	32,0;92,6	77,7*	44,6;96,0	71,2	55,3;83,9	Oui
37,0**	16,5;61,7	32,7*	18,9;49,0	30,2**	11,6;55,3	33,4*	21,1;47,5	32,2**	7,4;68,0	22,3**	4,0;55,4	28,8*	16,1;44,7	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
-	;	4,8**	1,5;11,1	8,6**	2,3;20,7	2,5**	0,7;6,0	12,0**	3,7;26,8	3,7**	0,1;18,8	5,3**	2,0;11,2	Oui
100,0	;	95,2	88,9;98,5	91,4	79,3;97,7	97,5	94,0;99,3	88,0	73,2;96,3	96,3	81,2;99,9	94,7	88,8;98,0	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
70,4*	44,6;89,1	69,9	56,3;81,3	81,0	60,4;93,8	78,3	68,9;86,0	91,0	70,0;99,0	79,5	56,1;93,9	64,7	51,3;76,7	Oui, tout à fait
11,4**	1,1;37,6	3,1**	0,4;10,9	12,2**	2,6;31,7	6,7**	2,4;14,2	4,5**	0,1;23,7	4,6**	0,1;25,0	9,0**	3,3;18,8	Oui, en partie
18,3**	4,2;43,8	27,0*	16,4;40,0	6,8**	0,7;23,6	15,0*	8,8;23,3	4,5**	0,1;23,4	15,9**	3,3;40,3	26,3*	15,5;39,6	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p, r]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	81,3	77,6;84,6	78,7	66,0;88,4
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	18,7	15,4;22,4	21,3**	11,6;34,0
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	11,4	8,8;14,5	22,0**	12,0;35,1
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	88,6	85,5;91,2	78,0	64,9;88,0
Médecin spécialiste[p, r]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	17,3	14,0;21,0	10,8**	4,2;21,7
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	82,7	79,0;86,0	89,2	78,3;95,8
Infirmière pivot en oncologie[p]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	28,7	25,0;32,5	16,6**	7,8;29,6
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	71,3	67,5;75,0	83,4	70,4;92,2
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	2,7**	1,6;4,5	5,5**	1,0;16,3
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	97,3	95,5;98,4	94,5	83,7;99,0
CLSC[p, r]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	17,4	14,2;21,0	22,7**	12,4;36,1
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	82,6	79,0;85,8	77,3	63,9;87,6
Urgence d'un hôpital[p, r]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	26,5	22,9;30,2	30,2*	18,3;44,4
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	73,5	69,8;77,1	69,8	55,6;81,7
Unité de soins d'un hôpital[p, r]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	13,5	10,8;16,6	13,6**	6,0;25,2
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	86,5	83,4;89,2	86,4	74,8;94,0
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	2,6**	1,5;4,3	1,4**	0,0;8,0
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	97,4	95,7;98,5	98,6	92,0;100,0
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	0,7**	0,2;1,8	-	;
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	99,3	98,2;99,8	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p, r]
78,8	61,2;91,0	79,2	69,5;86,9	98,1	89,8;100,0	85,5	78,6;90,8	63,1	44,8;79,1	89,1	69,9;98,0	76,9	66,2;85,6	Oui
21,2**	9,0;38,8	20,8*	13,1;30,5	1,9**	0,0;10,2	14,5*	9,2;21,4	36,9*	20,9;55,2	10,9**	2,0;30,1	23,1*	14,4;33,8	Non
														Médecin de famille[p]
21,2**	9,0;38,8	9,5**	4,7;16,8	11,1**	3,5;24,5	8,9**	4,9;14,6	5,7**	0,7;19,2	10,4**	2,2;27,4	9,4**	4,2;17,6	Oui
78,8	61,2;91,0	90,5	83,2;95,3	88,9	75,5;96,5	91,1	85,4;95,1	94,3	80,8;99,3	89,6	72,6;97,8	90,6	82,4;95,8	Non
														Médecin spécialiste[p, r]
19,4**	7,9;36,6	12,3**	6,3;20,9	43,1*	28,5;58,7	13,8*	8,4;20,9	26,4**	12,8;44,2	19,8**	6,9;40,0	13,9*	8,2;21,6	Oui
80,6	63,4;92,1	87,7	79,1;93,7	56,9	41,3;71,5	86,2	79,1;91,6	73,6	55,8;87,2	80,2	60,0;93,1	86,1	78,4;91,8	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p]
27,2**	13,8;44,6	26,6*	18,1;36,4	37,6*	22,6;54,5	35,7	28,1;43,3	27,7**	13,7;45,8	41,2*	22,8;61,7	21,9*	14,3;31,1	Oui
72,8	55,4;86,2	73,4	63,6;81,9	62,4	45,5;77,4	64,3	56,7;71,9	72,3	54,2;86,3	58,8*	38,3;77,2	78,1	68,9;85,7	Non
														Info-Santé[p]
-	;	1,8**	0,2;6,1	-	;	3,9**	1,5;8,2	-	;	4,3**	0,1;23,4	3,2**	0,7;9,2	Oui
100,0	;	98,2	93,9;99,8	100,0	;	96,1	91,8;98,5	100,0	;	95,7	76,6;99,9	96,8	90,8;99,3	Non
														CLSC[p, r]
8,5**	1,9;22,5	27,8*	19,6;37,3	10,1**	3,5;21,7	13,6*	8,3;20,6	5,7**	0,7;19,2	11,7**	2,7;29,9	22,4*	14,1;32,8	Oui
91,5	77,5;98,1	72,2	62,7;80,4	89,9	78,3;96,5	86,4	79,4;91,7	94,3	80,8;99,3	88,3	70,1;97,3	77,6	67,2;85,9	Non
														Urgence d'un hôpital[p, r]
25,7**	12,5;43,2	18,1*	11,3;26,7	51,2	35,5;66,8	23,7*	16,9;31,7	20,0**	8,6;36,6	40,4*	21,9;61,1	23,8*	15,5;34,0	Oui
74,3	56,8;87,5	81,9	73,3;88,7	48,8*	33,2;64,5	76,3	68,3;83,1	80,0	63,4;91,4	59,6*	38,9;78,1	76,2	66,0;84,5	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p, r]
7,8**	1,6;21,3	4,3**	1,2;10,6	33,9*	19,6;50,7	18,0*	12,5;24,7	12,1**	3,6;27,4	12,0**	2,1;33,2	9,5**	4,4;17,4	Oui
92,2	78,7;98,4	95,7	89,4;98,8	66,1	49,3;80,4	82,0	75,3;87,5	87,9	72,6;96,4	88,0	66,8;97,9	90,5	82,6;95,6	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
2,8**	0,1;15,1	-	;	4,3**	0,5;14,7	4,5**	1,8;9,1	-	;	3,2**	0,1;17,6	3,4**	0,7;9,7	Oui
97,2	84,9;99,9	100,0	;	95,7	85,3;99,5	95,5	90,9;98,2	100,0	;	96,8	82,4;99,9	96,6	90,3;99,3	Non
														Autre contact
-	;	0,9**	0,0;5,4	-	;	2,1**	0,4;6,0	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	99,1	94,6;100,0	100,0	;	97,9	94,0;99,6	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	67,2	62,6;71,8	72,2	55,0;85,6
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	13,7	10,6;17,2	11,5**	3,3;26,6
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	19,1	15,6;23,2	16,3**	6,2;32,2
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	52,0	46,9;57,0	45,0*	27,9;63,0
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	14,7	11,3;18,6	15,9**	6,3;30,7
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	33,4	28,8;37,9	39,2*	23,5;56,6
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	46,3	41,7;50,9	28,9**	14,5;47,2
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	19,5	15,9;23,6	34,8*	18,8;53,7
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	34,1	29,6;38,6	36,3*	20,8;54,3
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	43,9	38,9;48,8	36,8*	20,0;56,2
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	14,7	11,3;18,7	8,8**	1,7;24,6
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	41,4	36,6;46,3	54,5*	35,6;72,4
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	59,3	54,5;64,0	65,9	51,1;78,6
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	16,3	12,9;20,3	23,3**	12,3;37,7
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	24,4	20,2;28,6	10,9**	3,4;24,2
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	61,6	56,9;66,3	64,1	48,0;78,1
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	15,4	11,8;19,5	17,4**	7,3;32,5
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	23,0	19,1;27,0	18,6**	8,4;33,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
54,3*	33,9;73,8	61,2	46,8;74,2	77,6	62,5;88,8	74,3	66,1;81,3	69,4	49,6;85,1	72,5	49,0;89,4	51,4	38,3;64,4	Oui, tout à fait
21,1**	7,6;41,7	9,1**	3,5;18,7	8,2**	2,4;19,4	13,3*	8,4;19,8	15,0**	5,1;31,5	15,0**	3,0;38,5	19,4**	10,5;31,3	Oui, en partie
24,6**	10,4;44,4	29,7*	18,5;43,1	14,2**	5,6;27,7	12,4*	7,5;18,9	15,6**	4,5;35,0	12,5**	2,5;33,1	29,2*	17,9;42,9	Non
														La sexualité[p]
58,6*	38,2;77,1	79,2	68,9;87,4	41,4*	24,9;59,5	46,0	36,8;55,1	14,4**	2,3;39,9	38,5**	15,1;66,6	45,1	31,9;58,3	Oui, tout à fait
17,5**	5,4;37,7	14,4**	8,0;23,2	15,2**	5,6;30,6	16,7*	10,5;24,7	10,1**	1,3;32,0	19,8**	3,6;50,5	9,7**	3,7;19,9	Oui, en partie
23,9**	9,6;44,3	6,3**	2,1;14,3	43,4*	26,6;61,4	37,3	28,7;45,9	75,5	49,6;92,5	41,7**	17,9;68,7	45,1*	31,5;58,8	Non
														Les émotions[p]
45,4*	26,8;65,0	50,1	38,9;61,4	48,7*	32,5;65,0	50,9	42,1;59,7	44,6*	26,3;64,1	42,7**	19,5;68,5	44,5	33,0;56,0	Oui, tout à fait
17,8**	5,4;38,6	21,2*	12,8;31,7	20,1**	9,4;35,2	21,0*	14,0;29,5	17,7**	6,7;34,7	18,1**	3,5;45,8	9,1**	3,5;18,3	Oui, en partie
36,8*	20,6;55,6	28,7*	18,6;40,7	31,2*	17,5;47,8	28,1	20,9;36,3	37,7*	20,7;57,2	39,2**	17,0;65,4	46,5	34,0;58,9	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
48,0*	26,4;70,1	62,0	51,9;72,2	40,8*	23,4;60,1	42,5	33,4;51,6	29,3**	10,8;54,6	33,6**	11,7;62,3	34,4*	22,0;48,6	Oui, tout à fait
13,0**	2,4;35,4	14,3**	7,7;23,4	15,2**	5,3;31,4	17,2*	10,4;26,0	8,5**	1,0;28,2	21,4**	3,8;53,7	15,3**	6,9;27,7	Oui, en partie
39,0**	20,0;60,8	23,7*	15,3;33,9	44,0*	26,7;62,5	40,3	31,2;49,4	62,2*	38,2;82,6	45,0**	19,9;72,1	50,3	36,8;63,8	Non
														Les besoins alimentaires[p]
61,6*	40,7;79,8	48,4	36,1;60,7	64,6	49,4;77,9	50,9	41,7;60,1	85,5	67,9;95,5	62,7*	37,0;84,0	59,3	47,1;71,5	Oui, tout à fait
22,8**	8,6;43,8	16,8**	8,8;27,8	17,8**	8,7;30,8	19,8*	13,2;27,9	8,9**	1,9;23,8	10,4**	1,0;35,2	7,9**	2,9;16,7	Oui, en partie
15,6**	4,0;36,5	34,8*	22,9;48,3	17,6**	7,7;32,2	29,3	21,4;38,3	5,7**	0,6;20,3	26,9**	9,7;51,3	32,7*	21,1;46,1	Non
														Les activités courantes[p]
51,7*	32,2;70,8	63,4	50,9;74,7	59,1	41,8;74,9	59,5	50,9;68,1	71,2	50,4;87,0	62,4*	36,8;83,6	61,7	48,9;73,3	Oui, tout à fait
28,0**	12,6;48,5	13,8**	6,8;24,0	10,0**	2,7;24,2	19,5*	12,5;28,4	9,5**	1,8;26,6	21,4**	5,7;47,5	9,2**	3,6;18,3	Oui, en partie
20,3**	8,3;38,0	22,8*	13,4;34,7	30,9*	16,8;48,1	20,9*	14,2;29,0	19,2**	6,9;38,4	16,3**	3,5;40,6	29,2*	18,7;41,6	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	93,9	91,6;95,8	88,6	77,1;95,6
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	5,2*	3,5;7,3	5,2**	1,1;14,5
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	0,9**	0,2;2,3	6,2**	1,2;17,4
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	68,1	64,3;71,9	63,0	49,6;75,1
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	26,7	23,0;30,4	28,7*	17,8;41,7
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	3,5*	2,1;5,4	4,7**	0,9;13,2
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	1,7**	0,8;3,2	3,6**	0,5;12,4
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	64,1	60,2;68,0	64,8	51,4;76,7
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	20,9	17,5;24,3	20,1**	11,0;32,2
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	15,0	12,2;18,2	15,1**	7,0;27,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
100,0	;	96,0	90,6;98,8	94,3	84,9;98,7	94,8	90,2;97,7	93,4	80,6;98,8	92,9	76,6;99,1	92,4	85,3;96,8	Oui, tout à fait
-	;	4,0**	1,2;9,4	3,8**	0,5;12,4	5,2**	2,3;9,8	6,6**	1,2;19,4	7,1**	0,9;23,4	7,6**	3,2;14,7	Oui, en partie
-	;	-	;	1,9**	0,0;10,6	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
61,3	43,4;77,3	76,7	66,5;85,0	58,2	43,3;72,1	67,9	60,7;75,2	68,6	52,3;82,1	81,1	59,4;94,3	67,1	58,1;76,0	Toujours
36,0*	20,8;53,5	19,9*	12,3;29,6	32,9*	19,3;49,0	27,0	20,2;34,6	29,1*	15,7;45,7	18,9**	5,7;40,6	26,3*	17,9;36,3	La plupart du temps
2,7**	0,1;14,3	1,1**	0,0;6,0	4,8**	0,6;16,4	5,1**	2,0;10,3	2,4**	0,1;12,6	-	;	3,7**	1,0;9,3	À l'occasion
-	;	2,3**	0,3;7,9	4,1**	0,4;14,5	-	;	-	;	-	;	2,9**	0,6;8,3	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
64,2	46,3;79,6	76,0	66,5;83,9	36,3*	22,8;51,6	65,9	58,5;73,4	59,4	41,2;75,9	65,4	44,4;82,7	62,9	52,9;73,0	Oui, tout à fait
27,7**	13,9;45,6	15,2*	8,7;23,9	29,4**	15,7;46,4	19,0*	13,2;25,9	24,9**	11,5;43,1	27,4**	11,9;48,5	20,2*	12,5;30,0	Oui, en partie
8,0**	1,8;21,3	8,9**	4,0;16,5	34,3*	20,3;50,6	15,1*	9,8;21,8	15,7**	5,3;32,9	7,2**	0,8;24,0	16,9*	9,4;26,9	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	80,1	76,4;83,4	90,3	79,7;96,5
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	11,7	9,1;14,6	5,0**	1,0;14,3
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	8,3	6,0;11,0	4,7**	0,9;13,5
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	89,0	85,6;91,8	90,8	79,4;97,1
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	8,2*	5,8;11,3	9,2**	2,9;20,6
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	2,8**	1,5;4,7	-	;
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	79,3	73,8;84,8	75,5	55,6;89,7
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	10,4*	6,6;15,4	4,0**	0,1;18,9
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	10,3*	6,5;15,4	20,5**	7,4;40,5
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	62,7	56,7;68,7	37,3**	13,6;66,6
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	21,7	16,7;26,8	41,2**	16,2;70,0
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	15,5	11,5;20,3	21,5**	5,7;47,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
68,1	50,2;82,7	75,5	66,6;83,0	77,7	61,6;89,4	85,1	77,9;90,6	80,7	64,5;91,7	70,4	48,2;87,3	78,8	68,8;86,8	Aucun report
14,3**	4,6;30,7	14,3*	8,2;22,5	15,3**	6,1;29,8	10,2**	5,7;16,5	9,8**	2,5;23,9	21,7**	8,2;41,8	10,6**	5,4;18,3	Un report
17,7**	6,8;34,5	10,2**	5,3;17,5	7,0**	1,3;20,0	4,7**	1,8;9,8	9,6**	2,6;23,1	7,9**	0,9;26,5	10,6**	5,3;18,3	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
84,1	67,9;94,2	80,3	69,0;88,9	100,0	;	92,9	87,6;96,4	83,2	67,6;93,3	88,3	62,6;98,7	90,8	82,7;95,9	Aucun report
10,3**	2,6;25,5	10,9**	4,6;21,1	-	;	6,5**	3,1;11,6	11,4**	3,3;26,4	11,7**	1,3;37,4	7,1**	2,7;14,6	Un report
5,5**	0,6;19,3	8,8**	3,3;18,1	-	;	0,6**	0,0;3,8	5,3**	0,7;17,4	-	;	2,2**	0,3;7,3	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
64,9*	34,3;88,5	82,8*	23,2;99,9	74,9	58,1;87,6	86,8	77,0;93,6	75,8*	35,9;97,0	78,1	49,7;94,8	79,1	56,5;93,3	Aucun report
6,3**	0,1;33,8	17,2**	0,1;76,8	17,3**	7,0;33,0	9,6**	4,0;18,9	12,1**	0,3;52,5	10,6**	0,9;36,7	8,6**	1,1;27,6	Un report
28,7**	8,1;59,0	-	;	7,8**	1,4;22,4	3,5**	0,7;9,9	12,1**	0,3;51,2	11,4**	1,2;36,6	12,3**	2,6;32,1	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
65,7*	37,2;87,8	44,4*	29,3;60,3	81,9	56,2;95,9	61,9	53,4;70,4	81,1	60,3;94,0	66,1*	30,7;91,6	77,1	52,9;92,7	Aucun report
14,6**	1,7;44,5	27,4*	15,1;42,7	18,1**	4,1;43,8	24,4*	17,3;32,7	11,5**	2,2;31,1	16,9**	2,0;49,7	4,5**	0,1;25,9	Un report
19,7**	3,7;49,4	28,2*	16,2;43,1	-	;	13,7*	8,0;21,4	7,4**	0,8;25,4	17,0**	1,7;52,0	18,4**	5,2;40,9	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	9,2	6,7;12,2	5,6**	1,1;15,6
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	7,0	5,1;9,4	5,2**	1,1;14,1
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	83,7	80,2;86,9	89,2	78,5;95,8
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	28,9	25,1;32,7	50,0	36,5;63,5
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	9,9	7,5;12,7	3,6**	0,4;12,7
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	61,2	57,0;65,4	46,4	33,2;59,6
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	53,8	50,1;57,5	63,4	50,1;75,4
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	4,2*	2,6;6,3	1,4**	0,0;7,3
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	42,0	38,2;45,8	35,2*	23,4;48,5
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	10,8	8,3;13,9	9,9**	3,8;20,2
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	9,4	7,1;12,1	4,9**	1,0;13,8
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	79,8	76,6;83,0	85,2	73,8;93,0
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	15,4	12,5;18,8	15,4**	6,7;28,3
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	4,9*	3,3;7,0	3,8**	0,4;13,3
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	79,7	76,3;83,1	80,8	67,9;90,2
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	40,3	36,2;44,4	36,7*	24,3;50,6
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	3,1*	1,9;4,8	1,4**	0,0;7,4
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	56,6	52,5;60,7	61,9	48,0;74,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
2,7**	0,1;14,2	6,0**	2,2;12,9	11,4**	4,5;22,5	11,4*	6,4;18,3	4,7**	0,5;16,3	11,3**	2,3;30,0	14,2**	7,6;23,2	Oui
5,1**	0,6;17,0	3,8**	1,0;9,9	10,1**	3,3;22,4	10,4*	6,0;16,3	9,1**	2,7;21,3	7,3**	0,8;25,2	4,9**	1,5;11,5	Non, mais il aurait souhaité le consulter
92,3	78,6;98,5	90,1	82,4;95,2	78,5	65,0;88,6	78,2	70,2;85,0	86,2	72,6;94,6	81,4	61,5;93,8	80,9	71,7;88,2	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
29,1**	15,3;46,5	18,8*	11,4;28,1	34,7*	21,0;50,5	12,2*	7,5;18,4	44,8*	30,4;60,0	48,7*	28,2;69,6	32,5*	22,9;42,1	Oui
14,1**	4,6;30,3	4,7**	1,5;10,7	12,6**	4,6;25,8	15,3*	10,0;22,0	18,6**	8,7;32,7	3,8**	0,1;19,9	6,7**	2,4;14,3	Non, mais il aurait souhaité le consulter
56,8	38,7;73,6	76,5	66,6;84,7	52,7	37,0;68,1	72,5	64,6;79,5	36,6*	23,1;51,7	47,4*	27,1;68,4	60,8	50,8;70,7	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
47,2*	30,5;64,3	30,1*	20,7;39,5	89,6	76,0;96,9	56,1	47,9;64,3	50,9	35,8;65,8	71,1	50,3;86,9	49,2	39,9;58,5	Oui
2,6**	0,1;14,1	5,1**	1,7;11,5	-	;	5,1**	2,1;10,2	6,9**	1,5;18,7	3,8**	0,1;19,9	5,3**	1,7;12,0	Non, mais il aurait souhaité le consulter
50,2*	33,0;67,4	64,8	54,9;74,7	10,4**	3,1;24,0	38,8	30,7;46,8	42,2*	27,9;57,6	25,1**	10,0;46,4	45,5	35,9;55,1	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
15,9**	5,8;32,2	8,2**	3,4;16,1	23,1**	11,7;38,3	12,2*	7,3;18,7	11,9**	3,9;25,8	-	;	6,9**	2,9;13,6	Oui
12,9**	4,3;27,7	8,3**	3,4;16,4	9,1**	3,0;20,0	12,5*	7,8;18,7	9,1**	2,4;22,1	7,3**	0,9;23,7	8,6**	3,7;16,6	Non, mais il aurait souhaité le consulter
71,2	54,3;84,7	83,5	73,9;90,6	67,8	52,8;80,5	75,3	67,9;81,7	79,0	62,9;90,4	92,7	76,3;99,1	84,4	75,6;91,1	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
15,5**	5,7;31,4	5,7**	2,0;12,4	20,4**	9,8;35,3	24,5	17,6;32,4	10,1**	2,9;23,7	12,4**	2,5;32,8	13,1**	6,8;22,2	Oui
5,1**	0,5;18,3	6,9**	2,7;14,0	-	;	7,2**	3,6;12,8	4,5**	0,6;15,3	4,4**	0,1;23,4	3,0**	0,7;8,2	Non, mais il aurait souhaité le consulter
79,4	62,8;90,9	87,4	79,4;93,2	79,6	64,7;90,2	68,3	60,7;75,9	85,4	71,2;94,3	83,3	61,7;95,5	83,9	74,6;90,8	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
42,1*	25,8;59,8	48,2	39,0;57,4	20,5**	10,2;34,7	49,3	41,5;57,0	13,6**	4,6;28,9	20,3**	6,6;42,1	47,0	37,5;56,6	Oui
7,5**	1,6;20,3	2,7**	0,6;7,4	3,6**	0,4;12,2	2,6**	0,7;6,6	4,6**	0,5;16,6	-	;	3,7**	1,0;9,2	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
50,4*	33,3;67,4	49,1	39,9;58,3	75,9	61,2;87,3	48,2	40,5;55,9	81,8	66,4;92,2	79,7	57,9;93,4	49,3	39,6;59,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	9,7	7,4;12,5	9,2**	3,5;18,8
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	12,3	9,7;15,4	7,0**	2,0;16,7
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	77,9	74,6;81,3	83,7	72,8;91,6
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	8,2	6,2;10,5	6,5**	1,8;15,8
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	8,3	6,2;10,9	7,3**	2,0;17,6
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	83,5	80,6;86,4	86,2	75,1;93,6
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	12,2	9,7;15,2	10,0**	3,6;21,2
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	9,5	7,3;12,0	11,5**	4,6;22,8
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	78,3	75,0;81,6	78,5	65,7;88,2
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	4,5*	2,9;6,6	1,9**	0,1;9,2
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	2,1**	1,1;3,5	2,8**	0,3;10,0
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	93,4	91,1;95,2	95,3	86,8;99,0
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	6,7*	4,7;9,2	11,9**	4,4;24,4
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	10,0	7,7;12,7	9,0**	3,1;19,4
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	83,3	79,9;86,3	79,1	65,7;89,0
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	9,5	7,0;12,4	13,0**	5,3;25,3
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	4,2*	2,7;6,1	3,0**	0,3;10,9
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	86,4	83,2;89,1	83,9	71,0;92,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
8,0**	1,7;21,8	3,0**	0,5;9,1	11,8**	4,2;24,5	19,2*	13,3;26,4	12,1**	3,9;26,7	8,2**	0,9;27,4	2,8**	0,5;8,1	Oui
10,4**	2,8;25,1	7,8**	3,4;14,9	14,3**	5,8;27,7	15,9*	10,3;22,9	18,3**	8,1;33,3	7,6**	1,0;24,6	13,4*	7,7;21,2	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
81,6	66,3;92,0	89,2	81,3;94,6	73,9	58,9;85,8	64,9	57,6;72,3	69,5	53,3;82,9	84,1	62,8;95,9	83,8	75,7;90,1	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
15,7**	5,8;31,4	5,8**	2,1;12,2	15,0**	6,7;27,3	14,3*	9,1;20,9	-	;	-	;	3,3**	1,0;8,1	Oui
5,1**	0,6;17,3	7,5**	3,3;14,1	14,4**	5,8;27,8	9,9*	5,6;15,8	11,3**	3,9;24,0	4,1**	0,1;21,3	5,8**	2,2;12,1	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
79,2	63,0;90,6	86,7	78,6;92,6	70,6	56,4;82,5	75,9	68,1;82,6	88,7	76,0;96,1	95,9	78,7;99,9	90,9	84,1;95,5	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
15,9**	6,0;31,5	6,9**	2,9;13,5	13,2**	5,1;26,4	17,2*	11,5;24,4	12,7**	4,2;27,5	11,3**	2,6;28,4	10,4**	4,9;18,7	Oui
5,0**	0,6;16,9	9,4**	4,4;17,2	13,8**	5,7;26,4	11,0*	6,3;17,3	7,4**	1,7;19,5	-	;	9,1**	4,3;16,3	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
79,1	62,9;90,6	83,7	74,8;90,4	73,0	58,1;84,9	71,8	63,9;78,8	79,8	64,0;90,9	88,7	71,6;97,4	80,5	71,1;87,9	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
2,6**	0,1;13,8	1,0**	0,0;5,2	4,7**	0,6;15,9	6,1**	2,8;11,4	5,0**	0,5;18,3	12,1**	2,8;30,6	5,7**	1,9;12,7	Oui
5,0**	0,6;16,6	1,8**	0,2;6,1	1,7**	0,0;9,5	2,7**	0,7;6,9	-	;	3,5**	0,1;18,6	0,9**	0,0;5,1	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
92,4	79,2;98,5	97,2	92,2;99,4	93,6	82,1;98,7	91,1	85,2;95,2	95,0	81,7;99,5	84,4	64,9;95,5	93,4	86,0;97,6	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
5,0**	0,6;17,3	2,8**	0,6;7,9	7,9**	2,1;19,4	6,2**	2,7;11,9	2,7**	0,1;14,4	10,8**	2,2;29,0	8,4**	3,5;16,3	Oui
25,8**	13,1;42,3	2,7**	0,6;7,5	11,4**	4,5;22,7	13,7*	8,9;19,8	14,1**	5,3;28,5	3,5**	0,1;18,6	6,8**	2,8;13,5	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
69,3	52,2;83,2	94,5	88,8;97,8	80,7	67,0;90,5	80,1	73,0;86,1	83,2	68,5;93,0	85,7	67,5;95,9	84,9	75,8;91,5	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
10,4**	2,8;25,0	3,8**	1,0;9,8	19,9**	9,2;35,1	11,0*	6,4;17,3	5,4**	0,7;17,9	3,5**	0,1;18,4	8,6**	3,7;16,6	Oui
2,4**	0,1;12,5	3,8**	1,0;9,7	3,5**	0,4;12,0	5,9**	2,7;11,1	4,5**	0,6;14,6	-	;	4,9**	1,6;11,4	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
87,2	72,3;95,8	92,4	84,9;96,9	76,6	61,2;88,2	83,1	76,4;88,5	90,1	77,2;97,1	96,5	81,6;99,9	86,4	77,5;92,8	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	4,0*	2,6;5,9	3,3**	0,4;11,7
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	96,0	94,1;97,4	96,7	88,3;99,6
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	12,0**	2,2;32,8	-	;
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	88,0	67,2;97,8	100,0	;
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	20,7**	6,6;43,1	-	;
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	79,3	56,9;93,4	100,0	;
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	37,2**	18,3;59,6	41,6**	0,2;98,7
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	62,8*	40,4;81,7	58,4**	1,3;99,8
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	8,0**	0,7;28,8	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	92,0	71,2;99,3	100,0	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	39,8**	18,2;64,9	-	;
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	60,2*	35,1;81,8	100,0	;
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	5,7**	0,2;26,4	-	;
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	94,3	73,6;99,8	100,0	;
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	37,3**	17,9;60,4	-	;
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	62,7*	39,6;82,1	100,0	;
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	52,5*	28,9;75,2	41,6**	0,2;98,7
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	47,5*	24,8;71,1	58,4**	1,3;99,8
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	4,1**	0,1;22,9	-	;
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	95,9	77,1;99,9	100,0	;
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	4,1**	0,1;22,9	-	;
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	95,9	77,1;99,9	100,0	;
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	5,5**	0,1;29,5	58,4**	1,3;99,8
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	94,5	70,5;99,9	41,6**	0,2;98,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]
5,0**	0,7;16,0	-	;	3,6**	0,4;12,7	8,1**	4,3;13,7	2,4**	0,0;13,3	-	;	4,4**	1,5;9,8	Oui
95,0	84,0;99,3	100,0	;	96,4	87,3;99,6	91,9	86,3;95,7	97,6	86,7;100,0	100,0	;	95,6	90,2;98,5	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	-	;	-	;	15,4**	1,5;48,7	-	;	-	;	22,0**	0,1;85,9	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	84,6	51,3;98,5	100,0	;	-	;	78,0**	14,1;99,9	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	-	;	-	;	39,7**	12,2;73,1	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	60,3**	26,9;87,8	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
														Psychologue
50,0**	0,8;99,2	-	;	100,0	;	32,1**	7,4;67,9	100,0	;	-	;	-	;	Oui
50,0**	0,8;99,2	-	;	-	;	67,9*	32,1;92,6	-	;	-	;	100,0	;	Non
														Travailleur social
-	;	-	;	-	;	15,4**	1,5;48,5	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	84,6	51,5;98,5	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
100,0	;	-	;	-	;	45,2**	15,2;78,1	-	;	-	;	47,0**	2,1;96,8	Oui
-	;	-	;	100,0	;	54,8**	21,9;84,8	100,0	;	-	;	53,0**	3,2;97,9	Non
														Médicaments
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	31,8**	0,6;90,9	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	-	;	68,2**	9,1;99,4	Non
														Services de transport
50,0**	0,8;99,2	-	;	50,0**	0,7;99,3	29,7**	6,0;66,5	-	;	-	;	78,0**	14,1;99,9	Oui
50,0**	0,8;99,2	-	;	50,0**	0,7;99,3	70,3*	33,5;94,0	100,0	;	-	;	22,0**	0,1;85,9	Non
														Services d'aide à domicile
50,0**	0,8;99,2	-	;	50,0**	0,7;99,3	69,4*	35,6;92,5	-	;	-	;	25,0**	0,1;90,2	Oui
50,0**	0,8;99,2	-	;	50,0**	0,7;99,3	30,6**	7,5;64,4	100,0	;	-	;	75,0**	9,8;99,9	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
-	;	-	;	-	;	7,9**	0,1;39,3	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	92,1	60,7;99,9	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
														Soins infirmiers à domicile
-	;	-	;	-	;	7,9**	0,1;39,3	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	92,1	60,7;99,9	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
														Autres services ou ressources
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	-	;	100,0	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	98,4	96,9;99,3	97,3	87,0;99,9
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	1,6**	0,7;3,1	2,7**	0,1;13,0
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	59,3	55,0;63,5	53,0	39,8;66,2
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	6,9*	4,9;9,3	12,1**	5,0;23,4
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	18,2	15,1;21,6	17,6**	9,2;29,2
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	15,7	12,6;19,2	17,3**	7,8;31,2
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	49,0	44,8;53,2	42,6*	29,8;55,3
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	18,9	15,7;22,4	25,1*	14,6;38,2
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	13,7	11,0;16,7	20,4**	11,0;32,9
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	18,5	15,3;22,0	12,0**	4,5;24,4
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	6,9*	4,9;9,5	10,9**	4,0;22,3
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	5,4*	3,7;7,6	5,0**	1,0;14,1
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	17,8	14,6;21,3	27,0*	16,0;40,5
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	10,1	7,6;13,2	9,2**	2,8;20,9
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	46,4	42,1;50,7	42,8*	29,4;56,3
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	13,3	10,7;16,4	5,2**	1,1;14,6
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	0,2**	0,0;1,0	-	;
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	5,9*	4,1;8,4	3,2**	0,3;11,8
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	93,9	91,4;95,8	96,8	88,2;99,7
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	91,2	88,3;93,6	86,8	72,6;95,3
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	7,8*	5,5;10,7	10,9**	3,5;24,2
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	1,0**	0,3;2,3	2,2**	0,1;12,1

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
97,2	85,5;99,9	100,0	;	100,0	;	98,0	94,1;99,6	95,1	82,4;99,5	100,0	;	98,8	93,2;100,0	Oui
2,8**	0,1;14,5	-	;	-	;	2,0**	0,4;5,9	4,9**	0,5;17,6	-	;	1,2**	0,0;6,8	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
63,1	45,4;78,5	67,1	57,6;76,6	95,6	85,3;99,4	62,6	54,5;70,7	43,5*	27,0;61,0	61,6*	39,2;80,8	39,5	29,5;49,4	Médecin spécialiste du cancer
-	;	5,4**	1,7;12,3	1,9**	0,0;10,4	11,3*	6,7;17,4	-	;	7,9**	1,0;25,7	6,4**	2,3;13,9	Médecin de famille
10,9**	2,9;26,3	16,6*	9,8;25,7	-	;	6,8**	3,3;12,2	37,9*	22,7;55,0	8,7**	1,1;27,6	40,2	29,5;50,9	Autre médecin spécialiste
26,0**	12,6;43,8	10,9**	5,1;19,6	2,5**	0,1;12,6	19,3*	13,1;26,8	18,7**	7,6;35,3	21,8**	7,2;44,5	13,9**	7,1;23,6	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
59,0	42,0;74,7	58,6	49,0;68,1	88,1	73,8;96,2	46,7	38,6;54,7	33,1*	18,0;51,2	53,5*	33,5;72,8	30,7	21,8;39,6	Médecin spécialiste du cancer
5,0**	0,6;17,1	16,9*	10,1;25,7	7,1**	1,5;19,6	25,5	18,5;33,5	12,6**	4,0;27,7	19,2**	6,5;39,6	20,8*	12,7;31,1	Médecin de famille
15,7**	6,1;30,8	9,7**	4,7;17,2	-	;	3,4**	1,1;7,6	28,1**	14,9;44,9	4,0**	0,1;20,1	30,0*	20,0;40,0	Autre médecin spécialiste
20,3**	8,4;37,7	14,9**	8,2;24,1	4,8**	0,6;16,3	24,5	17,6;32,5	26,2**	13,1;43,3	23,2**	8,6;44,7	18,4*	11,0;28,2	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
8,8**	1,7;24,5	7,0**	2,6;14,6	2,6**	0,0;14,4	7,9**	3,9;13,8	-	;	3,5**	0,1;19,7	8,3**	3,2;16,9	Au besoin
7,5**	1,3;22,1	2,9**	0,6;8,3	6,1**	1,2;17,1	3,7**	1,2;8,5	5,7**	0,7;18,9	7,5**	0,9;24,4	8,7**	3,6;17,0	À tous les mois
21,2**	9,0;38,9	16,2*	9,8;24,5	24,1**	12,2;39,9	10,8*	6,1;17,3	10,5**	2,8;25,2	27,6**	11,9;48,7	19,9*	12,3;29,5	À tous les 2 ou 3 mois
13,9**	4,5;29,9	6,4**	2,6;12,9	18,3**	7,8;33,8	8,9**	4,8;14,9	12,6**	4,1;27,5	17,0**	5,8;35,4	8,3**	3,3;16,7	À tous les 4 mois
38,2*	22,3;56,1	43,0	33,1;52,9	46,9*	30,5;63,8	60,1	52,0;68,2	54,8	37,9;70,9	37,1*	19,7;57,4	34,8	24,7;44,9	À tous les 6 mois
10,5**	2,9;24,7	24,5*	16,6;33,9	2,1**	0,1;10,2	8,7**	4,6;14,6	16,4**	6,4;32,0	7,3**	0,9;24,0	20,0*	12,6;29,3	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	1,0**	0,0;5,6	Trop long
2,9**	0,1;15,9	7,5**	2,9;15,4	16,6**	6,8;31,5	6,6**	3,0;12,3	2,4**	0,1;12,7	4,2**	0,1;21,0	3,3**	0,6;9,5	Trop court
97,1	84,1;99,9	92,5	84,6;97,1	83,4	68,5;93,2	93,4	87,7;97,0	97,6	87,3;99,9	95,8	79,0;99,9	95,7	88,9;98,9	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
94,5	80,7;99,4	93,4	85,8;97,6	91,1	79,0;97,4	88,8	82,3;93,5	94,7	82,1;99,4	86,2	63,2;97,4	93,6	86,1;97,8	Tout à fait capable
5,5**	0,6;19,3	4,6**	1,2;11,7	8,9**	2,6;21,0	10,5*	6,0;16,8	5,3**	0,6;17,9	13,8**	2,6;36,8	5,5**	1,7;12,9	En partie capable
-	;	2,0**	0,2;7,2	-	;	0,7**	0,0;4,0	-	;	-	;	0,9**	0,0;5,4	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	52,9	48,7;57,1	54,3	39,5;68,7
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	18,7	15,4;22,3	24,2*	13,6;37,8
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	28,4	24,5;32,4	21,4**	11,0;35,5
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	58,0	49,3;66,7	55,4**	18,9;88,0
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	42,0	33,3;50,7	44,6**	12,0;81,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
51,5*	33,7;68,9	55,6	46,1;65,1	58,5	42,7;73,2	50,0	41,4;58,6	44,9*	27,9;62,8	34,0**	16,2;56,0	59,9	49,7;70,2	Oui, tout à fait
16,4**	6,5;31,8	16,8*	10,4;25,1	7,6**	1,4;21,5	23,0	16,7;30,3	23,1**	11,0;39,6	32,1**	15,5;52,9	11,6**	5,8;20,2	oui, en partie
32,2*	17,4;50,1	27,6*	19,1;37,4	33,8*	20,2;49,7	27,0	19,9;35,2	32,0*	17,8;49,2	33,9**	16,8;54,8	28,4*	19,1;39,3	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
59,6**	26,1;87,5	53,2*	29,4;76,0	68,5*	38,6;90,1	60,9	45,2;75,0	40,0**	10,5;76,3	100,0	;	53,6*	30,6;75,4	Oui
40,4**	12,5;73,9	46,8*	24,0;70,6	31,5**	9,9;61,4	39,1*	25,0;54,8	60,0**	23,7;89,5	-	;	46,4*	24,6;69,4	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	22,2	18,9;25,6	19,9**	10,6;32,4
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	49,2	45,1;53,4	48,8	36,2;61,5
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	28,5	24,9;32,2	31,3*	19,2;45,5
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	23,8	20,3;27,4	18,0**	9,2;30,2
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	37,3	33,3;41,3	34,9*	22,3;49,3
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	38,9	34,9;42,8	47,1	34,1;60,1
Modification de l'alimentation[p]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	39,6	35,6;43,5	47,6	34,5;60,6
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	31,6	27,9;35,3	28,1*	16,7;42,2
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	28,8	25,0;32,7	24,3*	14,1;37,3
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	12,5	9,9;15,6	8,0**	2,6;17,9
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	7,8*	5,6;10,4	3,6**	0,4;12,5
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	79,7	76,3;83,1	88,4	77,5;95,2
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	1,2**	0,5;2,3	1,4**	0,0;7,2
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	1,7**	0,8;3,3	2,0**	0,1;10,4
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	97,1	95,4;98,3	96,6	88,0;99,6
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	9,4	7,2;12,0	14,5**	6,9;25,7
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	13,5	10,8;16,1	11,8**	4,5;24,0
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	77,2	74,0;80,3	73,7	61,1;84,0
Gestion du stress[p, r]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	34,6	30,8;38,3	35,0*	23,5;47,8
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	27,5	23,6;31,5	27,8*	17,5;40,3
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	37,9	33,9;41,9	37,2*	25,3;50,3

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p]
24,8**	12,8;40,4	17,7*	11,0;26,3	21,9**	11,6;35,6	33,9	26,5;41,4	24,8**	13,0;40,2	10,7**	2,2;28,3	13,0**	7,2;21,1	Oui
53,8	37,5;69,5	42,1	32,3;51,9	52,9	39,1;66,7	46,5	39,2;53,8	47,7*	32,5;63,2	73,6	52,6;88,9	51,1	41,8;60,5	Non
21,4**	10,6;36,2	40,2	30,3;50,0	25,2*	13,9;39,7	19,6*	13,9;26,4	27,5*	15,2;43,0	15,7**	4,0;36,8	35,8	26,9;44,7	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
36,1*	21,1;53,4	22,9*	15,3;32,1	17,5**	7,8;31,8	27,6	20,3;35,9	35,7*	21,5;51,9	13,5**	3,5;32,2	19,3*	12,3;28,1	Oui
37,7*	22,4;55,1	34,8	25,3;44,3	34,3*	20,5;50,5	45,2	37,2;53,3	35,6*	21,5;51,9	29,3**	13,5;49,9	34,4	25,0;43,8	Non
26,2**	13,0;43,5	42,2	32,4;52,1	48,2*	33,3;63,3	27,2	20,0;35,4	28,7*	16,0;44,4	57,2*	35,7;76,9	46,3	36,4;56,2	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p]
43,4*	27,5;60,3	32,0	23,5;40,6	29,3*	17,5;43,5	42,3	34,8;49,9	60,0	43,9;74,6	26,1**	10,8;47,3	36,4	26,5;46,2	Oui
29,8*	16,8;45,7	32,0*	22,4;41,6	38,3*	24,4;53,6	31,0	23,6;38,5	20,6**	10,5;34,4	32,0**	16,0;52,0	36,2	27,0;45,5	Non
26,8**	13,2;44,7	36,0	26,8;45,1	32,5*	19,5;47,7	26,6	19,8;34,3	19,4**	8,2;36,0	41,9*	22,5;63,2	27,4*	18,7;37,5	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
9,4**	2,5;22,8	5,5**	2,0;11,7	16,7**	7,5;30,2	8,3**	4,4;13,8	14,0**	5,3;28,2	53,4*	32,2;73,7	15,9*	9,4;24,5	Oui
12,7**	4,2;27,5	5,6**	2,0;12,1	9,2**	2,3;22,7	6,1**	3,0;10,8	7,0**	1,5;19,0	3,2**	0,1;17,3	13,6**	7,3;22,6	Non
77,9	61,9;89,5	88,9	81,0;94,3	74,1	58,6;86,2	85,7	79,1;90,8	79,0	63,1;90,3	43,4*	23,7;64,7	70,4	60,7;79,0	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	-	;	4,2**	0,6;13,9	0,6**	0,0;3,2	2,4**	0,1;13,0	-	;	1,8**	0,2;6,4	Oui
-	;	-	;	-	;	1,1**	0,0;5,8	2,5**	0,1;12,4	-	;	5,4**	2,0;11,6	Non
100,0	;	100,0	;	95,8	86,1;99,4	98,3	94,2;99,8	95,1	83,3;99,4	100,0	;	92,8	86,1;96,9	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
7,7**	1,5;21,6	7,2**	2,9;14,3	8,1**	2,1;20,4	5,5**	2,4;10,6	9,6**	2,9;21,9	14,2**	4,3;31,6	13,5*	7,7;21,5	Oui
11,9**	3,7;26,4	12,9**	7,1;20,9	19,2**	9,0;33,8	11,6*	6,9;17,8	18,7**	8,0;34,5	14,9**	3,9;35,0	12,9*	7,2;20,7	Non
80,4	65,2;91,1	80,0	71,0;87,1	72,6	58,1;84,3	82,9	76,0;88,4	71,7	55,6;84,6	70,9	50,5;86,5	73,6	64,1;81,7	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p, r]
40,8*	25,3;57,8	19,0*	11,9;27,9	44,2*	29,6;59,7	44,9	36,9;52,9	41,0*	25,5;57,8	25,9**	10,8;46,7	28,3*	19,8;38,0	Oui
29,6*	16,0;46,5	26,2*	17,9;36,0	21,0**	9,9;36,5	26,3	19,3;34,4	33,1*	18,9;50,0	29,3**	13,2;50,4	29,6*	20,8;39,6	Non
29,6**	14,8;48,3	54,8	45,1;64,5	34,8*	20,8;51,1	28,8	21,6;36,9	26,0**	13,3;42,5	44,8*	25,1;65,9	42,2	32,4;52,0	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	31,1	27,4;34,8	41,2*	28,6;53,8
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	23,0	19,4;26,5	18,9**	9,6;31,6
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	45,9	42,0;49,9	39,9*	27,0;54,0
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	1,0**	0,4;2,2	1,9**	0,1;9,1
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	99,0	97,8;99,6	98,1	90,9;99,9
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	-	;	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	100,0	;	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]
31,7*	17,2;49,5	20,4*	13,6;28,7	25,0*	13,8;39,4	37,4	29,9;45,0	32,8*	19,3;48,6	33,9**	16,5;55,1	27,6*	18,9;37,8	Oui
24,3**	12,3;40,3	33,7	24,0;43,5	19,3**	8,7;34,7	11,8*	7,0;18,2	31,1*	17,8;47,3	25,2**	10,2;46,4	27,5*	18,6;38,1	Non
43,9*	27,3;61,7	45,9	36,1;55,6	55,6	40,8;69,8	50,7	43,2;58,2	36,1*	21,5;52,8	40,9*	22,7;61,2	44,8	34,5;55,2	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
2,3**	0,1;12,3	0,9**	0,0;4,8	-	;	1,3**	0,1;4,8	-	;	-	;	0,9**	0,0;5,1	Oui
97,7	87,7;99,9	99,1	95,2;100,0	100,0	;	98,7	95,2;99,9	100,0	;	100,0	;	99,1	94,9;100,0	Non
														Autre
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	54,2	45,4;62,9	76,6*	44,1;95,4
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	45,8	37,1;54,6	23,4**	4,6;55,9
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	78,0	73,2;82,9	81,4	61,9;93,6
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	22,0	17,1;26,8	18,6**	6,4;38,1
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	45,6	34,7;56,5	54,9**	14,4;90,9
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	54,4	43,5;65,3	45,1**	9,1;85,6
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	17,0*	9,9;26,4	-	;
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	83,0	73,6;90,1	100,0	;
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	9,7*	5,6;15,4	17,2**	2,0;50,8
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	90,3	84,6;94,4	82,8	49,2;98,0
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	43,5	36,9;50,2	69,0*	41,4;89,2
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	56,5	49,8;63,1	31,0**	10,8;58,6
Prière ou soutien spirituel[p, r]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	57,1	50,4;63,8	78,6	52,2;94,4
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	42,9	36,2;49,6	21,4**	5,6;47,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
42,0**	8,0;83,3	51,4**	24,0;78,2	48,4**	18,9;78,7	43,4*	27,3;60,6	61,1**	23,2;90,8	100,0	;	49,5*	26,7;72,6	Oui
58,0**	16,7;92,0	48,6**	21,8;76,0	51,6**	21,3;81,1	56,6	39,4;72,7	38,9**	9,2;76,8	-	;	50,5*	27,4;73,3	Non
														Soutien de la famille ou des amis
78,1	50,9;94,4	69,4	51,2;84,0	79,3	54,8;94,2	74,6	63,4;83,9	76,6	52,8;92,3	94,0	69,7;99,9	82,1	67,8;91,9	Oui
21,9**	5,6;49,1	30,6**	16,0;48,8	20,7**	5,8;45,2	25,4*	16,1;36,6	23,4**	7,7;47,2	6,0**	0,1;30,3	17,9**	8,1;32,2	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
48,3**	7,8;90,7	20,5**	0,1;81,0	28,6**	5,2;66,1	50,6*	26,6;74,4	55,5**	20,3;86,9	19,5**	0,2;75,4	52,3*	29,5;74,4	Oui
51,7**	9,3;92,2	79,5**	19,0;99,9	71,4*	33,9;94,8	49,4*	25,6;73,4	44,5**	13,1;79,7	80,5*	24,6;99,8	47,7*	25,6;70,5	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
14,1**	0,1;65,3	36,3**	10,0;70,8	8,7**	0,1;42,3	16,2**	5,5;33,8	36,7**	11,9;68,1	-	;	4,5**	0,1;25,3	Oui
85,9*	34,7;99,9	63,7*	29,2;90,0	91,3	57,7;99,9	83,8	66,2;94,5	63,3*	31,9;88,1	100,0	;	95,5	74,7;99,9	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
-	;	20,6**	5,7;45,4	22,2**	4,1;54,8	12,3**	4,5;25,3	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	79,4	54,6;94,3	77,8*	45,2;95,9	87,7	74,7;95,5	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Exemple de l'entourage[p]
46,6**	16,9;78,3	31,4**	13,2;55,0	59,9*	31,4;84,2	46,0	32,7;59,4	30,4**	11,5;55,8	35,9**	11,2;67,9	38,4*	21,3;57,8	Oui
53,4**	21,7;83,1	68,6	45,0;86,8	40,1**	15,8;68,6	54,0	40,6;67,3	69,6*	44,2;88,5	64,1*	32,1;88,8	61,6	42,2;78,7	Non
														Prière ou soutien spirituel[p, r]
76,7	49,6;93,6	19,3**	6,1;40,7	52,4*	25,5;78,3	60,7	48,4;72,1	51,0*	27,0;74,6	76,6*	43,8;95,5	52,4*	34,8;69,7	Oui
23,3**	6,4;50,4	80,7	59,3;93,9	47,6**	21,7;74,5	39,3	27,9;51,6	49,0*	25,4;73,0	23,4**	4,5;56,2	47,6*	30,3;65,2	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,6	9,1;14,1
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	0,4**	0,0;1,4	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	2,3**	1,3;3,9	1,4**	0,0;7,3
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	10,4	7,9;13,4	14,2**	6,7;25,1
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	35,7	31,7;39,8	40,0*	27,1;52,9
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	51,1	47,0;55,3	44,5	31,7;57,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
6,5	4,7;8,6	17,5	15,3;19,8	8,3	6,2;10,7	24,8	22,3;27,3	7,8	5,8;10,1	4,8*	3,3;6,9	18,7	15,6;22,2	Ensemble des patients
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic
-	;	0,9**	0,0;5,4	-	;	-	;	-	;	-	;	1,1**	0,0;6,4	Mauvaise
-	;	3,9**	1,1;9,4	-	;	1,8**	0,4;5,4	4,8**	0,6;16,4	-	;	3,6**	1,0;8,7	Passable
10,3**	2,7;25,1	12,6**	6,5;21,3	8,4**	2,2;20,5	10,4*	6,0;16,5	14,5**	4,9;30,5	6,7**	0,8;22,4	6,4**	2,4;13,3	Bonne
48,5*	32,1;65,2	28,9*	20,0;39,1	43,8*	29,4;58,9	36,9	28,6;45,1	34,1*	19,2;51,6	37,1**	19,5;57,7	30,6*	21,2;40,0	Très bonne
41,2*	25,5;58,3	53,8	43,8;63,8	47,8	33,5;62,4	50,9	42,8;58,9	46,7*	29,8;64,2	56,2*	36,2;74,8	58,3	48,4;68,3	Excellente

Région 04

MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	47,9	46,6 ; 49,1
Femmes	53,9	52,1	50,9 ; 53,4
Âge			
18 à 49 ans	18,9	16,2	13,5 ; 19,0
50 à 59 ans	24,9	23,6	20,6 ; 26,6
60 à 69 ans	29,8	30,3	26,6 ; 34,1
70 ans et plus	26,5	29,8	27,1 ; 32,6
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	99,2	98,1 ; 99,8
Anglais	10,6	0,7**	0,2 ; 1,7
Autres	3,0	0,1**	0,0 ; 0,9
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	33,8	30,2 ; 37,3
Diplôme d'études secondaires	24,7	22,6	19,3 ; 25,9
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	31,3	27,5 ; 35,1
Diplôme d'études universitaires	20,6	12,3	9,7 ; 15,4
Occupation principale			
En emploi	29,3	25,7	22,5 ; 28,8
Étudiant	1,7	0,8**	0,2 ; 1,9
Retraité	55,8	59,9	56,6 ; 63,1
À la maison	7,2	7,3	5,4 ; 9,5
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	3,6*	2,3 ; 5,3
Congé de maternité / autres	3,6	2,8*	1,7 ; 4,3
Situation familiale			
Vit seul	24,1	25,2	21,5 ; 28,9
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	55,5	51,2 ; 59,7
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	11,3	8,8 ; 14,1
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	3,5*	2,0 ; 5,6
Autres	4,8	4,6*	3,0 ; 6,7
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	13,5	10,8 ; 16,1
Revenu suffisant	61,4	63,4	59,1 ; 67,6
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	23,2	19,5 ; 26,9
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	8,1	5,9 ; 10,8
2	21,1	15,3	12,3 ; 18,6
3	20,1	23,8	20,3 ; 27,3
4	19,4	30,2	26,5 ; 33,9
5 - très défavorisé	17,6	22,6	19,0 ; 26,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	11,0	8,6 ; 13,8	11,3*	8,0 ; 15,3	10,7*	7,4 ; 14,8
Génital féminin	5,5	...	10,2	4,9*	3,3 ; 6,9	...	;	9,4*	6,3 ; 13,3
Prostate	15,9	34,4	...	18,6	16,1 ; 21,2	38,8	33,6 ; 44,0	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	8,2	6,4 ; 10,3	9,8	7,3 ; 12,9	6,7*	4,3 ; 9,9
Sein	26,5	0,4**	48,8	23,8	21,0 ; 26,6	0,3**	0,0 ; 1,4	45,5	40,2 ; 50,8
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	6,4*	4,5 ; 8,7	7,0*	4,3 ; 10,7	5,8*	3,4 ; 9,1
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	6,7*	4,8 ; 9,0	5,7*	3,4 ; 8,7	7,6*	4,6 ; 11,7
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	20,5	17,5 ; 23,5	27,2	22,0 ; 32,3	14,4	10,7 ; 18,7
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	85,9	82,7 ; 88,8	87,5	82,8 ; 91,3	84,5	79,7 ; 88,6
Récidive	7,4	7,5	7,3	7,3	5,3 ; 9,7	8,2*	5,3 ; 12,0	6,4*	4,0 ; 9,7
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	6,8*	4,8 ; 9,2	4,3**	2,2 ; 7,3	9,1*	5,9 ; 13,3
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	9,6	7,4 ; 12,3	10,1*	6,8 ; 14,3	9,2*	6,3 ; 12,8
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	18,9	15,9 ; 21,9	8,3*	5,2 ; 12,3	28,5	23,6 ; 33,5
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	71,5	68,1 ; 74,9	81,6	76,6 ; 86,0	62,3	57,1 ; 67,5
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	46,9	42,7 ; 51,2	48,6	42,6 ; 54,7	45,4	39,5 ; 51,3
Non	58,8	56,6	60,7	53,1	48,8 ; 57,3	51,4	45,3 ; 57,4	54,6	48,7 ; 60,5
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	93,0	90,7 ; 94,9	92,3	88,4 ; 95,2	93,7	90,3 ; 96,1
Non	8,3	8,5	8,0	7,0	5,1 ; 9,3	7,7*	4,8 ; 11,6	6,3*	3,9 ; 9,7
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	11,6	9,1 ; 14,6	14,3	10,4 ; 19,0	9,2*	6,3 ; 12,9
Très bon	29,2	29,3	29,1	28,3	24,6 ; 32,0	27,7	22,3 ; 33,0	28,9	24,2 ; 33,7
Bon	34,9	34,2	35,5	36,0	31,7 ; 40,3	33,8	28,0 ; 39,7	37,9	32,2 ; 43,7
Moyen	18,8	17,8	19,6	20,1	16,8 ; 23,5	19,2	14,6 ; 24,4	21,0	16,2 ; 25,9
Mauvais	5,6	5,7	5,5	3,9*	2,5 ; 5,8	5,0*	2,9 ; 8,1	2,9**	1,2 ; 5,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p, r]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p]
11,0	8,6 ; 13,8	5,2**	1,6 ; 12,1	8,9*	5,1 ; 14,1	14,1*	9,6 ; 19,7	12,7*	7,5 ; 19,7	Colorectal
4,9*	3,3 ; 6,9	6,6**	2,6 ; 13,4	8,3**	4,5 ; 13,6	1,6**	0,3 ; 4,6	4,6**	1,8 ; 9,3	Génital féminin
18,6	16,1 ; 21,2	-	;	15,0*	9,5 ; 21,9	24,8	19,0 ; 30,5	25,5	19,8 ; 31,1	Prostate
8,2	6,4 ; 10,3	15,9*	9,1 ; 25,0	8,0**	4,3 ; 13,2	8,4*	4,9 ; 13,3	3,9**	1,7 ; 7,5	Hématopoïétique
23,8	21,0 ; 26,6	29,2	21,0 ; 38,6	28,7	21,9 ; 36,4	19,6	14,4 ; 25,7	21,1	15,3 ; 27,9	Sein
6,4*	4,5 ; 8,7	10,6**	5,2 ; 18,7	5,5**	2,4 ; 10,5	6,0**	3,2 ; 10,1	5,2**	2,1 ; 10,5	ORL (Tête et cou)
6,7*	4,8 ; 9,0	1,9**	0,3 ; 6,2	9,2**	5,1 ; 15,0	7,8*	4,5 ; 12,6	6,1**	2,6 ; 11,7	Broncho-pulmonaire
20,5	17,5 ; 23,5	30,5*	21,4 ; 39,7	16,5*	11,0 ; 23,4	17,7*	12,5 ; 24,0	21,0*	14,7 ; 28,5	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
85,9	82,7 ; 88,8	86,2	76,6 ; 92,9	84,7	78,1 ; 90,0	88,8	83,1 ; 93,1	83,8	76,3 ; 89,8	Premier cancer
7,3	5,3 ; 9,7	9,9**	4,3 ; 18,8	8,9**	4,9 ; 14,4	6,2**	3,2 ; 10,8	5,6**	2,4 ; 10,8	Récidive
6,8*	4,8 ; 9,2	3,9**	1,1 ; 9,5	6,4**	3,2 ; 11,3	4,9**	2,3 ; 9,3	10,6**	5,9 ; 17,1	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]
9,6	7,4 ; 12,3	12,6**	6,6 ; 21,0	6,6**	3,4 ; 11,4	11,7*	7,5 ; 17,2	8,3**	4,3 ; 14,2	Sous traitement
18,9	15,9 ; 21,9	21,3*	13,7 ; 30,6	20,7*	14,6 ; 27,9	17,5*	12,4 ; 23,6	17,4*	11,5 ; 24,6	Sans traitement avec médication
71,5	68,1 ; 74,9	66,1	57,0 ; 75,3	72,7	64,9 ; 79,6	70,8	63,7 ; 77,2	74,3	66,1 ; 81,4	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p, r]
46,9	42,7 ; 51,2	34,9	25,3 ; 44,6	43,2	35,8 ; 50,6	48,3	41,4 ; 55,3	55,2	46,0 ; 64,4	Oui
53,1	48,8 ; 57,3	65,1	55,4 ; 74,7	56,8	49,4 ; 64,2	51,7	44,7 ; 58,6	44,8	35,6 ; 54,0	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]
93,0	90,7 ; 94,9	83,6	73,6 ; 90,9	91,3	85,5 ; 95,3	95,6	91,4 ; 98,2	96,9	93,4 ; 98,8	Oui
7,0	5,1 ; 9,3	16,4**	9,1 ; 26,4	8,7**	4,7 ; 14,5	4,4**	1,8 ; 8,6	3,1**	1,2 ; 6,6	Non
										Perception de l'état de santé[p]
11,6	9,1 ; 14,6	17,5*	10,5 ; 26,5	8,0**	4,1 ; 13,8	11,3*	7,1 ; 16,8	11,7*	7,2 ; 17,5	Excellent
28,3	24,6 ; 32,0	31,3*	21,3 ; 41,3	35,3	27,7 ; 42,9	28,9	22,5 ; 36,0	20,7*	14,3 ; 28,3	Très bon
36,0	31,7 ; 40,3	26,1*	17,5 ; 36,3	33,4	25,4 ; 41,4	34,9	27,9 ; 42,0	44,4	35,7 ; 53,2	Bon
20,1	16,8 ; 23,5	23,0*	14,8 ; 33,1	18,4*	12,5 ; 25,8	21,2	15,5 ; 27,8	18,9*	12,4 ; 26,9	Moyen
3,9*	2,5 ; 5,8	2,1**	0,2 ; 7,6	4,9**	2,1 ; 9,5	3,7**	1,4 ; 7,7	4,3**	1,7 ; 8,9	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	49,8	45,7;54,0	65,4	51,4;77,6
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	50,2	46,0;54,3	34,6*	22,4;48,6
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	47,0	39,9;54,0	34,7**	17,2;55,9
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	19,5	14,7;25,2	11,3**	2,9;27,3
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	15,1*	10,5;20,7	34,6**	17,7;54,9
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	18,4*	13,2;24,7	19,4**	7,5;37,6
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	46,4	40,7;52,2	46,9*	23,9;70,9
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	15,7	11,7;20,3	27,7**	9,3;54,1
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	14,3*	10,1;19,4	12,6**	2,6;32,9
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	13,8	10,1;18,3	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	9,8*	6,6;13,7	12,8**	2,4;34,5
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	51,6	46,3;56,9	54,8*	37,2;71,5
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	22,3	17,5;27,0	18,6**	7,4;35,7
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	17,1	13,2;21,7	10,5**	3,4;23,0
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	8,9*	5,9;12,9	16,1**	5,4;33,6
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	87,2	84,1;89,9	84,3	70,9;93,2
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	7,7*	5,5;10,3	7,8**	2,4;17,8
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	5,1*	3,3;7,4	7,8**	1,7;21,1
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	1,2**	0,5;2,5	-	;
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	98,8	97,5;99,5	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
66,2	46,0;82,9	18,0*	11,2;26,8	62,9	48,7;75,6	53,9	45,4;62,3	48,4*	30,3;66,9	32,8*	18,3;50,1	62,5	53,0;72,0	Oui
33,8**	17,1;54,0	82,0	73,2;88,8	37,1*	24,4;51,3	46,1	37,7;54,6	51,6*	33,1;69,7	67,2	49,9;81,7	37,5	28,0;47,0	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
64,1*	31,5;89,2	25,0**	5,0;58,5	49,1*	25,7;72,8	51,7	39,5;63,9	43,1**	16,5;73,1	45,1**	11,4;82,7	51,5*	34,8;68,0	2 semaines et moins
9,5**	0,2;45,1	25,0**	4,2;61,1	13,2**	2,2;37,0	27,6*	17,2;40,2	20,2**	3,7;51,0	23,5**	2,1;66,3	16,5**	6,8;31,3	Plus de 2 semaines à 1 mois
-	;	9,2**	0,2;41,7	21,6**	6,0;47,3	11,1**	4,8;21,1	6,8**	0,2;32,5	10,3**	0,1;51,0	13,0**	4,7;26,7	Plus d'un mois à 3 mois
26,4**	5,6;60,0	40,8**	12,6;74,5	16,0**	3,4;40,1	9,6**	3,6;19,6	30,0**	8,6;60,7	21,1**	2,1;60,7	19,0**	8,5;34,1	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
41,7**	11,9;77,0	64,3	54,0;74,6	37,4**	16,8;62,0	20,2**	10,8;32,9	57,9*	32,4;80,7	67,6*	42,8;86,8	36,8*	22,0;53,6	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
-	;	19,1*	11,2;29,4	39,0**	18,0;63,4	-	;	22,5**	7,0;46,7	3,0**	0,0;18,9	23,4**	12,3;38,0	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
58,3**	23,0;88,1	10,9**	5,1;19,6	15,3**	3,0;39,6	10,4**	3,3;22,9	10,1**	1,1;33,4	8,5**	0,8;29,4	22,7**	9,8;40,8	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	62,4	48,2;75,1	-	;	-	;	-	;	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
-	;	5,7**	1,9;12,6	8,3**	0,9;28,0	7,0**	2,2;16,1	9,5**	1,1;31,1	20,8**	6,4;43,9	17,2**	6,8;33,1	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
55,5*	27,2;81,5	30,5*	20,0;42,8	59,7*	39,4;77,8	69,1	57,6;79,2	47,0*	24,5;70,5	44,5*	24,0;66,4	51,4	38,2;64,6	2 semaines et moins
30,9**	9,0;61,9	29,4*	18,5;42,4	26,6**	12,0;46,3	17,3**	9,6;27,8	31,9**	11,8;58,6	20,8**	7,1;42,2	16,7**	8,2;28,7	Plus de 2 semaines à 1 mois
6,8**	0,1;33,7	34,3*	22,8;47,4	10,8**	2,3;28,0	6,3**	2,0;14,5	10,9**	2,0;30,1	31,3**	12,1;56,6	17,7**	9,3;29,2	Plus d'un mois à 3 mois
6,8**	0,1;33,8	5,7**	1,4;14,8	3,0**	0,1;16,6	7,2**	2,7;14,9	10,2**	1,2;33,0	3,4**	0,1;17,9	14,3**	5,8;27,4	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
92,4	74,5;99,1	91,1	84,4;95,5	87,5	74,8;95,2	89,8	83,7;94,2	79,3	63,0;90,7	85,6	70,7;94,8	83,7	74,6;90,5	Oui, tout à fait
3,8**	0,1;20,2	6,1**	2,5;12,2	9,2**	2,7;21,6	5,9**	2,6;11,3	15,6**	5,8;31,3	7,5**	1,5;20,5	9,1**	4,1;17,0	Oui, en partie
3,8**	0,1;19,8	2,8**	0,7;7,6	3,3**	0,5;11,0	4,3**	1,5;9,3	5,1**	0,7;17,0	6,9**	1,3;19,5	7,2**	2,6;15,3	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]
-	;	0,9**	0,0;5,2	-	;	2,2**	0,4;6,6	-	;	-	;	2,4**	0,5;6,8	Oui
100,0	;	99,1	94,8;100,0	100,0	;	97,8	93,4;99,6	100,0	;	100,0	;	97,6	93,2;99,5	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	21,6	18,1;25,1	12,3**	4,6;24,9
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	23,7	20,1;27,3	19,0*	10,5;30,2
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	25,1	21,5;28,6	54,6	42,1;67,2
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	26,1	22,4;29,9	9,8**	3,0;22,1
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	2,1**	1,0;3,8	1,4**	0,1;7,1
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	1,0**	0,4;2,2	1,6**	0,1;8,0
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	0,4**	0,1;1,3	1,4**	0,0;7,9
Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	94,3	92,1;96,1	98,9	94,0;100,0
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	5,7*	3,9;7,9	1,1**	0,0;6,0
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	94,7	92,8;96,2	98,5	90,9;100,0
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	5,3*	3,8;7,2	1,5**	0,0;9,1
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	92,1	89,7;94,1	93,5	79,7;99,0
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	7,9	5,9;10,3	6,5**	1,0;20,3
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	94,1	91,8;95,9	91,4	77,6;98,0
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	5,9*	4,1;8,2	8,6**	2,0;22,4
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	63,8	59,8;67,7	59,7	46,8;72,5
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	36,2	32,3;40,2	40,3*	27,5;53,2
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	63,4	59,5;67,3	59,6	47,4;71,8
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	36,6	32,7;40,5	40,4*	28,2;52,6
Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	63,8	59,0;68,6	53,4*	36,4;69,9
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	36,2	31,4;41,0	46,6*	30,1;63,6
Contact pour du soutien pratique[3, p, r]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	75,5	72,1;79,0	68,1	53,8;80,3
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	24,5	21,0;27,9	31,9*	19,7;46,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3. On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
-	;	21,6*	13,7;31,3	5,0**	0,9;14,6	40,4	32,2;48,5	5,9**	0,7;19,6	42,4*	26,0;60,1	14,8*	8,5;23,3	Médecin de famille
6,5**	0,8;22,2	31,1	22,0;40,3	42,3	29,9;54,7	12,4*	7,6;18,7	34,4*	18,7;53,1	14,2**	5,1;29,2	29,3	21,0;38,7	Médecin spécialiste du cancer
10,3**	1,8;29,3	18,6*	11,5;27,7	22,1**	12,0;35,4	31,9	24,1;39,7	18,8**	7,6;35,6	14,4**	5,2;29,5	17,0*	9,7;26,6	Chirurgien
83,1	63,5;94,8	26,1*	18,1;35,5	29,1*	17,1;43,7	8,2**	4,4;13,9	38,4*	22,4;56,5	29,0**	15,6;45,8	36,1	26,7;45,5	Autre médecin spécialiste
-	;	2,6**	0,5;7,2	-	;	3,5**	0,9;9,3	2,5**	0,1;13,4	-	;	2,1**	0,2;7,4	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	-	;	3,6**	1,2;8,0	-	;	-	;	-	;	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	-	;	1,5**	0,0;8,1	-	;	-	;	-	;	0,8**	0,0;4,3	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]
93,8	78,8;99,3	98,4	93,8;99,8	94,7	81,0;99,5	82,6	75,3;88,6	100,0	;	100,0	;	98,3	94,0;99,8	En personne
6,2**	0,7;21,2	1,6**	0,2;6,2	5,3**	0,5;19,0	17,4*	11,4;24,7	-	;	-	;	1,7**	0,2;6,0	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
93,4	77,6;99,2	96,3	91,0;98,9	92,6	82,8;97,8	93,0	87,9;96,4	97,0	83,0;99,9	88,4	74,3;96,3	95,9	90,6;98,7	Oui
6,6**	0,8;22,4	3,7**	1,1;9,0	7,4**	2,2;17,2	7,0**	3,6;12,1	3,0**	0,1;17,0	11,6**	3,7;25,7	4,1**	1,3;9,4	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
90,4	74,0;98,1	95,2	89,0;98,4	94,2	84,5;98,7	92,8	87,5;96,4	91,5	76,7;98,3	90,4	76,5;97,5	88,2	80,7;93,5	Oui
9,6**	1,9;26,0	4,8**	1,6;11,0	5,8**	1,3;15,5	7,2**	3,6;12,5	8,5**	1,7;23,3	9,6**	2,5;23,5	11,8**	6,5;19,3	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
93,4	77,8;99,2	96,2	90,7;98,9	94,1	84,1;98,7	93,1	87,9;96,6	91,7	77,8;98,2	92,7	79,6;98,6	95,9	90,7;98,6	Oui
6,6**	0,8;22,2	3,8**	1,1;9,3	5,9**	1,3;15,9	6,9**	3,4;12,1	8,3**	1,8;22,2	7,3**	1,4;20,4	4,1**	1,4;9,3	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]
58,3*	38,3;76,5	82,5	73,9;89,2	69,6	53,4;82,8	71,3	62,7;78,9	63,2	44,5;79,4	41,2*	25,5;58,3	48,0	38,6;57,4	Oui
41,7*	23,5;61,7	17,5*	10,8;26,1	30,4*	17,2;46,6	28,7	21,1;37,3	36,8*	20,6;55,5	58,8	41,7;74,5	52,0	42,6;61,4	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]
72,6	52,1;87,9	44,0	34,5;53,6	75,5	60,4;87,0	82,2	74,6;88,3	58,4*	38,3;76,6	79,6	63,7;90,8	51,2	41,8;60,7	Oui
27,4**	12,1;47,9	56,0	46,4;65,5	24,5**	13,0;39,6	17,8*	11,7;25,4	41,6*	23,4;61,7	20,4**	9,2;36,3	48,8	39,3;58,2	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]
64,2*	39,9;84,1	49,8	36,2;63,4	68,3	51,7;82,1	84,0	75,4;90,5	63,8*	40,3;83,3	59,3*	38,4;77,9	43,4	30,7;56,1	Oui
35,8**	15,9;60,1	50,2	36,6;63,8	31,7*	17,9;48,3	16,0*	9,5;24,6	36,2**	16,7;59,7	40,7*	22,1;61,6	56,6	43,9;69,3	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p, r]
80,3	60,8;92,8	62,4	53,5;71,4	89,1	77,4;96,0	85,9	79,2;91,1	85,3	69,7;94,8	84,8	65,7;95,7	66,5	57,9;75,1	Oui
19,7**	7,2;39,2	37,6	28,6;46,5	10,9**	4,0;22,6	14,1*	8,9;20,8	14,7**	5,2;30,3	15,2**	4,3;34,3	33,5	24,9;42,1	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	7,1*	4,6;10,3	4,2**	0,5;14,3
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	92,9	89,7;95,4	95,8	85,7;99,5
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	41,7	36,8;46,6	35,8*	20,9;53,0
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	58,3	53,4;63,2	64,2	47,0;79,1
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	10,9	8,1;14,2	4,2**	0,4;15,0
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	89,1	85,8;91,9	95,8	85,0;99,6
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	7,1*	4,8;10,0	2,3**	0,0;13,7
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	92,9	90,0;95,2	97,7	86,3;100,0
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	8,7*	6,0;11,9	9,4**	2,6;22,4
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	91,3	88,1;94,0	90,6	77,6;97,4
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	2,7**	1,1;5,5	4,4**	0,5;15,1
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	97,3	94,5;98,9	95,6	84,9;99,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]
19,7**	5,7;43,0	2,3**	0,1;12,3	7,0**	1,3;20,2	10,8**	5,4;18,8	16,2**	4,3;37,6	3,1**	0,1;16,4	-	;	Oui
80,3	57,0;94,3	97,7	87,7;99,9	93,0	79,8;98,7	89,2	81,2;94,6	83,8	62,4;95,7	96,9	83,6;99,9	100,0	;	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
33,2**	13,9;57,8	28,7*	16,5;43,6	33,8*	19,5;50,8	65,7	57,2;74,2	34,5**	14,8;59,0	40,5*	22,2;60,9	22,3*	12,5;35,0	Oui
66,8*	42,2;86,1	71,3	56,4;83,5	66,2	49,2;80,5	34,3	25,8;42,8	65,5*	41,0;85,2	59,5*	39,1;77,8	77,7	65,0;87,5	Non
														Psychologue[p]
14,8**	2,9;38,5	4,5**	0,5;15,5	22,3**	10,7;38,2	15,8*	10,0;23,1	-	;	6,4**	0,7;22,0	9,1**	2,8;20,5	Oui
85,2	61,5;97,1	95,5	84,5;99,5	77,7	61,8;89,3	84,2	76,9;90,0	100,0	;	93,6	78,0;99,3	90,9	79,5;97,2	Non
														Travailleur social[p]
15,3**	2,8;40,6	2,2**	0,0;12,2	7,7**	1,5;21,3	8,7**	4,3;15,3	12,0**	2,4;32,1	7,5**	1,0;23,9	5,8**	1,7;13,9	Oui
84,7	59,4;97,2	97,8	87,8;100,0	92,3	78,7;98,5	91,3	84,7;95,7	88,0	67,9;97,6	92,5	76,1;99,0	94,2	86,1;98,3	Non
														Médecin[p]
13,1**	2,3;36,1	7,9**	2,2;19,0	7,7**	1,7;20,6	8,9**	4,2;16,0	9,1**	0,9;31,1	-	;	11,3**	4,3;22,8	Oui
86,9	63,9;97,7	92,1	81,0;97,8	92,3	79,4;98,3	91,1	84,0;95,8	90,9	68,9;99,1	100,0	;	88,7	77,2;95,7	Non
														Autre professionnel de la santé
-	;	4,2**	0,5;14,4	2,4**	0,1;13,0	-	;	4,2**	0,1;22,2	8,0**	0,3;35,9	3,3**	0,3;12,9	Oui
100,0	;	95,8	85,6;99,5	97,6	87,0;99,9	100,0	;	95,8	77,8;99,9	92,0	64,1;99,7	96,7	87,1;99,7	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	23,9	20,5;27,2	17,4**	9,4;28,2
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	76,1	72,8;79,5	82,6	71,8;90,6
Médecin spécialiste du cancer[p, r]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	43,8	39,9;47,7	38,9*	27,0;52,0
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	56,2	52,3;60,1	61,1	48,0;73,0
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	18,3	14,9;22,0	17,3**	9,2;28,3
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	81,7	78,0;85,1	82,7	71,7;90,8
Autre médecin spécialiste[p]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	16,6	13,6;20,0	11,7**	4,7;23,0
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	83,4	80,0;86,4	88,3	77,0;95,3
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	4,2*	2,8;6,0	3,3**	0,3;12,5
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	95,8	94,0;97,2	96,7	87,5;99,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
17,0**	5,4;36,2	14,3*	8,2;22,5	12,6**	5,0;24,9	49,3	41,4;57,3	20,7**	8,7;38,2	31,1*	17,0;48,2	10,7**	5,4;18,3	Oui
83,0	63,8;94,6	85,7	77,5;91,8	87,4	75,1;95,0	50,7	42,7;58,6	79,3	61,8;91,3	68,9	51,8;83,0	89,3	81,7;94,6	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p, r]
48,3*	28,5;68,5	39,6	30,2;49,0	78,9	65,3;88,9	52,7	44,1;61,3	48,3*	30,9;66,1	35,5*	20,4;53,2	26,2*	18,3;35,4	Oui
51,7*	31,5;71,5	60,4	51,0;69,8	21,1**	11,1;34,7	47,3	38,7;55,9	51,7*	33,9;69,1	64,5	46,8;79,6	73,8	64,6;81,7	Non
														Médecin de famille[p]
16,6**	5,7;34,4	17,4*	10,7;26,1	13,7**	5,5;26,8	19,4*	12,6;27,9	19,0**	8,3;34,7	27,3**	13,0;46,2	17,2*	9,9;26,9	Oui
83,4	65,6;94,3	82,6	73,9;89,3	86,3	73,2;94,5	80,6	72,1;87,4	81,0	65,3;91,7	72,7	53,8;87,0	82,8	73,1;90,1	Non
														Autre médecin spécialiste[p]
20,7**	8,1;39,4	15,0*	8,7;23,5	3,5**	0,5;12,0	16,3*	10,3;23,8	22,6**	9,6;41,1	13,6**	4,7;28,4	24,5*	16,6;33,9	Oui
79,3	60,6;91,9	85,0	76,5;91,3	96,5	88,0;99,5	83,7	76,2;89,7	77,4	58,9;90,4	86,4	71,6;95,3	75,5	66,1;83,4	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
3,1**	0,1;16,3	-	;	6,5**	1,3;17,8	4,4**	1,7;9,2	10,5**	2,8;25,3	3,2**	0,1;16,6	5,7**	2,1;11,8	Oui
96,9	83,7;99,9	100,0	;	93,5	82,2;98,7	95,6	90,8;98,3	89,5	74,7;97,2	96,8	83,4;99,9	94,3	88,2;97,9	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	84,9	81,2;88,0	83,7	68,9;93,3
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	9,1	6,7;11,9	8,6**	2,7;19,6
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	6,1*	4,0;8,7	7,7**	1,4;22,2
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	74,2	70,7;77,8	69,6	55,4;81,5
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	13,2	10,5;16,3	12,0**	5,2;22,6
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	12,6	9,9;15,6	18,4**	8,6;32,6
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	75,6	70,9;80,4	77,0	60,6;89,0
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	14,1	10,5;18,3	13,2**	4,4;28,1
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	10,3*	7,4;13,9	9,8**	2,7;23,5
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	58,7	53,9;63,4	52,6	37,6;67,3
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	14,8	11,6;18,5	18,2**	8,3;32,4
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	26,5	22,4;30,6	29,2*	16,0;45,6
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	33,0	28,9;37,0	34,4*	22,8;47,6
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	16,9	13,9;20,2	14,5**	6,9;25,6
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	18,9	15,7;22,5	17,7**	8,7;30,5
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	8,5	6,2;11,3	7,5**	2,0;18,3
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	22,8	19,2;26,3	25,8*	14,6;40,0
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	72,3	64,6;79,2	65,0*	35,8;87,7
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	13,9*	8,9;20,4	19,3**	3,7;48,3
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	13,8*	8,8;20,2	15,7**	2,9;41,6
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	15,5	12,6;18,3	12,9**	6,0;23,3
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	84,5	81,7;87,4	87,1	76,7;94,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
80,2	61,5;92,5	93,2	86,8;97,1	92,4	81,0;98,1	86,5	79,3;91,9	91,9	77,4;98,4	71,5	51,9;86,5	76,1	66,0;84,5	Oui, tout à fait
13,1**	3,9;29,6	4,0**	1,1;10,0	5,7**	1,0;16,6	10,2**	5,6;16,6	8,1**	1,6;22,6	12,3**	4,0;27,0	12,1**	6,1;20,9	Oui, en partie
6,6**	0,7;22,7	2,8**	0,7;7,5	1,9**	0,0;10,5	3,3**	0,9;8,1	-	;	16,2**	4,6;36,5	11,8**	6,0;20,0	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
86,0	68,2;96,0	81,4	72,6;88,3	83,2	69,9;92,3	76,0	67,8;83,0	82,6	64,5;93,9	73,9	55,1;87,9	59,3	49,8;68,7	Oui, tout à fait
3,9**	0,2;18,1	14,1*	8,0;22,3	13,0**	5,0;26,0	12,9*	7,6;20,1	10,6**	2,7;25,8	7,2**	1,3;20,7	18,3*	11,4;27,2	Oui, en partie
10,1**	2,0;27,5	4,5**	1,5;10,4	3,7**	0,4;12,9	11,0*	6,2;17,7	6,8**	0,7;24,1	18,8**	6,8;37,8	22,4*	15,0;31,4	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
78,1	51,2;94,3	63,5	50,3;75,3	82,6	65,7;93,4	79,1	69,2;86,9	69,2	45,3;87,4	85,2	63,5;96,6	75,3	61,1;86,4	Oui
11,0**	1,4;34,2	25,7*	15,1;38,9	14,1**	4,6;30,2	9,1**	4,1;17,1	20,7**	5,8;45,6	3,4**	0,1;18,5	13,8**	5,7;26,3	Non, il ne voulait pas
11,0**	1,1;36,2	10,8**	4,1;22,2	3,4**	0,1;17,0	11,8**	6,0;20,3	10,0**	1,0;34,0	11,3**	1,8;32,5	10,9**	4,0;22,6	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
72,6	49,0;89,5	70,4	57,9;81,0	61,1	44,2;76,2	62,4	53,3;71,5	62,3	41,7;80,1	54,1*	33,1;74,2	42,8	31,5;54,1	Oui, tout à fait
18,1**	5,1;40,3	11,2**	5,0;20,8	17,4**	6,9;33,3	11,6**	6,1;19,5	18,7**	5,9;39,5	22,7**	8,9;43,0	14,1**	6,6;25,1	Oui, en partie
9,3**	1,0;30,8	18,4*	10,4;29,1	21,6**	9,5;38,8	26,0*	18,3;35,1	19,0**	7,3;36,9	23,1**	7,6;46,9	43,1	31,5;54,7	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
22,2**	8,4;42,7	42,3	32,9;51,7	39,2*	25,9;53,8	35,8	26,9;44,6	49,4*	30,8;68,2	32,2*	17,4;50,1	15,8*	9,5;23,9	Oui, une infirmière pivot en oncologie
23,3**	9,9;42,1	11,5**	6,0;19,6	10,2**	4,0;20,4	13,6*	8,4;20,5	13,2**	3,9;29,7	23,1**	9,4;42,7	27,0*	18,7;36,6	Oui, un autre professionnel de la santé
20,1**	7,8;38,6	15,2*	8,7;23,9	34,1*	21,6;48,5	18,4*	12,4;25,8	23,0**	9,8;41,6	19,8**	7,1;39,6	15,1*	8,7;23,6	Oui, un membre du personnel administratif
3,5**	0,1;18,1	10,4**	5,2;18,0	5,4**	1,0;15,6	11,1**	6,1;18,0	2,4**	0,1;13,0	4,9**	0,5;17,6	10,1**	4,8;18,1	Oui, un médecin
31,0**	15,6;50,1	20,6*	13,1;30,0	11,1**	4,1;22,8	21,1*	14,3;29,3	12,0**	3,4;27,9	20,0**	8,7;36,5	32,1	22,9;41,4	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
81,0*	40,3;98,6	89,4	74,7;97,1	44,4**	18,7;72,5	72,0	56,0;84,7	78,5	49,2;95,3	66,2**	25,0;94,3	63,7*	40,4;83,1	Oui, tout à fait
-	;	7,2**	1,3;21,0	30,5**	8,2;62,9	16,2**	6,7;30,7	6,5**	0,1;31,7	21,0**	1,5;64,1	14,7**	2,9;38,1	Oui, en partie
19,0**	1,4;59,7	3,4**	0,2;15,5	25,1**	5,9;56,1	11,8**	3,7;26,4	15,1**	1,8;44,9	12,8**	0,2;56,3	21,6**	7,4;43,4	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]
24,5**	9,4;46,1	16,8*	10,3;25,4	17,0**	7,9;30,3	19,7*	13,6;27,0	12,8**	4,2;27,6	24,4**	11,7;41,5	6,3**	2,7;12,2	Oui
75,5	53,9;90,6	83,2	74,6;89,7	83,0	69,7;92,1	80,3	73,0;86,4	87,2	72,4;95,8	75,6	58,5;88,3	93,7	87,8;97,3	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	82,0	79,4;84,6	98,9	93,7;100,0
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	18,0	15,4;20,6	1,1**	0,0;6,3
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	39,9	35,6;44,3	2,6**	0,1;13,9
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	60,1	55,7;64,4	97,4	86,1;99,9
Lieu de la chirurgie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	82,8	79,1;86,1	89,5	77,1;96,6
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	17,2	13,9;20,9	10,5**	3,4;22,9
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	60,2	53,7;66,8	51,5*	30,9;71,8
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	8,2*	5,0;12,5	7,4**	1,3;21,6
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	31,6	25,5;37,6	41,0*	22,2;62,0
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	63,5	59,0;67,9	62,1	47,8;75,0
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	13,8	10,7;17,4	12,6**	5,4;23,8
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	22,7	18,7;26,8	25,3**	13,7;40,3
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	94,7	92,1;96,6	97,3	90,1;99,7
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	5,3*	3,4;7,9	2,7**	0,3;9,9
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	90,9	87,5;93,6	91,2	78,0;97,8
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	7,9*	5,3;11,2	7,6**	1,5;21,4
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	1,2**	0,4;2,7	1,2**	0,0;6,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
82,0	63,8;93,5	67,1	59,4;74,8	30,3*	18,3;44,5	95,6	90,9;98,2	82,9	67,9;92,8	82,6	65,9;93,4	90,9	83,8;95,6	Oui
18,0**	6,5;36,2	32,9	25,2;40,6	69,7	55,5;81,7	4,4**	1,8;9,1	17,1**	7,2;32,1	17,4**	6,6;34,1	9,1**	4,4;16,2	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
9,1**	1,1;29,2	16,1**	7,7;28,1	60,5*	31,5;84,9	70,4	61,9;77,9	31,6**	13,4;55,2	-	;	59,8	50,0;69,6	Oui
90,9	70,8;98,9	83,9	71,9;92,3	39,5**	15,1;68,5	29,6	22,1;38,1	68,4	44,8;86,6	100,0	;	40,2	30,4;50,0	Non
														Lieu de la chirurgie[p, r]
51,9*	31,1;72,2	85,3	74,4;92,8	82,7	54,7;96,9	89,0	82,6;93,7	74,2	55,0;88,4	68,0	48,1;84,0	83,0	74,9;89,4	Hôpital de la région de résidence
48,1*	27,8;68,9	14,7**	7,2;25,6	17,3**	3,1;45,3	11,0*	6,3;17,4	25,8**	11,6;45,0	32,0**	16,0;51,9	17,0*	10,6;25,1	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
59,8*	33,7;82,3	72,2	52,3;87,2	50,5**	14,0;86,6	62,7	48,7;75,3	61,0*	28,5;87,5	61,0*	33,5;84,1	57,0	41,2;71,8	Oui, tout à fait
16,5**	3,3;41,9	14,5**	4,3;32,4	-	;	6,8**	1,7;17,3	10,6**	0,3;45,4	6,2**	0,2;30,1	5,4**	1,1;15,2	Oui, en partie
23,8**	6,6;51,0	13,3**	3,4;31,7	49,5**	13,4;86,0	30,6*	18,6;44,8	28,4**	7,0;60,9	32,8**	11,6;61,0	37,6*	23,4;53,6	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
63,4*	40,5;82,6	81,8	71,7;89,4	54,2*	26,7;79,9	63,5	55,0;72,0	62,2*	41,4;80,2	59,4*	37,7;78,7	54,8	44,2;65,5	Oui, tout à fait
15,1**	3,8;35,7	8,6**	3,6;16,8	25,3**	7,0;53,5	16,6*	10,3;24,6	12,6**	3,3;30,1	18,6**	5,6;40,2	11,9**	6,0;20,4	Oui, en partie
21,5**	7,2;43,8	9,6**	4,2;18,1	20,6**	4,1;50,4	19,9*	13,5;27,8	25,2**	10,3;46,1	22,0**	7,7;43,6	33,3*	23,3;43,3	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
100,0	;	96,0	89,0;99,1	94,8	73,7;99,9	94,7	89,2;97,9	93,6	76,8;99,4	94,5	81,4;99,3	91,6	83,2;96,6	Oui
-	;	4,0**	0,9;11,0	5,2**	0,1;26,3	5,3**	2,1;10,8	6,4**	0,6;23,2	5,5**	0,7;18,6	8,4**	3,4;16,8	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
86,8	64,9;97,4	92,5	83,6;97,4	93,2	65,9;99,9	90,3	83,5;95,0	92,7	75,4;99,2	100,0	;	87,6	77,9;94,1	Oui, tout à fait
5,0**	0,1;24,6	7,5**	2,6;16,4	6,8**	0,1;34,1	8,2**	3,9;14,7	3,4**	0,1;18,3	-	;	12,4**	5,9;22,1	Oui, en partie
8,3**	0,8;28,6	-	;	-	;	1,5**	0,2;5,5	3,9**	0,1;20,2	-	;	-	;	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	36,7	34,1;39,4	51,6	39,4;63,8
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	63,3	60,6;65,9	48,4	36,2;60,6
Lieu de la chimiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	81,8	76,3;86,5	79,2	63,8;90,2
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	18,2	13,5;23,7	20,8**	9,8;36,2
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	62,0	55,8;68,1	50,0*	33,8;66,3
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	28,9	23,2;34,5	42,5*	26,2;60,0
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	9,2*	5,7;13,7	7,5**	1,5;20,9
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	50,8	42,3;59,3	45,6*	26,4;65,8
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	16,2*	10,3;23,7	26,6**	10,9;48,4
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	33,0	25,1;40,9	27,8**	12,6;47,9
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	42,7	35,8;49,5	53,6*	36,4;70,2
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	37,4	30,8;44,0	34,5*	19,5;52,2
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	19,9	14,9;25,8	11,9**	4,3;24,8
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	88,4	83,5;92,3	90,4	76,5;97,5
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	11,6*	7,7;16,5	9,6**	2,5;23,5
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	-	;	-	;
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	86,9	81,7;91,1	90,7	77,3;97,6
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	10,2*	6,5;14,9	7,1**	1,3;20,2
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	2,9**	1,0;6,4	2,2**	0,1;11,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
40,6*	23,2;60,1	2,8**	0,6;7,7	89,5	77,0;96,6	48,7	41,7;55,6	13,9**	5,2;28,1	51,5*	34,3;68,4	25,9*	17,8;35,4	Oui
59,4*	39,9;76,8	97,2	92,3;99,4	10,5**	3,4;23,0	51,3	44,4;58,3	86,1	71,9;94,8	48,5*	31,6;65,7	74,1	64,6;82,2	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p]
69,0*	35,5;92,1	50,0**	0,7;99,3	84,9	70,8;93,9	89,1	80,1;95,1	24,0**	0,1;87,2	79,2	56,3;93,5	79,5	58,0;93,2	Hôpital de la région de résidence
31,0**	7,9;64,5	50,0**	0,7;99,3	15,1**	6,1;29,2	10,9**	4,9;19,9	76,0**	12,8;99,9	20,8**	6,5;43,7	20,5**	6,8;42,0	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
54,1**	22,8;83,1	-	;	62,6	46,2;77,1	67,1	55,4;77,4	72,9**	10,8;99,8	70,7	46,8;88,4	62,6*	41,1;81,0	Moins de 30 minutes
16,1**	1,7;49,3	100,0	;	28,6*	16,0;44,3	26,1*	16,5;37,7	27,1**	0,2;89,2	25,0**	8,9;48,6	23,5**	9,6;43,4	De 30 à 60 minutes
29,8**	7,4;63,0	-	;	8,8**	2,3;21,4	6,8**	2,4;14,8	-	;	4,3**	0,1;22,8	13,9**	3,3;34,0	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
65,5**	25,3;93,6	-	;	35,7**	17,9;57,1	61,4	44,0;76,9	100,0	;	58,9*	31,6;82,6	41,8**	18,4;68,2	Oui, tout à fait
12,7**	0,1;58,9	100,0	;	28,8**	12,6;50,2	5,5**	0,6;18,8	-	;	6,0**	0,1;31,3	12,2**	1,3;39,2	Oui, en partie
21,8**	2,1;62,7	-	;	35,5**	18,0;56,3	33,1*	18,8;50,2	-	;	35,1**	13,4;62,6	46,1**	21,9;71,8	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
67,0*	34,7;90,5	50,0**	0,7;99,3	38,0*	23,3;54,5	35,6*	25,2;47,1	100,0	;	40,3**	19,7;63,8	38,5*	20,3;59,4	Moins de 30 minutes
18,2**	2,4;51,1	50,0**	0,7;99,3	38,2*	24,4;53,6	36,1*	25,2;48,2	-	;	59,7*	36,2;80,3	37,1**	17,7;60,1	De 30 à 60 minutes
14,9**	1,7;45,3	-	;	23,8**	11,1;41,3	28,3*	18,8;39,5	-	;	-	;	24,4**	9,8;45,2	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
85,1	53,9;98,4	100,0	;	87,1	72,4;95,7	83,8	73,5;91,3	100,0	;	92,2	73,6;99,1	95,9	77,9;99,9	Oui, tout à fait
14,9**	1,6;46,1	-	;	12,9**	4,3;27,6	16,2**	8,7;26,5	-	;	7,8**	0,9;26,4	4,1**	0,1;22,1	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
85,1	52,8;98,6	100,0	;	87,4	73,3;95,7	94,6	86,6;98,6	100,0	;	66,5*	43,2;85,1	76,9	54,4;91,8	Oui, tout à fait
14,9**	1,4;47,2	-	;	12,6**	4,3;26,7	2,7**	0,3;9,6	-	;	29,2**	11,9;52,4	13,8**	2,5;37,1	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	2,7**	0,4;9,1	-	;	4,4**	0,1;22,2	9,3**	1,0;30,6	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	48,2	45,4;50,9	25,2*	15,6;36,8
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	51,8	49,1;54,6	74,8	63,2;84,4
Lieu de la radiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	63,6	58,2;68,9	52,1*	28,9;74,7
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	36,4	31,1;41,8	47,9*	25,3;71,1
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	43,0	37,2;48,9	30,6**	12,0;55,5
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	45,5	39,6;51,3	63,8*	38,3;84,6
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	11,5*	7,9;16,0	5,6**	0,2;27,2
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	70,3	64,1;76,4	56,5*	27,5;82,5
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	10,1*	6,4;14,8	7,5**	0,1;39,0
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	19,7	14,5;25,7	36,0**	13,0;65,1
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	79,7	75,1;84,3	69,1*	43,8;88,1
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	12,7*	9,1;17,1	26,2**	8,8;51,7
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	7,6*	4,6;11,6	4,6**	0,1;22,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
33,7*	18,1;52,5	54,1	46,5;61,8	50,8	37,4;64,1	79,3	71,6;85,8	63,7	46,4;78,8	22,0**	10,1;38,6	25,0*	17,1;34,2	Oui
66,3	47,5;81,9	45,9	38,2;53,5	49,2	35,9;62,6	20,7*	14,2;28,4	36,3*	21,2;53,6	78,0	61,4;89,9	75,0	65,8;82,9	Non
														Lieu de la radiothérapie[p]
81,9	46,2;98,1	62,4	49,4;74,2	61,9*	39,6;81,0	63,0	54,9;71,1	69,4	47,7;86,2	67,5**	25,8;94,9	63,7	42,7;81,5	Hôpital de la région de résidence
18,1**	1,9;53,8	37,6*	25,8;50,6	38,1**	19,0;60,4	37,0	28,9;45,1	30,6**	13,8;52,3	32,5**	5,1;74,2	36,3**	18,5;57,3	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
72,8*	36,0;95,1	35,5*	23,7;48,8	47,3*	26,2;69,2	39,4	30,4;48,4	50,0*	29,1;71,0	47,3**	12,3;84,5	56,5*	36,1;75,3	Moins de 30 minutes
18,2**	1,5;56,4	50,4	37,7;63,1	32,2**	15,0;53,9	53,1	43,7;62,5	34,0**	15,5;56,9	52,7**	15,5;87,7	25,9**	11,7;45,3	De 30 à 60 minutes
9,0**	0,2;43,1	14,1**	5,9;26,9	20,4**	6,9;41,5	7,5**	3,5;13,6	16,0**	4,5;36,1	-	;	17,6**	5,3;38,3	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
61,7**	11,1;97,2	68,7	51,4;82,8	70,3*	43,6;89,6	71,0	60,0;80,4	75,3	48,5;92,7	80,9*	25,9;99,7	74,0	47,8;91,7	Oui, tout à fait
19,2**	0,1;78,4	13,1**	4,1;28,8	4,9**	0,1;25,6	9,8**	4,4;18,1	6,7**	0,1;33,3	19,1**	0,3;74,1	9,4**	0,8;33,4	Oui, en partie
19,2**	0,1;78,1	18,3**	7,7;34,1	24,8**	7,0;52,6	19,3*	11,6;29,2	17,9**	3,4;45,6	-	;	16,6**	3,2;42,7	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
87,3	45,7;99,7	78,1	64,7;88,2	78,4	58,5;91,7	85,4	77,5;91,4	74,3	52,5;89,8	63,2**	23,5;92,7	74,8	52,5;90,4	Oui, tout à fait
-	;	13,0**	5,5;24,8	14,9**	4,1;34,0	8,3**	4,0;14,7	22,0**	7,9;43,4	25,5**	2,9;67,2	12,5**	2,1;34,9	Oui, en partie
12,7**	0,3;54,3	8,9**	3,0;19,4	6,8**	0,7;23,4	6,3**	2,5;12,9	3,7**	0,1;19,9	11,3**	0,1;55,8	12,6**	2,5;33,6	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Douleur et malaises ressentis[p, r]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	55,2	51,3;59,1	70,2	55,5;82,4
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	44,8	40,9;48,7	29,8*	17,6;44,5
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	21,5	16,9;26,1	16,5**	7,2;30,5
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	41,9	36,5;47,3	49,3*	33,3;65,4
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	36,6	31,2;42,1	34,1*	19,1;51,9
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	82,3	77,4;86,5	88,4	75,9;95,8
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	13,2	9,6;17,5	7,8**	2,0;19,6
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	4,5**	2,5;7,5	3,8**	0,4;13,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p, r]
71,9	52,0;87,0	33,6	23,9;43,3	74,8	61,6;85,4	54,5	46,2;62,9	54,6*	36,1;72,3	60,6	41,2;77,8	53,7	44,2;63,3	Oui
28,1**	13,0;48,0	66,4	56,7;76,1	25,2*	14,6;38,4	45,5	37,1;53,8	45,4*	27,7;63,9	39,4*	22,2;58,8	46,3	36,7;55,8	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
-	;	10,9**	3,2;25,1	23,5**	10,9;40,6	21,6*	13,6;31,7	24,7**	7,7;50,5	47,4*	24,5;71,1	27,4*	15,2;42,8	Sévères
67,2	44,4;85,3	40,8*	24,1;59,1	43,6*	27,3;60,9	38,8	28,1;50,4	35,2**	14,0;61,8	20,6**	6,2;44,1	40,8*	27,1;55,7	Modérés
32,8**	14,7;55,6	48,4*	30,7;66,3	33,0*	18,5;50,2	39,5	28,6;51,3	40,1**	18,1;65,6	32,0**	12,6;57,4	31,7*	18,9;46,9	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
81,2	58,2;94,8	82,5	65,3;93,4	82,2	66,8;92,5	86,8	76,3;93,9	83,1	56,4;96,8	82,2	61,6;94,5	73,1	58,3;85,0	Oui, tout à fait
13,8**	3,0;35,3	14,9**	5,1;31,1	15,6**	6,0;30,9	9,7**	4,0;18,9	12,3**	1,3;39,6	17,8**	5,5;38,4	16,8**	7,7;30,0	Oui, en partie
4,9**	0,1;25,2	2,7**	0,1;13,8	2,2**	0,1;11,0	3,5**	0,5;11,6	4,6**	0,1;24,5	-	;	10,1**	3,5;21,5	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	87,7	84,1;90,7	89,7	77,1;96,7
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	8,5*	6,0;11,7	6,5**	1,2;18,6
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	3,8**	2,0;6,3	3,8**	0,4;13,8
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	7,4*	5,3;9,9	10,4**	3,2;23,4
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	92,6	90,1;94,7	89,6	76,6;96,8
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	77,4	73,6;81,2	82,8	69,4;92,1
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	21,4	17,6;25,1	17,2**	7,9;30,6
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	1,2**	0,5;2,6	-	;
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	66,6	62,9;70,3	75,1	60,3;86,6
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	33,4	29,7;37,1	24,9**	13,4;39,7
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	24,8	21,4;28,2	22,2*	12,3;35,0
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	15,3	12,3;18,7	12,9**	5,8;23,7
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	59,9	56,0;63,8	64,9	50,8;77,3
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	78,1	73,9;82,3	71,3	56,9;83,2
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	16,0	12,4;20,2	24,0*	13,2;37,9
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	5,9*	3,8;8,7	4,7**	0,9;13,8
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	63,6	58,2;68,9	64,9	49,2;78,5
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	36,4	31,1;41,8	35,1*	21,5;50,8
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	88,2	85,0;90,9	83,1	68,7;92,8
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	10,9	8,3;14,1	16,9**	7,2;31,3
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	0,9**	0,3;2,0	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
83,7	57,3;97,0	89,0	77,7;95,9	85,1	72,0;93,7	90,3	82,9;95,2	96,6	81,8;99,9	87,3	69,0;96,8	80,7	67,6;90,2	Oui, tout à fait
10,5**	1,0;35,2	7,8**	2,2;18,4	14,9**	6,3;28,0	5,5**	2,0;11,9	3,4**	0,1;18,2	5,9**	0,7;20,4	13,8**	5,8;26,2	Oui, en partie
5,9**	0,1;29,2	3,2**	0,4;11,0	-	;	4,2**	1,2;10,4	-	;	6,8**	0,7;23,7	5,6**	1,2;15,4	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
6,5**	0,8;21,9	2,1**	0,3;7,0	5,8**	1,1;16,6	7,4**	4,0;12,2	15,0**	4,7;32,5	9,6**	2,2;25,1	8,4**	3,6;16,0	Oui
93,5	78,1;99,2	97,9	93,0;99,7	94,2	83,4;98,9	92,6	87,8;96,0	85,0	67,5;95,3	90,4	74,9;97,8	91,6	84,0;96,4	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
80,4	60,5;93,1	82,1	73,2;89,1	80,9	67,7;90,4	76,3	68,1;83,4	72,8	53,8;87,2	71,0	53,1;85,1	72,5	60,9;82,2	Oui, toujours
16,2**	5,2;34,7	17,9*	10,9;26,8	17,2**	8,2;30,0	21,4*	14,5;29,7	27,2**	12,8;46,2	24,2**	11,4;41,7	27,5*	17,8;39,1	Oui, la plupart du temps
3,4**	0,1;17,8	-	;	2,0**	0,0;11,6	2,3**	0,4;6,8	-	;	4,8**	0,5;17,1	-	;	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
74,3	55,1;88,5	67,5	58,8;76,2	77,0	62,3;88,0	86,4	79,8;91,5	68,1	48,8;83,7	55,4*	36,4;73,4	34,7	25,7;43,7	Oui
25,7**	11,5;44,9	32,5	23,8;41,2	23,0**	12,0;37,7	13,6*	8,5;20,2	31,9**	16,3;51,2	44,6*	26,6;63,6	65,3	56,3;74,3	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p,]
24,2**	10,2;43,8	11,8**	6,3;19,6	36,5*	22,6;52,3	40,5	32,2;48,7	32,2*	17,2;50,4	23,7**	11,0;40,9	12,3*	7,2;19,3	Oui
17,4**	5,7;36,7	15,6*	9,1;24,4	19,9**	10,5;32,6	13,9*	8,6;20,8	8,0**	1,7;21,8	23,0**	10,0;41,4	15,2*	9,0;23,5	Non, mais il aurait aimé l'être
58,4*	37,9;76,9	72,6	63,1;80,7	43,6*	29,2;58,8	45,6	37,2;54,0	59,8	41,3;76,4	53,3*	34,9;71,1	72,4	63,2;80,5	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
80,0	56,3;94,3	78,2	66,8;87,2	86,5	70,7;95,7	84,7	76,0;91,2	80,2	58,3;93,8	71,7	52,1;86,7	71,8	57,9;83,2	Oui, tout à fait
15,5**	3,4;38,6	17,1**	9,0;28,4	11,1**	2,9;27,0	12,5**	6,8;20,5	19,8**	6,2;41,7	17,8**	5,9;37,3	14,3**	6,4;26,1	Oui, en partie
4,5**	0,1;23,5	4,6**	1,0;12,9	2,4**	0,1;12,2	2,8**	0,6;8,1	-	;	10,5**	2,6;25,9	13,8**	6,1;25,7	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
59,8*	36,5;80,3	66,6	48,7;81,5	69,1	48,7;85,2	60,9	50,8;70,9	59,4*	35,0;80,8	82,7	59,0;95,8	56,5	40,9;71,3	Oui
40,2**	19,7;63,5	33,4*	18,5;51,3	30,9**	14,8;51,3	39,1	29,1;49,2	40,6**	19,2;65,0	17,3**	4,2;41,0	43,5*	28,7;59,1	Non
														Patient traité de manière respectueuse
86,0	66,9;96,4	93,9	87,3;97,7	96,4	86,8;99,6	87,9	81,4;92,8	86,7	70,4;95,9	91,8	77,5;98,4	82,6	73,1;89,8	Oui, toujours
10,7**	2,1;29,0	6,1**	2,3;12,7	3,6**	0,4;13,2	12,1*	7,2;18,6	13,3**	4,1;29,6	5,7**	0,7;19,0	14,9*	8,4;23,7	Oui, la plupart du temps
3,2**	0,1;17,0	-	;	-	;	-	;	-	;	2,5**	0,1;13,3	2,6**	0,5;7,4	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	2,5**	1,3;4,3	4,0**	0,1;19,1
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	4,4*	2,8;6,6	2,8**	0,3;9,8
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	2,0**	1,1;3,5	1,3**	0,0;6,7
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	91,1	88,1;93,5	92,0	79,3;98,1
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	74,4	70,8;78,0	57,7	45,1;70,2
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	18,9	15,8;22,3	36,4*	24,2;50,1
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	6,7*	4,7;9,2	5,9**	1,7;14,4
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	88,3	85,3;90,9	90,7	81,8;96,2
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	10,2	7,8;13,1	9,3**	3,8;18,2
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	1,4**	0,6;2,8	-	;
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	72,2	65,3;78,4	77,2	59,6;89,8
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	27,8	21,6;34,7	22,8**	10,2;40,4
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	2,9*	1,7;4,6	3,0**	0,4;10,2
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	97,1	95,4;98,3	97,0	89,8;99,6
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	75,5	70,7;80,2	75,0	56,1;88,8
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	6,6*	4,1;9,9	5,1**	0,6;17,5
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	18,0	13,9;22,7	19,9**	7,5;38,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
7,7**	0,8;26,5	2,7**	0,5;8,2	1,6**	0,0;8,4	2,3**	0,6;6,1	2,2**	0,0;12,4	-	;	1,7**	0,2;6,1	Oui, souvent
-	;	0,9**	0,0;5,6	9,7**	3,1;21,7	2,1**	0,3;6,5	9,7**	2,2;25,3	-	;	9,9**	4,5;18,2	Oui, parfois
3,2**	0,1;17,0	1,1**	0,0;5,5	7,9**	2,2;19,2	0,7**	0,0;3,8	2,7**	0,1;14,4	-	;	2,6**	0,5;7,7	Oui, une seule fois
89,1	69,8;98,0	95,2	89,1;98,5	80,8	67,4;90,5	94,9	89,7;98,0	85,3	69,2;95,0	100,0	;	85,9	76,6;92,5	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
52,3*	32,6;71,5	84,0	75,8;90,2	75,3	60,4;86,8	82,6	75,1;88,6	67,1	48,2;82,8	81,7	65,7;92,4	70,1	60,4;78,7	Oui, toujours
30,6**	14,3;51,3	10,5**	5,3;18,2	16,8**	7,6;30,3	13,7*	8,4;20,6	27,1**	12,9;46,0	15,7**	5,8;31,7	19,7*	12,5;28,7	Oui, la plupart du temps
17,1**	5,6;36,2	5,5**	2,0;11,8	7,9**	2,2;18,9	3,8**	1,3;8,4	5,7**	0,5;20,7	2,6**	0,1;14,2	10,2**	4,9;18,0	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
80,7	61,3;93,1	92,7	85,7;96,9	84,9	73,5;92,8	91,3	85,8;95,2	90,9	75,4;98,2	88,1	73,9;96,2	82,1	72,7;89,3	Oui, toujours
12,7**	3,2;30,9	6,4**	2,5;13,2	13,2**	5,9;24,3	8,7**	4,8;14,2	9,1**	1,8;24,6	7,1**	1,3;20,2	15,6*	8,8;24,9	Oui, la plupart du temps
6,6**	0,9;21,4	0,9**	0,0;4,7	1,9**	0,0;10,2	-	;	-	;	4,8**	0,4;17,7	2,3**	0,3;7,7	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]
74,4	49,1;91,5	78,5	61,5;90,4	47,7**	21,3;75,1	71,1	57,0;82,7	78,6*	43,6;96,9	81,9	51,7;97,0	65,4	45,7;81,8	Oui
25,6**	8,5;50,9	21,5**	9,6;38,5	52,3**	24,9;78,7	28,9*	17,3;43,0	21,4**	3,1;56,4	18,1**	3,0;48,3	34,6**	18,2;54,3	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
-	;	-	;	7,6**	1,9;19,2	3,9**	1,5;8,1	2,7**	0,1;14,1	2,3**	0,0;13,4	3,2**	0,6;9,2	Oui
100,0	;	100,0	;	92,4	80,8;98,1	96,1	91,9;98,5	97,3	85,9;99,9	97,7	86,6;100,0	96,8	90,8;99,4	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
88,3	62,5;98,7	79,4	66,3;89,1	88,6	74,2;96,6	77,6	66,8;86,3	61,6*	41,0;79,5	80,0	53,6;95,1	64,5	51,2;76,4	Oui, tout à fait
11,7**	1,3;37,5	1,8**	0,1;9,5	2,4**	0,1;12,3	6,3**	2,2;13,9	13,4**	3,7;31,0	3,6**	0,1;19,6	10,7**	4,1;21,8	Oui, en partie
-	;	18,8**	9,5;31,7	9,0**	2,1;23,0	16,1**	8,7;26,3	25,0**	10,5;45,3	16,4**	2,9;43,6	24,8*	14,7;37,4	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p, r]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	81,4	77,7;84,8	86,0	70,5;95,3
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	18,6	15,2;22,3	14,0**	4,7;29,5
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	10,4	7,9;13,3	9,0**	3,2;18,9
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	89,6	86,7;92,1	91,0	81,1;96,8
Médecin spécialiste[p]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	17,0	14,0;20,4	12,6**	5,1;24,5
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	83,0	79,6;86,0	87,4	75,5;94,9
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	26,3	22,5;30,1	23,7*	13,6;36,7
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	73,7	69,9;77,5	76,3	63,3;86,4
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	7,9	5,8;10,4	6,2**	1,7;15,4
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	92,1	89,6;94,2	93,8	84,6;98,3
CLSC[p]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	19,6	16,3;23,1	16,5**	7,6;29,5
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	80,4	76,9;83,7	83,5	70,5;92,4
Urgence d'un hôpital[p, r]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	30,1	26,6;33,7	42,8*	29,5;56,0
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	69,9	66,3;73,4	57,2	44,0;70,5
Unité de soins d'un hôpital[p]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	8,0	5,9;10,6	7,2**	2,1;16,8
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	92,0	89,4;94,1	92,8	83,2;97,9
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	1,8**	0,8;3,5	4,5**	0,8;13,2
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	98,2	96,5;99,2	95,5	86,8;99,2
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	0,7**	0,2;1,7	-	;
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	99,3	98,3;99,8	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p, r]
85,8	67,3;96,0	81,2	71,9;88,4	95,9	85,7;99,5	85,9	79,2;91,0	76,6	57,0;90,3	80,9	59,5;94,1	68,8	59,4;78,3	Oui
14,2**	4,0;32,7	18,8*	11,6;28,1	4,1**	0,5;14,3	14,1*	9,0;20,8	23,4**	9,7;43,0	19,1**	5,9;40,5	31,2*	21,7;40,6	Non
														Médecin de famille[p]
13,3**	3,6;31,3	8,1**	3,4;15,8	6,4**	1,5;16,7	11,5*	6,7;17,9	14,9**	4,7;32,3	6,9**	0,7;24,6	12,7**	6,7;21,2	Oui
86,7	68,7;96,4	91,9	84,2;96,6	93,6	83,3;98,5	88,5	82,1;93,3	85,1	67,7;95,3	93,1	75,4;99,3	87,3	78,8;93,3	Non
														Médecin spécialiste[p]
19,6**	7,0;39,3	24,2*	16,5;33,4	23,2**	12,3;37,5	15,7*	10,5;22,2	19,4**	7,5;37,5	5,2**	0,7;17,5	14,0**	7,8;22,4	Oui
80,4	60,7;93,0	75,8	66,6;83,5	76,8	62,5;87,7	84,3	77,8;89,5	80,6	62,5;92,5	94,8	82,5;99,3	86,0	77,6;92,2	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
32,6**	16,5;52,3	17,9*	10,9;27,1	29,2*	16,8;44,4	38,1	29,6;46,7	29,9**	14,7;49,3	43,9*	26,6;62,3	12,0**	6,5;19,7	Oui
67,4	47,7;83,5	82,1	72,9;89,1	70,8	55,6;83,2	61,9	53,3;70,4	70,1	50,7;85,3	56,1*	37,7;73,4	88,0	80,3;93,5	Non
														Info-Santé[p]
14,2**	3,9;33,1	6,7**	2,7;13,3	2,0**	0,0;10,9	9,3**	5,0;15,5	5,9**	0,8;19,3	8,3**	1,8;21,9	9,3**	4,6;16,4	Oui
85,8	66,9;96,1	93,3	86,7;97,3	98,0	89,1;100,0	90,7	84,5;95,0	94,1	80,7;99,2	91,7	78,1;98,2	90,7	83,6;95,4	Non
														CLSC[p]
10,8**	2,1;29,6	28,2*	19,5;38,4	8,1**	2,1;20,2	20,5*	14,0;28,4	11,2**	2,8;27,5	14,8**	5,1;31,1	22,6*	15,0;31,9	Oui
89,2	70,4;97,9	71,8	61,6;80,5	91,9	79,8;97,9	79,5	71,6;86,0	88,8	72,5;97,2	85,2	68,9;94,9	77,4	68,1;85,0	Non
														Urgence d'un hôpital[p, r]
41,0*	22,7;61,3	13,0**	7,1;21,2	73,5	58,8;85,2	24,2	17,4;32,2	21,2**	8,6;39,6	33,5*	18,6;51,4	27,8*	19,3;37,7	Oui
59,0*	38,7;77,3	87,0	78,8;92,9	26,5*	14,8;41,2	75,8	67,8;82,6	78,8	60,4;91,4	66,5	48,6;81,4	72,2	62,3;80,7	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p]
17,2**	5,3;37,2	7,9**	3,6;14,8	10,7**	3,5;23,2	6,3**	2,9;11,6	6,0**	0,6;21,3	7,7**	1,3;22,4	8,0**	3,7;14,5	Oui
82,8	62,8;94,7	92,1	85,2;96,4	89,3	76,8;96,5	93,7	88,4;97,1	94,0	78,7;99,4	92,3	77,6;98,7	92,0	85,5;96,3	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
-	;	-	;	1,7**	0,0;10,3	5,0**	1,8;11,0	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	98,3	89,7;100,0	95,0	89,0;98,2	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autre contact
-	;	0,9**	0,0;5,0	2,5**	0,1;13,8	0,7**	0,0;3,9	-	;	-	;	0,7**	0,0;3,7	Oui
100,0	;	99,1	95,0;100,0	97,5	86,2;99,9	99,3	96,1;100,0	100,0	;	100,0	;	99,3	96,3;100,0	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	66,4	61,6;71,3	58,0	41,6;73,1
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	10,1	7,4;13,4	12,5**	5,5;23,2
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	23,5	19,1;27,8	29,6**	15,5;47,2
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	50,6	45,6;55,6	40,4*	25,9;56,3
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	11,5	8,6;15,1	16,1**	7,4;28,8
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	37,8	33,0;42,6	43,5*	28,6;59,4
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	47,1	42,2;52,0	43,4*	29,0;58,7
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	18,4	14,8;22,5	13,2**	5,3;25,9
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	34,4	29,9;39,0	43,4*	28,2;59,5
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	42,9	37,7;48,2	35,4*	21,8;50,9
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	16,4	12,6;20,8	15,1**	7,1;26,7
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	40,7	35,5;45,8	49,6	34,5;64,7
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	60,5	55,6;65,5	65,2	50,7;77,9
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	15,2	11,8;19,1	15,4**	7,8;26,2
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	24,3	20,2;28,5	19,4**	9,0;34,1
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	55,4	50,5;60,3	45,8*	31,4;60,7
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	19,2	15,4;23,5	22,4**	11,6;36,8
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	25,4	21,2;29,6	31,8*	18,1;48,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
80,7	57,2;94,6	57,9	44,4;71,5	79,7	64,9;90,3	72,4	63,8;79,8	58,6*	38,0;77,2	58,8*	36,3;78,9	63,4	50,0;75,4	Oui, tout à fait
9,5**	1,0;31,3	9,4**	3,1;20,6	7,2**	1,5;19,5	11,0**	6,1;18,0	24,5**	10,5;44,0	6,6**	0,7;22,7	4,2**	0,6;13,5	Oui, en partie
9,8**	1,1;31,9	32,7*	20,4;47,0	13,1**	4,9;26,5	16,6*	10,6;24,3	16,9**	4,9;37,7	34,5**	15,1;58,7	32,4*	20,5;46,2	Non
														La sexualité[p]
56,7*	33,0;78,3	75,4	65,8;83,5	55,0	38,7;70,5	40,8	31,2;50,4	51,4*	27,5;74,9	35,2**	17,2;56,9	33,8*	20,9;48,8	Oui, tout à fait
8,9**	0,9;30,1	12,4**	6,4;20,9	12,2**	4,2;25,9	12,5**	6,6;20,7	4,6**	0,1;23,8	7,0**	0,7;24,3	9,7**	2,5;23,6	Oui, en partie
34,4**	14,6;59,3	12,2**	6,4;20,4	32,9*	19,7;48,3	46,8	37,1;56,4	43,9**	21,3;68,6	57,8*	35,8;77,8	56,5	41,4;70,9	Non
														Les émotions[p]
49,8*	28,3;71,4	47,6	35,1;60,0	46,3*	30,8;62,4	56,9	47,7;66,0	46,9*	25,9;68,8	44,0*	24,0;65,6	34,7*	22,8;48,2	Oui, tout à fait
19,6**	6,4;40,6	19,0**	9,9;31,5	27,0*	14,8;42,5	16,6*	10,4;24,6	26,1**	10,5;47,8	15,4**	4,4;34,8	17,9**	8,8;30,5	Oui, en partie
30,6**	12,7;54,2	33,4*	21,7;47,0	26,7*	14,6;41,9	26,5*	18,8;35,5	27,0**	11,1;48,8	40,6**	20,6;63,2	47,4	35,5;59,3	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
42,5**	19,4;68,2	61,6	48,8;73,3	38,8*	23,5;55,9	46,1	36,3;55,8	39,9**	19,4;63,4	47,8*	26,1;70,2	25,8*	15,5;38,6	Oui, tout à fait
4,9**	0,1;25,5	13,2**	6,4;23,2	30,6*	16,8;47,5	15,1*	8,7;23,7	17,2**	4,5;39,7	12,0**	2,4;31,8	19,2**	9,8;32,1	Oui, en partie
52,7*	28,0;76,4	25,2*	15,2;37,6	30,6*	16,8;47,5	38,8	29,4;48,3	42,9**	21,9;66,0	40,2**	18,8;64,8	54,9	41,6;68,3	Non
														Les besoins alimentaires[p]
64,0*	41,5;82,8	59,6	47,7;71,6	67,9	51,3;81,8	62,7	54,0;71,4	66,9	45,5;84,2	67,4	44,3;85,7	42,7	30,6;54,7	Oui, tout à fait
7,6**	0,9;24,9	13,2**	6,0;24,1	18,3**	7,7;34,2	11,5**	6,2;18,8	20,2**	7,9;38,7	13,8**	3,5;33,1	21,2*	12,2;32,9	Oui, en partie
28,4**	12,2;50,1	27,1*	16,8;39,6	13,8**	5,9;25,8	25,9*	18,2;34,8	12,9**	2,5;34,3	18,7**	4,9;42,7	36,2*	24,4;49,3	Non
														Les activités courantes[p]
50,6*	27,6;73,4	58,5	46,9;70,1	61,3	44,2;76,5	61,4	52,6;70,1	52,5*	31,3;73,1	64,8*	41,8;83,7	47,0	35,3;58,6	Oui, tout à fait
26,5**	9,6;50,8	17,6**	9,7;28,2	20,3**	9,4;35,6	16,3*	9,6;25,2	30,4**	13,5;52,3	10,6**	2,1;28,6	18,8**	10,3;30,2	Oui, en partie
22,8**	7,9;45,5	23,8*	14,5;35,5	18,5**	7,5;35,1	22,3*	15,4;30,5	17,1**	4,6;39,1	24,6**	7,6;50,6	34,2*	23,7;46,0	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	90,8	87,9;93,3	90,8	80,2;96,8
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	7,9*	5,6;10,6	8,0**	2,4;18,5
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	1,3**	0,5;2,7	1,3**	0,0;6,9
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	74,6	70,8;78,3	75,2	62,7;85,3
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	20,9	17,4;24,4	19,6**	10,2;32,4
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	1,8**	0,8;3,5	2,8**	0,3;9,9
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	2,7**	1,5;4,6	2,4**	0,3;8,5
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	72,5	68,5;76,5	73,8	58,9;85,6
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	16,9	13,6;20,7	16,2**	6,3;31,5
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	10,6	8,0;13,7	10,0**	3,5;21,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
83,6	64,7;94,8	97,0	91,1;99,4	92,3	80,8;98,0	90,1	83,3;94,8	84,6	68,0;94,7	91,1	79,3;97,4	89,1	80,4;94,9	Oui, tout à fait
16,4**	5,2;35,3	3,0**	0,6;8,9	7,7**	2,0;19,2	9,0**	4,5;15,6	11,8**	3,3;27,5	8,9**	2,6;20,7	7,4**	2,8;15,3	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	0,9**	0,0;5,0	3,6**	0,1;17,4	-	;	3,5**	0,7;10,0	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
69,7	48,5;86,1	81,5	71,7;89,1	69,1	54,7;81,2	75,5	67,3;82,6	70,0	50,9;85,1	64,4	45,4;80,6	75,2	65,3;83,5	Toujours
20,5**	7,5;40,5	15,4**	8,4;25,0	28,9*	17,4;42,9	20,3*	13,7;28,5	26,7**	12,2;45,9	32,3**	16,8;51,3	18,1*	11,3;26,8	La plupart du temps
-	;	0,9**	0,0;5,0	2,0**	0,1;10,5	2,1**	0,4;6,4	-	;	3,3**	0,1;16,2	2,3**	0,2;8,5	À l'occasion
9,8**	1,9;26,7	2,2**	0,2;7,8	-	;	2,0**	0,4;5,6	3,3**	0,1;18,0	-	;	4,4**	1,0;11,6	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
69,1	47,6;85,9	81,1	71,8;88,4	71,6	56,0;84,2	72,3	64,3;79,4	66,6	48,4;81,8	61,2	42,2;78,1	70,7	59,6;80,2	Oui, tout à fait
23,4**	8,9;44,5	10,4**	5,0;18,5	14,9**	6,2;28,4	17,7*	11,9;24,8	23,3**	10,5;41,0	26,4**	11,9;45,9	16,7**	9,1;27,1	Oui, en partie
7,5**	0,7;26,1	8,5**	3,7;16,1	13,4**	4,7;28,0	10,0**	5,6;16,2	10,1**	2,1;27,1	12,4**	4,2;26,6	12,6**	5,9;22,7	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	84,2	80,7;87,2	89,8	79,4;96,0
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	10,2	7,7;13,3	4,4**	0,8;12,8
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	5,6*	3,9;7,8	5,8**	1,5;14,7
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	91,0	87,7;93,6	96,5	87,4;99,6
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	8,4*	5,9;11,6	3,5**	0,4;12,6
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	0,6**	0,1;1,7	-	;
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	82,4	76,6;87,2	83,8	68,8;93,4
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	12,6*	8,4;18,0	9,6**	2,5;23,6
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	5,0**	2,5;8,7	6,6**	1,2;19,1
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	73,8	68,9;78,7	59,8*	34,9;81,4
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	14,1	10,3;18,8	15,0**	2,9;39,0
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	12,0*	8,6;16,2	25,3**	8,8;49,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
71,2	48,1;88,3	76,4	67,1;84,2	70,6	55,8;82,8	89,3	82,8;93,9	87,4	66,0;97,6	85,3	68,9;95,1	89,3	81,3;94,7	Aucun report
24,4**	8,7;47,5	14,2*	8,1;22,5	11,8**	4,6;23,5	7,4**	3,6;13,1	6,7**	0,2;31,0	12,4**	3,5;28,6	9,7**	4,6;17,5	Un report
4,3**	0,2;19,9	9,4**	4,5;16,8	17,6**	8,0;31,5	3,4**	1,0;8,0	5,9**	0,7;20,1	2,3**	0,0;12,8	1,0**	0,0;5,7	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
95,7	77,8;99,9	80,3	68,6;89,2	88,1	61,4;98,8	93,9	88,3;97,4	84,9	61,9;96,7	97,0	84,0;99,9	90,4	82,4;95,6	Aucun report
4,3**	0,1;22,2	18,4**	9,8;30,0	11,9**	1,2;38,6	5,4**	2,1;10,9	15,1**	3,3;38,1	3,0**	0,1;16,0	8,7**	3,8;16,5	Un report
-	;	1,3**	0,0;7,7	-	;	0,7**	0,0;3,9	-	;	-	;	0,9**	0,0;4,7	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
83,1	49,7;98,1	100,0	;	75,6	59,1;87,9	82,1	71,2;90,2	77,9**	22,1;99,6	87,6	66,1;97,7	86,7	69,3;96,3	Aucun report
16,9**	1,9;50,3	-	;	17,6**	7,1;33,5	12,7**	6,1;22,6	22,1**	0,4;77,9	7,5**	0,8;26,1	10,1**	2,1;27,1	Un report
-	;	-	;	6,8**	1,4;18,8	5,2**	1,3;13,1	-	;	4,9**	0,1;26,9	3,2**	0,1;16,7	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
68,1*	29,3;94,0	51,9	38,2;65,6	81,8	62,3;93,9	79,7	71,9;86,2	92,3	75,1;99,0	86,9*	41,2;99,8	77,5	56,1;91,8	Aucun report
31,9**	6,0;70,7	18,9**	9,1;32,6	10,7**	2,3;27,9	15,3*	9,4;23,0	3,9**	0,1;20,0	13,1**	0,2;58,8	6,1**	0,8;20,3	Un report
-	;	29,2*	17,4;43,5	7,5**	0,8;25,4	5,0**	1,9;10,5	3,9**	0,1;19,6	-	;	16,4**	4,6;37,0	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	6,0*	4,2;8,3	3,8**	0,7;11,2
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	6,0*	4,1;8,4	7,6**	2,5;17,2
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	88,0	85,0;90,6	88,6	78,2;95,1
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	37,0	33,2;40,8	55,2	41,9;68,6
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	6,3*	4,4;8,5	4,5**	0,9;13,0
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	56,7	52,9;60,5	40,3*	26,9;53,6
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	50,1	46,2;53,9	54,3	40,6;67,9
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	2,3**	1,2;4,0	3,0**	0,3;11,0
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	47,6	43,6;51,6	42,8*	29,1;56,4
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	12,8	10,2;15,5	10,7**	4,7;20,0
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	6,6*	4,7;9,0	7,2**	2,4;16,1
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	80,6	76,9;83,8	82,0	71,3;90,0
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	14,2	11,3;17,5	16,4**	7,2;30,1
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	5,3*	3,6;7,5	9,4**	3,5;19,4
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	80,5	76,8;83,8	74,1	59,7;85,5
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	37,7	33,5;42,0	37,0*	24,3;51,2
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	5,5*	3,8;7,7	4,4**	0,8;12,9
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	56,8	52,4;61,1	58,6	45,8;71,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
10,1**	2,2;26,6	-	;	4,0**	0,4;14,3	10,0*	5,7;16,1	10,1**	1,9;27,8	7,8**	1,4;22,4	5,8**	2,0;12,8	Oui
3,2**	0,1;16,7	6,5**	2,3;14,2	7,6**	1,6;20,6	5,7**	2,5;10,8	5,4**	0,1;26,5	8,3**	1,8;22,1	4,3**	1,2;10,5	Non, mais il aurait souhaité le consulter
86,7	69,1;96,3	93,5	85,8;97,7	88,5	74,8;96,2	84,3	77,5;89,7	84,5	64,4;95,8	83,9	67,5;94,1	89,9	82,2;95,1	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
41,4*	23,2;61,5	26,8*	18,1;36,9	59,6	46,0;73,2	29,4	22,6;37,1	64,0	45,8;79,6	42,1*	25,4;60,2	23,7*	16,3;32,4	Oui
10,9**	2,5;27,7	5,5**	1,8;12,5	5,5**	1,2;14,9	6,4**	3,1;11,4	2,6**	0,1;13,7	5,5**	0,7;18,2	8,3**	3,6;15,8	Non, mais il aurait souhaité le consulter
47,7*	28,1;67,9	67,7	58,1;77,3	35,0*	22,1;49,6	64,2	56,8;71,6	33,4*	18,2;51,7	52,4*	34,0;70,3	68,0	59,1;76,9	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
54,8*	34,3;74,2	34,2	24,4;43,9	75,6	60,9;87,0	55,6	48,1;63,2	55,1*	37,1;72,1	54,1*	34,4;72,8	40,2	30,3;50,0	Oui
-	;	2,1**	0,3;7,3	1,9**	0,0;10,6	1,3**	0,1;5,0	8,0**	1,7;21,3	-	;	3,2**	0,6;9,4	Non, mais il aurait souhaité le consulter
45,2*	25,8;65,7	63,7	53,8;73,6	22,5**	11,6;37,0	43,0	35,3;50,7	37,0*	21,1;55,3	45,9*	27,2;65,6	56,6	46,5;66,8	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
17,7**	6,4;35,7	0,9**	0,0;4,8	28,8*	16,9;43,3	20,2*	14,2;27,3	-	;	11,4**	2,7;28,5	11,8**	6,3;19,6	Oui
7,3**	1,0;23,0	5,2**	1,6;12,1	9,5**	3,2;20,7	5,4**	2,4;10,0	12,5**	3,4;29,1	5,1**	0,6;17,4	6,4**	2,2;14,0	Non, mais il aurait souhaité le consulter
75,0	56,5;88,5	93,9	86,7;97,9	61,8	46,9;75,2	74,5	66,9;81,1	87,5	70,9;96,6	83,6	65,8;94,4	81,8	72,6;89,0	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
17,5**	5,7;36,9	4,5**	1,3;11,0	10,3**	3,4;22,5	19,0*	12,3;27,2	10,4**	2,7;25,2	23,8**	9,3;44,7	14,9*	8,9;22,7	Oui
-	;	5,4**	1,7;12,3	9,8**	3,1;21,8	4,7**	2,0;9,1	3,3**	0,1;17,1	2,6**	0,0;15,1	4,6**	1,4;11,0	Non, mais il aurait souhaité le consulter
82,5	63,1;94,3	90,2	82,1;95,4	79,9	65,8;90,1	76,3	67,9;83,5	86,2	69,9;95,7	73,6	53,0;88,7	80,5	71,8;87,4	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
39,0*	21,7;58,6	48,4	38,2;58,5	15,2**	6,5;28,4	48,4	40,3;56,6	26,2**	12,3;44,7	38,4*	22,7;56,1	28,2*	19,9;37,9	Oui
10,3**	2,3;26,8	1,9**	0,2;6,9	3,6**	0,4;12,8	2,8**	0,7;7,5	10,0**	2,4;25,4	12,2**	3,7;27,7	8,5**	3,7;16,1	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
50,7*	31,3;69,9	49,7	39,5;59,9	81,3	67,8;90,9	48,8	40,5;57,1	63,8	45,4;79,7	49,4*	32,0;66,9	63,2	53,6;72,9	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	9,1	6,8;11,9	8,3**	2,8;18,2
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	11,2	8,6;14,3	9,0**	3,3;18,5
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	79,7	76,3;83,0	82,8	70,9;91,2
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	6,9*	5,0;9,3	2,7**	0,3;9,8
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	8,6	6,3;11,5	11,3**	5,0;21,1
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	84,4	81,2;87,3	85,9	75,5;93,1
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	11,2	8,7;13,7	10,2**	3,0;23,3
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	12,1	9,5;14,6	15,6**	7,5;27,3
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	76,7	73,5;80,0	74,3	60,0;85,5
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	11,8	9,3;14,7	13,1**	4,9;26,5
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	3,1*	1,9;4,8	5,2**	1,4;12,8
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	85,1	81,9;88,0	81,7	68,3;91,1
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	9,9	7,6;12,7	8,2**	2,6;18,6
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	11,3	8,8;13,8	11,9**	5,2;22,4
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	78,8	75,4;82,1	79,8	67,3;89,2
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	9,2	6,9;12,0	12,5**	5,5;23,4
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	5,3*	3,5;7,6	10,2**	3,3;22,6
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	85,5	82,3;88,4	77,3	63,7;87,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
6,3**	0,8;20,9	1,0**	0,0;5,4	5,2**	1,1;14,5	17,1*	11,2;24,4	2,8**	0,1;14,6	8,6**	0,9;29,4	11,4**	5,6;20,2	Oui
13,4**	4,1;29,9	4,2**	1,1;10,5	20,7**	10,4;34,8	13,3*	8,2;20,0	11,6**	3,2;27,4	14,9**	5,2;30,8	9,8**	4,6;17,8	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
80,2	62,2;92,2	94,8	88,3;98,3	74,0	59,9;85,3	69,7	62,2;77,1	85,5	69,1;95,2	76,5	57,4;90,0	78,7	69,3;86,4	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
12,6**	3,7;28,6	3,2**	0,7;8,9	6,1**	1,1;17,4	17,7*	11,7;25,0	3,1**	0,0;17,4	2,1**	0,1;10,9	0,8**	0,0;4,1	Oui
3,0**	0,1;16,5	6,4**	2,4;13,3	12,9**	5,6;24,3	3,3**	1,1;7,4	14,7**	4,8;31,3	19,4**	6,6;39,7	9,9**	4,6;18,1	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
84,4	67,5;94,7	90,4	82,7;95,5	81,0	67,0;90,9	79,1	71,3;85,5	82,3	63,7;93,9	78,5	58,5;91,8	89,3	81,1;94,8	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
12,7**	3,4;30,0	6,7**	2,9;12,9	12,4**	5,1;24,0	16,4*	10,9;23,2	12,9**	3,9;28,8	7,5**	1,4;21,1	9,2**	4,6;16,0	Oui
12,8**	3,7;29,4	11,1**	5,6;19,2	14,4**	5,8;27,9	9,3**	4,8;15,9	15,8**	5,6;32,4	23,4**	10,8;40,7	8,5**	3,9;15,7	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
74,5	55,1;88,7	82,1	73,4;89,0	73,1	58,8;84,6	74,3	66,6;81,1	71,3	52,9;85,7	69,1	50,5;84,1	82,3	74,0;88,8	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
13,9**	3,7;32,5	8,1**	3,7;15,1	14,4**	5,9;27,7	16,1*	10,4;23,2	12,3**	3,8;27,4	14,3**	5,0;29,6	6,4**	2,7;12,6	Oui
3,6**	0,1;19,0	1,8**	0,2;6,7	3,8**	0,3;14,8	1,4**	0,2;4,8	6,3**	0,7;21,1	-	;	4,8**	1,5;11,4	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
82,5	62,9;94,4	90,1	82,5;95,2	81,8	67,7;91,6	82,5	75,4;88,3	81,4	64,5;92,5	85,7	70,4;95,0	88,7	81,1;94,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
16,8**	5,9;34,6	5,4**	1,8;12,1	10,8**	3,6;23,4	10,0*	5,7;15,9	3,2**	0,1;17,5	27,3**	12,5;47,1	9,3**	4,4;16,8	Oui
16,4**	5,6;34,0	6,5**	2,3;14,0	11,1**	4,4;21,9	16,3*	10,7;23,3	14,8**	5,1;30,9	13,3**	4,1;29,5	6,3**	2,6;12,5	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
66,8	48,0;82,3	88,1	79,7;93,9	78,1	64,5;88,4	73,8	65,8;80,7	82,0	65,4;92,9	59,4*	39,4;77,3	84,3	76,2;90,5	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
7,6**	0,8;25,9	5,2**	1,6;12,1	7,6**	2,1;18,5	11,2*	6,3;17,9	8,1**	1,7;22,2	7,9**	1,6;21,4	10,2**	5,2;17,7	Oui
10,8**	2,2;28,5	1,9**	0,2;7,1	5,8**	1,1;16,8	4,2**	1,6;8,6	8,6**	1,8;23,3	4,9**	0,5;17,6	4,2**	1,2;10,0	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
81,7	62,4;93,7	92,9	85,1;97,4	86,5	73,9;94,5	84,7	77,6;90,2	83,2	66,9;93,6	87,2	72,2;95,9	85,6	77,5;91,6	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	6,4*	4,6;8,7	5,1**	1,3;12,8
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	93,6	91,3;95,4	94,9	87,2;98,7
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	19,1**	8,2;35,1	-	;
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	80,9	64,9;91,8	100,0	;
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	16,2**	5,8;33,1	-	;
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	83,8	66,9;94,2	100,0	;
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	17,4**	6,8;33,6	41,3**	1,0;96,1
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	82,6	66,4;93,2	58,7**	3,9;99,0
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	14,0**	4,5;30,3	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	86,0	69,7;95,5	100,0	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	37,5*	21,7;55,5	41,3**	1,0;96,1
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	62,5	44,5;78,3	58,7**	3,9;99,0
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	16,1**	5,6;33,0	58,7**	3,9;99,0
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	83,9	67,0;94,4	41,3**	1,0;96,1
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	44,8*	27,6;62,9	41,3**	1,0;96,1
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	55,2*	37,1;72,4	58,7**	3,9;99,0
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	46,9*	29,9;64,4	29,3**	0,1;94,1
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	53,1*	35,6;70,1	70,7**	5,9;99,9
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[r]													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	8,7**	1,7;23,7	41,3**	1,0;96,1
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	91,3	76,3;98,3	58,7**	3,9;99,0
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	13,5**	4,4;29,1	-	;
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	86,5	70,9;95,6	100,0	;
Autres services ou ressources[r]													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	7,4**	1,1;23,1	-	;
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	92,6	76,9;98,9	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]
7,6**	0,8;25,9	3,9**	1,1;9,4	9,7**	2,9;22,4	10,7*	6,2;17,0	2,0**	0,0;11,2	9,8**	2,3;25,1	3,2**	0,9;8,0	Oui
92,4	74,1;99,2	96,1	90,6;98,9	90,3	77,6;97,1	89,3	83,0;93,8	98,0	88,8;100,0	90,2	74,9;97,7	96,8	92,0;99,1	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	-	;	33,9**	1,6;87,4	17,7**	3,4;45,1	-	;	52,7**	4,6;96,8	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	66,1**	12,6;98,4	82,3	54,9;96,6	100,0	;	47,3**	3,2;95,4	100,0	;	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	-	;	36,2**	2,5;87,0	18,1**	3,6;45,3	-	;	23,7**	0,1;89,7	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	63,8**	13,0;97,5	81,9	54,7;96,4	100,0	;	76,3**	10,3;99,9	100,0	;	Non
														Psychologue
-	;	-	;	19,2**	0,1;78,9	18,9**	3,9;46,8	-	;	23,7**	0,2;84,7	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	80,8**	21,1;99,9	81,1	53,2;96,1	100,0	;	76,3**	15,3;99,8	100,0	;	Non
														Travailleur social
-	;	-	;	19,2**	0,1;78,9	18,5**	3,4;47,5	-	;	23,7**	0,2;84,7	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	80,8**	21,1;99,9	81,5	52,5;96,6	100,0	;	76,3**	15,3;99,8	100,0	;	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
100,0	;	38,1**	0,6;95,8	-	;	36,0**	14,1;63,3	-	;	100,0	;	-	;	Oui
-	;	61,9**	4,2;99,4	100,0	;	64,0*	36,7;85,9	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
														Médicaments
-	;	38,1**	0,6;95,8	-	;	12,6**	1,2;40,9	100,0	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	61,9**	4,2;99,4	100,0	;	87,4	59,1;98,8	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Services de transport
-	;	68,4**	4,8;99,9	63,8**	11,1;98,0	37,8**	15,4;64,9	-	;	52,7**	4,6;96,8	43,9**	0,2;99,1	Oui
100,0	;	31,6**	0,1;95,2	36,2**	2,0;88,9	62,2*	35,1;84,6	100,0	;	47,3**	3,2;95,4	56,1**	0,9;99,8	Non
														Services d'aide à domicile
100,0	;	38,1**	0,6;95,8	39,2**	3,2;88,9	48,5**	22,9;74,7	100,0	;	47,3**	3,4;95,2	43,9**	0,2;99,1	Oui
-	;	61,9**	4,2;99,4	60,8**	11,1;96,8	51,5*	25,3;77,1	-	;	52,7**	4,8;96,6	56,1**	0,9;99,8	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[r]
-	;	-	;	17,0**	0,1;72,9	6,7**	0,1;34,4	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	83,0*	27,1;99,9	93,3	65,6;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Soins infirmiers à domicile
-	;	31,6**	0,1;95,2	36,2**	2,5;87,0	11,8**	1,5;36,3	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	68,4**	4,8;99,9	63,8**	13,0;97,5	88,2	63,7;98,5	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autres services ou ressources[r]
-	;	-	;	-	;	8,4**	0,1;41,3	-	;	-	;	56,1**	0,9;99,8	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	91,6	58,7;99,9	100,0	;	100,0	;	43,9**	0,2;99,1	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	99,0	97,7;99,6	100,0	;
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	1,0**	0,4;2,3	-	;
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	42,5	38,0;47,0	41,1*	26,6;56,7
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	6,9*	4,9;9,4	10,0**	2,4;25,2
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	30,3	26,4;34,2	35,9*	22,4;51,2
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	20,3	16,9;23,7	13,0**	5,6;24,6
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	32,7	28,5;37,0	25,6**	13,7;40,9
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	18,3	14,9;22,0	29,1*	17,1;43,8
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	27,2	23,3;31,1	32,8*	20,6;47,1
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	21,8	18,1;25,4	12,5**	5,2;24,0
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	4,6*	3,0;6,6	3,7**	0,4;13,7
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	4,3*	2,7;6,3	1,3**	0,0;7,5
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	14,2	11,4;17,4	17,9**	9,5;29,4
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	13,7	10,6;17,2	11,2**	3,9;23,9
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	48,6	44,3;52,9	44,5*	30,3;59,3
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	14,7	11,8;18,0	21,3**	10,5;36,3
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	1,0**	0,3;2,1	1,3**	0,0;7,3
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	4,0*	2,4;6,2	3,0**	0,3;10,7
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	95,0	92,7;96,8	95,7	87,2;99,2
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	89,5	86,5;92,0	93,8	84,4;98,4
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	8,8	6,4;11,8	4,7**	0,9;13,6
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	1,7**	0,8;3,1	1,5**	0,0;8,1

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
100,0	;	99,1	94,9;100,0	98,1	89,8;99,9	100,0	;	97,5	85,4;100,0	97,5	86,2;100,0	98,2	93,7;99,8	Oui
-	;	0,9**	0,0;5,1	1,9**	0,1;10,2	-	;	2,5**	0,0;14,6	2,5**	0,0;13,8	1,8**	0,2;6,3	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
36,9**	19,1;57,8	46,1	36,0;56,3	79,0	64,5;89,6	38,6	29,9;47,2	23,8**	10,8;41,7	39,9*	23,4;58,2	37,6	28,0;47,2	Médecin spécialiste du cancer
6,5**	0,8;21,9	6,3**	2,4;13,1	2,0**	0,1;10,7	5,6**	2,5;10,8	8,8**	1,6;25,0	17,5**	6,6;34,4	5,5**	1,8;12,2	Médecin de famille
32,0**	16,0;51,8	25,8*	17,6;35,4	-	;	31,6	23,5;39,6	38,8*	21,4;58,5	20,1**	8,8;36,4	43,0	33,0;53,0	Autre médecin spécialiste
24,5**	10,2;44,7	21,8*	14,6;30,6	19,0**	8,8;33,5	24,2*	17,2;32,4	28,6**	13,7;48,0	22,6**	8,9;42,6	13,9**	7,4;23,1	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
27,1**	11,5;48,1	41,1	31,2;51,0	74,5	60,0;85,9	28,5	21,1;36,9	19,9**	8,2;37,3	26,5**	13,1;44,0	24,4*	16,1;34,4	Médecin spécialiste du cancer
14,1**	4,1;31,6	15,7*	9,4;24,1	2,0**	0,1;10,7	19,7*	13,2;27,6	16,8**	6,3;33,3	27,1**	13,1;45,5	18,3*	10,6;28,5	Médecin de famille
29,7**	14,2;49,6	22,1*	14,4;31,6	-	;	26,8	19,6;35,0	41,7*	24,5;60,6	17,8**	7,4;33,3	38,7	28,1;49,3	Autre médecin spécialiste
29,2**	13,2;50,0	21,1*	14,1;29,6	23,5**	12,5;37,9	25,1*	17,9;33,4	21,5**	9,4;38,9	28,6**	13,9;47,5	18,6*	10,6;29,1	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
3,6**	0,1;18,4	6,9**	2,9;13,5	2,1**	0,1;11,1	3,6**	1,1;8,4	5,8**	0,7;19,2	5,9**	0,6;21,2	4,5**	1,4;10,4	Au besoin
11,2**	2,3;29,7	-	;	10,2**	3,4;22,4	1,2**	0,2;4,2	-	;	8,9**	2,0;23,0	9,6**	4,5;17,4	À tous les mois
15,7**	4,8;34,4	6,9**	3,0;13,4	30,6*	18,1;45,5	8,3**	4,1;14,7	20,2**	8,0;38,4	10,4**	2,4;26,4	18,8*	11,7;27,9	À tous les 2 ou 3 mois
5,1**	0,1;25,3	10,4**	4,9;18,8	8,6**	2,3;20,9	21,8*	15,1;29,8	21,1**	9,3;37,9	14,5**	3,5;35,1	9,1**	4,1;17,1	À tous les 4 mois
55,7*	34,6;75,4	50,8	40,9;60,6	46,5*	31,6;61,9	54,6	45,8;63,3	35,6*	20,8;52,6	52,9*	33,9;71,2	43,3	33,5;53,1	À tous les 6 mois
8,7**	0,9;29,5	25,0*	16,6;35,2	2,1**	0,1;11,0	10,5*	6,1;16,6	17,4**	6,0;35,9	7,5**	1,3;21,9	14,7*	8,3;23,4	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	-	;	2,4**	0,0;13,1	1,5**	0,2;5,1	-	;	-	;	1,3**	0,0;6,4	Trop long
4,4**	0,2;20,8	5,5**	1,8;12,4	4,2**	0,5;14,1	4,3**	1,6;9,0	-	;	2,8**	0,0;16,4	4,2**	0,9;11,9	Trop court
95,6	79,2;99,8	94,5	87,6;98,2	93,5	81,7;98,7	94,2	89,0;97,4	100,0	;	97,2	83,6;100,0	94,5	86,8;98,4	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
89,1	70,4;97,9	96,8	90,9;99,3	83,4	68,8;93,0	85,5	78,2;91,1	88,4	73,6;96,5	82,0	63,8;93,5	90,6	81,4;96,2	Tout à fait capable
7,1**	0,9;23,3	1,9**	0,2;6,8	16,6**	7,0;31,2	12,3*	7,0;19,6	8,5**	1,7;23,2	12,4**	3,2;30,0	9,4**	3,8;18,6	En partie capable
3,8**	0,1;20,0	1,3**	0,0;6,7	-	;	2,1**	0,4;6,0	3,1**	0,1;16,9	5,6**	0,5;20,4	-	;	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	57,8	53,4;62,1	47,8	34,6;61,1
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	14,8	11,7;18,4	19,9**	9,6;34,4
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	27,4	23,5;31,4	32,3*	19,3;47,5
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	52,5	43,0;62,0	34,9**	9,3;69,4
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	47,5	38,0;57,0	65,1*	30,6;90,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
41,9*	22,3;63,5	65,5	56,3;74,6	58,3	42,5;73,0	54,4	45,9;62,9	64,6	45,5;80,8	46,0*	27,1;65,9	65,6	55,4;75,8	Oui, tout à fait
28,3**	12,4;49,5	8,3**	3,5;16,1	20,1**	9,1;35,7	16,9*	11,0;24,2	18,2**	6,7;36,3	20,8**	8,9;38,1	6,8**	2,7;13,6	oui, en partie
29,8**	13,2;51,5	26,3*	18,3;35,6	21,6**	11,3;35,5	28,7	21,1;37,3	17,2**	6,1;35,0	33,1**	17,3;52,4	27,6*	18,3;38,6	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
56,1**	19,2;88,5	31,3**	4,2;74,3	48,6**	20,9;77,0	64,8	46,9;80,2	60,8**	10,7;97,0	29,3**	4,9;68,6	65,7*	36,6;88,0	Oui
43,9**	11,5;80,8	68,7**	25,7;95,8	51,4**	23,0;79,1	35,2*	19,8;53,1	39,2**	3,0;89,3	70,7*	31,4;95,1	34,3**	12,0;63,4	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	21,0	17,7;24,2	23,3*	14,3;34,5
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	47,9	43,5;52,3	44,0	31,5;56,5
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	31,1	27,2;35,1	32,7*	20,5;46,8
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	23,1	19,7;26,5	22,3*	12,7;34,8
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	42,2	38,0;46,3	51,9	38,7;65,1
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	34,7	30,6;38,8	25,8*	14,7;39,7
Modification de l'alimentation[p, r]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	41,5	37,5;45,5	61,9	47,7;74,8
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	27,8	24,1;31,5	15,7**	7,0;28,7
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	30,7	26,6;34,8	22,4**	12,1;36,0
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	13,3	10,7;16,4	9,7**	3,1;21,5
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	11,0	8,6;13,8	9,2**	3,7;18,2
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	75,7	72,2;79,1	81,1	69,2;90,0
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	1,1**	0,4;2,3	1,4**	0,0;8,0
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	2,4**	1,3;4,2	-	;
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	96,5	94,5;97,9	98,6	92,0;100,0
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	6,4*	4,6;8,7	11,0**	4,4;21,6
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	10,6	8,2;12,9	9,7**	4,5;17,7
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	83,0	80,0;86,0	79,3	68,0;88,1
Gestion du stress[p]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	34,1	30,1;38,2	37,7*	25,0;51,8
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	22,4	18,9;25,9	17,0**	8,1;29,8
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	43,5	39,3;47,6	45,3	32,5;58,1

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p]
13,7**	4,0;31,2	11,8**	6,3;19,7	26,2*	14,8;40,5	30,4	23,0;37,9	15,2**	5,2;32,0	33,6*	19,2;50,7	14,5*	8,5;22,4	Oui
56,4*	36,7;74,7	53,3	43,4;63,1	39,4*	25,4;54,8	41,8	33,5;50,1	61,2	42,3;77,9	47,2*	29,7;65,2	49,6	39,7;59,5	Non
29,9**	15,6;47,8	34,9	25,7;44,1	34,5*	20,3;50,9	27,8	20,5;36,0	23,6**	11,0;40,8	19,2**	8,2;35,3	35,9	26,4;45,4	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
23,2**	10,3;41,3	18,2*	11,1;27,2	27,5*	15,1;43,2	26,8	19,7;34,8	27,3**	13,4;45,5	32,2**	16,3;51,8	17,7*	11,4;25,6	Oui
38,5*	21,2;58,2	48,1	38,6;57,7	36,7*	22,9;52,2	31,4	24,0;38,9	38,8*	22,8;56,8	36,5*	19,5;56,3	50,2	40,6;59,8	Non
38,3*	20,6;58,6	33,7	24,3;43,0	35,8*	22,2;51,4	41,8	33,5;50,1	33,9*	18,7;52,0	31,3**	16,1;50,2	32,1	23,8;40,4	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p, r]
38,7*	21,3;58,6	29,9	21,3;39,6	44,5*	29,5;60,2	44,8	36,4;53,3	44,0*	26,1;63,1	45,8*	28,8;63,5	34,2	25,8;42,7	Oui
23,0**	9,4;42,6	37,1	27,5;46,8	24,0**	13,0;38,2	20,5*	14,2;28,0	18,0**	6,8;35,4	30,0**	15,1;48,7	39,8	30,2;49,4	Non
38,2*	21,3;57,6	33,0	23,7;42,3	31,5*	18,5;47,1	34,7	27,0;42,4	38,0*	21,3;57,2	24,3**	10,6;43,3	26,0*	17,6;35,9	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
13,4**	4,0;30,3	4,6**	1,5;10,5	11,1**	4,0;22,9	10,5*	6,1;16,5	21,4**	9,7;38,0	53,3*	35,1;70,9	12,7*	7,2;20,3	Oui
8,0**	1,0;25,9	12,1**	6,5;20,1	12,6**	4,5;26,0	8,2**	4,3;13,8	10,4**	2,1;28,1	7,4**	1,5;20,6	15,6*	9,1;24,3	Non
78,5	59,3;91,6	83,3	74,5;90,0	76,4	61,8;87,5	81,4	74,5;87,1	68,1	50,4;82,7	39,2*	22,9;57,5	71,6	62,1;79,9	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	-	;	2,2**	0,0;11,8	0,7**	0,0;3,7	2,9**	0,0;16,6	2,0**	0,0;11,6	1,6**	0,1;6,2	Oui
3,6**	0,1;18,5	0,9**	0,0;5,0	-	;	1,5**	0,2;5,5	3,1**	0,1;16,1	-	;	7,5**	3,2;14,3	Non
96,4	81,5;99,9	99,1	95,0;100,0	97,8	88,2;100,0	97,8	93,7;99,5	94,0	78,8;99,4	98,0	88,4;100,0	91,0	83,7;95,7	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
6,4**	0,8;21,3	5,5**	1,8;12,4	13,6**	5,8;25,6	3,8**	1,4;8,3	2,9**	0,0;16,6	9,0**	2,2;22,6	5,1**	2,1;10,3	Oui
11,2**	2,4;29,4	15,5*	9,2;23,8	3,7**	0,4;13,2	7,5**	3,9;12,9	6,1**	0,8;20,2	7,6**	1,4;21,4	15,1*	9,2;22,9	Non
82,4	63,1;94,2	79,0	69,6;86,5	82,7	70,3;91,5	88,7	82,7;93,1	91,0	75,3;98,2	83,4	67,2;93,7	79,8	71,4;86,6	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p]
29,9**	14,4;49,7	15,4*	8,9;24,0	49,8	36,0;63,7	42,6	34,4;50,9	40,5*	24,4;58,4	64,3	44,6;81,0	21,9*	14,6;30,6	Oui
22,7**	9,2;42,3	27,6*	19,0;37,7	17,7**	8,5;30,7	24,0	17,5;31,5	15,2**	5,0;32,5	9,9**	2,4;25,1	26,7*	18,5;36,4	Non
47,4*	28,4;67,0	57,0	47,3;66,7	32,5*	20,0;47,1	33,3	25,8;40,9	44,2*	28,0;61,4	25,8**	11,4;45,4	51,4	42,0;60,7	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	41,9	37,8;46,0	41,1*	28,1;54,1
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	18,4	15,2;21,8	12,4**	5,7;22,5
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	39,7	35,7;43,8	46,5	33,4;59,7
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	1,2**	0,5;2,3	2,6**	0,3;9,3
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	98,8	97,7;99,5	97,4	90,7;99,7
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	0,1**	0,0;0,8	1,2**	0,0;6,8
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	99,9	99,2;100,0	98,8	93,2;100,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]
42,6*	25,0;61,6	26,5	19,0;35,2	58,7	45,1;72,3	47,1	38,7;55,5	45,7*	29,5;62,7	35,8*	20,2;54,0	44,0	34,2;53,8	Oui
10,2**	2,3;26,2	35,0	25,3;44,7	11,5**	4,1;24,1	5,8**	2,6;11,0	22,9**	10,2;40,7	14,2**	5,0;29,6	25,7*	17,1;35,9	Non
47,3*	29,3;65,7	38,5	29,0;48,0	29,8*	17,7;44,3	47,1	38,7;55,4	31,3**	16,7;49,3	50,0*	32,1;67,9	30,3*	21,2;39,3	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
-	;	-	;	3,4**	0,4;11,6	0,7**	0,0;3,6	-	;	-	;	2,4**	0,5;7,2	Oui
100,0	;	100,0	;	96,6	88,4;99,6	99,3	96,4;100,0	100,0	;	100,0	;	97,6	92,8;99,5	Non
														Autre
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	63,7	55,4;72,0	69,5*	42,8;89,1
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	36,3	28,0;44,6	30,5**	10,9;57,2
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	78,2	72,7;83,8	89,1	69,2;98,1
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	21,8	16,2;27,3	10,9**	1,9;30,8
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	46,9	37,2;56,5	48,5**	15,3;82,8
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	53,1	43,5;62,8	51,5**	17,2;84,7
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	27,3*	18,3;38,0	30,1**	5,1;69,5
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	72,7	62,0;81,7	69,9*	30,5;94,9
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	14,0*	8,6;21,0	15,6**	1,3;50,8
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	86,0	79,0;91,4	84,4	49,2;98,7
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	51,1	43,1;59,0	61,5*	38,0;81,6
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	48,9	41,0;56,9	38,5**	18,4;62,0
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	71,9	66,1;77,8	66,8	46,2;83,6
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	28,1	22,2;33,9	33,2**	16,4;53,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
45,5**	8,6;86,9	73,8	47,7;91,5	75,4*	43,4;94,6	63,5	46,2;78,6	72,4*	38,4;93,9	38,9**	6,3;81,9	54,9*	32,9;75,6	Oui
54,5**	13,1;91,4	26,2**	8,5;52,3	24,6**	5,4;56,6	36,5*	21,4;53,8	27,6**	6,1;61,6	61,1**	18,1;93,7	45,1*	24,4;67,1	Non
														Soutien de la famille ou des amis
58,9*	28,0;85,3	65,0	46,0;81,1	75,8	52,1;91,7	84,6	72,5;92,9	53,5*	26,7;78,9	79,6	53,0;95,0	84,9	69,3;94,5	Oui
41,1**	14,7;72,0	35,0*	18,9;54,0	24,2**	8,3;47,9	15,4**	7,1;27,5	46,5**	21,1;73,3	20,4**	5,0;47,0	15,1**	5,5;30,7	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
66,6**	4,8;99,8	36,9**	9,0;73,6	24,7**	5,2;57,3	44,7*	26,1;64,4	49,7**	17,2;82,4	65,0*	39,8;85,2	46,2**	19,8;74,4	Oui
33,4**	0,2;95,2	63,1**	26,4;91,0	75,3*	42,7;94,8	55,3*	35,6;73,9	50,3**	17,6;82,8	35,0**	14,8;60,2	53,8**	25,6;80,2	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
-	;	29,2**	5,6;66,1	9,7**	0,2;43,3	28,8**	12,2;51,0	19,0**	0,2;74,7	27,2**	4,8;64,4	47,6**	15,7;81,0	Oui
100,0	;	70,8*	33,9;94,4	90,3	56,7;99,8	71,2	49,0;87,8	81,0*	25,3;99,8	72,8*	35,6;95,2	52,4**	19,0;84,3	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
-	;	5,6**	0,1;28,5	-	;	21,3**	10,0;37,0	9,2**	0,2;44,5	11,6**	1,3;37,0	19,6**	4,7;45,7	Oui
100,0	;	94,4	71,5;99,9	100,0	;	78,7	63,0;90,0	90,8	55,5;99,8	88,4	63,0;98,7	80,4	54,3;95,3	Non
														Exemple de l'entourage[p]
50,6**	9,9;90,6	47,9*	25,1;71,3	53,1**	25,4;79,4	53,2	37,8;68,1	51,1**	17,8;83,8	29,1**	9,0;57,9	52,3*	32,4;71,6	Oui
49,4**	9,4;90,1	52,1*	28,7;74,9	46,9**	20,6;74,6	46,8*	31,9;62,2	48,9**	16,2;82,2	70,9*	42,1;91,0	47,7*	28,4;67,6	Non
														Prière ou soutien spirituel[p]
47,6**	13,1;84,0	76,0	55,3;90,4	75,7	51,7;91,8	68,7	56,7;79,2	72,5*	42,7;92,3	77,2	53,1;92,8	78,8	62,2;90,5	Oui
52,4**	16,0;86,9	24,0**	9,6;44,7	24,3**	8,2;48,3	31,3*	20,8;43,3	27,5**	7,7;57,3	22,8**	7,2;46,9	21,2**	9,5;37,8	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Mauricie et Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	0,4**	0,0;1,4	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	0,8**	0,3;1,8	-	;
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	8,7	6,4;11,6	7,2**	1,6;19,3
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	36,6	32,5;40,7	37,6*	25,8;50,5
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	53,5	49,2;57,7	55,2	42,9;67,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région															
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
4,9*	3,3;6,9	18,6	16,1;21,2	8,2	6,4;10,3	23,8	21,0;26,6	6,4*	4,5;8,7	6,7*	4,8;9,0	20,5	17,5;23,5	Ensemble des patients	
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic	
3,2**	0,1;17,0	-	;	-	;	0,9**	0,0;5,0	-	;	-	;	-	;	Mauvaise	
-	;	0,9**	0,0;4,7	-	;	1,3**	0,1;4,7	-	;	4,6**	0,5;16,3	-	;	Passable	
3,5**	0,1;18,4	8,6**	3,7;16,3	3,3**	0,3;12,4	6,5**	2,9;12,2	11,7**	3,1;28,0	20,5**	7,8;39,8	11,3**	5,8;19,3	Bonne	
32,3**	16,4;52,0	39,9	30,7;49,1	34,2*	21,6;48,8	36,1	28,5;43,8	20,6**	8,5;38,3	25,9**	12,5;43,7	44,5	34,0;55,0	Très bonne	
60,9	41,6;78,0	50,7	41,2;60,1	62,4	47,9;75,5	55,2	47,0;63,3	67,8	49,3;82,9	48,9*	30,4;67,6	44,2	34,1;54,2	Excellente	

Région 05

ESTRIE

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	46,8	45,3 ; 48,4
Femmes	53,9	53,2	51,6 ; 54,7
Âge			
18 à 49 ans	18,9	15,9	13,2 ; 18,6
50 à 59 ans	24,9	24,4	21,4 ; 27,4
60 à 69 ans	29,8	29,7	25,8 ; 33,6
70 ans et plus	26,5	30,0	27,0 ; 33,1
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	88,6	85,3 ; 91,5
Anglais	10,6	10,6	7,9 ; 13,9
Autres	3,0	0,7**	0,2 ; 1,8
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	28,9	25,0 ; 32,8
Diplôme d'études secondaires	24,7	22,1	18,3 ; 25,9
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	27,3	23,4 ; 31,3
Diplôme d'études universitaires	20,6	21,6	18,2 ; 25,1
Occupation principale			
En emploi	29,3	27,2	23,9 ; 30,5
Étudiant	1,7	1,9**	0,9 ; 3,4
Retraité	55,8	60,0	56,6 ; 63,5
À la maison	7,2	5,0*	3,3 ; 7,3
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	2,2**	1,2 ; 3,7
Congé de maternité / autres	3,6	3,6*	2,3 ; 5,4
Situation familiale			
Vit seul	24,1	22,4	18,7 ; 26,1
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	60,7	56,4 ; 65,0
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	9,7	7,4 ; 12,5
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	1,2**	0,4 ; 2,7
Autres	4,8	6,0*	4,0 ; 8,5
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	20,7	17,1 ; 24,2
Revenu suffisant	61,4	58,8	54,4 ; 63,2
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	20,5	17,0 ; 24,1
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	14,7	11,5 ; 18,4
2	21,1	27,3	23,2 ; 31,4
3	20,1	22,0	17,9 ; 26,0
4	19,4	20,2	16,6 ; 23,9
5 - très défavorisé	17,6	15,8	12,8 ; 19,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	11,1	8,3 ; 14,4	13,8*	9,5 ; 19,0	8,7*	5,4 ; 12,9
Génital féminin	5,5	...	10,2	7,6*	5,5 ; 10,3	...	;	14,4*	10,3 ; 19,3
Prostate	15,9	34,4	...	16,6	14,0 ; 19,2	35,4	29,8 ; 40,9	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	6,5	4,7 ; 8,5	6,8*	4,5 ; 9,7	6,2*	3,8 ; 9,4
Sein	26,5	0,4**	48,8	22,1	19,5 ; 24,8	0,7**	0,0 ; 3,8	41,1	36,1 ; 46,1
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	6,1*	4,3 ; 8,3	7,3*	4,5 ; 11,2	5,0*	2,9 ; 8,0
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	4,2*	2,7 ; 6,4	5,1**	2,7 ; 8,8	3,5**	1,6 ; 6,4
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	25,8	22,1 ; 29,5	31,0	25,3 ; 36,7	21,2	16,5 ; 25,9
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	83,7	79,8 ; 87,2	83,2	77,4 ; 88,0	84,3	79,0 ; 88,7
Récidive	7,4	7,5	7,3	6,9*	4,8 ; 9,6	8,6*	5,1 ; 13,3	5,4**	2,9 ; 9,1
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	9,3*	6,7 ; 12,6	8,3*	4,9 ; 12,9	10,3*	6,7 ; 14,9
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	10,0	7,5 ; 13,1	13,9*	9,6 ; 19,1	6,7*	4,0 ; 10,3
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	15,1	12,3 ; 18,0	3,2**	1,3 ; 6,5	25,6	20,6 ; 30,7
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	74,8	71,2 ; 78,4	82,9	77,3 ; 87,6	67,7	62,3 ; 73,1
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	44,6	40,2 ; 49,0	44,3	37,7 ; 50,9	44,9	39,1 ; 50,6
Non	58,8	56,6	60,7	55,4	51,0 ; 59,8	55,7	49,1 ; 62,3	55,1	49,4 ; 60,9
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	94,4	92,1 ; 96,1	93,2	89,4 ; 96,0	95,4	92,2 ; 97,6
Non	8,3	8,5	8,0	5,6*	3,9 ; 7,9	6,8*	4,0 ; 10,6	4,6**	2,4 ; 7,8
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	10,8	8,2 ; 13,9	14,3*	10,0 ; 19,6	7,8*	4,8 ; 11,7
Très bon	29,2	29,3	29,1	31,3	27,3 ; 35,4	33,9	27,8 ; 40,0	29,0	23,5 ; 34,6
Bon	34,9	34,2	35,5	35,2	31,1 ; 39,3	30,4	24,2 ; 36,6	39,5	33,8 ; 45,1
Moyen	18,8	17,8	19,6	17,3	14,0 ; 21,1	16,4	11,8 ; 21,9	18,1	13,7 ; 23,3
Mauvais	5,6	5,7	5,5	5,3*	3,5 ; 7,7	5,0**	2,7 ; 8,4	5,6**	3,0 ; 9,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p, r]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p]
11,1	8,3 ; 14,4	5,4**	1,7 ; 12,3	8,2**	4,1 ; 14,3	12,3*	7,5 ; 18,7	15,2*	8,9 ; 23,7	Colorectal
7,6*	5,5 ; 10,3	8,8**	3,8 ; 16,7	8,2**	4,4 ; 13,8	5,3**	2,5 ; 9,7	8,7**	4,3 ; 15,4	Génital féminin
16,6	14,0 ; 19,2	-	;	11,4*	6,6 ; 17,9	28,5	22,0 ; 35,7	17,9	13,1 ; 23,5	Prostate
6,5	4,7 ; 8,5	12,7**	6,4 ; 21,6	7,2**	3,9 ; 12,0	5,8**	3,0 ; 10,2	3,1**	1,0 ; 7,2	Hématopoïétique
22,1	19,5 ; 24,8	29,4*	20,8 ; 39,2	26,2	19,9 ; 33,3	20,3	14,7 ; 26,8	16,8*	11,1 ; 23,9	Sein
6,1*	4,3 ; 8,3	8,1**	3,6 ; 15,4	9,0**	4,9 ; 14,9	5,8**	2,6 ; 10,8	2,9**	0,8 ; 7,4	ORL (Tête et cou)
4,2*	2,7 ; 6,4	1,2**	0,0 ; 6,6	5,0**	2,2 ; 9,7	4,9**	2,2 ; 9,4	4,6**	1,6 ; 10,0	Broncho-pulmonaire
25,8	22,1 ; 29,5	34,5*	24,2 ; 44,8	24,7	17,9 ; 32,7	17,0*	11,8 ; 23,5	30,7	22,3 ; 39,2	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
83,7	79,8 ; 87,2	91,3	83,4 ; 96,3	82,7	75,4 ; 88,6	84,3	77,6 ; 89,6	80,0	71,0 ; 87,3	Premier cancer
6,9*	4,8 ; 9,6	2,3**	0,3 ; 7,6	7,9**	4,1 ; 13,4	8,9*	5,1 ; 14,3	6,6**	2,6 ; 13,4	Récidive
9,3*	6,7 ; 12,6	6,4**	2,4 ; 13,5	9,4**	5,1 ; 15,6	6,8**	3,5 ; 11,9	13,4**	7,3 ; 21,8	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]
10,0	7,5 ; 13,1	6,6**	2,6 ; 13,5	10,0*	5,6 ; 16,0	8,1**	4,4 ; 13,4	14,1*	8,4 ; 21,6	Sous traitement
15,1	12,3 ; 18,0	21,6*	13,6 ; 31,4	18,0*	12,4 ; 24,9	13,3*	8,6 ; 19,4	10,8*	6,3 ; 17,1	Sans traitement avec médication
74,8	71,2 ; 78,4	71,8	61,5 ; 80,7	72,0	64,1 ; 79,1	78,5	71,6 ; 84,5	75,1	66,1 ; 82,7	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p, r]
44,6	40,2 ; 49,0	29,4*	20,3 ; 39,9	44,3	36,1 ; 52,5	49,1	41,7 ; 56,5	48,6	39,3 ; 57,9	Oui
55,4	51,0 ; 59,8	70,6	60,1 ; 79,7	55,7	47,5 ; 63,9	50,9	43,5 ; 58,3	51,4	42,1 ; 60,7	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]
94,4	92,1 ; 96,1	89,3	80,6 ; 95,0	95,1	90,4 ; 97,9	91,8	86,5 ; 95,5	99,1	94,7 ; 100,0	Oui
5,6*	3,9 ; 7,9	10,7**	5,0 ; 19,4	4,9**	2,1 ; 9,6	8,2**	4,5 ; 13,5	0,9**	0,0 ; 5,3	Non
										Perception de l'état de santé[p]
10,8	8,2 ; 13,9	7,8**	3,0 ; 15,9	8,2**	4,1 ; 14,1	15,8*	10,6 ; 22,2	9,8**	5,1 ; 16,5	Excellent
31,3	27,3 ; 35,4	31,2*	21,3 ; 41,0	35,5	27,5 ; 43,5	31,4	24,0 ; 38,7	27,9	20,5 ; 36,3	Très bon
35,2	31,1 ; 39,3	39,5	29,3 ; 49,7	36,6	28,5 ; 44,7	30,7	23,4 ; 38,0	36,2	27,7 ; 44,7	Bon
17,3	14,0 ; 21,1	13,5**	6,9 ; 23,0	12,0*	7,1 ; 18,5	18,1*	12,4 ; 25,1	22,9*	15,6 ; 31,6	Moyen
5,3*	3,5 ; 7,7	8,0**	3,2 ; 16,0	7,7**	3,8 ; 13,6	4,0**	1,6 ; 8,2	3,3**	0,9 ; 8,0	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	51,0	46,8;55,2	61,0	45,7;74,9
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	49,0	44,8;53,2	39,0*	25,1;54,3
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	34,4	27,4;41,4	44,5*	24,0;66,4
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	16,5*	11,5;22,4	14,1**	3,9;32,8
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	20,7*	14,9;27,6	27,1**	11,1;49,1
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	28,4	21,9;35,6	14,3**	3,7;33,6
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	40,4	34,3;46,5	58,2*	32,5;81,0
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	17,3	12,9;22,4	8,4**	0,7;30,4
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	16,4*	11,7;22,1	16,3**	3,5;40,5
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	15,1	11,3;19,6	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	10,8*	7,2;15,4	17,1**	3,3;43,9
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	40,8	34,9;46,7	63,9	45,1;80,1
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	25,1	19,8;30,4	14,8**	5,2;30,8
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	21,8	16,8;26,9	14,3**	4,3;31,7
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	12,2*	8,5;16,8	7,0**	1,2;20,2
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	82,7	78,8;86,1	83,8	69,8;93,1
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	13,1	10,3;16,5	14,2**	5,9;27,1
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	4,2*	2,5;6,6	2,0**	0,0;11,4
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	6,2*	4,2;8,7	3,7**	0,4;13,4
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	93,8	91,3;95,8	96,3	86,6;99,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
71,5	52,9;86,0	12,8**	6,4;22,1	59,4	42,3;74,9	52,6	43,6;61,7	41,5*	23,8;61,0	31,6**	13,1;55,6	67,0	58,3;75,7	Oui
28,5**	14,0;47,1	87,2	77,9;93,6	40,6*	25,1;57,7	47,4	38,3;56,4	58,5*	39,0;76,2	68,4*	44,4;86,9	33,0	24,3;41,7	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
50,4*	26,0;74,7	10,8**	0,2;50,9	48,7**	23,0;74,9	46,9*	31,6;62,6	28,4**	6,5;62,2	51,8**	0,8;99,5	16,0**	7,2;28,9	2 semaines et moins
12,8**	2,3;35,0	11,5**	0,2;51,4	9,6**	0,8;33,7	17,2**	8,4;29,8	-	;	48,2**	0,5;99,2	22,4**	12,0;36,1	Plus de 2 semaines à 1 mois
23,8**	7,1;49,6	47,0**	12,0;84,4	29,8**	9,6;58,3	12,2**	4,2;25,8	27,7**	5,2;64,2	-	;	16,9**	8,1;29,5	Plus d'un mois à 3 mois
13,0**	2,6;34,6	30,7**	5,0;71,1	11,9**	1,3;38,4	23,7**	12,3;38,9	43,9**	14,7;76,7	-	;	44,7*	30,6;59,5	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
31,7**	8,0;65,7	56,5	44,9;68,1	41,0**	16,0;70,0	10,3**	3,6;22,0	31,1**	11,1;58,3	45,2**	18,2;74,5	45,3*	27,9;63,7	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
-	;	31,7*	21,4;43,5	32,7**	11,3;61,3	3,0**	0,4;10,3	16,4**	3,4;41,3	29,1**	7,2;61,9	10,6**	3,7;22,8	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
51,6**	20,4;81,9	7,9**	2,9;16,7	4,8**	0,1;27,4	10,0**	2,9;23,2	25,9**	7,7;53,6	-	;	35,6*	20,6;53,0	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	70,5	56,4;82,2	-	;	-	;	-	;	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
16,7**	1,7;51,1	3,9**	0,8;11,0	21,5**	5,0;49,8	6,2**	1,6;15,4	26,5**	8,8;52,5	25,7**	6,4;56,4	8,4**	1,4;24,8	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
49,5*	28,3;70,8	16,8**	7,4;30,8	39,7**	19,7;62,6	66,0	51,5;78,7	33,5**	11,7;62,3	63,2*	27,8;90,4	23,1*	13,7;34,9	2 semaines et moins
38,6**	18,9;61,4	27,9*	15,6;43,3	22,6**	6,9;47,2	18,0**	8,9;30,8	17,6**	4,0;42,7	16,2**	1,2;53,1	32,2*	21,5;44,4	Plus de 2 semaines à 1 mois
11,9**	2,4;31,5	39,5*	25,2;55,3	25,7**	8,5;51,1	8,7**	2,5;20,5	26,0**	6,6;56,4	8,8**	0,2;40,8	27,0*	17,2;38,8	Plus d'un mois à 3 mois
-	;	15,8**	6,5;29,9	12,0**	2,3;32,3	7,3**	1,9;18,1	22,9**	6,0;50,6	11,7**	0,3;49,7	17,7**	9,3;29,3	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
81,1	61,8;93,4	85,9	76,2;92,7	64,5	46,4;80,0	88,0	79,7;93,7	80,2	60,9;92,8	91,4	73,0;98,8	79,0	69,5;86,7	Oui, tout à fait
13,3**	3,2;32,5	12,9**	6,4;22,3	32,9*	17,8;51,1	8,4**	3,9;15,3	13,2**	3,6;30,8	8,6**	1,2;27,0	12,9**	7,2;20,8	Oui, en partie
5,6**	0,5;20,2	1,2**	0,0;6,6	2,6**	0,1;12,7	3,7**	0,8;10,2	6,5**	0,7;22,5	-	;	8,1**	3,2;16,2	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]
7,3**	1,5;19,8	6,2**	2,0;14,2	3,2**	0,1;16,0	11,0**	6,0;18,0	6,7**	0,8;22,5	9,5**	1,0;31,5	2,4**	0,3;8,6	Oui
92,7	80,2;98,5	93,8	85,8;98,0	96,8	84,0;99,9	89,0	82,0;94,0	93,3	77,5;99,2	90,5	68,5;99,0	97,6	91,4;99,7	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	18,3	15,0;21,8	8,7**	2,3;21,2
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	27,5	23,5;31,6	28,4*	16,1;43,6
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	26,5	22,8;30,3	48,0	34,4;61,6
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	23,4	19,8;27,1	11,1**	4,4;22,1
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	3,7*	2,2;5,9	2,2**	0,1;11,5
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	0,2**	0,0;0,9	-	;
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	0,4**	0,0;1,3	1,6**	0,0;8,7
Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	86,0	82,7;88,8	91,5	79,0;97,8
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	14,0	11,2;17,3	8,5**	2,2;21,0
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	93,4	90,7;95,4	100,0	;
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	6,6*	4,6;9,3	-	;
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	91,3	88,6;93,6	96,1	86,9;99,5
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	8,7	6,4;11,4	3,9**	0,5;13,1
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	94,1	91,8;96,0	97,9	88,9;99,9
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	5,9*	4,0;8,2	2,1**	0,1;11,1
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	60,8	56,3;65,2	61,5	46,4;75,2
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	39,2	34,8;43,7	38,5*	24,8;53,6
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	57,0	52,6;61,4	62,5	48,5;75,1
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	43,0	38,6;47,4	37,5*	24,9;51,5
Contact pour du soutien émotionnel[2, p]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	56,7	50,7;62,7	64,3	45,5;80,4
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	43,3	37,3;49,3	35,7*	19,6;54,5
Contact pour du soutien pratique[3, p, r]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	64,3	59,8;68,8	82,5	70,0;91,4
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	35,7	31,2;40,2	17,5**	8,6;30,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3. On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
9,8**	2,9;22,4	15,5**	8,2;25,5	5,3**	0,6;18,0	33,2	24,2;42,1	6,5**	0,7;22,2	28,8**	11,0;53,3	17,9*	12,0;25,1	Médecin de famille
35,2*	19,7;53,4	43,0	31,9;54,0	61,7	44,2;77,2	15,7*	9,5;23,6	29,5**	13,6;50,3	37,0**	15,5;63,0	14,8*	8,6;23,1	Médecin spécialiste du cancer
10,9**	3,1;25,6	13,9**	7,6;22,6	7,0**	1,2;20,6	40,6	31,8;49,5	47,8*	29,3;66,8	8,6**	1,0;28,0	21,0*	14,0;29,4	Chirurgien
30,1*	16,9;46,3	24,2*	14,9;35,6	23,6**	11,3;40,3	8,7**	4,3;15,5	16,1**	5,6;33,1	21,3**	6,5;45,1	40,8	31,9;49,6	Autre médecin spécialiste
14,0**	4,4;30,4	2,4**	0,3;8,3	-	;	1,8**	0,2;6,1	-	;	4,3**	0,1;21,5	5,6**	2,3;11,4	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	2,4**	0,1;13,0	-	;	-	;	-	;	-	;	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	1,1**	0,0;6,3	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]
78,5	62,9;89,7	96,3	89,9;99,2	89,0	73,9;97,0	74,2	64,9;82,1	74,1	55,2;88,2	100,0	;	89,0	82,5;93,8	En personne
21,5**	10,3;37,1	3,7**	0,8;10,1	11,0**	3,0;26,1	25,8*	17,9;35,1	25,9**	11,8;44,8	-	;	11,0*	6,2;17,5	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
95,2	84,0;99,4	92,7	85,2;97,2	91,3	76,1;98,3	96,5	91,0;99,1	90,2	73,8;97,9	95,5	78,4;99,8	88,8	81,1;94,2	Oui
4,8**	0,6;16,0	7,3**	2,8;14,8	8,7**	1,7;23,9	3,5**	0,9;9,0	9,8**	2,1;26,2	4,5**	0,2;21,6	11,2**	5,8;18,9	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
89,8	76,0;97,1	94,0	86,4;98,0	81,9	65,2;92,8	91,9	85,2;96,2	86,4	70,2;95,7	100,0	;	89,7	82,6;94,6	Oui
10,2**	2,9;24,0	6,0**	2,0;13,6	18,1**	7,2;34,8	8,1**	3,8;14,8	13,6**	4,3;29,8	-	;	10,3**	5,4;17,4	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
92,3	79,5;98,3	95,9	87,9;99,2	89,0	74,6;96,8	95,1	88,9;98,4	90,2	73,2;98,1	100,0	;	92,5	86,7;96,3	Oui
7,7**	1,7;20,5	4,1**	0,8;12,1	11,0**	3,2;25,4	4,9**	1,6;11,1	9,8**	1,9;26,8	-	;	7,5**	3,7;13,3	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]
65,1	47,7;80,0	77,9	68,3;85,7	67,2	47,9;83,1	76,9	67,6;84,6	51,8*	33,1;70,1	71,4*	44,9;90,1	32,9	24,1;41,7	Oui
34,9*	20,0;52,3	22,1*	14,3;31,7	32,8**	16,9;52,1	23,1*	15,4;32,4	48,2*	29,9;66,9	28,6**	9,9;55,1	67,1	58,3;75,9	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]
61,1	42,9;77,2	53,1	42,0;64,2	81,6	64,5;92,8	61,2	52,3;70,2	57,7*	37,8;76,0	49,5*	26,4;72,8	47,3	38,6;56,1	Oui
38,9*	22,8;57,1	46,9	35,8;58,0	18,4**	7,2;35,5	38,8	29,8;47,7	42,3*	24,0;62,2	50,5*	27,2;73,6	52,7	43,9;61,4	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p]
65,5*	41,5;84,9	44,6*	29,3;60,7	72,5	52,8;87,4	61,6	48,3;73,8	63,0*	35,4;85,5	70,3*	33,7;94,0	41,8*	28,9;54,8	Oui
34,5**	15,1;58,5	55,4	39,3;70,7	27,5**	12,6;47,2	38,4*	26,2;51,7	37,0**	14,5;64,6	29,7**	6,0;66,3	58,2	45,2;71,1	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p, r]
69,6	51,8;84,0	63,5	53,0;73,9	82,6	65,4;93,5	69,1	60,7;77,5	73,7	54,2;88,2	67,7*	43,0;86,8	43,7	34,4;53,0	Oui
30,4**	16,0;48,2	36,5	26,1;47,0	17,4**	6,5;34,6	30,9	22,5;39,3	26,3**	11,8;45,8	32,3**	13,2;57,0	56,3	47,0;65,6	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	11,3*	7,8;15,5	10,8**	1,8;31,1
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	88,7	84,5;92,2	89,2	68,9;98,2
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	31,3	25,9;36,8	35,7**	18,8;55,7
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	68,7	63,2;74,1	64,3	44,3;81,2
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	5,3*	3,1;8,5	-	;
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	94,7	91,5;96,9	100,0	;
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	7,0*	4,1;10,9	6,5**	0,6;23,3
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	93,0	89,1;95,9	93,5	76,7;99,4
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	8,6*	5,6;12,4	10,9**	2,8;26,4
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	91,4	87,6;94,4	89,1	73,6;97,2
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	3,3**	1,5;6,2	5,2**	0,5;18,9
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	96,7	93,8;98,5	94,8	81,1;99,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]
8,1**	0,8;28,4	15,8**	6,5;30,3	14,4**	4,4;31,9	16,3**	8,6;27,0	5,1**	0,1;27,7	-	;	6,3**	1,7;15,3	Oui
91,9	71,6;99,2	84,2	69,7;93,5	85,6	68,1;95,6	83,7	73,0;91,4	94,9	72,3;99,9	100,0	;	93,7	84,7;98,3	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
35,4**	15,7;59,7	18,3**	8,2;33,1	61,5	41,7;78,8	32,5*	21,6;44,9	27,0**	9,2;52,7	49,9**	17,0;82,8	20,7**	10,7;34,3	Oui
64,6*	40,3;84,3	81,7	66,9;91,8	38,5*	21,2;58,3	67,5	55,1;78,4	73,0	47,3;90,8	50,1**	17,2;83,0	79,3	65,7;89,3	Non
														Psychologue[p]
8,5**	0,8;29,8	2,2**	0,0;12,0	9,8**	2,0;26,3	8,7**	3,5;17,4	5,1**	0,1;27,5	-	;	4,7**	1,0;13,1	Oui
91,5	70,2;99,2	97,8	88,0;100,0	90,2	73,7;98,0	91,3	82,6;96,5	94,9	72,5;99,9	100,0	;	95,3	86,9;99,0	Non
														Travailleur social[p]
21,6**	5,9;47,4	-	;	16,8**	5,3;36,1	5,6**	1,3;14,9	10,1**	1,0;33,6	-	;	4,6**	0,7;14,7	Oui
78,4	52,6;94,1	100,0	;	83,2	63,9;94,7	94,4	85,1;98,7	89,9	66,4;99,0	100,0	;	95,4	85,3;99,3	Non
														Médecin[p]
4,5**	0,1;24,2	8,9**	2,5;21,1	5,4**	0,5;19,8	3,7**	0,7;10,9	25,7**	6,5;56,1	8,8**	0,2;41,7	10,4**	4,2;20,6	Oui
95,5	75,8;99,9	91,1	78,9;97,5	94,6	80,2;99,5	96,3	89,1;99,3	74,3*	43,9;93,5	91,2	58,3;99,8	89,6	79,4;95,8	Non
														Autre professionnel de la santé
-	;	6,6**	1,4;18,0	-	;	3,9**	0,8;10,9	-	;	19,4**	1,9;57,7	-	;	Oui
100,0	;	93,4	82,0;98,6	100,0	;	96,1	89,1;99,2	100,0	;	80,6*	42,3;98,1	100,0	;	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	15,2	12,2;18,7	19,7**	9,6;33,7
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	84,8	81,3;87,8	80,3	66,3;90,4
Médecin spécialiste du cancer[p, r]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	37,8	33,7;41,9	46,0*	31,8;60,7
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	62,2	58,1;66,3	54,0	39,3;68,2
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	16,7	13,6;20,2	22,4**	11,5;37,1
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	83,3	79,8;86,4	77,6	62,9;88,5
Autre médecin spécialiste[p]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	15,2	12,1;18,8	19,7**	9,9;33,2
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	84,8	81,2;87,9	80,3	66,8;90,1
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	2,0**	1,0;3,4	3,1**	0,4;10,1
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	98,0	96,6;99,0	96,9	89,9;99,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
29,8**	15,8;47,2	14,4**	7,4;24,3	39,4*	23,7;56,8	15,9*	10,0;23,5	11,7**	2,7;29,3	11,6**	1,1;38,5	4,3**	1,4;10,0	Oui
70,2	52,8;84,2	85,6	75,7;92,6	60,6	43,2;76,3	84,1	76,5;90,0	88,3	70,7;97,3	88,4	61,5;98,9	95,7	90,0;98,6	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p, r]
48,5*	31,1;66,1	43,1	32,1;54,1	56,3	38,4;73,0	39,0	30,2;47,8	38,7*	21,5;58,3	54,8*	31,3;76,8	18,8*	12,3;26,7	Oui
51,5*	33,9;68,9	56,9	45,9;67,9	43,7*	27,0;61,6	61,0	52,2;69,8	61,3	41,7;78,5	45,2*	23,2;68,7	81,2	73,3;87,7	Non
														Médecin de famille[p]
11,7**	2,8;29,3	15,8**	8,3;26,2	32,0*	17,4;49,7	18,8*	11,9;27,5	11,9**	3,3;28,1	20,3**	6,1;43,5	11,1**	6,2;17,9	Oui
88,3	70,7;97,2	84,2	73,8;91,7	68,0	50,3;82,6	81,2	72,5;88,1	88,1	71,9;96,7	79,7	56,5;93,9	88,9	82,1;93,8	Non
														Autre médecin spécialiste[p]
9,7**	1,9;26,7	9,6**	4,3;17,8	6,4**	0,8;20,8	13,2*	7,5;21,1	28,5**	13,3;48,4	17,4**	4,5;40,1	18,9*	12,2;27,4	Oui
90,3	73,3;98,1	90,4	82,2;95,7	93,6	79,2;99,2	86,8	78,9;92,5	71,5	51,6;86,7	82,6	59,9;95,5	81,1	72,6;87,8	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
4,8**	0,6;16,6	-	;	5,4**	0,7;18,1	4,2**	1,3;9,6	-	;	-	;	-	;	Oui
95,2	83,4;99,4	100,0	;	94,6	81,9;99,3	95,8	90,4;98,7	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	82,0	78,3;85,3	84,4	70,5;93,5
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	11,6	8,9;14,8	8,9**	2,4;21,6
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	6,4*	4,2;9,3	6,6**	1,6;17,4
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	69,5	65,5;73,5	72,1	57,5;84,0
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	18,7	15,3;22,4	15,8**	6,9;29,2
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	11,8	9,1;15,0	12,1**	4,4;24,9
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	78,9	73,9;83,9	92,5	79,4;98,5
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	13,7*	9,8;18,4	5,0**	0,6;17,5
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	7,4*	4,5;11,3	2,5**	0,0;14,1
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	60,1	54,7;65,5	68,2	51,3;82,2
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	13,8	10,2;18,0	16,6**	6,3;32,9
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	26,1	21,1;31,2	15,1**	5,5;30,7
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	28,7	24,9;32,6	35,2*	21,8;50,5
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	12,6	9,7;16,0	12,7**	5,5;23,8
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	23,5	19,8;27,2	18,4**	8,7;32,2
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	9,5	7,0;12,6	7,1**	2,1;16,9
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	25,7	21,7;29,6	26,6*	14,8;41,4
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	65,8	58,0;73,6	68,7*	35,1;92,0
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	20,4*	14,1;28,0	31,3**	8,0;64,9
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	13,8*	8,8;20,2	-	;
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	22,4	18,7;26,0	19,5**	9,8;32,8
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	77,6	74,0;81,3	80,5	67,2;90,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
87,1	71,9;95,8	87,5	78,2;93,8	74,6	57,6;87,5	87,0	79,4;92,6	77,3	57,8;90,8	83,9	58,7;96,8	74,4	65,4;82,1	Oui, tout à fait
7,2**	1,4;20,0	8,5**	3,4;16,8	22,3**	10,2;39,2	9,0**	4,5;15,7	19,6**	7,3;38,3	16,1**	3,2;41,3	13,1*	7,7;20,4	Oui, en partie
5,8**	0,6;19,9	4,1**	0,8;11,4	3,1**	0,1;15,7	4,0**	1,1;10,0	3,1**	0,0;17,7	-	;	12,5**	6,7;20,6	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
66,1	48,8;80,7	75,0	64,6;83,6	71,0	53,5;84,9	71,4	61,5;80,0	64,6	45,7;80,7	72,9	47,1;90,8	64,6	56,0;73,3	Oui, tout à fait
20,8**	10,0;36,0	16,7*	9,6;26,1	20,8**	9,2;37,4	20,9*	13,6;29,9	22,6**	9,2;41,8	16,2**	3,2;41,4	17,6*	11,3;25,4	Oui, en partie
13,1**	4,2;28,6	8,3**	3,1;17,4	8,2**	1,7;22,3	7,7**	3,7;13,8	12,8**	3,5;30,2	10,9**	1,3;34,4	17,8*	11,0;26,4	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
87,3	66,0;97,6	85,3	71,3;94,2	87,6	67,0;97,5	58,8	46,2;71,4	74,0*	44,9;92,9	94,0	69,3;99,9	77,3	61,6;88,9	Oui
8,0**	0,9;27,2	12,6**	4,6;25,9	12,4**	2,5;33,0	26,5*	15,9;39,4	6,2**	0,1;30,3	6,0**	0,1;30,7	12,8**	4,4;27,3	Non, il ne voulait pas
4,7**	0,1;25,9	2,1**	0,0;11,4	-	;	14,7**	7,0;25,9	19,8**	4,0;48,5	-	;	9,9**	2,5;24,2	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
55,6*	31,9;77,5	52,0	37,3;66,5	55,9*	34,1;76,2	58,9	48,8;69,1	60,7*	37,3;81,0	83,4	50,0;98,2	60,7	48,5;72,0	Oui, tout à fait
4,0**	0,1;21,5	15,1**	6,8;27,5	25,4**	10,6;46,1	13,6**	6,7;23,7	21,7**	7,2;44,1	9,5**	0,2;44,7	8,7**	3,3;17,9	Oui, en partie
40,4**	19,0;64,9	32,9*	20,4;47,5	18,7**	5,7;40,1	27,4*	18,4;38,0	17,6**	4,3;41,6	7,1**	0,2;34,4	30,6*	19,6;43,4	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
37,8*	20,5;57,7	26,4*	17,4;37,3	54,4*	35,7;72,2	33,9	24,9;42,8	25,9**	11,4;45,8	43,3**	20,8;67,9	12,5**	6,9;20,3	Oui, une infirmière pivot en oncologie
11,9**	2,7;30,0	19,5*	11,6;29,7	5,9**	0,7;20,2	9,1**	4,5;15,9	10,5**	2,1;28,3	35,1**	14,5;60,8	9,7**	4,5;17,8	Oui, un autre professionnel de la santé
22,5**	10,5;38,9	16,7*	9,4;26,5	31,5**	16,5;50,1	29,6	21,4;38,9	21,9**	8,1;42,6	8,6**	0,8;29,8	26,0*	18,1;35,1	Oui, un membre du personnel administratif
2,6**	0,0;14,6	16,0**	8,5;26,5	2,1**	0,0;11,8	7,2**	2,6;15,3	13,5**	3,5;32,0	3,9**	0,0;22,5	12,2*	6,8;19,5	Oui, un médecin
25,3**	12,8;41,7	21,3*	12,9;32,0	6,1**	0,7;20,8	20,2*	13,2;28,8	28,2**	13,0;48,1	9,1**	1,0;30,0	39,6	30,5;48,7	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
40,2**	8,2;80,5	74,3	52,9;89,6	72,2*	41,6;92,6	60,9	43,6;76,4	42,6**	11,8;78,5	66,9**	17,5;97,4	72,6	52,3;87,8	Oui, tout à fait
23,6**	2,0;67,6	14,4**	3,8;33,8	27,8**	7,4;58,4	24,9**	12,4;41,3	34,4**	6,9;73,4	15,6**	0,1;69,8	9,1**	1,7;25,2	Oui, en partie
36,1**	6,3;77,6	11,2**	2,2;30,3	-	;	14,3**	5,6;28,2	23,0**	2,5;63,2	17,5**	0,2;72,2	18,3**	6,8;36,2	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]
23,3**	10,2;41,8	28,6*	19,4;39,3	28,3**	14,5;46,1	35,5	27,1;43,9	20,7**	8,9;37,9	13,4**	3,0;33,7	8,4**	4,1;15,0	Oui
76,7	58,2;89,8	71,4	60,7;80,6	71,7	53,9;85,5	64,5	56,1;72,9	79,3	62,1;91,1	86,6	66,3;97,0	91,6	85,0;95,9	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	83,5	80,8;86,2	91,2	81,0;97,0
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	16,5	13,8;19,2	8,8**	3,0;19,0
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	45,1	40,2;50,1	10,8**	3,4;23,9
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	54,9	49,9;59,8	89,2	76,1;96,6
Lieu de la chirurgie[p]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	91,6	88,5;94,1	94,6	85,0;98,9
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	8,4*	5,9;11,5	5,4**	1,1;15,0
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	51,5	44,4;58,7	64,3	43,1;82,0
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	11,2*	6,8;17,1	15,7**	3,6;38,7
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	37,3	30,3;44,2	20,0**	6,7;41,0
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	60,5	55,6;65,3	75,5	60,2;87,2
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	14,8	11,4;18,7	5,2**	0,6;17,8
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	24,8	20,6;28,9	19,3**	9,2;33,4
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	94,9	92,1;96,9	98,1	89,3;100,0
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	5,1*	3,1;7,9	1,9**	0,0;10,7
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	86,1	82,0;89,6	85,6	70,9;94,6
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	12,2	9,0;16,1	14,4**	5,4;29,1
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	1,7**	0,6;3,8	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
95,9	86,0;99,5	60,1	51,1;69,2	45,0*	28,2;62,7	97,7	93,4;99,6	82,2	64,2;93,6	47,4*	25,7;69,9	95,0	90,2;97,9	Oui
4,1**	0,5;14,0	39,9	30,8;48,9	55,0*	37,3;71,8	2,3**	0,4;6,6	17,8**	6,4;35,8	52,6*	30,1;74,3	5,0**	2,1;9,8	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
10,4**	3,0;24,2	2,2**	0,1;11,7	48,1**	20,2;76,9	71,6	62,6;79,6	34,8**	17,7;55,3	-	;	68,5	59,4;77,5	Oui
89,6	75,8;97,0	97,8	88,3;99,9	51,9**	23,1;79,8	28,4	20,4;37,4	65,2	44,7;82,3	100,0	;	31,5	22,5;40,6	Non
														Lieu de la chirurgie[p]
93,5	78,7;99,2	92,3	80,9;98,0	89,5	63,3;99,1	91,0	84,6;95,4	95,0	76,4;99,8	83,3	49,1;98,3	90,3	84,0;94,7	Hôpital de la région de résidence
6,5**	0,8;21,3	7,7**	2,0;19,1	10,5**	0,9;36,7	9,0**	4,6;15,4	5,0**	0,2;23,6	16,7**	1,7;50,9	9,7**	5,3;16,0	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
38,6**	14,2;68,0	43,6**	21,2;68,1	32,8**	3,6;79,1	57,6	46,4;68,8	46,5**	21,2;73,2	50,2**	8,2;91,9	47,1*	30,7;63,9	Oui, tout à fait
6,7**	0,2;32,9	14,2**	2,9;36,6	10,4**	0,0;57,5	12,3**	5,9;21,9	6,4**	0,1;33,9	18,7**	0,3;72,3	7,8**	1,5;21,8	Oui, en partie
54,7**	25,6;81,7	42,2**	21,4;65,3	56,8**	14,5;92,4	30,1*	19,8;42,0	47,1**	21,9;73,4	31,1**	2,1;81,5	45,1*	28,7;62,3	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
54,3*	36,5;71,3	78,4	63,9;89,1	35,9**	11,2;67,8	64,4	55,4;73,4	65,6	44,4;83,1	64,0*	29,2;90,4	46,5	36,6;56,4	Oui, tout à fait
22,5**	9,1;41,9	15,2**	6,2;29,2	32,5**	9,8;63,5	11,7**	6,4;19,3	19,0**	6,4;39,2	28,3**	5,9;63,6	15,1*	8,8;23,5	Oui, en partie
23,2**	10,0;41,8	6,3**	1,3;17,6	31,6**	9,0;63,5	23,8*	16,3;32,7	15,3**	4,2;35,3	7,7**	0,1;40,0	38,4	28,3;48,5	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
90,5	75,0;97,9	97,2	86,3;99,9	84,3	51,6;98,4	100,0	;	92,2	73,1;99,2	100,0	;	90,2	82,4;95,3	Oui
9,5**	2,1;25,0	2,8**	0,1;13,7	15,7**	1,6;48,4	-	;	7,8**	0,8;26,9	-	;	9,8**	4,7;17,6	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
91,8	77,1;98,4	79,8	64,5;90,6	78,9*	44,1;96,9	87,7	79,8;93,3	87,5	67,6;97,3	79,8*	39,3;98,3	86,3	77,9;92,5	Oui, tout à fait
8,2**	1,6;22,9	17,9**	7,9;32,6	21,1**	3,1;55,9	10,7**	5,5;18,4	12,5**	2,7;32,4	20,2**	1,7;60,7	10,2**	5,0;17,8	Oui, en partie
-	;	2,3**	0,1;11,3	-	;	1,6**	0,2;6,0	-	;	-	;	3,5**	0,6;10,5	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	33,7	30,2;37,1	57,9	45,0;70,7
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	66,3	62,9;69,8	42,1*	29,3;55,0
Lieu de la chimiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	90,5	85,7;94,1	97,0	83,0;100,0
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	9,5*	5,9;14,3	3,0**	0,0;17,0
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	44,7	36,6;52,7	49,1*	27,6;70,8
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	41,9	33,9;49,9	36,3**	17,7;58,5
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	13,5*	8,9;19,2	14,6**	4,0;34,0
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	48,1	38,5;57,7	45,3**	18,8;74,0
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	9,4**	4,8;16,3	21,5**	4,2;52,6
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	42,5	33,1;51,9	33,1**	10,0;64,6
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	28,9	21,9;36,7	42,4*	22,3;64,4
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	41,6	33,8;49,4	42,1**	21,2;65,3
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	29,5	22,4;37,4	15,5**	4,2;35,8
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	77,3	69,8;83,6	83,0	63,1;94,8
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	18,9*	13,1;25,9	13,6**	3,2;33,4
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	3,9**	1,6;7,8	3,4**	0,1;16,2
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	89,3	83,1;93,9	90,4	69,6;98,8
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	10,1**	5,7;16,3	9,6**	1,2;30,4
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	0,6**	0,0;3,0	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
57,7*	39,2;74,8	1,5**	0,0;8,2	85,1	68,3;95,0	43,6	34,9;52,3	16,9**	6,0;34,2	28,6**	11,7;51,4	20,4*	14,0;28,0	Oui
42,3*	25,2;60,8	98,5	91,8;100,0	14,9**	5,0;31,7	56,4	47,7;65,1	83,1	65,8;94,0	71,4	48,6;88,3	79,6	72,0;86,0	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p]
100,0	;	-	;	82,0	63,9;93,5	92,2	80,5;98,0	79,9*	25,4;99,6	100,0	;	80,9	59,3;94,1	Hôpital de la région de résidence
-	;	-	;	18,0**	6,5;36,1	7,8**	2,0;19,5	20,1**	0,4;74,6	-	;	19,1**	5,9;40,7	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
34,2**	14,8;58,4	-	;	43,9*	25,2;63,9	43,7*	29,4;58,8	60,4**	11,6;96,4	51,7**	8,9;92,6	48,3*	25,6;71,5	Moins de 30 minutes
54,1*	30,2;76,7	-	;	40,4*	22,7;60,2	46,1*	31,5;61,2	19,5**	0,2;75,9	48,3**	7,4;91,1	32,5**	12,8;58,3	De 30 à 60 minutes
11,7**	2,2;31,9	-	;	15,7**	4,8;34,5	10,2**	3,4;22,2	20,1**	0,4;74,6	-	;	19,2**	6,2;40,3	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
37,9**	9,9;73,8	-	;	51,5*	26,7;75,7	46,4*	28,7;64,7	100,0	;	68,2**	5,2;99,8	43,8**	20,9;68,9	Oui, tout à fait
-	;	-	;	8,9**	1,0;29,7	13,1**	4,4;27,8	-	;	-	;	4,8**	0,1;24,4	Oui, en partie
62,1**	26,2;90,1	-	;	39,7**	17,6;65,4	40,6*	24,2;58,7	-	;	31,8**	0,2;94,8	51,4*	26,7;75,5	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
23,8**	7,9;47,9	-	;	14,8**	4,8;31,9	19,7**	9,7;33,6	59,8**	11,2;96,3	15,4**	0,1;69,9	48,3*	25,5;71,7	Moins de 30 minutes
26,3**	9,2;51,1	-	;	49,9*	29,8;70,0	50,8	36,2;65,3	40,2**	3,7;88,8	16,7**	0,2;69,2	35,5**	15,7;59,8	De 30 à 60 minutes
49,9*	25,8;74,0	-	;	35,3**	17,8;56,3	29,5*	17,4;44,3	-	;	67,9**	20,2;97,0	16,2**	4,9;35,7	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
57,5*	32,8;79,7	-	;	80,7	63,7;92,2	77,3	63,7;87,7	100,0	;	83,8*	29,1;99,9	80,6	58,7;94,0	Oui, tout à fait
35,1**	14,8;60,3	-	;	16,3**	5,9;33,1	22,7**	12,3;36,3	-	;	16,2**	0,1;70,9	8,6**	0,8;29,8	Oui, en partie
7,5**	0,9;24,4	-	;	3,0**	0,1;15,4	-	;	-	;	-	;	10,8**	1,9;30,5	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
87,1	59,8;98,5	-	;	90,4	74,0;98,1	88,3	75,9;95,7	80,5*	24,1;99,8	100,0	;	90,1	71,5;98,3	Oui, tout à fait
12,9**	1,5;40,2	-	;	9,6**	1,9;26,0	11,7**	4,3;24,1	19,5**	0,2;75,9	-	;	6,5**	0,6;22,9	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	3,5**	0,1;18,4	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	43,4	40,8;45,9	31,2*	19,8;44,5
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	56,6	54,1;59,2	68,8	55,5;80,2
Lieu de la radiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	86,5	81,2;90,7	95,7	75,6;99,9
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	13,5*	9,3;18,8	4,3**	0,1;24,4
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	42,3	35,7;48,9	55,6*	29,6;79,4
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	46,5	39,7;53,2	35,4**	15,0;60,6
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	11,3*	7,4;16,2	9,1**	1,0;30,2
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	54,4	46,2;62,7	39,1**	11,3;73,6
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	12,8*	8,2;18,7	8,7**	0,1;42,7
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	32,8	24,9;40,6	52,2**	19,5;83,5
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	77,6	70,9;83,5	82,9	55,4;96,9
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	16,3*	11,3;22,5	11,8**	1,0;39,8
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	6,0**	3,1;10,5	5,3**	0,1;26,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
36,6*	21,9;53,4	52,6	44,1;61,2	23,2**	9,8;42,4	80,3	72,0;87,1	65,6	46,4;81,6	44,2**	22,3;67,9	12,6*	7,9;18,8	Oui
63,4	46,6;78,1	47,4	38,8;55,9	76,8	57,6;90,2	19,7*	12,9;28,0	34,4*	18,4;53,6	55,8*	32,1;77,7	87,4	81,2;92,1	Non
														Lieu de la radiothérapie[p]
71,2*	40,8;91,9	84,4	69,6;93,9	79,1*	39,1;98,0	86,0	77,6;92,2	88,9	64,5;98,8	100,0	;	90,2	65,0;99,2	Hôpital de la région de résidence
28,8**	8,1;59,2	15,6**	6,1;30,4	20,9**	2,0;60,9	14,0*	7,8;22,4	11,1**	1,2;35,5	-	;	9,8**	0,8;35,0	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
48,3**	23,2;74,0	31,7*	17,6;48,8	31,8**	2,7;80,2	45,0	35,4;54,5	33,5**	13,7;58,8	46,6**	10,1;86,1	45,4**	20,4;72,3	Moins de 30 minutes
37,3**	13,7;66,6	54,4*	37,2;70,9	13,5**	0,0;69,3	47,7	37,8;57,5	50,1*	26,2;74,0	53,4**	13,9;89,9	44,0**	19,1;71,5	De 30 à 60 minutes
14,4**	1,5;45,2	13,9**	5,4;27,4	54,7**	10,2;93,8	7,4**	2,9;15,0	16,4**	3,5;40,9	-	;	10,6**	0,8;37,9	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
51,3**	19,6;82,2	50,1*	30,8;69,4	78,8**	17,6;99,9	57,5	45,9;69,1	53,1**	22,6;81,9	55,7**	2,9;98,8	56,6**	23,2;86,0	Oui, tout à fait
24,8**	4,7;59,0	15,2**	5,0;32,3	21,2**	0,1;82,4	11,7**	5,4;21,3	8,3**	0,2;39,0	-	;	11,8**	0,3;51,1	Oui, en partie
23,9**	3,1;63,0	34,7**	17,8;55,0	-	;	30,8*	20,4;42,7	38,6**	12,5;70,8	44,3**	1,2;97,1	31,6**	7,8;65,8	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
70,1*	38,9;91,7	70,7	52,6;85,1	87,4	45,1;99,8	83,7	74,5;90,7	66,3*	41,7;85,8	85,9*	38,0;99,8	65,9*	37,6;87,8	Oui, tout à fait
20,6**	3,5;52,7	18,3**	7,0;35,7	-	;	11,5**	5,7;20,0	33,7**	14,2;58,3	14,1**	0,2;62,0	27,8**	8,2;56,8	Oui, en partie
9,3**	0,3;40,4	11,0**	3,3;25,0	12,6**	0,2;54,9	4,7**	1,3;11,6	-	;	-	;	6,3**	0,1;32,5	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Douleur et malaises ressentis[p, r]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	53,3	49,2;57,4	57,3	41,4;72,1
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	46,7	42,6;50,8	42,7*	27,9;58,6
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	28,9	23,3;34,5	51,3*	32,7;69,7
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	36,1	30,3;42,0	23,3**	10,1;41,9
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	35,0	29,0;41,0	25,3**	11,2;44,7
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	77,4	72,2;82,7	84,9	67,7;95,1
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	17,0	12,7;22,0	12,0**	3,1;28,7
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	5,6**	2,9;9,8	3,2**	0,1;17,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p, r]
75,5	56,2;89,3	35,7*	25,2;46,2	72,7	54,9;86,5	54,6	45,3;63,8	59,3*	40,1;76,6	53,4*	27,6;78,0	48,8	39,5;58,0	Oui
24,5**	10,7;43,8	64,3	53,8;74,8	27,3**	13,5;45,1	45,4	36,2;54,7	40,7*	23,4;59,9	46,6**	22,0;72,4	51,2	42,0;60,5	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
22,7**	8,8;43,2	23,3**	9,8;42,5	28,0**	12,3;48,9	20,3*	11,5;31,8	31,1**	11,4;57,7	44,7**	15,3;77,2	28,7*	16,9;43,1	Sévères
38,5*	20,3;59,5	38,0**	19,6;59,3	39,5*	21,7;59,6	43,2	30,5;56,0	31,8**	10,9;60,1	27,3**	5,5;62,3	34,8*	22,4;48,9	Modérés
38,8**	19,2;61,4	38,8*	20,9;59,1	32,5**	15,1;54,4	36,4*	24,0;50,4	37,1**	15,2;63,7	28,0**	5,2;65,1	36,5*	23,4;51,2	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
83,3	63,3;95,0	78,3	60,3;90,8	91,0	72,9;98,6	73,4	60,4;84,0	72,6	46,8;90,5	73,3*	35,7;95,5	71,3	57,2;82,9	Oui, tout à fait
16,7**	5,0;36,7	18,5**	7,1;36,1	9,0**	1,4;27,1	22,9*	13,3;35,3	22,0**	6,5;47,0	9,4**	0,2;43,1	16,0**	7,7;28,0	Oui, en partie
-	;	3,2**	0,1;17,2	-	;	3,6**	0,4;13,4	5,4**	0,1;27,3	17,3**	1,5;54,5	12,6**	4,6;26,0	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	88,7	84,9;91,8	92,5	79,0;98,5
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	6,7*	4,3;10,0	2,5**	0,0;14,4
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	4,6*	2,6;7,4	5,0**	0,6;17,4
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	8,8	6,4;11,8	7,7**	2,3;18,2
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	91,2	88,2;93,6	92,3	81,8;97,7
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	72,4	68,6;76,3	76,4	62,0;87,4
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	25,9	22,1;29,7	21,4**	10,9;35,7
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	1,7**	0,8;3,2	2,2**	0,1;11,5
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	57,3	53,2;61,3	66,1	51,5;78,8
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	42,7	38,7;46,8	33,9*	21,2;48,5
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	23,2	19,5;26,9	35,4*	22,2;50,4
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	12,3	9,7;15,3	12,1**	4,3;25,3
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	64,5	60,5;68,5	52,5	37,7;66,9
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	74,7	70,2;79,2	86,6	73,2;94,9
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	18,8	14,8;23,4	13,4**	5,1;26,8
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	6,5*	4,0;9,7	-	;
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	61,0	55,1;67,0	66,4	44,8;83,9
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	39,0	33,0;44,9	33,6**	16,1;55,2
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	88,1	84,9;90,9	91,6	81,0;97,3
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	11,0	8,4;14,1	6,6**	1,7;16,7
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	0,9**	0,2;2,3	1,8**	0,0;10,3

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
96,0	78,8;99,9	77,7	64,0;88,1	89,0	71,2;97,6	90,4	82,5;95,6	100,0	;	100,0	;	82,9	69,2;92,2	Oui, tout à fait
-	;	8,9**	2,3;22,0	11,0**	2,4;28,8	7,3**	2,9;14,9	-	;	-	;	11,8**	4,2;24,6	Oui, en partie
4,0**	0,1;21,2	13,4**	5,1;26,8	-	;	2,2**	0,3;7,8	-	;	-	;	5,3**	1,1;14,8	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
11,2**	3,5;24,9	2,7**	0,3;9,4	19,8**	8,3;36,7	9,6**	5,1;16,1	16,8**	5,6;35,3	-	;	8,6**	3,9;15,8	Oui
88,8	75,1;96,5	97,3	90,6;99,7	80,2	63,3;91,7	90,4	83,9;94,9	83,2	64,7;94,4	100,0	;	91,4	84,2;96,1	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
73,5	54,8;87,6	81,5	71,9;89,0	52,0*	33,7;69,9	65,8	57,1;74,6	66,5	47,3;82,3	95,3	73,3;99,9	73,9	64,5;81,9	Oui, toujours
26,5**	12,4;45,2	18,5*	11,0;28,1	42,7*	26,2;60,5	31,0	22,5;39,4	30,6**	15,3;49,7	4,7**	0,1;26,7	25,4*	17,4;34,8	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	5,3**	0,6;18,7	3,2**	0,9;7,8	3,0**	0,1;16,0	-	;	0,7**	0,0;4,0	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
65,0	46,1;80,9	54,6	43,7;65,5	73,7	55,4;87,5	80,1	70,7;87,6	46,9*	28,1;66,4	64,0*	38,4;84,8	28,7*	20,4;38,3	Oui
35,0*	19,1;53,9	45,4	34,5;56,3	26,3**	12,5;44,6	19,9*	12,4;29,3	53,1*	33,6;71,9	36,0**	15,2;61,6	71,3	61,7;79,6	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]
34,6**	18,3;54,0	6,2**	2,0;14,3	45,4*	28,9;62,6	30,5	22,5;38,5	26,6**	13,0;44,6	11,6**	1,2;37,5	14,3*	8,3;22,3	Oui
8,0**	1,7;21,4	10,5**	4,6;19,7	23,9**	11,3;41,1	18,0*	11,5;26,3	14,1**	3,8;32,7	9,6**	1,2;30,8	6,7**	2,9;12,7	Non, mais il aurait aimé l'être
57,5*	38,6;74,9	83,3	73,1;90,8	30,7**	16,1;48,8	51,4	43,0;59,9	59,3*	39,9;76,8	78,8	53,8;94,0	79,1	70,9;85,8	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
63,0*	39,2;82,9	77,8	65,4;87,4	61,3	43,6;77,0	73,9	62,0;83,7	71,2	46,2;89,4	74,8*	43,8;94,0	76,2	65,6;84,8	Oui, tout à fait
25,4**	9,3;48,8	18,3**	9,4;30,6	32,3*	17,6;50,0	19,6*	11,0;31,0	14,3**	2,8;37,2	17,5**	3,3;44,9	16,0**	8,9;25,7	Oui, en partie
11,6**	1,1;38,2	3,9**	0,6;12,7	6,5**	0,8;21,0	6,5**	2,1;14,5	14,5**	3,0;37,3	7,7**	0,2;37,4	7,8**	3,2;15,6	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
77,6	55,0;92,4	66,2	48,6;81,0	59,1*	38,6;77,5	53,4	40,1;66,6	52,6*	28,6;75,7	58,6**	23,4;88,1	60,1	44,6;74,2	Oui
22,4**	7,6;45,0	33,8*	19,0;51,4	40,9*	22,5;61,4	46,6	33,4;59,9	47,4*	24,3;71,4	41,4**	11,9;76,6	39,9*	25,8;55,4	Non
														Patient traité de manière respectueuse
84,9	68,0;95,0	85,6	76,5;92,2	95,2	83,6;99,4	91,2	84,9;95,5	80,0	61,4;92,3	90,0	66,2;99,0	86,3	78,7;92,0	Oui, toujours
15,1**	5,0;32,0	12,8**	6,5;21,9	4,8**	0,6;16,4	8,8**	4,5;15,1	20,0**	7,7;38,6	5,0**	0,1;26,7	12,8*	7,3;20,2	Oui, la plupart du temps
-	;	1,5**	0,0;7,9	-	;	-	;	-	;	5,0**	0,1;26,1	0,9**	0,0;4,7	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	2,2**	1,1;3,9	2,5**	0,1;12,7
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	6,0*	4,1;8,4	5,1**	0,7;16,9
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	2,8**	1,3;4,9	7,2**	1,1;22,2
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	89,1	85,8;91,9	85,2	69,4;94,7
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	74,3	70,5;78,2	68,9	53,3;81,9
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	19,7	16,3;23,5	27,3*	15,2;42,6
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	6,0*	3,9;8,7	3,7**	0,4;13,4
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	89,3	86,2;91,9	89,7	78,0;96,5
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	9,0	6,6;11,8	6,8**	1,9;16,8
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	1,7**	0,8;3,3	3,4**	0,3;13,1
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	67,7	60,0;75,3	82,9	59,5;95,9
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	32,3	24,7;40,0	17,1**	4,1;40,5
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	4,2*	2,7;6,2	1,8**	0,0;10,5
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	95,8	93,8;97,3	98,2	89,5;100,0
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	68,6	63,1;74,0	75,5	52,7;91,0
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	10,9*	7,5;15,3	11,4**	2,7;28,8
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	20,5	15,7;25,3	13,1**	2,1;37,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
-	;	4,2**	0,8;11,8	7,1**	1,4;19,8	1,5**	0,2;5,4	3,0**	0,0;17,7	-	;	0,7**	0,0;4,1	Oui, souvent
12,4**	4,3;26,4	3,6**	0,9;9,5	7,3**	1,5;19,9	4,7**	1,5;10,6	16,3**	5,2;34,8	5,2**	0,1;27,6	4,1**	1,1;10,3	Oui, parfois
4,7**	0,5;16,9	1,3**	0,0;7,1	5,5**	0,6;19,1	1,7**	0,2;6,2	-	;	5,3**	0,1;28,1	1,6**	0,2;5,6	Oui, une seule fois
82,9	67,6;92,9	91,0	82,4;96,3	80,1	63,7;91,4	92,1	85,5;96,3	80,8	61,5;93,1	89,5	65,5;98,9	93,6	86,8;97,5	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
76,8	60,6;88,7	81,6	72,1;88,9	54,4	38,1;70,1	76,0	67,4;83,3	79,5	60,8;91,9	85,4	61,6;97,2	71,7	61,3;80,7	Oui, toujours
16,1**	6,6;30,6	10,8**	5,2;19,1	37,5*	22,9;54,0	21,4*	14,4;29,9	20,5**	8,1;39,2	14,6**	2,8;38,4	17,7*	10,8;26,6	Oui, la plupart du temps
7,1**	1,3;20,4	7,6**	2,9;15,8	8,1**	1,2;24,8	2,6**	0,6;7,1	-	;	-	;	10,6**	4,8;19,4	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
89,1	75,1;96,7	92,7	85,1;97,1	86,4	70,8;95,5	85,5	78,3;91,0	89,9	73,4;97,8	100,0	;	89,4	82,4;94,3	Oui, toujours
10,9**	3,3;24,9	6,2**	2,1;13,6	7,9**	1,6;21,6	12,0*	7,1;18,6	10,1**	2,2;26,6	-	;	9,7**	5,0;16,6	Oui, la plupart du temps
-	;	1,1**	0,0;6,1	5,6**	0,7;18,8	2,5**	0,6;6,8	-	;	-	;	0,9**	0,0;4,7	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]
83,7	50,0;98,3	71,2	52,3;85,9	65,5*	36,9;87,6	54,4*	33,7;74,0	70,9*	35,7;93,7	79,1**	22,8;99,7	56,9*	35,7;76,4	Oui
16,3**	1,7;50,0	28,8**	14,1;47,7	34,5**	12,4;63,1	45,6*	26,0;66,3	29,1**	6,3;64,3	20,9**	0,3;77,2	43,1*	23,6;64,3	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
2,2**	0,0;11,7	2,2**	0,2;8,6	10,1**	2,7;24,1	6,4**	2,8;12,0	3,5**	0,1;17,5	9,5**	1,1;31,0	3,0**	0,8;7,5	Oui
97,8	88,3;100,0	97,8	91,4;99,8	89,9	75,9;97,3	93,6	88,0;97,2	96,5	82,5;99,9	90,5	69,0;98,9	97,0	92,5;99,2	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
59,7*	32,5;83,1	68,9	52,6;82,3	68,8	46,8;85,9	66,1	52,2;78,2	68,9*	44,6;87,4	92,0	60,7;99,9	65,6	53,3;76,6	Oui, tout à fait
14,8**	1,3;47,5	6,8**	1,3;19,4	13,8**	3,8;32,2	14,6**	6,8;26,1	4,8**	0,1;24,2	8,0**	0,1;39,3	10,7**	4,6;20,5	Oui, en partie
25,5**	8,0;51,7	24,3**	12,6;39,8	17,4**	4,9;38,9	19,3**	9,8;32,5	26,3**	9,1;51,2	-	;	23,6*	14,2;35,5	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p, r]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	74,1	70,2;78,0	87,1	74,3;95,0
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	25,9	22,0;29,8	12,9**	5,0;25,7
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	7,5*	5,3;10,3	14,4**	5,2;29,4
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	92,5	89,7;94,7	85,6	70,6;94,8
Médecin spécialiste[p]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	20,7	17,0;24,3	20,7**	10,2;35,3
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	79,3	75,7;83,0	79,3	64,7;89,8
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	17,5	14,2;21,2	14,7**	6,4;27,4
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	82,5	78,8;85,8	85,3	72,6;93,6
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	4,4*	2,9;6,4	7,1**	1,7;18,2
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	95,6	93,6;97,1	92,9	81,8;98,3
CLSC[p]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	17,8	14,5;21,5	25,6**	13,9;40,6
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	82,2	78,5;85,5	74,4	59,4;86,1
Urgence d'un hôpital[p, r]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	26,1	22,2;30,1	37,4*	23,4;53,2
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	73,9	69,9;77,8	62,6	46,8;76,6
Unité de soins d'un hôpital[p]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	10,3	7,6;13,5	21,2**	10,9;35,1
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	89,7	86,5;92,4	78,8	64,9;89,1
Autre professionnel de la santé[p, r]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	0,6**	0,1;1,8	-	;
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	99,4	98,2;99,9	100,0	;
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	0,3**	0,0;1,2	1,3**	0,0;7,0
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	99,7	98,8;100,0	98,7	93,0;100,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p, r]
86,3	68,8;96,0	68,6	58,8;78,4	95,3	83,7;99,5	76,4	67,0;84,3	62,9*	41,4;81,1	87,4	59,9;98,7	60,6	51,2;70,0	Oui
13,7**	4,0;31,2	31,4*	21,6;41,2	4,7**	0,5;16,3	23,6*	15,7;33,0	37,1**	18,9;58,6	12,6**	1,3;40,1	39,4	30,0;48,8	Non
														Médecin de famille[p]
6,4**	0,6;23,2	6,4**	2,1;14,2	5,9**	0,7;20,2	4,4**	1,5;9,8	3,7**	0,1;18,0	26,7**	8,2;54,3	6,8**	2,8;13,5	Oui
93,6	76,8;99,4	93,6	85,8;97,9	94,1	79,8;99,3	95,6	90,2;98,5	96,3	82,0;99,9	73,3*	45,7;91,8	93,2	86,5;97,2	Non
														Médecin spécialiste[p]
26,5**	11,9;46,2	18,2*	10,3;28,6	29,4**	14,9;47,8	17,7*	10,9;26,6	23,1**	8,1;45,6	24,3**	6,0;53,9	19,6*	12,1;29,2	Oui
73,5	53,8;88,1	81,8	71,4;89,7	70,6	52,2;85,1	82,3	73,4;89,1	76,9	54,4;91,9	75,7*	46,1;94,0	80,4	70,8;87,9	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
38,7*	22,5;56,9	18,1*	10,8;27,6	26,1**	12,7;43,9	19,0*	12,4;27,2	17,2**	5,3;37,2	15,5**	3,0;40,5	8,0**	3,9;14,3	Oui
61,3	43,1;77,5	81,9	72,4;89,2	73,9	56,1;87,3	81,0	72,8;87,6	82,8	62,8;94,7	84,5	59,5;97,0	92,0	85,7;96,1	Non
														Info-Santé[p]
2,6**	0,1;13,0	2,4**	0,3;8,5	6,3**	0,5;24,0	5,6**	2,2;11,5	4,0**	0,1;21,4	5,4**	0,1;26,8	3,5**	1,0;8,5	Oui
97,4	87,0;99,9	97,6	91,5;99,7	93,7	76,0;99,5	94,4	88,5;97,8	96,0	78,6;99,9	94,6	73,2;99,9	96,5	91,5;99,0	Non
														CLSC[p]
19,6**	7,4;38,1	19,4*	11,6;29,3	17,0**	5,9;34,8	21,6*	14,0;30,9	8,2**	0,9;27,1	15,0**	2,4;41,4	12,1**	6,3;20,3	Oui
80,4	61,9;92,6	80,6	70,7;88,4	83,0	65,2;94,1	78,4	69,1;86,0	91,8	72,9;99,1	85,0	58,6;97,6	87,9	79,7;93,7	Non
														Urgence d'un hôpital[p, r]
30,7**	16,2;48,6	13,1**	6,8;22,0	76,6	59,4;89,1	25,7*	18,0;34,8	20,8**	7,5;41,1	29,3**	10,9;54,5	16,1*	9,6;24,7	Oui
69,3	51,4;83,8	86,9	78,0;93,2	23,4**	10,9;40,6	74,3	65,2;82,0	79,2	58,9;92,5	70,7	45,5;89,1	83,9	75,3;90,4	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p]
15,4**	4,2;35,6	4,7**	1,3;11,8	14,5**	4,2;32,7	12,0**	6,5;19,9	8,3**	1,0;27,0	-	;	7,1**	3,2;13,1	Oui
84,6	64,4;95,8	95,3	88,2;98,7	85,5	67,3;95,8	88,0	80,1;93,5	91,7	73,0;99,0	100,0	;	92,9	86,9;96,8	Non
														Autre professionnel de la santé[p, r]
5,7**	0,7;19,6	-	;	-	;	0,8**	0,0;4,3	-	;	-	;	-	;	Oui
94,3	80,4;99,3	100,0	;	100,0	;	99,2	95,7;100,0	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autre contact
-	;	-	;	-	;	0,8**	0,0;4,4	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	99,2	95,6;100,0	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	63,1	58,2;68,0	61,2	43,5;76,9
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	13,2	9,8;17,2	12,5**	4,2;26,9
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	23,7	19,3;28,1	26,3**	12,6;44,4
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	48,9	43,4;54,5	52,1*	33,9;69,9
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	14,0	10,3;18,3	3,1**	0,1;15,6
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	37,1	32,0;42,2	44,8*	27,2;63,4
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	46,0	40,6;51,5	49,9*	33,0;66,9
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	18,2	14,2;22,7	11,9**	3,3;27,6
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	35,8	30,6;40,9	38,2*	22,3;56,2
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	41,6	36,0;47,2	51,3*	33,5;69,0
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	15,4	11,6;19,8	2,4**	0,1;11,6
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	43,0	37,5;48,5	46,3*	29,2;64,0
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	51,5	46,4;56,5	62,3	46,4;76,5
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	18,3	14,4;22,8	17,0**	7,0;32,4
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	30,2	25,2;35,3	20,6**	9,9;35,5
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	54,5	49,3;59,6	63,9	47,1;78,5
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	18,2	14,3;22,7	15,1**	6,3;28,6
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	27,3	22,4;32,2	21,0**	9,6;37,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
74,1	52,3;89,6	61,0	45,2;75,2	68,7	49,7;84,1	67,2	57,3;77,1	67,8	45,2;85,5	86,3	55,7;98,7	48,3	36,5;60,2	Oui, tout à fait
11,3**	2,9;27,4	6,2**	1,3;17,2	12,3**	3,3;29,0	16,3*	9,5;25,2	9,3**	1,2;29,4	6,6**	0,2;31,8	17,4**	9,4;28,3	Oui, en partie
14,7**	3,7;34,9	32,8*	19,5;48,6	19,0**	7,1;37,3	16,5*	9,4;26,1	23,0**	8,0;45,6	7,2**	0,1;37,3	34,3*	22,8;47,2	Non
														La sexualité[p]
37,2*	20,8;56,0	72,6	60,5;82,6	43,6*	26,0;62,6	42,9	31,4;54,4	51,8*	28,2;74,8	48,4**	14,4;83,5	28,3*	15,6;44,2	Oui, tout à fait
16,9**	6,2;34,0	21,9*	13,0;33,3	11,7**	3,3;27,2	13,6**	6,9;23,3	10,0**	1,4;30,2	10,3**	0,2;47,2	11,0**	4,0;22,8	Oui, en partie
45,9*	27,5;65,3	5,5**	1,6;13,2	44,7*	27,0;63,4	43,4	32,2;54,7	38,3**	17,0;63,4	41,4**	10,1;79,1	60,7	44,7;75,2	Non
														Les émotions[p]
51,0*	30,7;71,1	45,3	32,2;58,4	47,7*	29,9;65,9	51,0	39,9;62,0	59,6*	37,9;78,8	52,7**	23,8;80,2	27,6*	16,6;40,9	Oui, tout à fait
11,7**	2,8;29,2	21,5**	11,8;34,2	9,6**	2,0;25,6	29,6*	20,3;40,4	4,6**	0,1;23,8	19,1**	3,2;49,9	15,3**	7,5;26,5	Oui, en partie
37,3**	18,8;59,1	33,3*	22,1;46,0	42,7*	25,3;61,5	19,4*	11,5;29,7	35,9**	17,1;58,5	28,2**	8,1;58,0	57,1	44,1;70,1	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
39,0*	20,8;59,9	48,4	35,4;61,5	43,8*	26,2;62,5	42,5	30,9;54,1	50,7*	28,3;72,9	55,6**	18,2;88,6	17,9**	8,3;31,9	Oui, tout à fait
19,8**	6,3;41,4	26,3*	16,0;39,0	16,4**	5,3;34,9	17,2**	9,3;27,9	10,6**	1,4;32,5	-	;	9,8**	3,2;21,3	Oui, en partie
41,2**	20,7;64,2	25,2*	14,7;38,4	39,9*	22,7;59,1	40,3	29,0;51,6	38,7**	18,6;62,1	44,4**	11,4;81,8	72,3	57,1;84,5	Non
														Les besoins alimentaires[p]
40,2*	22,9;59,6	44,3*	30,8;57,8	57,5*	38,2;75,2	51,7	41,1;62,4	63,3*	42,0;81,3	62,3*	32,3;86,6	44,8*	31,5;58,2	Oui, tout à fait
30,0**	13,8;51,1	24,7*	14,2;37,9	19,8**	8,3;36,7	19,4*	11,9;29,0	8,1**	0,9;26,9	15,0**	1,8;44,9	10,3**	4,1;20,5	Oui, en partie
29,7**	13,0;51,8	31,0*	18,9;45,3	22,7**	9,9;41,0	28,8*	19,6;39,5	28,7**	12,6;50,0	22,7**	4,8;53,5	44,9*	31,2;58,5	Non
														Les activités courantes[p]
51,5*	30,5;72,1	54,0	41,4;66,6	44,7*	26,0;64,4	58,8	47,7;70,0	51,5*	30,3;72,2	52,7**	20,7;83,1	50,5	37,9;63,1	Oui, tout à fait
25,5**	10,2;47,0	24,3*	13,9;37,4	24,7**	10,8;43,9	17,2*	9,8;27,1	19,4**	6,3;40,7	28,9**	5,6;65,6	7,8**	2,6;17,2	Oui, en partie
23,0**	8,4;44,8	21,7**	11,4;35,5	30,6**	14,4;51,5	24,0*	14,8;35,2	29,1**	12,4;51,3	18,5**	2,2;52,8	41,7*	28,5;54,8	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	90,8	87,8;93,2	94,2	80,8;99,3
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	7,2*	5,1;9,8	5,8**	0,7;19,2
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	2,0**	1,0;3,7	-	;
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	68,7	64,6;72,9	63,6	48,1;77,2
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	24,9	21,0;28,8	36,4*	22,8;51,9
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	4,7*	3,0;6,9	-	;
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	1,8**	0,7;3,5	-	;
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	69,0	64,8;73,2	72,4	57,0;84,8
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	14,8	11,7;18,4	14,0**	5,7;27,2
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	16,2	12,8;20,0	13,5**	5,6;26,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
84,7	66,8;95,2	90,1	81,4;95,6	86,1	70,5;95,3	88,9	81,5;94,1	94,0	80,4;99,2	90,0	66,2;99,0	94,1	88,1;97,7	Oui, tout à fait
13,0**	3,5;30,6	5,9**	2,0;13,0	13,9**	4,7;29,5	8,6**	4,1;15,4	6,0**	0,8;19,6	5,0**	0,1;26,7	4,2**	1,4;9,8	Oui, en partie
2,3**	0,0;12,8	4,1**	0,8;11,9	-	;	2,5**	0,5;7,0	-	;	5,0**	0,1;26,1	1,6**	0,2;5,7	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
58,4	41,0;74,4	81,1	71,3;88,7	51,9*	33,2;70,3	71,7	63,0;79,4	73,6	55,4;87,3	80,4	57,4;94,3	64,2	54,5;74,0	Toujours
33,9*	19,2;51,3	15,5**	8,6;24,8	43,0*	25,3;62,2	25,0*	17,8;33,2	19,5**	7,8;37,1	14,6**	3,2;36,5	21,3*	13,4;31,1	La plupart du temps
7,7**	1,5;21,7	2,3**	0,3;7,9	2,6**	0,1;13,2	3,3**	0,8;8,5	6,9**	0,8;22,9	-	;	9,5**	4,5;17,1	À l'occasion
-	;	1,1**	0,0;5,8	2,4**	0,0;13,3	-	;	-	;	5,0**	0,1;26,1	5,0**	1,6;11,7	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
71,7	53,6;85,8	77,0	65,9;85,9	54,9*	36,1;72,8	64,9	55,5;74,3	64,4*	42,5;82,6	89,8	66,1;98,9	66,3	57,2;75,3	Oui, tout à fait
9,1**	2,4;22,3	12,1**	5,7;21,7	24,2**	10,9;42,6	21,7*	14,0;31,1	11,4**	2,3;30,3	5,6**	0,1;27,6	12,4**	6,7;20,3	Oui, en partie
19,2**	7,2;37,8	10,9**	5,4;19,0	20,9**	8,7;38,6	13,4*	7,8;21,1	24,2**	9,1;46,3	4,7**	0,0;27,6	21,4*	13,6;31,0	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	78,1	74,3;82,0	80,2	66,0;90,4
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	12,1	9,2;15,6	11,6**	4,1;24,5
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	9,8	7,1;13,0	8,2**	2,3;19,5
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	90,7	87,4;93,4	93,6	79,2;99,2
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	7,4*	5,0;10,5	6,4**	0,8;20,8
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	1,9**	0,8;3,7	-	;
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	71,5	64,1;78,1	84,1	66,9;94,5
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	16,5*	11,0;23,3	3,6**	0,2;15,6
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	12,0*	7,3;18,2	12,4**	3,1;30,2
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	51,0	44,6;57,5	36,5**	14,8;63,2
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	25,5	19,9;31,2	32,2**	12,3;58,3
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	23,4	18,0;28,8	31,3**	12,4;56,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
70,6	51,1;85,8	78,9	68,6;87,0	62,1	44,5;77,7	78,3	69,7;85,4	85,5	67,3;95,8	71,7*	44,1;90,9	82,9	74,4;89,4	Aucun report
12,5**	3,2;30,1	10,9**	5,1;19,8	13,7**	4,6;29,1	11,3**	6,1;18,7	10,2**	2,2;27,0	24,1**	6,7;51,6	11,7**	6,1;19,7	Un report
16,9**	6,2;33,9	10,2**	4,5;18,9	24,2**	11,0;42,4	10,4**	5,5;17,5	4,3**	0,1;21,8	4,2**	0,1;23,5	5,5**	2,0;11,6	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
95,5	84,3;99,5	81,3	68,0;90,8	65,6*	39,1;86,5	92,9	86,6;96,8	92,9	76,0;99,2	69,9*	34,1;93,6	94,2	88,2;97,7	Aucun report
4,5**	0,5;15,7	16,8**	7,9;29,7	20,1**	4,9;46,4	5,4**	2,0;11,4	7,1**	0,8;24,0	20,1**	2,1;58,0	4,2**	1,4;9,4	Un report
-	;	1,9**	0,0;10,4	14,3**	1,6;44,3	1,7**	0,2;6,2	-	;	9,9**	0,2;45,8	1,6**	0,2;5,8	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
65,4*	39,8;85,7	-	;	53,4*	34,5;71,6	75,2	60,9;86,4	79,9**	17,9;99,9	82,4*	32,4;99,6	71,3	47,4;88,8	Aucun report
8,7**	0,8;30,8	-	;	27,4**	12,5;47,4	15,0**	6,3;28,4	20,1**	0,1;82,1	17,6**	0,4;67,6	28,7**	11,2;52,6	Un report
25,9**	9,1;50,2	-	;	19,2**	7,4;37,1	9,8**	3,1;22,1	-	;	-	;	-	;	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
25,7**	7,4;53,9	40,6*	25,1;57,7	75,9*	33,6;97,6	53,9	44,0;63,8	81,8	57,9;95,4	48,3**	12,3;85,7	50,5**	24,4;76,4	Aucun report
33,1**	11,5;61,8	20,4**	9,6;35,6	-	;	27,1*	18,8;36,8	9,9**	1,2;31,4	42,9**	9,3;82,6	38,7**	16,2;65,5	Un report
41,1**	16,8;69,1	39,0*	24,2;55,5	24,1**	2,4;66,4	19,0*	11,4;28,8	8,4**	0,8;29,5	8,7**	0,1;45,5	10,8**	1,1;35,6	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	7,4*	5,3;10,0	1,7**	0,0;9,7
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	6,9*	4,6;9,8	5,6**	0,7;18,9
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	85,7	82,1;88,9	92,7	79,2;98,7
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	23,9	20,2;27,6	44,8*	31,2;58,3
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	8,4*	6,0;11,3	5,5**	1,1;15,6
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	67,7	63,7;71,7	49,7	35,3;64,2
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	44,4	40,0;48,8	61,1	46,7;74,3
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	2,7**	1,5;4,6	3,6**	0,1;16,9
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	52,9	48,4;57,4	35,3*	22,6;49,6
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	7,9*	5,6;10,6	3,3**	0,1;15,9
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	7,1*	5,1;9,7	5,3**	1,1;14,8
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	85,0	81,7;87,9	91,4	79,9;97,5
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	9,0*	6,4;12,1	16,2**	6,3;31,6
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	5,0*	3,2;7,3	9,8**	3,2;21,4
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	86,0	82,5;89,1	74,0	59,1;85,8
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	25,8	21,8;29,7	48,0	34,2;61,9
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	5,3*	3,5;7,6	-	;
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	69,0	64,8;73,1	52,0	38,1;65,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
4,8**	0,6;16,1	9,1**	3,6;18,1	16,4**	6,2;32,5	9,8**	5,0;16,7	6,8**	0,9;22,0	5,5**	0,1;27,2	5,4**	1,9;11,7	Oui
8,6**	1,8;23,4	3,8**	0,8;10,5	5,9**	0,7;20,0	11,7**	6,2;19,5	7,1**	0,9;23,4	7,3**	0,2;34,8	4,8**	1,8;10,1	Non, mais il aurait souhaité le consulter
86,6	70,7;95,7	87,1	76,8;94,0	77,7	60,6;89,9	78,5	70,0;85,6	86,1	68,3;96,1	87,2	59,4;98,6	89,8	82,7;94,7	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
38,2*	21,5;57,2	15,4**	8,3;25,3	46,8*	30,1;64,1	12,3**	6,8;20,1	43,2*	24,7;63,2	18,6**	4,3;44,4	16,1*	9,6;24,7	Oui
12,7**	3,2;30,7	3,7**	0,8;9,9	8,4**	1,6;23,3	16,2*	10,1;24,0	10,5**	1,9;29,3	7,0**	0,2;33,4	4,0**	1,4;8,8	Non, mais il aurait souhaité le consulter
49,2*	30,4;68,1	80,9	70,7;88,8	44,8*	28,0;62,5	71,5	63,0;79,1	46,3*	26,8;66,6	74,4	46,6;92,6	79,9	71,1;86,9	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
58,9	40,6;75,5	29,6*	18,9;42,3	86,1	71,4;95,1	47,7	38,3;57,1	40,3*	22,0;60,7	40,2**	18,9;64,6	29,4*	20,8;39,2	Oui
2,1**	0,1;11,1	-	;	3,1**	0,1;15,7	6,0**	2,4;12,4	3,6**	0,1;17,6	-	;	1,5**	0,2;5,1	Non, mais il aurait souhaité le consulter
39,0*	22,3;57,8	70,4	57,7;81,1	10,7**	3,2;24,5	46,2	36,7;55,7	56,2*	35,9;75,0	59,8*	35,4;81,1	69,1	60,2;78,0	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
14,3**	5,3;28,9	3,7**	0,9;9,9	15,6**	5,5;32,0	12,2*	6,9;19,4	-	;	5,3**	0,1;27,9	6,8**	2,8;13,4	Oui
7,3**	1,4;20,8	2,2**	0,3;7,1	8,3**	1,7;22,4	9,6**	4,9;16,3	14,6**	4,0;33,6	-	;	7,9**	3,9;13,9	Non, mais il aurait souhaité le consulter
78,4	62,1;90,0	94,1	86,9;98,0	76,2	58,9;88,9	78,3	70,1;85,1	85,4	66,4;96,0	94,7	72,1;99,9	85,2	77,7;91,0	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
7,4**	1,4;21,0	3,2**	0,4;10,8	27,3**	13,8;44,9	5,0**	1,8;10,9	9,5**	1,9;25,7	7,3**	0,2;34,8	8,6**	3,8;16,1	Oui
8,7**	1,6;24,9	1,1**	0,0;6,3	2,3**	0,0;12,9	5,1**	1,8;10,9	7,4**	1,0;23,8	-	;	5,1**	2,1;10,1	Non, mais il aurait souhaité le consulter
83,9	66,1;94,6	95,6	88,4;99,0	70,3	52,9;84,3	89,9	82,8;94,7	83,1	64,8;94,3	92,7	65,2;99,8	86,3	78,4;92,1	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
33,7*	18,1;52,5	32,0*	22,0;42,0	25,1**	12,1;42,4	18,6*	11,5;27,8	25,1**	10,6;45,2	14,6**	3,2;36,6	17,7*	10,8;26,5	Oui
3,8**	0,1;21,2	4,7**	1,2;11,9	8,3**	1,7;22,7	8,5**	4,3;14,7	6,8**	0,9;22,1	11,0**	1,2;35,8	3,3**	1,0;8,2	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
62,4	43,7;78,8	63,3	53,2;73,4	66,6	47,7;82,2	72,8	63,5;80,9	68,1	47,5;84,6	74,4	49,3;91,4	79,0	69,9;86,4	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	9,9	7,7;12,5	11,4**	3,9;24,2
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	8,2*	5,8;11,2	7,1**	1,9;17,6
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	81,9	78,4;85,0	81,5	66,8;91,6
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	8,7	6,4;11,4	5,2**	0,7;17,3
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	7,1*	5,0;9,8	12,0**	4,7;24,1
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	84,2	80,7;87,3	82,8	68,7;92,3
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	7,4*	5,0;10,4	10,1**	3,0;23,3
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	12,5	9,8;15,5	15,9**	6,3;30,9
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	80,2	76,4;83,6	74,0	58,4;86,2
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	7,1*	5,0;9,8	7,7**	2,1;18,8
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	3,2**	1,8;5,2	9,1**	2,5;21,6
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	89,6	86,6;92,2	83,2	69,3;92,6
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	5,0*	3,2;7,5	18,8**	8,0;34,7
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	7,7*	5,5;10,5	8,0**	2,3;18,7
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	87,2	84,0;90,0	73,2	57,3;85,7
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	11,4	8,4;14,9	24,6**	12,5;40,7
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	5,4*	3,6;7,6	5,6**	1,2;15,3
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	83,3	79,3;86,7	69,8	54,1;82,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
13,9**	4,7;29,3	3,8**	0,7;10,9	14,0**	4,1;31,4	17,2*	11,0;25,1	3,1**	0,1;16,6	4,2**	0,1;22,1	6,9**	3,1;13,0	Oui
19,3**	7,9;36,4	4,5**	1,3;10,8	7,5**	1,5;20,7	11,5**	6,2;18,9	7,3**	0,7;25,5	9,1**	1,1;29,3	5,0**	1,9;10,3	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
66,8	48,1;82,3	91,8	83,8;96,6	78,5	60,9;90,8	71,3	62,2;79,3	89,6	71,3;98,0	86,7	65,6;97,2	88,1	81,4;93,1	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
12,4**	4,0;27,3	12,0**	5,9;21,1	11,1**	2,9;26,8	13,5*	8,2;20,5	3,1**	0,1;17,1	6,6**	0,2;32,0	3,1**	0,9;7,6	Oui
2,8**	0,0;15,9	3,2**	0,7;9,3	12,9**	4,4;27,5	5,0**	1,8;10,7	14,3**	3,8;33,5	5,0**	0,2;23,9	8,1**	4,1;14,1	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
84,7	68,8;94,5	84,7	75,1;91,8	75,9	59,4;88,3	81,5	73,5;87,9	82,6	62,7;94,6	88,4	65,0;98,4	88,8	81,8;93,8	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
4,7**	0,5;16,7	3,0**	0,4;10,2	4,6**	0,4;16,9	3,9**	1,3;8,9	6,5**	0,6;23,6	23,7**	6,6;50,7	11,5**	6,1;19,3	Oui
21,7**	9,6;38,9	11,5**	5,5;20,4	22,4**	10,6;38,5	14,0*	8,4;21,4	7,1**	0,7;25,0	15,4**	3,2;39,1	5,5**	2,3;10,8	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
73,6	55,4;87,3	85,5	75,9;92,3	73,0	56,3;86,0	82,1	74,4;88,3	86,4	66,4;96,8	60,9*	35,4;82,7	83,0	75,0;89,3	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
12,3**	3,7;27,7	2,8**	0,3;9,7	10,1**	2,7;24,4	8,5**	4,1;15,2	3,0**	0,1;16,5	9,9**	1,1;32,7	6,8**	3,1;12,5	Oui
3,2**	0,1;17,3	2,2**	0,3;7,4	-	;	3,5**	0,9;9,1	3,5**	0,1;19,5	-	;	2,5**	0,6;6,9	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
84,5	68,2;94,5	95,0	87,8;98,6	89,9	75,6;97,3	88,0	80,3;93,5	93,5	76,4;99,4	90,1	67,3;98,9	90,7	84,4;95,1	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
4,8**	0,5;16,9	-	;	2,4**	0,0;14,2	3,2**	0,6;9,5	3,3**	0,1;17,0	6,3**	0,1;30,9	5,3**	1,9;11,5	Oui
12,0**	3,8;26,6	5,7**	1,8;13,0	7,8**	1,6;21,5	12,5*	7,1;19,9	13,9**	4,1;31,4	4,8**	0,1;25,7	2,3**	0,5;6,3	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
83,2	67,2;93,5	94,3	87,0;98,2	89,8	75,7;97,2	84,4	76,4;90,5	82,8	64,6;94,0	89,0	64,2;98,8	92,5	85,7;96,7	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
24,8**	11,2;43,4	10,9**	5,0;20,0	13,3**	4,6;28,2	6,5**	2,8;12,7	10,8**	2,2;28,8	14,0**	2,5;38,1	5,4**	1,8;12,3	Oui
2,2**	0,0;12,0	7,6**	3,0;15,2	6,2**	0,8;20,0	8,0**	3,7;14,5	3,3**	0,0;19,0	12,1**	1,3;38,7	1,5**	0,2;5,2	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
73,0	54,3;87,2	81,5	71,4;89,2	80,5	63,9;91,8	85,5	77,7;91,4	85,8	67,2;96,1	73,9*	46,2;92,2	93,1	86,1;97,3	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	4,2*	2,7;6,1	-	;
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	95,8	93,9;97,3	100,0	;
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	21,9**	7,0;45,2	-	;
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	78,1	54,8;93,0	-	;
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	..	;	..	;
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	..	;	..	;
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	21,0**	6,7;43,7	-	;
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	79,0	56,3;93,3	-	;
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	4,2**	0,1;23,1	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	95,8	76,9;99,9	-	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	43,8*	22,6;66,9	-	;
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	56,2*	33,1;77,4	-	;
Médicaments[r]													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	25,6**	8,4;51,2	-	;
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	74,4	48,8;91,6	-	;
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	38,6**	17,4;63,6	-	;
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	61,4*	36,4;82,6	-	;
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	36,1**	16,7;59,5	-	;
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	63,9*	40,5;83,3	-	;
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	9,7**	1,1;31,7	-	;
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	90,3	68,3;98,9	-	;
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	14,2**	3,1;35,9	-	;
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	85,8	64,1;96,9	-	;
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	-	;	-	;
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	100,0	;	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]
7,0**	1,5;19,2	-	;	10,7**	3,2;24,3	9,7**	4,9;16,9	-	;	-	;	2,9**	0,9;7,0	Oui
93,0	80,8;98,5	100,0	;	89,3	75,7;96,8	90,3	83,1;95,1	100,0	;	100,0	;	97,1	93,0;99,1	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	-	;	30,3**	0,5;89,9	25,1**	4,3;61,2	-	;	-	;	21,8**	0,1;83,6	Oui
100,0	;	-	;	69,7**	10,1;99,5	74,9*	38,8;95,7	-	;	-	;	78,2**	16,4;99,9	Non
														Nutritionniste ou diététiste
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Oui
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Non
														Psychologue
34,4**	0,4;94,5	-	;	46,5**	3,1;95,0	16,3**	2,0;48,1	-	;	-	;	-	;	Oui
65,6**	5,5;99,6	-	;	53,5**	5,0;96,9	83,7	51,9;98,0	-	;	-	;	100,0	;	Non
														Travailleur social
-	;	-	;	-	;	8,4**	0,1;43,0	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	91,6	57,0;99,9	-	;	-	;	100,0	;	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
100,0	;	-	;	69,7**	10,1;99,5	16,3**	1,4;52,2	-	;	-	;	53,1**	5,1;96,6	Oui
-	;	-	;	30,3**	0,5;89,9	83,7	47,8;98,6	-	;	-	;	46,9**	3,4;94,9	Non
														Médicaments[r]
-	;	-	;	76,8**	11,7;99,9	24,5**	2,8;65,7	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	23,2**	0,1;88,3	75,5*	34,3;97,2	-	;	-	;	100,0	;	Non
														Services de transport
34,4**	0,4;94,5	-	;	23,2**	0,1;88,3	34,1**	7,5;71,4	-	;	-	;	68,8**	9,2;99,5	Oui
65,6**	5,5;99,6	-	;	76,8**	11,7;99,9	65,9*	28,6;92,5	-	;	-	;	31,2**	0,5;90,8	Non
														Services d'aide à domicile
34,4**	0,4;94,5	-	;	-	;	33,3**	7,5;70,0	-	;	-	;	79,0**	15,9;99,9	Oui
65,6**	5,5;99,6	-	;	100,0	;	66,7*	30,0;92,5	-	;	-	;	21,0**	0,1;84,1	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
29,0**	0,1;93,9	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	31,2**	0,5;90,8	Oui
71,0**	6,1;99,9	-	;	100,0	;	100,0	;	-	;	-	;	68,8**	9,2;99,5	Non
														Soins infirmiers à domicile
-	;	-	;	30,3**	0,5;89,9	8,4**	0,2;40,6	-	;	-	;	25,9**	0,3;86,8	Oui
100,0	;	-	;	69,7**	10,1;99,5	91,6	59,4;99,8	-	;	-	;	74,1**	13,2;99,7	Non
														Autres services ou ressources
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	-	;	-	;	100,0	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	96,4	94,1;98,0	97,5	86,4;99,9
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	3,6**	2,0;5,9	2,5**	0,1;13,6
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	45,3	40,7;49,9	42,5*	27,0;59,2
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	10,5	7,7;13,8	21,4**	9,7;37,8
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	29,1	24,8;33,4	24,8**	12,9;40,3
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	15,1	11,9;18,8	11,3**	3,7;24,5
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	36,6	32,4;40,8	30,4*	17,6;46,0
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	21,1	17,3;24,8	37,7*	23,5;53,5
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	24,4	20,4;28,4	15,5**	6,5;29,3
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	17,9	14,5;21,7	16,4**	6,6;31,5
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	6,8*	4,5;9,8	8,7**	2,3;21,4
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	5,1*	3,2;7,8	9,9**	2,1;25,9
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	14,2	11,2;17,6	22,3**	11,1;37,6
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	9,7	7,2;12,9	6,2**	1,2;17,7
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	52,6	47,6;57,6	46,1*	30,0;62,8
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	11,6	8,8;14,9	6,8**	1,4;18,6
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	1,2**	0,4;2,8	2,7**	0,1;13,7
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	6,8*	4,8;9,2	3,9**	0,4;13,7
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	92,1	89,4;94,3	93,4	81,6;98,7
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	89,0	85,6;91,9	89,3	73,8;97,3
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	10,1	7,3;13,4	10,7**	2,7;26,2
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	0,9**	0,2;2,5	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
96,1	78,4;99,9	95,3	88,5;98,6	95,1	82,3;99,5	96,7	92,2;99,0	100,0	;	100,0	;	95,2	87,6;98,8	Oui
3,9**	0,1;21,6	4,7**	1,4;11,5	4,9**	0,5;17,7	3,3**	1,0;7,8	-	;	-	;	4,8**	1,2;12,4	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
51,1*	33,2;68,8	66,7	56,5;76,8	85,3	68,5;95,2	40,4	31,0;49,8	41,2*	23,4;61,0	47,1**	22,1;73,2	23,7*	16,1;32,9	Médecin spécialiste du cancer
-	;	2,5**	0,3;8,9	3,4**	0,1;16,7	14,2*	8,1;22,6	3,1**	0,1;16,7	5,4**	0,1;26,2	16,4*	9,3;25,8	Médecin de famille
30,7**	15,7;49,5	19,4*	11,7;29,3	3,6**	0,1;17,4	20,9*	13,8;29,5	43,3*	24,9;63,2	20,7**	5,8;45,5	50,0	39,8;60,1	Autre médecin spécialiste
18,2**	8,1;32,9	11,4**	5,3;20,7	7,7**	1,4;22,0	24,5*	16,6;33,7	12,3**	3,1;30,2	26,8**	8,5;53,8	9,9**	4,9;17,5	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
34,0**	17,9;53,4	55,7	44,6;66,8	78,6	60,9;90,9	29,5*	21,0;39,2	34,4*	18,6;53,2	47,6*	24,7;71,2	20,3*	13,3;28,8	Médecin spécialiste du cancer
13,1**	4,1;28,9	11,4**	5,3;20,6	3,6**	0,1;17,5	25,2*	17,0;35,0	12,1**	3,2;28,6	24,9**	8,4;49,5	26,1*	17,3;36,6	Médecin de famille
26,2**	12,7;44,1	15,5**	8,5;25,1	-	;	17,9*	11,2;26,3	35,5*	19,6;54,0	18,8**	5,2;41,9	45,8	35,8;55,9	Autre médecin spécialiste
26,7**	12,5;45,4	17,4*	9,9;27,4	17,8**	6,9;34,8	27,4*	19,2;37,0	18,1**	6,6;36,1	8,7**	0,7;32,0	7,8**	3,3;15,1	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
2,4**	0,0;13,5	6,7**	2,2;15,0	-	;	9,1**	4,0;17,3	5,8**	0,7;19,6	10,9**	1,3;34,7	6,3**	2,3;13,5	Au besoin
8,4**	1,6;23,3	2,7**	0,3;9,4	5,7**	0,6;19,9	4,4**	1,5;9,8	3,0**	0,1;16,3	11,0**	1,1;36,7	3,8**	1,0;9,6	À tous les mois
11,0**	2,9;26,5	6,2**	1,9;14,6	34,3*	18,6;53,0	10,7**	5,8;17,6	13,4**	3,6;31,4	37,0**	16,3;62,0	11,6**	6,3;19,2	À tous les 2 ou 3 mois
12,1**	3,2;29,0	5,3**	1,6;12,6	13,7**	4,5;29,3	13,4*	7,5;21,4	9,2**	2,0;24,4	4,6**	0,1;25,6	10,2**	4,9;18,2	À tous les 4 mois
60,8	42,0;77,6	68,7	56,9;79,0	38,4*	20,9;58,4	49,3	39,7;58,9	44,2*	26,1;63,5	36,4**	16,1;61,1	53,4	42,9;63,9	À tous les 6 mois
5,3**	0,6;18,4	10,3**	4,6;19,1	7,9**	1,0;25,2	13,1*	7,5;20,8	24,5**	11,0;43,0	-	;	14,6*	8,3;23,2	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	-	;	-	;	0,7**	0,0;4,4	3,4**	0,1;17,4	6,1**	0,1;31,1	1,0**	0,0;5,2	Trop long
7,7**	1,5;21,6	10,2**	4,6;19,1	10,4**	2,1;28,2	2,6**	0,5;7,4	6,8**	0,8;23,2	-	;	9,8**	4,6;17,7	Trop court
92,3	78,4;98,5	89,8	80,9;95,4	89,6	71,8;97,9	96,7	91,4;99,2	89,8	72,5;98,0	93,9	68,9;99,9	89,2	80,9;94,8	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
84,1	68,2;94,0	93,9	86,3;98,0	80,2	59,6;93,2	89,4	81,8;94,5	87,2	70,1;96,4	95,3	77,2;99,9	88,0	79,0;94,1	Tout à fait capable
13,6**	4,6;29,0	6,1**	2,0;13,7	19,8**	6,8;40,4	8,6**	4,3;15,0	12,8**	3,6;29,9	4,7**	0,1;22,8	11,0**	5,0;20,2	En partie capable
2,3**	0,0;13,4	-	;	-	;	2,0**	0,2;7,6	-	;	-	;	1,0**	0,0;5,1	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	60,0	55,2;64,9	67,8	51,8;81,3
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	16,8	13,2;20,9	13,6**	5,3;26,9
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	23,2	19,1;27,3	18,6**	8,3;33,6
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	46,2	36,2;56,3	26,8**	0,8;82,3
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	53,8	43,7;63,8	73,2**	17,7;99,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
43,6*	26,5;61,8	56,4	45,5;67,4	68,7	48,3;84,9	60,4	51,4;69,5	57,9*	38,5;75,7	68,1	44,5;86,5	61,5	51,5;71,5	Oui, tout à fait
19,7**	7,3;38,7	16,2**	8,5;26,9	16,5**	5,2;35,5	19,6*	12,3;28,8	9,6**	2,0;25,6	14,1**	3,1;35,7	17,4*	10,5;26,4	oui, en partie
36,8*	20,5;55,6	27,4*	18,1;38,5	14,9**	4,6;32,6	19,9*	12,5;29,2	32,5**	16,6;52,1	17,8**	4,5;41,2	21,1*	13,3;30,8	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
53,0**	14,0;89,4	52,4**	20,9;82,4	48,2**	19,8;77,5	58,6*	38,6;76,8	26,2**	2,2;71,9	100,0	;	25,5**	6,6;55,3	Oui
47,0**	10,6;86,0	47,6**	17,6;79,1	51,8**	22,5;80,2	41,4*	23,2;61,4	73,8*	28,1;97,8	-	;	74,5*	44,7;93,4	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	22,2	18,7;25,7	32,6*	19,9;47,5
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	43,0	38,8;47,3	34,8*	22,3;49,0
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	34,8	30,8;38,8	32,6*	20,2;47,2
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	26,5	22,6;30,3	32,5*	20,0;47,0
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	40,5	36,5;44,6	42,3*	28,1;57,5
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	33,0	29,1;36,9	25,3*	14,5;38,8
Modification de l'alimentation[p]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	34,4	30,4;38,5	41,8*	27,9;56,6
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	31,0	27,1;34,9	27,0**	14,5;42,9
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	34,5	30,4;38,7	31,2*	18,7;46,2
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	10,8	8,3;13,8	10,8**	4,3;21,6
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	7,7*	5,5;10,5	11,3**	4,5;22,2
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	81,4	77,9;84,6	77,9	65,3;87,6
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	0,8**	0,2;2,2	-	;
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	2,8**	1,6;4,6	3,1**	0,4;10,6
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	96,4	94,3;97,9	96,9	89,4;99,6
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	5,1*	3,4;7,3	6,2**	1,4;16,8
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	8,8	6,5;11,5	4,7**	0,9;13,6
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	86,1	83,0;88,9	89,1	77,8;95,9
Gestion du stress[p]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	29,5	25,6;33,4	16,9**	7,7;30,2
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	25,5	21,7;29,3	24,1*	13,3;37,9
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	45,0	40,5;49,5	59,1	45,5;72,7

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p]
25,3**	13,4;40,8	17,7*	10,0;28,0	38,9*	22,9;56,9	25,3*	17,9;33,8	3,4**	0,1;18,9	26,8**	9,8;51,0	16,4*	10,5;24,0	Oui
43,5*	27,0;61,2	38,4	27,4;50,4	35,0*	19,5;53,3	47,0	38,2;55,8	64,5	42,9;82,4	47,8*	26,0;70,2	42,1	32,7;51,6	Non
31,2*	17,0;48,4	43,8	32,3;55,3	26,1**	12,9;43,3	27,7	20,1;36,5	32,1**	15,0;53,8	25,4**	8,4;50,7	41,5	32,4;50,5	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
25,9**	12,4;43,9	24,7*	15,7;35,7	23,1**	10,7;40,2	26,2*	18,4;35,2	21,7**	9,3;39,5	17,6**	3,4;44,8	28,9*	20,5;38,5	Oui
37,2*	21,0;55,8	41,6	31,2;52,1	30,5*	16,9;47,3	44,6	35,6;53,6	39,7*	21,9;59,8	65,8*	40,7;85,7	34,9	26,2;43,6	Non
36,9*	20,6;55,7	33,6*	23,7;43,6	46,4*	30,2;63,2	29,2	21,2;38,3	38,6*	20,8;58,9	16,6**	4,4;38,1	36,2	27,4;45,1	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p]
38,1*	23,2;54,9	18,1*	10,9;27,4	40,9*	24,8;58,6	38,6	30,2;47,1	36,9*	20,1;56,5	23,8**	7,7;48,5	36,8	28,0;45,6	Oui
29,3**	15,3;46,8	37,0	27,2;46,8	35,3*	20,4;52,7	25,0*	17,3;34,0	30,0**	14,7;49,4	55,1*	32,6;76,2	29,7	21,5;39,0	Non
32,6**	17,3;51,1	44,9	34,5;55,3	23,7**	11,4;40,5	36,4	28,2;44,6	33,1*	17,8;51,6	21,1**	6,6;44,3	33,5	24,9;42,1	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
-	;	6,4**	2,1;14,2	11,1**	2,9;26,8	15,7*	10,0;23,1	17,7**	6,6;35,2	25,8**	9,1;50,1	8,5**	4,4;14,5	Oui
2,2**	0,0;12,1	8,0**	3,3;15,7	2,4**	0,0;13,3	10,4**	5,5;17,2	10,0**	2,0;27,3	8,7**	0,9;29,9	6,0**	2,6;11,6	Non
97,8	87,9;100,0	85,7	76,1;92,5	86,5	70,3;95,8	73,9	65,1;81,5	72,3	53,3;86,8	65,5*	41,0;85,1	85,5	78,4;90,9	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	-	;	-	;	1,7**	0,2;6,3	-	;	4,3**	0,1;23,5	1,0**	0,0;5,4	Oui
3,1**	0,1;16,9	4,8**	1,4;11,7	2,0**	0,0;12,0	2,0**	0,2;7,2	2,9**	0,1;15,5	5,8**	0,1;28,6	1,6**	0,2;5,6	Non
96,9	83,1;99,9	95,2	88,3;98,6	98,0	88,0;100,0	96,3	90,5;99,0	97,1	84,5;99,9	90,0	67,3;98,9	97,4	92,8;99,4	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
-	;	4,9**	1,3;12,5	-	;	6,2**	2,6;12,0	5,7**	0,6;19,9	8,6**	0,9;29,0	5,9**	2,4;12,0	Oui
5,0**	0,5;17,5	13,4**	7,3;21,8	9,6**	2,6;22,8	6,3**	2,7;12,1	15,9**	5,0;34,4	24,0**	7,9;48,4	6,2**	2,7;11,8	Non
95,0	82,5;99,5	81,7	71,6;89,4	90,4	77,2;97,4	87,5	80,3;92,9	78,3	59,2;91,3	67,4*	42,9;86,4	87,9	80,5;93,2	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p]
35,4*	21,7;51,2	18,2*	10,5;28,4	54,3*	36,8;71,1	44,8	35,6;54,1	22,5**	9,0;42,1	21,2**	6,6;44,4	24,1*	16,4;33,1	Oui
27,3**	13,2;45,6	25,4*	16,8;35,7	28,3**	13,8;47,1	22,8*	15,5;31,5	30,4**	14,4;50,8	26,3**	9,8;49,8	26,0*	18,4;34,9	Non
37,3*	22,0;54,7	56,4	45,7;67,0	17,4**	7,1;33,0	32,4	23,6;41,3	47,2*	28,1;66,8	52,5*	29,4;74,8	49,9	40,7;59,1	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	41,2	36,9;45,6	43,9*	29,6;59,0
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	16,0	12,9;19,5	19,6**	9,9;32,8
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	42,8	38,4;47,2	36,5*	23,1;51,6
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	1,7**	0,6;3,5	5,0**	0,9;14,5
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	98,3	96,5;99,4	95,0	85,5;99,1
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	0,2**	0,0;0,8	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	99,8	99,2;100,0	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]
28,6**	13,8;47,8	27,8*	19,0;38,0	58,7	40,0;75,8	40,9	32,3;49,4	15,7**	4,7;34,7	32,2**	13,7;56,0	56,4	47,4;65,4	Oui
7,0**	1,3;20,1	32,3*	22,6;42,1	20,2**	8,2;38,0	10,6**	5,2;18,4	21,6**	8,7;40,5	4,8**	0,1;24,3	10,3**	5,4;17,3	Non
64,3	45,3;80,5	39,9	29,7;50,0	21,1**	9,6;37,3	48,6	39,2;58,0	62,6	42,6;79,9	63,0*	39,4;82,7	33,3	24,7;41,9	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
9,6**	1,6;27,7	-	;	2,3**	0,0;12,9	0,9**	0,0;5,4	-	;	-	;	-	;	Oui
90,4	72,3;98,4	100,0	;	97,7	87,1;100,0	99,1	94,6;100,0	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autre
-	;	-	;	2,4**	0,1;11,7	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	97,6	88,3;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	61,6	53,0;70,2	75,2	47,3;93,0
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	38,4	29,8;47,0	24,8**	7,0;52,7
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	78,2	71,5;84,0	65,9	44,8;83,3
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	21,8	16,0;28,5	34,1**	16,7;55,2
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	43,2	33,2;53,1	41,6**	13,1;75,1
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	56,8	46,9;66,8	58,4**	24,9;86,9
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	23,8*	15,0;34,5	22,5**	2,3;63,0
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	76,2	65,5;85,0	77,5*	37,0;97,7
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	16,3*	10,4;23,7	7,9**	0,2;37,5
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	83,7	76,3;89,6	92,1	62,5;99,8
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	51,2	43,3;59,1	51,6*	27,5;75,2
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	48,8	40,9;56,7	48,4*	24,8;72,5
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	65,0	58,0;72,1	70,0*	43,2;89,4
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	35,0	27,9;42,0	30,0**	10,6;56,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
75,0*	39,9;95,4	60,4**	25,9;88,5	69,6*	29,8;94,9	49,7*	31,2;68,2	17,8**	0,0;80,2	67,8**	6,0;99,7	66,4	43,8;84,5	Oui
25,0**	4,6;60,1	39,6**	11,5;74,1	30,4**	5,1;70,2	50,3*	31,8;68,8	82,2**	19,8;100,0	32,2**	0,3;94,0	33,6**	15,5;56,2	Non
														Soutien de la famille ou des amis
85,1	61,5;97,0	75,9	50,8;92,4	85,4	61,7;97,2	87,3	74,8;95,0	62,6**	27,2;90,0	69,1**	21,4;97,2	76,5	59,9;88,7	Oui
14,9**	3,0;38,5	24,1**	7,6;49,2	14,6**	2,8;38,3	12,7**	5,0;25,2	37,4**	10,0;72,8	30,9**	2,8;78,6	23,5**	11,3;40,1	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
40,9**	7,3;82,9	27,8**	3,0;72,0	81,7*	41,8;98,7	60,5*	37,7;80,4	16,4**	0,1;71,9	45,2**	7,8;87,5	24,6**	8,9;47,6	Oui
59,1**	17,1;92,7	72,2*	28,0;97,0	18,3**	1,3;58,2	39,5**	19,6;62,3	83,6*	28,1;99,9	54,8**	12,5;92,2	75,4	52,4;91,1	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
10,5**	0,2;48,1	38,1**	9,9;74,1	49,1**	17,9;80,8	21,6**	7,5;43,4	-	;	73,2**	5,9;100,0	10,0**	1,2;31,8	Oui
89,5	51,9;99,8	61,9**	25,9;90,1	50,9**	19,2;82,1	78,4	56,6;92,5	100,0	;	26,8**	0,0;94,1	90,0	68,2;98,8	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
12,2**	1,2;40,0	23,6**	4,9;55,6	36,1**	9,3;71,6	15,8**	5,7;31,9	15,6**	0,1;69,9	31,7**	0,2;94,6	10,5**	2,2;27,7	Oui
87,8	60,0;98,8	76,4*	44,4;95,1	63,9*	28,4;90,7	84,2	68,1;94,3	84,4*	30,1;99,9	68,3**	5,4;99,8	89,5	72,3;97,8	Non
														Exemple de l'entourage[p]
51,7*	25,9;76,9	29,9**	10,2;57,2	72,7	46,8;90,7	50,0*	34,3;65,8	27,0**	3,0;70,0	51,2**	8,3;92,6	56,1	39,2;71,9	Oui
48,3**	23,1;74,1	70,1*	42,8;89,8	27,3**	9,3;53,2	50,0*	34,2;65,7	73,0*	30,0;97,0	48,8**	7,4;91,7	43,9*	28,1;60,8	Non
														Prière ou soutien spirituel[p]
75,0	46,6;93,1	63,9*	38,3;84,8	85,2	61,0;97,2	60,4	44,4;75,0	54,6**	22,8;83,7	83,3*	30,6;99,8	55,1	37,9;71,5	Oui
25,0**	6,9;53,4	36,1**	15,2;61,7	14,8**	2,8;39,0	39,6*	25,0;55,6	45,4**	16,3;77,2	16,7**	0,2;69,4	44,9*	28,5;62,1	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Estrie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	8,3;14,4
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	0,8**	0,2;1,9	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	2,0**	1,0;3,5	-	;
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	13,1	10,2;16,4	19,4**	9,6;33,0
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	31,9	27,7;36,1	27,2*	14,8;42,9
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	52,3	47,8;56,8	53,3	38,3;67,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région															
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
7,6*	5,5;10,3	16,6	14,0;19,2	6,5	4,7;8,5	22,1	19,5;24,8	6,1*	4,3;8,3	4,2*	2,7;6,4	25,8	22,1;29,5	Ensemble des patients	
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic	
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	3,0**	0,8;7,6	Mauvaise	
-	;	5,8**	1,9;13,0	-	;	3,4**	1,0;8,4	3,5**	0,1;18,7	-	;	-	;	Passable	
15,0**	6,1;29,0	9,6**	4,1;18,4	21,5**	9,1;39,2	9,3**	4,6;16,2	26,2**	12,1;45,1	4,5**	0,1;24,2	11,6**	6,3;19,0	Bonne	
34,1*	20,0;50,6	25,2*	16,2;36,1	36,1*	20,6;54,0	32,1	23,5;40,7	25,8**	11,6;45,0	30,4**	12,2;54,6	38,2	29,2;47,2	Très bonne	
50,9*	34,3;67,3	59,5	48,9;70,1	42,4*	25,5;60,8	55,2	46,1;64,3	44,5*	26,7;63,4	65,1*	40,3;85,0	47,1	38,3;55,9	Excellente	

Région 06

MONTRÉAL

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	43,3	42,4 ; 44,3
Femmes	53,9	56,7	55,7 ; 57,6
Âge			
18 à 49 ans	18,9	19,7	19,0 ; 20,3
50 à 59 ans	24,9	22,5	20,8 ; 24,3
60 à 69 ans	29,8	26,3	23,9 ; 28,8
70 ans et plus	26,5	31,5	29,6 ; 33,3
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	63,1	60,1 ; 66,0
Anglais	10,6	27,6	24,9 ; 30,3
Autres	3,0	9,4	7,7 ; 11,3
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	22,0	19,6 ; 24,5
Diplôme d'études secondaires	24,7	22,8	20,2 ; 25,4
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	25,7	23,1 ; 28,4
Diplôme d'études universitaires	20,6	29,4	26,8 ; 32,0
Occupation principale			
En emploi	29,3	31,6	29,5 ; 33,8
Étudiant	1,7	1,7*	1,0 ; 2,6
Retraité	55,8	54,6	52,4 ; 56,9
À la maison	7,2	6,1	4,8 ; 7,6
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	2,8*	2,0 ; 3,9
Congé de maternité / autres	3,6	3,2*	2,3 ; 4,2
Situation familiale			
Vit seul	24,1	30,0	27,4 ; 32,6
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	43,4	40,6 ; 46,2
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	15,9	13,8 ; 18,0
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	5,2	4,0 ; 6,6
Autres	4,8	5,5	4,1 ; 7,2
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	19,8	17,6 ; 22,1
Revenu suffisant	61,4	61,7	59,0 ; 64,5
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	18,5	16,2 ; 20,7
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	32,7	29,6 ; 35,8
2	21,1	19,6	17,2 ; 22,1
3	20,1	19,0	16,4 ; 21,5
4	19,4	15,2	12,9 ; 17,5
5 - très défavorisé	17,6	13,5	11,4 ; 15,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	11,1	9,3 ; 13,0	13,6	10,8 ; 16,9	9,2	6,9 ; 12,0
Génital féminin	5,5	...	10,2	5,8	4,5 ; 7,3	...	;	10,2	7,9 ; 12,9
Prostate	15,9	34,4	...	14,9	13,3 ; 16,5	34,4	30,7 ; 38,2	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	8,9	7,4 ; 10,4	12,0	9,5 ; 14,4	6,6	4,9 ; 8,7
Sein	26,5	0,4**	48,8	26,9	24,9 ; 29,0	0,3**	0,0 ; 1,9	47,3	43,8 ; 50,8
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	7,1	5,7 ; 8,8	7,1*	5,0 ; 9,8	7,1	5,2 ; 9,4
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	5,1	3,9 ; 6,6	5,3*	3,5 ; 7,7	5,0*	3,5 ; 7,0
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	20,1	17,7 ; 22,5	27,2	23,2 ; 31,2	14,6	11,8 ; 17,8
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	85,1	83,0 ; 87,1	86,8	83,2 ; 89,8	83,8	80,9 ; 86,6
Récidive	7,4	7,5	7,3	7,6	6,1 ; 9,4	6,5*	4,4 ; 9,3	8,5	6,4 ; 11,0
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	7,3	5,8 ; 9,0	6,7*	4,5 ; 9,6	7,7	5,8 ; 10,1
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	13,3	11,3 ; 15,3	15,9	12,6 ; 19,6	11,4	8,9 ; 13,9
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	21,0	18,8 ; 23,3	6,4*	4,3 ; 9,0	32,2	28,6 ; 35,7
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	65,6	62,8 ; 68,5	77,8	73,9 ; 81,6	56,5	52,5 ; 60,5
Médecin de famille durant les traitements[p, r]									
Oui	41,2	43,4	39,3	31,8	29,0 ; 34,5	35,7	31,0 ; 40,4	28,8	25,3 ; 32,4
Non	58,8	56,6	60,7	68,2	65,5 ; 71,0	64,3	59,6 ; 69,0	71,2	67,6 ; 74,7
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	86,6	84,6 ; 88,5	86,4	83,0 ; 89,3	86,7	84,2 ; 89,2
Non	8,3	8,5	8,0	13,4	11,5 ; 15,4	13,6	10,7 ; 17,0	13,3	10,8 ; 15,8
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	12,4	10,4 ; 14,4	13,8	10,7 ; 17,4	11,3	8,8 ; 14,2
Très bon	29,2	29,3	29,1	29,1	26,4 ; 31,8	28,9	24,8 ; 33,0	29,2	25,6 ; 32,8
Bon	34,9	34,2	35,5	32,1	29,2 ; 35,1	32,5	28,4 ; 36,7	31,8	28,0 ; 35,6
Moyen	18,8	17,8	19,6	19,8	17,4 ; 22,2	18,3	14,8 ; 22,2	20,9	17,8 ; 24,1
Mauvais	5,6	5,7	5,5	6,6	5,1 ; 8,4	6,4*	4,2 ; 9,3	6,8*	4,9 ; 9,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p, r]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p]
11,1	9,3 ; 13,0	3,4**	1,3 ; 6,9	9,3*	6,0 ; 13,4	9,8*	6,8 ; 13,7	18,4	14,1 ; 23,4	Colorectal
5,8	4,5 ; 7,3	5,9**	3,3 ; 9,6	5,3**	2,9 ; 8,9	5,8*	3,5 ; 8,9	6,0*	3,5 ; 9,5	Génital féminin
14,9	13,3 ; 16,5	0,6**	0,0 ; 3,0	17,6	13,7 ; 22,0	23,0	18,5 ; 27,5	15,3	12,5 ; 18,4	Prostate
8,9	7,4 ; 10,4	14,9	11,5 ; 18,9	7,0*	4,4 ; 10,6	9,6*	6,5 ; 13,6	5,9*	3,7 ; 8,9	Hématopoïétique
26,9	24,9 ; 29,0	38,7	33,5 ; 43,8	29,4	24,8 ; 34,0	26,3	22,0 ; 30,7	18,3	14,5 ; 22,7	Sein
7,1	5,7 ; 8,8	13,4*	9,3 ; 18,3	8,2*	5,3 ; 12,0	5,5*	3,2 ; 8,8	3,8**	1,7 ; 7,0	ORL (Tête et cou)
5,1	3,9 ; 6,6	2,2**	0,8 ; 4,8	5,2*	3,0 ; 8,4	6,2*	3,6 ; 9,6	6,1*	3,8 ; 9,2	Broncho-pulmonaire
20,1	17,7 ; 22,5	21,1	16,1 ; 26,1	18,0	13,5 ; 23,2	13,8	10,2 ; 18,0	26,2	21,4 ; 31,0	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
85,1	83,0 ; 87,1	91,4	86,8 ; 94,8	85,1	80,6 ; 89,0	85,2	80,5 ; 89,2	80,8	75,9 ; 85,1	Premier cancer
7,6	6,1 ; 9,4	6,3**	3,4 ; 10,4	8,2*	5,1 ; 12,2	7,8*	5,0 ; 11,6	7,9*	5,0 ; 11,8	Récidive
7,3	5,8 ; 9,0	2,3**	0,8 ; 5,0	6,7*	4,1 ; 10,2	6,9*	4,3 ; 10,5	11,3*	7,9 ; 15,4	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]
13,3	11,3 ; 15,3	11,0*	7,3 ; 15,8	12,7*	9,2 ; 17,1	16,0	12,0 ; 20,6	12,9*	9,1 ; 17,6	Sous traitement
21,0	18,8 ; 23,3	29,3	24,0 ; 34,7	19,8	15,5 ; 24,6	20,4	16,0 ; 24,8	17,1	13,1 ; 21,8	Sans traitement avec médication
65,6	62,8 ; 68,5	59,6	53,7 ; 65,5	67,5	62,0 ; 73,0	63,6	58,1 ; 69,2	69,9	64,5 ; 75,3	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p, r]
31,8	29,0 ; 34,5	21,6	15,9 ; 27,2	30,5	25,0 ; 36,0	37,3	31,7 ; 42,8	34,5	29,0 ; 40,0	Oui
68,2	65,5 ; 71,0	78,4	72,8 ; 84,1	69,5	64,0 ; 75,0	62,7	57,2 ; 68,3	65,5	60,0 ; 71,0	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]
86,6	84,6 ; 88,5	70,2	63,9 ; 76,6	84,3	79,3 ; 88,5	92,4	88,6 ; 95,3	93,6	90,4 ; 96,0	Oui
13,4	11,5 ; 15,4	29,8	23,4 ; 36,1	15,7	11,5 ; 20,7	7,6*	4,7 ; 11,4	6,4*	4,0 ; 9,6	Non
										Perception de l'état de santé[p]
12,4	10,4 ; 14,4	13,1*	8,9 ; 18,5	12,0*	8,4 ; 16,4	9,9*	6,8 ; 13,7	14,3	10,4 ; 19,1	Excellent
29,1	26,4 ; 31,8	26,9	20,9 ; 33,7	31,8	26,4 ; 37,2	29,2	24,0 ; 34,3	28,3	23,3 ; 33,4	Très bon
32,1	29,2 ; 35,1	33,4	26,8 ; 40,0	28,7	23,0 ; 34,4	38,2	32,5 ; 43,9	28,8	23,8 ; 33,8	Bon
19,8	17,4 ; 22,2	18,1*	12,9 ; 24,3	19,9	15,2 ; 25,3	17,3	13,1 ; 22,2	22,9	18,2 ; 27,5	Moyen
6,6	5,1 ; 8,4	8,4*	5,1 ; 13,0	7,6*	4,9 ; 11,2	5,5**	3,1 ; 8,9	5,7**	3,1 ; 9,3	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	51,5	48,6;54,4	60,1	51,3;68,9
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	48,5	45,6;51,4	39,9	31,1;48,7
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	41,6	36,6;46,5	34,1*	21,4;48,9
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	19,6	15,7;24,1	10,8**	3,9;22,6
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	18,3	14,5;22,4	23,5**	12,6;37,7
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	20,6	16,5;24,7	31,5*	20,1;44,8
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	34,8	30,5;39,0	44,9*	29,7;60,9
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	16,9	13,9;20,3	18,1**	8,0;32,9
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	21,9	18,2;25,6	8,8**	2,3;21,7
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	13,3	10,8;15,9	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	13,1	10,2;16,4	28,2*	15,4;44,2
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	50,1	45,9;54,3	57,1	45,5;68,7
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	26,2	22,5;29,9	21,7*	12,5;33,5
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	18,7	15,5;22,3	17,3**	9,3;28,1
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	5,0*	3,3;7,2	4,0**	0,7;11,8
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	82,2	79,9;84,5	85,0	77,0;91,1
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	12,1	10,2;14,1	10,9**	5,6;18,6
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	5,7	4,3;7,3	4,0**	1,1;9,9
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p, r]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	23,4	20,9;25,9	7,4**	3,3;13,8
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	76,6	74,1;79,1	92,6	86,2;96,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
62,8	49,9;74,5	16,8*	11,3;23,7	60,3	50,5;70,1	54,2	48,7;59,7	47,4	36,1;58,6	35,0*	23,2;48,4	67,6	61,4;73,7	Oui
37,2*	25,5;50,1	83,2	76,3;88,7	39,7	29,9;49,5	45,8	40,3;51,3	52,6	41,4;63,9	65,0	51,6;76,8	32,4	26,3;38,6	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
31,9**	13,6;55,5	42,7**	20,4;67,4	45,0*	28,7;62,2	49,2	40,4;58,0	39,1*	21,3;59,3	44,9**	17,2;75,2	37,2	26,4;49,1	2 semaines et moins
29,7**	12,5;52,5	8,8**	0,8;30,5	29,1*	16,0;45,4	17,6*	11,2;25,6	14,9**	4,7;32,4	26,3**	4,5;63,2	23,5*	14,2;35,2	Plus de 2 semaines à 1 mois
15,5**	4,1;36,1	21,9**	6,8;45,8	13,0**	4,7;26,8	16,0*	10,0;23,9	24,7**	10,4;44,6	22,6**	3,8;56,9	17,5**	9,6;28,3	Plus d'un mois à 3 mois
22,9**	8,9;43,3	26,6**	9,1;51,8	12,8**	4,5;27,0	17,2*	11,3;24,4	21,4**	8,6;40,3	6,2**	0,1;33,5	21,7*	12,9;32,8	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
22,1**	7,1;45,3	49,2	40,8;57,6	33,9*	18,9;51,7	13,4*	8,1;20,4	39,2*	23,7;56,4	53,9	37,1;70,1	33,6*	21,7;47,3	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
7,8**	0,8;27,2	22,0*	15,6;29,6	26,8**	13,6;43,8	14,1*	8,6;21,3	13,2**	4,8;27,2	21,3**	9,3;38,5	9,8**	3,9;19,5	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
58,2*	35,0;79,0	24,5	17,6;32,5	24,9**	11,2;43,7	12,6*	7,6;19,3	33,1*	18,3;50,9	7,1**	1,2;21,2	31,6*	19,9;45,4	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	50,8	42,8;58,7	-	;	-	;	1,1**	0,0;6,2	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
11,9**	2,3;32,0	4,3**	1,5;9,3	14,4**	5,0;30,1	9,2**	4,9;15,3	14,5**	5,4;29,3	17,7**	6,5;35,4	23,8*	13,8;36,6	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
53,7*	34,3;72,3	29,8*	20,6;40,3	73,5	59,4;84,8	51,5	43,3;59,7	40,7*	24,9;58,0	55,1*	36,7;72,5	49,0	39,0;59,0	2 semaines et moins
40,3*	22,8;59,8	30,2*	20,1;40,3	13,6**	5,5;26,3	29,9	21,8;39,0	18,5**	8,0;34,0	27,3**	12,7;46,7	26,7*	18,3;36,4	Plus de 2 semaines à 1 mois
6,1**	0,7;20,6	33,2*	23,2;43,2	8,3**	2,7;18,5	13,1*	7,5;20,7	35,4*	21,3;51,7	14,5**	4,0;33,2	18,6*	11,2;28,1	Plus d'un mois à 3 mois
-	;	6,9**	2,3;15,1	4,7**	0,8;14,0	5,5**	2,0;11,7	5,5**	0,6;19,3	3,1**	0,1;16,8	5,7**	2,1;12,3	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
79,3	65,3;89,6	88,8	83,2;93,1	76,7	67,7;84,2	83,1	78,7;87,0	70,7	57,7;81,7	79,4	66,8;88,9	82,5	75,9;87,8	Oui, tout à fait
14,8**	7,0;26,3	7,5**	4,1;12,5	17,2*	10,6;25,7	12,2*	8,7;16,5	21,6*	12,1;33,9	14,9**	7,0;26,6	9,0*	5,4;13,8	Oui, en partie
5,9**	1,0;17,7	3,7**	1,3;8,1	6,2**	2,2;13,3	4,7**	2,6;7,6	7,7**	2,4;17,8	5,6**	1,2;15,5	8,6**	4,8;13,9	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p, r]
16,7**	7,5;30,3	30,4	23,6;37,3	17,8*	10,5;27,3	29,9	24,8;34,9	31,8*	21,5;43,8	22,2**	11,6;36,3	19,7*	14,1;26,4	Oui
83,3	69,7;92,5	69,6	62,7;76,4	82,2	72,7;89,5	70,1	65,1;75,2	68,2	56,2;78,5	77,8	63,7;88,4	80,3	73,6;85,9	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	12,5	10,5;14,4	15,5*	9,7;22,9
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	30,6	27,9;33,3	23,3*	15,7;32,3
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	23,0	20,4;25,5	32,3	23,4;41,3
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	28,6	26,1;31,2	22,5*	15,4;31,1
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	3,7*	2,6;5,1	5,6**	2,3;11,1
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	0,8**	0,4;1,5	0,8**	0,0;4,4
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	0,8**	0,4;1,6	-	;
Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	91,8	90,1;93,4	95,8	90,2;98,7
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	8,2	6,6;9,9	4,2**	1,3;9,8
Professionnel suffisamment à l'écoute[p, r]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	91,7	89,8;93,3	92,9	86,7;96,8
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	8,3	6,7;10,2	7,1**	3,2;13,3
Professionnel a consacré assez de temps[p, r]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	89,5	87,7;91,4	91,7	84,5;96,2
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	10,5	8,6;12,3	8,3**	3,8;15,5
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	92,6	90,9;94,2	93,0	86,5;97,0
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	7,4	5,8;9,1	7,0**	3,0;13,5
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	58,4	55,4;61,4	49,4	40,2;58,5
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	41,6	38,6;44,6	50,6	41,5;59,8
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	62,9	60,0;65,9	59,6	50,7;68,5
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	37,1	34,1;40,0	40,4	31,5;49,3
Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	58,4	54,7;62,2	54,6	43,2;66,0
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	41,6	37,8;45,3	45,4	34,0;56,8
Contact pour du soutien pratique[3, p, r]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	66,9	64,2;69,7	64,0	54,5;73,5
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	33,1	30,3;35,8	36,0	26,5;45,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3. On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
7,6**	2,2;17,8	11,7*	7,1;17,8	17,6*	11,1;26,0	17,3	13,3;21,9	4,2**	0,8;12,1	23,1*	13,1;35,9	4,1**	1,8;7,6	Médecin de famille
18,3**	9,1;31,1	39,2	31,8;46,6	37,5	28,5;46,5	35,5	30,1;40,9	21,1*	12,5;32,1	34,8*	22,6;48,7	24,4	18,1;31,5	Médecin spécialiste du cancer
6,7**	1,9;16,2	11,8*	7,3;17,8	21,7*	14,3;30,8	29,4	24,5;34,3	25,8*	16,7;36,6	11,5**	4,7;22,4	24,6	18,8;31,2	Chirurgien
58,7	45,9;71,5	33,7	26,9;40,5	18,3*	11,4;27,1	9,3*	6,2;13,2	46,5	35,5;57,6	28,7*	18,0;41,5	43,9	36,6;51,2	Autre médecin spécialiste
7,2**	1,3;20,7	3,6**	1,4;7,5	2,1**	0,3;7,3	4,5**	2,5;7,4	2,4**	0,3;8,5	1,9**	0,0;10,8	2,2**	0,6;5,7	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	0,9**	0,0;5,2	2,5**	1,1;4,9	-	;	-	;	-	;	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
1,6**	0,0;8,6	-	;	1,7**	0,2;6,2	1,5**	0,5;3,5	-	;	-	;	0,8**	0,0;4,5	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]
92,5	83,2;97,5	97,6	93,8;99,4	90,8	83,3;95,7	87,2	82,9;90,8	86,4	76,2;93,3	90,5	80,0;96,6	94,0	89,6;96,9	En personne
7,5**	2,5;16,8	2,4**	0,6;6,2	9,2**	4,3;16,7	12,8*	9,2;17,1	13,6**	6,7;23,8	9,5**	3,4;20,0	6,0**	3,1;10,4	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p, r]
93,8	84,8;98,3	96,0	91,7;98,5	87,4	78,8;93,4	95,1	91,8;97,3	82,8	72,1;90,6	86,4	74,9;93,9	89,1	83,6;93,3	Oui
6,2**	1,7;15,2	4,0**	1,5;8,3	12,6**	6,6;21,2	4,9**	2,7;8,2	17,2**	9,4;27,9	13,6**	6,1;25,1	10,9*	6,7;16,4	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p, r]
97,1	89,7;99,7	92,8	87,9;96,1	84,2	75,4;90,8	93,1	89,6;95,7	71,6	59,4;81,9	85,8	74,7;93,4	88,8	83,2;93,0	Oui
2,9**	0,3;10,3	7,2**	3,9;12,1	15,8*	9,2;24,6	6,9*	4,3;10,4	28,4*	18,1;40,6	14,2**	6,6;25,3	11,2*	7,0;16,8	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
95,4	87,5;98,9	95,4	90,4;98,2	86,1	77,3;92,4	95,1	91,8;97,3	84,8	74,2;92,3	89,4	79,0;95,8	92,9	88,3;96,0	Oui
4,6**	1,1;12,5	4,6**	1,8;9,6	13,9**	7,6;22,7	4,9**	2,7;8,2	15,2**	7,7;25,8	10,6**	4,2;21,0	7,1**	4,0;11,7	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]
59,3	44,4;73,1	68,8	61,7;75,9	60,8	51,1;70,5	68,8	63,9;73,7	49,4	38,0;60,8	50,1	36,5;63,6	45,4	38,7;52,0	Oui
40,7*	26,9;55,6	31,2	24,1;38,3	39,2	29,5;48,9	31,2	26,3;36,1	50,6	39,2;62,0	49,9	36,4;63,5	54,6	48,0;61,3	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]
61,6	47,5;74,4	57,8	50,0;65,6	64,7	55,0;74,4	71,2	65,9;76,6	71,6	60,4;81,1	68,3	53,8;80,7	52,5	45,4;59,6	Oui
38,4*	25,6;52,5	42,2	34,4;50,0	35,3	25,6;45,0	28,8	23,4;34,1	28,4*	18,9;39,6	31,7*	19,3;46,2	47,5	40,4;54,6	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]
46,5*	29,3;64,4	42,2	32,1;52,4	69,2	56,5;80,1	77,1	71,7;82,4	47,8	35,0;60,6	63,4	46,3;78,3	41,6	31,7;51,4	Oui
53,5*	35,6;70,7	57,8	47,6;67,9	30,8*	19,9;43,5	22,9	17,6;28,3	52,2	39,4;65,0	36,6*	21,7;53,7	58,4	48,6;68,3	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p, r]
64,8	51,2;76,9	60,7	53,1;68,3	79,9	70,7;87,3	73,1	68,2;77,9	67,2	54,8;78,1	79,4	67,4;88,5	56,1	49,2;63,0	Oui
35,2*	23,1;48,8	39,3	31,7;46,9	20,1*	12,7;29,3	26,9	22,1;31,8	32,8*	21,9;45,2	20,6*	11,5;32,6	43,9	37,0;50,8	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	15,9	13,1;18,7	4,0**	0,8;11,7
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	84,1	81,3;86,9	96,0	88,3;99,2
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	31,3	27,9;34,7	28,8*	18,9;40,5
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	68,7	65,3;72,1	71,2	59,5;81,1
Psychologue[p, r]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	8,3	6,4;10,6	4,2**	0,8;12,0
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	91,7	89,4;93,6	95,8	88,0;99,2
Travailleur social[p, r]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	5,3*	3,8;7,2	1,9**	0,1;9,4
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	94,7	92,8;96,2	98,1	90,6;99,9
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	7,5	5,6;9,8	13,3**	6,0;24,4
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	92,5	90,2;94,4	86,7	75,6;94,0
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	4,9*	3,5;6,8	4,0**	0,8;11,2
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	95,1	93,2;96,5	96,0	88,8;99,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]
12,6**	3,6;28,9	11,3**	5,8;19,2	20,1*	11,2;32,0	28,7	22,6;34,7	12,1**	4,9;23,5	10,2**	2,7;24,6	6,6**	2,5;13,8	Oui
87,4	71,1;96,4	88,7	80,8;94,2	79,9	68,0;88,8	71,3	65,3;77,4	87,9	76,5;95,1	89,8	75,4;97,3	93,4	86,2;97,5	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
31,2**	16,0;50,0	19,5*	12,3;28,6	36,7*	23,8;51,2	45,6	38,9;52,3	32,5*	20,7;46,1	18,5**	8,0;33,9	17,3*	10,3;26,5	Oui
68,8	50,0;84,0	80,5	71,4;87,7	63,3	48,8;76,2	54,4	47,7;61,1	67,5	53,9;79,3	81,5	66,1;92,0	82,7	73,5;89,7	Non
														Psychologue[p, r]
2,2**	0,0;12,3	1,0**	0,0;5,4	15,0**	7,2;26,1	14,3*	9,9;19,6	1,7**	0,0;8,9	12,5**	3,9;27,6	6,3**	2,4;12,8	Oui
97,8	87,7;100,0	99,0	94,6;100,0	85,0	73,9;92,8	85,7	80,4;90,1	98,3	91,1;100,0	87,5	72,4;96,1	93,7	87,2;97,6	Non
														Travailleur social[p, r]
2,5**	0,0;14,0	3,1**	0,6;8,8	15,0**	7,2;26,4	5,3**	2,8;9,2	8,8**	2,9;19,4	7,6**	1,4;21,9	2,4**	0,5;6,8	Oui
97,5	86,0;100,0	96,9	91,2;99,4	85,0	73,6;92,8	94,7	90,8;97,2	91,2	80,6;97,1	92,4	78,1;98,6	97,6	93,2;99,5	Non
														Médecin[p]
10,3**	2,8;24,4	10,5**	5,2;18,4	3,0**	0,4;9,7	3,4**	1,5;6,7	5,0**	0,9;14,7	15,7**	5,9;31,4	9,0**	4,3;16,2	Oui
89,7	75,6;97,2	89,5	81,6;94,8	97,0	90,3;99,6	96,6	93,3;98,5	95,0	85,3;99,1	84,3	68,6;94,1	91,0	83,8;95,7	Non
														Autre professionnel de la santé
2,5**	0,0;14,0	2,1**	0,2;7,5	4,4**	0,8;13,3	7,0*	4,0;11,3	3,7**	0,5;12,3	9,3**	2,5;22,7	4,3**	1,4;9,8	Oui
97,5	86,0;100,0	97,9	92,5;99,8	95,6	86,7;99,2	93,0	88,7;96,0	96,3	87,7;99,5	90,7	77,3;97,5	95,7	90,2;98,6	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	23,7	21,3;26,2	21,5*	14,5;30,1
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	76,3	73,8;78,7	78,5	69,9;85,5
Médecin spécialiste du cancer[p, r]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	40,7	37,9;43,5	45,1	35,5;54,8
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	59,3	56,5;62,1	54,9	45,2;64,5
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	9,8	8,1;11,8	14,3*	8,1;22,8
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	90,2	88,2;91,9	85,7	77,2;91,9
Autre médecin spécialiste[p, r]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	12,6	10,6;14,6	9,3**	4,6;16,5
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	87,4	85,4;89,4	90,7	83,5;95,4
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	3,5*	2,5;4,7	1,8**	0,2;6,4
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	96,5	95,3;97,5	98,2	93,6;99,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
21,9**	12,0;34,8	6,6**	3,3;11,6	31,6	22,6;40,6	38,2	32,9;43,5	29,8*	20,3;40,8	28,4*	17,3;41,9	11,6*	7,6;16,6	Oui
78,1	65,2;88,0	93,4	88,4;96,7	68,4	59,4;77,4	61,8	56,5;67,1	70,2	59,2;79,7	71,6	58,1;82,7	88,4	83,4;92,4	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p, r]
36,5*	24,7;49,5	40,2	33,3;47,0	52,9	43,5;62,4	46,2	41,0;51,4	35,0*	24,6;46,5	43,8	31,5;56,1	28,2	21,9;35,3	Oui
63,5	50,5;75,3	59,8	53,0;66,7	47,1	37,6;56,5	53,8	48,6;59,0	65,0	53,5;75,4	56,2	43,9;68,5	71,8	64,7;78,1	Non
														Médecin de famille[p]
6,5**	1,8;15,8	6,7**	3,3;12,0	10,5**	5,3;18,3	10,8*	7,4;14,9	2,4**	0,3;8,2	18,3**	8,5;32,4	9,5*	5,8;14,5	Oui
93,5	84,2;98,2	93,3	88,0;96,7	89,5	81,7;94,7	89,2	85,1;92,6	97,6	91,8;99,7	81,7	67,6;91,5	90,5	85,5;94,2	Non
														Autre médecin spécialiste[p, r]
4,7**	0,9;13,5	18,9*	13,2;25,9	4,2**	1,3;9,7	7,7*	5,0;11,2	23,8*	14,9;34,9	9,8**	3,8;19,7	19,2*	13,8;25,7	Oui
95,3	86,5;99,1	81,1	74,1;86,8	95,8	90,3;98,7	92,3	88,8;95,0	76,2	65,1;85,1	90,2	80,3;96,2	80,8	74,3;86,2	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
1,7**	0,0;9,3	1,8**	0,3;5,2	6,6**	2,8;12,8	4,8**	2,7;7,9	2,6**	0,3;8,9	4,9**	0,9;14,2	2,9**	0,9;6,8	Oui
98,3	90,7;100,0	98,2	94,8;99,7	93,4	87,2;97,2	95,2	92,1;97,3	97,4	91,1;99,7	95,1	85,8;99,1	97,1	93,2;99,1	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	78,8	76,4;81,2	81,5	73,0;88,2
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	14,7	12,7;16,8	12,8**	7,1;20,7
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	6,5	5,0;8,3	5,8**	2,0;12,6
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	70,0	67,3;72,7	75,7	67,2;82,9
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	16,5	14,4;18,6	14,0*	8,4;21,2
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	13,5	11,3;15,7	10,3**	5,5;17,3
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	77,8	74,6;80,9	84,9	74,2;92,4
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	15,0	12,3;17,7	11,4**	4,9;21,4
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	7,2	5,3;9,6	3,7**	0,7;11,1
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	54,4	50,9;57,9	55,7	44,7;66,6
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	16,4	13,7;19,0	19,4*	11,5;29,5
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	29,2	25,9;32,6	25,0*	15,9;36,1
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	32,6	29,7;35,5	32,2	23,7;40,7
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	10,4	8,5;12,3	12,1**	6,6;19,9
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	27,7	25,0;30,5	18,9*	12,1;27,4
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	5,8	4,4;7,5	4,9**	1,5;11,3
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	23,5	20,9;26,0	31,9	23,2;40,6
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	64,5	59,2;69,7	80,5	59,3;93,6
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	17,9	13,9;22,6	3,5**	0,1;18,6
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	17,6	13,6;22,2	16,1**	4,3;37,2
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	28,1	25,5;30,6	17,9*	11,4;26,2
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	71,9	69,4;74,5	82,1	73,8;88,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
70,2	56,2;81,8	80,8	74,1;86,5	79,9	70,8;87,1	81,9	76,8;86,3	75,0	63,9;84,1	74,7	62,3;84,7	75,9	69,0;82,0	Oui, tout à fait
25,9*	14,9;39,7	13,4*	9,1;18,8	16,4*	9,9;24,8	12,2*	8,6;16,7	19,3*	11,3;29,8	19,3**	10,2;31,7	13,3*	9,0;18,8	Oui, en partie
4,0**	0,9;10,9	5,8**	2,4;11,5	3,8**	1,1;9,2	5,9*	3,4;9,4	5,7**	1,5;14,4	6,0**	1,6;14,7	10,8*	6,8;16,0	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
70,6	57,8;81,4	79,0	71,9;85,0	62,3	52,4;72,3	71,0	65,7;76,4	60,9	49,1;72,0	67,4	54,4;78,8	65,7	58,9;72,5	Oui, tout à fait
15,9**	7,8;27,6	11,1*	6,7;16,9	19,4*	12,0;28,8	18,4	14,4;23,0	19,9*	11,6;30,6	22,1*	12,6;34,2	15,7*	10,9;21,6	Oui, en partie
13,4**	6,6;23,4	9,9**	5,5;16,0	18,2*	11,3;27,0	10,6*	7,2;14,8	19,2*	10,8;30,2	10,5**	3,9;21,6	18,6*	13,4;24,8	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
78,0	62,9;89,0	79,3	69,6;87,0	84,0	73,4;91,6	71,4	64,3;77,9	70,4	51,5;85,3	79,7	64,0;90,8	78,5	68,9;86,3	Oui
13,3**	5,0;26,8	11,9**	6,4;19,7	9,4**	4,0;18,3	21,1	15,3;27,9	18,9**	7,5;36,2	12,0**	3,8;26,6	15,2*	8,5;24,3	Non, il ne voulait pas
8,7**	2,3;21,5	8,8**	3,7;17,0	6,6**	2,2;14,7	7,5**	4,0;12,5	10,7**	2,8;26,2	8,3**	2,2;20,2	6,3**	2,5;12,9	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
54,2	37,5;70,3	56,0	46,9;65,2	59,6	49,1;70,1	52,4	46,0;58,8	45,4	32,9;58,0	52,1*	35,8;68,0	56,4	47,9;64,8	Oui, tout à fait
19,5**	8,8;34,9	12,8*	7,5;19,8	15,1**	8,2;24,7	17,1*	12,1;23,2	23,3*	13,0;36,6	14,0**	5,2;28,4	14,3*	9,2;20,9	Oui, en partie
26,3**	12,9;43,9	31,2	22,4;40,0	25,2*	16,1;36,3	30,5	24,7;36,3	31,2*	18,8;46,0	33,9*	19,6;50,8	29,3	21,5;38,1	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
25,1*	14,0;39,4	29,1	22,7;36,0	37,9	27,9;48,0	41,0	35,3;46,6	37,0*	26,0;49,1	31,2*	19,5;44,9	22,6	16,9;29,1	Oui, une infirmière pivot en oncologie
15,7**	7,1;28,4	9,9*	5,6;15,7	9,4**	4,2;17,7	8,7*	5,8;12,4	7,9**	2,9;16,7	14,2**	6,4;25,9	11,0*	7,1;16,1	Oui, un autre professionnel de la santé
31,0*	19,5;44,4	28,8	21,8;36,8	33,0*	23,0;43,0	27,8	22,8;32,8	27,1*	17,7;38,2	29,1*	17,1;43,6	28,2	22,0;35,1	Oui, un membre du personnel administratif
1,6**	0,0;8,4	6,1**	3,1;10,5	5,0**	1,7;11,3	2,3**	0,8;5,0	4,9**	0,9;14,2	7,6**	2,4;17,2	12,2*	7,7;18,0	Oui, un médecin
26,6*	15,3;40,7	26,1	19,4;33,8	14,6**	8,0;23,7	20,2	15,8;24,7	23,0*	13,9;34,6	17,9**	8,5;31,3	26,0	19,6;33,3	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
51,7**	16,9;85,2	77,9	63,7;88,5	58,0	39,8;74,7	56,6	47,2;66,0	61,3*	40,1;79,8	65,6*	34,6;89,1	65,5	50,8;78,3	Oui, tout à fait
30,9**	5,8;69,4	16,5**	7,3;30,4	20,8**	9,4;37,0	22,7*	14,9;32,3	14,1**	4,1;31,9	28,0**	6,7;60,8	12,9**	5,4;24,6	Oui, en partie
17,4**	1,3;55,8	5,5**	1,1;15,5	21,2**	9,4;38,0	20,7*	13,3;29,9	24,6**	9,1;47,1	6,4**	0,2;30,3	21,6**	10,8;36,2	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]
27,7*	17,3;40,2	33,9	26,6;41,2	30,9*	21,7;40,1	40,0	34,5;45,5	15,5**	8,5;24,9	23,1*	12,9;36,2	17,8*	12,8;23,8	Oui
72,3	59,8;82,7	66,1	58,8;73,4	69,1	59,9;78,3	60,0	54,5;65,5	84,5	75,1;91,5	76,9	63,8;87,1	82,2	76,2;87,2	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	81,3	79,5;83,0	96,9	92,2;99,2
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	18,7	17,0;20,5	3,1**	0,8;7,8
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	42,2	39,1;45,3	5,9**	2,0;13,1
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	57,8	54,7;60,9	94,1	86,9;98,0
Lieu de la chirurgie[p]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	91,9	89,9;93,6	96,2	90,9;98,8
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	8,1	6,4;10,1	3,8**	1,2;9,1
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	45,8	40,7;50,9	41,9*	27,0;58,0
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	8,1*	5,6;11,2	8,0**	2,1;19,6
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	46,1	40,9;51,3	50,1*	33,9;66,2
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	59,0	55,3;62,6	56,7	46,6;66,8
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	18,8	16,1;21,5	17,5*	10,5;26,5
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	22,2	19,3;25,2	25,8*	17,6;35,6
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	94,5	92,8;96,0	98,1	93,0;99,8
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	5,5	4,0;7,2	1,9**	0,2;7,0
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	83,4	80,8;86,1	86,7	78,5;92,7
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	14,6	12,1;17,0	11,1**	5,8;18,6
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	2,0**	1,1;3,4	2,2**	0,3;7,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
88,9	79,1;95,1	60,9	55,1;66,8	34,2	24,9;43,5	94,6	91,6;96,8	78,1	68,3;86,0	67,9	54,6;79,4	93,1	89,3;95,8	Oui
11,1**	4,9;20,9	39,1	33,2;44,9	65,8	56,5;75,1	5,4*	3,2;8,4	21,9*	14,0;31,7	32,1*	20,6;45,4	6,9*	4,2;10,7	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
13,6**	5,7;26,0	12,7**	6,6;21,4	44,2*	25,1;64,7	79,7	74,9;84,5	18,9**	9,9;31,2	8,3**	1,6;22,8	44,4	37,3;51,6	Oui
86,4	74,0;94,3	87,3	78,6;93,4	55,8*	35,3;74,9	20,3	15,5;25,1	81,1	68,8;90,1	91,7	77,2;98,4	55,6	48,4;62,7	Non
														Lieu de la chirurgie[p]
96,5	88,0;99,6	91,0	83,5;95,8	91,5	77,3;98,2	90,5	86,3;93,8	98,4	91,1;100,0	87,0	71,6;95,9	89,5	84,0;93,6	Hôpital de la région de résidence
3,5**	0,4;12,0	9,0**	4,2;16,5	8,5**	1,8;22,7	9,5*	6,2;13,7	1,6**	0,0;8,9	13,0**	4,1;28,4	10,5*	6,4;16,0	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
62,8*	36,6;84,4	51,0	36,2;65,8	49,3**	17,7;81,3	43,1	34,3;52,0	37,6**	19,7;58,4	44,6**	22,0;69,0	46,9	35,9;58,0	Oui, tout à fait
4,6**	0,1;24,3	10,3**	3,1;23,4	9,5**	0,1;46,8	8,4**	4,1;15,0	11,4**	2,3;30,3	-	;	7,9**	3,2;15,7	Oui, en partie
32,6**	12,9;58,1	38,6*	24,7;54,1	41,2**	11,6;76,6	48,4	39,3;57,6	51,0*	30,4;71,3	55,4*	31,0;78,0	45,2	33,6;56,7	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
61,5	45,1;76,2	74,5	63,8;83,4	55,0*	34,7;74,1	56,8	50,8;62,7	72,9	59,6;83,7	47,8*	31,2;64,8	53,4	46,0;60,8	Oui, tout à fait
14,5**	6,5;26,5	14,8**	8,1;23,9	19,8**	7,6;38,2	20,4	15,7;25,1	18,7**	9,7;31,1	26,8**	13,1;44,9	18,7*	13,3;25,3	Oui, en partie
24,0**	12,1;39,9	10,8**	5,1;19,3	25,2**	10,7;45,5	22,8	17,9;27,7	8,4**	2,6;18,9	25,3**	12,2;43,0	27,8	21,6;34,8	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
95,0	81,9;99,5	94,1	87,2;97,9	90,2	73,8;98,0	93,2	89,6;95,8	98,4	90,9;100,0	91,8	77,1;98,4	94,5	89,6;97,5	Oui
5,0**	0,5;18,1	5,9**	2,1;12,8	9,8**	2,0;26,2	6,8*	4,2;10,4	1,6**	0,0;9,1	8,2**	1,6;22,9	5,5**	2,5;10,4	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
81,4	66,2;91,7	85,6	76,0;92,5	58,8*	37,6;77,9	82,5	77,4;87,0	78,4	66,4;87,7	77,0	58,2;90,2	88,2	82,4;92,6	Oui, tout à fait
17,1**	7,2;32,0	11,4**	5,6;19,8	34,4**	16,6;56,1	15,7	11,5;20,7	18,0**	9,4;30,0	23,0**	9,8;41,8	10,6*	6,5;16,2	Oui, en partie
1,5**	0,0;8,2	3,0**	0,4;10,1	6,8**	0,9;21,8	1,8**	0,5;4,3	3,5**	0,4;12,2	-	;	1,2**	0,1;4,3	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	40,7	38,7;42,7	49,4	40,1;58,6
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	59,3	57,3;61,3	50,6	41,4;59,9
Lieu de la chimiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	90,8	87,4;93,4	91,7	81,7;97,2
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	9,2*	6,6;12,6	8,3**	2,8;18,3
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	55,2	50,5;59,9	49,2	35,9;62,4
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	41,1	36,4;45,7	47,6	34,6;60,5
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	3,7*	2,2;5,8	3,3**	0,4;11,2
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	39,8	33,6;46,1	39,9*	24,1;57,5
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	16,3*	11,7;21,9	16,2**	6,4;31,4
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	43,9	37,7;50,0	43,8*	27,1;61,7
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	38,4	33,9;42,9	35,5*	23,7;48,7
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	33,6	29,0;38,2	31,6*	20,4;44,5
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	28,0	23,8;32,2	32,9*	21,4;46,1
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	79,2	75,3;83,1	74,6	61,3;85,3
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	17,6	14,1;21,5	23,9*	13,5;37,1
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	3,2**	1,7;5,4	1,5**	0,0;8,4
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	81,8	77,9;85,3	83,6	72,1;91,7
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	13,7	10,7;17,1	9,7**	3,8;19,7
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	4,5*	2,8;6,8	6,7**	1,8;16,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
36,4*	24,4;49,9	1,7**	0,3;5,2	93,3	85,8;97,6	53,9	49,3;58,4	23,0*	14,8;33,0	62,9	48,4;75,9	25,5	19,8;31,2	Oui
63,6	50,1;75,6	98,3	94,8;99,7	6,7**	2,4;14,2	46,1	41,6;50,7	77,0	67,0;85,2	37,1*	24,1;51,6	74,5	68,8;80,2	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p]
95,0	75,2;99,9	100,0	;	90,6	83,0;95,5	89,6	83,3;94,1	100,0	;	94,3	79,3;99,5	86,3	72,1;94,9	Hôpital de la région de résidence
5,0**	0,1;24,8	-	;	9,4**	4,5;17,0	10,4*	5,9;16,7	-	;	5,7**	0,5;20,7	13,7**	5,1;27,9	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
73,4	49,6;90,2	-	;	58,5	48,4;68,6	51,5	43,9;59,2	61,8*	34,5;84,5	61,5	42,9;78,0	55,0	39,1;70,1	Moins de 30 minutes
26,6**	9,8;50,4	100,0	;	38,4	28,3;48,5	43,5	35,9;51,1	38,2**	15,5;65,5	35,6*	19,7;54,2	40,4*	26,2;55,8	De 30 à 60 minutes
-	;	-	;	3,1**	0,6;9,2	4,9**	2,2;9,4	-	;	2,9**	0,1;15,6	4,7**	0,6;16,0	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
34,4**	9,9;67,4	100,0	;	39,8*	26,1;54,7	43,7	32,9;54,4	61,7**	24,3;90,9	18,6**	6,0;39,0	39,8*	21,1;61,0	Oui, tout à fait
17,5**	2,0;51,7	-	;	20,5**	10,1;34,9	15,1**	7,8;25,4	8,8**	0,3;39,2	19,0**	6,1;40,0	13,2**	3,1;32,7	Oui, en partie
48,0**	19,3;77,8	-	;	39,7*	25,8;55,1	41,2	30,8;51,6	29,5**	4,9;68,9	62,4*	40,5;81,1	47,0*	28,0;66,7	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
36,1**	16,2;60,4	-	;	44,5	33,8;55,2	34,9	27,5;42,2	74,1*	43,9;93,3	25,0**	11,9;42,7	43,4*	28,4;59,3	Moins de 30 minutes
42,3**	21,3;65,5	-	;	41,1	30,6;51,5	30,1	23,5;36,6	25,9**	6,7;56,1	34,6*	19,1;52,9	33,1*	19,3;49,5	De 30 à 60 minutes
21,6**	7,3;43,7	100,0	;	14,4**	7,6;24,0	35,1	28,0;42,2	-	;	40,4*	24,5;57,9	23,5**	11,8;39,2	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
91,4	73,0;98,8	100,0	;	78,7	67,8;87,2	77,2	70,0;83,3	80,1	50,6;96,1	83,2	67,3;93,5	82,9	69,7;92,1	Oui, tout à fait
3,5**	0,1;18,0	-	;	15,3**	8,3;25,0	19,9*	14,1;26,7	19,9**	3,9;49,4	16,8**	6,5;32,7	13,5**	5,5;26,0	Oui, en partie
5,0**	0,1;24,8	-	;	6,0**	2,0;13,5	3,0**	0,9;7,1	-	;	-	;	3,6**	0,5;12,1	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
65,7*	41,1;85,3	100,0	;	77,6	67,7;85,7	88,8	83,1;93,1	93,7	69,7;99,8	71,2	53,6;85,2	75,6	61,0;86,9	Oui, tout à fait
18,0**	5,1;40,2	-	;	18,5*	11,2;27,9	10,1*	6,1;15,6	6,3**	0,2;30,3	22,9**	10,8;39,6	14,9**	5,7;29,6	Oui, en partie
16,3**	3,4;41,1	-	;	3,8**	1,0;9,7	1,1**	0,1;4,0	-	;	5,9**	0,7;19,5	9,4**	3,5;19,6	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	48,9	46,8;51,1	22,9*	16,1;31,0
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	51,1	48,9;53,2	77,1	69,0;83,9
Lieu de la radiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	88,0	85,0;90,5	96,0	78,6;99,9
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	12,0	9,5;15,0	4,0**	0,1;21,4
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	45,6	41,4;49,7	41,3*	23,0;61,5
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	49,1	45,1;53,2	54,5*	34,6;73,4
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	5,3*	3,6;7,6	4,2**	0,1;22,3
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	45,0	39,7;50,2	51,1*	25,9;75,8
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	13,8	10,4;17,8	10,8**	1,2;35,2
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	41,3	36,2;46,3	38,1**	15,4;65,5
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	74,2	70,7;77,7	81,8	62,6;93,8
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	17,4	14,4;20,8	15,3**	4,4;34,5
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	8,4	6,2;10,9	2,9**	0,0;16,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
32,2*	21,3;44,6	53,9	48,3;59,4	35,1	25,4;44,8	80,8	76,0;85,0	74,4	62,5;84,2	33,1*	21,3;46,8	23,0	17,7;28,2	Oui
67,8	55,4;78,7	46,1	40,6;51,7	64,9	55,2;74,6	19,2	15,0;24,0	25,6*	15,8;37,5	66,9	53,2;78,7	77,0	71,8;82,3	Non
														Lieu de la radiothérapie[p]
90,0	69,2;98,7	87,2	78,9;93,1	85,0	68,5;94,9	86,8	81,6;91,0	95,1	85,3;99,1	89,7	67,0;98,8	82,7	68,4;92,4	Hôpital de la région de résidence
10,0**	1,3;30,8	12,8**	6,9;21,1	15,0**	5,1;31,5	13,2*	9,0;18,4	4,9**	0,9;14,7	10,3**	1,2;33,0	17,3**	7,6;31,6	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
45,8*	25,5;67,3	51,8	41,6;62,1	45,5*	28,0;63,8	41,4	35,4;47,4	55,9	42,6;69,1	37,9**	15,3;65,2	47,3*	32,0;63,0	Moins de 30 minutes
54,2*	32,7;74,5	46,0	35,6;56,3	54,5*	36,2;72,0	51,3	45,1;57,4	37,8*	25,1;51,8	56,9*	30,1;81,0	46,4*	31,8;61,4	De 30 à 60 minutes
-	;	2,2**	0,2;8,0	-	;	7,3*	4,4;11,2	6,3**	1,1;18,6	5,2**	0,1;28,5	6,3**	1,4;17,0	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
49,3**	20,5;78,4	49,3	36,6;61,9	46,3*	26,9;66,6	41,7	33,5;49,9	44,3*	26,3;63,4	31,6**	10,3;60,8	51,2*	34,9;67,2	Oui, tout à fait
17,2**	1,5;53,6	15,9**	7,0;29,1	19,9**	7,4;39,2	10,0*	5,8;16,0	23,8**	10,7;41,9	25,9**	6,2;57,3	9,0**	2,5;21,5	Oui, en partie
33,6**	9,0;67,3	34,9*	22,6;48,9	33,7**	17,1;53,9	48,2	40,0;56,5	31,9**	16,4;51,1	42,4**	16,9;71,3	39,8*	24,3;57,0	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
76,9	54,3;92,0	74,5	64,4;83,0	70,0	50,9;85,1	73,5	67,9;79,1	79,5	66,0;89,4	60,3*	31,4;84,7	72,7	58,3;84,3	Oui, tout à fait
13,4**	3,0;33,7	20,9*	12,9;31,0	19,2**	7,7;36,5	16,5	11,9;21,9	16,7**	7,6;30,0	26,6**	7,5;55,4	15,7**	7,1;28,6	Oui, en partie
9,6**	1,2;31,0	4,6**	1,2;11,5	10,8**	2,7;26,5	10,0*	6,5;14,6	3,8**	0,4;13,2	13,1**	1,4;41,9	11,5**	4,1;24,1	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Douleur et malaises ressentis[p, r]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	59,9	57,0;62,8	57,3	47,7;66,9
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	40,1	37,2;43,0	42,7	33,1;52,3
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	27,4	23,8;31,0	33,2*	22,6;45,4
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	43,2	39,6;46,8	40,4	28,9;51,9
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	29,4	26,0;32,8	26,4*	17,2;37,4
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	76,7	73,3;80,0	70,2	57,3;81,1
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	18,3	15,3;21,4	23,8*	14,1;36,1
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	5,0*	3,4;7,1	6,0**	1,7;14,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p, r]
69,8	56,7;80,9	37,8	30,4;45,3	74,8	66,1;82,3	67,1	61,7;72,5	64,0	51,7;75,1	71,3	57,3;82,9	54,0	46,7;61,2	Oui
30,2*	19,1;43,3	62,2	54,7;69,6	25,2*	17,7;33,9	32,9	27,5;38,3	36,0*	24,9;48,3	28,7*	17,1;42,7	46,0	38,8;53,3	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
19,5**	8,3;36,0	22,8*	13,3;34,9	29,7*	19,1;42,1	24,3	18,4;30,2	38,2*	24,5;53,6	26,8**	13,6;44,0	29,1*	20,7;38,7	Sévères
62,5	46,1;77,0	43,4	31,3;55,6	43,5	32,4;54,7	46,2	39,5;52,9	32,7*	19,6;48,2	37,0*	22,3;53,6	38,4	28,7;48,1	Modérés
18,0**	8,1;32,5	33,8*	22,2;46,9	26,8*	17,0;38,5	29,5	23,4;35,6	29,0*	16,1;45,0	36,2*	21,7;52,7	32,5	23,0;42,0	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
81,7	65,3;92,5	82,9	71,2;91,2	82,5	72,7;89,8	81,2	75,7;85,9	68,0	52,9;80,8	76,3	60,9;87,9	67,6	58,2;77,0	Oui, tout à fait
12,2**	4,3;25,5	17,1**	8,8;28,8	14,8**	8,0;24,2	13,9*	9,6;19,4	23,3**	12,3;37,9	18,8**	8,2;34,4	25,6*	17,1;35,7	Oui, en partie
6,1**	0,5;22,7	-	;	2,7**	0,3;9,5	4,9**	2,4;8,8	8,6**	2,2;21,4	4,9**	0,6;16,6	6,8**	2,5;14,4	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	85,5	83,1;88,0	91,0	82,1;96,4
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	12,0	9,7;14,3	7,9**	2,8;16,8
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	2,5*	1,5;3,8	1,1**	0,0;5,8
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	12,8	10,8;14,8	11,6**	6,5;18,7
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	87,2	85,2;89,2	88,4	81,3;93,5
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	69,8	67,1;72,4	75,5	66,6;82,9
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	27,5	24,9;30,0	21,4*	14,2;30,0
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	2,8*	1,8;4,1	3,2**	0,9;8,0
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	59,4	56,6;62,2	60,9	51,3;70,4
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	40,6	37,8;43,4	39,1	29,6;48,7
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p, r]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	18,7	16,5;20,9	18,6*	11,9;26,9
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	18,4	16,1;20,7	16,1*	9,6;24,6
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	62,9	60,1;65,6	65,4	56,6;74,1
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	70,8	67,5;74,1	82,7	73,1;90,0
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	22,9	19,8;25,9	14,6**	7,7;24,1
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	6,3	4,7;8,3	2,7**	0,5;8,1
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	60,8	56,8;64,7	62,2	48,8;74,3
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	39,2	35,3;43,2	37,8*	25,7;51,2
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	86,4	84,4;88,5	85,2	77,5;91,1
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	12,4	10,4;14,3	14,8*	8,9;22,5
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	1,2**	0,6;2,1	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
82,1	67,2;92,2	84,8	75,7;91,5	87,8	79,1;93,8	84,7	80,0;88,7	79,6	67,1;89,0	79,9	65,6;90,2	88,9	81,5;94,1	Oui, tout à fait
8,0**	1,8;21,1	10,7**	5,1;19,1	12,2**	6,2;20,9	13,4*	9,6;18,0	20,4**	11,0;32,9	15,7**	6,6;29,6	8,1**	3,6;15,1	Oui, en partie
9,9**	2,7;23,9	4,5**	1,3;11,1	-	;	1,9**	0,6;4,4	-	;	4,3**	0,5;14,9	3,0**	0,7;8,3	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
19,3**	10,3;31,5	12,0*	7,2;18,3	13,0**	7,0;21,4	10,3*	7,3;14,1	21,4*	13,1;31,7	15,0**	6,7;27,4	11,9*	7,9;16,9	Oui
80,7	68,5;89,7	88,0	81,7;92,8	87,0	78,6;93,0	89,7	85,9;92,7	78,6	68,3;86,9	85,0	72,6;93,3	88,1	83,1;92,1	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
68,2	54,4;80,1	73,5	65,6;80,4	63,4	53,6;73,2	69,9	64,9;75,0	64,7	52,9;75,3	61,5	48,4;73,4	71,2	63,9;77,7	Oui, toujours
30,5*	19,0;44,0	24,8	18,2;32,4	32,5	23,2;41,9	29,4	24,4;34,5	34,1*	23,7;45,7	31,7*	20,3;45,0	23,3	17,5;29,9	Oui, la plupart du temps
1,3**	0,0;7,0	1,7**	0,2;6,0	4,1**	1,2;10,0	0,6**	0,1;2,3	1,2**	0,0;6,4	6,8**	2,0;16,3	5,6**	2,5;10,5	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
62,3	48,3;75,0	53,4	46,1;60,7	74,0	63,9;82,5	79,8	75,3;84,3	41,6	30,5;52,7	61,2	47,2;74,0	32,8	26,3;39,3	Oui
37,7*	25,0;51,7	46,6	39,3;53,9	26,0*	17,5;36,1	20,2	15,7;24,7	58,4	47,3;69,5	38,8*	26,0;52,8	67,2	60,7;73,7	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p, r]
19,0**	10,4;30,4	8,8*	5,1;13,9	31,8*	22,4;41,2	27,3	22,4;32,3	12,0**	5,7;21,4	18,4**	9,3;31,0	11,0*	6,9;16,4	Oui
9,7**	3,5;20,2	17,0*	11,9;23,2	19,8*	12,9;28,2	22,5	17,8;27,3	24,1*	14,6;35,8	20,6**	11,0;33,3	14,4*	10,0;19,8	Non, mais il aurait aimé l'être
71,4	58,5;82,1	74,2	67,0;80,5	48,4	39,0;57,8	50,1	44,5;55,7	63,9	52,2;74,6	61,0	46,7;74,0	74,7	68,7;80,7	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
62,6	46,8;76,6	74,0	65,3;81,6	65,1	53,5;75,5	70,2	63,2;76,6	65,1	50,8;77,6	72,1	57,7;83,7	68,0	59,9;76,1	Oui, tout à fait
35,4*	21,8;51,0	16,1*	9,9;24,2	30,1*	20,3;40,0	22,6	16,9;29,3	17,8**	8,5;31,1	24,0**	12,9;38,4	28,1	20,6;36,7	Oui, en partie
2,0**	0,0;11,2	9,8**	5,2;16,6	4,8**	1,3;12,1	7,1**	3,9;11,8	17,1**	8,4;29,5	4,0**	0,5;13,8	3,9**	1,2;9,1	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
62,6	45,4;77,7	58,5	47,2;69,8	65,3	52,6;76,6	58,0	50,3;65,8	59,7	44,7;73,5	52,3*	35,8;68,5	65,7	53,8;76,2	Oui
37,4*	22,3;54,6	41,5	30,2;52,8	34,7*	23,4;47,4	42,0	34,2;49,7	40,3*	26,5;55,3	47,7*	31,5;64,2	34,3*	23,8;46,2	Non
														Patient traité de manière respectueuse
82,4	69,3;91,5	91,7	86,4;95,4	84,1	75,4;90,6	86,5	82,2;90,0	85,0	74,8;92,2	82,9	70,1;91,8	86,8	81,2;91,2	Oui, toujours
16,4**	7,6;29,3	7,7**	4,1;13,0	13,9**	7,7;22,4	12,9	9,4;17,0	13,8**	6,9;23,7	13,6**	5,8;25,6	11,2*	7,1;16,6	Oui, la plupart du temps
1,2**	0,0;6,8	0,6**	0,0;3,3	2,1**	0,2;7,4	0,6**	0,1;2,4	1,2**	0,0;6,9	3,6**	0,4;12,3	2,0**	0,5;5,3	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	2,1*	1,3;3,2	0,9**	0,0;5,0
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	8,1	6,5;9,9	10,2**	5,0;18,0
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	2,6*	1,7;3,7	1,6**	0,2;6,1
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	87,3	85,3;89,2	87,3	79,0;93,3
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	72,7	69,9;75,4	68,2	59,2;77,2
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	20,5	18,1;22,9	23,5*	15,8;32,8
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	6,9	5,4;8,6	8,3**	3,7;15,6
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	86,8	84,7;88,9	90,3	83,2;95,2
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	11,3	9,4;13,2	7,3**	3,2;14,1
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	1,9*	1,2;2,9	2,3**	0,5;6,7
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p, r]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	64,5	59,8;69,3	77,7	63,7;88,2
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	35,5	30,7;40,2	22,3**	11,8;36,3
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	6,3	5,0;7,8	6,3**	2,6;12,3
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	93,7	92,2;95,0	93,7	87,7;97,4
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	67,7	63,9;71,5	66,4	53,7;77,6
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	13,4	10,7;16,0	11,8**	5,3;21,8
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	18,9	15,8;22,0	21,8*	12,8;33,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
1,5**	0,0;8,1	3,0**	0,8;7,6	3,8**	1,1;9,1	1,0**	0,2;2,9	2,7**	0,4;9,2	-	;	3,3**	1,1;7,2	Oui, souvent
8,0**	2,5;18,2	7,5**	4,1;12,3	7,3**	3,2;13,9	5,5*	3,3;8,7	9,6**	3,9;19,0	15,2**	6,8;27,8	9,1*	5,4;14,1	Oui, parfois
1,9**	0,1;9,4	1,8**	0,3;5,3	3,3**	0,7;9,7	2,6**	1,1;5,1	7,9**	2,8;16,9	3,3**	0,5;10,8	1,4**	0,3;4,0	Oui, une seule fois
88,6	77,7;95,3	87,7	81,8;92,3	85,6	77,0;91,9	90,9	87,1;93,8	79,8	68,5;88,4	81,5	68,7;90,7	86,3	80,5;90,9	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
68,9	54,8;80,8	82,7	75,9;88,3	62,0	52,7;71,4	75,7	70,8;80,7	69,6	57,8;79,7	69,2	56,0;80,4	71,4	64,1;78,0	Oui, toujours
26,0*	15,2;39,5	10,5*	6,3;16,3	29,3*	20,7;39,1	20,7	16,1;25,4	23,9*	14,7;35,3	24,4*	14,2;37,2	17,9*	12,7;24,2	Oui, la plupart du temps
5,1**	1,0;14,4	6,7**	3,4;11,8	8,7**	3,9;16,1	3,5**	1,6;6,5	6,5**	2,2;14,1	6,4**	1,4;17,4	10,6*	6,6;16,1	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
86,5	74,8;94,2	90,2	84,9;94,2	79,1	70,1;86,4	86,3	82,0;89,9	85,1	74,6;92,5	88,5	76,5;95,7	86,6	81,0;91,0	Oui, toujours
11,9**	4,7;23,6	9,2*	5,4;14,4	16,3*	9,7;25,1	12,5*	9,0;16,7	12,6**	5,9;22,6	9,5**	3,0;21,3	11,0*	6,8;16,4	Oui, la plupart du temps
1,5**	0,0;8,3	0,6**	0,0;3,3	4,5**	1,5;10,1	1,2**	0,4;3,1	2,3**	0,3;8,3	1,9**	0,0;10,8	2,4**	0,9;5,4	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p, r]
56,1*	30,4;79,5	64,4	50,4;76,8	70,4	55,4;82,8	49,5	39,4;59,6	50,5*	29,6;71,2	53,5*	33,2;73,0	78,5	68,0;86,8	Oui
43,9**	20,5;69,6	35,6*	23,2;49,6	29,6*	17,2;44,6	50,5	40,4;60,6	49,5*	28,8;70,4	46,5*	27,0;66,8	21,5*	13,2;32,0	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
6,2**	1,6;15,5	5,9**	3,1;10,1	11,9**	6,2;19,9	3,9**	2,0;6,8	6,3**	2,2;13,8	9,8**	3,6;20,3	6,4**	3,5;10,6	Oui
93,8	84,5;98,4	94,1	89,9;96,9	88,1	80,1;93,8	96,1	93,2;98,0	93,7	86,2;97,8	90,2	79,7;96,4	93,6	89,4;96,5	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
67,7	50,1;82,3	64,2	54,1;74,3	67,9	55,0;79,0	67,8	60,8;74,8	60,1	43,0;75,5	64,4	46,5;79,7	74,5	65,3;82,4	Oui, tout à fait
7,8**	1,6;21,2	11,9**	5,9;20,7	21,0*	12,1;32,5	10,9*	6,6;16,8	22,6**	10,6;39,2	16,9**	6,5;33,3	12,0**	6,5;19,8	Oui, en partie
24,5**	11,9;41,4	23,9*	15,2;34,5	11,1**	4,5;21,9	21,3	15,7;27,8	17,4**	7,2;32,8	18,7**	7,6;35,4	13,5*	7,9;21,0	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	81,6	79,2;84,0	81,6	72,1;88,9
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	18,4	16,0;20,8	18,4*	11,1;27,9
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	4,3*	3,1;5,7	5,0**	1,7;11,1
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	95,7	94,3;96,9	95,0	88,9;98,3
Médecin spécialiste[p]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	18,4	16,0;20,8	12,1**	6,7;19,6
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	81,6	79,2;84,0	87,9	80,4;93,3
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	31,0	28,4;33,6	27,8*	19,5;37,3
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	69,0	66,4;71,6	72,2	62,7;80,5
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	4,8	3,5;6,3	7,2**	2,9;14,3
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	95,2	93,7;96,5	92,8	85,7;97,1
CLSC[p]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	15,9	13,7;18,1	19,1*	12,3;27,6
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	84,1	81,9;86,3	80,9	72,4;87,7
Urgence d'un hôpital[p]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	30,3	27,6;32,9	33,6	24,4;42,8
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	69,7	67,1;72,4	66,4	57,2;75,6
Unité de soins d'un hôpital[p]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	13,2	11,3;15,2	10,7**	5,9;17,4
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	86,8	84,8;88,7	89,3	82,6;94,1
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	1,9*	1,1;2,9	0,8**	0,0;4,6
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	98,1	97,1;98,9	99,2	95,4;100,0
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	0,7**	0,3;1,4	1,9**	0,2;6,7
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	99,3	98,6;99,7	98,1	93,3;99,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]
75,9	61,6;86,9	75,6	68,0;82,2	94,6	87,5;98,3	83,0	78,2;87,1	75,9	63,3;85,8	87,8	75,8;95,2	79,6	72,6;85,6	Oui
24,1**	13,1;38,4	24,4	17,8;32,0	5,4**	1,7;12,5	17,0	12,9;21,8	24,1*	14,2;36,7	12,2**	4,8;24,2	20,4*	14,4;27,4	Non
														Médecin de famille[p]
-	;	7,5**	3,7;13,3	2,0**	0,2;7,0	2,7**	1,1;5,5	5,9**	1,4;15,1	10,5**	3,2;23,5	3,6**	1,5;7,4	Oui
100,0	;	92,5	86,7;96,3	98,0	93,0;99,8	97,3	94,5;98,9	94,1	84,9;98,6	89,5	76,5;96,8	96,4	92,6;98,5	Non
														Médecin spécialiste[p]
13,2**	5,5;25,2	20,3	14,7;26,9	29,9*	20,6;40,5	18,9	14,6;23,9	22,5*	13,5;33,8	18,8**	8,9;32,8	14,1*	9,1;20,4	Oui
86,8	74,8;94,5	79,7	73,1;85,3	70,1	59,5;79,4	81,1	76,1;85,4	77,5	66,2;86,5	81,2	67,2;91,1	85,9	79,6;90,9	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
40,1*	26,2;55,2	17,9*	12,3;24,6	51,2	40,8;61,6	39,5	34,1;44,8	32,7*	22,0;44,9	31,7*	19,7;45,8	17,4*	12,2;23,6	Oui
59,9	44,8;73,8	82,1	75,4;87,7	48,8	38,4;59,2	60,5	55,2;65,9	67,3	55,1;78,0	68,3	54,2;80,3	82,6	76,4;87,8	Non
														Info-Santé[p]
1,8**	0,0;9,6	4,4**	1,7;9,1	0,9**	0,0;4,9	4,9**	2,7;8,0	6,4**	1,7;15,8	8,9**	3,0;19,5	4,6**	2,1;8,8	Oui
98,2	90,4;100,0	95,6	90,9;98,3	99,1	95,1;100,0	95,1	92,0;97,3	93,6	84,2;98,3	91,1	80,5;97,0	95,4	91,2;97,9	Non
														CLSC[p]
8,7**	2,3;21,4	21,2*	15,1;28,4	12,9**	6,8;21,6	14,0	10,2;18,5	10,6**	4,6;20,1	13,0**	5,0;26,0	18,7*	13,3;25,2	Oui
91,3	78,6;97,7	78,8	71,6;84,9	87,1	78,4;93,2	86,0	81,5;89,8	89,4	79,9;95,4	87,0	74,0;95,0	81,3	74,8;86,7	Non
														Urgence d'un hôpital[p]
26,6*	15,2;40,8	24,7	18,5;31,7	34,6	25,2;44,1	32,3	27,1;37,6	22,3*	13,4;33,7	40,6*	27,8;53,5	28,7	22,3;35,8	Oui
73,4	59,2;84,8	75,3	68,3;81,5	65,4	55,9;74,8	67,7	62,4;72,9	77,7	66,3;86,6	59,4	46,5;72,2	71,3	64,2;77,7	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p]
13,4**	5,6;25,7	9,5*	5,4;15,2	15,4*	9,3;23,5	13,8	10,2;18,1	16,4**	8,0;28,5	11,9**	4,8;23,3	14,9*	10,3;20,5	Oui
86,6	74,3;94,4	90,5	84,8;94,6	84,6	76,5;90,7	86,2	81,9;89,8	83,6	71,5;92,0	88,1	76,7;95,2	85,1	79,5;89,7	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
-	;	-	;	3,2**	0,7;9,0	2,9**	1,3;5,6	4,2**	0,8;12,0	1,5**	0,0;8,1	1,5**	0,3;4,6	Oui
100,0	;	100,0	;	96,8	91,0;99,3	97,1	94,4;98,7	95,8	88,0;99,2	98,5	91,9;100,0	98,5	95,4;99,7	Non
														Autre contact
-	;	-	;	1,3**	0,0;6,2	1,3**	0,3;3,3	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	98,7	93,8;100,0	98,7	96,7;99,7	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
L'apparence physique[p, r]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	62,2	59,0;65,4	58,1	47,0;69,2
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	15,4	13,0;17,9	15,4**	8,2;25,3
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	22,4	19,6;25,2	26,5*	16,6;38,5
La sexualité[p, r]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	46,5	43,0;50,1	41,0	29,0;53,0
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	16,0	13,3;18,7	11,1**	4,5;21,6
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	37,5	34,1;40,8	47,9	35,4;60,4
Les émotions[p, r]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	40,1	36,8;43,5	40,4	29,7;51,0
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	22,6	19,7;25,5	22,6*	13,9;33,5
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	37,2	34,1;40,3	37,0	26,7;47,4
La relation de couple et la vie familiale[p, r]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	39,4	35,6;43,2	37,4*	25,9;50,1
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	17,4	14,6;20,2	12,5**	5,4;23,5
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	43,2	39,7;46,8	50,1	38,1;62,0
Les besoins alimentaires[p, r]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	55,1	51,9;58,4	65,1	55,8;74,4
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	20,8	18,2;23,4	18,3*	11,5;26,9
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	24,1	21,3;26,9	16,6*	9,5;26,0
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	51,4	47,8;55,0	53,0	40,3;65,8
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	22,6	19,5;25,7	17,1**	8,8;28,7
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	26,0	22,8;29,2	29,9*	18,5;43,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p, r]
69,3	53,2;82,6	54,8	45,5;64,1	72,8	62,1;81,8	68,5	62,9;74,1	52,9	40,4;65,5	62,5	46,9;76,5	53,0	44,3;61,8	Oui, tout à fait
16,0**	6,6;30,3	12,8**	7,0;21,0	18,5*	11,3;27,9	15,0*	10,8;20,0	21,4**	11,5;34,4	21,8**	11,4;35,7	11,0*	6,2;17,6	Oui, en partie
14,7**	5,3;30,3	32,4	23,6;41,1	8,7**	3,8;16,7	16,5	12,1;21,8	25,7*	14,7;39,5	15,6**	6,5;29,5	36,0	27,2;44,8	Non
														La sexualité[p, r]
40,7*	24,7;58,3	71,4	63,3;78,6	53,9	42,5;65,3	38,4	32,1;44,8	36,9*	21,8;54,3	30,4*	16,8;47,2	38,8	29,3;48,4	Oui, tout à fait
25,4**	13,5;40,8	19,4*	13,3;26,9	20,6**	11,3;32,8	15,6*	11,0;21,2	10,2**	2,9;23,8	7,9**	1,6;21,7	13,9*	8,3;21,4	Oui, en partie
33,9*	18,8;51,8	9,1**	5,0;14,9	25,5*	16,4;36,5	45,9	39,4;52,4	52,9*	35,9;69,5	61,7	44,7;76,8	47,3	37,6;56,9	Non
														Les émotions[p, r]
33,0*	19,9;48,4	45,1	35,5;54,7	37,9	27,1;49,7	46,3	40,2;52,3	36,5*	24,4;50,0	37,6*	23,7;53,1	31,3	22,9;39,6	Oui, tout à fait
24,0**	12,9;38,6	16,3*	10,3;24,0	38,1	27,6;48,7	24,5	19,3;29,8	22,4**	11,9;36,2	30,8*	18,2;45,9	12,6*	7,6;19,3	Oui, en partie
43,0*	27,9;59,1	38,6	29,7;47,4	23,9*	15,1;34,7	29,2	23,5;34,9	41,2*	27,3;56,2	31,6*	18,4;47,4	56,1	47,8;64,4	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p, r]
35,1*	19,7;53,2	56,3	47,4;65,1	36,9*	25,2;49,8	34,9	28,7;41,1	37,3*	22,5;54,1	33,8*	19,4;50,8	35,8	26,7;44,9	Oui, tout à fait
17,9**	7,0;34,6	17,7*	11,4;25,5	26,9*	17,0;38,8	20,0	14,5;25,6	17,7**	7,9;32,2	16,3**	5,7;33,4	10,0**	5,1;17,2	Oui, en partie
47,0*	29,1;65,6	26,1	18,7;34,5	36,2*	25,5;48,1	45,1	38,3;51,9	45,0*	28,8;61,9	50,0*	32,9;67,1	54,2	44,6;63,8	Non
														Les besoins alimentaires[p, r]
47,6	33,9;61,3	56,9	47,6;66,3	68,6	58,9;78,3	49,4	43,2;55,7	64,8	51,5;76,5	54,3	40,6;68,1	46,2	37,4;55,0	Oui, tout à fait
23,9**	12,9;38,1	18,2*	11,5;26,7	22,5*	14,1;32,9	25,7	20,3;31,1	13,2**	6,0;24,0	29,4*	16,9;44,7	14,9*	9,6;21,8	Oui, en partie
28,6*	16,0;44,1	24,9*	17,4;33,6	8,9**	4,0;16,5	24,9	19,5;30,2	22,1*	12,2;34,9	16,2**	7,2;29,6	38,9	29,9;47,8	Non
														Les activités courantes[p]
46,5*	31,7;61,7	57,6	48,6;66,6	54,5	43,1;65,8	50,1	43,6;56,5	53,9	40,3;67,4	44,3*	28,5;61,1	49,1	40,4;57,9	Oui, tout à fait
29,8*	17,1;45,2	14,6*	8,4;23,0	32,4*	21,8;44,5	26,3	20,8;31,8	24,2*	13,7;37,5	29,0*	16,3;44,6	15,6*	10,0;22,6	Oui, en partie
23,7**	12,5;38,4	27,8*	19,6;37,2	13,1**	6,6;22,5	23,7	18,1;29,2	21,9**	11,2;36,4	26,7**	14,5;42,2	35,3	26,6;43,9	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	88,0	85,9;90,0	89,4	81,8;94,6
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	9,8	8,1;11,9	9,1**	4,3;16,5
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	2,2*	1,4;3,4	1,5**	0,1;5,6
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	66,7	63,7;69,6	64,4	55,8;73,1
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	25,7	23,0;28,4	27,7*	19,4;37,3
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	5,1	3,8;6,7	5,8**	2,1;12,2
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	2,5*	1,6;3,7	2,1**	0,3;7,3
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p, r]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	50,7	47,4;54,0	44,6	34,8;54,5
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	14,8	12,5;17,1	22,7*	14,8;32,2
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	34,5	31,3;37,8	32,7	23,3;42,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
82,8	70,4;91,5	88,3	82,2;92,9	90,3	82,8;95,2	91,8	88,2;94,5	84,8	73,9;92,5	88,9	78,3;95,5	82,9	76,8;87,9	Oui, tout à fait
13,7**	6,3;24,9	9,9*	5,7;15,7	7,7**	3,4;14,6	6,9*	4,5;10,2	10,6**	4,4;20,6	8,5**	3,0;18,1	14,3*	9,7;19,9	Oui, en partie
3,5**	0,4;12,0	1,8**	0,4;5,1	2,0**	0,2;7,3	1,3**	0,3;3,9	4,5**	0,9;12,8	2,6**	0,1;13,1	2,9**	1,0;6,5	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
76,4	63,9;86,2	71,6	63,9;78,4	65,2	56,1;74,4	64,9	59,3;70,5	60,1	48,4;71,1	56,6	44,4;68,8	69,6	63,0;76,2	Toujours
16,7**	8,5;28,2	18,0*	12,2;25,2	24,1*	16,1;33,7	28,9	23,5;34,3	30,9*	20,5;43,0	36,6*	24,9;49,7	24,7	18,7;30,6	La plupart du temps
3,7**	0,5;12,5	4,8**	2,3;8,9	9,7**	4,7;17,1	4,6*	2,6;7,4	5,3**	1,4;13,0	1,6**	0,0;8,4	4,8**	2,1;9,3	À l'occasion
3,3**	0,4;11,3	5,6**	2,4;10,6	1,0**	0,0;5,2	1,6**	0,5;3,7	3,7**	0,8;10,1	5,2**	1,1;14,2	0,9**	0,1;3,1	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p, r]
55,9	41,1;70,1	64,4	56,5;72,2	38,6	28,2;49,1	49,9	43,6;56,2	35,6*	23,9;48,6	49,2	34,3;64,3	54,6	46,6;62,5	Oui, tout à fait
9,5**	3,1;20,9	12,7*	7,9;18,9	12,3**	6,2;21,0	13,2*	9,5;17,8	17,2**	8,9;28,8	25,6*	14,2;40,1	13,1*	8,3;19,3	Oui, en partie
34,6*	20,7;50,6	23,0*	16,3;30,9	49,1	38,6;59,6	36,9	30,7;43,1	47,2	34,6;59,8	25,2**	13,2;40,7	32,3	24,9;39,8	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	80,5	78,0;82,9	79,8	70,9;87,1
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	9,8	8,1;11,7	5,0**	1,6;11,4
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	9,8	8,1;11,7	15,2*	9,1;23,2
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	85,5	83,1;87,8	81,1	71,7;88,4
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	11,4	9,3;13,5	15,0*	8,4;23,8
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	3,2*	2,2;4,4	4,0**	1,0;10,3
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	81,1	77,1;84,7	80,7	69,4;89,2
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	11,5	8,8;14,8	9,8**	3,9;19,3
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	7,4*	5,1;10,3	9,5**	3,4;20,1
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	73,4	69,7;77,1	80,0	61,5;92,3
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	15,3	12,4;18,6	9,5**	1,9;25,8
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	11,3	8,8;14,3	10,4**	2,0;28,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
84,5	71,8;93,0	79,0	71,7;85,1	75,9	66,9;83,5	82,2	77,5;86,2	84,4	74,0;91,8	80,3	68,1;89,4	79,1	72,4;84,8	Aucun report
12,7**	5,0;25,2	11,6*	7,0;17,8	11,9**	6,4;19,8	9,6*	6,6;13,6	10,3**	4,4;19,6	8,2**	2,6;18,3	9,5*	5,7;14,8	Un report
2,8**	0,3;10,0	9,4*	5,4;15,0	12,1**	6,4;20,4	8,2*	5,3;11,9	5,3**	1,5;13,0	11,5**	4,7;22,6	11,4*	7,3;16,8	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
96,3	87,1;99,6	81,3	72,4;88,4	94,2	81,3;99,2	86,9	82,6;90,5	86,9	76,2;94,0	80,3	63,2;91,9	84,0	78,1;88,9	Aucun report
3,7**	0,4;12,9	11,6**	6,1;19,4	-	;	11,4*	8,1;15,4	11,5**	4,8;22,1	17,6**	6,5;35,3	12,1*	7,8;17,8	Un report
-	;	7,1**	2,9;14,1	5,8**	0,8;18,7	1,7**	0,6;3,9	1,6**	0,0;8,3	2,0**	0,0;11,0	3,8**	1,7;7,3	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
71,9	48,0;89,2	100,0	;	79,9	69,9;87,7	83,0	76,2;88,6	78,8	53,6;94,1	88,5	74,8;96,3	76,9	63,1;87,5	Aucun report
24,2**	8,3;47,8	-	;	9,9**	4,6;18,0	13,2*	8,3;19,7	5,2**	0,1;26,4	4,6**	0,5;16,8	13,8**	5,9;26,1	Un report
3,9**	0,2;18,0	-	;	10,2**	4,7;18,6	3,7**	1,4;8,0	16,0**	3,3;40,9	6,9**	1,5;18,7	9,3**	3,0;20,6	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
69,1	47,2;86,1	54,8	43,8;65,7	74,6	55,9;88,4	79,0	74,2;83,9	72,0	58,9;82,9	85,7	60,4;97,6	71,2	55,9;83,6	Aucun report
18,3**	5,2;40,5	27,8*	18,4;38,9	14,8**	4,8;31,9	10,7*	7,1;15,3	16,3**	7,7;28,8	9,3**	1,0;31,2	20,2**	9,3;35,5	Un report
12,6**	2,5;33,3	17,4*	10,1;27,1	10,6**	2,6;26,2	10,2*	6,7;14,8	11,7**	4,9;22,4	5,1**	0,1;27,6	8,6**	2,2;21,3	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	13,1	11,2;15,0	9,6**	4,9;16,3
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	9,7	8,0;11,6	13,0*	7,5;20,5
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	77,3	74,8;79,7	77,4	68,8;84,6
Nutritionniste ou diététiste[p, r]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	31,4	28,7;34,2	50,1	40,4;59,9
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	14,9	12,8;17,0	16,3*	10,1;24,2
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	53,7	50,6;56,7	33,6	24,4;42,8
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	47,8	45,0;50,5	40,6	30,7;50,5
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	4,6	3,3;6,1	8,3**	3,8;15,3
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	47,7	45,0;50,4	51,1	41,1;61,0
Psychologue[p, r]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	13,6	11,6;15,7	8,0**	3,6;14,8
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	12,0	10,0;13,9	13,4*	7,8;21,0
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	74,4	71,7;77,0	78,6	69,9;85,7
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	12,1	10,0;14,2	13,3*	7,5;21,3
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	8,5	7,0;10,3	11,4**	6,3;18,5
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	79,4	76,9;81,8	75,3	65,9;83,2
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	32,1	29,2;34,9	55,6	46,5;64,7
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	7,3	5,8;9,0	3,7**	0,9;9,7
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	60,7	57,7;63,6	40,7	31,5;49,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
8,1**	2,6;18,1	7,6**	3,8;13,2	16,8*	9,7;26,1	13,2	9,7;17,4	8,8**	3,6;17,3	29,1*	17,1;43,8	16,3*	11,3;22,4	Oui
4,5**	1,0;12,3	6,3**	3,0;11,3	9,7**	4,5;17,9	13,1*	9,4;17,5	12,7**	6,2;22,5	9,5**	3,2;20,5	5,9**	2,9;10,6	Non, mais il aurait souhaité le consulter
87,4	77,0;94,3	86,1	79,3;91,4	73,5	63,5;81,9	73,7	68,7;78,7	78,5	67,8;86,9	61,4	46,8;74,7	77,7	71,3;83,3	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p, r]
36,0*	24,1;49,2	28,1	21,4;35,6	53,1	43,5;62,8	19,2	14,7;24,3	38,2	27,8;48,6	41,7*	28,6;54,8	23,9	18,2;30,4	Oui
6,2**	1,6;15,8	10,5*	6,0;16,8	7,4**	2,9;15,0	20,3	15,9;24,6	24,1*	14,1;36,7	15,4**	6,8;28,3	12,5*	8,0;18,3	Non, mais il aurait souhaité le consulter
57,8	45,0;70,6	61,4	54,0;68,7	39,5	30,1;48,9	60,5	54,8;66,3	37,7	26,7;49,8	42,9*	29,8;56,0	63,6	56,5;70,7	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
56,9	43,3;70,6	29,8	23,0;37,3	69,9	61,2;78,6	52,8	47,2;58,5	52,1	41,1;63,2	67,3	53,1;79,6	38,7	31,7;45,6	Oui
7,6**	2,5;16,9	1,8**	0,4;5,2	3,6**	1,0;9,1	5,4*	3,2;8,5	5,3**	1,4;13,5	2,0**	0,0;10,7	3,4**	1,3;7,4	Non, mais il aurait souhaité le consulter
35,5*	22,9;49,7	68,4	61,4;75,4	26,5*	18,3;36,1	41,8	36,1;47,4	42,5	31,7;53,4	30,7*	18,8;44,8	57,9	51,1;64,7	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p, r]
8,1**	2,7;17,9	3,9**	1,5;7,9	17,0*	10,6;25,2	21,7	16,8;26,7	11,5**	5,4;20,6	28,4*	17,2;42,0	9,9*	6,1;15,0	Oui
14,0**	6,6;25,0	9,3**	5,2;15,1	13,4**	7,4;21,5	14,5	10,5;19,3	10,6**	4,6;19,9	15,0**	6,8;27,2	8,2**	4,6;13,3	Non, mais il aurait souhaité le consulter
77,8	65,4;87,4	86,8	80,7;91,6	69,6	60,7;78,6	63,8	58,0;69,5	78,0	67,3;86,5	56,6	43,0;70,1	81,9	75,4;87,3	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
4,8**	1,0;13,5	5,1**	2,1;10,1	25,8*	17,8;35,1	11,9*	8,5;16,0	11,4**	5,3;20,6	23,3**	12,3;37,9	10,2*	6,2;15,4	Oui
11,9**	5,3;22,0	6,7**	3,2;12,1	8,2**	3,7;15,3	9,7*	6,5;13,9	5,1**	1,3;13,0	14,3**	6,8;25,3	5,8**	2,8;10,4	Non, mais il aurait souhaité le consulter
83,3	72,8;91,0	88,1	81,7;93,0	66,0	56,9;75,2	78,4	73,6;83,2	83,5	73,3;91,0	62,4	48,4;75,0	84,1	78,0;89,0	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
20,8**	11,2;33,6	28,4	21,1;36,6	35,5	26,1;45,0	31,8	26,6;37,0	11,1**	5,3;19,7	41,2*	28,7;53,6	29,1	22,6;36,3	Oui
9,4**	3,5;19,5	6,6**	3,2;11,8	5,5**	1,9;12,2	8,0*	5,1;11,7	18,2*	10,1;29,0	3,4**	0,4;11,6	6,0**	3,1;10,2	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
69,8	56,7;80,9	65,0	57,3;72,7	58,9	49,6;68,3	60,2	54,8;65,6	70,8	58,8;80,9	55,4	43,0;67,8	64,9	57,9;71,8	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	12,8	10,9;14,7	9,6**	4,5;17,2
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	15,6	13,4;17,8	16,5*	10,3;24,6
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	71,6	69,1;74,2	73,9	64,9;81,6
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	11,1	9,2;13,0	6,9**	3,1;13,2
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	10,9	9,0;12,9	14,0*	8,2;21,8
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	77,9	75,5;80,4	79,1	70,7;86,0
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	7,3	5,9;9,0	9,2**	4,8;15,6
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	15,7	13,4;18,0	16,1*	9,6;24,7
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	77,0	74,4;79,5	74,6	65,4;82,5
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	2,3*	1,5;3,3	2,7**	0,6;7,4
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	4,3*	3,1;5,7	9,6**	4,6;17,3
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	93,5	91,8;94,9	87,7	79,9;93,3
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	6,5	5,2;8,0	9,5**	4,8;16,3
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	14,3	12,3;16,3	16,0*	9,8;24,1
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	79,2	76,9;81,5	74,5	65,3;82,3
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	10,1	8,2;11,9	12,2**	6,6;20,0
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	5,9	4,5;7,5	9,9**	4,9;17,4
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	84,0	81,8;86,2	77,9	68,9;85,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
9,9**	3,8;20,1	3,7**	1,4;7,7	19,7*	12,5;28,6	21,7	17,2;26,2	6,5**	2,1;14,5	6,5**	1,7;16,2	10,5*	6,5;15,8	Oui
20,1**	10,9;32,4	10,7*	6,3;16,7	17,3*	10,3;26,6	17,3	13,1;22,3	16,7**	8,9;27,3	21,0**	11,0;34,5	12,2*	8,0;17,5	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
70,0	57,3;80,8	85,6	79,1;90,7	63,0	52,8;73,1	61,0	55,5;66,5	76,8	65,5;85,9	72,5	58,5;83,9	77,3	70,7;83,0	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
12,2**	4,8;24,3	4,3**	1,7;8,7	9,7**	4,7;17,3	18,5	14,4;23,1	12,7**	5,8;23,1	17,1**	7,7;30,9	6,5**	3,4;11,2	Oui
10,1**	3,7;21,1	9,8**	5,5;15,8	15,7*	9,0;24,5	7,8*	4,8;11,8	15,1**	7,8;25,4	8,4**	2,8;18,5	11,6*	7,4;17,0	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
77,7	64,2;87,9	85,9	79,4;90,9	74,6	65,1;82,7	73,7	68,7;78,8	72,2	60,1;82,3	74,5	60,7;85,5	81,9	75,7;87,0	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
11,5**	5,0;21,6	1,2**	0,1;4,4	13,4**	7,4;21,8	7,1*	4,4;10,8	5,0**	1,4;12,1	14,7**	5,9;28,4	6,2**	3,3;10,4	Oui
15,9**	7,6;28,1	13,5*	8,2;20,4	13,4**	7,3;21,8	20,1	15,6;24,5	16,5**	8,7;27,3	20,8**	10,8;34,3	10,5*	6,4;15,9	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
72,6	59,4;83,4	85,3	78,1;90,9	73,2	62,6;82,2	72,8	67,8;77,8	78,5	67,5;87,2	64,5	49,0;78,1	83,3	77,2;88,4	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
3,2**	0,4;10,8	2,4**	0,6;6,2	-	;	3,4**	1,8;5,9	1,0**	0,0;4,9	2,1**	0,0;11,1	1,7**	0,3;5,0	Oui
3,1**	0,4;10,9	5,6**	2,4;10,8	4,2**	1,0;11,0	3,2**	1,6;5,8	4,9**	1,3;12,6	5,6**	1,1;15,9	1,5**	0,3;4,2	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
93,7	85,2;98,1	92,0	86,3;95,9	95,8	89,0;99,0	93,3	90,2;95,7	94,1	86,5;98,1	92,3	81,2;97,9	96,8	93,1;98,8	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
10,9**	4,5;21,0	4,4**	1,8;8,8	8,9**	4,3;16,1	5,0*	2,9;8,1	1,3**	0,1;6,1	13,6**	6,1;24,9	5,9**	3,2;10,0	Oui
14,0**	6,6;24,8	9,3**	5,0;15,3	17,2*	10,1;26,3	16,7	12,8;21,2	18,0**	9,9;28,9	19,4**	9,5;33,1	10,0*	6,3;14,9	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
75,2	62,4;85,4	86,3	79,7;91,5	73,9	64,3;82,1	78,3	73,8;82,8	80,7	69,6;89,1	67,1	53,6;78,7	84,1	78,3;88,8	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
11,8**	5,2;21,9	5,6**	2,5;10,6	17,3*	10,8;25,6	6,4*	3,9;9,9	3,8**	0,8;10,4	9,2**	3,2;19,8	15,9*	11,0;21,8	Oui
6,1**	1,5;15,4	5,1**	2,2;9,8	4,6**	1,4;10,6	6,4*	3,8;10,0	9,6**	3,7;19,4	7,9**	2,2;18,8	2,4**	0,8;5,3	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
82,2	69,9;91,0	89,2	83,1;93,8	78,1	68,9;85,7	87,2	82,7;90,9	86,6	76,3;93,6	82,9	70,5;91,6	81,8	75,6;86,9	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	7,5	6,1;9,2	8,4**	3,7;15,8
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	92,5	90,8;93,9	91,6	84,2;96,3
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	26,2*	17,3;36,7	-	;
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	73,8	63,3;82,7	100,0	;
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	16,4*	9,3;26,1	-	;
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	83,6	73,9;90,7	100,0	;
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	24,1*	15,5;34,5	-	;
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	75,9	65,5;84,5	100,0	;
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	6,8**	2,5;14,5	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	93,2	85,5;97,5	100,0	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p, r]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	35,8	25,5;46,0	9,3**	0,1;50,4
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	64,2	54,0;74,5	90,7	49,6;99,9
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	15,2**	8,2;24,9	-	;
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	84,8	75,1;91,8	100,0	;
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	34,6*	24,1;46,4	41,9**	10,0;80,0
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	65,4	53,6;75,9	58,1**	20,0;90,0
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	44,9	33,9;55,9	52,9**	15,5;87,9
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	55,1	44,1;66,1	47,1**	12,1;84,5
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	7,6**	3,0;15,4	-	;
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	92,4	84,6;97,0	100,0	;
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	12,3**	5,9;21,8	10,6**	0,1;56,7
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	87,7	78,2;94,1	89,4	43,3;99,9
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	4,1**	0,8;11,7	24,3**	2,1;68,2
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	95,9	88,3;99,2	75,7*	31,8;97,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]
4,6**	1,0;12,9	5,3**	2,2;10,4	10,0**	5,2;17,2	8,4*	5,4;12,2	12,9**	6,5;22,1	13,7**	5,9;25,7	3,6**	1,6;6,7	Oui
95,4	87,1;99,0	94,7	89,6;97,8	90,0	82,8;94,8	91,6	87,8;94,6	87,1	77,9;93,5	86,3	74,3;94,1	96,4	93,3;98,4	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	55,1**	18,5;88,0	24,4**	5,0;57,2	32,3**	15,9;52,7	-	;	43,3**	6,9;86,5	39,1**	7,3;80,3	Oui
100,0	;	44,9**	12,0;81,5	75,6*	42,8;95,0	67,7	47,3;84,1	100,0	;	56,7**	13,5;93,1	60,9**	19,7;92,7	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	-	;	-	;	26,6**	11,2;47,5	26,9**	4,9;63,6	28,3**	2,3;75,7	26,3**	2,4;71,2	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	73,4	52,5;88,8	73,1*	36,4;95,1	71,7**	24,3;97,7	73,7*	28,8;97,6	Non
														Psychologue
-	;	21,9**	2,2;62,1	35,2**	9,4;69,8	33,9**	16,9;54,6	29,6**	6,1;65,9	28,3**	2,3;75,7	9,9**	0,1;48,7	Oui
100,0	;	78,1*	37,9;97,8	64,8*	30,2;90,6	66,1	45,4;83,1	70,4*	34,1;93,9	71,7**	24,3;97,7	90,1	51,3;99,9	Non
														Travailleur social
-	;	11,0**	0,3;47,6	7,7**	0,2;36,1	3,6**	0,1;19,1	19,0**	2,1;54,9	14,7**	0,2;65,4	-	;	Oui
100,0	;	89,0	52,4;99,7	92,3	63,9;99,8	96,4	80,9;99,9	81,0*	45,1;97,9	85,3*	34,6;99,8	100,0	;	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p, r]
33,7**	0,4;94,2	22,3**	2,2;62,9	72,5*	36,7;94,6	49,3*	29,2;69,6	9,5**	0,2;44,9	25,8**	1,9;72,8	39,1**	7,8;79,4	Oui
66,3**	5,8;99,6	77,7*	37,1;97,8	27,5**	5,4;63,3	50,7*	30,4;70,8	90,5	55,1;99,8	74,2*	27,2;98,1	60,9**	20,6;92,2	Non
														Médicaments
-	;	22,3**	1,8;65,2	7,7**	0,2;36,1	15,5**	4,2;35,8	26,9**	4,8;63,6	14,7**	0,2;65,4	27,0**	3,0;70,5	Oui
100,0	;	77,7*	34,8;98,2	92,3	63,9;99,8	84,5	64,2;95,8	73,1*	36,4;95,2	85,3*	34,6;99,8	73,0*	29,5;97,0	Non
														Services de transport
33,1**	0,4;93,7	11,3**	0,2;50,5	24,1**	4,3;58,9	33,1**	15,6;54,8	45,4**	15,3;78,3	42,5**	7,3;85,1	49,0**	11,8;87,1	Oui
66,9**	6,3;99,6	88,7	49,5;99,8	75,9*	41,1;95,7	66,9	45,2;84,4	54,6**	21,7;84,7	57,5**	14,9;92,7	51,0**	12,9;88,2	Non
														Services d'aide à domicile
66,9**	6,3;99,6	-	;	61,2**	26,2;89,2	49,4*	28,6;70,4	24,7**	5,1;57,5	50,3**	9,7;90,7	63,1**	20,4;94,0	Oui
33,1**	0,4;93,7	100,0	;	38,8**	10,8;73,8	50,6*	29,6;71,4	75,3*	42,5;94,9	49,7**	9,3;90,3	36,9**	6,0;79,6	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
-	;	-	;	26,8**	5,7;60,8	6,5**	0,7;22,9	-	;	26,9**	2,0;74,7	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	73,2*	39,2;94,3	93,5	77,1;99,3	100,0	;	73,1**	25,3;98,0	100,0	;	Non
														Soins infirmiers à domicile
-	;	-	;	-	;	20,2**	6,7;41,5	18,5**	1,7;56,2	14,7**	0,2;65,4	12,8**	0,2;58,4	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	79,8	58,5;93,3	81,5*	43,8;98,3	85,3*	34,6;99,8	87,2*	41,6;99,8	Non
														Autres services ou ressources
-	;	-	;	-	;	-	;	8,5**	0,1;41,8	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	91,5	58,2;99,9	100,0	;	100,0	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	97,2	95,9;98,2	93,5	86,9;97,4
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	2,8*	1,8;4,1	6,5**	2,6;13,1
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	64,4	61,7;67,2	67,5	58,5;76,5
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	2,5*	1,6;3,7	2,7**	0,5;8,0
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	22,0	19,6;24,4	21,3*	13,9;30,3
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	11,1	9,2;13,0	8,5**	3,9;15,7
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	58,1	55,2;61,0	55,8	46,6;65,1
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	8,0	6,4;9,8	10,0**	4,9;17,7
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	21,5	19,0;23,9	20,6*	13,5;29,2
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	12,5	10,3;14,6	13,6*	7,9;21,5
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	5,0	3,7;6,6	7,1**	2,5;15,2
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	4,3*	3,1;5,9	5,1**	1,6;11,8
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	15,5	13,3;17,8	19,4*	12,4;28,1
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	16,3	13,9;18,7	16,1*	9,5;24,8
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	51,1	48,0;54,3	49,8	39,9;59,7
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	7,7	6,2;9,5	2,5**	0,5;7,2
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	1,1**	0,6;2,0	0,9**	0,0;4,7
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	9,3	7,5;11,3	10,1**	4,8;18,2
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	89,6	87,7;91,5	89,0	81,0;94,5
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	88,7	86,7;90,7	88,0	79,9;93,7
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	10,2	8,2;12,1	12,0**	6,3;20,1
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	1,1**	0,6;2,0	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
100,0	;	97,4	93,4;99,3	97,0	91,2;99,4	98,6	96,3;99,6	98,8	94,0;100,0	98,2	90,6;99,9	95,8	91,4;98,3	Oui
-	;	2,6**	0,7;6,6	3,0**	0,6;8,8	1,4**	0,4;3,7	1,2**	0,0;6,0	1,8**	0,1;9,4	4,2**	1,7;8,6	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
59,9	46,9;73,0	58,4	50,8;66,0	96,8	91,0;99,3	74,4	69,3;79,6	43,6	31,9;55,4	57,9	44,6;71,1	49,5	41,2;57,8	Médecin spécialiste du cancer
1,6**	0,0;8,8	1,8**	0,3;5,6	1,2**	0,0;6,2	3,7**	1,7;7,0	-	;	2,6**	0,1;14,1	2,8**	0,9;6,6	Médecin de famille
30,0*	18,3;43,9	27,3	20,7;34,7	-	;	7,9*	4,9;11,8	39,1	28,4;49,7	17,5**	8,8;29,6	40,9	33,1;48,7	Autre médecin spécialiste
8,5**	2,8;18,7	12,4*	7,6;18,8	2,0**	0,3;7,1	14,0	10,1;18,6	17,3**	9,2;28,3	22,0**	11,5;36,0	6,7**	3,5;11,6	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
63,5	49,4;76,1	47,9	40,3;55,6	89,4	81,3;94,8	69,3	64,2;74,4	40,8	29,6;52,0	49,8	35,1;64,5	44,6	36,5;52,6	Médecin spécialiste du cancer
6,6**	1,9;15,7	11,3*	6,7;17,5	4,3**	1,3;10,0	8,8*	5,7;12,8	2,7**	0,2;10,5	7,0**	1,3;20,1	7,4**	4,0;12,2	Médecin de famille
22,1*	12,2;35,1	28,4	21,5;36,2	1,2**	0,0;6,3	6,9*	4,2;10,6	41,9	30,6;53,3	23,6*	13,2;36,9	37,8	30,0;45,6	Autre médecin spécialiste
7,8**	1,9;19,9	12,4*	7,8;18,3	5,2**	1,7;11,8	15,0	11,1;19,7	14,6**	7,3;24,9	19,7**	9,3;34,2	10,2*	6,1;15,8	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
1,6**	0,0;8,3	4,6**	1,8;9,3	3,4**	0,7;9,8	3,7**	1,7;6,8	1,3**	0,0;7,5	5,4**	1,2;14,8	9,2*	5,2;14,8	Au besoin
4,8**	0,9;13,9	0,6**	0,0;3,5	14,4**	7,7;23,9	2,1**	0,8;4,6	1,3**	0,0;7,4	14,6**	5,8;28,4	4,0**	1,7;7,6	À tous les mois
12,2**	5,6;22,2	6,8**	3,3;12,1	20,3*	12,2;30,8	13,6*	9,7;18,4	17,2*	9,7;27,2	20,7**	11,0;33,6	20,2*	14,3;27,1	À tous les 2 ou 3 mois
18,9**	10,1;30,8	12,2*	7,6;18,4	34,1*	24,1;44,1	14,5	10,4;19,3	17,0**	8,8;28,2	19,5**	9,8;32,9	12,4*	7,6;18,8	À tous les 4 mois
54,1	41,0;67,2	64,3	56,9;71,8	26,3*	17,8;36,2	58,9	53,0;64,7	57,7	46,2;69,1	39,8*	26,8;54,0	40,7	33,2;48,2	À tous les 6 mois
8,5**	2,8;18,6	11,4*	7,1;17,2	1,4**	0,1;7,1	7,3*	4,6;11,0	5,6**	1,4;14,2	-	;	13,6*	8,9;19,7	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
3,2**	0,4;11,3	0,8**	0,0;4,1	1,4**	0,0;8,1	0,7**	0,1;2,5	2,7**	0,3;9,7	-	;	1,0**	0,1;3,7	Trop long
4,9**	0,9;14,5	8,6**	4,6;14,3	8,0**	3,5;15,2	9,6*	6,5;13,5	16,1**	8,5;26,6	7,7**	2,0;19,2	8,7**	4,9;14,2	Trop court
91,9	81,8;97,4	90,6	84,7;94,8	90,5	82,6;95,7	89,8	85,7;93,0	81,2	69,9;89,6	92,3	80,8;98,0	90,2	84,6;94,3	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
93,8	85,7;98,1	90,9	85,2;94,9	86,5	77,3;93,0	87,2	82,8;90,8	81,2	68,4;90,5	85,3	72,2;93,8	92,5	87,7;95,9	Tout à fait capable
6,2**	1,9;14,3	7,8**	4,1;13,4	12,0**	5,9;21,1	11,4*	8,0;15,5	16,0**	7,5;28,3	12,6**	5,0;25,0	6,9**	3,7;11,6	En partie capable
-	;	1,3**	0,2;4,4	1,5**	0,1;7,3	1,4**	0,4;3,6	2,8**	0,3;10,3	2,1**	0,1;10,6	0,6**	0,0;3,3	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p, r]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	52,3	49,1;55,5	54,0	44,2;63,8
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	17,4	15,0;19,8	20,4*	12,5;30,4
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	30,3	27,4;33,1	25,6*	17,2;35,7
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	47,3	41,5;53,1	41,0*	23,4;60,4
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	52,7	46,9;58,5	59,0*	39,6;76,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p, r]
51,2	37,8;64,5	56,0	48,3;63,8	68,4	58,6;78,3	44,5	38,7;50,4	39,1	27,7;51,5	51,6	37,0;66,0	57,5	50,1;64,9	Oui, tout à fait
25,6*	15,0;38,9	19,4*	13,8;26,1	17,1*	9,6;27,3	15,3	11,2;20,3	24,0*	14,3;36,1	19,0**	8,6;34,1	11,7*	7,2;17,6	oui, en partie
23,2*	13,1;36,1	24,6	17,9;32,3	14,4**	7,7;23,8	40,1	34,5;45,8	36,9*	25,2;49,9	29,4*	17,4;43,9	30,8	23,9;37,7	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
45,9**	19,1;74,5	32,3**	17,1;50,7	59,6*	39,9;77,3	55,2	45,3;65,1	47,8*	25,6;70,6	40,7**	13,4;73,0	38,9*	22,7;57,1	Oui
54,1**	25,5;80,9	67,7	49,3;82,9	40,4*	22,7;60,1	44,8	34,9;54,7	52,2*	29,4;74,4	59,3**	27,0;86,6	61,1	42,9;77,3	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Sport ou activité physique[p, r]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	21,8	19,3;24,4	19,0*	12,2;27,4
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	50,5	47,5;53,5	55,2	46,4;63,9
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	27,7	25,1;30,4	25,8*	18,3;34,6
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	26,5	23,8;29,3	27,9	20,0;36,9
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	42,5	39,4;45,6	39,7	30,6;48,9
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	31,0	28,2;33,7	32,4	23,3;41,5
Modification de l'alimentation[p]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	42,6	39,6;45,5	52,8	43,4;62,3
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	28,2	25,5;30,9	21,4*	14,0;30,5
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	29,2	26,4;32,0	25,7*	17,8;35,0
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	15,9	13,8;18,0	14,3*	8,4;22,1
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	7,8	6,4;9,4	2,6**	0,5;7,6
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	76,3	73,8;78,8	83,1	74,5;89,7
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	2,0*	1,2;3,0	1,9**	0,2;7,5
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	4,8	3,5;6,4	2,4**	0,5;6,7
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	93,2	91,5;94,8	95,6	89,9;98,6
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	10,5	8,8;12,1	7,6**	3,5;14,0
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	11,3	9,4;13,2	10,0**	5,4;16,5
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	78,2	75,8;80,7	82,4	74,8;88,6
Gestion du stress[p, r]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	34,7	31,9;37,4	28,3*	20,1;37,7
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	27,9	25,3;30,6	31,2	22,5;40,0
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	37,4	34,6;40,2	40,5	31,3;49,6

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p, r]
31,1*	19,3;45,1	14,1*	9,0;20,6	22,3*	14,7;31,7	27,3	22,3;32,3	16,5**	8,8;27,2	26,1*	15,4;39,5	19,6*	14,1;26,2	Oui
46,2	33,6;58,9	49,5	42,0;57,1	55,2	46,4;64,1	48,3	42,7;53,9	52,4	41,3;63,5	57,0	42,2;70,9	48,2	41,2;55,2	Non
22,6*	12,7;35,4	36,4	29,0;43,7	22,4*	14,5;32,1	24,4	19,6;29,2	31,0*	20,6;43,1	16,9**	7,5;30,8	32,2	25,8;38,5	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
32,7*	20,3;47,2	22,5*	16,1;30,0	34,0	24,8;43,2	24,1	19,2;28,9	29,8*	19,2;42,3	29,9*	18,3;43,7	24,9	18,9;31,7	Oui
37,2*	24,7;51,1	45,0	37,2;52,9	42,9	32,7;53,2	46,3	40,4;52,1	28,5*	18,4;40,4	46,7	33,5;59,8	42,4	35,5;49,3	Non
30,1*	18,6;43,7	32,5	25,0;39,9	23,0*	15,2;32,5	29,7	24,4;34,9	41,7	30,0;53,4	23,4**	12,7;37,5	32,7	26,3;39,1	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p]
50,9	38,4;63,4	35,6	28,2;43,0	51,0	41,6;60,3	41,0	35,6;46,4	42,9	31,9;53,9	33,0*	21,1;46,8	40,2	33,7;46,6	Oui
18,5**	9,3;31,2	31,5	24,3;38,8	24,3*	16,3;33,8	29,6	24,5;34,7	25,9*	16,5;37,2	37,3*	24,5;51,7	30,8	24,4;37,2	Non
30,7*	19,0;44,4	32,9	25,5;40,2	24,7*	16,8;34,2	29,4	24,6;34,2	31,2*	21,0;43,0	29,7*	18,1;43,6	29,0	22,6;36,1	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
9,2**	3,4;18,9	7,8**	4,2;13,1	15,0*	9,0;22,8	15,5	11,3;20,5	20,1*	12,1;30,3	42,9*	29,4;56,3	17,4*	12,3;23,5	Oui
4,6**	1,0;12,5	10,8*	6,5;16,7	8,6**	3,8;16,3	7,9*	5,3;11,2	2,4**	0,3;8,8	5,0**	1,0;14,3	11,7*	7,7;16,8	Non
86,3	75,8;93,4	81,3	74,2;87,2	76,4	67,0;84,2	76,6	71,6;81,6	77,5	66,9;86,0	52,2	38,7;65,7	70,9	63,9;77,3	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
2,9**	0,3;10,4	0,6**	0,0;3,1	4,6**	1,3;11,0	0,9**	0,1;3,4	2,4**	0,3;8,4	3,2**	0,5;10,6	2,5**	0,8;5,9	Oui
3,1**	0,4;10,7	2,4**	0,7;5,8	6,8**	2,4;14,7	4,9**	2,7;8,2	6,2**	2,2;13,6	6,0**	1,1;17,7	6,6**	3,4;11,2	Non
94,0	85,0;98,4	97,0	93,4;99,0	88,6	79,8;94,5	94,2	90,7;96,7	91,3	83,4;96,3	90,8	79,4;97,0	91,0	86,1;94,5	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
9,4**	3,6;19,1	10,0*	6,1;15,2	14,4*	8,2;22,8	6,9*	4,5;10,1	15,6**	8,1;26,1	13,3**	6,0;24,4	13,1*	8,9;18,4	Oui
1,4**	0,0;8,7	18,9*	13,2;25,9	11,7**	6,2;19,6	10,6*	7,5;14,5	8,1**	3,0;17,0	12,0**	4,7;23,9	10,8*	6,8;16,1	Non
89,1	78,4;95,7	71,1	63,5;77,9	73,9	64,2;82,1	82,5	77,9;86,4	76,3	64,6;85,6	74,7	61,8;85,1	76,0	70,1;81,9	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p, r]
55,1	42,5;67,7	20,1*	14,1;27,2	39,4	30,2;48,6	40,9	35,5;46,3	31,9*	21,3;44,1	43,6*	29,9;57,2	31,3	24,9;37,7	Oui
19,2*	10,7;30,5	27,7	20,7;35,5	22,7*	15,5;31,3	26,2	21,3;31,1	32,9*	22,1;45,2	30,2*	18,3;44,5	31,3	24,8;37,9	Non
25,7*	15,2;38,8	52,2	44,5;59,9	37,9	28,8;47,1	32,9	27,6;38,3	35,2*	24,6;47,0	26,2*	15,0;40,2	37,4	30,8;44,0	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p, r]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	37,8	34,9;40,7	22,1*	15,0;30,6
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	16,8	14,6;19,0	16,5*	10,3;24,5
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	45,4	42,5;48,3	61,4	52,9;69,9
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	0,9**	0,4;1,6	-	;
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	99,1	98,4;99,6	100,0	;
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	0,3**	0,1;0,8	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	99,7	99,2;99,9	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p, r]
29,0*	17,6;42,8	30,8	24,0;37,6	44,2	34,4;54,0	46,9	41,0;52,9	39,1	28,6;49,7	47,5	34,5;60,4	36,1	29,6;42,6	Oui
7,7**	2,7;16,5	29,8	23,1;37,1	12,1**	6,3;20,4	10,9*	7,7;14,9	28,1*	18,7;39,3	10,4**	3,8;21,5	17,6*	12,4;23,8	Non
63,3	49,2;75,9	39,4	32,0;46,8	43,7	34,3;53,2	42,1	36,4;47,9	32,7*	22,4;44,4	42,2*	29,1;55,3	46,3	39,3;53,4	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
1,7**	0,1;8,7	-	;	1,0**	0,0;5,4	1,6**	0,5;3,6	2,4**	0,3;8,1	-	;	0,5**	0,0;2,7	Oui
98,3	91,3;99,9	100,0	;	99,0	94,6;100,0	98,4	96,4;99,5	97,6	91,9;99,7	100,0	;	99,5	97,3;100,0	Non
														Autre
-	;	0,6**	0,0;3,1	-	;	0,7**	0,1;2,5	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	99,4	96,9;100,0	100,0	;	99,3	97,5;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	48,2	42,7;53,6	41,7*	23,6;61,6
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	51,8	46,4;57,3	58,3*	38,4;76,4
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	80,6	77,0;83,9	81,9	69,1;91,0
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	19,4	16,1;23,0	18,1**	9,0;30,9
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	52,9	46,2;59,6	49,1*	24,4;74,1
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	47,1	40,4;53,8	50,9*	25,9;75,6
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	28,8	22,9;34,6	42,6**	17,7;70,6
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	71,2	65,4;77,1	57,4*	29,4;82,3
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	22,0	17,1;27,0	29,6**	12,6;52,0
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	78,0	73,0;82,9	70,4	48,0;87,4
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	52,8	47,5;58,1	59,1	40,0;76,4
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	47,2	41,9;52,5	40,9*	23,6;60,0
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	65,6	61,2;70,1	74,5	57,1;87,6
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	34,4	29,9;38,8	25,5**	12,4;42,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
39,6**	17,6;65,1	47,9*	29,6;66,5	48,4*	31,5;65,5	50,6	40,9;60,3	35,8**	17,6;57,6	68,9	44,8;87,3	47,3*	32,5;62,4	Oui
60,4*	34,9;82,4	52,1*	33,5;70,4	51,6*	34,5;68,5	49,4	39,7;59,1	64,2*	42,4;82,4	31,1**	12,7;55,2	52,7	37,6;67,5	Non
														Soutien de la famille ou des amis
96,4	82,3;99,9	82,1	68,5;91,6	86,0	72,9;94,3	80,4	73,6;86,1	65,1	46,6;80,8	84,5	69,0;94,1	76,6	66,1;85,1	Oui
3,6**	0,1;17,7	17,9**	8,4;31,5	14,0**	5,7;27,1	19,6*	13,9;26,4	34,9*	19,2;53,4	15,5**	5,9;31,0	23,4*	14,9;33,9	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
66,9**	16,5;97,6	57,2*	35,3;77,2	46,1*	23,4;70,2	59,2	46,8;71,5	40,6**	17,4;67,3	61,3*	37,4;81,7	44,6*	26,8;63,4	Oui
33,1**	2,4;83,5	42,8*	22,8;64,7	53,9*	29,8;76,6	40,8*	28,5;53,2	59,4*	32,7;82,6	38,7**	18,3;62,6	55,4*	36,6;73,2	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
37,3**	6,8;78,4	30,7**	10,2;59,1	12,7**	1,7;38,1	26,7*	16,5;39,1	16,3**	3,2;41,8	46,7**	15,7;79,8	31,8*	17,3;49,5	Oui
62,7**	21,6;93,2	69,3*	40,9;89,8	87,3	61,9;98,3	73,3	60,9;83,5	83,7	58,2;96,8	53,3**	20,2;84,3	68,2	50,5;82,7	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
8,9**	0,2;41,2	10,0**	2,1;26,3	22,7**	9,8;41,0	24,8*	16,0;35,3	18,6**	5,6;40,3	39,8**	17,2;66,1	19,2**	9,4;32,7	Oui
91,1	58,8;99,8	90,0	73,7;97,9	77,3	59,0;90,2	75,2	64,7;84,0	81,4	59,7;94,4	60,2*	33,9;82,8	80,8	67,3;90,6	Non
														Exemple de l'entourage[p]
53,3*	30,5;75,2	41,0*	24,7;58,9	69,5	52,9;83,0	52,2	42,3;62,2	44,8*	24,6;66,4	54,4*	33,6;74,1	48,5	35,5;61,5	Oui
46,7*	24,8;69,5	59,0	41,1;75,3	30,5*	17,0;47,1	47,8	37,8;57,7	55,2*	33,6;75,4	45,6*	25,9;66,4	51,5	38,5;64,5	Non
														Prière ou soutien spirituel[p]
63,4*	41,7;81,7	64,0	48,2;77,8	68,1	53,2;80,8	66,9	59,1;74,7	47,6*	29,5;66,1	77,3	59,0;90,3	61,6	48,8;73,3	Oui
36,6**	18,3;58,3	36,0*	22,2;51,8	31,9*	19,2;46,8	33,1	25,3;40,9	52,4*	33,9;70,5	22,7**	9,7;41,0	38,4*	26,7;51,2	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Montréal et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,1	9,3;13,0
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	0,8**	0,4;1,6	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	2,8*	2,0;3,9	4,4**	1,5;10,1
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	12,9	11,0;14,9	13,3**	7,3;21,5
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	33,4	30,6;36,3	40,1	31,0;49,2
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	50,0	47,0;53,0	42,2	33,0;51,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région															
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
5,8	4,5;7,3	14,9	13,3;16,5	8,9	7,4;10,4	26,9	24,9;29,0	7,1	5,7;8,8	5,1	3,9;6,6	20,1	17,7;22,5	Ensemble des patients	
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic	
1,5**	0,0;7,9	-	;	1,0**	0,0;5,7	0,6**	0,1;2,1	1,2**	0,0;6,0	1,8**	0,0;9,9	1,5**	0,3;4,2	Mauvaise	
4,0**	0,4;14,6	1,9**	0,4;5,5	1,9**	0,2;6,6	2,9**	1,3;5,6	3,6**	0,6;10,9	-	;	2,9**	1,0;6,7	Passable	
11,0**	4,6;21,4	14,3*	9,2;20,8	14,5*	8,3;22,8	11,9*	8,5;16,0	19,3*	11,5;29,5	13,1**	5,4;25,4	10,7*	6,7;16,0	Bonne	
27,3*	17,2;39,5	30,7	23,8;37,6	28,7*	20,1;38,6	37,1	31,4;42,8	31,3*	21,1;42,9	35,5*	23,2;49,5	30,9	24,3;37,6	Très bonne	
56,1	43,6;68,7	53,1	45,7;60,6	53,9	43,9;63,9	47,6	41,9;53,2	44,6	33,5;55,7	49,5	36,7;62,4	53,9	46,8;61,1	Excellente	

Région 07

OUTAOUAIS

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	48,4	46,9 ; 49,9
Femmes	53,9	51,6	50,1 ; 53,1
Âge			
18 à 49 ans	18,9	20,3	17,2 ; 23,4
50 à 59 ans	24,9	26,3	22,8 ; 29,7
60 à 69 ans	29,8	27,9	24,2 ; 31,7
70 ans et plus	26,5	25,5	22,7 ; 28,3
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	84,3	80,7 ; 87,4
Anglais	10,6	14,9	11,8 ; 18,4
Autres	3,0	0,8**	0,3 ; 1,9
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	27,5	23,6 ; 31,5
Diplôme d'études secondaires	24,7	27,2	23,4 ; 31,1
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	24,2	20,5 ; 27,8
Diplôme d'études universitaires	20,6	21,1	17,3 ; 24,9
Occupation principale			
En emploi	29,3	26,2	22,8 ; 29,5
Étudiant	1,7	1,1**	0,4 ; 2,5
Retraité	55,8	57,4	54,0 ; 60,8
À la maison	7,2	6,9*	4,9 ; 9,3
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	2,0**	1,0 ; 3,4
Congé de maternité / autres	3,6	6,5*	4,5 ; 8,9
Situation familiale			
Vit seul	24,1	20,8	17,4 ; 24,3
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	55,6	51,4 ; 59,8
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	15,9	12,9 ; 19,2
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	3,2*	2,0 ; 5,0
Autres	4,8	4,5*	2,8 ; 6,6
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	24,5	20,4 ; 28,6
Revenu suffisant	61,4	56,2	51,7 ; 60,7
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	19,3	15,9 ; 23,1
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	31,7	28,0 ; 35,5
2	21,1	16,5	13,5 ; 19,8
3	20,1	14,5	11,3 ; 18,1
4	19,4	16,0	12,9 ; 19,5
5 - très défavorisé	17,6	21,3	17,9 ; 24,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	14,0	11,2 ; 17,2	17,8	13,5 ; 22,9	10,4*	7,2 ; 14,5
Génital féminin	5,5	...	10,2	2,5**	1,4 ; 4,1	...	;	4,9**	2,8 ; 8,0
Prostate	15,9	34,4	...	10,7	8,9 ; 12,6	22,2	18,2 ; 26,1	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	6,4*	4,6 ; 8,7	7,7*	4,8 ; 11,5	5,3*	3,0 ; 8,4
Sein	26,5	0,4**	48,8	25,9	23,1 ; 28,6	0,7**	0,1 ; 2,5	49,5	44,4 ; 54,6
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	6,7*	4,8 ; 9,1	8,2*	5,2 ; 12,4	5,2*	3,0 ; 8,4
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	7,2*	5,2 ; 9,7	7,8*	4,9 ; 11,7	6,6*	4,0 ; 10,2
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	26,6	23,0 ; 30,1	35,6	30,0 ; 41,1	18,1	13,9 ; 22,9
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	83,0	79,2 ; 86,3	84,9	79,8 ; 89,2	81,2	75,7 ; 86,0
Récidive	7,4	7,5	7,3	8,3*	6,0 ; 11,1	7,0*	4,1 ; 11,1	9,5*	6,1 ; 13,9
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	8,7*	6,2 ; 11,7	8,0*	4,9 ; 12,3	9,3*	5,9 ; 13,8
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	13,4	10,7 ; 16,4	12,7*	8,9 ; 17,2	14,0	10,4 ; 18,4
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	16,0	13,1 ; 18,9	4,3**	2,1 ; 7,8	26,7	21,8 ; 31,7
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	70,6	67,0 ; 74,3	83,0	77,9 ; 87,3	59,2	53,8 ; 64,6
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	49,9	45,5 ; 54,3	46,1	39,7 ; 52,5	53,5	47,7 ; 59,4
Non	58,8	56,6	60,7	50,1	45,7 ; 54,5	53,9	47,5 ; 60,3	46,5	40,6 ; 52,3
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	90,6	87,9 ; 92,9	89,7	85,2 ; 93,1	91,5	87,8 ; 94,3
Non	8,3	8,5	8,0	9,4	7,1 ; 12,1	10,3*	6,9 ; 14,8	8,5*	5,7 ; 12,2
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	10,1	7,7 ; 12,9	11,3*	7,9 ; 15,6	8,9*	5,7 ; 12,9
Très bon	29,2	29,3	29,1	28,8	24,7 ; 32,9	27,8	22,1 ; 33,4	29,8	24,3 ; 35,3
Bon	34,9	34,2	35,5	32,9	28,7 ; 37,1	33,6	27,5 ; 39,8	32,2	26,8 ; 37,5
Moyen	18,8	17,8	19,6	18,0	14,9 ; 21,5	16,1	11,7 ; 21,3	19,8	15,0 ; 25,2
Mauvais	5,6	5,7	5,5	10,3	7,9 ; 13,1	11,2*	7,7 ; 15,5	9,4*	6,4 ; 13,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p]
14,0	11,2 ; 17,2	7,5**	3,3 ; 14,1	12,2*	7,7 ; 18,0	18,0*	12,1 ; 25,2	16,7*	10,7 ; 24,2	Colorectal
2,5**	1,4 ; 4,1	6,0**	2,6 ; 11,7	3,5**	1,2 ; 7,8	0,7**	0,0 ; 4,1	0,8**	0,0 ; 4,2	Génital féminin
10,7	8,9 ; 12,6	0,9**	0,0 ; 5,0	8,9**	4,9 ; 14,5	17,6*	12,5 ; 23,7	13,0*	8,8 ; 18,2	Prostate
6,4*	4,6 ; 8,7	7,7**	3,4 ; 14,8	7,7**	4,2 ; 12,7	7,3**	3,9 ; 12,2	3,1**	0,9 ; 7,7	Hématopoïétique
25,9	23,1 ; 28,6	34,1	26,5 ; 41,7	38,4	31,7 ; 45,2	18,9*	13,2 ; 25,8	14,1*	8,4 ; 21,5	Sein
6,7*	4,8 ; 9,1	11,0**	5,7 ; 18,6	6,4**	3,1 ; 11,5	6,3**	2,9 ; 11,5	4,0**	1,2 ; 9,7	ORL (Tête et cou)
7,2*	5,2 ; 9,7	3,9**	1,1 ; 9,3	5,8**	2,8 ; 10,6	9,3**	5,3 ; 15,1	8,9**	4,3 ; 15,8	Broncho-pulmonaire
26,6	23,0 ; 30,1	28,9*	20,4 ; 38,6	17,2*	11,4 ; 24,3	21,9	16,0 ; 28,7	39,4	30,8 ; 48,0	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
83,0	79,2 ; 86,3	86,5	78,9 ; 92,1	85,8	79,1 ; 91,1	83,4	76,4 ; 89,1	76,8	67,4 ; 84,5	Premier cancer
8,3*	6,0 ; 11,1	8,0**	3,4 ; 15,3	9,0**	4,9 ; 14,9	10,0*	5,7 ; 16,0	6,0**	2,3 ; 12,5	Récidive
8,7*	6,2 ; 11,7	5,5**	2,3 ; 10,8	5,2**	2,3 ; 9,9	6,6**	3,1 ; 12,0	17,2*	10,4 ; 26,1	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]
13,4	10,7 ; 16,4	13,8*	8,5 ; 20,8	13,7*	9,1 ; 19,6	12,9*	8,0 ; 19,3	13,1**	7,3 ; 21,2	Sous traitement
16,0	13,1 ; 18,9	19,9*	13,3 ; 28,0	21,1	15,2 ; 28,0	13,0*	8,0 ; 19,6	10,8**	5,4 ; 18,8	Sans traitement avec médication
70,6	67,0 ; 74,3	66,3	58,1 ; 74,5	65,2	57,8 ; 72,6	74,1	66,4 ; 80,8	76,1	66,2 ; 84,3	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p]
49,9	45,5 ; 54,3	47,7	38,4 ; 56,9	52,9	44,7 ; 61,0	52,5	44,2 ; 60,9	45,8	36,1 ; 55,5	Oui
50,1	45,7 ; 54,5	52,3	43,1 ; 61,6	47,1	39,0 ; 55,3	47,5	39,1 ; 55,8	54,2	44,5 ; 63,9	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]
90,6	87,9 ; 92,9	83,5	75,6 ; 89,6	88,3	81,9 ; 93,1	91,7	86,0 ; 95,6	97,4	92,2 ; 99,5	Oui
9,4	7,1 ; 12,1	16,5*	10,4 ; 24,4	11,7*	6,9 ; 18,1	8,3**	4,4 ; 14,0	2,6**	0,5 ; 7,8	Non
										Perception de l'état de santé[p]
10,1	7,7 ; 12,9	10,1**	5,2 ; 17,3	9,2**	5,2 ; 14,9	11,4*	6,7 ; 17,6	9,5**	5,0 ; 16,0	Excellent
28,8	24,7 ; 32,9	30,1	21,3 ; 38,9	24,6	17,6 ; 32,7	29,9	22,6 ; 38,1	31,0	22,2 ; 39,7	Très bon
32,9	28,7 ; 37,1	29,9	21,4 ; 39,5	35,6	27,6 ; 43,6	31,9	24,6 ; 39,2	33,5	24,7 ; 42,4	Bon
18,0	14,9 ; 21,5	18,6*	11,9 ; 27,1	20,3*	14,0 ; 27,9	16,7*	10,8 ; 24,1	16,5*	10,1 ; 24,8	Moyen
10,3	7,9 ; 13,1	11,3**	6,0 ; 18,8	10,3*	5,9 ; 16,5	10,1*	6,0 ; 15,8	9,5**	5,1 ; 15,9	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	51,6	47,2;56,0	57,3	45,8;68,7
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	48,4	44,0;52,8	42,7	31,3;54,2
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	36,7	30,1;43,3	31,6**	16,1;50,8
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	17,3	12,7;22,9	8,7**	1,8;23,5
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	22,6	16,8;28,4	32,4**	16,7;51,7
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	23,4	17,5;29,2	27,3**	13,0;46,0
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	48,5	42,4;54,7	50,5*	32,7;68,2
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	15,4	11,3;20,3	17,9**	6,0;36,9
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	13,5*	9,5;18,4	15,0**	4,6;33,0
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	14,0	10,2;18,5	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	8,5*	5,5;12,5	16,6**	5,9;34,0
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	41,0	35,5;46,4	50,0*	34,0;65,9
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	26,9	21,9;31,8	21,7**	10,0;38,1
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	21,8	17,3;26,2	22,3**	10,9;38,0
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	10,4	7,6;13,9	6,0**	1,3;16,2
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	83,9	80,4;87,0	78,5	66,7;87,7
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	12,4	9,6;15,6	18,6**	10,1;30,1
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	3,7*	2,2;5,8	2,8**	0,3;10,1
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	6,7*	4,6;9,3	2,6**	0,3;9,5
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	93,3	90,7;95,4	97,4	90,5;99,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
33,9**	11,6;63,3	15,8**	7,8;27,1	65,2	46,5;81,0	56,0	48,2;63,8	50,7*	33,3;68,0	26,4**	13,1;43,7	64,3	55,7;72,8	Oui
66,1*	36,7;88,4	84,2	72,9;92,2	34,8*	19,0;53,5	44,0	36,2;51,8	49,3*	32,0;66,7	73,6	56,3;86,9	35,7	27,2;44,3	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
-	;	50,0**	8,8;91,2	19,9**	3,8;49,8	42,3	31,3;53,4	47,4**	18,5;77,7	34,0**	4,8;77,5	35,2*	22,9;49,3	2 semaines et moins
35,6**	0,4;95,4	-	;	48,7**	21,7;76,2	20,1*	12,0;30,5	19,1**	3,3;49,8	13,3**	0,1;61,2	12,1**	4,8;23,9	Plus de 2 semaines à 1 mois
28,5**	0,1;92,7	15,9**	0,1;71,2	25,3**	6,8;54,3	16,8*	9,3;26,8	15,6**	2,0;45,7	52,8**	13,9;89,2	22,5*	12,5;35,6	Plus d'un mois à 3 mois
35,8**	0,4;95,3	34,1**	3,0;82,9	6,1**	0,1;29,8	20,8*	12,5;31,4	17,9**	2,0;52,6	-	;	30,1*	18,5;43,9	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
57,9**	22,0;88,4	57,2	42,3;71,1	48,0**	16,5;80,7	27,4*	16,2;41,2	48,5**	21,6;76,1	77,3	56,0;91,6	47,3*	31,0;64,0	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
8,9**	0,1;47,5	23,3**	12,6;37,2	26,3**	4,4;63,4	7,3**	2,3;16,6	24,4**	6,2;53,6	9,1**	1,8;24,8	15,3**	6,0;29,8	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
24,3**	2,6;66,1	17,2**	8,2;30,2	7,7**	0,1;39,6	1,4**	0,0;7,8	21,0**	4,4;50,4	3,1**	0,1;17,1	26,7**	14,2;42,6	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	55,6	43,1;68,1	-	;	6,6**	0,2;31,0	-	;	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
8,9**	0,1;43,5	2,4**	0,1;12,1	18,1**	2,0;52,9	8,3**	3,1;17,2	6,2**	0,1;31,7	3,9**	0,1;19,8	10,7**	3,3;24,1	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
-	;	27,0**	13,1;45,1	35,4**	15,3;60,2	48,9	38,2;59,7	49,6*	26,9;72,5	46,3*	26,0;67,5	35,1*	24,0;47,6	2 semaines et moins
67,9**	18,3;97,5	27,1**	13,2;45,4	38,0**	17,1;62,8	26,1*	16,8;37,4	26,1**	9,5;49,9	10,4**	2,0;28,5	29,4*	19,8;40,7	Plus de 2 semaines à 1 mois
18,5**	0,3;72,7	28,6**	14,6;46,3	9,4**	0,9;32,4	12,5**	5,9;22,2	19,4**	5,5;42,7	40,1**	20,7;62,1	25,9*	16,0;38,0	Plus d'un mois à 3 mois
13,7**	0,1;66,6	17,4**	7,4;32,3	17,2**	3,8;42,2	12,5**	6,7;20,6	4,9**	0,1;23,6	3,2**	0,1;16,8	9,6**	4,3;17,9	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
77,5*	46,0;95,4	86,7	75,7;94,0	76,8	58,3;90,0	89,3	82,4;94,2	88,4	73,1;96,6	76,8	60,2;89,0	83,5	75,7;89,6	Oui, tout à fait
16,6**	2,1;48,1	9,8**	3,7;19,9	18,0**	6,6;35,7	9,3**	4,7;16,0	8,5**	2,0;21,7	20,4**	9,0;36,8	10,1**	5,4;16,9	Oui, en partie
5,9**	0,1;28,9	3,5**	0,4;12,4	5,2**	0,6;17,6	1,4**	0,2;5,4	3,1**	0,1;16,1	2,8**	0,0;15,5	6,4**	2,6;12,6	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]
8,4**	0,2;39,8	7,1**	2,0;17,2	5,3**	0,6;18,9	5,7**	2,8;10,3	8,0**	1,7;21,8	4,9**	0,2;23,5	10,1**	5,3;17,1	Oui
91,6	60,2;99,8	92,9	82,8;98,0	94,7	81,1;99,4	94,3	89,7;97,2	92,0	78,2;98,3	95,1	76,5;99,8	89,9	82,9;94,7	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	24,9	21,3;28,5	14,9**	8,1;24,3
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	22,7	19,3;26,0	24,0*	14,9;35,3
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	23,5	19,9;27,0	35,2*	24,8;46,8
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	25,7	22,1;29,4	24,7*	15,7;35,7
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	2,6**	1,4;4,4	1,2**	0,0;6,8
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	-	;	-	;
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	0,6**	0,1;1,9	-	;
Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	91,7	89,0;93,9	97,6	91,1;99,7
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	8,3	6,1;11,0	2,4**	0,3;8,9
Professionnel suffisamment à l'écoute[p, r]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	94,3	91,9;96,1	95,9	88,1;99,2
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	5,7*	3,9;8,1	4,1**	0,8;11,9
Professionnel a consacré assez de temps[p, r]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	92,8	90,3;94,8	92,1	83,6;97,0
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	7,2*	5,2;9,7	7,9**	3,0;16,4
Professionnel a répondu aux questions[p, r]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	94,1	91,7;96,0	95,7	86,9;99,3
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	5,9*	4,0;8,3	4,3**	0,7;13,1
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	51,5	47,5;55,5	49,7	38,6;60,8
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	48,5	44,5;52,5	50,3	39,2;61,4
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	61,3	57,0;65,6	62,2	50,0;73,3
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	38,7	34,4;43,0	37,8*	26,7;50,0
Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	56,9	51,6;62,2	48,3*	33,1;63,7
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	43,1	37,8;48,4	51,7	36,3;66,9
Contact pour du soutien pratique[3, p, r]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	70,4	66,4;74,4	74,0	62,5;83,6
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	29,6	25,6;33,6	26,0*	16,4;37,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3. On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
5,9**	0,1;28,9	18,4**	9,5;30,7	14,8**	4,8;31,6	44,8	36,2;53,5	13,7**	3,8;31,8	29,7**	15,6;47,3	19,1*	12,6;27,3	Médecin de famille
33,5**	10,9;63,6	47,1	34,9;59,3	33,3**	17,7;52,3	10,4*	6,0;16,4	24,2**	12,0;40,4	27,7**	14,3;44,8	18,5*	12,3;26,0	Médecin spécialiste du cancer
13,9**	1,3;44,6	3,7**	0,4;13,0	18,6**	7,2;36,2	37,5	29,4;45,6	29,0**	14,9;46,9	21,2**	9,8;37,3	13,0*	7,6;20,2	Chirurgien
46,8**	19,6;75,5	29,3*	18,6;42,0	24,4**	11,8;41,4	3,4**	1,0;8,1	30,3**	15,1;49,5	16,4**	6,3;32,2	46,3	37,8;54,8	Autre médecin spécialiste
-	;	1,5**	0,0;8,6	5,8**	0,7;18,9	4,0**	1,4;8,8	2,7**	0,1;14,4	5,0**	0,6;17,3	1,4**	0,2;4,7	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	-	;	3,0**	0,0;17,2	-	;	-	;	-	;	1,7**	0,2;6,0	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]
88,2	62,5;98,7	96,8	88,1;99,7	94,2	80,0;99,4	81,4	74,0;87,5	93,9	80,0;99,2	92,9	78,7;98,8	95,4	89,5;98,5	En personne
11,8**	1,3;37,5	3,2**	0,3;11,9	5,8**	0,6;20,0	18,6*	12,5;26,0	6,1**	0,8;20,0	7,1**	1,2;21,3	4,6**	1,5;10,5	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p, r]
66,6*	37,3;88,8	96,6	88,1;99,6	94,2	79,6;99,4	94,8	90,0;97,8	97,0	83,3;99,9	90,4	77,4;97,3	94,9	89,7;97,9	Oui
33,4**	11,2;62,7	3,4**	0,4;11,9	5,8**	0,6;20,4	5,2**	2,2;10,0	3,0**	0,1;16,7	9,6**	2,7;22,6	5,1**	2,1;10,3	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p, r]
58,0*	29,8;82,8	100,0	;	91,5	76,1;98,4	94,5	89,6;97,5	96,9	82,9;99,9	86,8	71,3;95,7	92,6	86,7;96,5	Oui
42,0**	17,2;70,2	-	;	8,5**	1,6;23,9	5,5**	2,5;10,4	3,1**	0,1;17,1	13,2**	4,3;28,7	7,4**	3,5;13,3	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p, r]
63,3*	33,0;87,4	94,8	85,9;98,9	91,2	75,0;98,4	93,6	88,2;97,0	100,0	;	91,7	77,4;98,3	96,2	91,4;98,8	Oui
36,7**	12,6;67,0	5,2**	1,1;14,1	8,8**	1,6;25,0	6,4**	3,0;11,8	-	;	8,3**	1,7;22,6	3,8**	1,2;8,6	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]
39,4**	13,4;70,8	59,8	46,7;72,9	72,7	54,9;86,5	61,1	53,1;69,2	59,7*	39,9;77,5	56,8	39,7;72,9	32,2	23,7;40,7	Oui
60,6*	29,2;86,6	40,2*	27,1;53,3	27,3**	13,5;45,1	38,9	30,8;46,9	40,3*	22,5;60,1	43,2*	27,1;60,3	67,8	59,3;76,3	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]
72,4*	41,8;92,7	57,6	44,1;71,0	73,4	55,1;87,2	72,3	64,1;79,5	73,4	54,4;87,7	53,6*	36,5;70,0	46,2	36,9;55,5	Oui
27,6**	7,3;58,2	42,4*	29,0;55,9	26,6**	12,8;44,9	27,7	20,5;35,9	26,6**	12,3;45,6	46,4*	30,0;63,5	53,8	44,5;63,1	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]
27,3**	4,2;66,6	47,2*	29,4;65,5	64,7	43,9;82,0	76,2	66,8;84,0	60,4*	37,6;80,3	37,8**	17,8;61,5	44,3	31,6;57,0	Oui
72,7*	33,4;95,8	52,8*	34,5;70,6	35,3**	18,0;56,1	23,8*	16,0;33,2	39,6**	19,7;62,4	62,2*	38,5;82,2	55,7	43,0;68,4	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p, r]
34,1**	10,4;65,6	68,6	54,1;80,8	69,5	52,9;83,1	78,6	70,7;85,3	88,1	69,0;97,5	68,7	50,8;83,3	60,5	51,5;69,4	Oui
65,9*	34,4;89,6	31,4*	19,2;45,9	30,5*	16,9;47,1	21,4*	14,7;29,3	11,9**	2,5;31,0	31,3**	16,7;49,2	39,5	30,6;48,5	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	14,5	11,1;18,4	12,7**	5,6;23,6
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	85,5	81,6;88,9	87,3	76,4;94,4
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	29,1	24,4;33,8	20,7**	9,8;36,0
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	70,9	66,2;75,6	79,3	64,0;90,2
Psychologue[p, r]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	13,0	9,8;16,7	8,1**	2,2;19,9
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	87,0	83,3;90,2	91,9	80,1;97,8
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	5,7*	3,4;8,9	2,0**	0,0;12,3
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	94,3	91,1;96,6	98,0	87,7;100,0
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	9,7*	6,6;13,7	12,4**	4,7;25,1
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	90,3	86,3;93,4	87,6	74,9;95,3
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	3,1**	1,4;5,7	4,4**	0,5;16,0
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	96,9	94,3;98,6	95,6	84,0;99,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]
-	;	3,1**	0,1;15,8	15,3**	4,1;35,5	29,5	21,1;39,0	11,2**	2,2;30,5	4,2**	0,1;21,2	4,7**	0,9;13,7	Oui
100,0	;	96,9	84,2;99,9	84,7	64,5;95,9	70,5	61,0;78,9	88,8	69,5;97,8	95,8	78,8;99,9	95,3	86,3;99,1	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
27,3**	4,2;66,6	32,6**	17,1;51,5	31,9**	14,8;53,5	43,9	34,6;53,1	33,8**	16,0;55,8	10,4**	1,2;33,3	13,6**	6,6;23,9	Oui
72,7*	33,4;95,8	67,4	48,5;82,9	68,1	46,5;85,2	56,1	46,9;65,4	66,2	44,2;84,0	89,6	66,7;98,8	86,4	76,1;93,4	Non
														Psychologue[p, r]
-	;	2,7**	0,0;16,2	9,7**	2,2;25,2	28,5	20,4;37,7	3,8**	0,1;19,5	8,3**	0,8;28,5	6,1**	1,6;15,4	Oui
100,0	;	97,3	83,8;100,0	90,3	74,8;97,8	71,5	62,3;79,6	96,2	80,5;99,9	91,7	71,5;99,2	93,9	84,6;98,4	Non
														Travailleur social[p]
8,1**	0,1;40,3	6,0**	0,8;19,9	3,9**	0,1;21,3	7,4**	3,2;14,2	3,6**	0,1;20,7	4,2**	0,1;21,2	7,2**	1,8;18,0	Oui
91,9	59,7;99,9	94,0	80,1;99,2	96,1	78,7;99,9	92,6	85,8;96,8	96,4	79,3;99,9	95,8	78,8;99,9	92,8	82,0;98,2	Non
														Médecin[p]
-	;	5,8**	0,7;19,6	-	;	7,3**	3,2;13,9	15,1**	3,2;38,3	19,1**	5,0;43,3	13,7**	5,3;27,3	Oui
100,0	;	94,2	80,4;99,3	100,0	;	92,7	86,1;96,8	84,9	61,7;96,8	80,9	56,7;95,0	86,3	72,7;94,7	Non
														Autre professionnel de la santé
-	;	2,7**	0,1;14,7	11,0**	2,2;29,5	2,0**	0,2;7,0	-	;	-	;	3,4**	0,3;12,6	Oui
100,0	;	97,3	85,3;99,9	89,0	70,5;97,8	98,0	93,0;99,8	100,0	;	100,0	;	96,6	87,4;99,7	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	16,9	13,9;20,3	18,2*	10,4;28,4
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	83,1	79,7;86,1	81,8	71,6;89,6
Médecin spécialiste du cancer[p, r]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	45,1	41,1;49,1	54,5	43,5;65,4
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	54,9	50,9;58,9	45,5	34,6;56,5
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	17,4	14,2;21,1	17,9**	9,7;29,0
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	82,6	78,9;85,8	82,1	71,0;90,3
Autre médecin spécialiste[p, r]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	16,8	13,5;20,5	18,4**	10,1;29,5
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	83,2	79,5;86,5	81,6	70,5;89,9
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	2,9*	1,7;4,6	2,4**	0,3;8,4
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	97,1	95,4;98,3	97,6	91,6;99,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
6,4**	0,1;33,1	13,7**	5,7;26,3	12,8**	4,0;28,1	29,2	22,1;37,1	29,9**	15,3;48,2	3,0**	0,1;14,9	7,9**	3,8;14,0	Oui
93,6	66,9;99,9	86,3	73,7;94,3	87,2	71,9;96,0	70,8	62,9;77,9	70,1	51,8;84,7	97,0	85,1;99,9	92,1	86,0;96,2	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p, r]
21,3**	3,6;54,1	67,0	52,6;79,4	62,4	45,1;77,7	52,3	44,4;60,3	42,8*	25,0;62,0	48,5*	31,6;65,7	20,7*	13,4;29,7	Oui
78,7*	45,9;96,4	33,0*	20,6;47,4	37,6*	22,3;54,9	47,7	39,7;55,6	57,2*	38,0;75,0	51,5*	34,3;68,4	79,3	70,3;86,6	Non
														Médecin de famille[p]
12,6**	1,1;41,7	8,3**	2,8;18,1	21,4**	9,3;38,8	21,9*	15,6;29,4	15,7**	5,2;33,3	33,6*	19,2;50,6	11,7**	6,4;19,1	Oui
87,4	58,3;98,9	91,7	81,9;97,2	78,6	61,2;90,7	78,1	70,6;84,4	84,3	66,7;94,8	66,4	49,4;80,8	88,3	80,9;93,6	Non
														Autre médecin spécialiste[p, r]
6,4**	0,1;34,5	6,9**	1,7;17,7	5,8**	0,6;20,3	9,9*	5,7;15,8	40,3*	22,4;60,4	4,8**	0,5;17,1	28,8*	20,5;38,3	Oui
93,6	65,5;99,9	93,1	82,3;98,3	94,2	79,7;99,4	90,1	84,2;94,3	59,7*	39,6;77,6	95,2	82,9;99,5	71,2	61,7;79,5	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
6,4**	0,1;31,3	1,5**	0,0;8,1	4,6**	0,5;16,3	3,9**	1,4;8,1	-	;	-	;	3,7**	1,1;8,7	Oui
93,6	68,7;99,9	98,5	91,9;100,0	95,4	83,7;99,5	96,1	91,9;98,6	100,0	;	100,0	;	96,3	91,3;98,9	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	84,0	80,8;86,9	79,4	68,0;88,2
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	11,7	9,3;14,6	17,9**	9,8;28,9
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	4,3*	2,7;6,4	2,6**	0,3;9,1
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	72,5	68,7;76,2	70,2	59,2;79,8
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	17,4	14,3;20,8	20,1*	11,7;30,8
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	10,2	7,6;13,3	9,7**	4,4;18,0
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	84,2	79,8;87,9	84,6	73,7;92,2
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	10,2*	7,2;13,9	4,7**	1,0;12,9
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	5,6*	3,5;8,5	10,8**	4,5;20,8
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	59,9	55,1;64,7	65,7	51,6;78,1
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	11,4	8,3;15,1	1,5**	0,0;8,3
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	28,7	24,1;33,3	32,8*	20,7;46,8
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	31,1	27,3;34,9	30,8*	20,9;42,2
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	13,2	10,3;16,6	18,2**	10,0;29,3
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	28,1	24,2;32,0	23,6*	14,1;35,6
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	7,5*	5,3;10,1	10,4**	4,3;20,0
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	20,2	16,6;23,7	17,0**	9,3;27,4
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	64,6	57,6;71,6	36,6**	16,4;60,9
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	15,6*	10,4;22,0	14,2**	2,8;37,4
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	19,8	14,5;26,1	49,2*	26,3;72,4
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	13,2	10,5;16,3	9,2**	3,8;18,0
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	86,8	83,7;89,5	90,8	82,0;96,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
76,0*	45,3;94,5	88,6	77,8;95,4	81,5	65,0;92,5	88,0	81,5;92,8	88,8	73,0;97,0	93,2	81,7;98,5	78,2	70,1;85,0	Oui, tout à fait
16,0**	1,9;47,2	11,4**	4,6;22,2	18,5**	7,5;35,0	9,3**	5,2;15,3	6,1**	0,7;20,8	4,4**	0,6;14,7	12,3*	6,9;19,7	Oui, en partie
8,0**	0,2;37,4	-	;	-	;	2,7**	0,5;8,4	5,1**	0,6;17,2	2,4**	0,1;11,8	9,5**	5,1;15,8	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
59,7*	30,6;84,5	80,9	68,4;90,1	62,0	43,6;78,1	79,3	72,0;85,4	73,3	54,6;87,4	72,8	55,1;86,5	66,9	58,6;75,3	Oui, tout à fait
24,3**	5,6;55,1	15,6**	7,3;27,7	18,2**	7,5;34,2	16,5*	11,0;23,5	21,8**	9,2;39,9	19,6**	7,9;37,0	14,9*	9,1;22,4	Oui, en partie
16,0**	2,0;47,1	3,5**	0,4;11,8	19,9**	7,8;38,0	4,2**	1,6;8,5	5,0**	0,6;16,8	7,6**	1,5;20,8	18,2*	11,7;26,4	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
63,7**	24,9;92,3	78,0	62,0;89,5	95,9	76,6;99,9	86,6	78,1;92,7	83,7	58,1;96,8	81,7	63,3;93,4	83,8	71,6;92,3	Oui
-	;	13,8**	4,9;28,5	4,1**	0,1;23,4	10,7**	5,1;18,9	16,3**	3,2;41,9	13,0**	3,3;31,4	13,2**	5,5;25,2	Non, il ne voulait pas
36,3**	7,7;75,1	8,3**	1,7;22,4	-	;	2,8**	0,6;7,9	-	;	5,3**	0,6;18,4	3,0**	0,3;10,9	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
58,8**	26,8;86,0	63,4	48,9;76,3	55,2*	34,1;75,0	61,4	52,4;70,4	67,6	48,3;83,3	58,7*	37,0;78,1	51,0	39,6;62,4	Oui, tout à fait
-	;	13,6**	5,5;26,4	6,7**	0,7;23,7	14,5*	8,6;22,3	6,6**	0,7;22,8	16,6**	4,0;39,6	15,9**	8,4;26,5	Oui, en partie
41,2**	14,0;73,2	23,0**	12,2;37,2	38,1**	19,3;59,9	24,0*	16,2;33,4	25,8**	11,5;45,4	24,7**	10,2;45,2	33,0*	22,6;44,8	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
36,4**	10,6;69,7	44,6	31,8;57,3	42,4*	26,0;60,1	38,6	30,7;46,6	41,9*	25,5;59,8	29,3**	14,3;48,4	12,1*	7,0;19,0	Oui, une infirmière pivot en oncologie
24,7**	5,4;56,7	13,6**	5,8;25,5	5,8**	0,5;20,9	10,9*	6,5;16,8	15,9**	5,5;33,0	14,3**	4,4;31,7	12,5*	7,1;19,9	Oui, un autre professionnel de la santé
15,1**	1,4;48,5	17,0**	8,7;28,5	31,0*	16,7;48,6	30,1	22,6;37,6	25,7**	10,8;46,2	28,5**	14,2;46,8	34,2	26,1;42,3	Oui, un membre du personnel administratif
-	;	7,5**	2,6;16,1	2,5**	0,1;13,5	6,0**	2,7;11,4	6,2**	0,7;21,3	7,8**	1,4;22,7	9,5**	4,7;16,8	Oui, un médecin
23,8**	4,7;57,0	17,4**	9,1;28,9	18,3**	7,2;35,1	14,4*	9,1;21,2	10,2**	2,3;26,5	20,1**	8,1;38,0	31,7	23,7;39,6	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
55,6**	9,1;95,2	75,2	55,0;89,5	75,5*	25,9;98,7	64,3	50,7;76,3	82,7	49,2;98,0	78,5	47,3;95,8	60,7*	40,8;78,4	Oui, tout à fait
-	;	21,6**	8,3;41,3	-	;	19,9**	10,7;32,1	-	;	6,5**	0,1;36,4	19,2**	6,4;39,8	Oui, en partie
44,4**	4,8;90,9	3,2**	0,1;16,1	24,5**	1,3;74,1	15,8**	8,2;26,6	17,3**	2,0;50,8	15,1**	1,5;47,1	20,0**	7,7;38,6	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]
17,1**	1,9;50,7	25,3*	15,2;37,8	14,1**	4,6;30,3	16,3*	10,9;23,1	5,8**	0,5;21,5	22,3**	10,5;38,5	6,1**	2,6;11,9	Oui
82,9	49,3;98,1	74,7	62,2;84,8	85,9	69,7;95,4	83,7	76,9;89,1	94,2	78,5;99,5	77,7	61,5;89,5	93,9	88,1;97,4	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	78,9	76,1;81,8	97,6	91,3;99,7
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	21,1	18,2;23,9	2,4**	0,3;8,7
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	53,6	48,8;58,5	4,9**	1,0;13,7
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	46,4	41,5;51,2	95,1	86,3;99,0
Lieu de la chirurgie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	82,8	78,9;86,2	86,2	75,9;93,2
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	17,2	13,8;21,1	13,8**	6,8;24,1
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	55,5	48,7;62,4	65,2	44,0;82,7
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	8,8*	5,0;14,1	-	;
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	35,7	29,2;42,2	34,8**	17,3;56,0
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	65,4	60,7;70,0	66,5	54,5;77,1
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	15,8	12,3;19,8	19,5*	11,3;30,2
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	18,9	15,1;23,1	14,0**	6,6;24,9
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	95,5	92,8;97,5	97,3	90,6;99,7
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	4,5*	2,5;7,2	2,7**	0,3;9,4
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	87,5	83,7;90,7	86,3	76,4;93,1
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	11,3	8,3;14,8	13,7**	6,9;23,6
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	1,2**	0,3;3,2	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
82,4	54,4;96,7	29,5*	18,6;42,3	29,7**	14,4;49,2	89,6	83,7;94,0	84,3	68,9;94,0	71,6	54,7;85,1	91,1	85,2;95,2	Oui
17,6**	3,3;45,6	70,5	57,7;81,4	70,3	50,8;85,6	10,4*	6,0;16,3	15,7**	6,0;31,1	28,4**	14,9;45,3	8,9**	4,8;14,8	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
21,9**	2,6;60,3	25,2**	7,1;53,4	70,4*	33,0;94,3	81,4	73,4;87,8	23,7**	9,2;44,5	6,4**	0,6;22,6	76,4	67,6;83,8	Oui
78,1*	39,7;97,4	74,8	46,6;92,9	29,6**	5,7;67,0	18,6*	12,2;26,6	76,3	55,5;90,8	93,6	77,4;99,4	23,6*	16,2;32,4	Non
														Lieu de la chirurgie[p, r]
41,1**	11,9;75,9	68,9*	41,4;89,2	72,6*	36,2;94,9	90,0	83,3;94,6	93,3	77,9;99,2	49,1*	29,3;69,1	84,9	77,3;90,8	Hôpital de la région de résidence
58,9**	24,1;88,1	31,1**	10,8;58,6	27,4**	5,1;63,8	10,0**	5,4;16,7	6,7**	0,8;22,1	50,9*	30,9;70,7	15,1*	9,2;22,7	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
35,8**	3,6;83,6	59,0**	16,3;93,1	64,0**	14,0;97,2	58,2	46,9;69,6	77,3*	45,6;95,5	43,0**	20,9;67,4	48,0*	33,3;62,9	Oui, tout à fait
12,7**	0,1;64,5	25,5**	2,1;71,4	18,8**	0,2;76,2	6,1**	1,6;15,0	6,3**	0,1;33,2	8,7**	0,4;36,8	13,1**	4,9;26,6	Oui, en partie
51,5**	10,5;90,9	15,5**	0,3;63,8	17,2**	0,2;72,3	35,7*	24,4;48,3	16,4**	1,6;50,4	48,2*	24,5;72,5	38,9*	25,9;53,0	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
50,4**	15,8;84,6	86,3	57,7;98,4	70,8*	31,1;95,3	69,0	61,0;77,1	86,8	65,1;97,4	76,7	55,2;91,3	52,2	42,5;61,9	Oui, tout à fait
41,0**	10,6;77,9	7,2**	0,1;35,8	20,5**	1,7;61,7	13,3*	7,7;21,1	4,0**	0,1;21,6	14,3**	4,0;32,7	17,7*	10,8;26,6	Oui, en partie
8,6**	0,1;44,0	6,5**	0,2;31,1	8,7**	0,1;44,7	17,6*	11,3;25,5	9,2**	1,1;30,0	9,0**	1,1;28,8	30,1*	20,5;39,6	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
100,0	;	100,0	;	87,3	44,7;99,8	94,8	88,6;98,3	100,0	;	100,0	;	92,9	86,0;97,1	Oui
-	;	-	;	12,7**	0,2;55,3	5,2**	1,7;11,4	-	;	-	;	7,1**	2,9;14,0	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
80,5*	43,6;97,9	94,0	69,5;99,9	89,3	50,3;99,8	85,7	77,8;91,7	91,9	72,7;99,1	88,8	69,0;98,0	88,4	80,2;94,0	Oui, tout à fait
19,5**	2,1;56,4	6,0**	0,1;30,5	10,7**	0,2;49,7	11,8**	6,6;19,0	8,1**	0,9;27,3	8,1**	0,9;27,1	10,7**	5,4;18,7	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	2,5**	0,3;8,7	-	;	3,1**	0,1;17,4	0,9**	0,0;4,9	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	43,1	40,4;45,8	69,4	58,1;79,2
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	56,9	54,2;59,6	30,6*	20,8;41,9
Lieu de la chimiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	88,3	83,7;92,0	91,8	82,2;97,2
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	11,7*	8,0;16,3	8,2**	2,8;17,8
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	61,6	55,6;67,7	64,5	50,1;77,2
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	25,8	20,1;31,4	23,2**	12,5;37,3
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	12,6*	8,6;17,6	12,3**	4,9;24,3
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	57,1	48,7;65,4	46,1*	25,7;67,5
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	16,5*	10,5;24,0	22,6**	9,0;42,4
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	26,5	19,3;34,7	31,3**	14,2;53,1
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	34,6	28,7;40,4	42,8*	30,1;55,6
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	32,1	26,0;38,2	39,1*	26,6;52,8
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	33,3	27,7;39,0	18,0**	9,0;30,6
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	72,1	67,0;77,3	76,7	63,3;87,0
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	24,8	19,6;30,0	23,3*	13,0;36,7
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	3,1**	1,4;5,9	-	;
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	81,9	76,1;86,7	72,8	59,1;84,0
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	14,6*	10,3;19,8	19,8**	10,2;33,0
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	3,6**	1,5;7,0	7,3**	1,8;18,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
29,2**	9,7;56,8	1,8**	0,0;10,1	89,2	73,9;97,2	59,8	53,3;66,3	20,9**	9,0;38,1	62,0	44,3;77,6	20,2*	14,2;27,5	Oui
70,8*	43,2;90,3	98,2	89,9;100,0	10,8**	2,8;26,1	40,2	33,7;46,7	79,1	61,9;91,0	38,0*	22,4;55,7	79,8	72,5;85,8	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p]
100,0	;	-	;	77,7	59,2;90,6	93,5	87,2;97,3	100,0	;	79,7	59,3;92,9	80,1	59,7;93,1	Hôpital de la région de résidence
-	;	-	;	22,3**	9,4;40,8	6,5**	2,7;12,8	-	;	20,3**	7,1;40,7	19,9**	6,9;40,3	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
100,0	;	-	;	38,0*	21,2;57,4	66,5	57,0;75,9	100,0	;	53,5*	32,5;73,6	61,3*	39,2;80,5	Moins de 30 minutes
-	;	-	;	33,7**	17,7;52,9	27,3*	18,5;37,7	-	;	21,8**	8,5;41,4	30,8**	13,1;53,8	De 30 à 60 minutes
-	;	-	;	28,3**	13,2;48,0	6,2**	2,3;13,2	-	;	24,8**	9,7;46,3	7,9**	0,9;26,0	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
-	;	-	;	62,4*	37,9;83,0	60,1	45,4;73,5	100,0	;	54,5**	25,9;81,0	59,4*	30,1;84,4	Oui, tout à fait
-	;	-	;	10,0**	1,1;32,7	18,5**	9,0;32,1	-	;	14,4**	1,3;46,5	13,0**	1,3;42,4	Oui, en partie
100,0	;	-	;	27,6**	10,0;52,4	21,4**	11,1;35,3	-	;	31,1**	9,7;60,9	27,6**	7,9;57,1	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
-	;	-	;	48,1*	28,3;68,3	12,0**	6,3;20,2	83,9*	25,7;99,9	30,4**	13,5;52,3	72,8	50,9;88,8	Moins de 30 minutes
39,6**	2,9;89,8	-	;	24,0**	10,1;43,5	28,2*	19,5;38,4	16,1**	0,1;74,3	50,5*	29,6;71,3	23,8**	9,3;44,9	De 30 à 60 minutes
60,4**	10,2;97,1	-	;	28,0**	12,7;48,3	59,8	50,4;69,1	-	;	19,1**	5,8;41,0	3,4**	0,1;18,9	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
39,6**	2,6;90,7	-	;	82,9	64,3;94,3	63,3	54,0;72,5	83,9*	25,7;99,9	69,4	47,6;86,3	83,9	64,1;95,3	Oui, tout à fait
60,4**	9,3;97,4	-	;	14,3**	4,0;32,7	31,5	22,4;40,5	16,1**	0,1;74,3	27,1**	11,4;48,7	12,4**	2,6;32,3	Oui, en partie
-	;	-	;	2,8**	0,0;15,6	5,3**	1,7;11,8	-	;	3,5**	0,1;18,4	3,7**	0,1;18,8	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
100,0	;	-	;	90,1	73,7;97,9	83,9	75,0;90,6	100,0	;	80,5	60,7;93,2	78,6	56,2;92,9	Oui, tout à fait
-	;	-	;	2,9**	0,1;15,9	15,0*	8,5;23,7	-	;	19,5**	6,8;39,3	17,6**	4,9;39,5	Oui, en partie
-	;	-	;	7,0**	0,9;22,5	1,1**	0,0;6,3	-	;	-	;	3,8**	0,1;19,5	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	46,9	44,0;49,9	29,7*	19,7;41,5
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	53,1	50,1;56,0	70,3	58,5;80,3
Lieu de la radiothérapie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	76,2	70,9;81,4	80,4	59,4;93,5
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	23,8	18,6;29,1	19,6**	6,5;40,6
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	53,8	47,7;59,9	47,1*	26,1;68,9
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	23,3	18,0;28,5	25,3**	10,0;46,9
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	22,9	17,8;28,0	27,6**	10,1;52,2
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	64,7	57,2;72,2	46,5**	17,9;77,0
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	14,5*	9,4;21,0	22,2**	3,5;57,1
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	20,8	15,1;27,4	31,3**	8,9;62,9
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	81,2	76,0;85,6	66,2	44,0;84,1
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	12,6*	8,9;17,2	26,1**	9,9;48,9
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	6,2*	3,6;9,8	7,8**	0,9;25,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
33,8**	10,1;65,8	82,7	71,6;90,9	36,9*	21,7;54,3	74,7	67,3;81,2	63,7	45,7;79,2	38,5*	23,7;55,0	16,3*	11,0;22,8	Oui
66,2*	34,2;89,9	17,3**	9,1;28,4	63,1	45,7;78,3	25,3	18,8;32,7	36,3*	20,8;54,3	61,5	45,0;76,3	83,7	77,2;89,0	Non
														Lieu de la radiothérapie[p, r]
82,6*	27,2;99,8	53,8	40,1;67,6	86,9	56,6;98,9	86,7	79,3;92,2	90,5	69,1;98,9	58,5*	30,1;83,2	61,3*	37,9;81,5	Hôpital de la région de résidence
17,4**	0,2;72,8	46,2*	32,4;59,9	13,1**	1,1;43,4	13,3*	7,8;20,7	9,5**	1,1;30,9	41,5**	16,8;69,9	38,7**	18,5;62,1	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
59,0**	9,2;96,9	45,5*	30,6;60,9	30,3**	8,5;61,7	59,4	50,1;68,7	70,0	45,6;88,2	18,6**	3,3;48,3	72,3	47,2;90,1	Moins de 30 minutes
23,6**	0,4;81,1	17,0**	7,4;31,2	31,2**	8,6;63,3	28,6*	20,0;38,5	15,7**	3,6;38,6	30,4**	9,5;59,7	6,7**	0,2;32,6	De 30 à 60 minutes
17,4**	0,2;72,8	37,6*	23,9;52,9	38,5**	13,4;69,2	12,0*	6,9;19,1	14,3**	3,1;36,1	51,0**	22,5;79,0	21,0**	6,4;44,5	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
75,6**	10,8;99,9	71,7	53,7;85,8	85,8*	35,8;99,9	67,3	55,1;78,0	51,6**	24,2;78,3	63,2*	29,2;89,5	56,8*	32,1;79,2	Oui, tout à fait
-	;	14,3**	4,8;30,3	-	;	14,4**	7,3;24,7	14,0**	1,2;45,7	29,6**	6,4;65,0	9,7**	0,9;33,0	Oui, en partie
24,4**	0,1;89,2	14,0**	4,6;29,9	14,2**	0,1;64,2	18,2*	10,3;28,8	34,4**	11,2;64,9	7,2**	0,1;36,1	33,6**	13,9;58,7	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
40,1**	2,8;90,6	88,6	75,7;96,1	85,5	54,2;98,6	82,6	74,2;89,2	81,0	56,9;95,0	94,3	71,1;99,9	73,3	50,8;89,4	Oui, tout à fait
23,6**	0,4;81,1	9,4**	2,7;22,1	7,7**	0,1;39,2	13,8*	8,0;21,5	4,8**	0,1;24,9	5,7**	0,1;28,9	12,7**	2,4;34,2	Oui, en partie
36,3**	2,2;88,3	2,1**	0,1;10,4	6,8**	0,1;37,5	3,6**	1,0;9,2	14,3**	3,0;36,4	-	;	14,0**	2,9;36,0	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Douleur et malaises ressentis[p, r]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	57,1	52,9;61,2	71,0	59,1;81,0
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	42,9	38,8;47,1	29,0*	19,0;40,9
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	29,5	24,4;34,6	28,5*	16,8;42,7
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	40,2	34,5;45,8	39,9*	26,6;54,3
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	30,3	25,2;35,4	31,6*	19,2;46,3
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	72,0	67,0;76,9	68,9	54,1;81,3
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	21,2	16,6;25,7	23,9**	12,9;38,2
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	6,9*	4,1;10,7	7,3**	2,0;17,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p, r]
60,2*	30,1;85,5	41,7*	29,1;54,2	68,5	50,3;83,3	62,8	55,8;69,8	57,7*	38,5;75,4	73,1	53,5;87,8	42,2	32,6;51,8	Oui
39,8**	14,5;69,9	58,3	45,8;70,9	31,5**	16,7;49,7	37,2	30,2;44,2	42,3*	24,6;61,5	26,9**	12,2;46,5	57,8	48,2;67,4	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
9,8**	0,2;45,8	20,7**	7,5;41,0	26,6**	11,2;47,7	29,8*	20,7;40,2	26,5**	9,2;51,4	33,1**	16,1;54,2	37,9*	25,1;52,1	Sévères
69,9*	30,4;94,9	36,1**	16,9;59,4	49,3*	27,9;70,9	43,5	33,1;54,0	43,7**	20,9;68,7	37,2*	19,6;57,8	28,3*	17,0;42,1	Modérés
20,4**	2,0;59,4	43,2*	23,4;64,6	24,1**	8,0;48,3	26,7*	18,0;36,9	29,8**	10,8;55,9	29,6**	12,6;52,2	33,7*	20,9;48,6	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
52,1**	16,7;85,9	56,5*	33,9;77,2	85,3	65,4;96,1	79,3	69,3;87,3	71,8	47,6;89,2	79,3	60,1;92,1	64,2	49,2;77,4	Oui, tout à fait
23,0**	2,6;62,9	27,0**	10,8;49,4	11,1**	2,0;30,7	17,5*	10,2;27,1	19,9**	5,5;44,1	17,0**	5,6;35,7	28,1*	16,3;42,6	Oui, en partie
24,9**	2,7;67,0	16,5**	4,2;38,6	3,7**	0,1;20,2	3,2**	0,3;11,5	8,3**	1,1;26,5	3,7**	0,1;20,5	7,8**	2,3;18,1	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	88,0	84,1;91,2	92,7	80,3;98,4
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	9,0*	6,4;12,3	7,3**	1,6;19,7
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	3,0**	1,4;5,8	-	;
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	12,8	10,1;16,0	16,7**	8,6;28,0
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	87,2	84,0;89,9	83,3	72,0;91,4
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	74,2	70,2;78,2	68,0	56,3;78,3
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	24,5	20,6;28,4	28,8*	19,3;40,0
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	1,4**	0,5;2,8	3,1**	0,4;10,9
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	58,3	54,2;62,3	67,0	57,0;77,1
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	41,7	37,7;45,8	33,0*	22,9;43,0
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	23,8	20,1;27,5	15,5**	8,5;25,2
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	17,1	14,2;20,5	20,1*	11,3;31,6
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	59,0	54,8;63,3	64,4	51,7;75,7
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	78,3	74,2;82,5	74,7	62,4;84,7
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	16,4	12,6;20,8	18,3**	9,6;30,3
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	5,3*	3,3;8,0	7,0**	2,3;15,7
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	61,9	55,9;67,8	66,0	49,5;80,1
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	38,1	32,2;44,1	34,0*	19,9;50,5
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	90,1	87,3;92,5	81,7	70,8;89,8
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	8,6	6,4;11,3	15,3**	7,9;25,8
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	1,3**	0,5;2,7	3,0**	0,4;9,9

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
88,6	49,1;99,8	86,3	70,6;95,5	100,0	;	86,4	79,4;91,8	91,2	70,4;99,1	89,9	73,2;97,9	80,6	66,6;90,6	Oui, tout à fait
11,4**	0,2;50,9	11,2**	3,1;26,2	-	;	12,1*	7,1;18,9	8,8**	0,9;29,6	7,0**	0,8;23,2	7,6**	2,1;18,5	Oui, en partie
-	;	2,5**	0,1;13,4	-	;	1,5**	0,2;5,2	-	;	3,1**	0,1;14,7	11,8**	4,0;25,5	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
43,9**	17,2;73,5	11,0**	4,6;21,0	5,8**	0,7;19,8	14,4*	9,1;21,3	9,4**	2,1;24,6	5,6**	0,6;19,3	11,8**	6,5;19,2	Oui
56,1*	26,5;82,8	89,0	79,0;95,4	94,2	80,2;99,3	85,6	78,7;90,9	90,6	75,4;97,9	94,4	80,7;99,4	88,2	80,8;93,5	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
53,7**	23,2;82,2	85,2	73,5;93,2	61,4	43,1;77,6	72,9	65,0;79,8	81,0	62,6;92,9	77,2	59,1;90,0	76,5	67,6;84,0	Oui, toujours
46,3**	17,8;76,8	13,2**	5,8;24,5	36,0*	20,5;53,9	26,5	19,6;34,3	19,0**	7,1;37,4	22,8**	10,0;40,9	21,8*	14,5;30,7	Oui, la plupart du temps
-	;	1,5**	0,0;8,5	2,6**	0,0;15,0	0,7**	0,0;3,5	-	;	-	;	1,7**	0,2;6,1	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
51,1**	21,8;79,8	60,5	46,9;73,0	64,3	45,3;80,4	82,8	74,9;89,0	55,2*	36,0;73,4	51,5*	33,2;69,5	28,8	20,6;38,3	Oui
48,9**	20,2;78,2	39,5*	27,0;53,1	35,7*	19,6;54,7	17,2*	11,0;25,1	44,8*	26,6;64,0	48,5*	30,5;66,8	71,2	61,7;79,4	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]
21,5**	3,9;53,7	31,4*	19,7;45,0	34,7*	19,4;52,8	33,5	25,6;41,3	36,0*	20,3;54,4	22,0**	9,6;39,5	10,0**	5,1;17,1	Oui
13,3**	1,3;43,1	13,0**	5,6;24,4	13,3**	4,3;28,9	21,0*	14,6;28,6	9,4**	2,0;25,0	29,6*	16,3;46,0	13,7*	8,2;21,1	Non, mais il aurait aimé l'être
65,2*	32,2;89,9	55,7	42,5;68,8	51,9*	35,4;68,2	45,6	37,2;54,0	54,6*	35,8;72,5	48,5*	31,7;65,5	76,3	67,9;83,4	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
89,4	48,5;99,9	85,7	72,3;94,2	68,2	47,3;84,8	77,1	67,3;85,2	92,5	74,7;99,1	70,1	51,0;85,1	79,1	68,3;87,6	Oui, tout à fait
10,6**	0,1;51,5	10,0**	3,2;22,1	23,9**	9,4;44,6	17,6*	10,3;27,0	7,5**	0,9;25,3	27,6**	12,9;46,8	13,8**	7,1;23,4	Oui, en partie
-	;	4,4**	0,6;14,7	8,0**	1,0;25,6	5,3**	1,9;11,4	-	;	2,4**	0,0;13,2	7,0**	2,3;15,7	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
41,0**	11,4;76,4	56,9*	36,4;75,9	62,4*	35,2;84,8	60,5	50,1;70,8	74,4	47,0;92,4	71,1	47,6;88,4	58,7	43,3;72,9	Oui
59,0**	23,6;88,6	43,1*	24,1;63,6	37,6**	15,2;64,8	39,5	29,2;49,9	25,6**	7,6;53,0	28,9**	11,6;52,4	41,3*	27,1;56,7	Non
														Patient traité de manière respectueuse
75,6*	42,8;95,0	98,5	92,4;100,0	92,1	78,3;98,4	90,9	85,4;94,8	91,4	74,7;98,6	94,8	81,3;99,5	89,4	82,4;94,3	Oui, toujours
24,4**	5,0;57,2	1,5**	0,0;7,6	7,9**	1,6;21,7	8,4**	4,6;13,7	5,4**	0,5;19,7	5,2**	0,5;18,7	8,9**	4,5;15,4	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	-	;	0,8**	0,0;4,1	3,2**	0,1;17,8	-	;	1,7**	0,2;5,9	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	2,5**	1,2;4,6	1,7**	0,0;9,2
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	3,9*	2,5;6,0	5,8**	1,4;14,9
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	2,2**	1,1;3,9	1,3**	0,0;6,9
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	91,3	88,2;93,8	91,3	81,8;96,8
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	76,4	72,9;79,9	65,1	52,8;76,0
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	16,5	13,6;19,8	31,3*	20,6;43,6
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	7,1*	4,9;9,9	3,6**	0,7;10,5
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	91,0	88,4;93,1	82,5	71,6;90,5
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	8,2	6,1;10,8	16,1**	8,4;26,8
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	0,8**	0,3;1,9	1,4**	0,0;8,1
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	71,2	64,9;77,5	76,6	58,7;89,5
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	28,8	22,5;35,1	23,4**	10,5;41,3
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	6,5*	4,6;8,9	5,6**	1,5;14,1
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	93,5	91,1;95,4	94,4	85,9;98,5
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	75,9	71,2;80,6	74,1	58,8;86,1
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	8,2*	5,6;11,5	9,4**	3,0;21,1
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	15,9	12,0;20,4	16,5**	7,0;30,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
-	;	3,4**	0,3;12,5	-	;	3,0**	0,9;7,1	-	;	8,8**	1,0;28,8	2,2**	0,3;7,7	Oui, souvent
8,7**	0,2;41,2	3,2**	0,4;10,5	2,5**	0,1;13,8	5,8**	2,6;10,9	2,7**	0,1;14,3	2,8**	0,1;15,1	1,9**	0,3;6,2	Oui, parfois
-	;	1,9**	0,1;10,0	-	;	1,8**	0,4;5,1	-	;	3,1**	0,0;18,6	4,5**	1,4;10,3	Oui, une seule fois
91,3	58,8;99,8	91,6	81,1;97,3	97,5	86,2;99,9	89,4	83,6;93,6	97,3	85,7;99,9	85,3	65,7;96,1	91,5	84,6;96,0	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
90,6	56,9;99,8	92,1	81,7;97,6	73,2	55,3;86,8	75,4	67,7;82,1	86,7	69,3;96,2	63,3	45,6;78,7	76,6	67,6;84,1	Oui, toujours
9,4**	0,2;43,1	6,4**	1,6;16,3	20,9**	9,1;37,8	20,1*	14,1;27,3	5,3**	0,7;17,8	20,3**	8,6;37,5	11,0**	6,0;18,1	Oui, la plupart du temps
-	;	1,5**	0,0;8,2	5,9**	0,7;20,5	4,5**	1,8;9,2	8,0**	1,0;25,8	16,4**	6,2;32,5	12,4**	6,7;20,4	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
93,6	68,6;99,9	96,4	87,4;99,6	92,2	77,8;98,5	89,3	84,0;93,4	94,8	81,7;99,4	86,1	69,4;95,7	94,5	89,2;97,7	Oui, toujours
6,4**	0,1;31,4	3,6**	0,4;12,6	7,8**	1,5;22,2	8,3**	4,5;13,6	5,2**	0,6;18,3	13,9**	4,3;30,6	5,5**	2,3;10,8	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	-	;	2,4**	0,7;5,8	-	;	-	;	-	;	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]
31,5**	4,0;75,6	73,9	50,7;90,2	83,3	54,9;97,2	71,5	57,3;83,1	66,7*	38,8;88,0	77,1*	44,8;95,5	67,1	51,4;80,5	Oui
68,5**	24,4;96,0	26,1**	9,8;49,3	16,7**	2,8;45,1	28,5*	16,9;42,7	33,3**	12,0;61,2	22,9**	4,5;55,2	32,9*	19,5;48,6	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
12,6**	1,3;40,6	4,9**	0,9;14,4	10,1**	2,6;24,8	9,2**	5,1;15,0	10,9**	2,9;26,3	4,7**	0,6;16,1	2,8**	0,7;7,1	Oui
87,4	59,4;98,7	95,1	85,6;99,1	89,9	75,2;97,4	90,8	85,0;94,9	89,1	73,7;97,1	95,3	83,9;99,4	97,2	92,9;99,3	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
90,0	54,1;99,8	77,2	59,2;90,0	91,7	72,3;99,1	78,5	69,4;85,9	72,4	51,4;88,0	82,8	62,9;94,7	65,7	52,5;77,3	Oui, tout à fait
-	;	5,2**	0,6;18,0	4,0**	0,1;21,4	7,4**	3,3;14,0	3,8**	0,1;20,7	9,6**	1,9;26,2	13,6**	7,0;22,9	Oui, en partie
10,0**	0,2;45,9	17,6**	6,6;34,8	4,3**	0,1;23,1	14,0*	8,0;22,2	23,8**	9,3;44,7	7,6**	0,8;26,4	20,7**	11,1;33,5	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	78,9	75,3;82,6	87,7	77,6;94,3
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	21,1	17,4;24,7	12,3**	5,7;22,4
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	10,9	8,3;14,1	12,1**	5,0;23,3
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	89,1	85,9;91,7	87,9	76,7;95,0
Médecin spécialiste[p, r]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	13,2	10,5;16,3	11,9**	5,4;21,8
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	86,8	83,7;89,5	88,1	78,2;94,6
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	22,0	18,5;25,5	29,1*	18,7;41,4
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	78,0	74,5;81,5	70,9	58,6;81,3
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	8,9	6,7;11,6	10,4**	4,5;19,9
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	91,1	88,4;93,3	89,6	80,1;95,5
CLSC[p, r]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	30,0	26,0;33,9	44,9	33,4;56,3
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	70,0	66,1;74,0	55,1	43,7;66,6
Urgence d'un hôpital[p, r]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	30,1	26,1;34,0	40,1	29,1;51,2
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	69,9	66,0;73,9	59,9	48,8;70,9
Unité de soins d'un hôpital[p]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	8,4	6,1;11,2	8,2**	3,2;16,7
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	91,6	88,8;93,9	91,8	83,3;96,8
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	0,6**	0,1;1,7	-	;
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	99,4	98,3;99,9	100,0	;
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	-	;	-	;
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	100,0	;	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]
89,7	53,3;99,8	74,2	60,6;85,0	81,7	64,1;93,1	85,4	78,0;91,0	73,7	54,3;88,1	81,0	61,6;93,3	68,0	59,0;76,9	Oui
10,3**	0,2;46,7	25,8*	15,0;39,4	18,3**	6,9;35,9	14,6*	9,0;22,0	26,3**	11,9;45,7	19,0**	6,7;38,4	32,0	23,1;41,0	Non
														Médecin de famille[p]
16,3**	1,3;52,4	8,3**	2,5;19,2	10,4**	2,7;25,4	9,3**	5,0;15,4	6,7**	0,8;22,0	11,2**	2,8;27,9	14,0*	7,9;22,4	Oui
83,7	47,6;98,7	91,7	80,8;97,5	89,6	74,6;97,3	90,7	84,6;95,0	93,3	78,0;99,2	88,8	72,1;97,2	86,0	77,6;92,1	Non
														Médecin spécialiste[p, r]
7,0**	0,1;35,3	16,9**	8,6;28,5	5,4**	0,6;18,9	9,6*	5,5;15,3	37,3*	20,5;56,7	4,1**	0,1;20,0	14,4*	8,3;22,7	Oui
93,0	64,7;99,9	83,1	71,5;91,4	94,6	81,1;99,4	90,4	84,7;94,5	62,7	43,3;79,5	95,9	80,0;99,9	85,6	77,3;91,7	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
58,5**	26,4;86,0	24,1**	13,0;38,5	22,9**	10,5;40,1	29,7	22,5;37,8	30,9**	16,3;48,9	17,2**	6,3;34,5	3,0**	0,8;7,6	Oui
41,5**	14,0;73,6	75,9	61,5;87,0	77,1	59,9;89,5	70,3	62,2;77,5	69,1	51,1;83,7	82,8	65,5;93,7	97,0	92,4;99,2	Non
														Info-Santé[p]
9,5**	0,2;44,7	7,2**	2,1;17,1	5,0**	0,6;16,9	13,2*	8,4;19,5	9,6**	2,1;25,4	9,9**	2,0;26,6	4,6**	1,4;10,6	Oui
90,5	55,3;99,8	92,8	82,9;97,9	95,0	83,1;99,4	86,8	80,5;91,6	90,4	74,6;97,9	90,1	73,4;98,0	95,4	89,4;98,6	Non
														CLSC[p, r]
19,1**	2,0;55,7	17,6**	8,7;30,2	33,1*	17,9;51,3	38,5	30,3;46,6	23,9**	10,5;42,6	14,4**	4,7;30,9	23,3*	15,3;33,0	Oui
80,9*	44,3;98,0	82,4	69,8;91,3	66,9	48,7;82,1	61,5	53,4;69,7	76,1	57,4;89,5	85,6	69,1;95,3	76,7	67,0;84,7	Non
														Urgence d'un hôpital[p, r]
37,3**	12,3;68,6	24,0*	13,3;37,8	33,3*	18,4;51,1	35,3	27,9;42,7	8,6**	1,8;23,1	39,7*	22,6;58,9	23,1*	15,6;32,2	Oui
62,7*	31,4;87,7	76,0	62,2;86,7	66,7	48,9;81,6	64,7	57,3;72,1	91,4	76,9;98,2	60,3	41,1;77,4	76,9	67,8;84,4	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p]
17,2**	1,6;52,7	4,8**	1,1;13,0	17,5**	6,2;35,5	11,4*	6,5;18,2	7,0**	0,8;23,0	12,1**	3,3;28,4	2,5**	0,5;7,4	Oui
82,8	47,3;98,4	95,2	87,0;98,9	82,5	64,5;93,8	88,6	81,8;93,5	93,0	77,0;99,2	87,9	71,6;96,7	97,5	92,6;99,5	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
-	;	-	;	-	;	0,6**	0,0;3,3	-	;	-	;	1,7**	0,2;6,0	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	99,4	96,7;100,0	100,0	;	100,0	;	98,3	94,0;99,8	Non
														Autre contact
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	66,4	61,3;71,5	55,8	42,4;69,2
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	14,6	11,3;18,3	30,4*	18,6;44,3
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	19,0	15,1;23,4	13,8**	5,7;26,5
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	50,1	44,8;55,4	41,8*	27,7;56,9
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	11,2	8,2;15,0	12,3**	4,6;25,0
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	38,7	33,4;43,9	45,9*	31,2;61,1
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	47,0	42,1;51,8	34,2*	21,9;48,3
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	15,5	11,9;19,6	24,0*	14,0;36,5
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	37,5	32,8;42,2	41,8*	28,8;54,9
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	41,5	36,6;46,5	34,5*	21,7;49,2
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	15,6	12,0;19,8	16,0**	7,1;29,3
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	42,8	37,9;47,8	49,5*	34,0;65,1
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	59,8	55,1;64,6	68,3	55,7;79,2
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	14,9	11,8;18,4	22,7*	13,5;34,2
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	25,3	21,0;29,6	9,0**	3,2;19,0
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	59,1	54,3;64,0	53,8	39,1;68,0
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	18,0	14,3;22,2	22,5*	12,4;35,8
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	22,9	18,7;27,1	23,7*	13,2;37,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
70,5*	34,7;93,8	55,5*	36,0;73,8	72,4	53,4;86,9	71,9	62,6;80,0	79,5	61,0;91,9	62,4*	41,4;80,4	63,3	51,4;74,2	Oui, tout à fait
11,0**	0,2;49,5	2,9**	0,0;16,8	15,0**	4,9;32,2	19,8*	12,8;28,4	-	;	16,0**	5,1;34,5	7,3**	2,5;15,7	Oui, en partie
18,5**	1,9;54,5	41,6*	23,6;61,5	12,5**	3,3;30,0	8,3**	3,7;15,7	20,5**	8,1;39,0	21,6**	8,3;41,4	29,4*	19,3;41,3	Non
														La sexualité[p]
54,1**	21,0;84,6	74,2	60,5;85,1	43,3*	24,0;64,3	53,1	44,1;62,1	48,9**	21,9;76,3	32,1**	15,6;52,6	40,0*	27,6;52,5	Oui, tout à fait
10,3**	0,1;49,4	13,5**	6,0;24,9	14,2**	3,7;33,7	14,0*	8,4;21,3	-	;	12,8**	3,4;30,0	5,3**	1,0;15,4	Oui, en partie
35,6**	8,9;71,5	12,3**	5,1;23,6	42,5*	23,7;63,0	32,9	24,0;41,8	51,1**	23,7;78,1	55,2*	34,7;74,5	54,6	42,0;67,3	Non
														Les émotions[p]
24,6**	4,5;59,5	58,6	41,2;74,6	52,7*	33,3;71,5	55,7	47,6;63,8	58,8*	37,1;78,2	37,5**	19,5;58,5	36,7*	25,3;49,3	Oui, tout à fait
10,3**	0,1;49,4	7,2**	1,4;20,4	19,0**	6,6;38,6	15,9*	10,2;23,2	13,1**	2,9;33,4	13,3**	3,8;30,5	13,7**	6,2;25,1	Oui, en partie
65,1**	27,5;92,2	34,2*	19,6;51,3	28,3**	12,9;48,5	28,4	20,9;37,0	28,1**	12,0;49,8	49,1*	30,2;68,3	49,6	37,8;61,4	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
24,6**	4,5;59,5	61,7	46,3;75,5	37,5**	19,5;58,4	46,8	38,3;55,3	49,0*	27,3;71,0	33,6**	16,8;54,1	26,4*	15,8;39,5	Oui, tout à fait
21,3**	2,4;59,6	13,3**	5,6;25,1	11,6**	2,3;31,0	20,0*	12,9;28,8	5,0**	0,1;26,4	13,7**	4,1;30,7	15,4**	7,5;26,8	Oui, en partie
54,0**	20,0;85,4	25,0*	13,7;39,6	50,9*	30,3;71,2	33,2	24,7;41,8	46,0*	24,7;68,4	52,7*	33,2;71,7	58,1	45,8;70,5	Non
														Les besoins alimentaires[p]
47,3**	14,0;82,5	67,9	50,7;82,2	62,3	43,4;78,8	55,3	47,0;63,7	93,2	76,1;99,3	60,2	41,4;77,1	41,0*	28,5;53,6	Oui, tout à fait
8,4**	0,2;40,5	11,9**	4,2;25,0	15,1**	4,9;32,3	21,4*	14,7;29,4	-	;	10,9**	2,9;26,1	7,4**	2,2;17,2	Oui, en partie
44,3**	12,4;80,3	20,2**	9,0;36,3	22,6**	9,4;41,4	23,3*	16,1;31,8	6,8**	0,7;23,9	28,9**	14,3;47,5	51,5	39,2;63,8	Non
														Les activités courantes[p]
32,2**	8,5;65,7	62,4	45,9;77,0	60,7*	39,1;79,6	63,4	54,6;72,2	79,8	58,5;93,3	58,4	41,0;74,5	51,7	40,0;63,4	Oui, tout à fait
28,1**	5,5;64,2	13,7**	5,0;27,9	23,3**	8,5;45,3	22,6*	15,4;31,3	3,7**	0,1;19,6	18,7**	7,5;35,5	11,5**	5,1;21,4	Oui, en partie
39,7**	11,1;74,9	23,9**	11,8;40,2	16,0**	4,3;37,0	14,0*	8,1;21,9	16,6**	4,5;37,9	22,9**	9,8;41,4	36,8*	25,4;49,4	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	88,5	85,3;91,2	75,3	63,7;84,7
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	8,9	6,6;11,8	20,5*	11,8;31,7
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	2,6**	1,4;4,3	4,2**	0,8;12,6
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	73,7	70,0;77,5	71,0	59,2;81,0
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	20,9	17,5;24,3	20,5*	11,9;31,6
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	3,4*	2,0;5,2	5,3**	1,4;12,9
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	2,0**	0,9;3,8	3,3**	0,4;11,3
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	67,6	63,3;71,8	62,6	50,1;74,0
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	16,2	13,1;19,8	15,7**	8,1;26,5
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	16,2	13,0;19,9	21,6*	12,5;33,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
81,0	52,6;96,3	90,2	79,2;96,5	96,7	83,6;99,9	92,6	86,6;96,4	96,9	82,7;99,9	89,5	75,4;97,0	86,6	80,1;91,6	Oui, tout à fait
12,6**	1,3;40,6	8,3**	2,6;19,0	-	;	6,0**	2,7;11,5	3,1**	0,1;17,3	5,5**	0,7;18,1	10,5**	5,9;17,0	Oui, en partie
6,4**	0,1;33,1	1,5**	0,1;7,7	3,3**	0,1;16,4	1,4**	0,1;5,5	-	;	5,0**	0,6;17,2	2,9**	0,7;7,4	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
67,2*	34,4;90,9	77,2	65,0;86,7	70,7	51,5;85,7	65,7	58,1;73,4	78,5	59,9;91,3	85,3	70,4;94,5	79,0	70,2;86,2	Toujours
25,9**	5,4;59,6	21,0*	11,7;33,2	22,8**	9,5;41,7	28,6	21,7;36,3	21,5**	8,7;40,1	11,8**	3,9;25,4	14,3*	8,2;22,5	La plupart du temps
6,9**	0,1;35,7	1,8**	0,0;10,3	6,5**	0,8;21,3	4,1**	1,4;9,0	-	;	2,9**	0,1;16,4	2,2**	0,5;6,3	À l'occasion
-	;	-	;	-	;	1,6**	0,2;5,9	-	;	-	;	4,5**	1,5;10,1	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
55,8**	26,0;82,7	75,4	61,8;86,2	48,7*	29,6;68,1	65,7	57,9;73,5	87,2	69,7;96,6	58,0	39,7;74,8	72,2	62,8;80,3	Oui, tout à fait
8,7**	0,1;42,7	17,3**	7,9;31,1	20,3**	8,4;37,7	22,0*	15,2;30,1	9,3**	1,9;25,4	28,1**	14,0;46,2	8,4**	3,9;15,2	Oui, en partie
35,5**	11,6;66,3	7,2**	1,9;17,7	31,0**	15,3;50,8	12,3*	7,1;19,2	3,4**	0,1;16,9	14,0**	4,5;30,1	19,5*	12,2;28,6	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	81,0	77,4;84,3	80,9	69,8;89,3
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	11,1	8,5;14,1	14,2**	6,9;24,9
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	7,9*	5,8;10,6	4,9**	1,5;11,5
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	89,4	86,1;92,2	87,9	78,4;94,2
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	8,1*	5,7;11,0	10,9**	4,9;20,3
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	2,5**	1,2;4,6	1,2**	0,0;6,0
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	82,5	77,2;87,0	87,6	75,8;95,0
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	9,0*	5,7;13,4	6,2**	1,3;16,9
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	8,5*	5,3;12,8	6,2**	1,6;15,5
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	71,7	66,2;77,3	79,5	58,6;92,9
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	14,4*	10,3;19,3	12,1**	2,2;33,1
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	13,9*	9,7;19,0	8,4**	1,1;26,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
79,6	49,9;96,0	70,8	57,6;81,9	78,0	59,5;90,9	81,6	74,6;87,4	91,4	76,7;98,2	71,0	53,1;85,0	86,2	78,4;92,0	Aucun report
8,6**	0,2;40,3	15,7**	7,6;27,4	16,3**	5,3;34,6	10,8*	6,6;16,5	8,6**	1,8;23,3	8,4**	1,7;23,0	7,6**	3,4;14,3	Un report
11,8**	1,2;38,7	13,5**	6,0;24,8	5,6**	0,6;19,8	7,6**	3,7;13,3	-	;	20,7**	9,1;37,3	6,2**	2,6;12,0	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
90,3	54,4;99,8	86,2	59,0;98,2	90,4	53,2;99,9	93,1	86,7;97,1	100,0	;	74,1	53,8;88,9	87,7	79,5;93,5	Aucun report
9,7**	0,2;45,6	13,8**	1,8;41,0	-	;	5,3**	2,2;10,7	-	;	19,4**	7,1;38,4	8,4**	3,7;15,9	Un report
-	;	-	;	9,6**	0,1;46,8	1,5**	0,0;7,8	-	;	6,5**	0,6;23,2	4,0**	1,3;9,2	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
60,4**	10,6;96,9	100,0	;	78,6	59,0;91,8	80,2	71,2;87,4	100,0	;	84,6	64,1;95,9	79,4	59,4;92,6	Aucun report
19,4**	0,1;79,5	-	;	11,9**	2,9;29,3	8,8**	4,0;16,2	-	;	10,9**	2,0;30,3	11,2**	2,2;30,1	Un report
20,1**	0,4;74,1	-	;	9,5**	1,7;26,9	11,0**	5,4;19,2	-	;	4,5**	0,1;23,3	9,3**	2,0;24,8	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
41,0**	3,1;90,8	56,7	40,2;72,1	64,2*	31,8;89,1	72,7	63,4;80,8	78,2	54,6;93,2	87,2	59,9;98,6	82,1	59,2;95,2	Aucun report
-	;	24,1**	12,0;40,1	27,6**	6,5;60,4	14,8*	8,6;23,2	12,8**	2,3;35,1	5,8**	0,1;28,9	-	;	Un report
59,0**	9,2;96,9	19,3**	9,0;33,9	8,2**	0,1;40,4	12,4*	7,1;19,8	9,0**	1,0;30,1	7,0**	0,1;35,1	17,9**	4,8;40,8	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	11,9	9,3;15,0	9,9**	4,0;19,6
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	6,4*	4,4;8,8	6,6**	2,3;14,5
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	81,7	78,2;84,8	83,5	73,0;91,2
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	28,7	25,2;32,1	54,7	43,3;66,1
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	11,0	8,4;14,0	8,4**	3,1;17,6
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	60,3	56,4;64,3	36,9*	25,6;49,3
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	50,7	46,2;55,2	54,9	42,9;66,9
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	2,1**	1,1;3,6	2,3**	0,3;8,1
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	47,2	42,8;51,6	42,7	30,9;54,6
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	17,6	14,6;20,9	12,6**	6,0;22,4
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	4,8*	3,1;7,0	3,7**	0,7;10,8
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	77,6	74,2;81,0	83,6	72,9;91,3
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	11,4	8,9;14,4	10,9**	4,6;21,0
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	4,1*	2,5;6,2	4,0**	0,8;11,5
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	84,5	81,2;87,4	85,0	74,2;92,6
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	42,3	38,0;46,6	56,7	44,9;68,5
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	7,3*	5,2;9,7	13,2**	6,6;22,7
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	50,4	46,0;54,9	30,1*	19,8;42,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
15,1**	1,7;45,8	6,9**	2,0;16,5	8,6**	1,6;24,1	25,5	18,4;33,9	8,0**	1,7;21,5	9,1**	1,7;25,2	3,2**	0,8;8,2	Oui
6,4**	0,1;33,1	1,8**	0,0;10,5	4,9**	0,6;16,7	9,5**	5,2;15,4	3,1**	0,1;17,3	9,5**	2,2;24,3	5,4**	2,1;11,1	Non, mais il aurait souhaité le consulter
78,5*	46,4;96,1	91,3	80,8;97,1	86,6	70,6;95,7	65,0	57,2;72,8	88,9	73,8;97,0	81,4	63,9;92,8	91,5	85,1;95,7	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
15,1**	1,3;48,5	23,7*	13,8;36,3	37,4*	21,4;55,6	17,4*	11,9;24,0	55,8*	37,2;73,3	53,3*	34,7;71,2	14,7*	8,9;22,3	Oui
28,3**	7,6;59,4	5,0**	1,0;14,1	10,3**	2,5;25,9	19,8*	13,7;27,1	7,5**	1,0;23,8	3,6**	0,1;17,4	6,9**	3,1;13,0	Non, mais il aurait souhaité le consulter
56,6**	26,2;83,7	71,2	57,8;82,4	52,3*	34,4;69,7	62,9	55,1;70,7	36,7*	21,0;54,7	43,1*	25,7;61,8	78,4	70,1;85,4	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
34,0**	11,4;63,8	42,0*	29,2;54,7	71,4	54,0;85,2	55,9	47,9;64,0	56,2*	37,1;74,0	70,1	50,9;85,2	36,7	27,6;45,8	Oui
6,4**	0,1;32,4	-	;	-	;	3,9**	1,5;8,2	-	;	-	;	2,2**	0,4;6,6	Non, mais il aurait souhaité le consulter
59,6*	29,9;84,8	58,0	45,3;70,8	28,6**	14,8;46,0	40,1	32,2;48,1	43,8*	26,0;62,9	29,9**	14,8;49,1	61,1	52,0;70,2	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
21,5**	3,9;53,6	6,7**	1,9;16,4	8,0**	1,6;22,2	34,3	26,8;41,9	16,4**	6,1;32,9	13,8**	4,6;29,4	10,6**	5,6;17,8	Oui
15,7**	1,8;47,0	3,5**	0,4;12,6	-	;	8,4**	4,2;14,6	3,4**	0,1;18,4	6,2**	0,8;20,1	2,4**	0,6;6,4	Non, mais il aurait souhaité le consulter
62,9*	30,8;88,2	89,8	78,7;96,3	92,0	77,8;98,4	57,3	49,0;65,6	80,2	62,7;91,9	80,1	62,6;91,9	87,0	80,0;92,3	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
15,1**	1,7;45,8	7,1**	2,1;16,6	8,6**	1,7;23,5	18,3*	12,4;25,5	7,6**	1,4;21,7	13,9**	3,6;32,9	7,0**	3,2;13,1	Oui
-	;	3,3**	0,3;12,1	-	;	4,9**	1,8;10,3	-	;	9,7**	2,0;25,7	4,8**	1,7;10,4	Non, mais il aurait souhaité le consulter
84,9	54,2;98,3	89,7	79,1;96,0	91,4	76,5;98,3	76,8	68,9;83,5	92,4	78,3;98,6	76,5	56,7;90,3	88,2	81,5;93,1	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
30,2**	8,2;62,1	23,5*	13,5;36,3	35,3*	19,4;54,0	59,3	51,1;67,4	36,1*	20,2;54,6	39,3*	22,4;58,2	30,5	22,3;38,7	Oui
8,7**	0,2;40,7	3,1**	0,4;10,9	10,6**	2,7;25,9	10,8*	6,3;17,0	-	;	9,5**	1,9;25,7	2,4**	0,6;6,5	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
61,1*	29,2;87,1	73,4	60,5;83,9	54,1*	36,2;71,3	29,9	22,5;38,1	63,9	45,4;79,8	51,3*	33,1;69,3	67,0	58,6;75,5	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	11,8	9,3;14,8	13,3**	6,5;23,3
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	9,6	7,3;12,4	11,3**	5,1;20,9
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	78,6	75,2;81,9	75,4	64,0;84,7
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	10,3	7,9;13,1	8,7**	3,5;17,2
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	7,9*	5,7;10,6	7,5**	2,6;16,2
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	81,9	78,3;85,0	83,9	73,4;91,4
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	9,1	6,7;12,0	6,4**	2,0;14,7
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	13,6	10,7;16,8	14,5**	7,4;24,8
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	77,3	73,6;81,1	79,0	67,3;88,1
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	8,9	6,6;11,5	2,9**	0,4;10,0
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	5,1*	3,3;7,4	5,6**	1,4;14,4
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	86,1	82,8;88,9	91,5	82,1;96,9
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	5,3*	3,5;7,7	6,1**	1,7;15,0
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	14,5	11,7;17,8	15,8**	7,7;27,4
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	80,1	76,3;83,6	78,1	65,6;87,7
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	12,1	9,3;15,3	19,1*	10,6;30,4
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	4,9*	3,2;7,1	6,7**	2,0;15,7
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	83,0	79,6;86,1	74,2	61,8;84,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
25,4**	6,7;54,6	1,8**	0,0;9,5	7,8**	1,5;21,7	22,0*	15,5;29,7	9,2**	1,9;25,0	14,3**	4,5;31,4	4,5**	1,7;9,5	Oui
-	;	3,4**	0,3;12,9	5,7**	0,6;19,9	15,4*	10,1;22,1	-	;	16,7**	5,7;34,7	8,1**	3,7;14,9	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
74,6*	45,4;93,3	94,8	85,0;99,0	86,5	70,0;95,9	62,6	54,7;70,4	90,8	75,0;98,1	68,9	50,6;83,8	87,4	80,1;92,8	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
16,1**	1,6;50,0	5,2**	1,0;14,7	8,3**	1,5;23,9	21,0*	14,8;28,3	9,2**	1,9;24,9	6,1**	0,7;21,1	3,5**	1,1;8,0	Oui
16,7**	1,9;49,9	5,2**	1,1;14,3	2,9**	0,1;15,3	8,7**	4,7;14,5	6,5**	0,7;22,2	12,6**	3,5;29,2	8,0**	3,7;14,7	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
67,2*	33,8;91,1	89,6	79,3;95,9	88,8	72,8;97,2	70,4	62,3;77,6	84,3	67,3;94,6	81,4	63,3;93,0	88,5	81,5;93,5	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
15,1**	1,3;48,5	18,8**	9,8;31,1	8,3**	1,7;22,4	9,1**	4,9;15,2	5,7**	0,6;19,5	11,7**	3,1;27,9	6,2**	2,7;12,1	Oui
13,3**	1,5;41,6	6,5**	1,7;16,4	13,5**	4,7;28,2	16,5*	11,2;23,0	5,6**	0,6;19,4	27,2**	13,7;44,5	11,7**	6,3;19,2	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
71,6*	39,4;92,8	74,7	61,8;85,0	78,2	61,3;90,2	74,4	66,9;81,0	88,7	72,6;97,1	61,1	43,1;77,2	82,1	73,8;88,6	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
23,3**	4,1;57,3	22,4**	12,1;36,0	-	;	9,9*	5,7;15,7	2,8**	0,1;15,0	22,7**	10,6;39,4	4,2**	1,6;8,9	Oui
7,0**	0,2;34,3	4,9**	1,0;13,8	7,7**	1,5;21,4	2,0**	0,4;5,6	-	;	16,8**	5,6;35,2	5,6**	2,2;11,5	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
69,7*	37,2;92,0	72,6	58,9;83,8	92,3	78,6;98,5	88,1	82,1;92,7	97,2	85,0;99,9	60,5	42,9;76,4	90,2	83,5;94,8	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
8,7**	0,2;41,2	-	;	8,7**	1,5;24,9	7,3**	3,7;12,6	2,5**	0,0;15,0	3,1**	0,1;16,7	5,3**	1,9;11,4	Oui
37,2**	11,8;69,3	7,8**	2,5;17,6	18,2**	7,7;33,8	20,3*	14,2;27,6	6,4**	0,8;21,4	25,3**	12,4;42,6	6,9**	2,9;13,2	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
54,1**	23,2;82,9	92,2	82,4;97,5	73,1	56,1;86,3	72,5	65,0;79,2	91,0	74,9;98,3	71,5	54,1;85,3	87,8	80,2;93,3	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
17,4**	1,9;51,9	7,6**	2,2;18,1	16,7**	6,2;33,3	15,3*	9,8;22,3	3,3**	0,1;16,6	17,4**	6,6;34,5	6,0**	2,4;12,1	Oui
6,4**	0,1;31,4	8,1**	2,4;18,8	-	;	5,3**	2,3;10,3	2,5**	0,0;14,5	2,6**	0,0;14,7	4,5**	1,6;10,0	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
76,2*	43,4;95,3	84,3	72,4;92,5	83,3	66,7;93,8	79,4	71,8;85,7	94,2	79,8;99,4	79,9	63,2;91,4	89,4	82,0;94,5	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	4,9*	3,4;6,9	3,9**	0,8;10,9
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	95,1	93,1;96,6	96,1	89,1;99,2
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p, r]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	24,4**	9,5;45,7	72,2**	7,0;99,9
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	75,6	54,3;90,5	27,8**	0,1;93,0
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	10,3**	2,0;28,2	27,8**	0,1;94,1
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	89,7	71,8;98,0	72,2**	5,9;99,9
Psychologue[r]													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	22,9**	8,6;43,9	-	;
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	77,1	56,1;91,4	100,0	;
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	7,7**	0,9;25,2	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	92,3	74,8;99,1	100,0	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	29,4**	13,5;49,9	-	;
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	70,6	50,1;86,5	100,0	;
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	17,8**	5,3;38,8	-	;
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	82,2	61,2;94,7	100,0	;
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	33,5**	15,9;55,2	-	;
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	66,5	44,8;84,1	100,0	;
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	45,7*	25,9;66,6	27,8**	0,1;94,1
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	54,3*	33,4;74,1	72,2**	5,9;99,9
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	..	;	..	;
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	..	;	..	;
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	6,5**	0,8;21,6	27,8**	0,1;93,0
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	93,5	78,4;99,2	72,2**	7,0;99,9
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	3,6**	0,1;19,3	-	;
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	96,4	80,7;99,9	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]
6,4**	0,1;32,5	1,5**	0,0;7,8	5,1**	0,7;16,9	9,1*	5,2;14,7	3,0**	0,1;15,6	5,3**	0,7;17,2	2,9**	0,8;7,1	Oui
93,6	67,5;99,9	98,5	92,2;100,0	94,9	83,1;99,3	90,9	85,3;94,8	97,0	84,4;99,9	94,7	82,8;99,3	97,1	92,9;99,2	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p, r]
-	;	-	;	-	;	22,2**	4,2;54,5	-	;	58,9**	1,3;99,8	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	77,8*	45,5;95,8	100,0	;	41,1**	0,2;98,7	100,0	;	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	-	;	-	;	13,9**	1,5;43,3	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	86,1	56,7;98,5	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Psychologue[r]
100,0	;	100,0	;	-	;	22,0**	4,8;51,8	-	;	58,9**	1,3;99,8	-	;	Oui
-	;	-	;	100,0	;	78,0	48,2;95,2	100,0	;	41,1**	0,2;98,7	100,0	;	Non
														Travailleur social
-	;	-	;	-	;	15,1**	1,7;46,0	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	84,9	54,0;98,3	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
-	;	-	;	54,7**	1,1;99,6	28,4**	7,5;59,8	-	;	100,0	;	28,3**	0,1;93,0	Oui
100,0	;	100,0	;	45,3**	0,4;98,9	71,6*	40,2;92,5	100,0	;	-	;	71,7**	7,0;99,9	Non
														Médicaments
-	;	-	;	-	;	13,3**	1,4;42,4	-	;	-	;	100,0	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	86,7	57,6;98,6	100,0	;	100,0	;	-	;	Non
														Services de transport
-	;	-	;	100,0	;	43,1**	16,4;73,2	-	;	-	;	40,1**	0,8;95,9	Oui
100,0	;	100,0	;	-	;	56,9*	26,8;83,6	100,0	;	100,0	;	59,9**	4,1;99,2	Non
														Services d'aide à domicile
-	;	-	;	100,0	;	52,2**	23,3;80,0	100,0	;	-	;	40,1**	0,8;95,9	Oui
100,0	;	100,0	;	-	;	47,8**	20,0;76,7	-	;	100,0	;	59,9**	4,1;99,2	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Oui
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Non
														Soins infirmiers à domicile
-	;	-	;	45,3**	0,4;98,9	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	54,7**	1,1;99,6	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autres services ou ressources
-	;	-	;	-	;	7,1**	0,1;36,1	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	92,9	63,9;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	98,1	96,4;99,2	97,2	89,6;99,7
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	1,9**	0,8;3,6	2,8**	0,3;10,4
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	52,7	48,0;57,4	46,2	33,7;58,7
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	7,8*	5,5;10,7	9,5**	3,6;19,6
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	23,7	19,7;27,7	26,3*	15,0;40,4
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	15,8	12,8;19,2	18,0**	9,6;29,5
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	39,4	34,9;44,0	32,9*	21,5;45,9
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	21,9	18,3;25,5	31,2*	20,1;44,0
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	22,6	18,9;26,3	24,6*	14,1;37,8
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	16,1	12,9;19,6	11,4**	5,2;21,0
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	8,4*	5,9;11,5	3,5**	0,4;12,0
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	5,4*	3,6;7,6	8,8**	3,3;18,1
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	16,7	13,6;20,2	18,2**	9,8;29,8
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	9,2	6,8;12,2	9,7**	3,9;19,4
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	44,1	39,7;48,6	53,4	40,9;65,9
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	16,2	12,9;20,0	6,4**	1,7;15,7
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	0,6**	0,1;1,6	1,5**	0,0;7,8
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	7,5*	5,2;10,3	6,4**	1,9;15,2
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	92,0	89,1;94,3	92,1	82,8;97,3
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	89,7	86,4;92,4	74,2	61,1;84,7
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	8,1*	5,7;11,0	20,7*	11,5;32,7
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	2,3**	1,0;4,3	5,2**	1,1;14,2

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
90,0	53,0;99,8	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	96,8	84,1;99,9	95,8	90,3;98,7	Oui
10,0**	0,2;47,0	-	;	-	;	-	;	-	;	3,2**	0,1;15,9	4,2**	1,3;9,7	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
59,9**	25,2;88,5	58,8	46,1;71,5	91,3	76,0;98,3	59,1	50,9;67,3	39,5*	23,4;57,5	70,6	52,5;84,9	33,8	24,0;43,5	Médecin spécialiste du cancer
17,0**	1,8;51,1	3,4**	0,3;13,0	-	;	13,1*	7,4;20,7	3,1**	0,1;16,3	5,2**	0,5;19,2	6,7**	2,9;12,9	Médecin de famille
23,1**	2,8;62,4	21,8**	11,7;35,1	-	;	5,4**	2,4;10,4	48,7*	31,6;65,9	11,9**	3,2;28,3	45,8	36,0;55,7	Autre médecin spécialiste
-	;	16,0**	7,4;28,6	8,7**	1,7;24,0	22,4*	16,1;29,8	8,7**	1,5;25,1	12,3**	3,6;28,0	13,7**	7,5;22,3	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
30,3**	5,5;69,0	47,4	34,6;60,2	80,2	63,1;91,9	46,2	37,8;54,6	29,0**	15,0;46,8	50,7*	34,0;67,2	19,6*	12,4;28,7	Médecin spécialiste du cancer
38,8**	10,7;73,9	17,4**	8,4;30,4	2,4**	0,0;13,6	22,7*	15,6;31,1	6,4**	0,8;21,0	33,5*	18,0;52,2	23,8*	15,9;33,3	Médecin de famille
23,1**	2,8;62,4	19,9**	10,6;32,5	-	;	6,9**	3,4;12,3	59,0	41,5;75,0	5,3**	0,5;18,8	41,5	31,6;51,5	Autre médecin spécialiste
7,9**	0,1;42,1	15,3**	7,3;26,8	17,4**	6,4;34,6	24,2	17,7;31,8	5,6**	0,5;20,2	10,5**	2,3;27,5	15,1**	8,0;25,0	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
19,5**	1,9;57,6	5,8**	1,3;15,4	5,9**	0,7;19,9	7,0**	3,0;13,3	6,2**	0,7;21,8	10,8**	2,7;26,5	13,7**	7,6;22,3	Au besoin
-	;	-	;	11,2**	3,0;26,9	6,3**	2,8;11,8	-	;	7,5**	1,6;20,5	4,8**	1,7;10,4	À tous les mois
8,1**	0,1;43,5	12,8**	5,3;24,6	8,9**	1,7;24,7	11,4*	6,5;18,0	39,7*	23,5;57,7	21,5**	9,7;38,1	17,8*	11,2;26,2	À tous les 2 ou 3 mois
-	;	12,9**	4,9;25,8	2,6**	0,1;13,9	7,8**	4,1;13,1	10,9**	2,9;26,2	10,2**	2,5;25,4	10,8**	5,3;18,9	À tous les 4 mois
50,1**	17,4;82,8	41,3*	27,7;54,9	59,3	40,8;76,0	52,1	43,9;60,3	22,8**	10,5;39,9	47,2*	30,2;64,7	32,4	23,1;41,6	À tous les 6 mois
22,2**	2,9;59,8	27,2*	15,5;41,8	12,1**	3,2;28,9	15,5*	10,1;22,4	20,4**	8,1;38,7	2,8**	0,1;15,1	20,6*	12,7;30,4	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	1,6**	0,0;9,3	-	;	-	;	-	;	2,3**	0,1;11,9	-	;	Trop long
11,9**	0,2;52,6	3,4**	0,4;12,4	5,8**	0,7;19,9	10,3**	5,6;17,0	5,8**	0,7;19,7	10,0**	2,0;26,7	6,6**	2,5;13,6	Trop court
88,1	47,4;99,8	95,0	85,3;99,1	94,2	80,1;99,3	89,7	83,0;94,4	94,2	80,3;99,3	87,8	71,2;96,7	93,4	86,4;97,5	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
60,4**	26,3;88,3	96,6	88,0;99,6	93,7	78,7;99,3	86,6	78,9;92,3	100,0	;	95,1	82,6;99,5	94,6	87,9;98,2	Tout à fait capable
22,6**	2,8;60,9	3,4**	0,4;12,0	6,3**	0,7;21,3	11,3**	6,2;18,4	-	;	4,9**	0,5;17,4	2,7**	0,6;7,7	En partie capable
17,0**	1,8;51,1	-	;	-	;	2,1**	0,2;7,4	-	;	-	;	2,7**	0,3;9,3	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	56,0	51,6;60,4	44,9	32,3;57,5
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	16,0	13,0;19,5	16,8**	8,4;28,6
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	27,9	23,8;32,1	38,3*	26,1;51,7
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	45,6	36,5;54,6	38,9**	12,3;71,7
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	54,4	45,4;63,5	61,1*	28,3;87,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
59,9**	25,1;88,6	61,7	47,0;75,1	49,8*	31,3;68,4	48,4	40,3;56,6	65,0	45,9;81,2	40,0*	23,0;59,0	71,7	61,2;80,6	Oui, tout à fait
-	;	5,9**	1,2;16,3	24,5**	11,1;42,8	25,5*	18,1;34,0	5,8**	0,7;19,2	28,5**	14,2;46,9	8,0**	3,4;15,3	oui, en partie
40,1**	11,4;74,9	32,4*	19,9;47,0	25,7**	11,9;44,4	26,1	18,9;34,4	29,2**	14,1;48,5	31,5**	16,2;50,5	20,4*	12,5;30,3	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
38,9**	6,0;82,4	17,2**	1,4;54,5	41,6**	11,4;77,5	57,5	41,6;72,3	71,4**	12,9;99,5	40,7**	13,1;73,5	39,0**	17,1;64,7	Oui
61,1**	17,6;94,0	82,8*	45,5;98,6	58,4**	22,5;88,6	42,5*	27,7;58,4	28,6**	0,5;87,1	59,3**	26,5;86,9	61,0*	35,3;82,9	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	22,3	18,9;25,7	19,4*	11,2;30,1
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	48,4	44,0;52,8	50,0	38,2;61,8
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	29,3	25,3;33,2	30,6*	19,9;43,1
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	26,4	22,6;30,2	26,3*	16,8;37,7
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	39,0	34,8;43,2	24,2*	15,9;34,3
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	34,6	30,5;38,7	49,5	38,2;60,7
Modification de l'alimentation[p]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	43,0	39,0;47,1	56,9	45,2;68,7
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	26,6	22,8;30,4	21,4*	12,6;32,6
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	30,4	26,6;34,3	21,7*	13,3;32,2
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	17,9	14,8;21,3	11,4**	5,5;20,2
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	9,4	7,1;12,1	10,0**	4,3;19,1
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	72,7	68,9;76,5	78,5	68,2;86,8
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	2,2**	1,2;3,7	-	;
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	3,8*	2,2;6,1	3,9**	0,8;11,1
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	94,0	91,4;95,9	96,1	88,9;99,2
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	8,2	6,0;10,9	7,7**	2,9;16,1
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	13,6	10,8;16,9	8,3**	3,2;16,9
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	78,2	74,8;81,5	84,0	73,8;91,4
Gestion du stress[p]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	34,2	30,3;38,1	29,1*	19,5;40,4
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	27,0	23,1;30,9	24,1*	15,0;35,4
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	38,8	34,6;42,9	46,7	35,1;58,4

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p]
33,1**	10,9;62,8	17,0**	8,5;29,0	18,7**	7,3;36,0	31,1	24,3;37,9	14,1**	4,6;30,5	24,4**	12,1;40,7	18,7*	12,0;27,2	Oui
35,8**	11,8;66,6	50,3	37,8;62,9	35,4*	19,3;54,3	41,6	33,9;49,3	61,4	42,8;77,8	54,5*	36,9;71,3	53,0	43,6;62,3	Non
31,1**	9,2;61,9	32,7*	20,8;46,4	45,9*	27,9;64,8	27,3	20,1;35,4	24,5**	11,0;43,0	21,2**	9,3;38,0	28,3	20,5;37,1	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
43,3**	17,8;71,7	25,4*	14,7;38,9	21,5**	9,4;38,8	29,7	22,8;37,3	45,1*	28,1;63,0	43,8*	27,6;61,0	13,9*	8,2;21,5	Oui
19,8**	3,5;50,7	45,6	33,4;57,8	46,7*	30,0;63,9	36,1	28,6;43,6	21,3**	9,1;38,9	41,5*	25,2;59,2	50,8	41,9;59,6	Non
36,9**	13,3;66,5	29,0*	17,6;42,7	31,7**	16,5;50,6	34,2	26,7;41,7	33,6**	17,3;53,4	14,7**	5,4;29,8	35,4	26,8;44,0	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p]
57,8*	29,3;82,9	37,6*	25,4;51,0	45,8*	28,5;63,9	46,2	38,2;54,1	50,0*	32,5;67,6	49,7*	33,1;66,4	29,0	21,2;37,9	Oui
27,8**	7,6;58,1	38,1*	25,2;52,3	24,6**	11,8;41,7	17,2*	11,1;25,0	12,9**	3,9;28,9	29,6*	16,3;46,0	36,9	28,4;45,4	Non
14,4**	1,7;43,9	24,3*	14,4;36,8	29,7**	15,5;47,4	36,6	28,5;44,7	37,1*	21,1;55,3	20,7**	9,0;37,5	34,1	25,6;42,6	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
26,0**	7,0;55,3	6,6**	1,9;15,6	13,4**	4,3;29,0	20,5*	14,7;27,4	21,8**	9,2;39,9	48,7*	32,0;65,6	14,7*	9,2;21,8	Oui
-	;	8,4**	2,8;18,5	9,0**	1,6;25,5	7,4**	3,8;12,7	9,7**	1,9;26,5	2,3**	0,1;12,1	14,2*	9,0;20,9	Non
74,0*	44,7;93,0	85,0	73,6;92,9	77,6	59,2;90,5	72,1	64,4;78,9	68,5	50,7;83,1	49,0*	32,1;65,9	71,1	62,2;79,0	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	-	;	5,8**	0,7;19,7	1,2**	0,1;4,4	10,6**	3,2;23,9	2,5**	0,0;14,4	2,3**	0,5;6,4	Oui
-	;	5,1**	1,1;14,1	4,2**	0,1;20,1	1,2**	0,1;4,2	2,9**	0,1;14,4	10,7**	2,8;26,0	4,6**	1,4;10,8	Non
100,0	;	94,9	85,9;98,9	90,0	73,0;98,0	97,6	94,0;99,3	86,5	71,8;95,3	86,8	70,4;96,1	93,2	86,5;97,2	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
-	;	13,3**	5,6;25,3	13,6**	4,3;29,6	5,7**	2,6;10,6	16,2**	5,8;32,9	9,9**	2,8;23,1	6,0**	2,4;11,9	Oui
15,7**	1,8;47,5	18,1**	9,4;30,2	9,5**	1,9;26,2	10,2*	6,0;16,0	15,4**	5,2;32,3	16,8**	6,5;32,7	17,4*	10,8;26,0	Non
84,3	52,5;98,2	68,6	55,2;80,1	76,9	58,8;89,8	84,1	77,2;89,6	68,5	49,7;83,7	73,4	56,7;86,3	76,6	67,8;84,0	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p]
45,4**	18,3;74,7	25,6*	15,0;38,9	38,2*	22,4;56,1	46,6	38,9;54,4	25,0**	11,9;42,4	33,0*	18,6;50,2	28,9	20,9;38,0	Oui
30,6**	8,1;63,0	19,1**	9,9;31,7	31,8*	17,5;49,1	26,9	19,7;35,1	27,1**	13,2;45,3	23,7**	11,1;40,8	31,1	23,2;39,1	Non
24,1**	5,3;55,6	55,2	42,1;68,3	30,0**	15,7;47,9	26,4	19,4;34,5	48,0*	30,3;66,0	43,3*	27,6;60,0	39,9	31,4;48,4	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	45,6	41,4;49,8	43,7	32,9;54,6
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	13,6	10,9;16,7	12,0**	5,4;22,0
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	40,9	36,5;45,2	44,3	33,1;55,5
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	1,1**	0,4;2,4	-	;
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	98,9	97,6;99,6	100,0	;
Autre[r]													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	0,6**	0,1;1,9	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	99,4	98,1;99,9	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]
39,5**	13,5;71,0	30,4*	19,7;42,8	57,3	39,6;73,8	49,8	41,9;57,8	30,6**	15,2;49,9	49,5*	32,5;66,6	48,8	40,3;57,4	Oui
32,4**	9,7;63,5	25,2*	14,7;38,2	9,1**	1,7;25,4	7,6**	4,1;12,8	24,6**	11,1;43,0	4,6**	0,6;15,6	14,6*	9,0;22,0	Non
28,1**	7,1;60,2	44,5	33,2;55,8	33,6*	18,0;52,4	42,5	34,4;50,6	44,8*	26,7;64,1	45,9*	29,0;63,5	36,5	27,8;45,3	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
-	;	-	;	-	;	2,5**	0,6;6,6	-	;	-	;	1,5**	0,2;5,7	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	97,5	93,4;99,4	100,0	;	100,0	;	98,5	94,3;99,8	Non
														Autre[r]
-	;	-	;	-	;	-	;	5,1**	0,5;17,8	-	;	1,1**	0,0;5,8	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	94,9	82,2;99,5	100,0	;	98,9	94,2;100,0	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	50,9	42,8;58,9	55,6*	33,4;76,3
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	49,1	41,1;57,2	44,4*	23,7;66,6
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	83,5	78,1;88,1	91,3	76,5;98,2
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	16,5	11,9;21,9	8,7**	1,8;23,5
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	51,9	41,5;62,3	56,1*	28,8;80,9
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	48,1	37,7;58,5	43,9**	19,1;71,2
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	33,9	24,7;43,1	13,5**	0,2;59,7
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	66,1	56,9;75,3	86,5*	40,3;99,8
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	20,7*	14,3;28,4	16,7**	3,5;41,8
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	79,3	71,6;85,7	83,3	58,2;96,5
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	54,3	46,8;61,7	63,3	42,6;80,9
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	45,7	38,3;53,2	36,7**	19,1;57,4
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	65,7	59,0;72,5	83,9	63,8;95,4
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	34,3	27,5;41,0	16,1**	4,6;36,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
60,1**	11,5;96,4	30,4**	6,2;67,4	62,1*	29,4;88,2	48,1	34,5;61,8	76,0*	31,9;98,0	24,5**	1,4;72,9	51,1*	29,1;72,8	Oui
39,9**	3,6;88,5	69,6*	32,6;93,8	37,9**	11,8;70,6	51,9	38,2;65,5	24,0**	2,0;68,1	75,5*	27,1;98,6	48,9*	27,2;70,9	Non
														Soutien de la famille ou des amis
86,6	43,1;99,7	69,7*	41,7;89,9	93,3	65,7;99,9	81,0	70,0;89,4	83,2	50,0;98,1	88,2	69,8;97,4	80,4	66,9;90,1	Oui
13,4**	0,3;56,9	30,3**	10,1;58,3	6,7**	0,1;34,3	19,0*	10,6;30,0	16,8**	1,9;50,0	11,8**	2,6;30,2	19,6**	9,9;33,1	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
22,7**	0,1;88,8	56,2**	19,4;88,4	100,0	;	53,3*	34,6;71,3	55,6**	15,1;91,1	45,6**	14,9;79,0	40,1**	18,7;64,7	Oui
77,3**	11,2;99,9	43,8**	11,6;80,6	-	;	46,7*	28,7;65,4	44,4**	8,9;84,9	54,4**	21,0;85,1	59,9*	35,3;81,3	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
28,7**	2,5;75,7	17,8**	0,4;67,7	59,3**	9,4;96,9	40,6*	24,2;58,8	42,9**	3,5;91,7	12,6**	0,3;52,4	40,0**	18,4;64,9	Oui
71,3**	24,3;97,5	82,2*	32,3;99,6	40,7**	3,1;90,6	59,4	41,2;75,8	57,1**	8,3;96,5	87,4	47,6;99,7	60,0*	35,1;81,6	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
46,2**	7,1;89,5	18,0**	1,8;54,1	26,9**	2,2;73,7	19,9**	9,7;34,0	32,7**	2,5;82,6	-	;	25,8**	10,6;47,1	Oui
53,8**	10,5;92,9	82,0*	45,9;98,2	73,1**	26,3;97,8	80,1	66,0;90,3	67,3**	17,4;97,5	100,0	;	74,2	52,9;89,4	Non
														Exemple de l'entourage[p]
38,4**	7,2;79,4	33,7**	10,9;64,0	91,0	57,2;99,8	58,0	46,4;69,7	57,2**	24,1;86,1	30,1**	9,3;59,6	52,5*	33,6;70,9	Oui
61,6**	20,6;92,8	66,3*	36,0;89,1	9,0**	0,2;42,8	42,0	30,3;53,6	42,8**	13,9;75,9	69,9*	40,4;90,7	47,5*	29,1;66,4	Non
														Prière ou soutien spirituel[p]
40,1**	5,2;85,7	47,0**	20,3;75,0	61,3*	31,0;86,2	66,0	53,5;77,0	73,7*	39,6;94,6	60,0*	34,1;82,3	65,9	48,7;80,5	Oui
59,9**	14,3;94,8	53,0**	25,0;79,7	38,7**	13,8;69,0	34,0*	23,0;46,5	26,3**	5,4;60,4	40,0**	17,7;65,9	34,1*	19,5;51,3	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Outaouais et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,2;17,2
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	0,3**	0,0;1,1	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	4,0*	2,5;6,1	7,6**	2,7;16,4
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	12,3	9,5;15,5	17,0**	9,3;27,4
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	33,8	29,6;38,0	34,1*	23,8;45,6
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	49,6	45,1;54,1	41,3	30,2;52,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région															
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
2,5**	1,4;4,1	10,7	8,9;12,6	6,4*	4,6;8,7	25,9	23,1;28,6	6,7*	4,8;9,1	7,2*	5,2;9,7	26,6	23,0;30,1	Ensemble des patients	
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic	
-	;	-	;	-	;	1,2**	0,2;4,1	-	;	-	;	-	;	Mauvaise	
5,9**	0,1;28,9	3,0**	0,4;10,1	3,1**	0,1;15,7	1,3**	0,2;4,8	2,4**	0,0;14,6	5,2**	0,7;17,3	5,4**	2,3;10,5	Passable	
23,0**	4,6;55,0	3,1**	0,4;10,6	7,5**	1,4;21,0	15,1*	9,5;22,2	11,5**	3,0;27,7	16,8**	5,9;34,4	9,9**	5,0;17,0	Bonne	
13,6**	1,3;43,8	35,2*	23,7;48,2	45,6*	29,7;62,2	37,0	29,1;44,9	21,9**	8,6;41,4	39,8*	23,7;57,6	30,1	21,4;38,8	Très bonne	
57,5*	28,2;83,4	58,7	47,0;70,3	43,8*	28,1;60,5	45,4	37,4;53,4	64,1	44,4;80,9	38,3*	23,4;55,0	54,6	45,4;63,8	Excellente	

Région 08

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	45,3	44,4 ; 46,2
Femmes	53,9	54,7	53,8 ; 55,6
Âge			
18 à 49 ans	18,9	18,5	14,5 ; 23,0
50 à 59 ans	24,9	28,8	24,5 ; 33,1
60 à 69 ans	29,8	29,6	24,7 ; 34,5
70 ans et plus	26,5	23,1	19,5 ; 26,7
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	95,7	92,8 ; 97,7
Anglais	10,6	4,3**	2,3 ; 7,2
Autres	3,0	-	;
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	37,8	32,5 ; 43,0
Diplôme d'études secondaires	24,7	18,4	14,3 ; 23,1
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	27,0	22,0 ; 32,1
Diplôme d'études universitaires	20,6	16,8	12,8 ; 21,6
Occupation principale			
En emploi	29,3	27,2	22,5 ; 31,8
Étudiant	1,7	1,2**	0,2 ; 3,3
Retraité	55,8	57,7	53,4 ; 62,0
À la maison	7,2	5,7*	3,3 ; 9,2
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	4,1**	2,2 ; 7,0
Congé de maternité / autres	3,6	4,1**	2,3 ; 6,9
Situation familiale			
Vit seul	24,1	25,4	20,5 ; 30,3
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	59,2	53,7 ; 64,7
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	9,5*	6,5 ; 13,3
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	2,5**	1,0 ; 5,1
Autres	4,8	3,4**	1,6 ; 6,2
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	20,6	16,0 ; 25,1
Revenu suffisant	61,4	53,8	47,9 ; 59,6
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	25,7	20,6 ; 30,8
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	2,7**	1,2 ; 5,2
2	21,1	8,3*	5,6 ; 11,8
3	20,1	20,1	15,5 ; 24,6
4	19,4	27,3	22,3 ; 32,3
5 - très défavorisé	17,6	41,6	35,9 ; 47,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	11,7*	8,3 ; 15,8	18,7*	12,4 ; 26,5	5,9**	2,9 ; 10,4
Génital féminin	5,5	...	10,2	5,0**	2,8 ; 8,1	...	;	9,1**	5,1 ; 14,7
Prostate	15,9	34,4	...	11,9	9,1 ; 15,2	26,3	19,9 ; 33,6	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	6,8*	4,1 ; 10,6	6,6**	2,8 ; 12,7	7,0**	3,6 ; 11,9
Sein	26,5	0,4**	48,8	30,4	26,1 ; 34,7	0,6**	0,0 ; 3,6	55,1	47,4 ; 62,9
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	4,7*	2,7 ; 7,6	5,5**	2,5 ; 10,5	4,1**	1,5 ; 8,6
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	8,0*	5,3 ; 11,3	12,2*	7,2 ; 18,9	4,5**	2,0 ; 8,4
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	21,5	16,9 ; 26,1	30,0	22,6 ; 38,2	14,5*	9,4 ; 20,9
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	84,5	79,5 ; 88,7	83,3	76,2 ; 88,9	85,5	78,7 ; 90,8
Récidive	7,4	7,5	7,3	7,9*	5,1 ; 11,6	5,9**	2,6 ; 11,2	9,5*	5,5 ; 15,2
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	7,6*	4,8 ; 11,5	10,9*	6,2 ; 17,3	5,0**	2,1 ; 9,9
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	10,5*	7,2 ; 14,6	10,4*	6,0 ; 16,4	10,6*	6,2 ; 16,6
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	20,0	15,7 ; 24,8	6,4**	3,0 ; 11,8	31,4	23,9 ; 38,8
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	69,5	64,6 ; 74,4	83,2	76,1 ; 88,9	58,0	50,4 ; 65,7
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	56,7	51,0 ; 62,5	54,6	46,1 ; 63,2	58,5	50,8 ; 66,1
Non	58,8	56,6	60,7	43,3	37,5 ; 49,0	45,4	36,8 ; 53,9	41,5	33,9 ; 49,2
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	89,9	86,0 ; 93,1	88,7	82,5 ; 93,3	90,9	85,3 ; 94,9
Non	8,3	8,5	8,0	10,1*	6,9 ; 14,0	11,3*	6,7 ; 17,5	9,1**	5,1 ; 14,7
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	7,3*	4,6 ; 10,9	6,9**	3,2 ; 12,8	7,7**	4,2 ; 12,7
Très bon	29,2	29,3	29,1	31,1	25,9 ; 36,3	31,3	23,8 ; 38,9	31,0	23,8 ; 38,1
Bon	34,9	34,2	35,5	36,2	30,8 ; 41,6	38,1	30,1 ; 46,1	34,7	27,4 ; 41,9
Moyen	18,8	17,8	19,6	18,3	14,0 ; 23,1	17,2*	11,4 ; 24,4	19,2*	13,4 ; 26,1
Mauvais	5,6	5,7	5,5	7,1*	4,3 ; 10,8	6,5**	3,0 ; 12,0	7,6**	3,8 ; 13,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p]
11,7*	8,3 ; 15,8	10,7**	3,9 ; 22,2	11,7**	6,0 ; 20,1	11,8**	6,0 ; 20,2	12,3**	4,8 ; 24,5	Colorectal
5,0**	2,8 ; 8,1	2,6**	0,1 ; 13,5	2,8**	0,4 ; 9,6	7,1**	2,9 ; 14,0	6,8**	1,9 ; 16,6	Génital féminin
11,9	9,1 ; 15,2	-	;	11,0**	5,9 ; 18,3	15,0*	8,8 ; 23,4	18,6*	11,1 ; 28,4	Prostate
6,8*	4,1 ; 10,6	16,8**	7,3 ; 31,1	4,1**	1,1 ; 10,5	6,4**	2,3 ; 13,5	2,6**	0,4 ; 8,7	Hématopoïétique
30,4	26,1 ; 34,7	38,3*	25,9 ; 51,9	39,1	30,2 ; 48,0	24,9*	17,4 ; 33,8	20,3*	11,7 ; 31,5	Sein
4,7*	2,7 ; 7,6	10,4**	3,6 ; 22,2	6,5**	2,7 ; 13,0	1,0**	0,0 ; 5,7	2,8**	0,3 ; 9,8	ORL (Tête et cou)
8,0*	5,3 ; 11,3	3,2**	0,4 ; 11,3	2,4**	0,3 ; 8,4	15,5*	9,0 ; 24,3	9,0**	3,3 ; 18,7	Broncho-pulmonaire
21,5	16,9 ; 26,1	18,0**	8,8 ; 31,0	22,3*	14,1 ; 32,4	18,2*	11,2 ; 27,1	27,5*	17,2 ; 39,9	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
84,5	79,5 ; 88,7	87,3	73,8 ; 95,4	84,3	75,1 ; 91,2	82,7	73,7 ; 89,7	84,6	72,7 ; 92,8	Premier cancer
7,9*	5,1 ; 11,6	3,9**	0,4 ; 14,8	10,8**	5,3 ; 19,0	6,9**	2,9 ; 13,6	8,8**	3,1 ; 18,7	Récidive
7,6*	4,8 ; 11,5	8,8**	2,4 ; 21,2	4,9**	1,5 ; 11,4	10,4**	5,0 ; 18,3	6,6**	1,7 ; 16,5	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]
10,5*	7,2 ; 14,6	13,0**	5,4 ; 25,1	9,9**	4,7 ; 17,8	12,2**	6,3 ; 20,7	6,8**	1,8 ; 16,6	Sous traitement
20,0	15,7 ; 24,8	15,7**	7,9 ; 26,7	21,8*	14,4 ; 30,7	21,2*	13,3 ; 31,1	19,5**	10,1 ; 32,4	Sans traitement avec médication
69,5	64,6 ; 74,4	71,3	57,8 ; 82,4	68,3	59,5 ; 77,2	66,6	56,8 ; 76,3	73,7	60,1 ; 84,6	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p]
56,7	51,0 ; 62,5	54,5	39,4 ; 69,0	54,9	45,4 ; 64,4	59,2	49,3 ; 69,1	57,8	44,5 ; 71,1	Oui
43,3	37,5 ; 49,0	45,5*	31,0 ; 60,6	45,1	35,6 ; 54,6	40,8	30,9 ; 50,7	42,2*	28,9 ; 55,5	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p]
89,9	86,0 ; 93,1	84,5	72,0 ; 93,0	87,5	79,5 ; 93,2	93,5	85,9 ; 97,7	92,8	83,3 ; 97,8	Oui
10,1*	6,9 ; 14,0	15,5**	7,0 ; 28,0	12,5**	6,8 ; 20,5	6,5**	2,3 ; 14,1	7,2**	2,2 ; 16,7	Non
										Perception de l'état de santé[p]
7,3*	4,6 ; 10,9	9,1**	3,5 ; 18,8	6,4**	2,1 ; 14,2	6,7**	2,3 ; 14,6	7,9**	2,1 ; 19,3	Excellent
31,1	25,9 ; 36,3	34,6*	22,1 ; 49,0	37,7	27,8 ; 47,6	33,5*	23,5 ; 43,5	16,8**	8,8 ; 27,9	Très bon
36,2	30,8 ; 41,6	30,1*	19,1 ; 43,1	37,5	27,5 ; 47,4	31,0*	21,4 ; 40,6	46,4	33,4 ; 59,4	Bon
18,3	14,0 ; 23,1	18,0**	8,7 ; 31,2	10,5**	5,2 ; 18,4	23,4*	15,1 ; 33,7	21,6*	12,0 ; 34,1	Moyen
7,1*	4,3 ; 10,8	8,1**	2,2 ; 19,5	8,0**	3,2 ; 16,0	5,4**	1,6 ; 12,9	7,2**	2,0 ; 17,8	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	50,6	45,3;55,9	57,1*	38,7;74,1
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	49,4	44,1;54,7	42,9*	25,9;61,3
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	42,1	32,6;51,6	42,9**	19,0;69,5
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	19,2*	12,0;28,3	14,3**	1,7;43,1
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	18,1*	11,8;26,0	28,2**	9,0;56,0
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	20,6*	12,9;30,1	14,6**	2,7;38,8
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	47,7	39,9;55,5	61,7*	31,9;86,1
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	15,0*	9,7;21,6	5,0**	0,1;26,7
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	11,1*	6,3;17,8	9,2**	0,2;43,4
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	17,1	12,3;22,8	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	9,1*	5,2;14,5	24,1**	5,8;53,9
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	44,9	37,2;52,6	65,7*	40,7;85,6
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	22,3	16,4;29,1	21,5**	6,5;45,6
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	23,1	16,7;30,6	12,8**	2,2;35,5
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	9,7*	5,5;15,6	-	;
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	83,4	78,9;87,2	77,9	59,4;90,8
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	12,1*	8,7;16,3	19,3**	7,6;36,9
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	4,5**	2,4;7,7	2,8**	0,0;15,9
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	2,9**	1,1;6,2	5,4**	0,1;26,7
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	97,1	93,8;98,9	94,6	73,3;99,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
60,6*	27,8;87,5	7,1**	1,5;19,5	65,2*	40,6;85,0	61,9	52,0;71,8	80,2	48,6;96,7	13,0**	2,5;34,4	55,7	43,8;67,6	Oui
39,4**	12,5;72,2	92,9	80,5;98,5	34,8**	15,0;59,4	38,1	28,2;48,0	19,8**	3,3;51,4	87,0	65,6;97,5	44,3	32,4;56,2	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
28,9**	1,4;81,2	-	;	24,7**	3,6;62,5	55,3	38,2;71,5	31,1**	6,0;69,3	100,0	;	37,6**	19,0;59,2	2 semaines et moins
-	;	-	;	32,3**	6,5;70,3	23,1**	11,1;39,5	16,1**	1,4;51,4	-	;	18,7**	6,5;38,0	Plus de 2 semaines à 1 mois
15,5**	0,1;71,1	50,0**	0,8;99,2	35,6**	9,2;70,8	8,9**	2,4;21,5	-	;	-	;	23,8**	9,9;43,5	Plus d'un mois à 3 mois
55,6**	10,2;94,4	50,0**	0,8;99,2	7,5**	0,1;39,5	12,8**	3,7;29,2	52,8**	19,3;84,5	-	;	20,0**	6,9;40,5	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
55,8**	8,1;95,9	65,0	46,7;80,6	53,8**	13,2;90,7	20,2**	8,2;38,1	29,6**	0,2;92,6	42,1**	20,7;65,9	56,6*	36,8;75,0	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
-	;	19,2**	7,9;36,1	31,1**	3,1;77,6	-	;	70,4**	7,4;99,8	32,8**	13,7;57,1	14,0**	3,7;33,0	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
44,2**	4,1;91,9	10,5**	2,5;26,4	15,1**	0,3;61,0	-	;	-	;	17,1**	4,3;40,0	15,4**	4,4;34,7	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	70,0	51,8;84,5	-	;	-	;	3,2**	0,1;17,8	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
-	;	5,2**	0,6;18,2	-	;	9,8**	2,3;25,2	-	;	8,0**	1,1;25,4	10,7**	2,1;29,0	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
15,4**	0,3;62,0	35,6**	17,4;57,3	47,1**	21,6;73,8	57,0	40,9;72,0	8,5**	0,1;44,0	70,7*	29,1;95,9	33,7*	19,7;50,0	2 semaines et moins
41,6**	8,1;82,6	20,0**	6,8;40,8	19,8**	4,5;46,9	19,8**	9,1;35,0	34,2**	8,6;69,4	-	;	25,8**	13,0;42,6	Plus de 2 semaines à 1 mois
32,4**	4,2;76,4	44,4*	24,1;66,2	25,1**	6,7;54,1	12,0**	3,8;26,5	22,8**	2,5;63,1	29,3**	4,1;70,9	25,9**	13,6;41,9	Plus d'un mois à 3 mois
10,6**	0,1;55,2	-	;	8,1**	0,1;39,6	11,3**	3,7;24,7	34,5**	6,4;74,5	-	;	14,6**	5,6;29,1	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
57,1**	25,7;84,7	85,2	70,4;94,4	78,9	52,8;94,4	91,4	83,6;96,2	84,5	52,4;98,3	73,5	52,2;89,0	84,7	73,6;92,4	Oui, tout à fait
22,3**	3,6;56,8	9,7**	2,9;22,3	17,4**	3,3;44,7	6,7**	2,4;14,2	-	;	22,1**	7,9;43,4	12,1**	5,5;22,3	Oui, en partie
20,6**	3,9;51,4	5,1**	0,7;17,0	3,7**	0,1;19,5	1,9**	0,2;7,2	15,5**	1,7;47,6	4,4**	0,1;23,7	3,2**	0,4;11,4	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]
-	;	-	;	8,2**	0,3;36,4	4,4**	1,1;11,5	-	;	5,1**	0,1;24,6	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	91,8	63,6;99,7	95,6	88,5;98,9	100,0	;	94,9	75,4;99,9	100,0	;	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	26,3	21,7;30,9	13,2**	4,3;28,7
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	18,9	14,7;23,7	10,0**	2,8;23,7
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	31,3	25,8;36,7	74,4	56,8;87,6
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	21,6	16,9;26,4	2,4**	0,0;13,6
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	1,6**	0,6;3,7	-	;
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	0,3**	0,0;1,4	-	;
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	-	;	-	;
Façon d'annoncer le diagnostic[p]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	93,0	89,3;95,8	97,4	84,2;100,0
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	7,0*	4,2;10,7	2,6**	0,0;15,8
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	94,8	91,3;97,1	97,1	84,5;99,9
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	5,2**	2,9;8,7	2,9**	0,1;15,5
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	94,6	91,2;97,0	94,4	80,0;99,4
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	5,4**	3,0;8,8	5,6**	0,6;20,0
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	95,2	92,1;97,3	96,7	82,2;99,9
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	4,8**	2,7;7,9	3,3**	0,1;17,8
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	59,9	54,2;65,7	53,9*	35,4;71,6
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	40,1	34,3;45,8	46,1*	28,4;64,6
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	68,2	62,7;73,7	70,1	51,4;84,9
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	31,8	26,3;37,3	29,9**	15,1;48,6
Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	60,3	53,7;66,9	65,2	44,0;82,7
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	39,7	33,1;46,3	34,8**	17,3;56,0
Contact pour du soutien pratique[3, p]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	74,3	69,3;79,4	72,1	53,8;86,3
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	25,7	20,6;30,7	27,9**	13,7;46,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3. On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
8,2**	0,2;39,9	9,8**	2,5;24,4	36,5**	15,9;61,5	46,3	36,4;56,2	8,6**	0,2;41,4	33,3**	14,3;57,3	17,0**	9,0;28,0	Médecin de famille
6,0**	0,1;29,6	54,7	37,8;70,9	34,7**	14,3;60,3	3,0**	0,4;10,3	28,5**	8,0;58,9	23,3**	8,6;45,0	20,3*	11,4;31,9	Médecin spécialiste du cancer
17,7**	2,0;52,1	5,1**	0,6;17,4	9,9**	1,3;31,1	47,9	38,2;57,6	14,4**	1,4;46,0	4,3**	0,1;20,9	22,1*	12,4;34,8	Chirurgien
68,1*	33,9;92,0	30,3*	16,7;47,0	18,9**	4,9;43,1	1,9**	0,2;7,3	48,5**	20,2;77,5	30,9**	13,0;54,3	35,9*	23,9;49,3	Autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	8,2**	1,0;26,8	4,7**	1,0;13,2	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	-	;	0,9**	0,0;4,7	-	;	-	;	-	;	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p]
78,9	46,9;96,3	95,3	83,7;99,4	92,6	66,7;99,8	89,5	81,3;94,9	100,0	;	91,7	73,6;98,9	96,8	89,0;99,6	En personne
21,1**	3,7;53,1	4,7**	0,6;16,3	7,4**	0,2;33,3	10,5**	5,1;18,7	-	;	8,3**	1,1;26,4	3,2**	0,4;11,0	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
84,7	50,7;98,7	97,5	86,3;99,9	90,8	68,8;99,1	91,7	83,4;96,7	91,4	58,6;99,8	100,0	;	98,6	92,3;100,0	Oui
15,3**	1,3;49,3	2,5**	0,1;13,7	9,2**	0,9;31,2	8,3**	3,3;16,6	8,6**	0,2;41,4	-	;	1,4**	0,0;7,7	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
100,0	;	97,5	86,3;99,9	94,5	70,6;99,9	91,9	83,9;96,8	91,4	58,6;99,8	92,2	74,9;99,0	97,2	89,6;99,7	Oui
-	;	2,5**	0,1;13,7	5,5**	0,1;29,4	8,1**	3,2;16,1	8,6**	0,2;41,4	7,8**	1,0;25,1	2,8**	0,3;10,4	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
89,8	53,8;99,8	97,5	86,3;99,9	88,5	64,8;98,5	94,8	88,4;98,3	91,4	58,6;99,8	100,0	;	95,9	88,1;99,2	Oui
10,2**	0,2;46,2	2,5**	0,1;13,7	11,5**	1,5;35,2	5,2**	1,7;11,6	8,6**	0,2;41,4	-	;	4,1**	0,8;11,9	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p]
35,0**	10,8;66,7	69,1	51,4;83,5	64,5*	39,9;84,5	68,0	58,1;77,9	27,2**	6,9;58,7	49,3*	26,8;71,9	61,5	49,0;73,0	Oui
65,0*	33,3;89,2	30,9**	16,5;48,6	35,5**	15,5;60,1	32,0*	22,1;41,9	72,8*	41,3;93,1	50,7*	28,1;73,2	38,5*	27,0;51,0	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]
70,5*	36,5;93,0	54,7*	37,5;71,2	95,2	77,2;99,8	76,6	65,9;85,4	71,9*	40,5;92,7	61,7*	38,2;81,7	56,3	43,8;68,8	Oui
29,5**	7,0;63,5	45,3*	28,8;62,5	4,8**	0,2;22,8	23,4*	14,6;34,1	28,1**	7,3;59,5	38,3**	18,3;61,8	43,7	31,2;56,2	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]
38,4**	9,7;75,0	39,7**	18,7;63,9	50,7*	25,8;75,5	78,3	66,7;87,3	40,9**	10,8;77,4	66,5*	37,2;88,6	47,9*	30,2;66,1	Oui
61,6**	25,0;90,3	60,3*	36,1;81,3	49,3*	24,5;74,2	21,7*	12,7;33,3	59,1**	22,6;89,2	33,5**	11,4;62,8	52,1*	33,9;69,8	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p]
50,7**	19,6;81,5	62,4	46,3;76,8	100,0	;	85,9	76,7;92,4	53,9**	23,4;82,4	72,8	50,0;89,3	68,0	54,7;79,4	Oui
49,3**	18,5;80,4	37,6*	23,2;53,7	-	;	14,1**	7,6;23,3	46,1**	17,6;76,6	27,2**	10,7;50,0	32,0*	20,6;45,3	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	6,8**	3,7;11,1	-	;
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	93,2	88,9;96,3	100,0	;
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	43,1	36,6;49,6	61,4*	40,4;79,8
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	56,9	50,4;63,4	38,6*	20,2;59,6
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	1,9**	0,5;4,7	-	;
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	98,1	95,3;99,5	100,0	;
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	7,8**	4,3;12,7	3,8**	0,1;20,7
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	92,2	87,3;95,7	96,2	79,3;99,9
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	10,3*	6,4;15,4	5,1**	0,1;25,6
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	89,7	84,6;93,6	94,9	74,4;99,9
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	2,0**	0,5;5,3	-	;
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	98,0	94,7;99,5	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]
-	;	10,9**	1,4;34,0	5,1**	0,1;26,4	10,9**	4,6;21,0	-	;	-	;	8,4**	2,0;21,7	Oui
100,0	;	89,1	66,0;98,6	94,9	73,6;99,9	89,1	79,0;95,4	100,0	;	100,0	;	91,6	78,3;98,0	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
17,4**	1,4;55,5	19,9**	5,7;43,7	45,7**	22,8;70,1	59,7	47,6;71,8	18,9**	2,1;54,8	35,4**	12,4;64,8	27,8**	14,0;45,7	Oui
82,6*	44,5;98,6	80,1	56,3;94,3	54,3*	29,9;77,2	40,3*	28,2;52,4	81,1*	45,2;97,9	64,6*	35,2;87,6	72,2	54,3;86,0	Non
														Psychologue[p]
-	;	-	;	-	;	3,8**	0,8;10,7	-	;	-	;	3,3**	0,1;15,9	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	96,2	89,3;99,2	100,0	;	100,0	;	96,7	84,1;99,9	Non
														Travailleur social[p]
-	;	4,5**	0,1;23,9	-	;	11,6**	4,8;22,3	13,9**	0,4;55,7	14,8**	1,9;44,0	6,3**	0,8;21,1	Oui
100,0	;	95,5	76,1;99,9	100,0	;	88,4	77,7;95,2	86,1	44,3;99,6	85,2	56,0;98,1	93,7	78,9;99,2	Non
														Médecin[p]
21,0**	2,3;59,7	9,6**	1,0;31,6	-	;	8,3**	2,7;18,4	8,2**	0,1;43,9	28,9**	8,8;57,9	13,1**	4,4;28,0	Oui
79,0*	40,3;97,7	90,4	68,4;99,0	100,0	;	91,7	81,6;97,3	91,8	56,1;99,9	71,1*	42,1;91,2	86,9	72,0;95,6	Non
														Autre professionnel de la santé
-	;	-	;	16,9**	3,0;44,7	-	;	-	;	7,0**	0,1;36,0	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	83,1	55,3;97,0	100,0	;	100,0	;	93,0	64,0;99,9	100,0	;	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	28,3	23,2;33,3	29,7**	15,1;48,1
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	71,7	66,7;76,8	70,3	51,9;84,9
Médecin spécialiste du cancer[p]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	41,0	35,4;46,6	43,9*	26,9;62,0
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	59,0	53,4;64,6	56,1*	38,0;73,1
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	24,9	20,1;29,8	26,5**	12,8;44,7
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	75,1	70,2;79,9	73,5	55,3;87,2
Autre médecin spécialiste[p]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	15,1	11,2;19,8	2,4**	0,0;13,5
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	84,9	80,2;88,8	97,6	86,5;100,0
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	4,5**	2,4;7,7	-	;
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	95,5	92,3;97,6	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
17,0**	1,5;53,0	4,9**	0,4;18,1	70,4*	44,7;89,1	38,7	28,1;49,3	24,4**	4,6;58,6	29,0**	12,2;51,5	15,9**	7,7;27,7	Oui
83,0	47,0;98,5	95,1	81,9;99,6	29,6**	10,9;55,3	61,3	50,7;71,9	75,6*	41,4;95,4	71,0	48,5;87,8	84,1	72,3;92,3	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p]
-	;	33,4*	18,9;50,6	50,8*	27,8;73,5	55,2	45,1;65,3	41,1**	14,4;72,4	27,9**	11,8;49,6	33,8*	22,3;46,9	Oui
100,0	;	66,6	49,4;81,1	49,2*	26,5;72,2	44,8	34,7;54,9	58,9*	27,6;85,6	72,1	50,4;88,2	66,2	53,1;77,7	Non
														Médecin de famille[p]
24,5**	4,5;58,9	12,9**	4,6;26,8	23,8**	7,8;48,3	35,1	24,9;45,3	6,4**	0,1;33,2	27,3**	11,7;48,5	20,2**	10,9;32,6	Oui
75,5*	41,1;95,5	87,1	73,2;95,4	76,2	51,7;92,2	64,9	54,7;75,1	93,6	66,8;99,9	72,7	51,5;88,3	79,8	67,4;89,1	Non
														Autre médecin spécialiste[p]
27,4**	5,7;62,0	13,7**	4,4;29,9	-	;	15,1*	8,4;24,1	20,3**	3,1;53,4	23,3**	8,3;45,8	21,2*	11,7;33,8	Oui
72,6*	38,0;94,3	86,3	70,1;95,6	100,0	;	84,9	75,9;91,6	79,7	46,6;96,9	76,7	54,2;91,7	78,8	66,2;88,3	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
10,8**	0,2;48,6	5,3**	0,5;18,9	13,7**	2,8;35,6	2,8**	0,3;9,9	-	;	9,1**	1,0;30,4	4,2**	0,9;11,3	Oui
89,2	51,4;99,8	94,7	81,1;99,5	86,3	64,4;97,2	97,2	90,1;99,7	100,0	;	90,9	69,6;99,0	95,8	88,7;99,1	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	80,8	75,8;85,2	78,8	62,1;90,6
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	16,3	12,2;21,1	18,8**	7,6;35,5
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	2,9**	1,3;5,4	2,4**	0,1;12,7
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	75,4	70,7;80,1	76,7	59,6;89,2
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	18,5	14,5;23,0	20,9**	8,8;38,4
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	6,1*	3,7;9,6	2,4**	0,1;12,7
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	78,2	71,6;83,9	84,3	59,8;96,8
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	11,2*	7,1;16,4	10,0**	1,3;31,1
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	10,6*	6,6;16,0	5,7**	0,1;30,3
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	57,7	51,5;64,0	53,6*	32,5;73,7
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	18,6	13,9;24,1	35,8**	17,5;57,8
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	23,7	18,5;28,8	10,7**	1,9;30,0
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	43,7	38,4;49,0	33,8*	18,9;51,6
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	16,2	12,3;20,6	20,5**	7,5;40,4
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	13,5*	9,5;18,4	20,7**	8,1;39,3
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	12,4	9,0;16,5	16,7**	5,6;34,9
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	14,2	10,5;18,6	8,4**	1,6;23,8
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	81,6	73,7;87,9	84,8	50,2;98,7
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	13,1*	7,9;20,0	15,2**	1,3;49,8
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	5,3**	2,0;11,2	-	;
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	11,7*	8,4;15,8	17,8**	6,0;36,8
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	88,3	84,2;91,6	82,2	63,2;94,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
86,1	55,5;98,7	87,2	73,2;95,5	76,6	48,8;93,8	83,5	74,4;90,4	71,1*	38,8;92,7	76,8	53,4;92,2	78,1	64,8;88,1	Oui, tout à fait
7,9**	0,2;38,0	7,6**	1,6;20,7	23,4**	6,2;51,2	16,5*	9,6;25,6	21,2**	3,1;56,1	23,2**	7,8;46,6	15,9**	7,6;28,0	Oui, en partie
6,0**	0,1;33,1	5,2**	0,6;18,1	-	;	-	;	7,6**	0,1;38,3	-	;	6,0**	1,5;15,3	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
59,5*	28,8;85,5	82,5	67,4;92,7	55,5*	30,4;78,7	76,9	67,5;84,7	52,4**	20,3;83,1	92,8	76,3;99,1	77,5	64,2;87,7	Oui, tout à fait
11,5**	1,4;36,0	14,9**	5,9;29,1	37,9**	16,0;64,3	19,9*	13,0;28,4	33,3**	8,8;67,3	3,6**	0,1;18,9	14,4**	6,5;26,2	Oui, en partie
29,0**	7,7;60,7	2,5**	0,0;14,9	6,6**	0,1;32,2	3,2**	0,5;9,9	14,3**	1,8;42,9	3,6**	0,1;19,5	8,1**	2,6;18,1	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
38,9**	3,1;88,7	89,2	70,6;97,9	69,7*	40,1;90,6	73,4	61,0;83,5	71,1**	24,3;97,4	92,8	65,7;99,8	82,4	65,7;93,2	Oui
33,5**	2,2;84,5	7,1**	0,8;24,4	9,0**	0,3;39,2	15,1**	7,6;25,9	17,3**	0,3;68,3	7,2**	0,2;34,3	5,5**	0,6;19,0	Non, il ne voulait pas
27,6**	0,8;83,6	3,7**	0,1;19,7	21,3**	5,1;49,0	11,5**	4,9;21,8	11,6**	0,1;55,7	-	;	12,0**	3,5;27,7	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
57,9**	20,7;89,3	64,3	47,2;79,0	39,8**	15,9;67,9	62,1	50,0;73,1	9,2**	0,1;47,2	70,1*	44,2;89,1	61,3	46,1;75,1	Oui, tout à fait
7,9**	0,1;41,9	16,6**	6,0;33,4	25,7**	6,7;55,5	14,6**	7,0;25,5	29,1**	4,5;69,3	17,4**	4,4;40,5	14,4**	5,8;27,9	Oui, en partie
34,2**	6,5;73,8	19,2**	7,4;37,2	34,6**	12,1;63,6	23,4*	14,1;35,0	61,6**	23,2;91,4	12,5**	1,4;39,9	24,3**	12,7;39,5	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
26,2**	6,1;58,3	29,0**	15,1;46,6	75,5	50,9;91,9	56,4	46,5;66,2	48,1**	18,8;78,4	41,8*	22,3;63,4	31,6*	20,1;45,1	Oui, une infirmière pivot en oncologie
13,8**	1,2;44,9	24,6**	11,5;42,5	18,5**	4,8;42,3	19,9*	12,8;28,8	-	;	8,9**	1,0;29,3	9,8**	3,6;20,1	Oui, un autre professionnel de la santé
26,4**	6,1;58,8	10,8**	2,8;26,1	-	;	10,9**	5,0;20,1	15,6**	1,6;48,6	12,2**	2,9;30,6	16,2**	7,5;29,1	Oui, un membre du personnel administratif
19,9**	3,2;52,0	17,0**	6,3;33,7	-	;	6,2**	2,3;13,0	6,2**	0,1;31,2	23,1**	7,9;46,3	16,6**	8,1;28,8	Oui, un médecin
13,8**	1,4;44,1	18,6**	7,7;34,8	6,0**	0,2;29,0	6,6**	2,4;14,0	30,0**	7,9;62,4	14,0**	2,8;36,4	25,8*	15,6;38,3	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
100,0	;	73,0	46,8;91,0	100,0	;	80,0	66,5;89,8	100,0	;	62,6**	25,0;91,3	86,2	65,7;96,8	Oui, tout à fait
-	;	15,8**	3,2;40,1	-	;	15,6**	6,8;28,9	-	;	37,4**	8,7;75,0	3,5**	0,1;18,7	Oui, en partie
-	;	11,3**	1,3;35,8	-	;	4,4**	0,6;14,7	-	;	-	;	10,2**	1,5;30,5	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]
5,6**	0,1;32,3	4,9**	0,6;17,0	38,9**	17,5;64,1	11,3**	5,6;19,5	-	;	7,2**	0,6;26,6	10,5**	4,3;20,6	Oui
94,4	67,7;99,9	95,1	83,0;99,4	61,1*	35,9;82,5	88,7	80,5;94,4	100,0	;	92,8	73,4;99,4	89,5	79,4;95,7	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	87,1	83,3;90,2	100,0	;
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	12,9	9,8;16,7	-	;
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	33,9	28,5;39,2	2,9**	0,0;16,5
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	66,1	60,8;71,5	97,1	83,5;100,0
Lieu de la chirurgie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	84,5	79,9;88,5	91,7	78,2;98,2
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	15,5	11,5;20,1	8,3**	1,8;21,8
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	64,3	57,0;71,6	78,8	55,4;93,4
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	10,4*	5,9;16,6	9,2**	1,0;30,8
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	25,4	18,9;32,8	12,0**	2,2;32,7
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	72,9	67,2;78,6	80,1	62,2;92,1
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	15,7	11,6;20,6	11,4**	2,9;27,8
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	11,4*	7,5;16,3	8,5**	1,6;23,9
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	96,5	93,5;98,4	97,8	88,5;99,9
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	3,5**	1,6;6,5	2,2**	0,1;11,5
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	82,7	77,5;87,2	86,1	69,0;95,8
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	16,1	11,8;21,2	13,9**	4,2;31,0
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	1,2**	0,3;3,2	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
84,4	51,1;98,5	62,6	47,3;76,3	43,4**	20,8;68,1	98,2	93,5;99,8	72,7*	42,0;92,8	85,8	67,3;96,0	95,9	88,6;99,1	Oui
15,6**	1,5;48,9	37,4*	23,7;52,7	56,6*	31,9;79,2	1,8**	0,2;6,5	27,3**	7,2;58,0	14,2**	4,0;32,7	4,1**	0,9;11,4	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
9,3**	0,2;44,3	12,6**	2,4;34,0	49,4**	9,8;89,6	67,3	57,9;76,8	7,9**	0,1;39,5	8,9**	1,0;29,2	24,0*	13,8;37,1	Oui
90,7	55,7;99,8	87,4	66,0;97,6	50,6**	10,4;90,2	32,7	23,2;42,1	92,1	60,5;99,9	91,1	70,8;99,0	76,0	62,9;86,2	Non
														Lieu de la chirurgie[p, r]
84,0	48,7;98,7	75,3	53,2;90,6	100,0	;	95,4	88,3;98,8	92,1	59,2;99,9	76,3	51,0;92,7	67,5	54,4;78,8	Hôpital de la région de résidence
16,0**	1,3;51,3	24,7**	9,4;46,8	-	;	4,6**	1,2;11,7	7,9**	0,1;40,8	23,7**	7,3;49,0	32,5*	21,2;45,6	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
87,8*	34,4;100,0	61,6*	31,8;86,1	100,0	;	62,3	48,1;75,1	23,1**	0,1;87,3	52,8**	21,9;82,2	59,7	43,2;74,7	Oui, tout à fait
-	;	7,4**	0,2;35,7	-	;	14,0**	5,8;26,9	-	;	21,2**	3,4;54,9	7,3**	1,6;19,3	Oui, en partie
12,2**	0,0;65,6	31,0**	9,7;60,7	-	;	23,7**	12,9;37,7	76,9**	12,7;99,9	26,0**	4,5;62,7	33,1*	18,8;50,0	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
68,4*	33,7;92,3	78,2	53,9;93,5	87,8	41,3;99,9	74,0	63,7;82,6	75,8*	35,5;97,1	69,9*	43,9;89,0	64,5	50,6;76,9	Oui, tout à fait
21,7**	3,9;54,0	17,6**	4,3;41,3	12,2**	0,1;58,7	16,5*	9,8;25,2	24,2**	2,9;64,5	25,9**	8,2;52,3	11,2**	4,6;21,6	Oui, en partie
10,0**	0,2;46,6	4,2**	0,1;22,1	-	;	9,5**	4,2;18,1	-	;	4,2**	0,1;21,4	24,3*	14,1;37,1	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
100,0	;	100,0	;	84,5*	38,9;99,6	97,1	91,6;99,4	87,1	43,0;99,8	96,1	79,9;99,9	96,1	86,5;99,5	Oui
-	;	-	;	15,5**	0,4;61,1	2,9**	0,6;8,4	12,9**	0,2;57,0	3,9**	0,1;20,1	3,9**	0,5;13,5	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
83,6	47,9;98,6	82,1	60,1;95,0	66,7**	16,5;97,6	80,1	70,2;87,8	89,9	48,3;99,9	89,1	64,9;98,8	83,5	71,4;92,0	Oui, tout à fait
16,4**	1,4;52,1	13,7**	3,0;34,8	33,3**	2,4;83,5	19,9*	12,2;29,8	10,1**	0,1;51,7	10,9**	1,2;35,1	12,8**	5,4;24,2	Oui, en partie
-	;	4,2**	0,1;22,7	-	;	-	;	-	;	-	;	3,7**	0,5;11,9	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	44,2	40,0;48,4	53,3*	36,2;69,8
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	55,8	51,6;60,0	46,7*	30,2;63,8
Lieu de la chimiothérapie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	85,3	78,7;90,4	61,8*	36,7;82,9
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	14,7*	9,6;21,3	38,2**	17,1;63,3
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	76,3	68,3;83,1	67,5*	39,8;88,4
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	11,3*	6,7;17,6	11,1**	1,2;36,4
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	12,4*	7,3;19,4	21,3**	5,4;48,3
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	61,4	49,6;72,3	65,2*	32,7;89,7
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	12,4**	5,5;23,0	21,2**	3,8;53,0
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	26,2*	17,0;37,2	13,6**	1,2;44,8
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	57,2	48,9;65,5	65,5*	39,2;86,3
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	28,3	20,5;37,3	24,1**	7,2;50,4
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	14,5*	9,2;21,2	10,4**	1,1;34,3
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	75,4	67,0;82,5	84,7	58,9;97,3
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	19,1*	12,7;27,0	4,8**	0,1;27,4
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	5,5**	2,5;10,4	10,5**	1,0;35,3
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	88,5	81,2;93,7	84,1	59,7;96,7
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	11,5**	6,3;18,8	15,9**	3,3;40,3
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	-	;	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
26,2**	6,1;58,3	-	;	89,2	65,6;98,7	64,5	55,4;73,7	25,1**	6,6;54,3	56,5*	34,8;76,4	24,6*	15,5;35,6	Oui
73,8*	41,7;93,9	100,0	;	10,8**	1,3;34,4	35,5	26,3;44,6	74,9*	45,7;93,4	43,5*	23,6;65,2	75,4	64,4;84,5	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p, r]
100,0	;	-	;	100,0	;	95,5	87,2;99,1	-	;	77,7*	46,6;95,5	81,4	53,1;96,4	Hôpital de la région de résidence
-	;	-	;	-	;	4,5**	0,9;12,8	100,0	;	22,3**	4,5;53,4	18,6**	3,6;46,9	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
78,6**	14,1;99,9	-	;	84,4	60,3;96,8	81,1	69,5;89,7	22,9**	0,2;83,7	77,4*	46,4;95,3	69,5*	40,6;90,2	Moins de 30 minutes
21,4**	0,1;85,9	-	;	10,7**	1,3;34,2	10,7**	4,5;20,5	27,1**	0,2;89,7	6,4**	0,1;31,4	12,9**	1,5;39,8	De 30 à 60 minutes
-	;	-	;	4,9**	0,1;25,6	8,3**	2,7;18,3	50,0**	3,5;96,5	16,2**	2,0;47,4	17,6**	3,3;45,4	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
37,0**	0,1;98,5	-	;	52,0**	19,4;83,4	65,6	46,0;81,9	50,0**	2,9;97,1	66,3**	18,4;96,8	61,9*	28,0;88,8	Oui, tout à fait
63,0**	1,5;99,9	-	;	19,4**	1,6;59,3	10,7**	2,0;29,6	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	28,6**	5,4;65,6	23,8**	10,4;42,5	50,0**	2,9;97,1	33,7**	3,2;81,6	38,1**	11,2;72,0	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
78,6**	14,1;99,9	-	;	52,5*	25,9;78,1	47,8	36,1;59,5	72,9**	10,3;99,8	58,3*	30,5;82,8	78,4	47,9;95,5	Moins de 30 minutes
21,4**	0,1;85,9	-	;	24,3**	6,5;52,6	35,3*	23,2;48,9	27,1**	0,2;89,7	20,2**	3,9;50,3	21,6**	4,5;52,1	De 30 à 60 minutes
-	;	-	;	23,2**	6,1;51,0	16,9**	8,9;28,0	-	;	21,4**	4,5;51,2	-	;	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
63,5**	7,9;98,8	-	;	78,8	51,1;95,0	67,8	55,6;78,4	72,9**	9,8;99,8	85,4	55,4;98,3	83,7	52,8;97,9	Oui, tout à fait
36,5**	1,2;92,1	-	;	15,8**	2,7;42,6	24,9*	14,9;37,4	27,1**	0,2;90,2	14,6**	1,7;44,6	16,3**	2,1;47,2	Oui, en partie
-	;	-	;	5,3**	0,1;29,5	7,3**	2,5;15,9	-	;	-	;	-	;	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
100,0	;	-	;	87,2	57,8;98,8	88,8	77,8;95,6	100,0	;	84,5	51,8;98,5	91,8	61,7;99,8	Oui, tout à fait
-	;	-	;	12,8**	1,2;42,2	11,2**	4,4;22,2	-	;	15,5**	1,5;48,2	8,2**	0,2;38,3	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	49,5	46,0;53,1	27,6**	14,9;43,8
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	50,5	46,9;54,0	72,4	56,2;85,1
Lieu de la radiothérapie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	3,9**	1,4;8,3	17,8**	1,9;53,0
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	96,1	91,7;98,6	82,2	47,0;98,1
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	39,3	31,5;47,1	57,5**	20,8;88,8
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	8,9**	4,7;15,0	20,4**	2,1;59,3
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	51,8	43,7;59,9	22,0**	2,2;62,5
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	77,3	69,5;83,9	83,7*	44,8;99,0
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	10,5**	5,9;16,9	16,3**	1,0;55,2
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	12,2*	7,2;18,8	-	;
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	82,8	76,1;88,3	65,2**	27,3;92,4
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	13,7*	9,0;19,6	34,8**	7,6;72,7
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	3,5**	1,2;8,1	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
41,6**	15,9;71,2	61,9	46,3;75,8	27,9**	10,9;51,4	80,0	71,2;87,1	75,6*	41,7;95,3	26,5**	10,6;48,7	23,0*	13,4;35,3	Oui
58,4*	28,8;84,1	38,1*	24,2;53,7	72,1	48,6;89,1	20,0*	12,9;28,8	24,4**	4,7;58,3	73,5	51,3;89,4	77,0	64,7;86,6	Non
														Lieu de la radiothérapie[p, r]
-	;	-	;	-	;	1,0**	0,0;5,8	11,3**	0,3;47,4	-	;	13,8**	1,5;42,9	Hôpital de la région de résidence
100,0	;	100,0	;	100,0	;	99,0	94,2;100,0	88,7	52,6;99,7	100,0	;	86,2	57,1;98,5	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
51,4**	7,6;93,5	34,3**	14,6;59,0	33,2**	3,1;81,3	35,7*	24,9;47,8	35,3**	9,3;70,2	39,0**	6,5;81,6	52,9**	23,9;80,5	Moins de 30 minutes
14,4**	0,1;67,0	12,9**	2,7;33,6	-	;	9,1**	3,6;18,3	9,0**	0,1;45,5	-	;	-	;	De 30 à 60 minutes
34,1**	2,2;85,7	52,8*	30,9;73,9	66,8**	18,7;96,9	55,2	43,6;66,8	55,7**	22,5;85,5	61,0**	18,4;93,5	47,1**	19,5;76,1	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
85,6*	27,5;100,0	91,2	72,5;98,8	76,6**	19,9;99,6	82,4	70,2;91,1	30,9**	5,4;70,4	46,1**	7,5;88,9	67,9*	37,0;90,3	Oui, tout à fait
-	;	8,8**	1,2;27,5	23,4**	0,4;80,1	6,8**	2,3;14,9	36,1**	6,7;76,7	36,5**	3,7;84,1	-	;	Oui, en partie
14,4**	0,0;72,5	-	;	-	;	10,8**	4,4;21,2	32,9**	5,3;74,5	17,4**	0,2;71,1	32,1**	9,7;63,0	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
85,6*	27,5;100,0	70,0	47,2;87,3	82,6*	28,4;99,8	85,5	75,7;92,5	100,0	;	100,0	;	79,5	49,7;95,9	Oui, tout à fait
14,4**	0,0;72,5	24,9**	9,7;46,6	17,4**	0,2;71,6	10,4**	4,8;19,1	-	;	-	;	12,4**	1,3;40,0	Oui, en partie
-	;	5,1**	0,1;26,3	-	;	4,1**	0,7;12,1	-	;	-	;	8,1**	0,1;40,0	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Douleur et malaises ressentis[p]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	63,2	57,6;68,8	67,2	47,0;83,6
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	36,8	31,2;42,4	32,8**	16,4;53,0
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	26,5	20,0;33,9	32,0**	13,4;56,1
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	40,7	33,2;48,1	37,8**	17,1;62,4
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	32,8	26,0;39,7	30,2**	11,9;54,7
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	80,8	74,6;86,1	89,5	67,4;98,6
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	17,1*	11,9;23,3	10,5**	1,4;32,6
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	2,1**	0,5;5,6	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p]
68,3*	35,7;91,4	43,6*	27,4;60,9	80,6	56,5;94,7	68,4	59,1;77,7	63,5*	31,5;88,5	74,5	50,8;90,9	52,1	39,7;64,5	Oui
31,7**	8,6;64,3	56,4	39,1;72,6	19,4**	5,3;43,5	31,6	22,3;40,9	36,5**	11,5;68,5	25,5**	9,1;49,2	47,9	35,5;60,3	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
34,0**	6,5;73,5	12,9**	1,4;41,2	33,9**	12,2;62,2	21,8*	12,4;33,9	42,3**	9,8;81,0	35,1**	15,0;60,1	22,8**	9,6;41,8	Sévères
28,9**	4,9;67,7	37,2**	13,7;66,3	46,1**	20,5;73,3	42,7	31,1;54,2	27,8**	3,2;71,0	45,2**	21,1;71,1	42,4*	25,2;61,0	Modérés
37,1**	8,6;74,7	49,9**	23,8;75,9	20,0**	4,3;48,1	35,6*	23,8;48,7	29,9**	5,5;68,0	19,7**	4,4;47,1	34,8*	18,8;53,8	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
83,2	48,4;98,3	73,8*	45,0;92,7	86,8	58,6;98,6	78,8	67,1;87,8	76,6*	34,4;97,7	74,2	47,2;92,1	83,4	64,3;94,8	Oui, tout à fait
8,1**	0,1;42,6	26,2**	7,3;55,0	13,2**	1,4;41,4	18,4**	9,8;30,2	23,4**	2,3;65,6	25,8**	7,9;52,8	12,7**	3,3;30,2	Oui, en partie
8,8**	0,1;42,7	-	;	-	;	2,8**	0,4;9,5	-	;	-	;	3,9**	0,1;21,4	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	88,3	83,0;92,5	96,0	79,5;99,9
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	10,5*	6,6;15,7	4,0**	0,1;20,5
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	1,1**	0,1;4,3	-	;
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	10,8*	7,3;15,1	5,5**	0,6;19,7
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	89,2	84,9;92,7	94,5	80,3;99,4
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	69,8	64,4;75,3	83,1	64,6;94,4
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	28,7	23,3;34,0	16,9**	5,6;35,4
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	1,5**	0,4;3,8	-	;
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	63,3	57,8;68,7	71,7	53,2;86,1
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	36,7	31,3;42,2	28,3**	13,9;46,8
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	49,7	44,4;55,0	30,6**	15,9;49,0
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	17,6	13,6;22,2	12,1**	3,1;29,3
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	32,7	27,7;37,7	57,3*	37,9;75,1
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	72,8	66,9;78,8	58,5*	34,8;79,6
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	19,0	14,0;25,0	33,3**	14,6;56,9
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	8,1*	4,9;12,5	8,2**	0,8;28,6
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	56,8	49,4;64,2	61,0*	34,8;83,2
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	43,2	35,8;50,6	39,0**	16,8;65,2
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	86,9	82,6;90,5	91,0	74,2;98,4
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	12,7	9,2;16,9	9,0**	1,6;25,8
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	0,4**	0,0;2,4	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
100,0	;	83,7	63,3;95,4	85,8	57,3;98,3	85,4	75,4;92,5	89,3	51,2;99,8	100,0	;	83,3	64,7;94,5	Oui, tout à fait
-	;	16,3**	4,6;36,7	7,7**	0,2;37,0	14,6**	7,5;24,6	10,7**	0,2;48,8	-	;	12,8**	3,5;30,0	Oui, en partie
-	;	-	;	6,5**	0,1;32,9	-	;	-	;	-	;	3,9**	0,1;19,6	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
20,6**	3,3;53,5	10,6**	2,9;25,1	24,8**	6,7;53,4	6,8**	2,7;14,0	22,4**	4,4;54,1	6,9**	0,7;24,5	11,4**	4,1;23,6	Oui
79,4*	46,5;96,7	89,4	74,9;97,1	75,2	46,6;93,3	93,2	86,0;97,3	77,6*	45,9;95,6	93,1	75,5;99,3	88,6	76,4;95,9	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
74,5*	43,1;94,0	81,7	66,4;92,0	50,6*	25,8;75,1	62,5	52,7;72,3	77,5*	42,8;96,3	69,7	45,7;87,7	71,2	57,0;82,8	Oui, toujours
25,5**	6,0;56,9	15,7**	6,2;30,7	43,4**	20,7;68,4	36,6	26,8;46,3	13,4**	1,2;44,3	30,3**	12,3;54,3	28,8*	17,2;43,0	Oui, la plupart du temps
-	;	2,6**	0,1;14,5	6,0**	0,2;29,0	0,9**	0,0;5,4	9,1**	0,2;43,7	-	;	-	;	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
51,5**	22,3;80,0	57,9	40,6;73,9	72,8	47,2;90,6	82,5	73,0;89,7	47,1**	19,2;76,5	53,4*	30,8;75,0	40,7*	28,3;53,0	Oui
48,5**	20,0;77,7	42,1*	26,1;59,4	27,2**	9,4;52,8	17,5*	10,3;27,0	52,9**	23,5;80,8	46,6*	25,0;69,2	59,3	47,0;71,7	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]
48,5**	19,6;78,2	58,2	42,3;73,0	61,0*	35,3;82,9	70,7	60,4;79,6	41,5**	16,4;70,3	40,3*	21,2;61,8	25,7*	15,8;37,8	Oui
11,6**	1,1;38,5	10,4**	2,6;25,6	25,2**	7,5;52,4	17,3*	10,3;26,5	27,9**	7,4;58,8	16,8**	4,4;39,1	22,0*	12,5;34,2	Non, mais il aurait aimé l'être
39,9**	13,1;72,1	31,4*	18,5;46,9	13,8**	2,6;36,5	12,0**	6,5;19,8	30,6**	8,1;63,3	42,9*	23,2;64,4	52,4	40,2;64,5	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
56,3**	19,3;88,6	75,2	54,3;90,0	74,8	48,4;92,3	70,7	58,0;81,4	83,6	46,0;98,8	74,6	51,7;90,5	80,2	67,8;89,5	Oui, tout à fait
35,9**	7,3;75,1	21,3**	7,9;41,7	18,9**	4,2;45,7	19,5*	10,9;31,0	16,4**	1,2;54,0	21,3**	6,5;45,0	7,5**	2,1;18,1	Oui, en partie
7,9**	0,1;44,1	3,4**	0,1;18,1	6,2**	0,2;29,5	9,8**	3,8;19,8	-	;	4,1**	0,1;21,2	12,3**	5,2;23,4	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
78,3*	32,9;98,7	49,3**	24,1;74,8	45,4**	18,2;74,9	56,6	43,6;69,7	66,8*	28,4;93,3	60,5*	33,3;83,6	52,5*	33,4;71,1	Oui
21,7**	1,3;67,1	50,7*	25,2;75,9	54,6**	25,1;81,8	43,4*	30,3;56,4	33,2**	6,7;71,6	39,5**	16,4;66,7	47,5*	28,9;66,6	Non
														Patient traité de manière respectueuse
88,4	59,7;99,1	92,1	78,0;98,4	77,8	51,4;94,0	81,3	72,3;88,4	91,4	58,6;99,8	85,5	66,5;96,0	92,6	81,6;98,0	Oui, toujours
11,6**	0,9;40,3	7,9**	1,6;22,0	16,2**	3,3;41,0	18,7*	11,6;27,7	8,6**	0,2;41,4	14,5**	4,0;33,5	7,4**	2,0;18,4	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	6,0**	0,2;29,0	-	;	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	2,1**	0,7;4,8	-	;
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	9,1*	5,9;13,3	6,1**	0,8;19,8
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	3,4**	1,6;6,3	3,3**	0,1;18,0
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	85,4	80,6;89,4	90,7	74,7;98,1
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	76,3	71,2;81,3	71,9	52,0;87,0
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	19,2	14,6;24,4	28,1**	13,0;48,0
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	4,6**	2,5;7,7	-	;
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	88,9	85,1;92,0	84,5	65,9;95,3
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	9,8*	6,9;13,4	15,5**	4,7;34,1
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	1,3**	0,3;3,5	-	;
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p, r]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	55,7	47,4;63,9	75,0*	41,0;95,1
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	44,3	36,1;52,6	25,0**	4,9;59,0
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	4,3**	2,3;7,2	2,6**	0,1;13,5
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	95,7	92,8;97,7	97,4	86,5;99,9
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	80,1	74,6;84,9	86,7	64,2;97,5
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	9,4*	6,0;13,9	8,3**	0,8;28,9
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	10,4*	6,8;15,1	5,0**	0,1;26,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
6,1**	0,1;34,3	-	;	-	;	4,0**	0,8;11,3	-	;	-	;	2,2**	0,1;11,3	Oui, souvent
-	;	2,8**	0,1;15,0	31,3**	11,9;57,3	3,7**	1,0;9,5	7,9**	0,1;41,3	15,7**	4,4;35,6	14,9**	6,4;27,7	Oui, parfois
-	;	2,9**	0,1;15,4	7,4**	0,2;33,3	2,8**	0,6;8,1	-	;	-	;	6,2**	1,3;17,3	Oui, une seule fois
93,9	65,7;99,9	94,3	80,6;99,3	61,3*	34,3;84,0	89,4	81,2;94,9	92,1	58,7;99,9	84,3	64,4;95,6	76,7	62,5;87,5	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
86,1	54,2;98,8	75,5	58,5;88,1	59,7*	33,1;82,7	75,5	65,5;83,7	84,6	54,0;98,2	59,3*	36,4;79,6	87,7	76,2;95,0	Oui, toujours
6,0**	0,1;29,6	10,7**	2,9;25,5	40,3**	17,3;66,9	21,3*	13,4;31,2	15,4**	1,8;46,0	29,5**	12,8;51,7	8,9**	2,8;20,1	Oui, la plupart du temps
7,9**	0,1;39,5	13,8**	4,7;29,0	-	;	3,2**	0,6;9,7	-	;	11,1**	2,2;29,8	3,4**	0,4;11,6	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
86,5	55,0;98,9	94,3	82,3;99,1	90,9	69,4;99,1	85,8	77,3;91,9	93,2	64,3;99,9	82,4	62,8;94,3	94,4	84,3;98,8	Oui, toujours
5,6**	0,1;31,9	2,6**	0,1;12,5	9,1**	0,9;30,6	13,3*	7,4;21,3	6,8**	0,1;35,7	14,4**	3,8;33,9	5,6**	1,2;15,7	Oui, la plupart du temps
7,9**	0,1;39,5	3,1**	0,1;14,9	-	;	1,0**	0,0;5,9	-	;	3,2**	0,1;17,8	-	;	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p, r]
90,5	47,0;100,0	75,5*	43,2;94,7	70,2**	25,0;96,8	32,7**	17,0;51,9	36,1**	6,5;77,2	60,8**	26,0;88,8	55,0*	35,1;73,8	Oui
9,5**	0,0;53,0	24,5**	5,3;56,8	29,8**	3,2;75,0	67,3	48,1;83,0	63,9**	22,8;93,5	39,2**	11,2;74,0	45,0*	26,2;64,9	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
-	;	2,5**	0,0;14,2	10,3**	1,2;33,2	4,7**	1,6;10,5	17,4**	2,1;50,5	-	;	3,4**	0,5;10,9	Oui
100,0	;	97,5	85,8;100,0	89,7	66,8;98,8	95,3	89,5;98,4	82,6	49,5;97,9	100,0	;	96,6	89,1;99,5	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
91,6	59,4;99,8	78,6	61,7;90,6	70,5*	44,0;89,6	78,3	67,1;87,1	90,6	55,8;99,8	77,1	53,0;92,7	80,9	66,1;91,2	Oui, tout à fait
8,4**	0,2;40,6	12,0**	3,6;27,1	12,7**	1,7;38,3	12,3**	6,0;21,7	-	;	10,2**	1,2;32,3	4,2**	0,4;15,0	Oui, en partie
-	;	9,4**	1,7;26,6	16,8**	3,7;41,3	9,4**	3,8;18,5	9,4**	0,2;44,2	12,7**	2,8;32,3	14,9**	6,0;29,1	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	83,3	78,2;87,7	93,1	77,2;99,2
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	16,7	12,3;21,8	6,9**	0,8;22,8
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	15,0	11,0;19,7	32,3**	14,5;54,8
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	85,0	80,3;89,0	67,7	45,2;85,5
Médecin spécialiste[p]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	11,8*	8,1;16,5	4,2**	0,1;20,4
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	88,2	83,5;91,9	95,8	79,6;99,9
Infirmière pivot en oncologie[p,]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	37,4	31,8;43,0	32,1**	16,3;51,7
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	62,6	57,0;68,2	67,9	48,3;83,7
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	9,3*	6,2;13,3	10,3**	2,0;28,1
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	90,7	86,7;93,8	89,7	71,9;98,0
CLSC[p]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	17,9	13,7;22,8	23,5**	9,2;44,1
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	82,1	77,2;86,3	76,5	55,9;90,8
Urgence d'un hôpital[p, r]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	30,8	25,2;36,4	49,7*	29,8;69,7
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	69,2	63,6;74,8	50,3*	30,3;70,2
Unité de soins d'un hôpital[p]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	10,5*	6,9;15,0	7,2**	0,8;24,7
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	89,5	85,0;93,1	92,8	75,3;99,2
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	1,3**	0,3;3,6	2,9**	0,1;14,8
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	98,7	96,4;99,7	97,1	85,2;99,9
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	-	;	-	;
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	100,0	;	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]
72,7*	41,5;93,0	75,5	57,0;88,9	88,1	63,8;98,4	84,6	75,5;91,3	79,7*	43,0;97,6	100,0	;	74,7	59,7;86,4	Oui
27,3**	7,0;58,5	24,5**	11,1;43,0	11,9**	1,6;36,2	15,4*	8,7;24,5	20,3**	2,4;57,0	-	;	25,3**	13,6;40,3	Non
														Médecin de famille[p]
5,6**	0,1;32,3	8,6**	1,9;22,4	4,7**	0,1;24,5	17,5*	10,5;26,5	-	;	16,5**	4,8;36,7	13,9**	5,8;26,4	Oui
94,4	67,7;99,9	91,4	77,6;98,1	95,3	75,5;99,9	82,5	73,5;89,5	100,0	;	83,5	63,3;95,2	86,1	73,6;94,2	Non
														Médecin spécialiste[p]
5,6**	0,1;31,9	9,6**	2,1;25,1	19,7**	4,7;46,1	12,1**	6,2;20,5	19,3**	2,1;56,1	12,9**	2,8;33,2	13,6**	5,0;27,9	Oui
94,4	68,1;99,9	90,4	74,9;97,9	80,3	53,9;95,3	87,9	79,5;93,8	80,7*	43,9;97,9	87,1	66,8;97,2	86,4	72,1;95,0	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p]
25,2**	7,1;53,2	26,4**	12,4;45,1	42,9**	20,3;68,0	50,1	39,8;60,4	44,3**	14,6;77,4	33,7**	15,2;56,8	25,8*	14,7;39,9	Oui
74,8	46,8;92,9	73,6	54,9;87,6	57,1*	32,0;79,7	49,9	39,6;60,2	55,7**	22,6;85,4	66,3*	43,2;84,8	74,2	60,1;85,3	Non
														Info-Santé[p]
-	;	6,3**	0,7;22,2	9,9**	0,9;33,9	14,9**	8,2;24,0	-	;	3,5**	0,1;19,8	7,6**	1,8;19,4	Oui
100,0	;	93,7	77,8;99,3	90,1	66,1;99,1	85,1	76,0;91,8	100,0	;	96,5	80,2;99,9	92,4	80,6;98,2	Non
														CLSC[p]
-	;	18,3**	7,1;35,4	14,0**	2,9;36,3	20,0*	12,7;29,0	8,5**	0,1;43,6	14,1**	2,7;37,2	21,4**	10,7;36,0	Oui
100,0	;	81,7	64,6;92,9	86,0	63,7;97,1	80,0	71,0;87,3	91,5	56,4;99,9	85,9	62,8;97,3	78,6	64,0;89,3	Non
														Urgence d'un hôpital[p, r]
33,6**	10,1;65,3	15,4**	5,5;31,6	58,5*	34,8;79,7	24,8*	16,9;34,1	23,7**	4,2;58,3	51,9*	29,5;73,7	19,9**	10,0;33,6	Oui
66,4*	34,7;89,9	84,6	68,4;94,5	41,5**	20,3;65,2	75,2	65,9;83,1	76,3*	41,7;95,8	48,1*	26,3;70,5	80,1	66,4;90,0	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p]
8,2**	0,2;39,5	12,0**	3,1;28,6	18,8**	3,6;47,4	10,2**	5,1;17,7	18,0**	1,8;54,2	9,5**	1,2;30,5	7,9**	2,1;19,3	Oui
91,8	60,5;99,8	88,0	71,4;96,9	81,2	52,6;96,4	89,8	82,3;94,9	82,0*	45,8;98,2	90,5	69,5;98,8	92,1	80,7;97,9	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
-	;	-	;	-	;	1,9**	0,2;7,0	-	;	4,6**	0,1;24,2	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	98,1	93,0;99,8	100,0	;	95,4	75,8;99,9	100,0	;	Non
														Autre contact
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	67,5	61,5;73,5	68,7*	44,1;87,4
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	14,5*	10,2;19,7	20,9**	6,8;43,2
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	18,1	13,5;23,4	10,4**	1,1;33,8
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	56,2	49,6;62,9	53,9*	33,8;73,1
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	14,3*	10,0;19,6	20,7**	7,2;41,6
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	29,5	23,3;35,7	25,4**	9,8;47,7
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	48,9	42,4;55,4	50,0*	27,8;72,2
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	26,4	20,6;32,1	26,0**	10,3;48,1
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	24,8	19,2;30,3	24,0**	8,6;46,8
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	43,9	36,9;50,8	59,6*	35,9;80,4
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	20,2	14,7;25,6	12,3**	2,2;33,8
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	36,0	29,6;42,3	28,1**	10,9;51,9
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	65,2	59,1;71,2	86,4	67,1;96,6
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	19,2	14,5;24,6	13,6**	3,4;32,9
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	15,7*	11,1;21,1	-	;
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	56,5	49,8;63,2	74,9	53,1;90,2
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	23,0	17,4;28,5	13,1**	2,6;34,6
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	20,5	15,4;25,7	12,0**	2,5;31,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
53,0**	13,3;90,0	62,7*	38,4;83,0	75,2	47,8;92,9	73,5	62,7;82,6	62,7*	27,8;89,8	47,4**	23,3;72,3	67,6	50,5;81,8	Oui, tout à fait
9,7**	0,1;49,5	7,9**	1,1;24,8	12,8**	1,2;42,2	19,1*	11,1;29,6	-	;	15,0**	3,0;38,7	10,5**	3,0;24,5	Oui, en partie
37,2**	5,8;80,3	29,5**	11,6;53,7	11,9**	1,4;37,5	7,4**	3,1;14,4	37,3**	10,2;72,2	37,7**	15,8;63,9	21,9**	10,0;38,7	Non
														La sexualité[p]
79,9*	40,1;98,2	74,5	56,0;88,2	54,2**	23,6;82,5	56,3	44,4;68,1	49,9**	15,8;84,1	16,8**	2,8;45,2	57,1	39,9;73,2	Oui, tout à fait
9,6**	0,1;50,5	19,9**	8,2;37,1	8,7**	0,1;42,8	13,0**	6,1;23,2	-	;	10,4**	1,1;34,0	16,0**	6,2;31,6	Oui, en partie
10,5**	0,2;49,5	5,6**	0,5;20,5	37,2**	12,8;67,6	30,8*	19,7;43,8	50,1**	15,9;84,2	72,8	46,4;91,0	26,8**	13,8;43,6	Non
														Les émotions[p]
56,2**	21,8;86,6	45,3*	26,6;65,0	44,8**	20,6;71,1	55,5	44,7;66,3	68,9*	32,0;93,5	28,2**	10,0;53,9	40,0*	24,8;56,7	Oui, tout à fait
18,9**	1,6;57,8	34,4**	17,5;54,7	22,5**	5,7;50,5	24,3*	15,5;35,1	8,2**	0,1;41,7	30,4**	11,2;56,5	32,4*	18,2;49,6	Oui, en partie
24,9**	3,8;62,4	20,3**	8,0;38,8	32,6**	11,3;61,1	20,2*	11,8;31,0	22,9**	2,9;61,4	41,4**	18,9;66,9	27,6**	14,4;44,4	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
48,0**	12,4;85,2	46,5*	28,2;65,5	36,6**	12,6;67,0	49,1	37,4;60,8	55,9**	17,3;89,7	7,1**	0,2;34,1	34,7*	18,9;53,5	Oui, tout à fait
8,8**	0,1;46,0	33,2**	16,7;53,4	13,4**	1,3;43,0	17,1**	8,9;28,3	-	;	32,6**	11,0;61,5	27,7**	13,0;47,1	Oui, en partie
43,2**	10,1;81,9	20,4**	7,6;39,7	49,9**	23,2;76,6	33,8*	23,3;45,7	44,1**	10,3;82,7	60,3*	30,8;85,1	37,5*	21,7;55,6	Non
														Les besoins alimentaires[p]
60,3**	22,9;90,3	55,9*	34,0;76,2	65,5*	39,5;86,1	65,0	52,9;75,7	72,3*	37,4;94,2	48,6*	25,2;72,5	63,7	47,6;77,8	Oui, tout à fait
-	;	15,9**	4,0;37,5	27,4**	8,9;54,4	22,2*	13,7;33,0	16,9**	1,6;52,3	27,8**	11,5;49,9	17,3**	7,3;32,3	Oui, en partie
39,7**	9,7;77,1	28,2**	11,2;51,6	7,1**	0,2;32,5	12,8**	6,0;23,0	10,8**	0,2;49,8	23,6**	7,0;49,6	19,0**	8,6;34,0	Non
														Les activités courantes[p]
56,2**	21,3;87,0	52,6*	29,3;75,0	44,2**	18,7;72,3	60,9	49,2;71,9	69,4*	31,6;94,1	40,1**	16,3;68,0	47,7*	31,3;64,5	Oui, tout à fait
18,9**	1,7;57,3	25,0**	9,5;47,3	32,0**	9,4;63,2	23,7*	14,9;34,6	10,5**	0,1;52,1	25,8**	8,3;52,0	25,7**	12,6;43,0	Oui, en partie
24,9**	4,5;60,0	22,4**	7,0;46,4	23,8**	4,7;56,9	15,3**	8,2;25,2	20,0**	1,9;59,2	34,0**	11,2;64,2	26,6**	14,1;42,5	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	88,6	84,0;92,2	96,8	82,5;99,9
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	9,6*	6,4;13,8	3,2**	0,1;17,5
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	1,8**	0,6;4,2	-	;
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	71,5	66,3;76,7	79,4	62,1;91,3
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	25,0	19,9;30,1	20,6**	8,7;37,9
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	1,4**	0,4;3,7	-	;
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	2,1**	0,8;4,5	-	;
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	77,8	73,1;82,5	87,5	69,5;96,9
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	13,7	10,0;18,2	9,3**	1,8;25,4
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	8,4*	5,3;12,6	3,2**	0,1;18,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
72,7*	41,5;93,0	94,5	82,0;99,3	67,3*	41,4;87,2	91,2	84,0;95,9	91,4	58,6;99,8	91,4	70,2;99,2	86,2	73,5;94,3	Oui, tout à fait
21,3**	4,3;51,8	-	;	26,7**	9,3;51,9	8,8**	4,1;16,0	8,6**	0,2;41,4	8,6**	0,8;29,8	11,7**	4,4;24,0	Oui, en partie
6,0**	0,1;29,6	5,5**	0,7;18,0	6,0**	0,2;29,0	-	;	-	;	-	;	2,1**	0,0;12,0	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
73,1*	43,2;92,6	71,4	52,9;85,8	60,1*	33,2;83,2	69,2	59,6;78,8	60,1*	27,7;86,9	78,2	57,4;92,0	74,1	61,5;84,3	Toujours
26,9**	7,4;56,8	22,2**	9,6;40,1	39,9**	16,8;66,8	27,5*	18,3;38,3	33,7**	9,2;67,3	14,0**	3,7;33,2	22,2*	12,4;34,8	La plupart du temps
-	;	3,4**	0,1;17,9	-	;	1,4**	0,0;7,8	6,2**	0,1;31,2	3,6**	0,1;19,4	-	;	À l'occasion
-	;	3,1**	0,1;14,9	-	;	1,9**	0,2;6,8	-	;	4,2**	0,1;21,8	3,7**	0,5;12,5	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
60,6**	25,4;89,0	63,2	44,6;79,3	63,9*	36,6;85,9	78,3	68,1;86,4	68,7*	35,9;91,6	91,8	72,5;99,1	84,2	71,3;92,9	Oui, tout à fait
17,6**	1,5;55,0	27,6**	13,7;45,4	36,1**	14,1;63,4	16,1**	9,0;25,8	14,9**	1,5;46,5	4,4**	0,1;23,1	1,5**	0,0;7,9	Oui, en partie
21,8**	3,1;57,6	9,3**	1,7;25,9	-	;	5,6**	1,8;12,8	16,5**	1,6;51,0	3,8**	0,1;20,7	14,3**	6,2;26,5	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	81,5	76,2;86,0	88,2	71,6;96,9
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	9,4*	6,2;13,6	2,9**	0,0;17,5
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	9,1*	5,9;13,3	8,9**	1,6;25,0
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	86,9	81,5;91,3	85,1	66,5;95,7
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	11,0*	7,2;15,8	14,9**	4,3;33,5
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	2,1**	0,7;4,9	-	;
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	77,2	68,7;84,2	69,0*	43,6;88,0
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	13,5*	8,2;20,6	16,1**	3,2;41,0
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	9,3**	5,0;15,5	15,0**	2,9;39,2
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	67,4	59,9;74,9	63,4*	28,9;89,9
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	17,2*	11,5;24,4	27,7**	5,2;64,3
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	15,4*	10,0;22,3	8,9**	0,1;46,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
87,8	59,1;98,9	81,9	67,3;91,9	73,5	46,6;91,7	82,7	73,2;89,9	86,1	53,9;98,8	70,9	48,1;87,9	80,1	67,0;89,7	Aucun report
12,2**	1,1;40,9	5,1**	0,8;15,9	5,5**	0,2;25,8	11,2**	5,4;20,1	6,5**	0,1;33,6	16,4**	4,5;37,3	11,1**	4,5;22,0	Un report
-	;	13,0**	4,5;27,5	20,9**	4,5;49,9	6,1**	2,1;13,4	7,4**	0,1;39,0	12,7**	2,6;33,4	8,8**	2,7;20,0	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
90,3	55,5;99,8	83,3	60,8;95,8	82,2*	23,3;99,9	85,7	76,5;92,3	88,2	51,2;99,6	91,8	73,7;99,0	89,0	77,6;95,9	Aucun report
9,7**	0,2;44,5	12,8**	2,5;34,2	17,8**	0,1;76,7	12,0**	6,1;20,7	11,8**	0,4;48,8	8,2**	1,0;26,3	7,0**	2,1;16,4	Un report
-	;	3,9**	0,1;21,4	-	;	2,3**	0,2;8,5	-	;	-	;	4,0**	0,5;13,5	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
100,0	;	-	;	75,3*	45,8;93,7	80,4	67,9;89,7	72,9**	9,8;99,8	52,2*	25,6;78,0	93,7	70,4;99,8	Aucun report
-	;	-	;	4,9**	0,1;25,8	12,4**	5,2;23,6	27,1**	0,2;90,2	35,5**	12,6;64,8	6,3**	0,2;29,6	Un report
-	;	-	;	19,8**	3,5;50,8	7,2**	2,5;15,8	-	;	12,2**	1,4;38,4	-	;	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
72,3**	19,0;98,9	44,1*	24,4;65,2	100,0	;	69,9	58,6;79,7	80,7*	45,0;97,7	39,5**	6,9;81,6	78,8	49,7;95,4	Aucun report
27,7**	1,1;81,0	17,7**	5,7;37,2	-	;	16,6**	8,7;27,5	19,3**	2,3;55,0	15,3**	0,2;65,9	13,9**	1,5;43,6	Un report
-	;	38,3**	18,6;61,2	-	;	13,5**	6,4;24,0	-	;	45,2**	9,1;85,8	7,3**	0,2;35,3	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	9,6*	6,4;13,7	5,7**	0,6;20,5
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	10,0*	6,8;14,2	10,8**	2,1;29,3
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	80,3	75,2;84,8	83,4	64,4;94,8
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	36,3	31,1;41,5	68,6	50,3;83,5
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	10,3*	7,1;14,3	12,1**	2,5;31,6
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	53,4	47,9;58,9	19,3**	8,1;35,9
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	58,0	52,0;63,9	60,7	42,0;77,3
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	2,8**	1,2;5,6	8,2**	0,7;29,2
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	39,2	33,2;45,2	31,1**	15,8;50,2
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	8,9*	5,8;12,9	3,0**	0,0;17,1
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	8,4*	5,5;12,0	7,6**	1,4;21,3
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	82,7	77,8;87,0	89,5	73,4;97,5
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	14,6	10,7;19,2	5,5**	0,5;19,9
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	7,0*	4,3;10,7	6,1**	0,6;22,2
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	78,4	73,6;83,2	88,4	71,4;97,1
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	23,7	18,9;28,4	39,4*	22,6;58,3
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	6,8*	4,1;10,5	3,0**	0,1;16,3
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	69,5	64,3;74,7	57,6*	38,4;75,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	2,7**	0,1;12,8	13,6**	1,8;40,1	18,3*	10,7;28,3	12,6**	1,2;41,2	13,4**	2,7;35,3	1,4**	0,0;8,5	Oui
12,2**	1,1;40,8	8,5**	1,9;22,5	15,2**	1,7;46,2	10,7**	5,4;18,3	5,8**	0,1;30,1	8,2**	0,9;27,3	9,3**	3,2;19,9	Non, mais il aurait souhaité le consulter
87,8	59,2;98,9	88,8	74,5;96,6	71,3*	41,3;91,7	71,0	60,6;80,1	81,7	51,6;97,0	78,3	55,4;93,0	89,3	78,1;96,0	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
32,1**	8,1;66,2	32,7*	17,9;50,6	63,7*	35,7;86,1	25,7*	17,5;35,4	25,1**	6,6;54,3	53,7*	30,2;76,0	25,2*	14,5;38,6	Oui
16,5**	1,7;50,0	8,0**	1,5;22,6	5,5**	0,1;28,0	14,8*	8,4;23,4	7,5**	0,1;37,3	7,0**	0,9;22,8	5,7**	1,6;14,1	Non, mais il aurait souhaité le consulter
51,4**	20,5;81,6	59,3	41,9;75,1	30,8**	10,0;59,7	59,5	49,7;69,4	67,4*	37,7;89,3	39,3**	18,8;63,1	69,1	55,4;80,7	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
31,3**	7,9;65,2	43,3*	26,6;61,1	89,1	65,6;98,7	63,5	53,5;73,6	55,8**	24,2;84,3	81,0	60,6;93,8	43,1*	29,1;57,9	Oui
-	;	5,6**	0,7;18,9	-	;	3,8**	1,1;9,2	-	;	-	;	-	;	Non, mais il aurait souhaité le consulter
68,7*	34,8;92,1	51,1*	34,1;68,0	10,9**	1,3;34,4	32,6*	22,9;42,3	44,2**	15,7;75,8	19,0**	6,2;39,4	56,9	42,1;70,9	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
-	;	5,2**	0,5;18,7	10,1**	1,2;31,9	11,5**	5,8;19,8	28,7**	7,8;59,8	8,1**	1,0;26,6	7,7**	2,1;18,7	Oui
16,5**	1,7;50,0	7,6**	1,8;19,8	17,7**	3,5;44,8	9,1**	4,3;16,5	5,8**	0,1;30,1	7,2**	0,7;25,1	4,5**	0,9;12,8	Non, mais il aurait souhaité le consulter
83,5	50,0;98,3	87,2	72,0;95,9	72,2	47,1;90,0	79,4	69,3;87,3	65,5*	34,4;89,1	84,7	64,0;96,0	87,8	75,8;95,2	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
10,4**	0,2;46,4	5,2**	0,5;18,7	10,1**	1,3;31,8	16,3*	9,3;25,6	35,9**	11,4;67,6	25,9**	10,1;48,3	15,0**	7,3;26,1	Oui
18,7**	3,2;48,8	8,2**	1,8;21,8	16,6**	3,4;41,9	7,9**	3,5;15,0	-	;	3,5**	0,1;18,8	2,9**	0,3;10,3	Non, mais il aurait souhaité le consulter
71,0*	39,1;92,4	86,5	71,1;95,5	73,3	47,6;91,0	75,8	65,6;84,2	64,1*	32,4;88,6	70,6	48,4;87,4	82,2	70,0;90,9	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
23,3**	4,3;56,9	5,4**	0,7;17,5	25,7**	8,8;50,5	18,2*	11,2;27,1	26,9**	6,2;59,6	37,6**	18,4;60,1	27,0*	15,9;40,6	Oui
5,6**	0,1;28,4	7,6**	1,8;19,8	4,7**	0,1;24,9	11,3**	5,4;19,9	-	;	6,9**	0,7;24,1	4,1**	0,7;12,9	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
71,1*	38,4;92,8	87,0	72,6;95,5	69,7*	44,8;88,2	70,6	60,4;79,4	73,1*	40,4;93,8	55,5*	34,0;75,6	68,9	55,5;80,2	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	11,2*	8,0;15,3	3,0**	0,1;15,8
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	10,2*	6,9;14,3	5,1**	0,6;17,6
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	78,6	74,1;83,1	92,0	77,4;98,5
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	6,6*	4,0;10,3	-	;
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	10,5*	7,1;14,7	10,0**	2,0;27,1
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	82,9	77,9;87,1	90,0	72,9;98,0
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	26,9	22,0;31,8	15,0**	4,9;32,1
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	9,8*	6,6;13,9	6,3**	0,7;21,7
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	63,3	57,8;68,8	78,6	59,9;91,4
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	46,7	42,1;51,3	37,2*	20,4;56,6
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	3,9**	1,9;7,0	-	;
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	49,4	44,5;54,3	62,8	43,4;79,6
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	10,6*	7,3;14,6	3,0**	0,1;16,9
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	13,4	9,9;17,5	8,0**	1,6;22,2
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	76,0	71,2;80,9	88,9	73,0;97,2
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	9,3*	6,2;13,4	17,5**	5,6;37,0
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	5,1*	2,9;8,0	2,7**	0,0;15,5
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	85,6	81,0;89,5	79,8	60,1;92,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
16,9**	1,7;51,4	5,2**	0,5;19,0	15,9**	3,2;40,4	18,0*	11,4;26,5	-	;	7,7**	0,9;25,7	10,2**	3,7;21,2	Oui
12,2**	1,1;40,8	10,6**	3,2;24,0	17,2**	3,5;43,3	15,2**	8,4;24,4	5,8**	0,1;28,7	15,3**	3,8;36,5	1,5**	0,0;7,9	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
71,0*	39,1;92,4	84,2	68,7;94,0	66,9*	39,1;88,0	66,8	58,1;75,6	94,2	71,3;99,9	77,0	53,5;92,3	88,3	77,3;95,2	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
-	;	3,3**	0,1;17,3	9,4**	1,2;30,0	12,7**	6,3;22,0	-	;	7,3**	0,8;25,3	4,7**	0,9;13,6	Oui
22,5**	4,3;55,0	7,8**	1,9;20,3	10,8**	1,3;34,1	5,5**	2,0;11,6	11,5**	1,1;38,4	18,1**	4,9;41,1	13,6**	5,7;26,0	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
77,5*	45,0;95,7	88,9	74,9;96,6	79,8	54,8;94,6	81,8	72,1;89,2	88,5	61,6;98,9	74,6	51,4;90,6	81,7	68,4;91,1	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
46,6**	17,1;78,1	37,1*	21,9;54,4	17,0**	3,5;42,7	35,4	26,0;44,8	38,3**	12,0;71,0	16,0**	4,1;37,4	15,0**	7,2;26,4	Oui
16,1**	1,6;49,5	5,1**	0,7;16,9	15,4**	3,3;38,8	6,1**	2,3;12,8	11,5**	1,1;38,4	20,6**	6,3;43,8	11,9**	4,8;23,3	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
37,3**	11,6;69,9	57,8	41,0;73,4	67,6*	41,6;87,5	58,5	48,8;68,2	50,2**	20,2;80,1	63,4*	40,3;82,7	73,1	59,5;84,1	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
50,0**	20,4;79,6	62,8	46,2;77,5	30,2**	11,4;55,7	63,6	54,1;73,1	42,5**	15,8;72,9	35,7**	16,3;59,4	26,7*	16,6;38,9	Oui
8,3**	0,1;41,6	2,9**	0,1;15,8	-	;	2,6**	0,3;8,9	-	;	4,1**	0,1;22,9	9,6**	3,2;21,1	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
41,7**	14,1;73,8	34,2*	19,8;51,2	69,8*	44,3;88,6	33,8	25,0;42,7	57,5*	27,1;84,2	60,1*	36,7;80,6	63,7	50,0;76,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
31,2**	7,8;65,2	2,5**	0,1;13,8	6,2**	0,1;32,8	12,3**	6,1;21,3	6,8**	0,1;35,7	15,7**	4,4;35,7	11,8**	4,6;23,6	Oui
19,1**	3,2;49,8	10,6**	3,2;24,0	19,7**	5,2;44,3	17,4*	10,7;26,2	11,5**	1,1;38,4	17,1**	4,4;39,6	7,2**	2,1;17,2	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
49,7**	21,2;78,4	86,9	72,3;95,5	74,1	48,5;91,4	70,3	59,3;79,8	81,7	51,6;97,0	67,2	46,0;84,3	81,0	68,3;90,2	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
-	;	8,6**	1,8;23,2	15,1**	3,0;38,9	4,8**	1,3;12,3	24,3**	4,9;57,2	7,6**	1,1;24,0	9,2**	3,3;19,7	Oui
6,5**	0,1;36,8	2,6**	0,1;12,4	-	;	5,8**	2,2;12,1	5,8**	0,1;30,1	13,0**	2,5;35,1	4,6**	0,8;13,5	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
93,5	63,2;99,9	88,8	74,4;96,6	84,9	61,1;97,0	89,4	81,1;94,9	69,9*	37,6;92,1	79,3	57,2;93,3	86,2	74,6;93,9	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	5,4*	3,1;8,7	2,5**	0,1;13,0
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	94,6	91,3;96,9	97,5	87,0;99,9
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	21,5**	5,9;47,0	-	;
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	78,5	53,0;94,1	100,0	;
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	5,1**	0,1;27,2	100,0	;
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	94,9	72,8;99,9	-	;
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	17,3**	3,2;44,8	100,0	;
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	82,7	55,2;96,8	-	;
Travailleur social[r]													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	20,0**	4,4;47,8	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	80,0	52,2;95,6	100,0	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	41,5**	17,9;68,4	100,0	;
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	58,5*	31,6;82,1	-	;
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	-	;	-	;
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	100,0	;	100,0	;
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	23,9**	5,5;54,5	-	;
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	76,1*	45,5;94,5	100,0	;
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	36,5**	14,9;63,0	100,0	;
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	63,5*	37,0;85,1	-	;
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	-	;	-	;
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	100,0	;	100,0	;
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	5,2**	0,1;27,4	-	;
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	94,8	72,6;99,9	100,0	;
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	..	;	..	;
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	..	;	..	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]
5,6**	0,1;28,4	-	;	12,1**	1,6;36,6	6,4**	2,0;14,8	14,3**	1,6;44,3	3,5**	0,1;18,8	5,2**	1,1;14,4	Oui
94,4	71,6;99,9	100,0	;	87,9	63,4;98,4	93,6	85,2;98,0	85,7	55,7;98,4	96,5	81,2;99,9	94,8	85,6;98,9	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
100,0	;	-	;	-	;	15,1**	0,1;71,1	-	;	100,0	;	27,0**	0,1;92,5	Oui
-	;	-	;	100,0	;	84,9*	28,9;99,9	100,0	;	-	;	73,0**	7,5;99,9	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Psychologue
-	;	-	;	47,9**	0,6;99,1	14,0**	0,1;64,9	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	52,1**	0,9;99,4	86,0*	35,1;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Travailleur social[r]
-	;	-	;	-	;	14,0**	0,1;64,9	-	;	-	;	73,0**	7,5;99,9	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	86,0*	35,1;99,9	100,0	;	100,0	;	27,0**	0,1;92,5	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
-	;	-	;	47,9**	0,6;99,1	65,1**	16,1;97,0	-	;	-	;	27,0**	0,1;92,5	Oui
100,0	;	-	;	52,1**	0,9;99,4	34,9**	3,0;83,9	100,0	;	100,0	;	73,0**	7,5;99,9	Non
														Médicaments
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Services de transport
-	;	-	;	-	;	20,9**	0,5;73,8	59,7**	1,4;99,8	-	;	42,6**	0,9;97,0	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	79,1*	26,2;99,5	40,3**	0,2;98,6	100,0	;	57,4**	3,0;99,1	Non
														Services d'aide à domicile
100,0	;	-	;	-	;	43,1**	5,8;88,2	40,3**	0,2;98,6	100,0	;	-	;	Oui
-	;	-	;	100,0	;	56,9**	11,8;94,2	59,7**	1,4;99,8	-	;	100,0	;	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Soins infirmiers à domicile
100,0	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autres services ou ressources
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Oui
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Suivi médical du patient établi[p, r]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	96,1	93,2;98,0	89,3	71,8;97,7
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	3,9**	2,0;6,8	10,7**	2,3;28,2
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	38,1	32,3;44,0	23,0**	8,6;44,5
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	20,9	16,0;25,8	18,1**	5,5;39,3
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	22,6	17,5;27,6	24,5**	11,1;42,8
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	18,4	14,0;23,4	34,3**	17,3;55,0
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	28,9	23,8;34,1	19,7**	7,4;38,4
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	33,7	28,3;39,2	29,1**	13,6;49,1
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	18,4	13,7;24,0	20,5**	8,2;38,9
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	18,9	14,3;24,3	30,7**	14,4;51,5
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	5,3**	2,7;9,1	13,8**	3,0;35,0
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	4,4**	2,3;7,5	5,7**	0,6;20,3
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	28,9	23,6;34,2	29,1**	13,6;49,2
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	16,5	12,6;21,0	14,8**	4,3;33,3
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	35,8	30,0;41,7	33,8**	16,5;55,1
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	9,1*	5,9;13,3	2,7**	0,0;15,9
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	-	;	-	;
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	6,0*	3,5;9,6	8,9**	1,8;24,4
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	94,0	90,4;96,5	91,1	75,6;98,2
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	88,2	83,9;91,6	89,2	69,5;98,1
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	10,3*	7,0;14,5	10,8**	1,9;30,5
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	1,5**	0,4;4,0	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p, r]
84,5	50,1;98,7	97,2	86,0;99,9	95,1	74,5;99,9	98,7	93,5;100,0	100,0	;	93,1	76,6;99,2	98,6	92,8;100,0	Oui
15,5**	1,3;49,9	2,8**	0,1;14,0	4,9**	0,1;25,5	1,3**	0,0;6,5	-	;	6,9**	0,8;23,4	1,4**	0,0;7,2	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
15,3**	1,3;49,7	62,7	45,5;77,9	80,0	53,8;95,1	32,2*	22,4;42,0	51,2**	23,4;78,5	29,4**	11,9;52,8	31,2*	19,1;45,6	Médecin spécialiste du cancer
20,0**	2,0;58,7	5,1**	0,5;18,0	6,1**	0,1;31,7	39,6	29,4;49,8	5,8**	0,1;28,7	16,2**	3,0;42,5	12,9**	5,1;25,3	Médecin de famille
50,1**	16,7;83,5	29,6**	15,6;47,1	4,7**	0,1;24,3	9,7**	4,3;18,0	24,6**	5,0;57,7	25,3**	8,4;50,4	36,8*	23,3;52,0	Autre médecin spécialiste
14,6**	1,3;46,9	2,5**	0,1;13,7	9,3**	1,0;30,4	18,6*	11,3;27,9	18,4**	3,0;48,8	29,2**	10,4;55,2	19,1**	9,1;33,2	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
15,3**	1,3;49,7	57,8	40,9;73,5	62,7*	36,5;84,3	20,4*	12,6;30,3	42,6**	15,4;73,6	11,9**	2,3;32,2	24,6*	14,1;37,9	Médecin spécialiste du cancer
20,0**	2,0;58,7	15,6**	5,7;31,6	12,6**	1,7;38,1	58,1	48,1;68,0	20,1**	3,5;51,5	33,6**	14,2;58,1	22,6**	12,2;36,2	Médecin de famille
50,1**	16,7;83,5	21,6**	9,3;39,2	9,5**	1,0;31,4	7,7**	3,0;15,6	16,1**	1,5;50,0	15,7**	3,1;40,6	30,3*	17,5;45,8	Autre médecin spécialiste
14,6**	1,3;46,9	5,0**	0,5;18,1	15,2**	3,0;39,5	13,8**	7,4;22,8	21,2**	4,1;52,3	38,8**	18,6;62,3	22,6**	12,3;36,1	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
12,6**	0,3;53,9	2,9**	0,1;15,8	11,4**	1,1;38,1	3,8**	0,8;10,5	-	;	11,0**	1,1;36,6	-	;	Au besoin
-	;	2,5**	0,0;13,8	9,4**	1,0;31,7	4,2**	0,9;11,5	5,8**	0,1;30,1	3,8**	0,1;19,7	4,3**	0,6;14,1	À tous les mois
10,8**	0,3;47,1	16,2**	6,4;31,5	39,1**	17,9;63,9	22,8*	15,1;32,1	51,4**	22,9;79,3	36,1**	16,7;59,4	37,9*	25,3;51,9	À tous les 2 ou 3 mois
17,8**	2,0;52,3	25,4**	12,4;42,6	9,5**	1,2;30,2	22,9*	15,2;32,1	6,3**	0,1;33,7	9,5**	1,0;32,1	9,4**	3,5;19,4	À tous les 4 mois
51,6**	18,3;83,8	49,9*	33,3;66,5	18,0**	3,6;45,3	37,0	26,9;47,1	5,9**	0,1;30,3	39,6**	19,4;62,9	35,6*	23,0;49,8	À tous les 6 mois
7,3**	0,1;39,9	3,2**	0,1;17,1	12,6**	1,7;38,1	9,4**	4,3;17,3	30,7**	8,2;63,2	-	;	12,8**	4,6;26,4	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Trop long
7,9**	0,1;39,3	13,1**	4,1;28,9	6,9**	0,2;32,9	6,1**	2,1;13,4	-	;	4,7**	0,1;24,1	1,4**	0,0;8,4	Trop court
92,1	60,7;99,9	86,9	71,1;95,9	93,1	67,1;99,8	93,9	86,6;97,9	100,0	;	95,3	75,9;99,9	98,6	91,6;100,0	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
92,1	60,7;99,9	91,6	77,4;98,3	81,7	54,7;96,2	82,4	73,7;89,1	90,8	55,6;99,8	94,7	74,0;99,9	92,3	81,3;97,9	Tout à fait capable
7,9**	0,1;39,3	8,4**	1,7;22,6	11,4**	1,0;38,5	14,2**	7,9;22,8	9,2**	0,2;44,4	5,3**	0,1;26,0	7,7**	2,1;18,7	En partie capable
-	;	-	;	6,9**	0,2;32,9	3,4**	0,7;9,9	-	;	-	;	-	;	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	55,1	49,1;61,0	55,5*	34,3;75,3
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	22,6	17,4;27,8	29,5**	13,0;51,1
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	22,3	17,5;27,2	15,0**	4,7;32,8
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	41,7	29,9;53,5	51,5**	9,4;91,9
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	58,3	46,5;70,1	48,5**	8,1;90,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
72,1*	34,3;95,1	49,5*	32,3;66,8	44,4**	20,0;71,1	59,9	50,3;69,6	40,8**	14,8;71,2	48,7*	25,3;72,6	56,2	43,1;69,3	Oui, tout à fait
15,3**	1,6;47,6	26,0**	13,2;42,8	18,8**	3,1;49,7	22,0*	13,8;32,1	22,8**	4,5;55,1	13,5**	2,7;35,7	23,5*	13,3;36,5	oui, en partie
12,6**	0,3;53,9	24,4**	11,4;42,2	36,8**	16,0;61,9	18,1*	11,1;27,1	36,4**	12,4;66,7	37,7**	16,0;63,8	20,3**	10,3;33,8	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
20,9**	0,1;84,5	-	;	23,3**	2,2;65,8	52,8*	31,9;73,0	59,6**	5,8;98,6	41,2**	10,9;77,6	31,9**	7,2;67,9	Oui
79,1**	15,5;99,9	100,0	;	76,7*	34,2;97,8	47,2*	27,0;68,1	40,4**	1,4;94,2	58,8**	22,4;89,1	68,1*	32,1;92,8	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	24,0	18,9;29,2	16,5**	6,1;33,2
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	48,9	43,4;54,3	43,8*	25,8;63,0
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	27,1	21,8;32,4	39,7*	22,5;59,0
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	24,5	19,3;29,6	32,7*	17,6;50,9
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	44,6	39,0;50,2	28,1**	13,1;47,7
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	31,0	25,9;36,0	39,3*	21,9;58,9
Modification de l'alimentation[p]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	45,3	39,5;51,1	62,8	44,3;78,8
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	32,3	27,1;37,6	18,1**	6,5;36,4
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	22,3	17,7;26,9	19,1**	7,1;37,7
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	13,7	10,0;18,1	4,4**	0,1;21,9
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	9,2*	6,2;13,1	6,0**	0,6;21,0
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	77,1	72,2;81,9	89,6	72,0;97,9
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	0,9**	0,1;2,9	-	;
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	0,5**	0,1;2,0	-	;
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	98,6	96,5;99,6	100,0	;
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	10,4*	7,2;14,3	10,6**	2,7;25,8
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	8,4*	5,7;11,7	12,7**	4,1;27,9
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	81,3	76,6;85,4	76,7	58,9;89,5
Gestion du stress[p]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	31,2	26,0;36,4	28,5**	13,6;47,8
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	24,0	18,9;29,1	24,1**	11,1;41,9
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	44,8	39,1;50,5	47,4*	28,2;67,2

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p]
11,2**	0,8;40,0	12,9**	4,3;27,6	15,3**	2,6;41,3	36,6	26,5;46,7	14,3**	1,3;46,0	32,9**	14,2;56,7	21,0**	11,3;33,9	Oui
57,8*	28,7;83,4	54,4	37,9;70,2	56,9*	31,4;79,9	38,9	29,1;48,7	70,3*	37,8;92,3	47,3*	25,2;70,2	53,9	41,4;66,3	Non
31,0**	9,8;60,4	32,7*	18,6;49,7	27,8**	9,4;54,2	24,5*	15,8;34,9	15,4**	1,9;45,8	19,8**	6,7;40,6	25,2*	14,6;38,5	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
11,6**	1,1;38,5	18,6**	7,3;35,8	34,0**	13,9;59,4	27,2*	18,2;37,7	31,1**	8,3;63,7	21,5**	6,6;45,2	18,9**	9,3;32,1	Oui
75,0*	44,1;94,1	42,6*	27,0;59,4	50,5*	27,7;73,2	38,1	28,3;47,9	35,4**	10,8;67,7	63,8*	40,0;83,4	50,2	37,9;62,6	Non
13,4**	1,4;42,6	38,8*	23,8;55,6	15,5**	3,4;38,6	34,8	25,4;44,1	33,5**	10,9;63,6	14,7**	3,6;35,3	30,9*	19,9;43,8	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p]
22,7**	5,6;51,3	30,2*	16,3;47,5	73,3	46,4;91,5	48,4	38,3;58,6	43,7**	16,6;73,8	32,5**	14,1;55,9	41,7*	28,5;54,9	Oui
47,3**	19,2;76,7	42,4*	26,8;59,3	16,5**	3,2;42,3	28,6*	20,0;38,4	29,6**	7,3;62,9	39,6**	19,8;62,2	39,2*	26,6;53,0	Non
30,0**	7,2;64,1	27,4**	14,2;44,3	10,2**	1,3;32,3	23,0*	14,6;33,3	26,8**	6,9;57,5	28,0**	11,1;51,2	19,1**	10,2;31,1	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
19,3**	3,4;49,8	9,8**	2,4;24,6	6,3**	0,2;30,1	13,3**	7,3;21,5	33,9**	10,9;64,5	23,6**	8,4;46,1	14,4**	6,6;26,0	Oui
-	;	7,6**	1,7;20,4	5,5**	0,2;25,8	10,3**	5,4;17,6	5,9**	0,1;32,1	19,1**	5,3;42,5	10,8**	3,9;22,5	Non
80,7	50,2;96,6	82,5	67,1;92,8	88,2	64,7;98,3	76,4	67,1;84,1	60,2*	30,0;85,5	57,3*	34,7;77,8	74,8	61,5;85,4	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	-	;	5,5**	0,2;25,8	-	;	-	;	-	;	2,3**	0,1;11,7	Oui
-	;	-	;	-	;	1,8**	0,2;6,4	-	;	-	;	-	;	Non
100,0	;	100,0	;	94,5	74,2;99,8	98,2	93,6;99,8	100,0	;	100,0	;	97,7	88,3;99,9	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
-	;	10,0**	2,8;23,4	-	;	12,4*	7,0;19,9	13,9**	1,3;44,9	-	;	16,4**	7,9;28,5	Oui
13,5**	1,3;43,7	12,1**	3,9;26,6	-	;	3,7**	1,0;8,9	14,2**	1,4;45,5	3,3**	0,1;17,1	12,7**	6,0;22,7	Non
86,5	56,3;98,7	77,9	62,5;89,2	100,0	;	84,0	75,8;90,2	71,9*	40,1;92,8	96,7	82,9;99,9	70,9	57,6;82,1	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p]
13,9**	1,2;45,4	22,7**	11,2;38,4	49,8**	24,5;75,2	43,1	32,8;53,4	30,2**	7,5;63,5	16,1**	4,2;37,5	24,4*	14,2;37,3	Oui
20,7**	3,5;53,1	19,5**	8,3;36,0	32,2**	12,1;58,8	19,2*	11,5;29,0	57,5*	27,2;84,1	17,5**	4,5;40,6	26,5*	15,8;39,7	Non
65,5*	33,2;89,7	57,7	41,3;73,0	17,9**	3,8;44,2	37,8	27,6;48,0	12,4**	1,3;39,8	66,4*	42,9;85,2	49,1	35,9;62,3	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	48,6	43,1;54,1	44,3*	26,6;63,1
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	14,9	11,0;19,6	7,7**	1,7;20,7
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	36,5	30,9;42,1	48,0*	29,3;67,1
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	0,6**	0,1;2,2	-	;
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	99,4	97,8;99,9	100,0	;
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	0,3**	0,0;1,6	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	99,7	98,4;100,0	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]
56,1*	27,2;82,2	21,8**	10,1;38,2	61,3*	35,7;83,0	64,2	54,5;73,9	47,6**	20,1;76,3	41,8*	22,2;63,6	40,3*	27,7;52,8	Oui
-	;	30,5*	16,8;47,3	-	;	9,0**	4,0;16,9	46,3**	19,0;75,4	15,8**	3,2;40,4	19,6**	9,8;33,1	Non
43,9**	17,8;72,8	47,7*	31,3;64,6	38,7**	17,0;64,3	26,8*	18,6;36,4	6,0**	0,1;31,3	42,4**	21,4;65,6	40,2*	27,3;53,0	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
-	;	-	;	-	;	0,9**	0,0;4,8	-	;	-	;	1,4**	0,0;7,5	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	99,1	95,2;100,0	100,0	;	100,0	;	98,6	92,5;100,0	Non
														Autre
-	;	-	;	-	;	0,9**	0,0;5,1	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	99,1	94,9;100,0	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	57,6	46,5;68,8	68,2*	29,5;94,0
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	42,4	31,2;53,5	31,8**	6,0;70,5
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	83,4	76,2;89,2	84,8	61,0;96,9
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	16,6*	10,8;23,8	15,2**	3,1;39,0
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	53,7	42,1;65,3	28,0**	2,7;73,6
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	46,3	34,7;57,9	72,0**	26,4;97,3
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	30,9*	19,4;44,5	15,8**	0,1;69,0
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	69,1	55,5;80,6	84,2*	31,0;99,9
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	12,4**	6,0;21,9	-	;
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	87,6	78,1;94,0	100,0	;
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	53,5	44,4;62,6	71,0*	44,2;90,1
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	46,5	37,4;55,6	29,0**	9,9;55,8
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	62,5	54,5;70,6	72,5*	44,9;91,3
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	37,5	29,4;45,5	27,5**	8,7;55,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
-	;	57,0**	21,2;88,0	64,3**	24,1;93,2	71,8	49,4;88,3	32,2**	0,2;94,9	66,2**	17,5;97,0	28,7**	7,6;60,3	Oui
100,0	;	43,0**	12,0;78,8	35,7**	6,8;75,9	28,2**	11,7;50,6	67,8**	5,1;99,8	33,8**	3,0;82,5	71,3*	39,7;92,4	Non
														Soutien de la famille ou des amis
59,3**	1,3;99,8	71,7*	36,1;94,2	93,3	65,7;99,9	82,5	69,0;91,9	80,4**	22,2;99,8	76,0*	45,5;94,4	89,4	70,5;98,1	Oui
40,7**	0,2;98,7	28,3**	5,8;63,9	6,7**	0,1;34,3	17,5**	8,1;31,0	19,6**	0,2;77,8	24,0**	5,6;54,5	10,6**	1,9;29,5	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
-	;	67,2**	18,8;97,1	23,7**	0,2;84,4	54,3*	31,8;75,6	100,0	;	52,5**	14,4;88,4	68,7*	32,4;93,2	Oui
100,0	;	32,8**	2,9;81,2	76,3**	15,6;99,8	45,7*	24,4;68,2	-	;	47,5**	11,6;85,6	31,3**	6,8;67,6	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
-	;	38,2**	6,2;80,9	13,4**	0,3;56,1	31,5**	11,6;58,1	50,0**	0,6;99,4	79,0**	15,3;99,9	35,6**	6,4;76,4	Oui
100,0	;	61,8**	19,1;93,8	86,6	43,9;99,7	68,5*	41,9;88,4	50,0**	0,6;99,4	21,0**	0,1;84,7	64,4**	23,6;93,6	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
-	;	11,7**	0,1;57,3	11,0**	0,3;48,2	16,6**	5,2;36,0	29,4**	0,3;91,4	21,7**	2,3;61,2	5,5**	0,1;29,1	Oui
100,0	;	88,3	42,7;99,9	89,0	51,8;99,7	83,4	64,0;94,8	70,6**	8,6;99,7	78,3*	38,8;97,7	94,5	70,9;99,9	Non
														Exemple de l'entourage[p]
59,3**	1,3;99,8	31,3**	2,8;79,3	42,5**	14,3;74,9	54,0	37,3;70,2	51,6**	3,6;97,1	62,4**	26,9;90,0	46,2**	22,5;71,2	Oui
40,7**	0,2;98,7	68,7**	20,7;97,2	57,5**	25,1;85,7	46,0*	29,8;62,7	48,4**	2,9;96,4	37,6**	10,0;73,1	53,8*	28,8;77,5	Non
														Prière ou soutien spirituel[p]
100,0	;	35,6**	6,4;76,6	32,3**	8,4;66,0	71,4	56,5;83,6	62,9**	4,0;99,6	50,3**	18,1;82,3	64,8*	41,0;84,2	Oui
-	;	64,4**	23,4;93,6	67,7*	34,0;91,6	28,6*	16,4;43,5	37,1**	0,4;96,0	49,7**	17,7;81,9	35,2**	15,8;59,0	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,7*	8,3;15,8
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	-	;	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	2,4**	0,9;5,1	-	;
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	11,4*	8,2;15,4	23,0**	9,7;42,1
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	37,0	31,1;43,0	22,8**	10,2;40,3
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	49,1	43,1;55,1	54,2*	35,0;72,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région															
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
5,0**	2,8;8,1	11,9	9,1;15,2	6,8*	4,1;10,6	30,4	26,1;34,7	4,7*	2,7;7,6	8,0*	5,3;11,3	21,5	16,9;26,1	Ensemble des patients	
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic	
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Mauvaise	
13,5**	1,1;45,0	2,5**	0,1;13,3	6,3**	0,2;30,1	1,9**	0,2;7,5	9,5**	0,2;43,6	-	;	-	;	Passable	
6,0**	0,1;33,1	7,8**	1,7;21,0	9,4**	1,1;30,6	12,3**	6,7;20,1	7,0**	0,1;36,4	9,3**	0,9;32,3	9,6**	3,9;19,0	Bonne	
42,7**	15,1;74,3	36,2*	20,1;54,9	38,3**	15,6;65,5	37,8	27,9;47,7	37,3**	11,8;69,5	48,7*	27,9;69,9	37,6*	25,4;51,1	Très bonne	
37,8**	12,7;68,9	53,5*	34,7;71,7	45,9**	21,8;71,6	48,0	37,6;58,4	46,2**	17,7;76,7	42,0*	21,9;64,1	52,7	40,2;65,3	Excellente	

Région 09

CÔTE-NORD

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	51,7	50,0 ; 53,4
Femmes	53,9	48,3	46,6 ; 50,0
Âge			
18 à 49 ans	18,9	17,7	13,5 ; 22,6
50 à 59 ans	24,9	36,0	31,0 ; 41,0
60 à 69 ans	29,8	25,0	19,3 ; 30,7
70 ans et plus	26,5	21,2	16,9 ; 25,5
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	96,6	93,1 ; 98,6
Anglais	10,6	2,1**	0,7 ; 5,1
Autres	3,0	1,3**	0,2 ; 4,0
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	39,5	32,9 ; 46,2
Diplôme d'études secondaires	24,7	25,8	19,8 ; 32,6
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	27,1	21,3 ; 32,9
Diplôme d'études universitaires	20,6	7,6*	4,5 ; 11,8
Occupation principale			
En emploi	29,3	33,6	27,9 ; 39,3
Étudiant	1,7	1,7**	0,5 ; 4,3
Retraité	55,8	48,3	42,9 ; 53,7
À la maison	7,2	11,0*	7,1 ; 16,1
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	3,8**	1,7 ; 7,1
Congé de maternité / autres	3,6	1,6**	0,5 ; 4,0
Situation familiale			
Vit seul	24,1	24,4	19,0 ; 29,9
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	53,5	47,1 ; 59,8
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	14,3*	10,3 ; 19,2
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	2,4**	0,8 ; 5,5
Autres	4,8	5,4**	2,8 ; 9,3
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	15,1*	10,5 ; 20,8
Revenu suffisant	61,4	63,7	57,1 ; 70,4
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	21,1	15,6 ; 26,7
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	2,9**	1,1 ; 6,0
2	21,1	20,9	15,4 ; 27,5
3	20,1	19,5	14,5 ; 25,4
4	19,4	16,2*	11,4 ; 22,1
5 - très défavorisé	17,6	40,4	33,7 ; 47,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	11,3*	7,5 ; 16,1	16,6*	10,5 ; 24,3	5,7**	2,2 ; 11,7
Génital féminin	5,5	...	10,2	7,0**	3,8 ; 11,6	...	;	14,4**	7,7 ; 23,9
Prostate	15,9	34,4	...	16,6	12,9 ; 20,9	32,2	24,7 ; 39,7	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	9,9*	6,7 ; 13,9	12,7*	7,8 ; 19,0	6,8**	3,1 ; 12,7
Sein	26,5	0,4**	48,8	19,8	15,4 ; 24,8	0,9**	0,0 ; 4,9	40,0	30,8 ; 49,3
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	4,0**	2,0 ; 7,2	5,1**	2,0 ; 10,4	2,8**	0,6 ; 8,2
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	10,5*	6,8 ; 15,2	7,1**	3,3 ; 13,1	14,1*	8,2 ; 22,1
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	20,9	15,5 ; 26,3	25,4*	17,9 ; 34,3	16,0*	9,4 ; 24,8
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	85,1	79,9 ; 89,4	88,8	81,6 ; 93,9	81,2	72,3 ; 88,2
Récidive	7,4	7,5	7,3	5,8**	3,2 ; 9,4	5,1**	2,0 ; 10,5	6,4**	2,6 ; 12,9
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	9,1*	5,6 ; 13,8	6,1**	2,3 ; 12,5	12,4**	6,6 ; 20,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	15,2*	10,9 ; 20,5	17,6*	11,0 ; 25,8	12,8*	7,2 ; 20,4
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	14,2*	9,8 ; 19,7	7,7**	3,2 ; 14,9	21,1*	13,6 ; 30,4
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	70,6	64,7 ; 76,4	74,8	65,9 ; 82,4	66,1	57,5 ; 74,7
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	55,0	48,5 ; 61,5	54,3	44,9 ; 63,6	55,8	46,7 ; 64,9
Non	58,8	56,6	60,7	45,0	38,5 ; 51,5	45,7	36,4 ; 55,1	44,2	35,1 ; 53,3
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	93,4	89,1 ; 96,4	93,9	87,2 ; 97,7	92,9	86,5 ; 96,9
Non	8,3	8,5	8,0	6,6**	3,6 ; 10,9	6,1**	2,3 ; 12,8	7,1**	3,1 ; 13,5
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	7,9*	4,5 ; 12,6	8,6**	4,0 ; 15,6	7,2**	2,9 ; 14,5
Très bon	29,2	29,3	29,1	26,8	21,1 ; 32,4	32,3	24,2 ; 40,4	21,0*	13,5 ; 30,2
Bon	34,9	34,2	35,5	40,7	34,6 ; 46,9	32,9	24,5 ; 41,2	48,9	39,8 ; 58,1
Moyen	18,8	17,8	19,6	20,0	14,8 ; 26,0	19,0*	12,4 ; 27,1	21,0*	13,5 ; 30,4
Mauvais	5,6	5,7	5,5	4,6**	2,3 ; 8,1	7,3**	3,4 ; 13,4	1,9**	0,2 ; 6,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région											
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
										Siège du cancer[p]	
11,3*	7,5 ; 16,1	4,7**	0,6 ; 15,7	11,9**	5,7 ; 21,2	11,8**	4,7 ; 23,2	15,4**	6,3 ; 29,4	Colorectal	
7,0**	3,8 ; 11,6	7,8**	1,5 ; 21,5	5,2**	1,4 ; 12,6	8,0**	2,6 ; 17,8	8,2**	1,6 ; 22,8	Génital féminin	
16,6	12,9 ; 20,9	-	;	12,6**	6,9 ; 20,7	31,4*	20,5 ; 44,0	19,9**	10,1 ; 33,3	Prostate	
9,9*	6,7 ; 13,9	16,6**	6,7 ; 31,7	7,8**	3,4 ; 14,8	9,7**	3,5 ; 20,1	8,0**	2,2 ; 19,4	Hématopoïétique	
19,8	15,4 ; 24,8	33,2*	19,1 ; 49,8	20,7*	13,2 ; 29,9	14,3**	6,7 ; 25,5	13,7**	4,7 ; 28,8	Sein	
4,0**	2,0 ; 7,2	4,5**	0,5 ; 15,4	6,7**	2,7 ; 13,6	1,7**	0,1 ; 8,6	1,8**	0,0 ; 9,8	ORL (Tête et cou)	
10,5*	6,8 ; 15,2	2,5**	0,1 ; 13,1	16,1*	9,1 ; 25,4	7,4**	2,2 ; 17,4	11,3**	3,1 ; 26,9	Broncho-pulmonaire	
20,9	15,5 ; 26,3	30,8*	17,5 ; 47,0	19,1*	11,2 ; 29,3	15,8**	7,6 ; 27,6	21,7**	9,1 ; 39,8	Autres cancers	
										Historique de la maladie[p]	
85,1	79,9 ; 89,4	95,0	82,5 ; 99,5	89,1	80,4 ; 94,8	78,2	65,6 ; 87,8	78,5	62,4 ; 90,0	Premier cancer	
5,8**	3,2 ; 9,4	2,3**	0,0 ; 12,9	4,6**	1,2 ; 11,8	12,8**	5,5 ; 24,1	2,3**	0,0 ; 13,5	Récidive	
9,1*	5,6 ; 13,8	2,7**	0,1 ; 14,3	6,3**	2,1 ; 14,2	9,0**	3,2 ; 19,3	19,2**	8,5 ; 34,6	Deuxième cancer	
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]	
15,2*	10,9 ; 20,5	15,1**	5,4 ; 30,8	11,8**	5,8 ; 20,5	18,2**	9,4 ; 30,2	17,8**	7,6 ; 32,9	Sous traitement	
14,2*	9,8 ; 19,7	20,7**	8,9 ; 37,7	11,6**	6,0 ; 19,9	16,3**	7,9 ; 28,5	10,6**	2,0 ; 28,8	Sans traitement avec médication	
70,6	64,7 ; 76,4	64,2	46,7 ; 79,3	76,6	66,5 ; 84,9	65,5	52,2 ; 77,2	71,6	53,5 ; 85,8	Sans traitement sans médication	
										Médecin de famille durant les traitements[p]	
55,0	48,5 ; 61,5	60,4	44,6 ; 74,8	53,5	42,9 ; 64,1	52,1	39,1 ; 65,2	56,4	39,7 ; 72,0	Oui	
45,0	38,5 ; 51,5	39,6*	25,2 ; 55,4	46,5	35,9 ; 57,1	47,9	34,8 ; 60,9	43,6*	28,0 ; 60,3	Non	
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p]	
93,4	89,1 ; 96,4	90,5	77,0 ; 97,5	95,2	88,0 ; 98,7	93,2	82,1 ; 98,4	93,0	79,8 ; 98,7	Oui	
6,6**	3,6 ; 10,9	9,5**	2,5 ; 23,0	4,8**	1,3 ; 12,0	6,8**	1,6 ; 17,9	7,0**	1,3 ; 20,2	Non	
										Perception de l'état de santé[p]	
7,9*	4,5 ; 12,6	4,5**	0,5 ; 16,0	10,9**	5,1 ; 19,8	7,2**	2,0 ; 17,6	6,5**	0,7 ; 22,4	Excellent	
26,8	21,1 ; 32,4	27,0**	13,8 ; 44,1	26,5*	17,5 ; 37,2	31,1*	20,3 ; 43,7	21,7**	9,9 ; 38,3	Très bon	
40,7	34,6 ; 46,9	41,5*	25,8 ; 58,5	45,4	35,6 ; 55,3	41,1*	28,2 ; 53,9	31,6*	17,2 ; 49,1	Bon	
20,0	14,8 ; 26,0	22,5**	10,9 ; 38,4	13,3**	6,6 ; 22,9	15,7**	7,3 ; 28,0	34,5*	19,9 ; 51,7	Moyen	
4,6**	2,3 ; 8,1	4,4**	0,5 ; 15,5	3,9**	0,7 ; 11,5	4,9**	0,9 ; 14,3	5,7**	1,2 ; 15,9	Mauvais	

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	48,5	42,0;55,0	43,9*	23,9;65,5
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	51,5	45,0;58,0	56,1*	34,5;76,1
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	40,1	29,8;50,3	46,1**	8,5;87,6
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	25,4*	16,3;36,5	38,8**	5,8;82,7
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	21,6*	12,5;33,2	-	;
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	12,9**	6,8;21,7	15,1**	0,4;60,1
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	42,8	33,3;52,2	45,4**	18,7;74,3
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	14,8*	9,2;22,1	21,6**	4,1;53,0
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	15,1*	9,1;22,9	12,8**	1,6;39,2
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	10,3**	5,8;16,7	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	17,1*	10,5;25,5	20,2**	3,7;50,9
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	42,2	33,5;50,8	54,8**	24,2;82,9
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	33,2	24,7;41,7	23,7**	4,9;55,9
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	16,1*	10,1;23,8	14,6**	1,5;45,6
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	8,5**	4,4;14,5	6,9**	0,1;35,3
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	82,7	76,5;87,9	84,2	64,7;95,4
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	12,9*	8,5;18,5	15,8**	4,6;35,3
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	4,4**	1,9;8,4	-	;
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	4,7**	2,3;8,5	-	;
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	95,3	91,5;97,7	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
69,1*	41,8;89,1	20,3**	9,1;36,3	61,9*	39,4;81,2	59,0	42,5;74,1	87,9	48,0;99,7	30,4**	12,3;54,3	51,7	35,8;67,4	Oui
30,9**	10,9;58,2	79,7	63,7;90,9	38,1**	18,8;60,6	41,0*	25,9;57,5	12,1**	0,3;52,0	69,6	45,7;87,7	48,3*	32,6;64,2	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
50,8**	13,5;87,4	14,3**	0,2;61,1	35,0**	11,7;65,2	41,5**	19,8;66,0	36,6**	3,0;86,2	61,1**	9,7;97,6	38,2**	14,0;67,7	2 semaines et moins
-	;	14,3**	0,2;62,4	40,3**	14,1;71,5	30,8**	12,1;55,8	45,8**	7,1;89,1	38,9**	2,4;90,3	6,5**	0,1;36,0	Plus de 2 semaines à 1 mois
38,2**	6,9;79,6	46,4**	8,9;87,5	-	;	14,1**	2,5;38,0	17,5**	0,2;70,6	-	;	48,1**	19,3;77,8	Plus d'un mois à 3 mois
11,0**	0,2;51,7	25,0**	1,2;75,2	24,7**	5,0;57,9	13,5**	2,8;34,8	-	;	-	;	7,2**	0,1;40,1	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
41,2**	4,0;89,1	51,7*	32,3;70,7	46,5**	13,2;82,4	14,7**	2,7;39,2	-	;	64,1*	35,7;86,6	37,9**	16,4;63,6	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
-	;	26,4**	12,0;45,8	43,0**	11,8;79,2	4,9**	0,1;25,0	-	;	5,2**	0,1;25,5	3,9**	0,1;21,3	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
40,2**	3,2;89,8	10,6**	2,6;26,2	-	;	4,9**	0,1;26,3	100,0	;	12,2**	1,2;39,5	28,6**	10,3;54,1	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	64,9*	39,0;85,7	-	;	-	;	-	;	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
18,6**	0,1;76,7	11,3**	2,6;28,7	10,5**	0,2;48,5	10,6**	1,1;34,7	-	;	18,5**	3,9;45,5	29,5**	11,6;53,8	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
19,7**	1,8;58,8	23,2**	8,4;45,2	48,1**	21,8;75,2	67,8	45,2;85,7	28,7**	3,0;73,6	59,8*	32,1;83,4	16,1**	3,2;41,3	2 semaines et moins
28,7**	5,2;66,2	32,4**	14,5;55,2	38,7**	14,8;67,5	20,5**	6,6;42,7	43,5**	8,4;84,6	27,7**	8,7;55,4	57,5*	30,6;81,4	Plus de 2 semaines à 1 mois
30,6**	6,3;67,4	17,1**	4,6;39,1	6,9**	0,2;32,1	11,6**	2,2;31,4	27,9**	2,9;72,3	12,6**	1,4;39,9	20,5**	4,2;49,8	Plus d'un mois à 3 mois
21,0**	2,4;59,0	27,3**	10,6;50,5	6,4**	0,1;33,2	-	;	-	;	-	;	6,0**	0,1;30,3	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
78,3	46,9;95,8	80,1	64,5;91,0	87,2	66,5;97,4	85,5	71,2;94,5	90,1	54,3;99,8	82,3	60,1;95,1	79,3	62,3;91,0	Oui, tout à fait
6,9**	0,2;33,7	14,9**	5,7;29,5	12,8**	2,6;33,5	11,4**	3,6;25,2	9,9**	0,2;45,7	9,1**	1,0;30,5	15,4**	5,3;32,2	Oui, en partie
14,8**	1,5;46,2	5,0**	0,4;18,6	-	;	3,1**	0,1;14,4	-	;	8,7**	1,0;28,3	5,3**	0,5;19,2	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]
-	;	7,2**	1,3;21,2	9,0**	1,2;28,6	2,1**	0,0;11,3	-	;	9,4**	1,0;31,0	6,2**	1,3;17,3	Oui
100,0	;	92,8	78,8;98,7	91,0	71,4;98,8	97,9	88,7;100,0	100,0	;	90,6	69,0;99,0	93,8	82,7;98,7	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	25,1	19,7;30,4	12,1**	2,5;31,6
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	21,9	16,8;27,0	14,8**	3,8;35,0
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	26,5	21,0;32,0	69,4	47,4;86,4
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	24,0	18,3;29,7	-	;
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	2,1**	0,7;5,1	3,7**	0,1;19,7
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	-	;	-	;
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	0,4**	0,0;2,1	-	;
Façon d'annoncer le diagnostic[p]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	90,1	86,0;93,3	100,0	;
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	9,9*	6,7;14,0	-	;
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	96,3	93,0;98,3	100,0	;
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	3,7**	1,7;7,0	-	;
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	96,8	93,7;98,7	100,0	;
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	3,2**	1,3;6,3	-	;
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	96,3	92,9;98,4	100,0	;
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	3,7**	1,6;7,1	-	;
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	61,7	55,0;68,4	63,7	42,8;81,5
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	38,3	31,6;45,0	36,3**	18,5;57,2
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	74,6	68,7;80,5	77,5	55,8;91,9
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	25,4	19,5;31,3	22,5**	8,1;44,2
Contact pour du soutien émotionnel[2, p]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	61,0	53,2;68,7	69,8	45,5;88,0
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	39,0	31,3;46,8	30,2**	12,0;54,5
Contact pour du soutien pratique[3, p]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	79,4	73,9;84,8	76,9	55,8;91,3
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	20,6	15,2;26,1	23,1**	8,7;44,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3. On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
-	;	28,9*	16,5;44,1	28,2**	12,2;49,7	39,3*	25,0;55,1	10,5**	0,2;47,6	26,9**	10,0;50,9	24,4**	12,0;41,0	Médecin de famille
6,7**	0,2;31,4	36,8*	22,9;52,6	39,2**	20,3;60,8	6,4**	1,4;17,4	10,9**	0,2;51,4	27,8**	10,7;51,5	24,6**	12,2;41,1	Médecin spécialiste du cancer
5,7**	0,1;31,5	9,8**	2,3;25,1	20,4**	6,3;43,1	45,8*	30,5;61,8	51,6**	17,7;84,5	4,0**	0,1;20,4	14,1**	6,0;26,6	Chirurgien
87,5	61,5;98,5	22,0**	10,9;37,1	8,1**	1,0;26,3	6,5**	1,3;18,0	26,9**	5,2;62,4	36,6**	16,2;61,4	34,9*	20,6;51,5	Autre médecin spécialiste
-	;	2,5**	0,1;12,3	4,1**	0,1;22,1	-	;	-	;	4,6**	0,1;23,4	2,0**	0,0;12,1	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	-	;	-	;	2,0**	0,1;10,6	-	;	-	;	-	;	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p]
100,0	;	86,1	72,1;94,8	100,0	;	80,7	67,3;90,4	81,4*	44,3;98,2	86,5	65,5;97,1	92,1	81,4;97,7	En personne
-	;	13,9**	5,2;27,9	-	;	19,3**	9,6;32,7	18,6**	1,8;55,7	13,5**	2,9;34,5	7,9**	2,3;18,6	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
85,5	54,4;98,5	97,2	83,5;100,0	95,9	77,5;99,9	95,3	83,4;99,5	100,0	;	100,0	;	95,6	84,7;99,5	Oui
14,5**	1,5;45,6	2,8**	0,0;16,5	4,1**	0,1;22,5	4,7**	0,5;16,6	-	;	-	;	4,4**	0,5;15,3	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
85,5	54,4;98,5	97,2	83,5;100,0	95,9	77,5;99,9	95,4	84,6;99,4	100,0	;	100,0	;	97,9	88,8;100,0	Oui
14,5**	1,5;45,6	2,8**	0,0;16,5	4,1**	0,1;22,5	4,6**	0,6;15,4	-	;	-	;	2,1**	0,0;11,2	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
91,9	58,4;99,9	94,3	79,7;99,4	91,9	72,7;99,1	97,8	87,7;100,0	100,0	;	95,4	77,1;99,9	97,9	88,8;100,0	Oui
8,1**	0,1;41,6	5,7**	0,6;20,3	8,1**	0,9;27,3	2,2**	0,0;12,3	-	;	4,6**	0,1;22,9	2,1**	0,0;11,2	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p]
28,8**	7,3;61,1	74,2	58,2;86,6	78,0	56,5;92,1	68,5	52,0;82,2	51,8**	18,6;83,8	56,9*	34,2;77,7	50,5*	34,6;66,4	Oui
71,2*	38,9;92,7	25,8**	13,4;41,8	22,0**	7,9;43,5	31,5*	17,8;48,0	48,2**	16,2;81,4	43,1*	22,3;65,8	49,5*	33,6;65,4	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]
73,7*	40,2;94,4	61,8	44,2;77,3	82,3	58,0;95,7	91,3	79,2;97,6	78,1*	36,1;98,1	54,7*	31,1;76,8	73,8	58,1;86,0	Oui
26,3**	5,6;59,8	38,2*	22,7;55,8	17,7**	4,3;42,0	8,7**	2,4;20,8	21,9**	1,9;63,9	45,3*	23,2;68,9	26,2**	14,0;41,9	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p]
35,3**	9,3;70,3	68,9	45,0;87,1	81,4	54,9;95,9	67,4	50,3;81,6	60,6**	19,6;92,5	37,1**	11,2;70,0	50,3*	29,3;71,2	Oui
64,7*	29,7;90,7	31,1**	12,9;55,0	18,6**	4,1;45,1	32,6*	18,4;49,7	39,4**	7,5;80,4	62,9*	30,0;88,8	49,7*	28,8;70,7	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p]
73,7*	40,0;94,4	83,3	68,2;93,1	87,6	66,3;97,7	83,2	69,3;92,5	100,0	;	76,8	54,3;91,8	68,7	52,2;82,4	Oui
26,3**	5,6;60,0	16,7**	6,9;31,8	12,4**	2,3;33,7	16,8**	7,5;30,7	-	;	23,2**	8,2;45,7	31,3*	17,6;47,8	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	7,7**	4,3;12,5	-	;
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	92,3	87,5;95,7	100,0	;
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	38,9	31,8;46,0	47,5*	24,0;71,8
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	61,1	54,0;68,2	52,5*	28,2;76,0
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	6,2**	3,2;10,5	-	;
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	93,8	89,5;96,8	100,0	;
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	2,9**	0,9;6,8	5,6**	0,2;26,2
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	97,1	93,2;99,1	94,4	73,8;99,8
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	10,3*	6,0;16,2	9,4**	1,1;30,7
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	89,7	83,8;94,0	90,6	69,3;98,9
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	5,8**	2,6;11,0	7,4**	0,2;34,7
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	94,2	89,0;97,4	92,6	65,3;99,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]
-	;	25,9**	11,2;45,9	5,3**	0,1;27,9	9,8**	2,7;23,2	-	;	8,1**	0,1;40,9	2,6**	0,0;14,2	Oui
100,0	;	74,1	54,1;88,8	94,7	72,1;99,9	90,2	76,8;97,3	100,0	;	91,9	59,1;99,9	97,4	85,8;100,0	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
35,3**	9,3;70,3	26,5**	9,8;50,3	75,9	50,2;92,6	50,8*	34,4;67,1	47,2**	11,4;85,4	13,6**	1,4;43,2	19,2**	7,4;37,1	Oui
64,7*	29,7;90,7	73,5	49,7;90,2	24,1**	7,4;49,8	49,2*	32,9;65,6	52,8**	14,6;88,6	86,4	56,8;98,6	80,8	62,9;92,6	Non
														Psychologue[p]
-	;	7,3**	0,8;25,0	16,2**	3,0;42,4	2,7**	0,1;13,7	21,9**	1,7;65,0	-	;	9,1**	1,7;25,1	Oui
100,0	;	92,7	75,0;99,2	83,8	57,6;97,0	97,3	86,3;99,9	78,1*	35,0;98,3	100,0	;	90,9	74,9;98,3	Non
														Travailleur social[p]
-	;	-	;	-	;	5,0**	0,6;17,3	12,1**	0,3;52,7	-	;	2,6**	0,0;14,2	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	95,0	82,7;99,4	87,9	47,3;99,7	100,0	;	97,4	85,8;100,0	Non
														Médecin[p]
10,2**	0,3;45,4	11,9**	2,0;33,6	-	;	4,5**	0,5;15,4	9,8**	0,1;52,8	14,0**	1,2;45,7	20,4**	7,4;40,4	Oui
89,8	54,6;99,7	88,1	66,4;98,0	100,0	;	95,5	84,6;99,5	90,2	47,2;99,9	86,0	54,3;98,8	79,6	59,6;92,6	Non
														Autre professionnel de la santé
-	;	4,6**	0,1;24,0	5,3**	0,1;27,9	6,8**	1,2;19,6	13,4**	0,2;60,0	8,0**	0,2;36,3	4,2**	0,1;23,3	Oui
100,0	;	95,4	76,0;99,9	94,7	72,1;99,9	93,2	80,4;98,8	86,6*	40,0;99,8	92,0	63,7;99,8	95,8	76,7;99,9	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	32,4	26,7;38,0	32,9**	16,1;53,6
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	67,6	62,0;73,3	67,1	46,4;83,9
Médecin spécialiste du cancer[p]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	33,5	27,8;39,1	21,9**	7,9;43,1
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	66,5	60,9;72,2	78,1	56,9;92,1
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	27,9	21,9;33,9	32,3**	14,6;54,7
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	72,1	66,1;78,1	67,7	45,3;85,4
Autre médecin spécialiste[p]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	17,9	13,2;23,5	15,7**	4,3;35,9
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	82,1	76,5;86,8	84,3	64,1;95,7
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	5,9**	3,1;10,0	-	;
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	94,1	90,0;96,9	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
26,1**	7,1;55,3	12,8**	4,8;25,8	75,3	53,4;90,6	44,3*	28,6;60,8	44,5**	14,3;78,2	29,1**	12,9;50,4	17,0**	7,2;31,6	Oui
73,9*	44,7;92,9	87,2	74,2;95,2	24,7**	9,4;46,6	55,7	39,2;71,4	55,5**	21,8;85,7	70,9	49,6;87,1	83,0	68,4;92,8	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p]
39,2**	13,6;70,0	42,0*	27,5;57,5	59,2*	37,2;78,8	29,7*	16,8;45,5	48,4**	15,0;82,8	26,2**	10,3;48,5	22,6**	11,7;37,1	Oui
60,8*	30,0;86,4	58,0	42,5;72,5	40,8*	21,2;62,8	70,3	54,5;83,2	51,6**	17,2;85,0	73,8	51,5;89,7	77,4	62,9;88,3	Non
														Médecin de famille[p]
19,8**	3,4;51,1	28,3*	15,5;44,2	33,0**	14,9;55,9	25,3**	12,4;42,4	33,7**	7,2;71,4	27,1**	10,7;49,9	26,9**	13,5;44,3	Oui
80,2	48,9;96,6	71,7	55,8;84,5	67,0	44,1;85,1	74,7	57,6;87,6	66,3*	28,6;92,8	72,9	50,1;89,3	73,1	55,7;86,5	Non
														Autre médecin spécialiste[p]
20,9**	3,4;53,9	16,2**	6,8;30,6	9,0**	0,9;30,7	23,6*	13,0;37,4	9,4**	0,2;44,5	18,1**	4,6;41,9	20,2**	8,9;36,5	Oui
79,1*	46,1;96,6	83,8	69,4;93,2	91,0	69,3;99,1	76,4	62,6;87,0	90,6	55,5;99,8	81,9	58,1;95,4	79,8	63,5;91,1	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
7,5**	0,1;39,4	-	;	-	;	15,1**	5,7;30,2	9,4**	0,2;44,5	9,4**	1,0;31,8	5,1**	0,4;19,3	Oui
92,5	60,6;99,9	100,0	;	100,0	;	84,9	69,8;94,3	90,6	55,5;99,8	90,6	68,2;99,0	94,9	80,7;99,6	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	82,8	76,6;87,9	80,7	59,7;93,7
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	11,1*	7,2;16,2	15,4**	4,1;35,6
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	6,2**	3,0;11,0	3,9**	0,1;20,5
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	73,3	67,3;79,3	76,1	54,2;91,1
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	12,7*	8,8;17,4	4,4**	0,1;21,4
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	14,0*	9,6;19,5	19,5**	6,4;40,6
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	87,3	80,6;92,3	95,3	73,2;99,9
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	7,2**	3,5;13,0	4,7**	0,1;26,8
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	5,5**	2,3;10,7	-	;
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	67,3	60,5;74,1	78,8	53,4;94,2
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	14,8*	10,2;20,5	5,4**	0,1;26,8
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	17,9*	12,5;24,5	15,8**	3,1;40,9
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	38,9	32,8;44,9	48,0*	26,8;69,7
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	21,3	15,8;27,8	18,6**	5,3;41,1
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	10,7*	6,9;15,6	4,0**	0,1;20,4
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	13,7*	9,1;19,6	17,0**	4,4;39,5
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	15,4*	10,7;21,0	12,4**	2,5;32,8
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	72,5	61,0;82,2	71,2**	23,1;97,7
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	20,1*	11,8;30,9	14,7**	0,2;65,5
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	7,3**	2,4;16,3	14,1**	0,1;67,9
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	19,6	14,4;25,7	7,8**	0,6;28,5
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	80,4	74,3;85,6	92,2	71,5;99,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
81,2	46,7;97,7	80,5	64,9;91,3	100,0	;	88,4	74,5;96,2	74,9*	31,7;97,5	82,9	62,1;95,1	73,6	56,5;86,8	Oui, tout à fait
6,1**	0,0;35,6	9,8**	3,0;22,3	-	;	11,6**	3,8;25,5	25,1**	2,5;68,3	12,5**	2,9;31,5	13,0**	4,6;27,1	Oui, en partie
12,6**	0,5;48,9	9,8**	2,3;24,7	-	;	-	;	-	;	4,6**	0,1;23,9	13,3**	4,2;29,2	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
72,0*	37,3;94,0	76,6	61,1;88,2	87,8	67,7;97,6	76,8	61,5;88,3	76,9*	35,6;97,7	87,3	65,9;97,6	52,2*	34,6;69,3	Oui, tout à fait
6,5**	0,1;37,3	11,1**	3,9;23,4	12,2**	2,4;32,3	16,5**	7,4;30,0	12,1**	0,1;57,0	8,8**	0,9;30,0	18,3**	8,3;32,8	Oui, en partie
21,5**	3,0;57,1	12,3**	3,9;27,1	-	;	6,6**	1,1;19,8	10,9**	0,2;51,4	3,9**	0,1;21,2	29,6**	15,6;47,0	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
70,7**	24,8;97,1	84,6	66,1;95,3	88,8	62,7;98,9	93,5	78,2;99,3	73,1*	30,7;96,8	90,3	51,4;99,9	83,5	61,8;95,6	Oui
13,2**	0,2;59,6	9,1**	1,6;25,9	11,2**	1,1;37,3	-	;	13,4**	0,2;60,7	9,7**	0,1;48,6	8,5**	0,7;30,5	Non, il ne voulait pas
16,1**	0,3;64,9	6,4**	0,6;22,8	-	;	6,5**	0,7;21,8	13,4**	0,4;55,0	-	;	8,0**	1,0;26,0	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
58,3**	19,3;90,6	64,9	46,4;80,6	72,7	46,3;90,9	76,6	60,1;88,8	47,4**	14,7;81,9	59,1*	32,1;82,5	62,0	44,0;77,8	Oui, tout à fait
11,5**	0,1;58,3	14,0**	4,9;28,9	10,8**	1,5;32,6	16,7**	7,0;31,5	29,6**	5,5;67,3	11,0**	1,2;35,9	18,8**	8,1;34,5	Oui, en partie
30,2**	4,7;71,1	21,1**	8,4;39,9	16,5**	3,2;42,5	6,6**	1,3;18,8	23,1**	2,3;64,4	29,9**	9,9;57,8	19,3**	7,8;36,4	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
46,9**	18,9;76,4	45,2*	28,9;62,3	74,4	52,2;90,1	37,2*	23,4;52,6	31,6**	5,0;72,7	27,3**	10,0;51,8	17,6**	7,5;32,6	Oui, une infirmière pivot en oncologie
33,3**	9,5;65,8	13,2**	4,9;26,9	16,9**	4,4;39,1	35,8*	21,8;51,7	41,5**	11,0;78,1	11,6**	1,4;36,3	14,0**	4,3;30,7	Oui, un autre professionnel de la santé
7,5**	0,1;37,8	12,0**	3,8;26,5	8,7**	1,2;27,4	4,0**	0,4;14,4	-	;	23,7**	7,9;47,6	17,8**	7,5;33,2	Oui, un membre du personnel administratif
12,3**	0,9;43,3	15,0**	5,5;30,4	-	;	15,0**	5,9;29,4	13,5**	0,2;60,5	13,6**	2,7;35,8	17,0**	6,2;33,9	Oui, un médecin
-	;	14,6**	5,5;29,4	-	;	8,0**	2,2;19,4	13,5**	0,3;56,5	23,8**	7,7;48,3	33,8*	18,5;52,0	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
70,3**	19,4;98,2	83,7	58,0;96,8	78,2*	38,5;97,7	68,9*	39,7;90,0	80,8*	25,0;99,8	49,8**	9,1;90,7	68,3*	36,1;91,2	Oui, tout à fait
29,7**	1,8;80,6	10,5**	1,4;32,6	10,9**	0,1;52,0	31,1**	10,0;60,3	19,2**	0,2;75,0	31,9**	2,2;82,2	18,8**	2,3;53,5	Oui, en partie
-	;	5,8**	0,1;31,9	10,9**	0,2;48,5	-	;	-	;	18,3**	0,4;68,9	12,9**	1,0;43,9	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]
21,2**	3,8;53,2	35,0*	19,8;52,9	17,4**	4,6;40,0	14,4**	5,8;28,0	-	;	35,0**	16,6;57,4	13,9**	5,0;28,5	Oui
78,8	46,8;96,2	65,0	47,1;80,2	82,6	60,0;95,4	85,6	72,0;94,2	100,0	;	65,0*	42,6;83,4	86,1	71,5;95,0	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	81,5	77,5;85,1	92,8	74,2;99,4
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	18,5	14,9;22,5	7,2**	0,6;25,8
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	25,6	19,4;32,6	3,9**	0,1;21,0
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	74,4	67,4;80,6	96,1	79,0;99,9
Lieu de la chirurgie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	56,4	49,2;63,6	79,6	57,1;93,6
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	43,6	36,4;50,8	20,4**	6,4;42,9
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	71,4	62,4;79,3	65,9*	31,8;90,9
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	8,2**	4,1;14,4	-	;
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	20,4*	13,2;29,3	34,1**	9,1;68,2
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	72,1	64,8;78,6	80,1	59,0;93,3
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	12,6*	7,7;19,0	3,7**	0,1;19,1
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	15,4*	10,3;21,7	16,2**	4,8;35,9
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	97,3	92,7;99,4	100,0	;
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	2,7**	0,6;7,3	-	;
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	90,9	85,5;94,7	100,0	;
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	8,0**	4,3;13,3	-	;
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	1,2**	0,2;3,9	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région															
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients	
														Patient a subi une chirurgie[p, r]	
93,5	68,4;99,8	59,2	47,8;70,6	34,0**	15,2;57,4	95,5	83,7;99,5	89,1	48,6;99,8	83,8	63,7;95,4	95,7	85,7;99,5	Oui	
6,5**	0,2;31,6	40,8	29,4;52,2	66,0*	42,6;84,8	4,5**	0,5;16,3	10,9**	0,2;51,4	16,2**	4,6;36,3	4,3**	0,5;14,3	Non	
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]	
-	;	7,0**	0,6;25,9	71,4*	29,8;96,1	51,3	36,0;66,5	25,6**	2,4;70,0	-	;	33,8**	17,9;53,0	Oui	
100,0	;	93,0	74,1;99,4	28,6**	3,9;70,2	48,7*	33,5;64,0	74,4*	30,0;97,6	100,0	;	66,2	47,0;82,1	Non	
														Lieu de la chirurgie[p, r]	
39,4**	14,7;68,9	24,9**	8,0;50,5	88,1	44,7;99,8	84,4	70,3;93,5	47,6**	15,1;81,7	37,2**	15,1;64,0	43,4*	26,6;61,3	Hôpital de la région de résidence	
60,6*	31,1;85,3	75,1	49,5;92,0	11,9**	0,2;55,3	15,6**	6,5;29,7	52,4**	18,3;84,9	62,8*	36,0;84,9	56,6	38,7;73,4	Hôpital d'une autre région	
														Problèmes de déplacement pris en compte	
72,9*	28,0;97,4	57,2*	32,4;79,7	100,0	;	79,5	60,3;92,2	39,1**	5,7;83,4	93,4	67,3;99,9	68,3	48,5;84,1	Oui, tout à fait	
-	;	18,4**	4,9;41,7	-	;	9,8**	2,1;25,7	43,3**	7,4;85,9	-	;	3,0**	0,1;15,6	Oui, en partie	
27,1**	2,6;72,0	24,3**	7,5;50,3	-	;	10,7**	2,1;29,0	17,6**	0,4;66,5	6,6**	0,1;32,7	28,7**	12,9;49,5	Non	
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]	
68,1*	36,0;91,0	71,9	46,8;89,7	88,1	44,7;99,8	70,7	54,4;83,9	82,5*	28,6;99,8	83,9	58,8;96,8	60,2	42,1;76,4	Oui, tout à fait	
12,2**	1,1;41,1	20,2**	5,1;46,3	11,9**	0,2;55,3	4,4**	0,5;15,1	-	;	10,8**	1,1;35,8	24,5**	11,0;43,1	Oui, en partie	
19,7**	2,7;54,0	7,9**	0,7;28,2	-	;	24,9**	12,4;41,5	17,5**	0,2;71,4	5,3**	0,1;27,7	15,3**	5,2;32,0	Non	
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]	
87,4	51,3;99,5	92,1	71,8;99,3	100,0	;	97,0	86,1;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui	
12,6**	0,5;48,7	7,9**	0,7;28,2	-	;	3,0**	0,1;13,9	-	;	-	;	-	;	Non	
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie	
100,0	;	86,8	64,8;97,5	83,3*	39,8;99,3	84,3	70,2;93,5	84,7*	33,5;99,8	100,0	;	89,6	75,1;97,2	Oui, tout à fait	
-	;	8,4**	0,8;29,6	16,7**	0,7;60,2	15,7**	6,5;29,8	15,3**	0,2;66,5	-	;	7,9**	1,5;22,0	Oui, en partie	
-	;	4,8**	0,1;23,9	-	;	-	;	-	;	-	;	2,5**	0,1;13,1	Non	

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	43,5	39,0;48,0	59,8*	39,6;77,7
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	56,5	52,0;61,0	40,2*	22,3;60,4
Lieu de la chimiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	78,5	68,3;86,6	81,1	54,0;95,9
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	21,5*	13,4;31,7	18,9**	4,1;46,0
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	62,1	51,7;72,5	63,7*	32,7;88,0
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	16,7*	9,5;26,2	14,6**	1,4;46,5
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	21,2*	13,0;31,6	21,7**	4,4;52,3
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	75,8	61,8;86,8	81,1*	39,8;98,7
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	6,7**	1,6;17,2	-	;
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	17,4**	8,5;30,1	18,9**	1,3;60,2
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	64,1	54,1;74,1	66,2*	34,5;89,9
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	24,8*	16,1;35,3	33,8**	10,1;65,5
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	11,1**	5,6;19,2	-	;
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	93,6	86,4;97,7	100,0	;
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	4,2**	1,2;10,6	-	;
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	2,1**	0,2;8,0	-	;
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	94,5	87,5;98,2	100,0	;
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	5,5**	1,8;12,5	-	;
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	-	;	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
30,8**	10,1;59,4	4,5**	0,5;15,7	100,0	;	65,8	50,7;78,9	40,5**	11,6;75,3	41,2**	21,3;63,5	23,9**	12,3;39,2	Oui
69,2*	40,6;89,9	95,5	84,3;99,5	-	;	34,2*	21,1;49,3	59,5**	24,7;88,4	58,8*	36,5;78,7	76,1	60,8;87,7	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p]
60,1**	10,7;96,7	-	;	74,8	50,7;91,2	86,8	68,2;96,7	24,2**	0,2;85,6	90,7	51,6;99,9	75,1*	27,1;98,4	Hôpital de la région de résidence
39,9**	3,3;89,3	-	;	25,2**	8,8;49,3	13,2**	3,3;31,8	75,8**	14,4;99,8	9,3**	0,1;48,4	24,9**	1,6;72,9	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
62,6**	10,2;97,9	-	;	56,9*	31,8;79,6	76,1	56,6;89,9	24,2**	0,1;87,1	51,3**	17,4;84,3	52,8**	14,7;88,5	Moins de 30 minutes
-	;	-	;	15,4**	2,8;41,0	17,3**	5,9;35,9	-	;	29,1**	5,3;67,1	23,7**	1,9;68,2	De 30 à 60 minutes
37,4**	2,1;89,8	-	;	27,7**	9,3;54,2	6,6**	0,8;22,2	75,8**	12,9;99,9	19,6**	1,8;58,7	23,5**	2,2;66,2	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
100,0	;	-	;	74,0*	38,5;95,2	69,9*	42,3;89,8	48,8**	3,6;95,8	68,3**	19,1;97,5	100,0	;	Oui, tout à fait
-	;	-	;	17,4**	1,9;51,6	5,7**	0,1;30,0	24,2**	0,1;87,1	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	8,6**	0,1;42,7	24,3**	7,3;50,6	27,1**	0,3;88,2	31,7**	2,5;80,9	-	;	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
81,3*	24,2;99,8	-	;	44,7**	20,9;70,5	63,7	43,6;80,9	51,7**	4,1;96,8	90,7	55,6;99,8	63,6**	20,6;94,3	Moins de 30 minutes
-	;	-	;	38,8**	15,9;65,9	18,5**	6,1;38,6	48,3**	3,2;95,9	-	;	36,4**	5,7;79,4	De 30 à 60 minutes
18,7**	0,2;75,8	-	;	16,5**	3,2;42,7	17,7**	5,8;37,2	-	;	9,3**	0,2;44,4	-	;	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
81,3*	24,2;99,8	-	;	89,7	64,4;99,1	93,4	77,3;99,3	75,8**	14,4;99,8	100,0	;	100,0	;	Oui, tout à fait
18,7**	0,2;75,8	-	;	10,3**	0,9;35,6	-	;	24,2**	0,2;85,6	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	6,6**	0,7;22,7	-	;	-	;	-	;	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
100,0	;	-	;	95,0	71,2;99,9	100,0	;	75,8**	14,4;99,8	69,8*	30,9;94,7	100,0	;	Oui, tout à fait
-	;	-	;	5,0**	0,1;28,8	-	;	24,2**	0,2;85,6	30,2**	5,3;69,1	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	40,0	35,4;44,5	30,0**	14,2;50,3
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	60,0	55,5;64,6	70,0	49,7;85,8
Lieu de la radiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	11,6**	5,6;20,6	-	;
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	88,4	79,4;94,4	100,0	;
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	30,4*	21,1;39,8	37,5**	2,9;87,6
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	11,7**	5,9;20,3	-	;
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	57,8	47,2;68,5	62,5**	12,4;97,1
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	73,8	62,3;83,4	100,0	;
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	10,7**	4,9;19,7	-	;
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	15,5**	8,2;25,6	-	;
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	83,0	73,8;90,0	100,0	;
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	6,7**	2,8;13,2	-	;
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	10,2**	4,8;18,6	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
47,5**	20,7;75,4	51,4	38,9;63,9	21,3**	7,4;42,6	66,7	51,4;79,9	77,4*	36,2;97,8	28,6**	11,7;51,4	15,6**	7,1;28,1	Oui
52,5**	24,6;79,3	48,6	36,1;61,1	78,7	57,4;92,6	33,3*	20,1;48,6	22,6**	2,2;63,8	71,4	48,6;88,3	84,4	71,9;92,9	Non
														Lieu de la radiothérapie[p]
12,1**	0,2;54,8	17,9**	3,8;44,1	-	;	-	;	28,3**	3,3;71,6	45,1**	9,2;85,6	12,9**	0,2;58,0	Hôpital de la région de résidence
87,9	45,2;99,8	82,1	55,9;96,2	100,0	;	100,0	;	71,7*	28,4;96,7	54,9**	14,4;90,8	87,1	42,0;99,8	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
75,9*	32,9;97,7	22,8**	9,1;42,8	24,9**	0,2;86,1	20,6**	7,8;39,9	24,8**	2,3;68,6	49,2**	7,8;91,5	29,5**	2,8;76,1	Moins de 30 minutes
-	;	9,3**	0,9;31,8	49,8**	3,8;96,1	4,5**	0,1;22,0	25,6**	2,7;68,5	17,7**	0,2;72,7	30,3**	2,7;77,8	De 30 à 60 minutes
24,1**	2,3;67,1	67,8	44,5;86,0	25,3**	0,3;85,8	74,9	54,8;89,4	49,6**	12,4;87,1	33,1**	2,4;83,5	40,2**	6,4;83,6	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
81,4*	27,8;99,7	78,6	54,0;93,8	50,3**	0,8;99,3	74,2	53,1;89,3	60,3**	19,5;92,3	73,8**	11,4;99,8	60,8**	21,5;91,6	Oui, tout à fait
-	;	9,9**	1,3;31,3	49,7**	0,7;99,2	13,6**	3,5;32,2	9,9**	0,1;51,7	-	;	12,2**	0,2;53,8	Oui, en partie
18,6**	0,3;72,2	11,5**	1,3;36,6	-	;	12,2**	2,9;30,6	29,8**	3,5;74,1	26,2**	0,2;88,6	27,0**	2,7;71,6	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
74,3*	28,5;97,9	84,5	64,7;95,7	100,0	;	89,3	71,2;97,9	90,1	48,3;99,9	32,4**	2,1;83,5	73,3*	29,7;97,2	Oui, tout à fait
12,0**	0,1;62,5	11,8**	2,5;30,8	-	;	3,1**	0,1;16,3	9,9**	0,1;51,7	17,7**	0,2;72,7	-	;	Oui, en partie
13,7**	0,3;58,5	3,7**	0,1;19,5	-	;	7,5**	0,9;25,3	-	;	49,9**	8,1;91,8	26,7**	2,8;70,3	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Douleur et malaises ressentis[p]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	64,8	58,4;71,2	74,2	47,8;91,9
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	35,2	28,8;41,6	25,8**	8,1;52,2
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	28,8	21,3;37,3	38,2**	15,2;66,0
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	38,3	30,1;46,6	56,0*	28,4;81,1
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	32,8	24,4;41,3	5,8**	0,1;29,5
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	84,2	77,0;89,9	77,7	53,1;93,2
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	12,9*	7,7;19,8	22,3**	6,8;46,9
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	2,9**	0,8;7,3	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p]
54,4**	25,0;81,8	52,7*	35,2;69,7	79,6	57,4;93,4	71,1	53,8;84,8	78,1*	38,9;97,6	71,2*	45,3;89,7	52,8	37,6;67,7	Oui
45,6**	18,2;75,0	47,3*	30,3;64,8	20,4**	6,6;42,6	28,9**	15,2;46,2	21,9**	2,4;61,1	28,8**	10,3;54,7	47,2*	32,3;62,4	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
37,4**	7,3;77,8	17,2**	3,7;42,7	25,3**	8,1;51,3	19,7**	6,9;39,5	47,2**	13,1;83,5	39,1**	15,6;67,2	30,1**	12,5;53,3	Sévères
24,2**	3,0;63,9	28,5**	10,1;54,3	46,1**	22,8;70,8	48,3*	28,2;68,9	39,4**	7,4;80,6	36,3**	13,6;64,6	20,4**	6,6;42,4	Modérés
38,4**	7,5;78,9	54,3*	27,6;79,4	28,5**	9,2;56,2	32,0**	14,6;54,0	13,4**	0,3;57,4	24,6**	6,6;53,0	49,5*	28,0;71,1	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
100,0	;	93,9	67,5;99,9	88,3	61,7;98,8	84,3	66,6;94,9	100,0	;	76,8	47,9;94,2	72,3	48,3;89,5	Oui, tout à fait
-	;	-	;	11,7**	1,2;38,3	15,7**	5,1;33,4	-	;	23,2**	5,8;52,1	14,3**	2,7;38,2	Oui, en partie
-	;	6,1**	0,1;32,5	-	;	-	;	-	;	-	;	13,4**	2,8;34,3	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	92,3	87,0;95,9	100,0	;
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	3,8**	1,4;8,2	-	;
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	4,0**	1,4;8,6	-	;
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p, r]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	10,0*	6,3;14,8	8,5**	1,0;27,6
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	90,0	85,2;93,7	91,5	72,4;99,0
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	72,5	66,5;78,5	72,2	50,7;88,2
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	26,0	20,1;31,9	23,9**	9,4;44,9
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	1,5**	0,3;4,5	3,9**	0,1;20,5
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	59,1	52,8;65,4	56,7*	34,7;77,0
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	40,9	34,6;47,2	43,3*	23,0;65,3
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	49,3	42,4;56,1	50,9*	30,5;71,2
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	15,2*	10,5;21,0	3,6**	0,1;18,5
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	35,5	28,9;42,2	45,5*	25,9;66,2
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	80,1	72,9;86,0	91,5	73,4;98,8
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	16,3*	10,9;23,0	8,5**	1,2;26,6
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	3,6**	1,3;7,8	-	;
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	72,0	64,1;79,0	71,4*	44,8;90,3
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	28,0	21,0;35,9	28,6**	9,7;55,2
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	89,3	84,1;93,3	83,4	59,9;96,1
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	8,8*	5,1;13,9	12,4**	2,3;33,8
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	1,9**	0,5;4,7	4,2**	0,1;22,0

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
100,0	;	87,2	64,8;97,7	100,0	;	89,5	75,3;97,0	84,3*	32,7;99,8	100,0	;	86,8	69,5;96,3	Oui, tout à fait
-	;	4,1**	0,1;22,0	-	;	7,4**	1,4;21,1	15,7**	0,2;67,3	-	;	3,0**	0,1;15,8	Oui, en partie
-	;	8,7**	0,7;31,4	-	;	3,1**	0,1;14,7	-	;	-	;	10,2**	2,2;26,7	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p, r]
7,9**	0,1;40,4	10,2**	2,5;25,6	16,2**	4,2;37,8	2,0**	0,0;12,2	55,4**	18,1;88,5	4,3**	0,1;21,8	11,7**	4,1;24,5	Oui
92,1	59,6;99,9	89,8	74,4;97,5	83,8	62,2;95,8	98,0	87,8;100,0	44,6**	11,5;81,9	95,7	78,2;99,9	88,3	75,5;95,9	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
87,5	51,5;99,5	77,7	61,0;89,7	58,1*	35,9;78,1	75,2	58,8;87,6	65,8**	24,5;94,2	63,2*	39,0;83,4	74,2	56,5;87,5	Oui, toujours
12,5**	0,5;48,5	19,4**	8,5;35,2	41,9*	21,9;64,1	24,8**	12,4;41,2	34,2**	5,8;75,5	36,8**	16,6;61,0	22,8**	10,1;40,6	Oui, la plupart du temps
-	;	3,0**	0,0;17,3	-	;	-	;	-	;	-	;	2,9**	0,1;16,1	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
36,6**	13,8;65,0	62,9	44,7;78,7	87,7	66,3;97,8	86,1	71,8;94,8	38,5**	9,9;74,9	46,7*	24,2;70,2	33,6*	20,2;49,4	Oui
63,4*	35,0;86,2	37,1*	21,3;55,3	12,3**	2,2;33,7	13,9**	5,2;28,2	61,5**	25,1;90,1	53,3*	29,8;75,8	66,4	50,6;79,8	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]
25,2**	6,4;55,0	49,9*	31,6;68,1	62,3*	40,2;81,1	83,6	67,0;94,0	29,2**	5,8;65,8	31,1**	12,7;55,3	29,7**	15,8;47,0	Oui
18,4**	3,2;48,0	15,4**	5,3;32,0	12,5**	2,3;34,0	2,4**	0,0;14,2	10,9**	0,2;51,4	26,0**	10,1;48,5	30,0*	16,3;46,9	Non, mais il aurait aimé l'être
56,4**	26,5;83,2	34,8*	19,6;52,5	25,3**	10,0;46,9	14,0**	4,6;30,0	59,9**	24,1;89,1	42,9**	21,6;66,3	40,3*	25,0;57,0	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
67,1**	21,4;96,3	82,4	64,1;93,8	74,1	48,4;91,4	81,7	64,3;93,0	75,0*	30,3;97,8	75,8*	45,2;94,3	77,8	58,9;90,8	Oui, tout à fait
32,9**	3,7;78,6	17,6**	6,2;35,9	21,2**	5,1;48,6	15,4**	5,5;31,5	25,0**	2,2;69,7	24,2**	5,7;54,8	9,2**	1,8;25,0	Oui, en partie
-	;	-	;	4,8**	0,1;24,8	2,9**	0,0;16,5	-	;	-	;	13,0**	3,3;31,5	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
64,2**	20,7;94,7	70,7*	44,2;89,8	78,5	53,0;94,0	74,5	56,6;87,9	76,6*	34,6;97,7	62,8*	30,9;88,1	71,9	53,0;86,5	Oui
35,8**	5,3;79,3	29,3**	10,2;55,8	21,5**	6,0;47,0	25,5**	12,1;43,4	23,4**	2,3;65,4	37,2**	11,9;69,1	28,1**	13,5;47,0	Non
														Patient traité de manière respectueuse
100,0	;	89,0	73,8;97,1	96,0	79,4;99,9	98,0	88,9;100,0	78,1*	36,1;98,1	86,0	63,1;97,3	80,1	64,7;90,9	Oui, toujours
-	;	8,0**	1,4;23,4	4,0**	0,1;20,6	2,0**	0,0;11,1	21,9**	1,9;63,9	14,0**	2,7;36,9	15,0**	5,6;30,3	Oui, la plupart du temps
-	;	2,9**	0,1;14,1	-	;	-	;	-	;	-	;	4,9**	0,6;16,1	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	3,4**	1,3;7,3	4,1**	0,1;22,6
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	3,3**	1,3;7,0	4,7**	0,1;25,6
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	2,4**	0,7;5,6	-	;
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	90,9	85,9;94,5	91,3	69,5;99,2
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	72,3	65,3;78,6	62,4*	39,6;81,7
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	20,8	15,0;27,6	25,9**	10,0;48,6
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	6,9**	3,7;11,4	11,7**	2,3;31,0
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	89,8	84,9;93,6	87,9	68,5;97,4
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	8,4*	4,9;13,3	8,1**	1,0;26,1
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	1,7**	0,5;4,5	4,0**	0,1;21,4
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	71,7	61,3;80,6	86,7	59,0;98,5
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	28,3*	19,4;38,7	13,3**	1,5;41,0
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	3,8**	1,7;7,2	-	;
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	96,2	92,8;98,3	100,0	;
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	85,0	78,7;90,1	83,6	57,7;96,9
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	6,0**	3,1;10,5	5,8**	0,2;27,8
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	8,9**	5,0;14,5	10,5**	1,1;34,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
-	;	3,1**	0,1;15,3	10,1**	1,4;30,6	2,5**	0,1;13,3	-	;	-	;	4,7**	0,2;21,6	Oui, souvent
-	;	3,1**	0,1;14,7	8,6**	0,9;29,5	-	;	-	;	5,3**	0,1;28,3	4,7**	0,5;17,1	Oui, parfois
-	;	-	;	5,2**	0,1;27,5	2,1**	0,0;11,7	-	;	4,8**	0,1;26,1	4,6**	0,5;16,0	Oui, une seule fois
100,0	;	93,9	80,1;99,2	76,1	53,5;91,4	95,4	84,0;99,5	100,0	;	89,8	66,7;98,9	86,1	69,3;95,7	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
67,6*	34,9;91,0	85,6	68,4;95,5	70,3	47,7;87,4	69,7	53,1;83,2	64,6**	26,3;92,4	74,6	48,7;91,9	74,0	54,8;88,2	Oui, toujours
13,7**	1,2;45,0	8,2**	1,5;23,3	25,4**	9,5;48,3	26,3**	13,3;43,3	35,4**	7,6;73,7	25,4**	8,1;51,3	16,7**	5,9;34,2	Oui, la plupart du temps
18,7**	2,6;51,8	6,3**	0,6;22,1	4,2**	0,1;21,5	4,0**	0,5;13,3	-	;	-	;	9,3**	1,8;25,9	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
81,3	47,4;97,6	100,0	;	87,4	68,0;97,2	94,0	82,8;98,8	100,0	;	79,3	55,1;94,1	86,3	70,9;95,4	Oui, toujours
18,7**	2,4;52,6	-	;	8,4**	1,1;27,0	4,0**	0,5;14,0	-	;	20,7**	5,9;44,9	11,4**	3,1;27,1	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	4,2**	0,1;21,2	2,0**	0,0;10,8	-	;	-	;	2,3**	0,1;12,2	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]
45,1**	0,5;98,8	62,7*	31,2;87,8	88,6	47,6;99,8	73,9*	41,6;94,0	71,1**	11,9;99,5	61,8**	27,5;89,1	67,6	46,6;84,5	Oui
54,9**	1,2;99,5	37,3**	12,2;68,8	11,4**	0,2;52,4	26,1**	6,0;58,4	28,9**	0,5;88,1	38,2**	10,9;72,5	32,4**	15,5;53,4	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
-	;	6,9**	1,3;19,5	4,0**	0,1;20,6	2,0**	0,0;11,3	-	;	4,5**	0,1;22,5	7,1**	1,2;21,2	Oui
100,0	;	93,1	80,5;98,7	96,0	79,4;99,9	98,0	88,7;100,0	100,0	;	95,5	77,5;99,9	92,9	78,8;98,8	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
100,0	;	89,8	70,0;98,4	89,4	66,4;98,7	86,7	68,9;96,4	41,8**	10,9;78,6	88,6	61,6;99,0	81,8	62,8;93,7	Oui, tout à fait
-	;	6,3**	0,6;22,5	10,6**	1,3;33,6	5,6**	0,7;18,8	21,6**	1,9;63,2	-	;	5,6**	0,5;20,5	Oui, en partie
-	;	4,0**	0,0;22,9	-	;	7,7**	1,0;24,9	36,6**	7,0;76,8	11,4**	1,0;38,4	12,6**	3,2;30,4	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	86,0	80,3;90,6	91,1	72,5;98,8
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	14,0*	9,4;19,7	8,9**	1,2;27,5
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	15,3*	10,5;21,2	8,5**	1,0;28,0
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	84,7	78,8;89,5	91,5	72,0;99,0
Médecin spécialiste[p]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	8,2*	4,9;12,8	9,5**	1,1;30,9
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	91,8	87,2;95,1	90,5	69,1;98,9
Infirmière pivot en oncologie[p]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	34,4	28,8;40,0	36,4**	17,6;58,7
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	65,6	60,0;71,2	63,6*	41,3;82,4
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	7,0**	3,8;11,6	8,3**	0,7;29,5
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	93,0	88,4;96,2	91,7	70,5;99,3
CLSC[p]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	17,9*	12,8;24,1	23,3**	7,4;47,9
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	82,1	75,9;87,2	76,7	52,1;92,6
Urgence d'un hôpital[p]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	29,4	23,3;35,6	29,1**	12,5;51,3
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	70,6	64,4;76,7	70,9	48,7;87,5
Unité de soins d'un hôpital[p]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	13,8*	9,4;19,2	8,0**	0,9;26,8
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	86,2	80,8;90,6	92,0	73,2;99,1
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	4,4**	2,0;8,3	9,1**	1,1;29,0
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	95,6	91,7;98,0	90,9	71,0;98,9
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	0,5**	0,0;2,8	-	;
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	99,5	97,2;100,0	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]
71,3*	35,3;94,2	81,7	65,3;92,5	100,0	;	85,5	70,6;94,7	100,0	;	83,5	57,5;96,8	82,8	66,1;93,5	Oui
28,7**	5,8;64,7	18,3**	7,5;34,7	-	;	14,5**	5,3;29,4	-	;	16,5**	3,2;42,5	17,2**	6,5;33,9	Non
														Médecin de famille[p]
-	;	30,5**	16,0;48,5	21,2**	6,1;45,9	6,8**	1,3;19,4	13,4**	0,3;57,3	4,8**	0,1;25,3	22,9**	10,6;39,8	Oui
100,0	;	69,5	51,5;84,0	78,8	54,1;93,9	93,2	80,6;98,7	86,6	42,7;99,7	95,2	74,7;99,9	77,1	60,2;89,4	Non
														Médecin spécialiste[p]
8,7**	0,1;43,1	12,1**	3,9;26,4	12,9**	2,5;34,6	2,1**	0,0;12,0	31,4**	4,9;72,7	-	;	7,4**	1,5;20,4	Oui
91,3	56,9;99,9	87,9	73,6;96,1	87,1	65,4;97,5	97,9	88,0;100,0	68,6**	27,3;95,1	100,0	;	92,6	79,6;98,5	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p]
24,5**	4,8;58,2	20,1**	9,7;34,5	57,3*	35,5;77,2	42,9*	27,9;58,9	49,6**	15,8;83,6	36,4**	16,1;61,0	22,9**	11,1;38,9	Oui
75,5*	41,8;95,2	79,9	65,5;90,3	42,7*	22,8;64,5	57,1	41,1;72,1	50,4**	16,4;84,2	63,6*	39,0;83,9	77,1	61,1;88,9	Non
														Info-Santé[p]
-	;	2,2**	0,0;12,7	8,5**	1,2;26,1	17,8**	7,3;33,5	-	;	-	;	5,0**	0,5;18,4	Oui
100,0	;	97,8	87,3;100,0	91,5	73,9;98,8	82,2	66,5;92,7	100,0	;	100,0	;	95,0	81,6;99,5	Non
														CLSC[p]
7,1**	0,1;37,7	24,0**	11,5;41,0	20,9**	6,9;42,9	15,9**	6,7;29,8	-	;	18,5**	3,5;47,0	17,4**	6,7;34,1	Oui
92,9	62,3;99,9	76,0	59,0;88,5	79,1	57,1;93,1	84,1	70,2;93,3	100,0	;	81,5	53,0;96,5	82,6	65,9;93,3	Non
														Urgence d'un hôpital[p]
15,2**	1,6;46,7	14,9**	5,5;30,2	59,1*	36,2;79,4	31,5*	18,7;46,8	25,0**	2,8;66,8	37,5**	15,8;63,7	24,9**	12,6;41,1	Oui
84,8	53,3;98,4	85,1	69,8;94,5	40,9**	20,6;63,8	68,5	53,2;81,3	75,0*	33,2;97,2	62,5*	36,3;84,2	75,1	58,9;87,4	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p]
7,1**	0,1;35,7	10,8**	3,1;25,4	8,6**	1,0;28,1	22,8**	11,6;37,9	21,9**	1,7;65,4	5,5**	0,1;28,7	16,7**	6,7;31,9	Oui
92,9	64,3;99,9	89,2	74,6;96,9	91,4	71,9;99,0	77,2	62,1;88,4	78,1*	34,6;98,3	94,5	71,3;99,9	83,3	68,1;93,3	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
8,7**	0,1;45,2	-	;	-	;	11,1**	3,4;24,8	-	;	-	;	2,1**	0,0;11,6	Oui
91,3	54,8;99,9	100,0	;	100,0	;	88,9	75,2;96,6	100,0	;	100,0	;	97,9	88,4;100,0	Non
														Autre contact
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	5,6**	0,2;27,3	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	94,4	72,7;99,8	100,0	;	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	68,4	61,3;75,4	64,7*	42,1;83,3
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	10,4*	6,1;16,3	8,7**	0,9;29,2
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	21,2*	15,1;28,5	26,6**	10,2;49,8
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	58,7	51,4;65,9	52,1*	28,6;75,0
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	11,9*	7,3;17,8	10,9**	1,3;34,4
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	29,4	22,9;36,6	37,0**	16,8;61,2
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	52,3	45,4;59,2	55,0*	32,4;76,1
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	21,6*	15,5;28,7	9,4**	1,2;29,5
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	26,1	19,8;33,3	35,6**	16,2;59,3
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	58,5	50,7;66,4	76,2	47,9;93,8
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	12,0*	7,3;18,3	12,4**	1,1;41,9
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	29,4	22,2;37,5	11,3**	1,2;37,2
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	66,7	60,2;73,2	68,5	48,3;84,7
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	13,0*	8,5;18,8	12,6**	2,8;32,1
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	20,2	14,6;26,9	18,9**	6,1;39,7
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	63,6	56,5;70,6	72,8	48,9;89,9
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	16,8*	11,4;23,5	11,3**	1,5;34,6
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	19,7*	13,8;26,7	15,8**	3,3;40,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
54,6**	18,9;87,0	79,9	61,0;92,4	75,7	51,0;92,0	84,9	69,0;94,6	75,5*	31,5;97,8	48,0**	21,6;75,3	42,2*	21,7;64,9	Oui, tout à fait
-	;	7,0**	0,9;22,9	19,6**	5,2;44,3	6,7**	0,8;22,1	24,5**	2,2;68,5	18,9**	3,1;49,8	7,6**	0,9;25,0	Oui, en partie
45,4**	13,0;81,1	13,0**	3,4;30,9	4,7**	0,1;26,4	8,4**	1,8;22,5	-	;	33,1**	11,6;61,4	50,2*	27,6;72,8	Non
														La sexualité[p]
45,1**	17,1;75,7	78,0	60,9;90,1	67,4*	40,9;87,6	56,7	39,4;72,9	59,3**	15,1;94,0	54,3**	24,0;82,4	42,3*	22,8;63,7	Oui, tout à fait
26,8**	5,3;62,2	14,4**	5,0;30,0	10,9**	1,0;36,6	7,8**	1,5;21,9	-	;	6,9**	0,1;37,6	15,1**	4,1;34,7	Oui, en partie
28,0**	5,0;65,5	7,6**	1,4;21,6	21,7**	6,0;47,3	35,5*	20,6;52,8	40,7**	6,0;84,9	38,8**	13,7;69,3	42,7*	22,6;64,7	Non
														Les émotions[p]
38,5**	5,5;82,9	46,6*	29,0;65,0	66,4*	42,6;85,4	59,3	42,3;74,8	47,5**	10,9;86,4	54,4*	27,5;79,5	39,2*	20,9;60,1	Oui, tout à fait
46,9**	8,6;88,4	33,0**	17,0;52,5	24,2**	7,9;48,8	20,4**	8,6;37,7	24,5**	2,4;67,4	21,1**	4,2;51,5	11,0**	2,3;29,0	Oui, en partie
14,6**	0,3;60,4	20,4**	8,3;38,3	9,3**	1,1;30,1	20,3**	9,1;36,2	28,0**	2,8;73,0	24,6**	5,4;56,2	49,7*	29,6;69,9	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
41,5**	10,0;79,3	69,4	49,8;84,9	58,3*	33,4;80,5	60,8	42,0;77,5	41,5**	3,2;91,0	63,8*	33,0;87,9	36,7**	18,0;58,8	Oui, tout à fait
23,9**	2,5;65,9	16,2**	5,8;32,9	22,5**	6,2;48,9	8,5**	1,8;22,8	-	;	-	;	8,3**	0,9;27,5	Oui, en partie
34,6**	7,4;72,6	14,5**	4,4;31,8	19,2**	5,6;41,9	30,7**	15,3;50,1	58,5**	9,0;96,8	36,2**	12,1;67,0	55,1*	32,6;76,1	Non
														Les besoins alimentaires[p]
81,1*	42,1;98,4	66,1	45,5;83,0	77,9	54,0;93,1	71,9	54,2;85,8	61,8**	23,1;91,6	59,9*	33,2;82,9	52,7*	34,0;70,8	Oui, tout à fait
18,9**	1,6;57,9	3,8**	0,1;18,9	8,8**	0,8;30,7	14,9**	4,6;32,7	-	;	20,8**	4,2;50,7	18,4**	6,8;36,5	Oui, en partie
-	;	30,1**	14,4;50,1	13,3**	2,6;35,3	13,1**	4,2;28,5	38,2**	8,4;76,9	19,3**	4,0;47,3	28,9**	12,7;50,2	Non
														Les activités courantes[p]
70,2**	23,4;97,2	63,8	43,9;80,8	80,5	55,5;95,0	69,5	51,7;83,8	57,2**	19,9;89,2	61,5*	33,8;84,6	41,6*	24,1;60,8	Oui, tout à fait
29,8**	2,8;76,6	19,9**	6,7;40,8	-	;	10,3**	2,4;26,3	31,1**	5,6;70,2	25,8**	6,6;56,1	23,4**	10,0;42,2	Oui, en partie
-	;	16,3**	5,3;34,5	19,5**	5,0;44,5	20,2**	8,7;36,9	11,6**	0,2;52,1	12,6**	1,2;41,1	35,1**	16,8;57,2	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	88,1	82,8;92,3	90,9	70,0;99,0
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	11,0*	6,9;16,2	4,9**	0,2;23,1
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	0,9**	0,1;3,3	4,2**	0,1;22,2
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	67,5	60,9;74,1	74,0	54,0;88,7
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	29,9	23,5;36,8	26,0**	11,3;46,0
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	2,3**	0,8;5,0	-	;
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	0,3**	0,0;1,9	-	;
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	75,1	68,4;81,0	79,5	56,8;93,6
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	16,2*	11,4;22,1	12,1**	2,4;32,4
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	8,7*	5,3;13,3	8,3**	0,9;27,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
87,4	51,1;99,5	94,3	80,4;99,4	95,9	75,3;100,0	89,6	75,0;97,2	64,2**	24,0;93,2	94,9	73,8;99,9	77,4	60,5;89,6	Oui, tout à fait
12,6**	0,5;48,9	5,7**	0,6;19,6	4,1**	0,0;24,7	10,4**	2,8;25,0	35,8**	6,8;76,0	5,1**	0,1;26,2	20,3**	8,8;36,9	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	2,3**	0,1;12,1	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
69,9*	39,4;91,2	67,7	49,3;82,9	66,6	43,7;84,9	65,2	49,2;79,1	50,7**	14,2;86,6	77,3	52,0;93,3	63,1	45,7;78,4	Toujours
17,4**	2,2;50,3	30,0**	15,3;48,5	33,4**	15,1;56,3	32,8*	19,2;48,9	49,3**	13,4;85,8	22,7**	6,7;48,0	32,2*	17,6;50,0	La plupart du temps
12,7**	1,1;42,8	-	;	-	;	2,0**	0,0;11,6	-	;	-	;	4,6**	0,5;15,9	À l'occasion
-	;	2,2**	0,0;12,1	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
73,9*	40,3;94,4	84,9	68,5;94,8	48,7*	26,3;71,6	81,4	65,8;92,0	87,6	41,7;99,9	73,7	49,4;90,5	70,9	54,0;84,5	Oui, tout à fait
19,7**	2,4;55,2	7,0**	1,4;19,8	39,1**	19,1;62,2	16,0**	6,3;31,3	-	;	17,5**	4,4;40,9	14,8**	4,8;31,6	Oui, en partie
6,4**	0,1;32,8	8,1**	1,3;24,2	12,2**	2,1;33,7	2,6**	0,1;13,4	12,4**	0,1;58,3	8,8**	0,9;30,1	14,3**	5,3;29,0	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	88,5	83,4;92,4	96,2	80,2;99,9
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	6,5**	3,6;10,7	3,8**	0,1;19,8
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	5,1**	2,6;8,9	-	;
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	89,0	83,0;93,5	95,8	78,1;99,9
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	8,5**	4,6;14,1	4,2**	0,1;21,9
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	2,5**	0,8;6,0	-	;
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	84,9	76,1;91,4	93,6	66,7;99,9
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	8,0**	3,4;15,2	6,4**	0,1;33,3
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	7,1**	3,0;14,0	-	;
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	63,2	53,1;73,4	72,7**	23,5;98,2
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	18,7*	10,9;28,9	27,3**	1,8;76,5
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	18,1*	10,8;27,5	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
93,1	60,6;99,9	75,1	57,2;88,3	91,2	69,8;99,1	93,7	79,5;99,2	63,3*	28,3;90,1	95,8	79,0;99,9	88,1	74,1;96,1	Aucun report
-	;	17,7**	7,2;33,8	4,3**	0,1;22,9	6,3**	0,8;20,5	-	;	4,2**	0,1;21,0	4,8**	0,6;16,1	Un report
6,9**	0,1;39,4	7,2**	1,3;20,9	4,5**	0,1;24,3	-	;	36,7**	9,9;71,7	-	;	7,1**	1,3;20,5	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
100,0	;	73,9	48,0;91,5	88,3	42,2;99,9	91,3	78,2;97,8	89,0	47,1;99,9	89,3	64,5;98,9	86,7	71,3;95,7	Aucun report
-	;	18,2**	3,9;44,6	11,7**	0,1;57,8	2,2**	0,1;11,3	11,0**	0,1;52,9	10,7**	1,1;35,5	13,3**	4,3;28,7	Un report
-	;	7,8**	0,7;27,5	-	;	6,5**	1,2;18,8	-	;	-	;	-	;	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
100,0	;	-	;	70,5	47,6;87,6	90,1	72,2;98,2	100,0	;	70,9*	32,9;94,7	90,4	52,4;99,9	Aucun report
-	;	-	;	16,9**	4,3;39,3	3,3**	0,1;17,7	-	;	18,4**	1,6;56,4	-	;	Un report
-	;	-	;	12,7**	2,5;33,7	6,6**	0,7;23,3	-	;	10,8**	0,2;48,0	9,6**	0,1;47,6	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
73,9*	29,9;97,4	44,2*	23,4;66,5	80,9**	17,7;99,9	63,3	42,6;81,0	44,8**	7,6;87,3	100,0	;	72,9*	28,0;97,4	Aucun report
-	;	31,3**	11,7;57,5	19,1**	0,1;82,3	16,1**	5,0;35,1	11,6**	0,1;59,2	-	;	27,1**	2,6;72,0	Un report
26,1**	2,6;70,1	24,5**	8,9;47,4	-	;	20,5**	7,4;40,7	43,7**	8,1;85,3	-	;	-	;	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	20,6	15,5;25,7	-	;
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	6,5**	3,3;11,3	9,0**	0,9;31,0
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	72,9	66,9;78,9	91,0	69,0;99,1
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	34,4	28,3;40,5	47,4*	26,6;68,9
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	9,7*	5,9;14,8	3,9**	0,1;20,5
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	55,9	49,1;62,8	48,7*	28,7;68,9
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	57,5	51,1;63,9	63,2*	39,9;82,7
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	3,3**	1,3;6,9	8,0**	0,8;27,5
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	39,1	32,7;45,5	28,9**	11,5;52,5
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	13,0*	8,8;18,3	4,2**	0,1;22,1
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	8,6*	5,1;13,5	4,2**	0,1;21,4
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	78,4	71,9;84,0	91,5	72,5;99,0
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	13,7*	9,3;19,1	8,8**	1,0;28,6
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	6,3**	3,4;10,5	4,2**	0,1;22,1
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	80,1	74,0;85,3	87,0	65,5;97,4
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	31,0	24,6;37,4	49,2*	28,3;70,2
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	5,7**	2,9;9,8	-	;
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	63,4	56,7;70,0	50,8*	29,8;71,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
14,6**	1,3;46,9	6,0**	0,7;20,2	4,3**	0,1;24,1	60,3	44,0;75,0	24,8**	4,9;58,6	9,0**	1,0;29,4	14,6**	5,1;30,3	Oui
-	;	11,1**	2,3;29,5	8,8**	0,9;30,1	2,1**	0,0;11,5	-	;	5,1**	0,1;27,3	9,9**	2,5;24,7	Non, mais il aurait souhaité le consulter
85,4	53,1;98,7	82,9	64,9;94,0	86,9	63,8;97,7	37,7*	23,1;54,1	75,2*	41,4;95,1	85,9	63,2;97,2	75,5	57,7;88,6	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
51,1**	22,2;79,4	30,8**	16,4;48,6	47,6*	27,2;68,7	28,3*	15,4;44,5	65,3**	27,3;92,5	17,6**	5,4;38,1	24,0**	12,0;39,9	Oui
15,0**	1,4;48,3	10,2**	2,1;27,3	4,2**	0,1;21,9	10,9**	3,5;24,1	-	;	5,1**	0,1;27,4	17,1**	6,2;34,4	Non, mais il aurait souhaité le consulter
33,9**	10,5;65,1	59,0	41,1;75,4	48,2*	27,4;69,4	60,7	44,3;75,6	34,7**	7,5;72,7	77,3	54,9;92,1	58,9	41,5;74,8	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
50,9**	20,7;80,6	46,1*	28,7;64,2	69,9	47,4;87,0	75,4	60,0;87,1	77,9*	36,8;97,9	62,1*	38,2;82,4	32,5*	19,5;47,9	Oui
-	;	3,2**	0,1;17,3	-	;	-	;	-	;	4,7**	0,1;23,9	7,3**	1,6;19,6	Non, mais il aurait souhaité le consulter
49,1**	19,4;79,3	50,7*	32,5;68,8	30,1**	13,0;52,6	24,6**	12,9;40,0	22,1**	2,1;63,2	33,2**	14,3;57,1	60,2	43,7;75,1	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
7,0**	0,0;41,5	8,0**	1,7;21,2	17,5**	4,7;40,0	19,1**	8,7;34,1	9,4**	0,2;44,5	9,3**	1,0;30,6	17,3**	7,1;32,8	Oui
17,2**	1,5;53,6	6,8**	0,7;23,6	-	;	13,2**	4,9;26,8	7,7**	0,2;37,3	4,1**	0,1;21,6	11,6**	3,2;27,2	Non, mais il aurait souhaité le consulter
75,8*	40,3;95,9	85,3	68,3;95,2	82,5	60,0;95,3	67,7	51,2;81,5	82,9	49,5;98,0	86,6	63,4;97,6	71,1	53,6;85,0	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
20,8**	3,3;54,0	11,3**	2,9;27,3	17,8**	4,4;41,8	12,8**	4,8;26,0	39,2**	10,5;74,9	13,0**	2,5;34,5	9,1**	1,8;24,8	Oui
8,0**	0,1;40,9	9,6**	2,1;25,4	-	;	13,2**	4,5;28,0	-	;	4,9**	0,1;24,3	2,3**	0,1;12,5	Non, mais il aurait souhaité le consulter
71,2*	36,8;93,5	79,1	60,7;91,6	82,2	58,2;95,6	74,0	58,1;86,3	60,8**	25,1;89,5	82,1	58,3;95,5	88,6	71,6;97,2	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
25,0**	6,5;54,4	29,0*	15,9;45,3	36,7**	16,3;61,3	28,8**	15,1;46,2	26,9**	4,7;64,0	28,3**	10,2;53,6	26,5**	12,8;44,7	Oui
5,7**	0,0;34,0	2,7**	0,1;13,5	4,2**	0,1;21,4	11,3**	3,7;24,5	12,1**	0,1;57,0	-	;	7,8**	1,6;21,5	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
69,3*	38,9;90,8	68,3	52,2;81,7	59,2*	35,4;80,1	59,9	43,2;75,0	61,0**	25,4;89,4	71,7	46,4;89,8	65,6	46,9;81,4	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	8,4*	5,2;12,7	4,8**	0,1;24,5
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	10,2*	6,3;15,4	5,1**	0,1;25,2
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	81,4	75,3;86,6	90,2	69,8;98,6
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	10,6*	7,0;15,2	9,0**	1,0;29,5
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	7,9**	4,3;13,1	5,1**	0,1;25,2
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	81,5	75,5;86,6	85,9	65,3;96,7
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	26,9	20,8;32,9	24,5**	8,8;47,5
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	12,3*	8,2;17,5	-	;
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	60,8	54,4;67,2	75,5	52,5;91,2
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	35,5	29,5;41,6	20,0**	7,3;39,7
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	6,9**	3,7;11,7	8,7**	1,0;28,8
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	57,6	51,0;64,1	71,2	50,2;87,2
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	7,5*	4,3;12,2	13,9**	2,8;36,3
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	13,4*	8,9;19,2	9,0**	0,8;31,3
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	79,0	73,4;84,6	77,2	53,5;92,5
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	15,2*	10,7;20,7	17,2**	4,6;39,5
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	4,6**	2,1;8,9	-	;
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	80,1	74,4;85,1	82,8	60,5;95,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
7,5**	0,1;39,1	3,0**	0,1;15,0	17,7**	4,4;41,3	8,8**	2,6;20,4	7,7**	0,1;39,3	13,5**	2,7;35,2	7,2**	1,4;20,2	Oui
6,1**	0,1;35,3	6,0**	0,7;20,4	4,4**	0,1;23,8	13,2**	4,7;27,4	9,8**	0,2;46,8	18,5**	4,9;42,1	13,1**	3,5;30,8	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
86,3	54,8;98,8	91,0	75,1;98,2	77,9	54,4;92,9	78,0	62,7;89,1	82,5*	45,7;98,5	68,0	44,5;86,3	79,7	61,9;91,8	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
26,8**	4,8;63,5	8,2**	1,8;21,8	8,8**	0,9;29,5	20,1**	9,6;34,9	9,4**	0,2;44,5	4,6**	0,1;23,5	2,6**	0,1;13,9	Oui
9,5**	0,2;45,0	3,2**	0,1;16,0	-	;	12,8**	4,4;27,1	35,2**	8,0;72,5	-	;	9,5**	1,9;25,9	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
63,7**	27,0;91,2	88,6	73,5;96,7	91,2	70,5;99,1	67,0	50,2;81,2	55,4**	21,1;86,2	95,4	76,5;99,9	87,8	71,7;96,6	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
7,0**	0,2;33,8	35,5*	19,9;53,7	21,4**	6,7;44,7	36,5*	22,8;52,1	19,7**	2,2;56,4	30,5**	12,6;54,2	20,5**	9,0;37,0	Oui
5,7**	0,1;30,1	14,3**	5,1;29,5	17,7**	4,6;40,7	8,5**	2,4;20,5	23,1**	2,3;64,4	17,2**	4,5;39,7	16,3**	5,5;34,0	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
87,3	59,3;98,7	50,3*	33,7;66,8	60,9*	37,6;81,0	55,0	39,1;70,1	57,2**	21,8;87,7	52,3*	31,4;72,6	63,2	45,3;78,8	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
34,8**	10,8;66,5	53,2*	35,9;69,9	20,1**	6,4;42,1	49,0*	33,5;64,7	26,9**	4,7;64,0	30,5**	12,6;54,2	26,7**	13,5;44,0	Oui
-	;	8,0**	1,9;20,5	4,5**	0,1;23,3	-	;	18,6**	1,8;55,7	8,6**	0,9;29,3	12,6**	3,3;29,9	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
65,2*	33,5;89,2	38,8*	23,8;55,7	75,4	52,6;91,0	51,0	35,3;66,5	54,5**	19,8;86,1	60,8*	37,3;81,1	60,7	42,7;76,8	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
20,9**	3,6;53,2	2,8**	0,1;15,0	17,8**	4,3;42,1	4,0**	0,4;14,4	-	;	9,3**	1,2;29,5	2,3**	0,0;12,5	Oui
25,8**	5,3;59,5	9,9**	2,5;24,5	4,3**	0,1;23,3	13,7**	5,2;27,4	32,5**	6,9;69,8	14,3**	2,9;36,9	14,2**	4,3;31,6	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
53,3**	23,0;81,9	87,3	72,0;96,1	77,9	54,1;93,0	82,3	68,2;92,0	67,5*	30,2;93,1	76,4	53,0;92,0	83,5	65,9;94,3	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
-	;	9,9**	2,5;24,7	8,9**	1,1;28,7	21,0**	11,1;34,3	9,4**	0,2;44,5	31,3**	12,4;56,3	13,0**	3,9;29,1	Oui
6,2**	0,1;32,7	3,0**	0,1;14,7	4,3**	0,1;22,5	6,3**	0,7;21,7	-	;	4,9**	0,1;24,5	7,4**	0,9;23,9	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
93,8	67,3;99,9	87,1	71,9;95,9	86,8	65,3;97,3	72,7	57,2;85,0	90,6	55,5;99,8	63,9*	39,5;83,9	79,7	62,4;91,5	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	5,2**	2,8;8,8	8,1**	1,0;26,6
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	94,8	91,2;97,2	91,9	73,4;99,0
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	-	;	-	;
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	100,0	;	100,0	;
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	8,3**	0,2;40,3	48,0**	0,5;99,2
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	91,7	59,7;99,8	52,0**	0,8;99,5
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	-	;	-	;
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	100,0	;	100,0	;
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	-	;	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	100,0	;	100,0	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	25,0**	4,9;58,9	-	;
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	75,0*	41,1;95,1	100,0	;
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	16,9**	1,7;51,3	52,0**	0,8;99,5
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	83,1	48,7;98,3	48,0**	0,5;99,2
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	48,7**	19,5;78,6	52,0**	0,8;99,5
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	51,3**	21,4;80,5	48,0**	0,5;99,2
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	15,4**	1,7;47,0	-	;
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	84,6	53,0;98,3	100,0	;
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	25,7**	5,0;60,3	-	;
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	74,3*	39,7;95,0	100,0	;
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	18,8**	1,8;56,1	-	;
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	81,2*	43,9;98,2	100,0	;
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	8,8**	0,2;41,7	-	;
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	91,2	58,3;99,8	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]
5,7**	0,1;31,8	7,5**	1,5;21,1	4,0**	0,1;20,4	4,5**	0,6;14,5	-	;	8,1**	1,0;26,2	2,3**	0,1;12,1	Oui
94,3	68,2;99,9	92,5	78,9;98,5	96,0	79,6;99,9	95,5	85,5;99,4	100,0	;	91,9	73,8;99,0	97,7	87,9;99,9	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Psychologue
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Travailleur social
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
-	;	36,1**	0,5;94,9	-	;	-	;	-	;	44,9**	0,3;99,0	100,0	;	Oui
100,0	;	63,9**	5,1;99,5	100,0	;	100,0	;	-	;	55,1**	1,0;99,7	-	;	Non
														Médicaments
-	;	-	;	-	;	45,0**	0,3;99,2	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	55,0**	0,8;99,7	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Services de transport
-	;	61,9**	5,0;99,2	100,0	;	45,0**	0,3;99,2	-	;	55,1**	1,0;99,7	-	;	Oui
100,0	;	38,1**	0,8;95,0	-	;	55,0**	0,8;99,7	-	;	44,9**	0,3;99,0	100,0	;	Non
														Services d'aide à domicile
-	;	-	;	-	;	45,0**	0,3;99,2	-	;	44,9**	0,3;99,0	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	55,0**	0,8;99,7	-	;	55,1**	1,0;99,7	100,0	;	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
100,0	;	36,1**	0,5;94,9	-	;	-	;	-	;	55,1**	1,0;99,7	-	;	Oui
-	;	63,9**	5,1;99,5	100,0	;	100,0	;	-	;	44,9**	0,3;99,0	100,0	;	Non
														Soins infirmiers à domicile
-	;	38,1**	0,8;95,0	-	;	55,0**	0,8;99,7	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	61,9**	5,0;99,2	100,0	;	45,0**	0,3;99,2	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autres services ou ressources
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	100,0	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	-	;	100,0	;	-	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	99,1	96,5;99,9	100,0	;
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	0,9**	0,1;3,5	-	;
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	28,4	22,2;34,6	19,6**	6,1;41,7
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	22,0	16,2;27,7	38,6**	19,4;60,8
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	26,2	20,2;32,9	24,0**	9,1;45,8
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	23,4	17,8;29,1	17,8**	5,2;39,1
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	22,0	16,5;27,5	27,5**	11,1;50,1
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	38,7	31,9;45,6	42,5*	22,4;64,6
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	17,3*	12,1;23,7	21,8**	7,4;44,1
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	22,0	16,4;28,4	8,2**	1,1;26,1
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	7,0*	4,0;11,3	-	;
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	4,6**	2,3;8,1	12,3**	2,6;32,0
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	23,7	17,9;29,4	14,8**	4,0;34,3
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	13,0*	8,9;18,2	8,1**	0,8;27,8
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	44,1	37,4;50,9	52,8*	32,1;72,8
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	7,6*	4,4;12,1	11,9**	2,5;31,0
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	0,3**	0,0;1,9	-	;
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	4,2**	1,7;8,3	8,5**	1,0;27,7
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	95,5	91,3;98,0	91,5	72,3;99,0
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	83,3	77,1;88,5	87,3	66,8;97,4
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	11,6*	7,7;16,7	12,7**	2,6;33,2
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	5,0**	2,2;9,5	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
100,0	;	97,1	82,7;100,0	100,0	;	97,9	87,7;100,0	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui
-	;	2,9**	0,0;17,3	-	;	2,1**	0,0;12,3	-	;	-	;	-	;	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
19,2**	3,7;48,2	39,0*	22,9;57,2	59,6*	37,1;79,4	19,4**	8,1;36,0	10,5**	0,2;47,6	33,3**	14,3;57,2	23,1**	11,5;38,8	Médecin spécialiste du cancer
23,2**	4,8;54,8	23,0**	10,8;39,6	9,7**	1,1;31,6	16,8**	6,0;34,2	12,1**	0,3;52,0	14,2**	2,7;37,8	28,0**	14,5;45,1	Médecin de famille
44,8**	18,0;74,1	13,4**	4,5;28,6	4,3**	0,1;22,9	34,4*	19,7;51,8	17,5**	1,5;54,3	33,5**	14,9;56,7	31,7**	16,4;50,5	Autre médecin spécialiste
12,7**	1,2;41,5	24,6**	11,6;42,1	26,3**	10,2;49,2	29,4*	15,8;46,3	59,9**	25,4;88,3	19,1**	5,4;42,1	17,2**	6,5;34,1	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
25,0**	6,4;54,6	28,7*	15,9;44,6	39,7**	18,7;63,9	13,7**	4,9;28,4	10,5**	0,2;47,6	22,4**	6,8;47,0	13,8**	5,4;27,2	Médecin spécialiste du cancer
35,8**	12,4;65,8	32,1*	17,4;50,0	31,2**	12,2;56,5	40,3*	25,2;56,9	21,6**	2,1;62,1	29,3**	10,9;54,5	54,1*	36,8;70,7	Médecin de famille
14,0**	1,4;44,7	13,0**	4,4;27,7	-	;	20,5**	8,7;37,6	39,5**	9,5;77,2	33,5**	14,9;56,7	11,5**	2,9;27,8	Autre médecin spécialiste
25,2**	6,9;53,7	26,2**	12,8;43,9	29,0**	11,0;53,7	25,5**	13,3;41,3	28,4**	4,3;68,7	14,9**	3,1;38,1	20,6**	9,1;37,2	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
5,7**	0,1;31,5	9,8**	2,4;24,6	-	;	5,5**	0,6;18,7	-	;	-	;	19,3**	8,6;34,7	Au besoin
5,7**	0,1;30,1	2,9**	0,1;14,3	13,2**	2,4;36,0	4,7**	0,6;15,6	-	;	-	;	-	;	À tous les mois
19,4**	3,0;51,6	29,6**	15,3;47,6	42,5**	20,6;66,9	17,8**	7,6;32,9	9,8**	0,1;48,4	23,3**	8,1;46,3	25,3**	12,8;41,8	À tous les 2 ou 3 mois
24,1**	5,9;53,9	4,1**	0,5;13,9	4,3**	0,1;22,9	20,1**	8,8;36,4	9,4**	0,2;44,5	14,0**	2,6;37,4	16,6**	6,5;32,2	À tous les 4 mois
39,3**	14,4;69,2	47,5*	31,0;64,5	35,4**	16,2;58,9	45,5*	30,0;61,6	70,8*	34,2;94,2	52,7*	28,9;75,7	30,7**	16,3;48,4	À tous les 6 mois
5,7**	0,1;33,0	6,1**	1,1;17,6	4,5**	0,1;22,3	6,4**	1,4;17,5	9,9**	0,2;45,7	9,9**	1,0;33,3	8,1**	1,5;23,4	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	2,0**	0,0;11,1	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Trop long
-	;	2,0**	0,1;10,8	-	;	-	;	9,4**	0,2;44,5	-	;	12,5**	3,2;29,9	Trop court
100,0	;	95,9	86,1;99,5	100,0	;	100,0	;	90,6	55,5;99,8	100,0	;	87,5	70,1;96,8	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
80,5	50,2;96,5	92,4	78,1;98,6	79,9	55,1;94,6	83,8	68,4;93,6	80,1*	42,4;97,9	95,2	75,9;99,9	70,7	52,4;85,2	Tout à fait capable
19,5**	3,5;49,8	7,6**	1,4;21,9	20,1**	5,4;44,9	5,1**	0,7;16,3	10,5**	0,2;47,6	4,8**	0,1;24,1	17,8**	7,0;34,1	En partie capable
-	;	-	;	-	;	11,2**	3,0;26,6	9,4**	0,2;44,5	-	;	11,5**	3,0;27,9	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	60,0	53,3;66,8	67,5	46,3;84,5
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	16,0*	11,3;21,7	21,0**	7,4;41,9
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	24,0	18,1;29,9	11,5**	2,1;31,5
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	47,6*	32,8;62,8	67,1**	5,2;99,8
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	52,4	37,2;67,2	32,9**	0,2;94,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
48,1**	21,2;75,8	71,6	53,4;85,7	64,8*	41,3;84,0	62,3	45,1;77,5	48,2**	16,2;81,4	49,7*	25,9;73,5	54,0*	36,8;70,5	Oui, tout à fait
19,7**	3,3;51,3	14,2**	4,4;31,3	26,3**	9,8;49,9	11,5**	3,8;25,2	10,5**	0,2;47,6	14,9**	2,7;39,8	14,4**	5,5;28,5	oui, en partie
32,2**	9,2;64,3	14,2**	5,6;28,0	8,8**	0,9;30,0	26,2**	12,7;44,0	41,3**	12,0;76,1	35,4**	14,5;61,5	31,6*	17,2;49,1	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
-	;	60,7**	14,6;95,2	100,0	;	53,5**	20,3;84,5	-	;	29,8**	2,7;76,7	42,9**	9,9;81,6	Oui
100,0	;	39,3**	4,8;85,4	-	;	46,5**	15,5;79,7	100,0	;	70,2**	23,3;97,3	57,1**	18,4;90,1	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	25,9	20,7;31,2	22,9**	9,0;43,1
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	49,5	43,1;55,8	57,5*	36,9;76,3
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	24,6	19,3;29,9	19,6**	6,3;40,9
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	28,1	22,1;34,0	30,5**	13,4;52,7
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	41,8	35,0;48,6	53,9*	32,3;74,5
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	30,1	24,1;36,1	15,6**	3,9;37,3
Modification de l'alimentation[p]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	42,0	35,6;48,4	46,6*	26,8;67,2
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	33,7	27,4;40,1	38,2**	19,4;60,0
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	24,2	18,7;29,7	15,2**	4,0;35,5
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	19,2	14,4;24,7	3,9**	0,1;20,0
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	10,9*	7,1;15,7	3,9**	0,1;20,4
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	69,9	64,3;75,5	92,2	74,2;99,1
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	1,3**	0,3;3,7	-	;
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	0,9**	0,1;3,2	-	;
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	97,8	95,1;99,3	100,0	;
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	5,6**	2,9;9,6	-	;
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	10,9*	7,2;15,6	7,5**	0,9;24,5
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	83,5	78,4;87,8	92,5	75,5;99,1
Gestion du stress[p]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	38,1	31,7;44,5	19,5**	6,3;40,8
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	20,6	15,8;25,5	14,3**	3,9;33,0
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	41,3	35,2;47,4	66,2	44,4;83,9

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p]
24,2**	6,4;52,9	18,7**	8,1;34,3	28,5**	11,9;50,8	49,5	34,9;64,1	25,3**	5,1;59,2	17,2**	4,5;39,6	13,6**	4,5;29,2	Oui
50,4**	22,2;78,4	43,5*	28,0;60,1	43,1*	22,8;65,2	33,7*	20,2;49,5	64,9*	30,1;90,8	56,3*	32,1;78,4	62,5	45,6;77,4	Non
25,4**	6,2;56,0	37,8*	22,9;54,6	28,4**	12,6;49,5	16,8**	7,3;31,0	9,8**	0,1;48,4	26,5**	10,0;50,0	23,9**	12,1;39,5	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
18,5**	3,4;47,3	29,4*	16,3;45,5	18,0**	5,1;40,0	41,4*	27,0;56,9	27,1**	5,5;62,0	26,1**	9,6;49,8	21,5**	10,3;36,9	Oui
52,6**	24,7;79,3	36,6*	22,1;53,0	35,8**	16,9;58,7	36,5*	21,9;53,1	28,4**	4,6;67,7	52,7*	29,9;74,8	40,9*	25,4;57,8	Non
28,9**	7,7;60,4	34,0*	19,7;50,9	46,2*	25,4;68,1	22,1**	10,5;38,3	44,5**	13,2;79,6	21,2**	6,6;44,5	37,7*	22,5;54,8	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p]
36,4**	12,7;66,4	35,5*	20,2;53,3	50,4*	29,2;71,5	45,1*	29,7;61,1	54,3**	20,6;85,3	22,1**	7,0;45,7	47,5*	31,6;63,8	Oui
57,8*	28,7;83,4	30,4*	17,4;46,3	25,3**	9,5;48,1	29,4**	15,5;46,9	33,6**	7,4;70,7	50,3*	28,1;72,4	25,4**	13,5;40,8	Non
5,7**	0,1;31,5	34,1*	19,0;51,9	24,3**	9,5;45,6	25,5**	13,6;40,9	12,1**	0,1;57,0	27,6**	10,7;51,2	27,1**	14,0;43,9	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
12,7**	1,4;40,6	13,5**	4,7;28,3	-	;	20,1**	9,4;35,2	20,7**	1,9;61,2	48,8*	25,9;72,1	27,7**	14,9;44,0	Oui
5,7**	0,1;29,3	10,7**	3,2;24,5	21,3**	7,3;42,9	4,5**	0,5;15,6	34,7**	7,5;72,7	9,2**	1,0;30,7	14,3**	5,5;28,4	Non
81,6	53,9;96,3	75,8	59,2;88,1	78,7	57,1;92,7	75,4	59,7;87,3	44,5**	14,3;78,2	42,1**	21,3;65,1	57,9	41,8;72,9	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	2,5**	0,1;13,7	-	;	-	;	-	;	-	;	4,5**	0,6;14,7	Oui
-	;	2,8**	0,1;14,4	-	;	-	;	-	;	-	;	2,1**	0,0;11,7	Non
100,0	;	94,7	81,9;99,4	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	93,5	82,7;98,5	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
-	;	9,5**	2,7;22,5	4,2**	0,1;21,5	4,0**	0,4;15,1	9,8**	0,1;48,4	5,0**	0,1;25,3	9,2**	2,5;22,2	Oui
-	;	19,2**	8,5;34,5	8,9**	1,2;28,2	4,9**	0,6;16,1	18,6**	1,8;55,7	5,0**	0,1;27,4	18,0**	7,5;33,6	Non
100,0	;	71,3	55,4;84,2	86,9	65,8;97,3	91,1	78,3;97,6	71,6*	33,6;95,0	89,9	66,3;99,0	72,8	56,7;85,4	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p]
19,8**	3,6;50,1	34,8*	21,2;50,5	52,8*	32,0;72,9	45,8*	31,1;61,0	44,9**	14,5;78,4	39,5**	19,0;63,2	40,9*	25,4;57,8	Oui
35,7**	11,0;67,8	13,5**	5,1;27,3	12,8**	3,1;31,4	19,4**	9,2;33,8	21,6**	2,5;60,0	21,8**	7,5;43,6	29,6*	17,2;44,7	Non
44,5**	17,0;74,7	51,6	36,6;66,5	34,4**	16,3;56,5	34,8*	21,0;50,9	33,6**	7,4;70,7	38,7**	18,2;62,6	29,5*	16,3;45,7	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	40,6	34,1;47,1	35,9**	18,7;56,2
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	15,3*	10,9;20,6	22,3**	9,1;41,6
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	44,2	37,8;50,5	41,7*	23,1;62,3
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	0,4**	0,0;2,5	-	;
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	99,6	97,5;100,0	100,0	;
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	0,4**	0,0;2,5	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	99,6	97,5;100,0	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région															
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]	
30,4**	9,7;59,4	33,4*	19,0;50,7	41,3*	22,1;62,7	46,9*	32,1;62,2	55,0**	20,4;86,4	39,1**	18,6;63,0	44,1*	28,4;60,8	Oui	
12,7**	1,1;42,3	21,1**	9,9;36,8	12,6**	3,1;30,9	4,4**	0,4;16,7	23,1**	2,8;62,4	8,6**	1,0;27,9	21,1**	9,9;36,9	Non	
56,9*	28,8;82,1	45,4*	29,8;61,7	46,1*	25,2;68,0	48,6*	33,3;64,2	21,9**	1,8;64,3	52,3*	29,6;74,3	34,7*	19,9;52,1	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	
														Plus de repos[p]	
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	4,2**	0,1;23,4	-	;	Oui	
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	95,8	76,6;99,9	100,0	;	Non	
														Autre	
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	2,2**	0,0;12,6	Oui	
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	97,8	87,4;100,0	Non	

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	58,9	46,2;71,5	63,2**	23,7;92,6
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	41,1*	28,5;53,8	36,8**	7,4;76,3
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	83,0	74,3;89,8	74,4*	44,9;93,2
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	17,0*	10,2;25,7	25,6**	6,8;55,1
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	57,4	44,5;70,3	58,4**	14,7;93,6
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	42,6*	29,7;55,5	41,6**	6,4;85,3
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	29,1*	18,0;42,3	29,3**	2,8;75,6
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	70,9	57,7;82,0	70,7**	24,4;97,2
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	18,2**	9,3;30,5	27,8**	3,9;68,8
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	81,8	69,5;90,7	72,2*	31,2;96,1
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	57,7	47,1;68,3	56,1**	23,3;85,4
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	42,3	31,7;52,9	43,9**	14,6;76,7
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	70,9	61,3;79,3	68,0*	34,8;91,5
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	29,1*	20,7;38,7	32,0**	8,5;65,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
22,8**	0,1;86,2	63,5**	24,8;92,3	83,6*	30,7;99,8	48,7**	21,1;76,9	100,0	;	33,8**	0,3;94,6	67,8*	32,5;92,3	Oui
77,2**	13,8;99,9	36,5**	7,7;75,2	16,4**	0,2;69,3	51,3**	23,1;78,9	-	;	66,2**	5,4;99,7	32,2**	7,7;67,5	Non
														Soutien de la famille ou des amis
77,4**	9,9;100,0	85,1	60,8;97,2	88,7	52,7;99,6	84,9	62,3;96,7	81,0*	26,1;99,7	89,4	53,0;99,7	81,2	54,2;95,9	Oui
22,6**	0,0;90,1	14,9**	2,8;39,2	11,3**	0,4;47,3	15,1**	3,3;37,7	19,0**	0,3;73,9	10,6**	0,3;47,0	18,8**	4,1;45,8	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
100,0	;	55,0**	18,7;87,6	40,7**	5,7;85,4	65,5*	33,5;89,5	27,5**	0,1;94,2	64,1**	26,1;92,0	49,1**	17,1;81,6	Oui
-	;	45,0**	12,4;81,3	59,3**	14,6;94,3	34,5**	10,5;66,5	72,5**	5,8;99,9	35,9**	8,0;73,9	50,9**	18,4;82,9	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
-	;	39,4**	7,6;80,3	31,2**	2,6;79,9	26,0**	4,8;61,9	21,6**	0,0;88,5	36,5**	3,9;83,6	30,6**	8,6;62,2	Oui
100,0	;	60,6**	19,7;92,4	68,8**	20,1;97,4	74,0*	38,1;95,2	78,4**	11,5;100,0	63,5**	16,4;96,1	69,4*	37,8;91,4	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
29,7**	0,1;93,5	20,5**	1,7;61,3	9,5**	0,1;48,4	25,7**	6,3;56,5	-	;	22,7**	0,4;79,5	8,1**	0,2;38,5	Oui
70,3**	6,5;99,9	79,5*	38,7;98,3	90,5	51,6;99,9	74,3*	43,5;93,7	100,0	;	77,3**	20,5;99,6	91,9	61,5;99,8	Non
														Exemple de l'entourage[p]
59,0**	5,1;98,7	62,0*	28,3;88,8	61,5**	26,3;89,5	59,9*	34,3;82,0	38,4**	2,5;89,8	67,7*	31,3;92,8	49,5**	22,2;77,0	Oui
41,0**	1,3;94,9	38,0**	11,2;71,7	38,5**	10,5;73,7	40,1**	18,0;65,7	61,6**	10,2;97,5	32,3**	7,2;68,7	50,5**	23,0;77,8	Non
														Prière ou soutien spirituel[p]
100,0	;	61,3*	34,1;84,1	67,2*	32,4;91,8	83,3	60,2;95,9	-	;	79,8*	41,8;97,8	71,8	48,6;88,7	Oui
-	;	38,7**	15,9;65,9	32,8**	8,2;67,6	16,7**	4,1;39,8	100,0	;	20,2**	2,2;58,2	28,2**	11,3;51,4	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Côte-Nord et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,3*	7,5;16,1
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	0,4**	0,0;2,5	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	0,9**	0,1;3,3	-	;
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	8,8*	5,3;13,5	7,5**	0,9;24,6
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	40,3	33,6;47,0	46,5*	25,8;68,1
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	49,6	42,8;56,4	46,0*	25,2;67,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région															
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
7,0**	3,8;11,6	16,6	12,9;20,9	9,9*	6,7;13,9	19,8	15,4;24,8	4,0**	2,0;7,2	10,5*	6,8;15,2	20,9	15,5;26,3	Ensemble des patients	
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic	
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	2,3**	0,1;12,2	Mauvaise	
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	4,9**	0,6;16,8	Passable	
11,7**	0,5;46,2	18,2**	7,8;33,7	4,1**	0,1;23,0	4,6**	0,4;16,8	-	;	8,6**	1,0;28,2	8,9**	1,7;24,4	Bonne	
50,3**	23,9;76,6	40,3*	24,2;58,0	49,4*	29,3;69,7	42,7*	26,7;59,9	42,3**	12,3;77,4	32,1**	12,2;58,5	29,5**	14,8;48,1	Très bonne	
37,9**	15,1;65,6	41,5*	27,4;56,6	46,5*	26,2;67,7	52,7*	36,1;68,9	57,7**	22,6;87,7	59,3*	34,7;80,8	54,5	37,6;70,7	Excellente	

Région 10

NORD-DU-QUÉBEC

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	38,3*	22,7 ; 55,9
Femmes	53,9	61,7	44,1 ; 77,3
Âge			
18 à 49 ans	18,9	21,3**	10,1 ; 37,0
50 à 59 ans	24,9	36,1*	21,3 ; 53,1
60 à 69 ans	29,8	30,0*	16,7 ; 46,3
70 ans et plus	26,5	12,6**	3,1 ; 30,7
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	100,0	;
Anglais	10,6	-	;
Autres	3,0	-	;
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	51,7	35,7 ; 67,4
Diplôme d'études secondaires	24,7	19,2**	8,5 ; 34,7
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	22,1**	9,6 ; 39,9
Diplôme d'études universitaires	20,6	7,0**	1,3 ; 19,9
Occupation principale			
En emploi	29,3	38,7*	25,9 ; 52,8
Étudiant	1,7	2,4**	0,1 ; 12,6
Retraité	55,8	51,3	38,0 ; 64,5
À la maison	7,2	5,2**	0,5 ; 18,9
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	-	;
Congé de maternité / autres	3,6	2,4**	0,1 ; 12,2
Situation familiale			
Vit seul	24,1	18,5**	6,9 ; 36,7
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	58,9	42,2 ; 74,2
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	15,6**	5,5 ; 32,0
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	7,0**	0,8 ; 23,6
Autres	4,8	-	;
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	10,1**	2,6 ; 24,9
Revenu suffisant	61,4	67,2	50,2 ; 81,4
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	22,7**	10,2 ; 40,3
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	-	;
2	21,1	-	;
3	20,1	15,2**	5,3 ; 31,4
4	19,4	56,4	38,6 ; 73,1
5 - très défavorisé	17,6	28,4**	14,5 ; 46,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	9,8**	2,0 ; 26,5	17,8**	2,1 ; 51,7	4,3**	0,1 ; 22,7
Génital féminin	5,5	...	10,2	8,3**	1,7 ; 22,8	...	;	14,1**	3,0 ; 36,0
Prostate	15,9	34,4	...	10,8**	3,0 ; 25,5	26,6**	6,8 ; 57,3	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	14,7**	5,7 ; 29,2	15,4**	2,1 ; 44,6	14,3**	3,3 ; 35,3
Sein	26,5	0,4**	48,8	32,0*	20,4 ; 45,6	-	;	54,0*	34,5 ; 72,8
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	5,2**	0,5 ; 18,6	5,7**	0,1 ; 31,2	4,9**	0,1 ; 24,6
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	5,6**	0,5 ; 20,2	13,7**	1,4 ; 43,2	-	;
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	13,5**	3,9 ; 30,7	20,9**	3,6 ; 53,1	8,4**	0,8 ; 29,0
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	94,8	81,8 ; 99,4	92,4	61,7 ; 99,9	96,2	80,2 ; 99,9
Récidive	7,4	7,5	7,3	-	;	-	;	-	;
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	5,2**	0,6 ; 18,2	7,6**	0,1 ; 38,3	3,8**	0,1 ; 19,8
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	5,7**	0,6 ; 20,0	7,6**	0,1 ; 38,3	4,5**	0,1 ; 23,6
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	40,8*	25,3 ; 57,7	12,2**	1,0 ; 41,2	58,5*	37,1 ; 77,8
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	53,6*	36,2 ; 70,3	80,2	49,3 ; 96,5	37,0**	18,2 ; 59,3
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	62,9	43,7 ; 79,5	59,5*	27,8 ; 86,2	64,9*	39,6 ; 85,3
Non	58,8	56,6	60,7	37,1*	20,5 ; 56,3	40,5**	13,8 ; 72,2	35,1**	14,7 ; 60,4
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	97,7	87,0 ; 100,0	94,3	69,0 ; 99,9	100,0	;
Non	8,3	8,5	8,0	2,3**	0,0 ; 13,0	5,7**	0,1 ; 31,0	-	;
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	4,4**	0,5 ; 15,5	-	;	6,9**	0,6 ; 25,3
Très bon	29,2	29,3	29,1	38,5*	22,8 ; 56,0	44,6**	16,9 ; 75,0	34,9**	17,0 ; 56,6
Bon	34,9	34,2	35,5	32,8**	16,7 ; 52,6	40,8**	12,5 ; 74,6	28,2**	10,8 ; 52,1
Moyen	18,8	17,8	19,6	12,4**	3,6 ; 28,3	6,5**	0,1 ; 32,0	15,8**	3,4 ; 39,7
Mauvais	5,6	5,7	5,5	11,9**	2,9 ; 29,5	8,1**	0,1 ; 41,2	14,2**	2,6 ; 38,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p]
9,8**	2,0 ; 26,5	11,2**	0,1 ; 54,4	6,0**	0,1 ; 33,0	-	;	70,7**	.. ; ..	Colorectal
8,3**	1,7 ; 22,8	-	;	14,1**	1,4 ; 45,1	9,2**	0,1 ; 44,5	-	;	Génital féminin
10,8**	3,0 ; 25,5	-	;	22,9**	5,0 ; 53,3	6,4**	0,1 ; 33,9	-	;	Prostate
14,7**	5,7 ; 29,2	41,8**	8,2 ; 82,7	6,0**	0,1 ; 32,7	9,2**	0,2 ; 44,0	-	;	Hématopoïétique
32,0*	20,4 ; 45,6	47,0**	11,9 ; 84,5	38,5**	15,8 ; 65,6	14,2**	1,1 ; 47,7	29,3**	0,0 ; 98,9	Sein
5,2**	0,5 ; 18,6	-	;	6,0**	0,1 ; 31,3	9,2**	0,2 ; 42,8	-	;	ORL (Tête et cou)
5,6**	0,5 ; 20,2	-	;	-	;	17,5**	1,9 ; 51,8	-	;	Broncho-pulmonaire
13,5**	3,9 ; 30,7	-	;	6,5**	0,1 ; 31,9	34,4**	8,0 ; 71,0	-	;	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
94,8	81,8 ; 99,4	100,0	;	100,0	;	82,5	48,7 ; 98,0	100,0	;	Premier cancer
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Récidive
5,2**	0,6 ; 18,2	-	;	-	;	17,5**	2,0 ; 51,3	-	;	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]
5,7**	0,6 ; 20,0	-	;	-	;	18,8**	1,9 ; 56,1	-	;	Sous traitement
40,8*	25,3 ; 57,7	47,0**	11,9 ; 84,5	38,5**	15,8 ; 65,6	36,2**	12,5 ; 66,2	47,7**	1,0 ; 98,4	Sans traitement avec médication
53,6*	36,2 ; 70,3	53,0**	15,5 ; 88,1	61,5*	34,4 ; 84,2	45,0**	16,7 ; 75,9	52,3**	1,6 ; 99,0	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p]
62,9	43,7 ; 79,5	73,7*	29,4 ; 97,4	72,4*	41,1 ; 92,9	71,5*	32,8 ; 95,2	-	;	Oui
37,1*	20,5 ; 56,3	26,3**	2,6 ; 70,6	27,6**	7,1 ; 58,9	28,5**	4,8 ; 67,2	100,0	;	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p]
97,7	87,0 ; 100,0	100,0	;	94,0	67,0 ; 99,9	100,0	;	100,0	;	Oui
2,3**	0,0 ; 13,0	-	;	6,0**	0,1 ; 33,0	-	;	-	;	Non
										Perception de l'état de santé[p]
4,4**	0,5 ; 15,5	-	;	6,5**	0,1 ; 33,7	6,4**	0,1 ; 35,7	-	;	Excellent
38,5*	22,8 ; 56,0	56,7**	14,9 ; 92,2	53,2**	24,1 ; 80,8	25,2**	4,2 ; 61,9	-	;	Très bon
32,8**	16,7 ; 52,6	43,3**	7,8 ; 85,1	26,1**	6,6 ; 56,8	26,1**	5,5 ; 59,7	52,3**	1,6 ; 99,0	Bon
12,4**	3,6 ; 28,3	-	;	14,1**	1,5 ; 44,4	23,4**	4,1 ; 57,9	-	;	Moyen
11,9**	2,9 ; 29,5	-	;	-	;	18,8**	2,4 ; 53,3	47,7**	1,0 ; 98,4	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Présence de symptômes[p]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	59,2	42,6;74,5	100,0	;
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	40,8*	25,5;57,4	-	;
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	29,7**	9,9;57,4	-	;
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	4,8**	0,1;26,0	-	;
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	23,3**	6,0;51,4	23,6**	0,0;95,0
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	42,2**	19,0;68,2	76,4**	..;..
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	35,5**	13,8;62,8	-	;
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	6,4**	0,1;31,5	-	;
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	-	;	-	;
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	43,0**	18,8;69,9	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	15,1**	1,6;46,6	-	;
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	38,5**	17,7;62,8	74,0**	6,5;100,0
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	28,4**	9,3;55,8	26,0**	0,0;93,5
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	24,6**	7,9;50,0	-	;
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	8,5**	0,7;30,5	-	;
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	91,3	76,5;98,2	100,0	;
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	8,7**	1,8;23,5	-	;
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	-	;	-	;
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	..	;	..	;
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	..	;	..	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p]
64,9**	4,6;99,7	27,0**	0,3;87,8	100,0	;	39,5**	13,5;70,8	100,0	;	44,6**	0,3;99,0	44,6**	3,2;93,6	Oui
35,1**	0,3;95,4	73,0**	12,2;99,7	-	;	60,5*	29,2;86,5	-	;	55,4**	1,0;99,7	55,4**	6,4;96,8	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
-	;	-	;	26,8**	0,1;93,6	78,3**	13,7;99,9	100,0	;	-	;	-	;	2 semaines et moins
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	100,0	;	-	;	Plus de 2 semaines à 1 mois
54,0**	0,7;99,7	-	;	39,3**	0,5;96,6	-	;	-	;	-	;	51,4**	0,9;99,3	Plus d'un mois à 3 mois
46,0**	0,3;99,3	100,0	;	34,0**	0,4;94,2	21,7**	0,1;86,3	-	;	-	;	48,6**	0,7;99,1	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
100,0	;	100,0	;	-	;	-	;	-	;	-	;	54,0**	1,1;99,5	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	46,0**	0,5;98,9	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	85,8*	40,1;99,7	-	;	-	;	-	;	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
-	;	-	;	-	;	14,2**	0,3;59,9	-	;	100,0	;	-	;	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
-	;	-	;	44,1**	0,3;98,9	58,6**	8,3;97,1	100,0	;	100,0	;	-	;	2 semaines et moins
64,9**	4,6;99,7	37,0**	0,4;96,2	-	;	21,7**	0,1;86,3	-	;	-	;	34,6**	0,3;95,1	Plus de 2 semaines à 1 mois
35,1**	0,3;95,4	37,0**	0,3;96,7	55,9**	1,1;99,7	19,7**	0,1;79,6	-	;	-	;	32,7**	0,2;94,7	Plus d'un mois à 3 mois
-	;	25,9**	0,1;91,5	-	;	-	;	-	;	-	;	32,7**	0,4;92,9	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	91,4	58,3;99,8	100,0	;	100,0	;	59,8**	10,2;96,8	Oui, tout à fait
-	;	-	;	-	;	8,6**	0,2;41,7	-	;	-	;	40,2**	3,2;89,8	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Oui
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	15,4**	5,5;31,5	-	;
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	26,4**	12,4;45,0	50,5**	1,3;98,8
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	22,0**	10,2;38,5	49,5**	1,2;98,7
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	31,6**	16,9;49,6	-	;
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	4,6**	0,5;16,1	-	;
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	-	;	-	;
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	-	;	-	;
Façon d'annoncer le diagnostic[p]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	82,7	68,6;92,2	100,0	;
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	17,3**	7,8;31,4	-	;
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	100,0	;	100,0	;
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	-	;	-	;
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	100,0	;	100,0	;
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	-	;	-	;
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	97,5	86,9;99,9	100,0	;
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	2,5**	0,1;13,1	-	;
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	65,1	45,7;81,4	49,5**	1,2;98,7
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	34,9*	18,6;54,3	50,5**	1,3;98,8
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	60,1	44,4;74,5	50,5**	1,3;98,8
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	39,9*	25,5;55,6	49,5**	1,2;98,7
Contact pour du soutien émotionnel[2, p]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	44,2*	23,0;67,1	-	;
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	55,8*	32,9;77,0	100,0	;
Contact pour du soutien pratique[3, p]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	69,8	52,3;83,9	26,0**	0,0;93,5
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	30,2**	16,1;47,7	74,0**	6,5;100,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3. On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
35,1**	0,3;95,4	-	;	-	;	29,7**	7,3;63,1	-	;	-	;	21,7**	0,2;81,0	Médecin de famille
-	;	18,9**	0,1;81,1	19,9**	0,2;76,9	17,2**	1,7;52,1	44,1**	0,4;98,8	55,4**	1,0;99,7	41,4**	3,3;90,7	Médecin spécialiste du cancer
-	;	-	;	-	;	44,5**	15,6;76,5	55,9**	1,2;99,6	-	;	-	;	Chirurgien
64,9**	4,6;99,7	81,1**	18,9;99,9	62,9**	10,6;97,9	8,6**	0,1;44,2	-	;	44,6**	0,3;99,0	21,7**	0,3;79,7	Autre médecin spécialiste
-	;	-	;	17,3**	0,1;75,2	-	;	-	;	-	;	15,2**	0,0;73,4	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p]
70,1**	4,7;99,9	100,0	;	100,0	;	60,9*	28,7;87,2	55,9**	1,2;99,6	100,0	;	100,0	;	En personne
29,9**	0,1;95,3	-	;	-	;	39,1**	12,8;71,3	44,1**	0,4;98,8	-	;	-	;	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	92,2	62,2;99,8	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui
-	;	-	;	-	;	7,8**	0,2;37,8	-	;	-	;	-	;	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p]
64,9**	4,6;99,7	100,0	;	62,4**	10,6;97,7	60,5*	29,7;86,1	-	;	100,0	;	74,4**	12,8;99,8	Oui
35,1**	0,3;95,4	-	;	37,6**	2,3;89,4	39,5**	13,9;70,3	100,0	;	-	;	25,6**	0,2;87,2	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]
35,1**	0,3;95,4	-	;	84,3*	20,3;100,0	56,7*	26,8;83,3	55,9**	1,2;99,6	100,0	;	84,8*	26,6;100,0	Oui
64,9**	4,6;99,7	100,0	;	15,7**	0,0;79,7	43,3**	16,7;73,2	44,1**	0,4;98,8	-	;	15,2**	0,0;73,4	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p]
-	;	-	;	50,5**	4,4;95,9	43,6**	8,3;84,9	100,0	;	55,4**	1,0;99,7	48,8**	3,6;95,8	Oui
100,0	;	-	;	49,5**	4,1;95,6	56,4**	15,1;91,7	-	;	44,6**	0,3;99,0	51,2**	4,2;96,4	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p]
29,9**	0,1;95,3	63,0**	3,8;99,6	80,1*	23,1;99,8	84,4	51,3;98,5	100,0	;	55,4**	1,0;99,7	78,3**	20,3;99,7	Oui
70,1**	4,7;99,9	37,0**	0,4;96,2	19,9**	0,2;76,9	15,6**	1,5;48,7	-	;	44,6**	0,3;99,0	21,7**	0,3;79,7	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	4,1**	0,1;21,4	-	;
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	95,9	78,6;99,9	100,0	;
Infirmière pivot en oncologie[p]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	30,5**	11,8;55,4	-	;
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	69,5*	44,6;88,2	100,0	;
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	-	;	-	;
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	100,0	;	100,0	;
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	14,9**	2,8;39,2	-	;
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	85,1	60,8;97,2	100,0	;
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	5,0**	0,1;25,9	-	;
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	95,0	74,1;99,9	100,0	;
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	9,2**	0,9;31,5	-	;
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	90,8	68,5;99,1	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]
-	;	-	;	-	;	13,3**	0,4;53,7	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	86,7	46,3;99,6	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p]
-	;	-	;	50,5**	4,4;95,9	30,3**	2,7;77,8	100,0	;	-	;	27,0**	0,2;90,3	Oui
100,0	;	-	;	49,5**	4,1;95,6	69,7**	22,2;97,3	-	;	100,0	;	73,0**	9,7;99,8	Non
														Psychologue[p]
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Travailleur social[p]
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	55,4**	1,0;99,7	48,8**	3,6;95,8	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	44,6**	0,3;99,0	51,2**	4,2;96,4	Non
														Médecin[p]
-	;	-	;	-	;	-	;	100,0	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autre professionnel de la santé
-	;	-	;	-	;	13,3**	0,4;53,7	100,0	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	-	;	100,0	;	86,7	46,3;99,6	-	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Infirmière pivot en oncologie[p]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	20,8**	7,9;40,3	-	;
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	79,2	59,7;92,1	100,0	;
Médecin spécialiste du cancer[p]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	31,9*	17,6;49,3	-	;
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	68,1	50,7;82,4	100,0	;
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	45,0*	30,5;60,3	26,0**	0,0;93,5
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	55,0	39,7;69,5	74,0**	6,5;100,0
Autre médecin spécialiste[p, r]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	12,4**	3,4;29,2	-	;
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	87,6	70,8;96,6	100,0	;
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	..	;	..	;
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	..	;	..	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p]
29,9**	0,1;95,3	-	;	41,0**	3,0;91,1	17,2**	1,7;52,1	-	;	55,4**	1,0;99,7	22,9**	0,2;84,5	Oui
70,1**	4,7;99,9	100,0	;	59,0**	8,9;97,0	82,8	47,9;98,3	100,0	;	44,6**	0,3;99,0	77,1**	15,5;99,8	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p]
29,9**	0,1;95,3	-	;	62,9**	10,6;97,9	29,5**	7,7;61,7	44,1**	0,4;98,8	-	;	55,4**	8,4;95,5	Oui
70,1**	4,7;99,9	100,0	;	37,1**	2,1;89,4	70,5*	38,3;92,3	55,9**	1,2;99,6	100,0	;	44,6**	4,5;91,6	Non
														Médecin de famille[p]
-	;	25,9**	0,1;91,5	58,2**	11,1;95,5	69,5*	36,2;92,2	100,0	;	-	;	22,9**	0,2;84,5	Oui
100,0	;	74,1**	8,5;99,9	41,8**	4,5;88,9	30,5**	7,8;63,8	-	;	100,0	;	77,1**	15,5;99,8	Non
														Autre médecin spécialiste[p, r]
-	;	37,0**	0,3;96,7	25,3**	0,4;84,4	7,8**	0,1;40,3	55,9**	1,2;99,6	-	;	-	;	Oui
100,0	;	63,0**	3,3;99,7	74,7**	15,6;99,6	92,2	59,7;99,9	44,1**	0,4;98,8	100,0	;	100,0	;	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Oui
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	89,8	75,6;97,3	74,0**	6,5;100,0
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	10,2**	2,7;24,4	26,0**	0,0;93,5
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	-	;	-	;
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	84,6	67,9;94,7	74,0**	6,5;100,0
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	12,9**	3,9;28,7	26,0**	0,0;93,5
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	2,5**	0,1;13,4	-	;
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	84,1	62,9;95,8	100,0	;
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	7,5**	0,7;26,9	-	;
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	8,4**	1,0;27,3	-	;
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	49,6*	28,1;71,3	26,0**	0,0;93,5
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	25,1**	10,4;45,8	-	;
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	25,3**	9,7;47,5	74,0**	6,5;100,0
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	20,4**	8,4;38,1	23,6**	0,0;95,0
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	8,9**	1,8;24,5	-	;
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	22,2**	9,0;41,4	-	;
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	27,4**	12,9;46,5	50,5**	1,3;98,8
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	21,1**	8,3;40,0	26,0**	0,0;93,5
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	82,1	47,4;98,0	100,0	;
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	17,9**	2,0;52,6	-	;
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	-	;	-	;
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	22,1**	9,1;40,9	23,6**	0,0;95,0
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	77,9	59,1;90,9	76,4**	..;..

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	76,9*	43,5;95,7	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui, tout à fait
-	;	-	;	-	;	23,1**	4,3;56,5	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	70,5*	37,4;92,7	100,0	;	100,0	;	78,3**	19,0;99,8	Oui, tout à fait
-	;	-	;	-	;	22,0**	4,0;54,5	-	;	-	;	21,7**	0,2;81,0	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	7,6**	0,2;33,9	-	;	-	;	-	;	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
100,0	;	100,0	;	49,7**	2,7;97,1	81,5	47,5;97,7	-	;	100,0	;	100,0	;	Oui
-	;	-	;	21,0**	0,0;88,7	9,8**	0,2;47,3	-	;	-	;	-	;	Non, il ne voulait pas
-	;	-	;	29,3**	0,4;89,7	8,7**	0,3;38,0	-	;	-	;	-	;	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
100,0	;	58,8**	1,3;99,8	44,1**	2,6;94,2	37,4**	6,5;79,3	100,0	;	55,4**	1,0;99,7	52,6**	4,9;96,5	Oui, tout à fait
-	;	41,2**	0,2;98,7	29,3**	0,4;89,7	23,3**	1,8;67,6	-	;	44,6**	0,3;99,0	47,4**	3,5;95,1	Oui, en partie
-	;	-	;	26,6**	0,3;87,7	39,3**	7,6;80,1	-	;	-	;	-	;	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
-	;	-	;	31,6**	0,5;91,3	16,9**	1,7;51,2	44,1**	0,4;98,8	-	;	48,8**	3,6;95,8	Oui, une infirmière pivot en oncologie
-	;	-	;	-	;	17,5**	1,9;52,3	-	;	55,4**	1,0;99,7	-	;	Oui, un autre professionnel de la santé
-	;	73,0**	9,3;99,8	46,9**	2,8;95,7	24,0**	4,9;56,8	-	;	-	;	-	;	Oui, un membre du personnel administratif
29,9**	0,1;95,3	-	;	21,5**	0,1;85,7	32,3**	7,2;68,6	55,9**	1,2;99,6	-	;	25,6**	0,3;86,8	Oui, un médecin
70,1**	4,7;99,9	27,0**	0,2;90,7	-	;	9,3**	0,1;45,3	-	;	44,6**	0,3;99,0	25,6**	0,2;87,2	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
-	;	-	;	100,0	;	64,1**	4,3;99,7	100,0	;	100,0	;	65,6**	5,4;99,6	Oui, tout à fait
-	;	-	;	-	;	35,9**	0,3;95,7	-	;	-	;	34,4**	0,4;94,6	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]
35,1**	0,3;95,4	-	;	-	;	30,3**	8,7;61,3	-	;	-	;	47,4**	3,5;95,1	Oui
64,9**	4,6;99,7	100,0	;	100,0	;	69,7*	38,7;91,3	100,0	;	100,0	;	52,6**	4,9;96,5	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Patient a subi une chirurgie[p]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	84,0	66,8;94,5	49,5**	1,2;98,7
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	16,0**	5,5;33,2	50,5**	1,3;98,8
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	34,0**	16,5;55,4	-	;
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	66,0	44,6;83,5	100,0	;
Lieu de la chirurgie[p]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	28,9**	13,1;49,6	52,4**	0,8;99,5
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	71,1	50,4;86,9	47,6**	0,5;99,2
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	57,8*	35,9;77,7	-	;
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	23,6**	8,7;45,6	-	;
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	18,5**	6,4;38,0	100,0	;
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	76,8	57,3;90,5	100,0	;
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	10,1**	2,0;27,1	-	;
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	13,1**	3,3;31,8	-	;
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	100,0	;	100,0	;
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	-	;	-	;
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	86,6	67,1;96,8	100,0	;
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	13,4**	3,2;32,9	-	;
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	-	;	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p]
100,0	;	100,0	;	41,8**	4,5;88,9	100,0	;	100,0	;	55,4**	1,0;99,7	100,0	;	Oui
-	;	-	;	58,2**	11,1;95,5	-	;	-	;	44,6**	0,3;99,0	-	;	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p]
-	;	-	;	100,0	;	61,1*	28,4;87,7	-	;	100,0	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	-	;	38,9**	12,3;71,6	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
														Lieu de la chirurgie[p]
29,9**	0,1;95,3	73,0**	9,3;99,8	52,4**	0,8;99,5	15,6**	1,6;48,1	-	;	-	;	22,9**	0,2;84,5	Hôpital de la région de résidence
70,1**	4,7;99,9	27,0**	0,2;90,7	47,6**	0,5;99,2	84,4	51,9;98,4	100,0	;	100,0	;	77,1**	15,5;99,8	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
100,0	;	73,0**	9,3;99,8	-	;	47,2**	17,6;78,4	-	;	-	;	78,3**	19,0;99,8	Oui, tout à fait
-	;	27,0**	0,2;90,7	-	;	26,5**	5,2;61,7	-	;	100,0	;	21,7**	0,2;81,0	Oui, en partie
-	;	-	;	100,0	;	26,3**	5,7;59,7	-	;	-	;	-	;	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
64,9**	4,6;99,7	100,0	;	100,0	;	54,1**	24,9;81,3	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui, tout à fait
-	;	-	;	-	;	23,9**	4,9;56,2	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
35,1**	0,3;95,4	-	;	-	;	22,0**	3,6;55,9	-	;	-	;	-	;	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
100,0	;	73,0**	9,3;99,8	100,0	;	77,2*	44,2;95,8	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui, tout à fait
-	;	27,0**	0,2;90,7	-	;	22,8**	4,2;55,8	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	38,9*	25,9;53,0	100,0	;
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	61,1	47,0;74,1	-	;
Lieu de la chimiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	57,0**	23,8;86,0	50,5**	1,3;98,8
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	43,0**	14,0;76,2	49,5**	1,2;98,7
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	65,3*	30,6;90,9	76,4**	..;..
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	-	;	-	;
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	34,7**	9,1;69,4	23,6**	0,0;95,0
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	66,3**	21,0;95,9	49,5**	1,2;98,7
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	11,1**	0,1;55,6	-	;
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	22,6**	1,1;71,7	50,5**	1,3;98,8
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	78,6*	45,8;96,3	100,0	;
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	14,5**	1,1;48,2	-	;
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	7,0**	0,1;37,0	-	;
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	93,0	59,3;100,0	100,0	;
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	7,0**	0,0;40,7	-	;
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	-	;	-	;
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	100,0	;	100,0	;
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	-	;	-	;
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	-	;	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p]
-	;	-	;	80,1*	23,1;99,8	46,7**	18,9;76,1	44,1**	0,4;98,8	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	19,9**	0,2;76,9	53,3**	23,9;81,1	55,9**	1,2;99,6	100,0	;	100,0	;	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p]
-	;	-	;	73,1**	5,7;100,0	61,5**	10,3;97,5	-	;	-	;	-	;	Hôpital de la région de résidence
-	;	-	;	26,9**	0,0;94,3	38,5**	2,5;89,7	100,0	;	-	;	-	;	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
-	;	-	;	29,6**	0,1;94,0	76,9**	13,7;99,9	100,0	;	-	;	-	;	Moins de 30 minutes
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	De 30 à 60 minutes
-	;	-	;	70,4**	6,0;99,9	23,1**	0,1;86,3	-	;	-	;	-	;	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
-	;	-	;	100,0	;	66,5**	4,8;99,8	-	;	-	;	-	;	Oui, tout à fait
-	;	-	;	-	;	33,5**	0,2;95,2	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
-	;	-	;	73,1**	5,7;100,0	61,5**	10,3;97,5	100,0	;	-	;	-	;	Moins de 30 minutes
-	;	-	;	26,9**	0,0;94,3	20,0**	0,1;81,8	-	;	-	;	-	;	De 30 à 60 minutes
-	;	-	;	-	;	18,5**	0,1;77,7	-	;	-	;	-	;	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
-	;	-	;	73,1**	5,7;100,0	100,0	;	100,0	;	-	;	-	;	Oui, tout à fait
-	;	-	;	26,9**	0,0;94,3	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
-	;	-	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	-	;	-	;	Oui, tout à fait
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	59,7	50,1;69,3	49,5**	1,2;98,7
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	40,3	30,7;49,9	50,5**	1,3;98,8
Lieu de la radiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	4,2**	0,1;22,2	-	;
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	95,8	77,8;99,9	100,0	;
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	24,8**	8,8;48,4	47,6**	0,5;99,2
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	21,1**	5,5;47,1	-	;
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	54,1*	29,9;76,9	52,4**	0,8;99,5
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	70,3*	42,1;90,4	47,6**	0,5;99,2
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	24,0**	5,8;53,9	52,4**	0,8;99,5
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	5,7**	0,1;31,3	-	;
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	90,9	70,9;98,9	100,0	;
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	4,8**	0,1;24,9	-	;
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	4,3**	0,1;22,7	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p]
29,9**	0,1;95,3	45,9**	2,4;95,7	41,0**	3,0;91,1	100,0	;	44,1**	0,4;98,8	44,6**	0,3;99,0	33,7**	1,8;86,3	Oui
70,1**	4,7;99,9	54,1**	4,3;97,6	59,0**	8,9;97,0	-	;	55,9**	1,2;99,6	55,4**	1,0;99,7	66,3**	13,7;98,2	Non
														Lieu de la radiothérapie[p]
-	;	-	;	-	;	7,8**	0,1;40,3	-	;	-	;	-	;	Hôpital de la région de résidence
100,0	;	100,0	;	100,0	;	92,2	59,7;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
-	;	41,2**	0,2;98,6	-	;	22,0**	3,8;55,3	100,0	;	-	;	-	;	Moins de 30 minutes
-	;	58,8**	1,4;99,8	61,8**	1,1;99,9	7,8**	0,2;37,1	-	;	-	;	100,0	;	De 30 à 60 minutes
-	;	-	;	38,2**	0,1;98,9	70,3*	37,0;92,6	-	;	100,0	;	-	;	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
100,0	;	100,0	;	100,0	;	67,1**	27,4;94,0	-	;	-	;	100,0	;	Oui, tout à fait
-	;	-	;	-	;	32,9**	6,0;72,6	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	100,0	;	-	;	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
100,0	;	100,0	;	100,0	;	83,6	50,0;98,3	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui, tout à fait
-	;	-	;	-	;	8,6**	0,2;41,7	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	7,8**	0,1;40,4	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Douleur et malaises ressentis[p]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	59,6	41,5;76,1	100,0	;
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	40,4*	23,9;58,5	-	;
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	23,2**	5,3;53,3	76,4**	..;..
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	35,7**	14,9;61,4	-	;
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	41,1**	18,9;66,4	23,6**	0,0;95,0
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	78,5	52,4;94,3	100,0	;
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	15,4**	3,2;39,2	-	;
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	6,1**	0,1;30,2	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p]
64,9**	4,6;99,7	63,0**	3,8;99,6	62,9**	10,6;97,9	48,1**	20,5;76,6	44,1**	0,4;98,8	-	;	70,1**	6,9;99,8	Oui
35,1**	0,3;95,4	37,0**	0,4;96,2	37,1**	2,1;89,4	51,9**	23,4;79,5	55,9**	1,2;99,6	100,0	;	29,9**	0,2;93,1	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
-	;	-	;	24,9**	0,0;94,5	16,2**	0,1;70,5	-	;	-	;	-	;	Sévères
100,0	;	58,8**	1,3;99,8	-	;	15,7**	0,4;61,4	100,0	;	-	;	100,0	;	Modérés
-	;	41,2**	0,2;98,7	75,1**	5,5;100,0	68,1**	20,0;97,2	-	;	-	;	-	;	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
54,0**	0,7;99,7	41,2**	0,2;98,7	65,2**	5,2;99,6	82,1*	26,2;99,8	100,0	;	-	;	100,0	;	Oui, tout à fait
46,0**	0,3;99,3	58,8**	1,3;99,8	-	;	17,9**	0,2;73,8	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	34,8**	0,4;94,8	-	;	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	85,7	64,1;96,9	100,0	;
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	14,3**	3,1;35,9	-	;
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	-	;	-	;
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	..	;	..	;
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	..	;	..	;
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	72,3	54,2;86,3	100,0	;
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	27,7**	13,7;45,8	-	;
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	-	;	-	;
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	59,9	43,3;74,9	49,5**	1,2;98,7
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	40,1*	25,1;56,7	50,5**	1,3;98,8
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	67,9	48,3;83,8	49,5**	1,2;98,7
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	15,1**	5,1;31,9	-	;
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	17,0**	5,4;36,2	50,5**	1,3;98,8
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	74,4	53,4;89,4	74,0**	6,5;100,0
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	19,4**	6,9;39,0	26,0**	0,0;93,5
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	6,2**	0,6;21,7	-	;
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	48,2**	23,4;73,6	47,6**	0,5;99,2
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	51,8*	26,4;76,6	52,4**	0,8;99,5
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	97,3	85,0;99,9	100,0	;
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	2,7**	0,1;15,0	-	;
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	-	;	-	;

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
100,0	;	100,0	;	70,7**	10,3;99,6	83,6	50,7;98,2	100,0	;	-	;	80,3**	15,4;100,0	Oui, tout à fait
-	;	-	;	29,3**	0,4;89,7	16,4**	1,8;49,3	-	;	-	;	19,7**	0,0;84,6	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Oui
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
70,1**	4,7;99,9	100,0	;	58,2**	11,1;95,5	57,0**	23,5;86,2	100,0	;	-	;	100,0	;	Oui, toujours
29,9**	0,1;95,3	-	;	41,8**	4,5;88,9	43,0**	13,8;76,5	-	;	100,0	;	-	;	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide
29,9**	0,1;95,3	45,9**	2,9;95,0	58,2**	11,1;95,5	70,5*	37,4;92,7	100,0	;	-	;	71,8**	11,5;99,6	Oui
70,1**	4,7;99,9	54,1**	5,0;97,1	41,8**	4,5;88,9	29,5**	7,3;62,6	-	;	100,0	;	28,2**	0,4;88,5	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]
64,9**	4,6;99,7	73,0**	9,3;99,8	78,1**	21,5;99,7	75,8*	43,5;95,0	55,9**	1,2;99,6	-	;	64,9**	4,8;99,6	Oui
35,1**	0,3;95,4	-	;	21,9**	0,3;78,5	24,2**	5,0;56,5	-	;	-	;	-	;	Non, mais il aurait aimé l'être
-	;	27,0**	0,2;90,7	-	;	-	;	44,1**	0,4;98,8	100,0	;	35,1**	0,4;95,2	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
64,9**	4,6;99,7	100,0	;	100,0	;	54,4**	22,0;84,3	44,1**	0,4;98,8	100,0	;	100,0	;	Oui, tout à fait
35,1**	0,3;95,4	-	;	-	;	37,9**	11,0;72,0	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	7,6**	0,1;38,2	55,9**	1,2;99,6	-	;	-	;	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
-	;	100,0	;	47,6**	0,4;99,4	61,2**	20,1;92,7	44,1**	0,4;98,8	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	52,4**	0,6;99,6	38,8**	7,3;79,9	55,9**	1,2;99,6	100,0	;	100,0	;	Non
														Patient traité de manière respectueuse
100,0	;	100,0	;	100,0	;	92,4	66,1;99,8	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui, toujours
-	;	-	;	-	;	7,6**	0,2;33,9	-	;	-	;	-	;	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	-	;	-	;
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	-	;	-	;
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	2,4**	0,0;13,2	-	;
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	97,6	86,8;100,0	100,0	;
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	85,8	70,0;95,2	74,0**	6,5;100,0
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	11,4**	3,0;27,4	26,0**	0,0;93,5
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	2,8**	0,1;14,4	-	;
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	97,2	84,5;99,9	100,0	;
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	2,8**	0,1;15,5	-	;
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	-	;	-	;
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	75,1*	40,3;95,4	100,0	;
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	24,9**	4,6;59,7	-	;
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	5,8**	0,6;20,0	23,6**	0,0;95,0
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	94,2	80,0;99,4	76,4**	..;..
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	88,6	70,3;97,6	100,0	;
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	11,4**	2,4;29,7	-	;
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	-	;	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui, souvent
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui, parfois
-	;	-	;	-	;	6,9**	0,1;34,4	-	;	-	;	-	;	Oui, une seule fois
100,0	;	100,0	;	100,0	;	93,1	65,6;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	76,6*	42,8;95,8	100,0	;	100,0	;	76,0**	14,6;99,8	Oui, toujours
-	;	-	;	-	;	23,4**	4,2;57,2	-	;	-	;	-	;	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	24,0**	0,2;85,4	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	92,2	59,6;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui, toujours
-	;	-	;	-	;	7,8**	0,1;40,4	-	;	-	;	-	;	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]
100,0	;	-	;	-	;	48,2**	2,8;96,3	100,0	;	-	;	100,0	;	Oui
-	;	-	;	100,0	;	51,8**	3,7;97,2	-	;	-	;	-	;	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	28,2**	0,4;88,5	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	71,8**	11,5;99,6	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	81,7*	44,5;98,3	100,0	;	-	;	71,8**	11,5;99,6	Oui, tout à fait
-	;	-	;	-	;	18,3**	1,7;55,5	-	;	-	;	28,2**	0,4;88,5	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	78,8	60,0;91,5	100,0	;
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	21,2**	8,5;40,0	-	;
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	20,4**	8,5;37,8	-	;
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	79,6	62,2;91,5	100,0	;
Médecin spécialiste[p]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	9,2**	1,7;25,5	-	;
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	90,8	74,5;98,3	100,0	;
Infirmière pivot en oncologie[p]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	18,1**	7,0;35,1	23,6**	0,0;95,0
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	81,9	64,9;93,0	76,4**	..;..
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	3,0**	0,0;17,5	-	;
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	97,0	82,5;100,0	100,0	;
CLSC[p]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	27,5**	12,3;47,7	50,5**	1,3;98,8
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	72,5	52,3;87,7	49,5**	1,2;98,7
Urgence d'un hôpital[p]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	26,9**	14,0;43,4	26,0**	0,0;93,5
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	73,1	56,6;86,0	74,0**	6,5;100,0
Unité de soins d'un hôpital[p]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	8,8**	1,5;25,4	-	;
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	91,2	74,6;98,5	100,0	;
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	-	;	-	;
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	100,0	;	100,0	;
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	-	;	-	;
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	100,0	;	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]
64,9**	4,6;99,7	63,0**	3,8;99,6	58,2**	11,1;95,5	77,2*	44,2;95,8	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui
35,1**	0,3;95,4	37,0**	0,4;96,2	41,8**	4,5;88,9	22,8**	4,2;55,8	-	;	-	;	-	;	Non
														Médecin de famille[p]
-	;	37,0**	0,3;96,7	-	;	24,2**	4,8;57,2	55,9**	1,2;99,6	-	;	47,8**	2,8;96,2	Oui
100,0	;	63,0**	3,3;99,7	100,0	;	75,8*	42,8;95,2	44,1**	0,4;98,8	100,0	;	52,2**	3,8;97,2	Non
														Médecin spécialiste[p]
29,9**	0,1;95,3	-	;	-	;	-	;	55,9**	1,2;99,6	-	;	28,2**	0,2;91,7	Oui
70,1**	4,7;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	44,1**	0,4;98,8	100,0	;	71,8**	8,3;99,8	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p]
-	;	25,9**	0,1;91,5	15,7**	0,0;79,7	22,8**	4,1;56,3	-	;	100,0	;	-	;	Oui
100,0	;	74,1**	8,5;99,9	84,3*	20,3;100,0	77,2*	43,7;95,9	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
														Info-Santé[p]
-	;	-	;	-	;	8,6**	0,1;44,2	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	91,4	55,8;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														CLSC[p]
35,1**	0,3;95,4	-	;	32,9**	1,7;86,0	30,6**	8,2;62,9	-	;	-	;	24,0**	0,2;85,4	Oui
64,9**	4,6;99,7	100,0	;	67,1**	14,0;98,3	69,4*	37,1;91,8	100,0	;	100,0	;	76,0**	14,6;99,8	Non
														Urgence d'un hôpital[p]
-	;	-	;	25,3**	0,4;84,4	40,3**	14,6;70,8	100,0	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	74,7**	15,6;99,6	59,7*	29,2;85,4	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p]
-	;	-	;	-	;	8,6**	0,1;44,2	100,0	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	91,4	55,8;99,9	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autre contact
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	74,8	53,9;89,7	100,0	;
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	14,1**	3,7;33,4	-	;
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	11,1**	2,4;28,7	-	;
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	55,8*	35,1;75,0	23,6**	0,0;95,0
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	3,3**	0,1;18,4	26,0**	0,0;93,5
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	40,9*	22,6;61,3	50,5**	1,3;98,8
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	51,2*	31,2;70,9	34,0**	0,0;98,7
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	17,9**	4,6;41,3	66,0**	1,3;100,0
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	30,9**	13,7;53,1	-	;
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	39,6*	20,9;60,9	-	;
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	18,0**	5,7;38,4	34,0**	0,0;98,7
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	42,3*	23,3;63,3	66,0**	1,3;100,0
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	58,2*	39,2;75,6	100,0	;
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	10,8**	2,1;29,5	-	;
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	31,0**	15,7;50,1	-	;
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	66,9	45,6;84,1	100,0	;
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	15,3**	4,0;35,8	-	;
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	17,8**	6,2;36,4	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
46,0**	0,3;99,2	100,0	;	78,1**	21,5;99,7	67,3*	33,3;91,5	100,0	;	-	;	64,9**	4,8;99,6	Oui, tout à fait
-	;	-	;	21,9**	0,3;78,5	24,2**	4,7;57,5	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
54,0**	0,8;99,7	-	;	-	;	8,6**	0,2;41,7	-	;	-	;	35,1**	0,4;95,2	Non
														La sexualité[p]
64,9**	4,6;99,7	100,0	;	74,0**	13,3;99,7	41,4**	11,2;77,4	44,1**	0,4;98,8	-	;	64,9**	4,8;99,6	Oui, tout à fait
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
35,1**	0,3;95,4	-	;	26,0**	0,3;86,7	58,6**	22,6;88,8	55,9**	1,2;99,6	-	;	35,1**	0,4;95,2	Non
														Les émotions[p]
35,1**	0,3;95,4	100,0	;	72,7**	14,1;99,5	49,4**	19,4;79,7	-	;	-	;	64,9**	4,8;99,6	Oui, tout à fait
-	;	-	;	-	;	25,9**	5,4;59,7	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
64,9**	4,6;99,7	-	;	27,3**	0,5;85,9	24,7**	4,5;59,4	100,0	;	-	;	35,1**	0,4;95,2	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
35,1**	0,3;95,4	63,0**	3,8;99,6	58,2**	11,1;95,5	30,8**	6,0;68,6	-	;	-	;	64,9**	4,8;99,6	Oui, tout à fait
29,9**	0,1;95,3	37,0**	0,4;96,2	-	;	10,2**	0,2;46,5	100,0	;	-	;	-	;	Oui, en partie
35,1**	0,3;95,4	-	;	41,8**	4,5;88,9	59,1**	23,6;88,6	-	;	-	;	35,1**	0,4;95,2	Non
														Les besoins alimentaires[p]
35,1**	0,3;95,4	100,0	;	58,2**	11,1;95,5	44,7**	15,0;77,5	44,1**	0,4;98,8	-	;	70,1**	6,9;99,8	Oui, tout à fait
-	;	-	;	19,9**	0,2;76,9	8,9**	0,2;40,8	55,9**	1,2;99,6	-	;	-	;	Oui, en partie
64,9**	4,6;99,7	-	;	21,9**	0,3;78,5	46,3**	15,8;79,1	-	;	-	;	29,9**	0,2;93,1	Non
														Les activités courantes[p]
35,1**	0,3;95,4	100,0	;	72,7**	14,1;99,5	53,1**	19,8;84,4	44,1**	0,4;98,8	-	;	100,0	;	Oui, tout à fait
-	;	-	;	27,3**	0,5;85,9	18,8**	2,3;53,4	55,9**	1,2;99,6	-	;	-	;	Oui, en partie
64,9**	4,6;99,7	-	;	-	;	28,1**	5,2;65,1	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	90,6	73,0;98,4	100,0	;
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	9,4**	1,6;27,0	-	;
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	-	;	-	;
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	78,2	58,0;91,7	74,0**	6,5;100,0
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	19,0**	6,7;38,2	26,0**	0,0;93,5
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	-	;	-	;
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	2,8**	0,1;15,5	-	;
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	79,7	61,7;91,9	100,0	;
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	11,8**	3,2;27,7	-	;
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	8,5**	1,9;22,6	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
64,9**	4,6;99,7	100,0	;	80,1*	23,1;99,8	92,2	59,7;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui, tout à fait
35,1**	0,3;95,4	-	;	19,9**	0,2;76,9	7,8**	0,1;40,3	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
35,1**	0,3;95,4	63,0**	3,8;99,6	78,1**	21,5;99,7	83,6	49,2;98,4	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Toujours
64,9**	4,6;99,7	37,0**	0,4;96,2	21,9**	0,3;78,5	8,6**	0,1;44,2	-	;	-	;	-	;	La plupart du temps
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	À l'occasion
-	;	-	;	-	;	7,8**	0,1;40,4	-	;	-	;	-	;	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
100,0	;	100,0	;	58,2**	11,1;95,5	69,5*	36,2;92,2	100,0	;	-	;	100,0	;	Oui, tout à fait
-	;	-	;	41,8**	4,5;88,9	14,2**	1,5;44,6	-	;	-	;	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	16,4**	1,7;50,0	-	;	100,0	;	-	;	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	85,2	66,8;95,7	76,4**	..;..
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	11,4**	2,6;28,9	23,6**	0,0;95,0
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	3,3**	0,1;18,7	-	;
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	96,4	80,6;99,9	100,0	;
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	3,6**	0,1;19,4	-	;
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	-	;	-	;
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	86,7	55,1;98,9	100,0	;
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	7,0**	0,1;37,7	-	;
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	6,3**	0,0;38,4	-	;
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	55,1*	30,8;77,7	-	;
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	36,5**	15,8;61,7	47,6**	0,5;99,2
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	8,4**	1,0;27,2	52,4**	0,8;99,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
100,0	;	73,0**	11,0;99,8	100,0	;	85,0	52,6;98,6	100,0	;	100,0	;	71,8**	8,3;99,8	Aucun report
-	;	27,0**	0,2;89,0	-	;	15,0**	1,4;47,4	-	;	-	;	-	;	Un report
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	28,2**	0,2;91,7	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	91,4	58,3;99,8	100,0	;	-	;	100,0	;	Aucun report
-	;	-	;	-	;	8,6**	0,2;41,7	-	;	-	;	-	;	Un report
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
-	;	-	;	58,9**	5,9;98,3	100,0	;	100,0	;	-	;	-	;	Aucun report
-	;	-	;	21,5**	0,1;85,7	-	;	-	;	-	;	-	;	Un report
-	;	-	;	19,5**	0,0;87,5	-	;	-	;	-	;	-	;	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
-	;	100,0	;	38,2**	0,1;98,9	68,7*	33,2;92,8	-	;	-	;	100,0	;	Aucun report
100,0	;	-	;	61,8**	1,1;99,9	31,3**	7,2;66,8	-	;	100,0	;	-	;	Un report
-	;	-	;	-	;	-	;	100,0	;	-	;	-	;	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	5,4**	0,5;19,4	-	;
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	2,8**	0,1;15,1	-	;
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	91,8	77,2;98,4	100,0	;
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	38,6*	21,7;57,7	100,0	;
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	5,6**	0,6;20,1	-	;
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	55,8*	37,9;72,7	-	;
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	51,6*	33,6;69,2	49,5**	1,2;98,7
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	3,1**	0,1;16,8	-	;
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	45,3*	27,6;64,0	50,5**	1,3;98,8
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	6,4**	0,8;21,2	-	;
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	6,0**	0,7;20,4	-	;
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	87,6	71,1;96,6	100,0	;
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	12,1**	3,5;27,8	26,0**	0,0;93,5
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	-	;	-	;
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	87,9	72,2;96,5	74,0**	6,5;100,0
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	27,7**	13,5;46,2	23,6**	0,0;95,0
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	2,7**	0,1;15,0	-	;
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	69,6	51,3;84,2	76,4**	..;..

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	-	;	-	;	7,8**	0,2;37,8	44,1**	0,4;98,8	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	7,8**	0,1;40,3	-	;	-	;	-	;	Non, mais il aurait souhaité le consulter
100,0	;	100,0	;	100,0	;	84,4	51,5;98,4	55,9**	1,2;99,6	100,0	;	100,0	;	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
35,1**	0,3;95,4	37,0**	0,3;96,7	23,1**	0,1;87,6	16,4**	1,9;48,9	44,1**	0,4;98,8	-	;	76,0**	14,6;99,8	Oui
-	;	-	;	-	;	15,3**	1,7;46,9	-	;	-	;	-	;	Non, mais il aurait souhaité le consulter
64,9**	4,6;99,7	63,0**	3,3;99,7	76,9**	12,4;99,9	68,3*	36,1;91,1	55,9**	1,2;99,6	100,0	;	24,0**	0,2;85,4	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
29,9**	0,1;95,3	25,9**	0,1;91,5	74,7**	15,6;99,6	63,1*	32,9;87,1	44,1**	0,4;98,8	-	;	35,1**	0,4;95,2	Oui
-	;	-	;	-	;	8,6**	0,2;41,7	-	;	-	;	-	;	Non, mais il aurait souhaité le consulter
70,1**	4,7;99,9	74,1**	8,5;99,9	25,3**	0,4;84,4	28,3**	8,2;57,9	55,9**	1,2;99,6	100,0	;	64,9**	4,8;99,6	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
-	;	-	;	-	;	7,6**	0,2;33,9	-	;	-	;	35,1**	0,4;95,2	Oui
-	;	-	;	-	;	15,6**	1,4;49,6	-	;	-	;	-	;	Non, mais il aurait souhaité le consulter
100,0	;	100,0	;	100,0	;	76,9*	43,7;95,7	100,0	;	100,0	;	64,9**	4,8;99,6	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
-	;	-	;	21,5**	0,1;85,7	7,6**	0,2;33,9	-	;	-	;	35,1**	0,4;95,2	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non, mais il aurait souhaité le consulter
100,0	;	100,0	;	78,5**	14,3;99,9	92,4	66,1;99,8	100,0	;	100,0	;	64,9**	4,8;99,6	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
35,1**	0,3;95,4	-	;	15,7**	0,0;79,7	39,1**	13,6;70,1	-	;	-	;	43,7**	2,4;94,5	Oui
-	;	-	;	-	;	7,6**	0,2;33,9	-	;	-	;	-	;	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
64,9**	4,6;99,7	100,0	;	84,3*	20,3;100,0	53,3**	23,9;81,1	100,0	;	100,0	;	56,3**	5,5;97,6	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	10,7**	3,1;24,8	49,5**	1,2;98,7
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	14,2**	4,6;30,5	-	;
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	75,1	57,5;88,2	50,5**	1,3;98,8
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	13,5**	4,3;29,5	26,0**	0,0;93,5
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	2,8**	0,1;14,8	-	;
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	83,7	67,0;94,1	74,0**	6,5;100,0
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	30,5**	14,7;50,6	26,0**	0,0;93,5
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	9,8**	1,8;27,5	-	;
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	59,7	40,3;77,1	74,0**	6,5;100,0
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	37,5*	21,0;56,5	49,5**	1,2;98,7
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	9,1**	1,6;26,0	-	;
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	53,4*	34,6;71,4	50,5**	1,3;98,8
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	10,3**	2,5;26,0	23,6**	0,0;95,0
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	11,9**	3,1;28,5	-	;
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	77,8	59,7;90,5	76,4**	..;..
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	17,1**	6,1;34,7	23,6**	0,0;95,0
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	2,9**	0,1;15,9	-	;
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	80,1	61,6;92,3	76,4**	..;..

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
-	;	-	;	-	;	15,3**	1,8;45,8	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	19,9**	0,2;76,9	15,6**	1,4;49,6	-	;	-	;	47,8**	2,8;96,2	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
100,0	;	100,0	;	80,1*	23,1;99,8	69,1*	35,9;92,0	100,0	;	100,0	;	52,2**	3,8;97,2	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
-	;	-	;	-	;	29,5**	7,8;61,6	-	;	-	;	-	;	Oui
29,9**	0,1;95,3	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
70,1**	4,7;99,9	100,0	;	100,0	;	70,5*	38,4;92,2	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
29,9**	0,1;95,3	37,0**	0,4;96,2	27,3**	0,5;85,9	30,0**	7,5;63,2	-	;	-	;	64,9**	4,0;99,8	Oui
-	;	-	;	-	;	17,2**	1,4;54,5	55,9**	1,2;99,6	-	;	-	;	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
70,1**	4,7;99,9	63,0**	3,8;99,6	72,7**	14,1;99,5	52,9**	20,3;83,7	44,1**	0,4;98,8	100,0	;	35,1**	0,2;96,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
64,9**	4,6;99,7	-	;	-	;	53,3**	22,3;82,5	100,0	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	24,7**	4,7;58,9	-	;	-	;	-	;	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
35,1**	0,3;95,4	100,0	;	100,0	;	22,0**	4,1;54,3	-	;	100,0	;	100,0	;	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
-	;	-	;	15,7**	0,0;79,7	7,8**	0,1;40,3	-	;	-	;	19,7**	0,0;84,6	Oui
29,9**	0,1;95,3	-	;	-	;	16,1**	2,1;46,6	55,9**	1,2;99,6	-	;	-	;	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
70,1**	4,7;99,9	100,0	;	84,3*	20,3;100,0	76,1*	44,5;94,8	44,1**	0,4;98,8	100,0	;	80,3**	15,4;100,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
-	;	50,0**	0,6;99,4	15,7**	0,0;79,7	13,6**	1,7;41,0	-	;	-	;	35,1**	0,4;95,2	Oui
-	;	-	;	-	;	7,8**	0,1;40,4	-	;	-	;	-	;	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
100,0	;	50,0**	0,6;99,4	84,3*	20,3;100,0	78,6	47,6;95,9	100,0	;	100,0	;	64,9**	4,8;99,6	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	..	;	..	;
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	..	;	..	;
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	-	;	-	;
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	-	;	-	;
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	-	;	-	;
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	-	;	-	;
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	-	;	-	;
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	-	;	-	;
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	-	;	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	-	;	-	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	-	;	-	;
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	-	;	-	;
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	-	;	-	;
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	-	;	-	;
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	-	;	-	;
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	-	;	-	;
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	-	;	-	;
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	-	;	-	;
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	-	;	-	;
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	-	;	-	;
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	-	;	-	;
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	-	;	-	;
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	-	;	-	;
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	-	;	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Oui
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Psychologue
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Travailleur social
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Médicaments
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Services de transport
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Services d'aide à domicile
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Soins infirmiers à domicile
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Autres services ou ressources
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	100,0	;	100,0	;
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	-	;	-	;
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	43,6*	26,1;62,5	50,5**	1,3;98,8
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	25,9**	12,5;43,7	49,5**	1,2;98,7
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	14,6**	5,2;30,2	-	;
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	15,9**	5,7;32,3	-	;
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	29,8**	14,6;49,1	-	;
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	47,1*	28,2;66,6	100,0	;
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	6,4**	0,7;21,9	-	;
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	16,8**	6,2;33,6	-	;
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	8,1**	1,3;24,1	-	;
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	3,2**	0,1;16,9	-	;
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	11,9**	3,3;27,7	-	;
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	5,4**	0,6;19,3	-	;
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	56,3*	38,1;73,3	66,0**	1,3;100,0
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	15,1**	4,6;33,2	34,0**	0,0;98,7
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	-	;	-	;
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	2,3**	0,1;11,6	-	;
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	97,7	88,4;99,9	100,0	;
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	91,9	76,7;98,5	100,0	;
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	5,3**	0,5;18,9	-	;
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	2,9**	0,0;16,3	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
64,9**	4,6;99,7	18,9**	0,1;81,1	64,5**	11,1;98,3	39,5**	13,6;70,8	44,1**	0,4;98,8	-	;	40,2**	3,2;89,8	Médecin spécialiste du cancer
-	;	-	;	15,7**	0,0;79,7	31,3**	8,1;64,8	55,9**	1,2;99,6	-	;	36,9**	2,1;89,1	Médecin de famille
35,1**	0,3;95,4	54,1**	5,0;97,1	-	;	7,2**	0,2;33,2	-	;	-	;	22,9**	0,2;84,5	Autre médecin spécialiste
-	;	27,0**	0,3;87,8	19,9**	0,2;76,9	22,0**	4,1;54,1	-	;	100,0	;	-	;	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
-	;	18,9**	0,1;81,1	64,5**	11,1;98,3	31,7**	9,0;63,6	-	;	-	;	41,4**	3,3;90,7	Médecin spécialiste du cancer
-	;	27,0**	0,2;90,7	15,7**	0,0;79,7	46,3**	17,2;77,4	100,0	;	100,0	;	58,6**	9,3;96,7	Médecin de famille
54,0**	0,8;99,7	27,0**	0,2;89,0	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Autre médecin spécialiste
46,0**	0,3;99,2	27,0**	0,3;87,8	19,9**	0,2;76,9	22,0**	4,1;54,1	-	;	-	;	-	;	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
-	;	-	;	-	;	7,8**	0,1;40,3	-	;	-	;	36,9**	2,6;87,8	Au besoin
-	;	-	;	-	;	-	;	55,9**	1,2;99,6	-	;	-	;	À tous les mois
-	;	-	;	19,9**	0,2;76,9	8,6**	0,1;42,2	44,1**	0,4;98,8	-	;	21,7**	0,3;79,7	À tous les 2 ou 3 mois
-	;	45,9**	2,4;95,7	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	À tous les 4 mois
46,0**	0,3;99,2	54,1**	4,3;97,6	80,1*	23,1;99,8	67,3*	35,2;90,5	-	;	100,0	;	18,5**	0,2;75,6	À tous les 6 mois
54,0**	0,8;99,7	-	;	-	;	16,4**	1,7;49,7	-	;	-	;	22,9**	0,2;84,5	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Trop long
-	;	18,9**	0,1;81,1	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Trop court
100,0	;	81,1**	18,9;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	85,8	53,1;98,8	100,0	;	-	;	100,0	;	Tout à fait capable
-	;	-	;	-	;	14,2**	1,2;46,9	-	;	-	;	-	;	En partie capable
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	100,0	;	-	;	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	64,6	45,8;80,7	34,0**	0,0;98,7
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	23,0**	9,6;42,1	66,0**	1,3;100,0
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	12,4**	3,3;29,4	-	;
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	54,7**	21,1;85,3	100,0	;
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	45,3**	14,7;78,9	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
100,0	;	45,9**	2,9;95,0	78,1**	21,5;99,7	69,5*	37,7;91,5	100,0	;	-	;	52,6**	3,7;97,4	Oui, tout à fait
-	;	54,1**	5,0;97,1	-	;	22,8**	4,6;54,5	-	;	-	;	21,8**	0,1;83,7	oui, en partie
-	;	-	;	21,9**	0,3;78,5	7,8**	0,1;40,3	-	;	100,0	;	25,6**	0,2;87,2	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
-	;	-	;	62,9**	4,0;99,6	33,7**	0,3;94,9	100,0	;	-	;	100,0	;	Oui
100,0	;	-	;	37,1**	0,4;96,0	66,3**	5,1;99,7	-	;	-	;	-	;	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	15,8**	5,8;31,8	-	;
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	56,4*	37,8;73,8	100,0	;
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	27,8**	13,6;46,3	-	;
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	17,8**	6,7;35,0	-	;
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	44,3*	27,1;62,5	26,0**	0,0;93,5
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	38,0*	21,7;56,4	74,0**	6,5;100,0
Modification de l'alimentation[p]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	36,8*	21,6;54,1	23,6**	0,0;95,0
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	29,5**	15,8;46,6	50,5**	1,3;98,8
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	33,7*	18,6;51,7	26,0**	0,0;93,5
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	22,4**	10,6;38,7	-	;
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	13,4**	4,5;28,8	49,5**	1,2;98,7
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	64,2	47,5;78,7	50,5**	1,3;98,8
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	-	;	-	;
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	9,3**	1,9;25,3	23,6**	0,0;95,0
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	90,7	74,7;98,1	76,4**	..;..
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	2,4**	0,0;14,0	-	;
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	11,0**	2,1;29,8	50,5**	1,3;98,8
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	86,6	66,9;96,9	49,5**	1,2;98,7
Gestion du stress[p]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	41,2*	25,4;58,5	-	;
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	31,0**	16,2;49,3	-	;
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	27,8**	14,4;44,8	100,0	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p]
35,1**	0,3;95,4	18,9**	0,1;81,1	37,6**	2,3;89,4	15,6**	1,8;46,5	-	;	-	;	-	;	Oui
29,9**	0,1;95,3	27,0**	0,2;89,0	19,9**	0,2;76,9	46,3**	17,5;77,1	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
35,1**	0,3;95,4	54,1**	4,3;97,6	42,6**	3,8;90,9	38,1**	12,4;70,0	-	;	-	;	-	;	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
35,1**	0,3;95,4	27,0**	0,3;87,8	21,9**	0,3;78,5	16,4**	1,7;49,7	-	;	55,4**	1,0;99,7	-	;	Oui
35,1**	0,3;95,4	45,9**	2,4;95,7	25,3**	0,4;84,4	39,1**	12,7;71,5	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
29,9**	0,1;95,3	27,0**	0,2;90,7	52,8**	6,2;95,6	44,5**	17,0;74,7	-	;	44,6**	0,3;99,0	-	;	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p]
64,9**	4,6;99,7	-	;	74,7**	15,6;99,6	23,9**	4,5;57,6	55,9**	1,2;99,6	-	;	55,4**	6,4;96,8	Oui
-	;	54,1**	5,0;97,1	-	;	22,8**	4,5;54,7	44,1**	0,4;98,8	55,4**	1,0;99,7	44,6**	3,2;93,6	Non
35,1**	0,3;95,4	45,9**	2,9;95,0	25,3**	0,4;84,4	53,3**	22,6;82,2	-	;	44,6**	0,3;99,0	-	;	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
29,9**	0,1;95,3	-	;	41,0**	3,0;91,1	25,0**	5,5;57,2	44,1**	0,4;98,8	55,4**	1,0;99,7	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	7,2**	0,2;33,2	-	;	-	;	52,6**	4,9;96,5	Non
70,1**	4,7;99,9	100,0	;	59,0**	8,9;97,0	67,8*	36,5;90,5	55,9**	1,2;99,6	44,6**	0,3;99,0	47,4**	3,5;95,1	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	25,3**	0,4;84,4	-	;	-	;	-	;	27,0**	0,2;90,3	Non
100,0	;	100,0	;	74,7**	15,6;99,6	100,0	;	100,0	;	100,0	;	73,0**	9,7;99,8	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
-	;	-	;	-	;	-	;	44,1**	0,4;98,8	-	;	-	;	Oui
-	;	-	;	-	;	8,6**	0,1;44,2	-	;	-	;	27,0**	0,2;90,3	Non
100,0	;	100,0	;	100,0	;	91,4	55,8;99,9	55,9**	1,2;99,6	100,0	;	73,0**	9,7;99,8	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p]
35,1**	0,3;95,4	27,0**	0,3;87,8	58,2**	11,1;95,5	47,3**	18,5;77,5	44,1**	0,4;98,8	55,4**	1,0;99,7	47,4**	2,6;96,3	Oui
-	;	27,0**	0,2;89,0	21,9**	0,3;78,5	39,9**	13,4;71,8	55,9**	1,2;99,6	44,6**	0,3;99,0	52,6**	3,7;97,4	Non
64,9**	4,6;99,7	45,9**	2,5;95,5	19,9**	0,2;76,9	12,8**	2,6;33,4	-	;	-	;	-	;	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	54,5*	36,1;72,1	23,6**	0,0;95,0
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	20,9**	8,7;38,9	50,5**	1,3;98,8
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	24,6**	11,6;42,1	26,0**	0,0;93,5
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	-	;	-	;
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	100,0	;	100,0	;
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	-	;	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	100,0	;	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]
35,1**	0,3;95,4	-	;	74,7**	15,6;99,6	70,3*	35,7;93,2	44,1**	0,4;98,8	55,4**	1,0;99,7	77,1**	15,5;99,8	Oui
-	;	45,9**	2,4;95,7	-	;	7,8**	0,1;40,4	55,9**	1,2;99,6	44,6**	0,3;99,0	22,9**	0,2;84,5	Non
64,9**	4,6;99,7	54,1**	4,3;97,6	25,3**	0,4;84,4	22,0**	3,7;55,5	-	;	-	;	-	;	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autre
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	55,1*	27,2;80,8	-	;
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	44,9**	19,2;72,8	-	;
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	..	;	..	;
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	..	;	..	;
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	33,5**	11,7;62,0	-	;
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	66,5*	38,0;88,3	-	;
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	..	;	..	;
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	..	;	..	;
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	24,3**	6,3;53,3	-	;
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	75,7	46,7;93,7	-	;
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	54,6*	28,3;79,1	-	;
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	45,4**	20,9;71,7	-	;
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	60,1*	36,0;81,1	-	;
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	39,9**	18,9;64,0	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
-	;	100,0	;	62,9**	4,0;99,6	33,6**	3,9;79,3	100,0	;	100,0	;	41,2**	0,3;98,4	Oui
-	;	-	;	37,1**	0,4;96,0	66,4**	20,7;96,1	-	;	-	;	58,8**	1,6;99,7	Non
														Soutien de la famille ou des amis
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Oui
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
-	;	-	;	58,4**	2,6;99,4	34,3**	2,9;83,5	-	;	-	;	35,1**	0,4;95,2	Oui
-	;	100,0	;	41,6**	0,6;97,4	65,7**	16,5;97,1	100,0	;	100,0	;	64,9**	4,8;99,6	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Oui
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
100,0	;	-	;	-	;	32,3**	2,2;83,1	-	;	-	;	35,1**	0,4;95,2	Oui
-	;	100,0	;	100,0	;	67,7**	16,9;97,8	100,0	;	100,0	;	64,9**	4,8;99,6	Non
														Exemple de l'entourage[p]
54,0**	0,7;99,7	-	;	45,4**	2,5;95,2	62,5**	21,5;93,1	100,0	;	-	;	70,1**	6,9;99,8	Oui
46,0**	0,3;99,3	100,0	;	54,6**	4,8;97,5	37,5**	6,9;78,5	-	;	100,0	;	29,9**	0,2;93,1	Non
														Prière ou soutien spirituel[p]
54,0**	0,7;99,7	-	;	69,4**	9,3;99,6	60,9**	20,1;92,5	-	;	100,0	;	64,9**	4,0;99,8	Oui
46,0**	0,3;99,3	100,0	;	30,6**	0,4;90,7	39,1**	7,5;79,9	100,0	;	-	;	35,1**	0,2;96,0	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24
Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Nord-du-Québec et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			9,8**	2,0;26,5
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	-	;	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	2,6**	0,1;13,7	-	;
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	5,9**	0,7;20,1	-	;
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	41,9*	25,5;59,7	50,5**	1,3;98,8
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	49,5*	33,2;66,0	49,5**	1,2;98,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région															
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
8,3**	1,7;22,8	10,8**	3,0;25,5	14,7**	5,7;29,2	32,0*	20,4;45,6	5,2**	0,5;18,6	5,6**	0,5;20,2	13,5**	3,9;30,7	Ensemble des patients	
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic	
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Mauvaise	
29,9**	0,1;95,3	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Passable	
-	;	-	;	21,9**	0,3;78,5	7,6**	0,2;33,9	-	;	-	;	-	;	Bonne	
35,1**	0,3;95,4	81,1**	18,9;99,9	19,9**	0,2;76,9	38,3**	13,2;69,3	-	;	100,0	;	47,4**	2,6;96,3	Très bonne	
35,1**	0,3;95,4	18,9**	0,1;81,1	58,2**	11,1;95,5	54,1**	24,2;82,0	100,0	;	-	;	52,6**	3,7;97,4	Excellente	

Région 11

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	44,6	43,1 ; 46,1
Femmes	53,9	55,4	53,9 ; 56,9
Âge			
18 à 49 ans	18,9	17,0	13,0 ; 21,6
50 à 59 ans	24,9	26,2	21,6 ; 30,9
60 à 69 ans	29,8	29,8	24,2 ; 35,4
70 ans et plus	26,5	27,0	23,2 ; 30,8
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	92,0	87,9 ; 95,0
Anglais	10,6	8,0*	5,0 ; 12,1
Autres	3,0	-	;
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	40,9	34,8 ; 47,1
Diplôme d'études secondaires	24,7	24,7	19,2 ; 30,1
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	26,5	20,9 ; 32,0
Diplôme d'études universitaires	20,6	7,9*	4,7 ; 12,4
Occupation principale			
En emploi	29,3	23,0	18,2 ; 27,8
Étudiant	1,7	3,7**	1,7 ; 6,9
Retraité	55,8	57,9	53,1 ; 62,8
À la maison	7,2	7,8*	5,0 ; 11,4
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	3,4**	1,7 ; 6,1
Congé de maternité / autres	3,6	4,2**	2,1 ; 7,3
Situation familiale			
Vit seul	24,1	18,7	14,3 ; 23,7
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	59,1	53,4 ; 64,9
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	13,7	10,0 ; 18,1
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	3,6**	1,6 ; 6,8
Autres	4,8	4,9**	2,4 ; 8,8
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	12,0*	8,1 ; 16,9
Revenu suffisant	61,4	57,5	50,9 ; 64,1
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	30,5	24,9 ; 36,1
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	1,2**	0,3 ; 3,4
2	21,1	5,2**	2,7 ; 8,9
3	20,1	7,7*	4,7 ; 11,9
4	19,4	9,1*	5,6 ; 13,6
5 - très défavorisé	17,6	76,9	71,3 ; 82,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	12,0*	8,3 ; 16,7	11,9**	6,3 ; 19,8	12,2*	7,4 ; 18,4
Génital féminin	5,5	...	10,2	5,4*	3,1 ; 8,5	...	;	9,7*	5,6 ; 15,4
Prostate	15,9	34,4	...	14,6	11,3 ; 18,4	32,6	24,9 ; 40,4	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	6,2*	3,5 ; 10,0	7,5**	3,0 ; 14,8	5,2**	2,3 ; 9,9
Sein	26,5	0,4**	48,8	27,6	23,4 ; 31,9	0,7**	0,0 ; 4,1	49,3	41,9 ; 56,7
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	9,0*	5,8 ; 13,1	10,7**	5,4 ; 18,7	7,6**	4,1 ; 12,7
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	6,2**	3,4 ; 10,1	9,8**	4,7 ; 17,6	3,2**	1,1 ; 7,3
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	19,0	14,3 ; 24,5	26,7*	18,8 ; 35,9	12,8*	7,5 ; 20,0
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	88,1	83,2 ; 91,9	89,6	82,2 ; 94,7	86,8	80,1 ; 92,0
Récidive	7,4	7,5	7,3	5,5**	2,9 ; 9,3	3,0**	0,6 ; 8,6	7,5**	3,7 ; 13,4
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	6,4*	3,7 ; 10,3	7,4**	3,2 ; 14,1	5,6**	2,5 ; 10,8
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	9,0*	5,6 ; 13,6	10,7**	5,3 ; 18,5	7,6**	3,8 ; 13,4
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	22,8	18,0 ; 27,6	8,8**	4,3 ; 15,6	34,1	26,9 ; 41,4
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	68,2	62,7 ; 73,7	80,6	71,6 ; 87,7	58,2	50,5 ; 66,0
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	52,8	46,2 ; 59,4	58,8	48,5 ; 69,1	48,1	39,8 ; 56,5
Non	58,8	56,6	60,7	47,2	40,6 ; 53,8	41,2	30,9 ; 51,5	51,9	43,5 ; 60,2
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	95,8	92,7 ; 97,9	95,2	89,4 ; 98,4	96,3	92,2 ; 98,6
Non	8,3	8,5	8,0	4,2**	2,1 ; 7,3	4,8**	1,6 ; 10,6	3,7**	1,4 ; 7,8
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	15,5*	11,1 ; 20,8	13,9**	7,7 ; 22,5	16,8*	11,0 ; 24,1
Très bon	29,2	29,3	29,1	25,1	20,0 ; 30,2	24,3*	16,1 ; 34,2	25,7	19,3 ; 32,9
Bon	34,9	34,2	35,5	32,2	26,5 ; 37,9	31,7	22,7 ; 40,8	32,5	24,8 ; 40,2
Moyen	18,8	17,8	19,6	23,2	17,9 ; 28,6	24,1*	16,4 ; 33,3	22,5*	15,9 ; 30,3
Mauvais	5,6	5,7	5,5	4,0**	1,9 ; 7,3	6,0**	2,3 ; 12,3	2,4**	0,6 ; 6,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p]
12,0*	8,3 ; 16,7	6,5**	1,3 ; 18,4	9,8**	4,1 ; 18,9	13,4**	6,3 ; 23,9	16,1**	7,6 ; 28,6	Colorectal
5,4*	3,1 ; 8,5	5,6**	1,2 ; 15,4	7,7**	2,9 ; 16,0	4,6**	1,2 ; 11,6	3,8**	0,9 ; 10,4	Génital féminin
14,6	11,3 ; 18,4	-	;	9,5**	3,7 ; 19,2	20,9*	12,6 ; 31,4	21,7*	14,8 ; 29,9	Prostate
6,2*	3,5 ; 10,0	10,9**	3,1 ; 25,3	6,1**	1,7 ; 14,9	6,6**	2,2 ; 14,7	3,0**	0,3 ; 10,5	Hématopoïétique
27,6	23,4 ; 31,9	39,0*	25,9 ; 53,5	34,8	25,1 ; 44,4	24,2*	16,2 ; 33,8	17,3**	9,0 ; 28,8	Sein
9,0*	5,8 ; 13,1	13,1**	4,3 ; 28,4	12,6**	5,9 ; 22,9	6,2**	2,2 ; 13,6	5,9**	1,6 ; 14,3	ORL (Tête et cou)
6,2**	3,4 ; 10,1	-	;	5,7**	1,6 ; 13,8	6,0**	2,0 ; 13,3	10,7**	4,3 ; 21,2	Broncho-pulmonaire
19,0	14,3 ; 24,5	24,8**	13,2 ; 39,9	13,7**	6,5 ; 24,4	18,1*	10,1 ; 28,8	21,6**	11,4 ; 35,1	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
88,1	83,2 ; 91,9	94,0	83,5 ; 98,8	90,6	81,7 ; 96,1	83,2	72,8 ; 90,8	87,2	76,3 ; 94,3	Premier cancer
5,5**	2,9 ; 9,3	4,1**	0,5 ; 13,7	4,2**	0,8 ; 12,0	9,2**	3,7 ; 18,2	3,7**	0,5 ; 12,5	Récidive
6,4*	3,7 ; 10,3	1,9**	0,0 ; 10,5	5,2**	1,6 ; 12,4	7,6**	2,6 ; 16,7	9,1**	3,2 ; 19,4	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]
9,0*	5,6 ; 13,6	7,9**	2,3 ; 18,6	9,3**	3,4 ; 19,4	9,4**	3,8 ; 18,6	8,9**	2,6 ; 20,9	Sous traitement
22,8	18,0 ; 27,6	28,4*	16,1 ; 43,6	31,7*	20,8 ; 44,2	21,6*	13,4 ; 31,8	12,0**	5,7 ; 21,5	Sans traitement avec médication
68,2	62,7 ; 73,7	63,7	47,9 ; 77,6	59,1	47,7 ; 70,5	69,0	57,4 ; 79,2	79,1	66,3 ; 88,7	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p]
52,8	46,2 ; 59,4	60,7	43,7 ; 76,1	51,6	39,6 ; 63,6	58,8	47,9 ; 69,7	42,1*	27,9 ; 57,3	Oui
47,2	40,6 ; 53,8	39,3*	23,9 ; 56,3	48,4	36,4 ; 60,4	41,2	30,3 ; 52,1	57,9	42,7 ; 72,1	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p]
95,8	92,7 ; 97,9	93,3	80,7 ; 98,8	92,8	83,9 ; 97,6	97,5	91,0 ; 99,7	98,7	93,3 ; 100,0	Oui
4,2**	2,1 ; 7,3	6,7**	1,2 ; 19,3	7,2**	2,4 ; 16,1	2,5**	0,3 ; 9,0	1,3**	0,0 ; 6,7	Non
										Perception de l'état de santé[p]
15,5*	11,1 ; 20,8	15,0**	5,4 ; 30,7	6,6**	2,1 ; 15,0	16,1**	8,4 ; 26,8	24,1*	13,6 ; 37,4	Excellent
25,1	20,0 ; 30,2	18,9**	8,1 ; 34,8	27,4*	18,4 ; 37,8	26,7*	17,2 ; 38,1	24,8*	14,4 ; 38,0	Très bon
32,2	26,5 ; 37,9	39,0*	25,1 ; 54,4	28,8*	19,0 ; 40,3	32,7*	22,6 ; 42,8	30,5*	18,9 ; 44,4	Bon
23,2	17,9 ; 28,6	25,2**	12,5 ; 41,9	28,8*	19,0 ; 40,4	21,1*	12,1 ; 32,6	18,9**	9,1 ; 32,8	Moyen
4,0**	1,9 ; 7,3	1,9**	0,0 ; 10,5	8,5**	3,0 ; 18,1	3,4**	0,6 ; 10,1	1,6**	0,1 ; 7,6	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	45,7	40,0;51,4	52,2*	31,1;72,7
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	54,3	48,6;60,0	47,8*	27,3;68,9
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	40,2	29,1;51,3	37,2**	7,4;77,2
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	21,7*	13,3;32,4	34,0**	6,5;73,5
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	12,6**	6,5;21,2	9,0**	0,1;48,9
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	25,5*	16,6;36,1	19,8**	2,0;57,7
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	32,7	24,7;40,8	13,4**	0,3;57,1
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	13,4*	8,2;20,2	30,3**	6,5;66,2
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	24,6*	17,4;33,0	37,3**	9,4;73,7
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	15,3*	9,9;22,2	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	14,0*	8,1;21,8	18,9**	1,7;57,7
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	53,0	44,6;61,4	51,1**	18,0;83,4
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	19,5*	12,6;28,2	9,5**	0,1;47,0
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	14,1*	8,8;21,1	8,2**	0,0;47,1
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	13,3*	7,5;21,3	31,2**	6,4;68,5
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	81,9	76,2;86,8	83,7	60,9;96,0
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	13,5*	9,3;18,7	12,6**	2,2;35,1
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	4,6**	2,2;8,3	3,7**	0,1;21,3
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	2,6**	1,0;5,3	-	;
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	97,4	94,7;99,0	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
67,2*	40,0;87,8	15,5**	5,8;31,1	22,0**	5,5;49,8	52,5	41,5;63,6	58,7*	36,0;79,1	19,3**	4,3;46,3	59,0	42,9;73,8	Oui
32,8**	12,2;60,0	84,5	68,9;94,2	78,0	50,2;94,5	47,5	36,4;58,5	41,3**	20,9;64,0	80,7	53,7;95,7	41,0*	26,2;57,1	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
28,4**	2,7;74,2	-	;	66,7**	4,9;99,8	53,6*	35,5;71,0	50,5**	15,8;84,9	-	;	30,0**	11,6;54,8	2 semaines et moins
12,2**	0,1;59,3	-	;	-	;	8,9**	1,8;24,1	39,1**	8,5;78,2	-	;	35,5**	14,5;61,6	Plus de 2 semaines à 1 mois
25,4**	2,4;69,7	-	;	33,3**	0,2;95,1	17,8**	6,4;35,7	-	;	50,9**	0,8;99,3	4,3**	0,1;21,5	Plus d'un mois à 3 mois
33,9**	6,0;74,3	100,0	;	-	;	19,7**	8,0;37,1	10,4**	0,2;49,0	49,1**	0,7;99,2	30,2**	11,5;55,4	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
41,5**	3,5;90,5	39,4*	22,6;58,1	45,7**	12,5;82,2	21,9**	10,2;38,3	19,6**	2,0;57,3	44,3**	13,3;79,2	40,7**	18,0;66,7	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
-	;	21,7**	8,9;40,4	-	;	2,5**	0,1;13,0	18,5**	1,7;56,3	17,3**	1,6;53,8	14,9**	2,7;39,9	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
58,5**	9,5;96,5	31,9**	15,3;52,6	10,1**	0,1;49,8	18,3**	8,1;33,3	28,5**	5,0;66,5	24,1**	3,2;63,1	15,4**	2,8;40,7	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	57,3	39,3;74,0	-	;	-	;	5,2**	0,1;27,4	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
-	;	7,0**	0,9;22,8	44,1**	11,6;81,1	-	;	33,4**	6,9;71,5	14,3**	1,1;47,6	23,9**	6,4;51,8	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
49,4**	14,6;84,6	14,5**	1,4;46,1	83,8*	34,2;99,7	75,7	57,6;88,9	57,5**	23,9;86,5	56,1**	16,4;90,5	40,7*	22,7;60,7	2 semaines et moins
22,4**	1,8;65,9	20,0**	3,8;49,9	16,2**	0,3;65,8	14,2**	4,7;30,5	-	;	21,8**	2,2;61,9	35,3**	17,8;56,2	Plus de 2 semaines à 1 mois
-	;	39,3**	14,6;68,9	-	;	7,4**	1,5;20,6	16,2**	1,4;51,4	22,1**	1,5;66,9	14,6**	4,0;33,7	Plus d'un mois à 3 mois
28,2**	3,4;71,4	26,3**	6,4;57,6	-	;	2,6**	0,1;13,7	26,4**	4,9;62,1	-	;	9,4**	1,0;31,2	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
79,6	49,4;96,0	78,2	60,4;90,7	84,5	50,3;98,6	92,3	83,6;97,3	86,1	64,2;97,1	67,7*	35,5;90,8	71,9	55,4;85,0	Oui, tout à fait
20,4**	4,0;50,6	19,3**	7,8;36,7	15,5**	1,4;49,7	3,9**	0,7;11,4	8,8**	0,8;30,5	19,5**	3,3;50,5	20,8**	9,4;36,9	Oui, en partie
-	;	2,5**	0,1;13,2	-	;	3,9**	0,8;11,1	5,1**	0,2;24,2	12,8**	0,6;49,0	7,3**	1,4;20,5	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]
7,9**	0,2;38,4	3,0**	0,1;15,5	-	;	1,4**	0,0;7,4	8,9**	1,2;27,7	-	;	2,5**	0,1;13,1	Oui
92,1	61,6;99,8	97,0	84,5;99,9	100,0	;	98,6	92,6;100,0	91,1	72,3;98,8	100,0	;	97,5	86,9;99,9	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	24,3	19,0;29,6	9,9**	1,8;27,8
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	19,9	15,1;25,4	6,3**	0,6;22,2
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	25,6	20,2;30,9	53,1*	33,3;72,1
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	26,9	21,3;32,6	23,5**	9,4;43,7
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	3,3**	1,5;6,3	7,2**	0,8;24,9
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	-	;	-	;
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	-	;	-	;
Façon d'annoncer le diagnostic[p]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	85,2	80,2;89,3	94,3	78,9;99,5
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	14,8*	10,7;19,8	5,7**	0,5;21,1
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	95,0	91,4;97,5	93,1	77,0;99,2
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	5,0**	2,5;8,6	6,9**	0,8;23,0
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	93,1	89,0;96,0	89,3	69,2;98,2
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	6,9*	4,0;11,0	10,7**	1,8;30,8
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	95,3	91,9;97,6	96,3	79,3;99,9
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	4,7**	2,4;8,1	3,7**	0,1;20,7
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	70,4	64,5;76,3	70,5	47,7;87,7
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	29,6	23,7;35,5	29,5**	12,3;52,3
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	58,4	52,2;64,6	62,1*	40,6;80,6
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	41,6	35,4;47,8	37,9**	19,4;59,4
Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	64,6	56,6;72,6	81,3	54,6;95,9
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	35,4	27,4;43,4	18,7**	4,1;45,4
Contact pour du soutien pratique[3, p, r]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	71,1	65,2;76,9	78,9	55,3;93,6
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	28,9	23,1;34,8	21,1**	6,4;44,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3 . On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
23,1**	5,9;51,3	26,2**	12,7;44,0	41,4**	16,3;70,3	28,2*	18,8;39,3	16,2**	4,6;36,6	22,2**	5,3;50,8	25,6**	13,9;40,5	Médecin de famille
-	;	52,7*	34,5;70,5	10,9**	0,3;48,1	10,0**	3,8;20,3	25,4**	8,5;50,6	46,8**	19,7;75,4	14,8**	5,1;31,1	Médecin spécialiste du cancer
5,6**	0,1;31,0	-	;	21,6**	6,0;47,0	36,9	26,1;48,7	25,0**	8,5;49,6	12,2**	1,6;37,2	22,7**	11,3;38,2	Chirurgien
64,4*	37,1;86,2	21,1**	9,3;37,9	13,9**	1,6;43,0	22,6*	13,5;34,0	33,3**	14,7;56,8	12,8**	0,6;49,0	35,3*	20,8;52,0	Autre médecin spécialiste
6,8**	0,1;34,3	-	;	12,2**	1,6;37,2	2,4**	0,3;8,0	-	;	5,9**	0,1;31,8	1,6**	0,1;8,0	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p]
81,5	53,2;96,4	87,2	72,7;95,7	94,8	69,7;99,9	78,9	68,1;87,3	69,6	46,3;87,3	87,2	51,0;99,4	91,7	80,0;97,7	En personne
18,5**	3,6;46,8	12,8**	4,3;27,3	5,2**	0,1;30,3	21,1*	12,7;31,9	30,4**	12,7;53,7	12,8**	0,6;49,0	8,3**	2,3;20,0	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
100,0	;	100,0	;	83,2	50,3;98,1	94,5	87,4;98,2	91,6	70,8;99,2	100,0	;	95,8	85,0;99,5	Oui
-	;	-	;	16,8**	1,9;49,7	5,5**	1,8;12,6	8,4**	0,8;29,2	-	;	4,2**	0,5;15,0	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
100,0	;	94,9	80,7;99,6	83,2	50,3;98,1	93,3	86,0;97,4	95,7	75,5;99,9	88,9	61,5;99,1	95,3	83,5;99,5	Oui
-	;	5,1**	0,4;19,3	16,8**	1,9;49,7	6,7**	2,6;14,0	4,3**	0,1;24,5	11,1**	0,9;38,5	4,7**	0,5;16,5	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
100,0	;	97,4	85,5;100,0	83,2	50,3;98,1	94,3	87,4;98,0	95,7	75,5;99,9	94,4	69,9;99,9	97,7	88,3;99,9	Oui
-	;	2,6**	0,0;14,5	16,8**	1,9;49,7	5,7**	2,0;12,6	4,3**	0,1;24,5	5,6**	0,1;30,1	2,3**	0,1;11,7	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p]
61,0*	32,6;84,8	75,4	58,0;88,3	89,1	51,9;99,7	76,4	65,5;85,3	65,7*	42,6;84,4	80,3*	44,6;97,6	53,7	38,0;69,0	Oui
39,0**	15,2;67,4	24,6**	11,7;42,0	10,9**	0,3;48,1	23,6*	14,7;34,5	34,3**	15,6;57,4	19,7**	2,4;55,4	46,3*	31,0;62,0	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]
50,6**	23,5;77,4	49,4*	31,3;67,7	78,9	48,0;95,9	64,2	52,4;74,9	63,0*	39,1;83,0	37,6**	14,1;66,5	54,3	38,7;69,3	Oui
49,4**	22,6;76,5	50,6*	32,3;68,7	21,1**	4,1;52,0	35,8*	25,1;47,6	37,0**	17,0;60,9	62,4*	33,5;85,9	45,7*	30,7;61,3	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]
24,6**	2,1;69,0	50,2**	24,5;75,8	75,3*	35,7;96,8	82,1	69,6;91,0	49,2**	21,1;77,7	65,0**	15,9;97,0	45,5*	24,7;67,6	Oui
75,4*	31,0;97,9	49,8**	24,2;75,5	24,7**	3,2;64,3	17,9**	9,0;30,4	50,8**	22,3;78,9	35,0**	3,0;84,1	54,5*	32,4;75,3	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p, r]
60,5*	31,4;84,9	57,3*	37,9;75,2	80,1*	42,5;97,9	84,6	75,0;91,6	78,7	54,9;93,6	72,1*	39,4;93,3	51,6*	34,5;68,4	Oui
39,5**	15,1;68,6	42,7*	24,8;62,1	19,9**	2,1;57,5	15,4**	8,4;25,0	21,3**	6,4;45,1	27,9**	6,7;60,6	48,4*	31,6;65,5	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	15,7*	10,3;22,5	26,3**	8,0;53,7
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	84,3	77,5;89,7	73,7	46,3;92,0
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	40,9	33,2;48,5	60,6*	34,2;83,1
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	59,1	51,5;66,8	39,4**	16,9;65,8
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	7,4**	3,8;12,9	4,6**	0,1;23,1
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	92,6	87,1;96,2	95,4	76,9;99,9
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	8,0**	4,4;13,0	21,3**	5,7;47,3
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	92,0	87,0;95,6	78,7	52,7;94,3
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	11,3*	6,6;17,6	5,5**	0,1;30,2
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	88,7	82,4;93,4	94,5	69,8;99,9
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	1,3**	0,1;5,1	-	;
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	98,7	94,9;99,9	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]
-	;	5,0**	0,1;24,5	23,8**	3,7;60,4	18,6**	9,3;31,6	5,5**	0,1;27,7	18,5**	0,4;69,0	15,7**	4,2;36,3	Oui
100,0	;	95,0	75,5;99,9	76,2*	39,6;96,3	81,4	68,4;90,7	94,5	72,3;99,9	81,5*	31,0;99,6	84,3	63,7;95,8	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
13,4**	0,2;60,4	23,5**	6,5;50,7	58,5**	23,1;88,3	58,3	45,1;71,5	36,7**	12,1;68,0	48,5**	7,9;90,8	7,6**	0,9;25,4	Oui
86,6*	39,6;99,8	76,5	49,3;93,5	41,5**	11,7;76,9	41,7*	28,5;54,9	63,3*	32,0;87,9	51,5**	9,2;92,1	92,4	74,6;99,1	Non
														Psychologue[p]
-	;	6,0**	0,1;30,8	17,6**	1,8;52,6	7,0**	1,8;17,3	12,5**	0,3;53,1	18,5**	0,4;69,0	3,3**	0,1;18,5	Oui
100,0	;	94,0	69,2;99,9	82,4	47,4;98,2	93,0	82,7;98,2	87,5	46,9;99,7	81,5*	31,0;99,6	96,7	81,5;99,9	Non
														Travailleur social[p]
-	;	5,0**	0,1;26,5	-	;	8,7**	2,8;19,4	-	;	35,0**	3,0;84,2	3,3**	0,1;18,5	Oui
100,0	;	95,0	73,5;99,9	100,0	;	91,3	80,6;97,2	100,0	;	65,0**	15,8;97,0	96,7	81,5;99,9	Non
														Médecin[p]
11,2**	0,1;53,0	10,8**	1,2;35,0	7,1**	0,1;36,0	11,7**	4,5;23,5	-	;	16,5**	0,2;70,7	22,1**	7,1;45,5	Oui
88,8	47,0;99,9	89,2	65,0;98,8	92,9	64,0;99,9	88,3	76,5;95,5	100,0	;	83,5*	29,3;99,8	77,9	54,5;92,9	Non
														Autre professionnel de la santé
-	;	-	;	-	;	1,7**	0,0;9,1	-	;	-	;	4,6**	0,1;23,6	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	98,3	90,9;100,0	100,0	;	100,0	;	95,4	76,4;99,9	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	24,2	18,9;29,6	41,3*	21,9;63,0
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	75,8	70,4;81,1	58,7*	37,0;78,1
Médecin spécialiste du cancer[p]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	37,5	31,9;43,1	36,4*	19,3;56,5
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	62,5	56,9;68,1	63,6	43,5;80,7
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	32,7	26,6;38,9	51,7*	29,9;73,1
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	67,3	61,1;73,4	48,3*	26,9;70,1
Autre médecin spécialiste[p]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	13,9*	9,8;18,8	13,3**	3,1;33,2
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	86,1	81,2;90,2	86,7	66,8;96,9
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	3,0**	1,4;5,7	-	;
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	97,0	94,3;98,6	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région															
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients	
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]	
6,1**	0,1;30,3	3,2**	0,1;18,0	45,6**	17,7;75,8	39,8	28,9;51,5	17,2**	4,5;39,7	33,4**	10,6;64,0	4,3**	0,6;14,4	Oui	
93,9	69,7;99,9	96,8	82,0;99,9	54,4**	24,2;82,3	60,2	48,5;71,1	82,8	60,3;95,5	66,6*	36,0;89,4	95,7	85,6;99,4	Non	
														Médecin spécialiste du cancer[p]	
33,2**	10,8;63,2	36,4*	20,3;55,2	59,8**	25,6;88,0	41,1	29,7;52,4	37,5**	18,6;59,5	31,7**	10,3;61,0	29,5*	16,5;45,7	Oui	
66,8*	36,8;89,2	63,6	44,8;79,7	40,2**	12,0;74,4	58,9	47,6;70,3	62,5*	40,5;81,4	68,3*	39,0;89,7	70,5	54,3;83,5	Non	
														Médecin de famille[p]	
13,3**	1,3;42,8	17,0**	6,4;33,8	44,3**	15,5;76,3	36,0*	25,4;47,6	31,3**	14,9;52,2	41,7**	15,4;72,1	27,7**	14,6;44,4	Oui	
86,7	57,2;98,7	83,0	66,2;93,6	55,7**	23,7;84,5	64,0	52,4;74,6	68,7	47,8;85,1	58,3*	27,9;84,6	72,3	55,6;85,4	Non	
														Autre médecin spécialiste[p]	
7,9**	0,2;38,4	3,1**	0,1;17,2	14,3**	1,3;46,0	22,5*	13,5;33,8	12,3**	2,5;32,5	20,0**	3,6;50,9	9,4**	2,4;23,2	Oui	
92,1	61,6;99,8	96,9	82,8;99,9	85,7	54,0;98,7	77,5	66,2;86,5	87,7	67,5;97,5	80,0	49,1;96,4	90,6	76,8;97,6	Non	
														Autre professionnel de la santé[p]	
-	;	2,5**	0,0;14,8	6,0**	0,1;30,9	8,1**	3,1;16,4	-	;	-	;	-	;	Oui	
100,0	;	97,5	85,2;100,0	94,0	69,1;99,9	91,9	83,6;96,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non	

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	82,9	77,7;87,4	84,6	65,9;95,4
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	9,6*	6,4;13,6	3,8**	0,1;21,2
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	7,5*	4,5;11,7	11,6**	2,6;29,9
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	78,4	73,1;83,8	87,6	67,3;97,5
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	10,7*	7,2;15,0	-	;
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	10,9*	7,2;15,7	12,4**	2,5;32,7
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	83,7	77,5;88,8	95,0	74,0;99,9
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	11,8*	7,3;17,7	5,0**	0,1;26,0
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	4,5**	1,9;9,0	-	;
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	60,3	53,3;67,4	80,5	57,2;94,4
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	17,5*	12,1;24,0	4,0**	0,0;24,4
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	22,2	16,3;28,9	15,5**	3,6;37,9
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	35,4	29,5;41,2	46,1*	27,2;65,9
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	20,4	15,2;25,7	10,5**	2,2;27,7
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	19,0	14,2;24,6	15,3**	3,9;36,1
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	12,8*	8,8;17,8	24,7**	9,8;45,8
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	12,4*	8,5;17,3	3,4**	0,0;20,8
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	77,7	66,4;86,7	91,9	53,6;100,0
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	19,4*	10,9;30,7	8,1**	0,0;46,4
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	2,8**	0,6;8,3	-	;
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	15,5	11,3;20,5	26,1**	10,5;48,0
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	84,5	79,5;88,7	73,9	52,0;89,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
68,4*	40,7;88,9	74,2	55,2;88,3	88,2	61,0;98,9	87,3	77,1;94,1	95,7	75,5;99,9	93,0	66,1;99,8	74,2	57,5;86,9	Oui, tout à fait
19,2**	4,0;47,1	17,3**	6,2;34,9	5,2**	0,1;30,3	10,2**	4,4;19,4	-	;	-	;	13,5**	5,1;27,2	Oui, en partie
12,4**	1,4;39,2	8,5**	1,7;23,2	6,6**	0,1;33,5	2,6**	0,3;9,4	4,3**	0,1;24,5	7,0**	0,2;33,9	12,3**	4,0;26,8	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
51,5**	24,6;77,7	68,7	50,9;83,2	55,5*	27,7;80,9	85,0	75,0;92,1	77,1	54,4;92,1	94,4	70,1;99,9	81,0	66,7;91,0	Oui, tout à fait
18,8**	3,4;48,4	16,8**	6,0;34,1	19,5**	4,0;48,2	7,7**	3,2;15,1	12,4**	2,6;32,5	-	;	14,3**	6,0;27,2	Oui, en partie
29,7**	8,7;60,0	14,5**	4,7;31,4	25,0**	6,5;54,2	7,3**	2,7;15,4	10,5**	1,4;32,7	5,6**	0,1;29,9	4,7**	0,5;16,5	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
82,8*	28,5;99,8	71,3	46,5;89,3	74,2*	32,1;97,0	74,6	60,1;85,9	95,2	72,7;99,9	100,0	;	89,5	71,1;98,0	Oui
17,2**	0,2;71,5	14,8**	3,1;37,9	25,8**	3,0;67,9	17,9**	8,5;31,4	4,8**	0,1;27,3	-	;	7,7**	0,9;25,1	Non, il ne voulait pas
-	;	13,8**	2,3;38,6	-	;	7,5**	2,0;18,4	-	;	-	;	2,9**	0,0;16,3	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
47,6**	17,5;79,0	46,0*	26,0;67,1	71,1*	34,7;94,2	60,2	47,1;72,3	63,8*	36,7;85,6	56,0**	25,2;83,7	56,3*	36,4;74,8	Oui, tout à fait
-	;	29,5**	12,9;51,4	28,9**	5,8;65,3	20,3*	11,4;32,0	5,8**	0,1;33,1	22,0**	4,3;53,5	18,8**	6,7;37,7	Oui, en partie
52,4**	21,0;82,5	24,4**	9,9;45,0	-	;	19,6**	10,6;31,5	30,4**	9,9;58,9	22,0**	2,9;58,8	25,0**	9,7;46,7	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
39,9**	16,3;67,5	22,8**	9,6;41,7	46,6**	16,5;78,7	46,0	34,9;57,0	24,2**	8,5;47,4	36,7**	13,2;66,1	21,8**	10,6;37,4	Oui, une infirmière pivot en oncologie
5,9**	0,1;31,9	23,0**	9,4;42,4	23,3**	4,5;56,0	22,1*	13,4;33,1	3,9**	0,1;21,6	30,8**	10,4;58,9	29,5*	16,0;46,2	Oui, un autre professionnel de la santé
26,0**	7,9;53,2	25,4**	11,7;43,9	21,2**	4,0;52,6	21,6*	13,0;32,5	14,4**	3,1;36,6	12,8**	0,6;49,0	15,0**	5,7;29,8	Oui, un membre du personnel administratif
21,0**	4,7;49,5	13,4**	3,5;31,9	8,9**	0,3;38,6	5,6**	1,9;12,4	33,9**	14,6;58,1	12,2**	1,3;39,1	5,0**	0,7;16,2	Oui, un médecin
7,2**	0,2;34,1	15,5**	5,2;32,5	-	;	4,7**	1,4;11,3	23,6**	8,4;46,2	7,4**	0,1;38,2	28,7*	15,5;45,2	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
37,2**	2,5;88,5	69,6*	30,9;94,5	77,0**	23,0;99,4	77,8	54,2;92,9	100,0	;	77,8*	32,3;98,6	74,2*	42,1;94,1	Oui, tout à fait
62,8**	11,5;97,5	21,6**	2,2;61,5	23,0**	0,6;77,0	15,2**	3,0;39,7	-	;	22,2**	1,4;67,7	25,8**	5,9;57,9	Oui, en partie
-	;	8,8**	0,1;45,1	-	;	7,0**	0,8;23,7	-	;	-	;	-	;	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]
23,8**	5,9;53,0	9,8**	1,9;26,7	-	;	15,0*	8,5;23,9	18,8**	4,6;43,9	19,8**	3,3;51,5	12,9**	4,7;26,3	Oui
76,2	47,0;94,1	90,2	73,3;98,1	100,0	;	85,0	76,1;91,5	81,2	56,1;95,4	80,2	48,5;96,7	87,1	73,7;95,3	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	82,2	78,1;85,8	100,0	;
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	17,8	14,2;21,9	-	;
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	29,7	23,6;35,7	2,8**	0,1;14,0
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	70,3	64,3;76,4	97,2	86,0;99,9
Lieu de la chirurgie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	52,4	46,2;58,6	68,6	46,7;85,7
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	47,6	41,4;53,8	31,4**	14,3;53,3
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	74,3	65,3;81,9	83,3	60,3;95,9
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	9,1**	4,8;15,4	-	;
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	16,6*	10,6;24,4	16,7**	4,1;39,7
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	67,2	60,5;73,9	78,7	56,7;92,8
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	13,5*	8,8;19,4	10,0**	1,6;29,3
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	19,3	14,0;25,6	11,3**	2,1;30,7
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p, r]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	97,3	93,8;99,1	95,7	78,2;99,9
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	2,7**	0,9;6,2	4,3**	0,1;21,8
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	86,0	80,3;90,6	95,9	77,7;99,9
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	12,5*	8,1;18,1	4,1**	0,1;22,3
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	1,5**	0,3;4,7	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
80,5	50,9;96,3	44,4*	30,8;58,1	43,4**	19,0;70,5	97,7	91,8;99,8	74,8	51,6;90,8	82,5	55,6;96,5	93,6	81,3;98,9	Oui
19,5**	3,7;49,1	55,6	41,9;69,2	56,6*	29,5;81,0	2,3**	0,2;8,2	25,2**	9,2;48,4	17,5**	3,5;44,4	6,4**	1,1;18,7	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
8,2**	0,1;41,1	-	;	65,7**	18,0;96,6	49,4	38,4;60,5	39,3**	18,0;64,1	6,9**	0,0;39,9	30,6**	16,4;48,2	Oui
91,8	58,9;99,9	100,0	;	34,3**	3,4;82,0	50,6	39,5;61,6	60,7*	35,9;82,0	93,1	60,1;100,0	69,4	51,8;83,6	Non
														Lieu de la chirurgie[p, r]
17,5**	2,1;51,1	13,4**	1,6;41,4	59,8**	13,4;95,2	83,4	73,7;90,6	39,6**	17,8;64,8	30,4**	7,0;65,4	27,4**	14,5;43,7	Hôpital de la région de résidence
82,5	48,9;97,9	86,6	58,6;98,4	40,2**	4,8;86,6	16,6*	9,4;26,3	60,4*	35,2;82,2	69,6*	34,6;93,0	72,6	56,3;85,5	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
100,0	;	55,6**	20,6;86,8	60,1**	3,6;99,3	78,3	60,5;90,7	93,0	62,3;99,9	35,0**	8,5;71,2	74,9	57,0;88,2	Oui, tout à fait
-	;	9,2**	0,2;43,1	-	;	4,6**	0,5;16,1	-	;	48,9**	17,8;80,7	11,1**	3,4;25,0	Oui, en partie
-	;	35,2**	8,2;72,0	39,9**	0,7;96,4	17,1**	6,1;34,6	7,0**	0,1;37,7	16,1**	1,2;52,6	14,0**	4,6;30,0	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
70,9*	39,3;92,2	78,2	46,8;95,8	29,0**	1,4;81,8	64,1	51,4;75,5	71,3*	43,5;90,7	69,2*	35,7;92,2	62,5	45,0;77,9	Oui, tout à fait
7,0**	0,1;37,5	6,3**	0,1;32,7	19,8**	0,4;73,7	12,4**	5,2;23,7	4,7**	0,1;24,8	22,8**	4,2;56,0	20,9**	9,5;37,0	Oui, en partie
22,1**	4,5;52,9	15,5**	1,7;47,3	51,2**	8,2;92,7	23,5*	14,5;34,6	24,0**	6,7;51,3	8,0**	0,1;40,5	16,6**	6,0;33,7	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p, r]
100,0	;	84,5	53,5;98,2	100,0	;	98,6	92,1;100,0	100,0	;	100,0	;	97,6	87,6;99,9	Oui
-	;	15,5**	1,8;46,5	-	;	1,4**	0,0;7,9	-	;	-	;	2,4**	0,1;12,4	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
81,8	46,4;98,0	74,3*	37,3;95,7	100,0	;	83,6	72,4;91,6	77,8	48,7;94,8	82,3	47,1;98,1	89,9	75,7;97,3	Oui, tout à fait
18,2**	2,0;53,6	25,7**	4,3;62,7	-	;	15,2**	7,4;26,3	16,1**	2,8;43,2	17,7**	1,9;52,9	7,5**	1,5;20,7	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	1,2**	0,0;7,0	6,1**	0,1;34,6	-	;	2,6**	0,0;15,2	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	40,9	36,7;45,1	55,1*	35,3;73,8
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	59,1	54,9;63,3	44,9*	26,2;64,7
Lieu de la chimiothérapie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	57,5	49,3;65,6	53,0*	26,8;78,1
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	42,5	34,4;50,7	47,0**	21,9;73,2
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	47,1	37,2;57,0	48,1**	22,9;74,0
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	15,1*	8,7;23,8	16,7**	2,8;44,7
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	37,8	28,4;47,1	35,2**	13,2;63,0
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	78,0	65,6;87,6	93,0	62,5;99,9
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	10,0**	4,1;19,4	7,0**	0,1;37,5
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	12,0**	5,2;22,8	-	;
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	72,3	62,3;81,0	86,6	57,4;98,6
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	19,3*	11,9;28,8	-	;
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	8,3**	3,6;15,9	13,4**	1,4;42,6
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	83,5	74,2;90,5	88,6	61,7;98,9
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	14,4**	7,9;23,3	4,9**	0,1;27,7
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	2,1**	0,2;7,5	6,5**	0,1;33,1
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	88,9	79,8;94,9	92,6	64,7;99,8
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	7,9**	3,1;16,0	7,4**	0,2;35,3
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	3,2**	0,6;9,0	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
43,0**	19,4;69,3	2,9**	0,1;15,1	100,0	;	56,7	46,3;67,2	30,2**	12,8;53,3	57,6*	29,4;82,6	17,9**	7,7;33,0	Oui
57,0*	30,7;80,6	97,1	84,9;99,9	-	;	43,3	32,8;53,7	69,8	46,7;87,2	42,4**	17,4;70,6	82,1	67,0;92,3	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p, r]
28,8**	3,4;72,3	-	;	49,9**	18,9;80,9	82,6	69,0;91,9	24,4**	1,1;75,3	42,6**	10,9;79,9	16,3**	0,2;69,6	Hôpital de la région de résidence
71,2*	27,7;96,6	-	;	50,1**	19,1;81,1	17,4**	8,1;31,0	75,6**	24,7;98,9	57,4**	20,1;89,1	83,7*	30,4;99,8	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
28,8**	3,4;72,3	-	;	50,5**	19,4;81,4	57,4	43,8;70,9	48,6**	5,0;94,0	32,4**	6,5;70,6	15,0**	0,0;76,5	Moins de 30 minutes
-	;	-	;	14,3**	1,2;46,7	14,1**	5,8;27,0	20,7**	0,1;83,3	10,2**	0,1;52,2	33,1**	2,4;83,2	De 30 à 60 minutes
71,2*	27,7;96,6	-	;	35,2**	9,9;68,8	28,6*	16,5;43,3	30,7**	0,8;87,9	57,4**	20,1;89,1	51,9**	7,8;93,7	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
60,0**	10,0;97,0	-	;	52,8**	19,0;84,7	84,1	64,4;95,4	100,0	;	85,0*	38,7;99,7	55,9**	7,4;96,4	Oui, tout à fait
20,0**	0,1;79,5	-	;	19,8**	2,0;57,7	7,7**	0,8;26,5	-	;	15,0**	0,3;61,3	-	;	Oui, en partie
20,0**	0,2;79,1	-	;	27,4**	4,2;66,7	8,2**	1,2;25,1	-	;	-	;	44,1**	3,6;92,6	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
54,8**	12,5;92,2	-	;	68,0*	30,1;93,6	67,8	52,3;80,8	81,5*	21,7;99,9	76,1*	36,1;97,1	72,0**	10,7;99,7	Moins de 30 minutes
29,4**	2,8;75,9	-	;	32,0**	6,4;69,9	24,0**	12,4;39,4	18,5**	0,1;78,3	23,9**	2,9;63,9	-	;	De 30 à 60 minutes
15,8**	0,2;67,8	-	;	-	;	8,2**	2,2;20,0	-	;	-	;	28,0**	0,3;89,3	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
100,0	;	-	;	91,6	56,3;99,9	83,2	69,7;92,4	32,2**	2,1;83,1	100,0	;	72,0**	10,7;99,7	Oui, tout à fait
-	;	-	;	-	;	16,8**	7,6;30,3	67,8**	16,9;97,9	-	;	28,0**	0,3;89,3	Oui, en partie
-	;	-	;	8,4**	0,1;43,7	-	;	-	;	-	;	-	;	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
84,2*	38,3;99,6	-	;	86,5	44,5;99,6	93,6	82,1;98,7	85,0*	32,2;99,9	87,1	44,2;99,7	81,2*	26,6;99,7	Oui, tout à fait
-	;	-	;	13,5**	0,4;55,5	6,4**	1,3;17,9	-	;	12,9**	0,3;55,8	18,8**	0,3;73,4	Oui, en partie
15,8**	0,4;61,7	100,0	;	-	;	-	;	15,0**	0,1;67,8	-	;	-	;	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	51,1	47,1;55,1	27,0**	11,9;47,2
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	48,9	44,9;52,9	73,0	52,8;88,1
Lieu de la radiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	6,6**	3,1;12,1	-	;
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	93,4	87,9;96,9	100,0	;
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	16,3*	10,2;24,1	21,2**	0,9;70,1
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	5,7**	2,3;11,5	16,8**	0,3;67,5
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	78,0	69,8;84,9	61,9**	18,3;94,2
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	73,5	64,4;81,3	78,6**	21,7;99,7
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	17,1*	10,5;25,5	21,4**	0,3;78,3
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	9,5**	4,9;16,2	-	;
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	78,3	70,5;84,9	69,7**	21,5;97,5
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	13,3*	8,0;20,3	30,3**	2,5;78,5
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	8,4**	4,5;14,1	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
54,9*	28,3;79,5	58,0	45,2;70,8	36,7**	14,4;64,2	76,7	66,6;84,9	66,0*	43,1;84,4	34,1**	11,8;63,2	26,0*	15,0;39,8	Oui
45,1**	20,5;71,7	42,0*	29,2;54,8	63,3*	35,8;85,6	23,3*	15,1;33,4	34,0**	15,6;56,9	65,9*	36,8;88,2	74,0	60,2;85,0	Non
														Lieu de la radiothérapie[p]
-	;	8,0**	0,9;26,9	-	;	9,2**	3,4;19,1	6,6**	0,1;35,4	15,4**	0,2;64,9	-	;	Hôpital de la région de résidence
100,0	;	92,0	73,1;99,1	100,0	;	90,8	80,9;96,6	93,4	64,6;99,9	84,6*	35,1;99,8	100,0	;	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
25,8**	2,5;69,8	15,5**	2,7;41,5	16,0**	0,2;66,6	18,0**	9,1;30,3	7,5**	0,1;38,4	-	;	18,3**	1,7;55,5	Moins de 30 minutes
-	;	-	;	-	;	6,4**	1,8;15,5	15,6**	1,5;48,8	-	;	-	;	De 30 à 60 minutes
74,2*	30,2;97,5	84,5	58,5;97,3	84,0*	33,4;99,8	75,7	62,8;85,8	76,8*	43,8;95,6	100,0	;	81,7*	44,5;98,3	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
60,9**	10,8;97,0	43,2**	20,0;68,9	69,7**	19,7;97,9	82,5	69,5;91,6	86,4	55,5;98,8	81,6*	25,6;99,8	75,2*	41,9;95,0	Oui, tout à fait
39,1**	3,0;89,2	37,0**	14,5;64,7	14,3**	0,0;72,5	13,5**	5,6;26,0	5,9**	0,1;30,2	-	;	8,1**	0,1;41,0	Oui, en partie
-	;	19,7**	5,4;43,8	16,0**	0,2;66,6	4,0**	0,6;13,0	7,7**	0,1;40,7	18,4**	0,2;74,4	16,7**	1,9;49,8	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
74,1*	30,0;97,5	59,6*	36,7;79,8	85,7*	27,5;100,0	86,2	75,2;93,6	73,7*	41,7;93,8	81,6*	25,6;99,8	83,5	48,3;98,5	Oui, tout à fait
-	;	23,3**	7,6;47,3	-	;	9,2**	3,4;19,2	19,3**	3,5;49,2	18,4**	0,2;74,4	9,3**	0,2;43,9	Oui, en partie
25,9**	2,5;70,0	17,1**	4,7;38,8	14,3**	0,0;72,5	4,6**	0,9;13,1	7,0**	0,1;37,5	-	;	7,2**	0,1;37,0	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Douleur et malaises ressentis[p]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	56,3	50,1;62,5	59,7*	37,6;79,2
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	43,7	37,5;49,9	40,3**	20,8;62,4
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	25,7*	18,4;34,2	33,7**	12,1;61,8
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	39,7	31,1;48,3	20,7**	3,6;52,8
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	34,6	26,6;42,6	45,6**	18,3;75,0
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	82,6	75,3;88,5	76,2	48,1;93,7
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	16,0*	10,3;23,4	23,8**	6,3;51,9
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	1,3**	0,2;4,5	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p]
47,5**	20,8;75,4	37,1*	20,2;56,6	72,1*	42,4;92,1	62,8	50,7;73,8	61,2*	38,7;80,6	70,1*	41,3;90,5	48,5*	32,2;65,0	Oui
52,5**	24,6;79,2	62,9	43,4;79,8	27,9**	7,9;57,6	37,2*	26,2;49,3	38,8**	19,4;61,3	29,9**	9,5;58,7	51,5*	35,0;67,8	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
13,7**	0,1;64,2	33,7**	9,3;67,1	23,9**	2,6;65,4	13,3**	5,4;25,9	33,7**	9,4;66,7	28,9**	3,3;72,7	37,0**	17,0;60,9	Sévères
60,5**	17,5;93,6	34,0**	9,1;68,1	37,3**	8,5;75,2	41,8*	29,0;54,5	45,6**	16,9;76,6	52,7**	18,2;85,4	38,4**	17,0;63,7	Modérés
25,8**	2,1;72,0	32,2**	8,0;66,8	38,8**	11,2;73,1	44,9*	31,5;58,3	20,8**	3,9;51,8	18,4**	1,5;57,4	24,6**	6,3;53,9	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
55,4**	15,2;90,8	60,1*	29,8;85,5	100,0	;	90,4	78,8;96,9	94,1	71,7;99,8	80,6*	43,3;98,0	78,4	55,4;93,1	Oui, tout à fait
44,6**	9,2;84,8	39,9**	14,5;70,2	-	;	5,4**	1,1;14,9	5,9**	0,2;28,3	19,4**	2,0;56,7	21,6**	6,9;44,6	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	4,2**	0,6;13,8	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	90,4	85,3;94,2	100,0	;
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	8,6*	5,0;13,4	-	;
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	1,0**	0,1;3,7	-	;
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	11,3*	7,6;15,9	16,2**	4,1;38,3
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	88,7	84,1;92,4	83,8	61,7;95,9
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	75,6	70,3;80,8	81,3	59,2;94,5
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	23,1	17,9;28,4	18,7**	5,5;40,8
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	1,3**	0,3;3,7	-	;
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	67,3	61,9;72,7	72,4	50,2;88,7
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	32,7	27,3;38,1	27,6**	11,3;49,8
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	54,1	48,1;60,2	51,9*	29,5;73,8
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	16,6	12,1;21,9	11,9**	2,1;32,9
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	29,3	23,6;35,1	36,2**	16,9;59,5
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	79,4	72,7;85,0	91,5	69,6;99,3
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	15,8*	10,8;22,0	8,5**	0,7;30,4
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	4,8**	2,3;8,8	-	;
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	68,8	61,2;76,4	86,7	57,7;98,6
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	31,2	23,6;38,8	13,3**	1,4;42,3
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	89,6	85,0;93,2	83,8	61,9;95,9
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	9,9*	6,4;14,4	16,2**	4,1;38,1
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	0,5**	0,0;2,4	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
100,0	;	82,7	58,5;95,9	94,1	65,4;100,0	92,3	83,2;97,4	94,7	71,5;99,9	79,1*	45,2;96,8	87,6	68,3;97,3	Oui, tout à fait
-	;	13,4**	2,4;36,4	5,9**	0,0;34,6	6,1**	1,8;14,6	5,3**	0,1;28,5	20,9**	3,2;54,8	12,4**	2,7;31,7	Oui, en partie
-	;	3,9**	0,1;21,9	-	;	1,6**	0,0;8,5	-	;	-	;	-	;	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
7,3**	0,1;36,6	21,1**	9,1;38,4	12,7**	0,3;54,3	11,5**	5,7;20,0	5,0**	0,2;23,9	-	;	8,3**	2,1;21,0	Oui
92,7	63,4;99,9	78,9	61,6;90,9	87,3	45,7;99,7	88,5	80,0;94,3	95,0	76,1;99,8	100,0	;	91,7	79,0;97,9	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
84,8	53,2;98,4	58,0	40,0;74,5	75,4*	45,3;94,0	83,5	73,6;90,8	67,9	45,0;85,8	88,7	62,5;98,9	70,4	54,5;83,3	Oui, toujours
15,2**	1,6;46,8	38,8*	22,6;57,0	24,6**	6,0;54,7	16,5*	9,2;26,4	32,1**	14,2;55,0	11,3**	1,1;37,5	25,2**	12,9;41,2	Oui, la plupart du temps
-	;	3,3**	0,1;16,3	-	;	-	;	-	;	-	;	4,5**	0,5;15,3	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
58,5*	29,9;83,4	47,6*	29,4;66,3	92,4	62,5;99,9	85,0	75,3;92,0	61,7*	39,6;80,7	67,7*	39,0;89,1	49,7*	33,3;66,2	Oui
41,5**	16,6;70,1	52,4*	33,7;70,6	7,6**	0,1;37,5	15,0**	8,0;24,7	38,3**	19,3;60,4	32,3**	10,9;61,0	50,3*	33,8;66,7	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]
49,4**	21,5;77,5	49,2*	30,1;68,5	53,8**	25,0;80,8	65,1	53,6;75,4	58,0*	33,6;79,9	33,5**	11,4;62,6	48,5*	33,3;63,9	Oui
14,5**	1,5;45,5	20,0**	7,7;38,7	19,5**	2,6;53,7	16,2*	9,0;26,0	8,7**	0,8;30,4	26,9**	5,5;61,7	17,3**	7,3;32,2	Non, mais il aurait aimé l'être
36,1**	11,9;67,1	30,8**	15,5;49,9	26,7**	6,5;58,4	18,7**	9,9;30,6	33,2**	13,9;57,9	39,7**	13,4;71,3	34,3*	19,7;51,3	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
65,7*	30,9;91,1	68,2	47,9;84,5	70,0**	25,7;96,5	79,7	67,3;89,0	90,9	70,0;99,0	83,8	51,9;98,1	78,8	60,7;91,3	Oui, tout à fait
34,3**	8,9;69,1	17,4**	6,1;35,5	30,0**	3,5;74,3	14,0**	6,3;25,5	9,1**	1,0;30,0	9,3**	0,2;42,3	18,2**	6,9;35,8	Oui, en partie
-	;	14,4**	3,8;33,8	-	;	6,3**	1,8;15,2	-	;	6,9**	0,1;36,2	2,9**	0,1;16,1	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
54,5**	18,3;87,4	38,9**	17,4;64,1	88,8	45,4;99,9	69,3	53,4;82,4	64,3*	33,1;88,4	61,1**	26,9;88,6	80,1	59,8;93,1	Oui
45,5**	12,6;81,7	61,1*	35,9;82,6	11,2**	0,1;54,6	30,7*	17,6;46,6	35,7**	11,6;66,9	38,9**	11,4;73,1	19,9**	6,9;40,2	Non
														Patient traité de manière respectueuse
84,8	53,2;98,4	80,4	63,2;91,9	94,8	69,7;99,9	95,3	88,6;98,6	96,5	82,0;99,9	80,6	46,7;97,3	90,9	77,7;97,6	Oui, toujours
15,2**	1,6;46,8	19,6**	8,1;36,8	5,2**	0,1;30,3	4,7**	1,4;11,4	3,5**	0,1;18,0	19,4**	2,7;53,3	6,8**	1,4;18,5	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	2,4**	0,1;12,9	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	2,7**	1,1;5,7	-	;
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	5,7**	3,1;9,4	8,9**	1,1;28,6
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	2,5**	0,9;5,5	3,9**	0,1;21,8
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	89,1	84,5;92,7	87,2	66,2;97,4
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	74,9	69,5;80,2	73,7	50,3;90,1
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	17,0	12,5;22,2	14,0**	3,4;34,2
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	8,2*	4,8;12,8	12,3**	2,2;33,7
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	89,7	85,1;93,2	87,7	66,0;97,8
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	8,7*	5,4;13,1	12,3**	2,2;34,0
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	1,6**	0,4;4,3	-	;
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	74,1	64,2;82,5	100,0	;
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	25,9*	17,5;35,8	-	;
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	6,0**	3,4;9,7	-	;
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	94,0	90,3;96,6	100,0	;
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	85,1	79,4;89,7	93,4	66,2;99,9
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	9,0*	5,5;13,8	6,6**	0,1;33,8
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	5,9**	3,1;9,9	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
-	;	3,3**	0,1;17,9	-	;	2,4**	0,3;7,8	3,7**	0,1;20,8	-	;	6,7**	1,2;19,3	Oui, souvent
14,4**	1,6;44,2	12,0**	3,6;27,4	5,6**	0,1;32,3	2,2**	0,3;7,4	7,9**	1,1;25,1	8,2**	0,2;39,4	-	;	Oui, parfois
-	;	-	;	-	;	3,6**	0,7;10,2	-	;	-	;	5,1**	0,6;17,6	Oui, une seule fois
85,6	55,8;98,4	84,7	68,5;94,6	94,4	67,7;99,9	91,9	84,3;96,5	88,4	69,3;97,7	91,8	60,6;99,8	88,2	74,3;96,2	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
80,6	51,9;96,2	72,0	52,9;86,6	81,8	52,2;96,9	79,9	69,3;88,2	65,0	43,1;83,1	67,3*	35,2;90,5	73,6	56,6;86,7	Oui, toujours
13,3**	1,3;42,6	12,4**	3,2;29,8	18,2**	3,1;47,8	15,4**	8,0;25,8	19,7**	6,7;40,3	32,7**	9,5;64,8	18,8**	8,1;34,6	Oui, la plupart du temps
6,1**	0,1;30,5	15,6**	5,2;32,9	-	;	4,7**	1,3;11,5	15,3**	3,3;38,6	-	;	7,6**	1,6;20,7	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
100,0	;	77,1	57,6;90,7	100,0	;	92,6	84,7;97,2	80,3	59,4;93,4	93,4	67,3;99,9	92,7	79,6;98,5	Oui, toujours
-	;	16,2**	5,1;35,2	-	;	6,3**	2,0;14,3	15,2**	4,4;34,1	6,6**	0,1;32,7	7,3**	1,5;20,4	Oui, la plupart du temps
-	;	6,6**	0,8;22,0	-	;	1,1**	0,0;5,6	4,5**	0,1;25,2	-	;	-	;	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]
77,5**	14,5;99,9	52,3**	20,8;82,5	88,9	40,1;100,0	73,2	54,9;87,2	75,2*	39,9;95,6	43,0**	8,2;84,2	81,4	52,9;96,5	Oui
22,5**	0,1;85,5	47,7**	17,5;79,2	11,1**	0,0;59,9	26,8**	12,8;45,1	24,8**	4,4;60,1	57,0**	15,8;91,8	18,6**	3,5;47,1	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
13,3**	1,4;42,3	15,2**	4,9;32,7	15,1**	2,2;42,8	5,8**	1,9;13,1	-	;	-	;	2,5**	0,1;12,5	Oui
86,7	57,7;98,6	84,8	67,3;95,1	84,9	57,2;97,8	94,2	86,9;98,1	100,0	;	100,0	;	97,5	87,5;99,9	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
85,0	53,7;98,4	76,3	56,0;90,5	86,3*	42,7;99,7	81,3	69,7;89,9	91,9	72,9;99,1	93,5	64,0;99,9	85,7	68,4;95,7	Oui, tout à fait
8,5**	0,2;40,7	3,8**	0,1;19,0	13,7**	0,3;57,3	12,9**	5,9;23,4	8,1**	0,9;27,1	6,5**	0,1;36,0	8,6**	1,7;23,7	Oui, en partie
6,5**	0,1;32,8	19,9**	7,0;39,9	-	;	5,8**	1,6;14,3	-	;	-	;	5,6**	0,6;20,1	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	76,7	71,0;82,3	87,3	65,6;97,6
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	23,3	17,7;29,0	12,7**	2,4;34,4
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	18,5	13,6;24,3	24,8**	10,3;45,0
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	81,5	75,7;86,4	75,2	55,0;89,7
Médecin spécialiste[p]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	11,5*	7,7;16,4	8,3**	1,0;26,9
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	88,5	83,6;92,3	91,7	73,1;99,0
Infirmière pivot en oncologie[p]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	22,3	17,2;27,4	25,3**	9,5;48,0
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	77,7	72,6;82,8	74,7	52,0;90,5
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	7,4*	4,4;11,6	3,2**	0,1;17,3
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	92,6	88,4;95,6	96,8	82,7;99,9
CLSC[p]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	16,9*	12,1;22,7	22,7**	7,8;45,5
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	83,1	77,3;87,9	77,3	54,5;92,2
Urgence d'un hôpital[p]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	29,7	23,7;35,8	38,7**	19,5;61,0
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	70,3	64,2;76,3	61,3*	39,0;80,5
Unité de soins d'un hôpital[p]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	9,7*	6,1;14,6	26,6**	10,6;49,0
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	90,3	85,4;93,9	73,4	51,0;89,4
Autre professionnel de la santé[p, r]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	2,3**	0,6;6,1	-	;
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	97,7	93,9;99,4	100,0	;
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	1,4**	0,3;3,9	-	;
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	98,6	96,1;99,7	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]
78,3	48,5;95,3	64,5	44,5;81,3	88,2	60,5;98,9	81,2	69,4;90,0	75,6	49,7;92,5	75,1*	43,5;94,4	69,0	51,3;83,4	Oui
21,7**	4,7;51,5	35,5**	18,7;55,5	11,8**	1,1;39,5	18,8**	10,0;30,6	24,4**	7,5;50,3	24,9**	5,6;56,5	31,0**	16,6;48,7	Non
														Médecin de famille[p]
30,9**	8,3;63,5	6,0**	0,7;20,9	18,7**	4,1;45,3	16,2**	8,9;26,1	24,9**	7,8;50,8	20,0**	3,9;49,7	20,8**	9,2;37,4	Oui
69,1*	36,5;91,7	94,0	79,1;99,3	81,3	54,7;95,9	83,8	73,9;91,1	75,1	49,2;92,2	80,0	50,3;96,1	79,2	62,6;90,8	Non
														Médecin spécialiste[p]
14,2**	1,5;44,3	9,8**	2,1;25,9	5,8**	0,2;28,1	10,1**	4,5;18,9	23,9**	6,6;51,3	13,2**	1,6;40,8	12,0**	3,7;26,9	Oui
85,8	55,7;98,5	90,2	74,1;97,9	94,2	71,9;99,8	89,9	81,1;95,5	76,1	48,7;93,4	86,8	59,2;98,4	88,0	73,1;96,3	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p]
29,5**	8,5;60,1	6,0**	0,6;21,4	32,1**	10,1;62,3	30,1*	20,2;40,0	24,8**	8,0;50,1	31,1**	9,9;60,6	11,3**	3,4;25,7	Oui
70,5*	39,9;91,5	94,0	78,6;99,4	67,9*	37,7;89,9	69,9	60,0;79,8	75,2	49,9;92,0	68,9*	39,4;90,1	88,7	74,3;96,6	Non
														Info-Santé[p]
8,4**	0,1;41,2	6,9**	0,7;24,6	7,1**	0,2;33,3	9,4**	3,9;18,3	-	;	19,6**	3,3;51,0	6,2**	1,1;18,3	Oui
91,6	58,8;99,9	93,1	75,4;99,3	92,9	66,7;99,8	90,6	81,7;96,1	100,0	;	80,4	49,0;96,7	93,8	81,7;98,9	Non
														CLSC[p]
-	;	12,5**	3,0;30,8	25,6**	7,3;53,6	17,1**	9,3;27,6	17,3**	3,6;43,3	26,2**	6,9;56,4	14,0**	5,0;28,8	Oui
100,0	;	87,5	69,2;97,0	74,4	46,4;92,7	82,9	72,4;90,7	82,7	56,7;96,4	73,8*	43,6;93,1	86,0	71,2;95,0	Non
														Urgence d'un hôpital[p]
40,3**	14,1;71,5	22,9**	9,6;42,0	20,4**	4,1;49,8	24,8*	15,3;36,5	27,3**	8,9;54,2	50,0**	22,5;77,5	30,7**	16,2;48,6	Oui
59,7*	28,5;85,9	77,1	58,0;90,4	79,6	50,2;95,9	75,2	63,5;84,7	72,7*	45,8;91,1	50,0**	22,5;77,5	69,3	51,4;83,8	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p]
-	;	3,5**	0,1;18,8	12,4**	1,2;40,9	8,0**	3,1;16,2	9,1**	0,2;40,8	14,6**	1,5;45,4	6,7**	0,7;23,5	Oui
100,0	;	96,5	81,2;99,9	87,6	59,1;98,8	92,0	83,8;96,9	90,9	59,2;99,8	85,4	54,6;98,5	93,3	76,5;99,3	Non
														Autre professionnel de la santé[p, r]
-	;	-	;	16,2**	1,5;50,8	1,2**	0,0;7,0	-	;	-	;	4,2**	0,1;21,4	Oui
100,0	;	100,0	;	83,8	49,2;98,5	98,8	93,0;100,0	100,0	;	100,0	;	95,8	78,6;99,9	Non
														Autre contact
-	;	6,7**	0,7;23,4	-	;	1,5**	0,0;8,5	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	93,3	76,6;99,3	100,0	;	98,5	91,5;100,0	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	69,3	63,2;75,3	75,4	49,6;92,3
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	11,4*	7,5;16,5	4,4**	0,1;25,4
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	19,3	14,3;25,2	20,2**	5,3;45,3
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	55,1	47,9;62,2	64,3*	37,5;85,9
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	17,9*	12,5;24,4	10,1**	1,0;34,1
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	27,0	21,0;33,1	25,5**	7,9;52,1
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	56,9	50,1;63,7	71,5*	42,1;91,6
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	16,0*	11,1;22,0	22,5**	5,7;50,5
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	27,1	21,0;33,2	5,9**	0,1;30,6
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	54,9	48,2;61,6	68,0*	40,8;88,4
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	13,1*	8,3;19,1	4,7**	0,1;24,6
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	32,1	25,7;38,4	27,3**	8,8;54,2
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	66,0	59,7;72,3	88,1	66,5;98,0
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	14,4*	10,2;19,5	11,9**	2,0;33,5
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	19,6	14,5;25,5	-	;
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	64,1	57,4;70,8	85,4	60,6;97,4
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	18,8	13,6;25,1	14,6**	2,6;39,4
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	17,1*	12,2;22,9	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
49,9**	21,0;78,9	40,8*	21,7;62,2	100,0	;	74,1	62,1;83,9	61,7*	37,3;82,4	73,5*	40,5;94,0	75,1	54,6;89,7	Oui, tout à fait
7,5**	0,1;39,3	20,8**	6,9;42,6	-	;	14,2**	7,1;24,4	18,2**	4,9;41,4	7,1**	0,1;37,2	6,9**	0,8;23,6	Oui, en partie
42,5**	14,9;74,2	38,4**	18,9;61,1	-	;	11,7**	5,4;21,3	20,0**	5,1;45,5	19,4**	2,5;54,0	18,0**	5,4;39,1	Non
														La sexualité[p]
50,1**	17,7;82,4	52,8*	33,4;71,6	62,3**	27,2;89,7	50,7	38,4;63,1	62,1*	36,2;83,8	62,0*	29,1;88,3	49,3*	30,9;67,9	Oui, tout à fait
18,9**	1,8;56,9	34,5**	17,5;55,1	37,7**	10,3;72,8	15,8**	7,9;27,0	5,4**	0,1;27,1	8,0**	0,2;39,1	11,5**	2,4;30,3	Oui, en partie
31,0**	6,0;68,9	12,7**	3,4;29,8	-	;	33,5*	22,2;46,5	32,5**	12,5;58,7	30,0**	6,6;65,4	39,2*	21,5;59,2	Non
														Les émotions[p]
41,7**	14,9;72,8	33,4**	15,4;55,8	68,3*	30,7;93,5	64,3	51,7;75,5	58,9*	33,2;81,5	65,7*	35,9;88,5	51,4*	33,4;69,1	Oui, tout à fait
15,2**	1,8;45,7	22,5**	8,2;43,8	17,0**	1,4;54,1	15,8**	7,8;27,3	20,7**	5,6;45,7	7,7**	0,1;37,8	8,9**	1,6;25,3	Oui, en partie
43,1**	15,3;74,7	44,2*	25,7;63,9	14,8**	0,4;58,8	19,9*	11,0;31,7	20,4**	5,0;47,0	26,5**	6,0;59,5	39,8*	23,0;58,5	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
36,6**	10,6;70,2	43,0*	23,9;63,7	68,3*	30,7;93,5	52,4	40,1;64,7	56,4*	30,0;80,3	61,1*	29,2;87,1	57,9*	38,7;75,5	Oui, tout à fait
8,2**	0,1;41,4	18,1**	5,6;39,0	24,7**	3,1;64,6	11,8**	5,0;22,6	11,4**	1,1;37,8	12,4**	1,0;42,7	14,3**	3,9;33,1	Oui, en partie
55,2**	23,1;84,4	38,9*	20,6;59,8	7,1**	0,1;40,2	35,8*	24,0;49,1	32,2**	11,8;59,3	26,5**	6,0;59,5	27,8**	11,8;49,4	Non
														Les besoins alimentaires[p]
49,4**	22,0;77,0	41,3*	22,5;62,2	94,0	65,3;99,9	72,2	59,7;82,7	70,4	46,1;88,4	62,7*	32,6;86,8	51,5*	33,2;69,5	Oui, tout à fait
7,8**	0,2;35,7	21,3**	7,6;42,4	6,0**	0,1;34,7	18,8*	10,6;29,6	4,9**	0,1;23,9	7,0**	0,2;33,9	18,5**	7,1;36,3	Oui, en partie
42,9**	16,8;72,2	37,4**	18,4;59,7	-	;	9,0**	2,7;20,7	24,7**	8,5;48,8	30,3**	8,8;61,0	30,0**	15,0;48,9	Non
														Les activités courantes[p]
41,1**	14,1;72,7	35,5**	17,8;56,6	90,8	55,0;99,9	70,3	58,4;80,5	66,2*	41,4;85,8	60,2*	29,3;86,0	57,3*	36,9;75,9	Oui, tout à fait
24,6**	4,2;60,1	22,0**	7,0;45,5	9,2**	0,1;45,0	14,5**	7,5;24,4	18,7**	5,0;42,3	19,2**	3,6;48,7	28,9**	13,2;49,5	Oui, en partie
34,4**	9,4;68,2	42,5*	23,1;63,8	-	;	15,2**	7,4;26,3	15,1**	2,9;39,6	20,6**	2,8;55,9	13,8**	3,8;32,1	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	91,4	87,1;94,5	100,0	;
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	7,5*	4,5;11,7	-	;
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	1,1**	0,2;3,2	-	;
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	74,3	68,7;79,9	78,3	56,9;92,3
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	19,5	14,6;25,1	21,7**	7,7;43,1
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	3,3**	1,4;6,5	-	;
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	2,9**	1,1;5,9	-	;
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	78,0	72,4;83,5	86,1	66,5;96,5
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	10,1*	6,6;14,5	-	;
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	12,0*	7,9;17,3	13,9**	3,5;33,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
76,6*	44,2;95,3	89,7	74,5;97,4	100,0	;	89,0	80,3;94,8	91,0	69,1;99,1	93,4	67,3;99,9	90,9	78,0;97,5	Oui, tout à fait
23,4**	4,7;55,8	10,3**	2,6;25,5	-	;	8,4**	3,3;16,9	4,3**	0,1;22,8	6,6**	0,1;32,7	9,1**	2,5;22,0	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	2,5**	0,4;8,4	4,8**	0,1;26,5	-	;	-	;	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
70,3*	37,7;92,4	52,9*	35,2;70,1	76,9*	45,0;95,3	80,9	69,9;89,3	89,6	65,3;98,9	92,9	65,8;99,8	65,6	48,2;80,3	Toujours
15,3**	1,5;48,2	35,7*	19,4;54,9	8,3**	0,3;37,0	16,4**	9,0;26,4	5,5**	0,2;25,6	7,1**	0,2;34,2	25,4**	12,4;42,6	La plupart du temps
7,9**	0,1;38,8	11,3**	3,3;26,3	7,0**	0,1;35,3	1,4**	0,0;7,4	-	;	-	;	2,5**	0,1;13,0	À l'occasion
6,5**	0,1;32,8	-	;	7,9**	0,1;39,7	1,3**	0,0;6,8	4,9**	0,1;27,1	-	;	6,5**	1,4;17,7	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
59,6*	28,9;85,6	61,5	42,8;78,0	75,7*	41,0;95,6	83,8	73,8;91,1	80,0	57,5;93,9	92,6	64,3;99,8	75,5	59,1;87,8	Oui, tout à fait
26,3**	5,4;60,5	18,1**	6,8;35,7	5,6**	0,0;32,7	6,7**	2,3;14,7	20,0**	6,1;42,5	7,4**	0,2;35,7	9,6**	2,5;23,4	Oui, en partie
14,1**	1,4;44,8	20,4**	8,2;38,3	18,7**	1,9;55,1	9,5**	4,1;18,2	-	;	-	;	14,9**	5,4;30,5	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	84,0	79,0;88,3	95,1	73,9;99,9
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	10,1*	6,4;14,8	-	;
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	5,9*	3,4;9,4	4,9**	0,1;26,1
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	87,6	81,7;92,1	92,8	75,2;99,2
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	11,0*	6,9;16,4	7,2**	0,8;24,8
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	1,4**	0,1;5,2	-	;
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	87,9	80,4;93,3	78,4	50,9;94,7
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	7,2**	3,0;14,1	16,7**	2,8;44,7
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	4,8**	1,7;10,4	4,9**	0,1;26,1
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	63,0	55,0;71,0	59,3**	15,2;94,0
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	17,0*	11,0;24,4	15,1**	0,2;66,8
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	20,0*	13,8;27,6	25,5**	1,2;76,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
79,1	49,1;95,8	80,7	63,7;92,0	80,1*	41,0;98,1	83,9	74,3;91,0	88,8	71,0;97,5	76,3*	43,9;95,2	83,8	69,3;93,3	Aucun report
20,9**	4,2;50,9	8,0**	1,6;21,9	13,5**	0,3;55,7	8,8**	3,7;17,0	7,6**	0,9;25,3	23,7**	4,8;56,1	11,4**	3,8;24,4	Un report
-	;	11,4**	3,1;27,0	6,4**	0,1;33,1	7,3**	2,8;15,0	3,6**	0,1;18,0	-	;	4,9**	0,6;16,1	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
100,0	;	86,6	58,9;98,4	87,9*	40,4;99,9	86,8	75,8;94,0	82,9	58,2;96,2	78,0*	41,7;97,0	87,8	74,2;95,7	Aucun report
-	;	13,4**	1,6;41,1	12,1**	0,1;59,6	10,6**	4,9;19,4	17,1**	3,8;41,8	22,0**	3,0;58,3	9,9**	2,8;23,3	Un report
-	;	-	;	-	;	2,6**	0,1;14,4	-	;	-	;	2,3**	0,0;12,8	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
86,4*	37,5;99,9	-	;	87,4	56,9;99,0	89,9	77,8;96,7	100,0	;	89,8	45,7;99,9	88,0*	40,4;99,9	Aucun report
13,6**	0,1;62,5	-	;	7,0**	0,1;36,4	4,1**	0,5;14,7	-	;	-	;	12,0**	0,1;59,6	Un report
-	;	-	;	5,6**	0,0;32,7	6,0**	1,2;16,5	-	;	10,2**	0,1;54,3	-	;	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
70,7**	22,3;97,7	43,2*	22,3;66,0	55,5**	11,7;93,3	57,7	45,3;70,2	94,5	73,6;99,8	60,0**	10,8;96,6	80,9	50,5;96,6	Aucun report
29,3**	2,3;77,7	24,5**	8,1;49,1	30,3**	2,1;80,3	18,9**	10,1;30,7	-	;	19,6**	0,2;78,4	6,0**	0,1;32,6	Un report
-	;	32,3**	13,7;56,2	14,3**	0,1;65,0	23,4*	13,3;36,4	5,5**	0,2;26,4	20,4**	0,5;73,3	13,1**	1,3;42,1	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	13,2*	9,0;18,4	-	;
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	4,6**	2,4;8,0	-	;
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	82,2	76,6;87,0	100,0	;
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	45,5	39,2;51,8	89,5	71,6;97,9
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	4,7**	2,5;7,9	-	;
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	49,8	43,5;56,2	10,5**	2,1;28,4
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	58,5	52,4;64,7	73,0	50,4;89,3
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	2,1**	0,7;5,0	4,9**	0,1;24,5
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	39,3	33,3;45,4	22,1**	8,1;43,2
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	9,0*	5,8;13,3	3,2**	0,1;18,0
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	6,2**	3,4;10,1	-	;
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	84,8	79,5;89,2	96,8	82,0;99,9
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	14,6	10,5;19,5	19,7**	6,4;41,1
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	5,3**	2,8;9,1	5,0**	0,1;25,2
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	80,1	74,8;84,7	75,2	53,0;90,6
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	34,7	28,8;40,7	39,8**	19,7;62,8
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	7,1*	4,2;11,1	8,8**	1,0;28,7
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	58,2	52,0;64,5	51,4*	28,5;73,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	7,3**	0,9;23,9	16,1**	1,4;51,2	22,9*	13,2;35,3	4,4**	0,1;23,5	6,6**	0,1;34,5	18,5**	8,1;33,6	Oui
-	;	10,4**	2,0;28,4	-	;	6,2**	2,0;14,0	9,9**	1,0;33,3	7,9**	0,2;37,6	-	;	Non, mais il aurait souhaité le consulter
100,0	;	82,3	62,7;94,3	83,9	48,8;98,6	70,9	58,5;81,4	85,6	61,8;97,3	85,5	55,1;98,4	81,5	66,4;91,9	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
33,4**	11,3;62,6	25,2**	11,2;44,5	59,3**	26,4;86,9	36,7*	25,4;49,2	59,2*	36,0;79,7	36,9**	11,3;69,7	41,5*	25,7;58,6	Oui
7,9**	0,2;38,5	9,5**	1,8;26,2	-	;	6,0**	2,1;13,1	-	;	8,4**	0,2;41,0	3,9**	0,5;13,4	Non, mais il aurait souhaité le consulter
58,8*	30,6;83,3	65,3	46,7;81,0	40,7**	13,1;73,6	57,3	45,7;69,0	40,8**	20,3;64,0	54,6**	22,5;84,1	54,6*	37,4;71,1	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
49,2**	21,4;77,5	62,2	42,8;79,1	76,2*	41,6;95,8	59,1	48,4;69,9	62,5*	39,3;82,2	67,5*	36,1;90,3	40,2*	25,1;56,8	Oui
-	;	5,6**	0,6;20,3	-	;	1,1**	0,0;5,4	-	;	-	;	2,4**	0,1;12,9	Non, mais il aurait souhaité le consulter
50,8**	22,5;78,6	32,2**	16,4;51,6	23,8**	4,2;58,4	39,8	29,0;51,4	37,5**	17,8;60,7	32,5**	9,7;63,9	57,4	40,5;73,1	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
21,4**	4,1;52,4	6,4**	0,7;22,3	16,1**	1,7;49,0	13,7**	6,7;23,9	-	;	7,4**	0,1;36,5	7,0**	1,4;19,4	Oui
-	;	9,6**	2,0;25,4	20,1**	1,9;59,2	6,1**	2,1;13,4	11,7**	2,1;32,6	8,6**	0,2;40,9	1,9**	0,0;10,4	Non, mais il aurait souhaité le consulter
78,6	47,6;95,9	84,1	66,3;94,7	63,8*	29,8;89,8	80,1	69,1;88,6	88,3	67,4;97,9	84,0	50,9;98,4	91,1	77,3;97,9	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
22,9**	5,1;53,1	11,8**	3,0;28,4	14,7**	1,3;47,1	15,0**	8,0;24,8	8,8**	1,1;28,5	27,9**	6,4;61,4	9,9**	2,9;22,9	Oui
-	;	12,2**	3,2;29,3	13,6**	0,4;55,6	2,4**	0,3;8,2	8,0**	0,8;27,8	7,9**	0,2;37,6	2,0**	0,0;10,6	Non, mais il aurait souhaité le consulter
77,1	46,9;94,9	76,0	57,6;89,3	71,7*	35,2;94,6	82,6	72,5;90,2	83,2	62,0;95,4	64,2*	31,4;89,3	88,1	74,2;96,1	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
13,4**	1,5;41,9	18,8**	6,4;38,5	31,0**	8,0;64,4	50,8	39,6;61,9	37,3**	19,5;58,2	51,3**	24,9;77,2	19,0**	8,9;33,3	Oui
-	;	13,9**	4,3;30,6	-	;	5,8**	1,9;13,1	7,7**	0,7;27,0	12,1**	1,3;38,7	4,9**	0,6;16,7	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
86,6	58,1;98,5	67,3	47,8;83,2	69,0*	35,6;92,0	43,4	32,6;54,3	55,0*	33,2;75,5	36,6**	14,2;64,3	76,1	60,8;87,7	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	11,4*	7,7;15,9	7,6**	0,8;26,0
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	7,6*	4,7;11,6	6,4**	0,7;22,3
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	81,0	75,9;85,4	85,9	66,1;96,5
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	13,6*	9,7;18,2	6,7**	0,7;23,0
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	8,7*	5,5;12,8	5,0**	0,1;25,4
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	77,7	72,8;82,7	88,3	68,6;97,7
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	44,8	38,6;51,0	46,3*	25,6;68,0
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	7,6*	4,5;11,8	3,4**	0,0;20,6
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	47,6	41,3;53,9	50,3*	29,5;71,0
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	53,6	48,2;59,0	26,9**	12,2;46,6
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	2,8**	1,1;5,7	3,9**	0,1;21,8
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	43,6	38,1;49,1	69,2	47,8;85,9
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	16,3	11,8;21,5	14,5**	2,9;37,9
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	15,5	11,3;20,4	12,8**	2,4;34,4
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	68,3	62,8;73,8	72,7	48,2;90,0
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	16,6	12,1;22,0	14,9**	3,8;35,5
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	7,5*	4,5;11,6	8,1**	0,9;27,6
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	75,8	70,4;81,2	77,0	54,4;91,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région													
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
13,2**	1,5;41,1	-	;	6,5**	0,1;33,9	17,7*	10,0;27,9	22,3**	7,3;45,5	-	;	10,7**	2,8;25,7	Oui
7,9**	0,2;38,5	9,9**	2,1;26,5	6,5**	0,0;38,5	11,1**	5,0;20,5	4,3**	0,1;24,5	6,7**	0,1;35,1	3,8**	0,4;13,6	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
78,9	50,5;95,2	90,1	73,5;97,9	87,0	55,6;99,0	71,2	59,9;80,8	73,4	50,0;90,0	93,3	64,9;99,9	85,6	70,7;94,7	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
12,8**	1,4;40,3	-	;	35,7**	10,2;69,3	19,9*	12,1;30,0	17,8**	4,4;41,8	6,7**	0,1;35,1	11,0**	3,5;24,5	Oui
-	;	22,1**	8,4;42,5	6,5**	0,0;38,5	9,6**	4,3;17,8	7,9**	0,7;28,4	7,8**	0,2;37,0	3,9**	0,4;13,9	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
87,2	59,7;98,6	77,9	57,5;91,6	57,8**	26,0;85,3	70,5	59,7;79,8	74,3	50,2;90,8	85,5	54,7;98,5	85,1	71,1;94,1	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
34,6**	10,6;66,4	58,2*	39,4;75,3	67,5*	34,7;91,1	43,5	32,2;54,9	48,3*	26,4;70,7	43,9**	17,3;73,5	31,2*	18,1;47,0	Oui
7,0**	0,2;34,3	12,6**	3,2;30,6	-	;	7,8**	3,0;15,9	4,3**	0,1;24,5	14,8**	1,8;44,5	7,8**	1,5;21,8	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
58,4*	28,0;84,6	29,3**	14,5;48,1	32,5**	8,9;65,3	48,7	36,9;60,4	47,4*	25,3;70,2	41,2**	16,5;69,7	61,0	44,2;76,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
39,2**	15,3;67,6	77,7	59,8;90,4	65,0*	34,8;88,3	54,8	43,8;65,9	49,1*	28,0;70,5	54,9**	25,7;81,7	53,3*	36,3;69,7	Oui
-	;	-	;	5,6**	0,0;32,7	3,8**	0,7;11,2	-	;	7,0**	0,2;33,9	2,4**	0,1;12,4	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
60,8*	32,4;84,7	22,3**	9,6;40,2	29,4**	7,9;61,1	41,4	30,2;52,5	50,9*	29,5;72,0	38,1**	13,4;68,4	44,3*	28,5;61,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
-	;	9,1**	1,8;25,1	6,5**	0,1;33,9	24,5*	14,8;36,5	15,5**	4,3;35,6	19,6**	4,3;47,3	16,6**	6,7;32,0	Oui
20,2**	3,7;51,2	17,3**	6,0;35,5	13,6**	0,4;55,6	18,4*	10,6;28,6	15,9**	4,1;37,3	20,4**	3,9;50,8	8,7**	2,6;20,2	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
79,8	48,8;96,3	73,6	55,6;87,2	79,9*	40,8;98,1	57,1	45,5;68,7	68,6	46,4;86,0	60,0*	31,0;84,6	74,7	58,2;87,2	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
14,3**	1,5;44,9	12,6**	3,2;30,3	17,0**	1,8;51,1	19,1*	11,0;29,8	15,4**	4,4;34,8	-	;	23,1**	11,2;39,2	Oui
6,5**	0,1;32,3	15,2**	4,7;33,3	20,1**	1,9;59,2	4,6**	1,3;11,0	-	;	13,6**	1,3;44,1	4,9**	0,5;17,1	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
79,1	50,8;95,3	72,2	53,2;86,7	62,9*	28,3;89,7	76,3	65,4;85,1	84,6	65,2;95,6	86,4	55,9;98,7	72,0	54,8;85,6	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p, r]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	5,2**	2,9;8,6	4,9**	0,1;24,5
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	94,8	91,4;97,1	95,1	75,5;99,9
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	..	;	..	;
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	..	;	..	;
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	5,9**	0,2;28,3	-	;
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	94,1	71,7;99,8	100,0	;
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	27,3**	7,6;56,9	-	;
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	72,7*	43,1;92,4	100,0	;
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	5,9**	0,2;28,3	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	94,1	71,7;99,8	100,0	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	43,8**	19,4;70,6	-	;
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	56,2*	29,4;80,6	100,0	;
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	-	;	-	;
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	100,0	;	100,0	;
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	..	;	..	;
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	..	;	..	;
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	54,5*	27,0;80,2	100,0	;
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	45,5**	19,8;73,0	-	;
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	5,9**	0,2;28,3	-	;
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	94,1	71,7;99,8	100,0	;
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	11,8**	1,3;37,4	-	;
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	88,2	62,6;98,7	100,0	;
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	-	;	-	;
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	100,0	;	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p, r]
24,4**	6,0;54,3	3,1**	0,1;15,6	-	;	7,8**	3,1;15,4	-	;	5,9**	0,1;30,3	1,6**	0,1;8,1	Oui
75,6*	45,7;94,0	96,9	84,4;99,9	100,0	;	92,2	84,6;96,9	-	;	94,1	69,7;99,9	98,4	91,9;99,9	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Oui
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	-	;	-	;	13,9**	0,2;60,8	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	-	;	86,1*	39,2;99,8	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Psychologue
28,0**	0,3;88,9	100,0	;	-	;	27,9**	2,6;73,9	-	;	-	;	-	;	Oui
72,0**	11,1;99,7	-	;	-	;	72,1**	26,1;97,4	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Travailleur social
-	;	-	;	-	;	13,9**	0,2;60,8	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	-	;	86,1*	39,2;99,8	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
48,9**	3,8;95,6	-	;	-	;	57,0**	16,9;91,0	-	;	100,0	;	-	;	Oui
51,1**	4,4;96,2	100,0	;	-	;	43,0**	9,0;83,1	-	;	-	;	100,0	;	Non
														Médicaments
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	-	;	100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Services de transport
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Oui
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Non
														Services d'aide à domicile
76,8**	14,0;99,9	-	;	-	;	57,0**	18,0;90,3	-	;	-	;	-	;	Oui
23,2**	0,1;86,0	100,0	;	-	;	43,0**	9,7;82,0	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
-	;	-	;	-	;	13,9**	0,2;60,8	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	-	;	86,1*	39,2;99,8	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Soins infirmiers à domicile
-	;	-	;	-	;	27,9**	3,5;70,0	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	-	;	72,1*	30,0;96,5	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autres services ou ressources
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	-	;	100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	97,2	93,9;99,0	95,8	78,7;99,9
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	2,8**	1,0;6,1	4,2**	0,1;21,3
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	28,4	22,6;34,1	23,0**	8,0;45,7
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	28,2	22,4;34,1	41,2**	19,8;65,3
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	20,8	15,4;26,2	8,7**	0,9;29,3
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	22,6	17,0;28,2	27,0**	10,7;49,7
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	16,1	11,7;21,3	6,6**	0,8;21,5
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	47,2	41,0;53,5	78,5	57,1;92,5
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	18,6	13,9;24,2	6,8**	0,4;26,9
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	18,0	13,2;23,7	8,1**	0,7;28,6
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	8,1*	4,8;12,6	11,9**	2,4;31,5
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	6,1**	3,3;10,2	8,8**	0,8;30,6
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	26,2	20,5;32,0	27,7**	11,2;50,3
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	12,9*	8,6;18,5	13,1**	2,4;35,6
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	40,2	33,4;47,0	30,8**	12,3;55,4
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	6,5**	3,6;10,6	7,6**	0,7;26,7
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	0,7**	0,1;2,4	-	;
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	5,7**	2,9;9,9	7,3**	0,2;34,8
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	93,7	89,3;96,6	92,7	65,2;99,8
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	87,8	82,3;92,1	96,6	80,3;100,0
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	10,2*	6,3;15,5	3,4**	0,0;19,7
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	2,0**	0,6;4,6	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
100,0	;	96,8	83,8;99,9	100,0	;	96,6	89,9;99,4	94,7	75,4;99,8	100,0	;	97,5	85,8;100,0	Oui
-	;	3,2**	0,1;16,2	-	;	3,4**	0,6;10,1	5,3**	0,2;24,6	-	;	2,5**	0,0;14,2	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
23,0**	5,8;51,2	31,3**	16,3;50,0	66,7*	34,8;90,1	17,5**	9,5;28,3	45,0*	22,9;68,8	37,5**	14,2;66,2	23,3**	11,0;40,2	Médecin spécialiste du cancer
-	;	21,1**	8,5;39,8	17,3**	2,4;48,5	38,1*	26,3;51,0	22,4**	7,7;44,9	45,1**	19,6;72,8	20,5**	9,2;36,6	Médecin de famille
59,0*	31,0;83,3	24,1**	10,7;42,7	-	;	14,3**	7,3;24,1	19,8**	5,7;43,3	-	;	37,8*	22,1;55,8	Autre médecin spécialiste
18,0**	3,4;46,1	23,5**	9,6;43,2	16,0**	1,6;49,1	30,2*	19,2;43,1	12,8**	3,0;31,9	17,3**	3,4;44,0	18,3**	7,9;33,7	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
11,5**	1,1;37,9	20,3**	8,5;37,6	51,5**	21,3;80,9	7,5**	2,5;16,6	27,5**	8,5;55,4	13,2**	1,6;40,8	17,4**	7,6;32,0	Médecin spécialiste du cancer
12,7**	1,3;40,7	31,8**	16,6;50,6	16,4**	1,8;49,2	62,0	49,9;73,1	32,5**	13,4;57,2	63,8*	36,2;86,0	39,8*	24,4;56,7	Médecin de famille
63,5*	35,3;86,2	22,5**	10,1;40,0	-	;	12,3**	5,7;22,3	25,1**	8,7;49,3	-	;	27,7**	14,6;44,4	Autre médecin spécialiste
12,4**	1,4;38,6	25,3**	11,0;45,0	32,1**	9,4;63,6	18,2**	10,0;29,3	14,8**	3,2;37,4	23,0**	5,8;51,1	15,1**	5,5;30,7	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
6,8**	0,2;31,8	6,4**	0,9;20,6	-	;	8,8**	3,5;17,8	9,6**	0,9;33,2	5,7**	0,1;30,6	9,2**	2,0;24,4	Au besoin
-	;	-	;	24,2**	5,3;55,9	6,5**	1,9;15,2	4,7**	0,1;22,9	-	;	7,8**	1,6;21,1	À tous les mois
12,7**	1,6;38,4	25,3**	11,8;43,4	36,1**	11,2;68,1	22,5*	13,2;34,5	38,0**	16,4;63,9	38,5**	14,6;67,5	22,7**	11,2;38,3	À tous les 2 ou 3 mois
19,1**	4,0;46,9	9,7**	1,9;26,5	12,6**	0,3;53,6	11,6**	4,7;22,6	9,9**	0,9;33,7	19,4**	3,3;50,3	14,6**	5,6;29,1	À tous les 4 mois
55,8*	29,1;80,2	52,0*	33,5;70,0	21,2**	3,6;54,1	44,0	32,5;55,5	33,1**	13,7;58,0	36,4**	12,0;67,5	36,6*	21,3;54,2	À tous les 6 mois
5,6**	0,1;31,0	6,6**	0,6;23,8	6,0**	0,1;31,2	6,6**	2,1;14,9	4,7**	0,1;23,2	-	;	9,1**	1,9;24,7	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	-	;	-	;	2,4**	0,3;8,2	-	;	-	;	-	;	Trop long
-	;	8,3**	1,5;23,5	6,0**	0,1;34,7	5,3**	1,4;13,5	-	;	-	;	9,5**	2,0;25,4	Trop court
100,0	;	91,7	76,5;98,5	94,0	65,3;99,9	92,3	83,4;97,3	100,0	;	100,0	;	90,5	74,6;98,0	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
80,3	51,7;96,0	87,6	70,4;96,7	93,2	66,8;99,9	88,8	78,9;95,1	85,6	60,6;97,5	63,3*	28,9;89,8	91,6	76,8;98,3	Tout à fait capable
19,7**	4,0;48,3	12,4**	3,3;29,6	6,8**	0,1;33,2	7,3**	2,5;15,8	10,1**	1,0;34,3	36,7**	10,2;71,1	5,7**	0,6;19,5	En partie capable
-	;	-	;	-	;	4,0**	0,8;11,4	4,3**	0,1;24,1	-	;	2,7**	0,1;13,9	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	58,0	51,7;64,3	74,9	51,2;91,1
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	17,9	13,5;23,1	12,2**	2,1;34,2
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	24,0	18,6;29,4	12,9**	2,4;34,8
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	45,3	32,8;57,7	55,3**	6,9;96,4
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	54,7	42,3;67,2	44,7**	3,6;93,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
29,5**	10,2;56,3	49,1*	31,0;67,3	72,0*	40,7;92,7	61,2	48,7;72,7	63,2*	38,3;83,9	47,7**	18,8;77,8	56,3	39,7;71,8	Oui, tout à fait
38,2**	15,3;65,7	17,6**	7,1;33,6	13,6**	1,6;41,8	16,8**	9,3;26,9	18,6**	4,8;42,8	25,9**	6,7;55,9	15,1**	5,9;29,8	oui, en partie
32,3**	11,2;60,5	33,3*	18,2;51,5	14,5**	1,3;46,5	22,0*	12,9;33,6	18,1**	4,2;43,4	26,4**	5,8;59,8	28,6**	14,5;46,5	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
38,2**	2,7;88,8	-	;	53,0**	6,2;95,7	58,7*	37,5;77,8	40,4**	3,5;89,4	35,4**	0,4;94,7	49,7**	13,9;85,7	Oui
61,8**	11,2;97,3	100,0	;	47,0**	4,3;93,8	41,3*	22,2;62,5	59,6**	10,6;96,5	64,6**	5,3;99,6	50,3**	14,3;86,1	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	25,6	20,5;30,6	34,2**	16,8;55,3
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	48,9	43,0;54,7	50,6*	30,7;70,3
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	25,6	20,3;30,9	15,3**	4,1;35,4
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	24,9	19,1;30,7	30,8**	14,7;51,2
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	46,1	39,7;52,5	46,8*	27,2;67,2
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	29,0	23,1;34,8	22,4**	8,0;44,1
Modification de l'alimentation[p]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	51,4	44,6;58,1	58,3*	37,3;77,3
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	24,9	19,5;30,3	24,9**	10,7;44,5
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	23,7	18,0;29,4	16,8**	5,3;36,0
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	18,1	13,7;23,3	12,0**	3,2;28,5
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	9,8*	6,4;14,2	10,1**	1,8;28,5
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	72,1	66,6;77,5	77,9	57,6;91,6
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	2,2**	0,8;5,0	2,7**	0,0;15,3
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	1,1**	0,1;4,2	-	;
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	96,7	93,2;98,7	97,3	84,7;100,0
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	11,4*	7,6;16,1	17,3**	5,4;37,1
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	4,2**	2,0;7,7	3,6**	0,1;19,7
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	84,4	79,2;88,8	79,1	58,9;92,3
Gestion du stress[p]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	36,5	30,9;42,0	16,1**	5,1;34,7
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	19,2	14,5;24,8	23,9**	9,6;44,5
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	44,3	38,4;50,2	60,0*	40,0;77,8

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p]
11,5**	1,1;38,4	27,8**	13,9;45,8	19,4**	3,8;48,5	29,9*	20,3;41,1	15,4**	4,4;34,5	19,7**	4,1;48,2	24,7**	13,3;39,6	Oui
57,9*	29,6;82,8	38,4*	23,7;54,9	41,4**	15,8;71,0	47,3	36,5;58,1	68,7	45,8;86,4	43,6**	18,1;71,9	50,0*	33,7;66,4	Non
30,6**	10,3;58,7	33,8*	18,4;52,1	39,1**	13,8;69,7	22,7*	14,2;33,3	16,0**	3,3;40,3	36,6**	11,4;68,9	25,2**	12,8;41,5	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
12,5**	1,4;39,5	27,0**	13,5;44,6	23,4**	5,9;52,0	17,3*	10,1;26,8	44,2**	22,4;67,9	22,2**	4,1;54,6	26,4**	13,3;43,4	Oui
50,1**	24,6;75,6	40,7*	24,4;58,8	51,6**	24,8;77,8	47,0	35,7;58,3	30,2**	12,7;53,4	49,1**	19,7;79,1	52,4	36,6;67,9	Non
37,5**	14,6;65,4	32,2*	18,2;49,1	25,0**	6,5;54,4	35,7*	24,8;47,7	25,5**	9,7;48,1	28,7**	7,7;60,0	21,2**	9,8;37,2	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p]
54,0**	24,5;81,5	26,1**	12,6;44,0	38,6**	15,6;66,0	52,8	41,8;63,8	70,2	45,8;88,3	48,3**	21,7;75,6	60,2	43,1;75,6	Oui
27,7**	7,1;59,3	33,1*	18,7;50,3	29,4**	9,0;58,6	20,4*	12,1;31,0	17,3**	4,8;39,2	32,4**	8,9;65,3	24,4**	11,9;41,1	Non
18,3**	3,4;46,9	40,8*	24,8;58,3	32,1**	10,8;60,7	26,8*	17,3;38,3	12,5**	2,3;33,9	19,3**	3,8;48,3	15,4**	5,5;31,6	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
18,4**	3,9;45,3	20,2**	8,0;38,5	21,4**	3,7;54,1	15,8*	9,1;24,8	8,4**	1,2;26,2	51,9**	22,3;80,5	17,0**	7,5;30,9	Oui
11,9**	1,3;38,2	13,7**	4,5;29,5	13,2**	1,4;41,8	7,2**	2,9;14,5	4,3**	0,1;24,5	-	;	14,4**	5,0;29,8	Non
69,7*	43,9;88,7	66,0	47,1;81,8	65,4*	36,2;87,9	77,0	66,7;85,4	87,2	65,2;97,7	48,1**	19,5;77,7	68,6	52,5;82,1	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	3,0**	0,1;16,1	-	;	1,1**	0,0;5,9	-	;	12,7**	1,2;41,9	2,2**	0,0;13,3	Oui
-	;	2,4**	0,1;12,5	-	;	2,6**	0,1;14,1	-	;	-	;	-	;	Non
100,0	;	94,6	81,7;99,4	100,0	;	96,3	86,3;99,7	100,0	;	87,3	58,1;98,8	97,8	86,7;100,0	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
-	;	16,7**	6,7;32,0	22,7**	4,2;55,7	5,4**	1,8;12,2	3,6**	0,1;18,0	12,7**	1,2;41,9	15,1**	5,8;30,0	Oui
-	;	7,8**	1,3;22,8	7,7**	0,3;34,6	3,6**	0,7;10,3	-	;	-	;	6,1**	0,7;20,3	Non
100,0	;	75,6	58,8;88,1	69,5*	37,9;91,5	91,0	83,1;96,0	96,4	82,0;99,9	87,3	58,1;98,8	78,8	63,1;90,1	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p]
37,0**	13,5;66,2	18,5**	7,7;34,7	45,2**	16,7;76,3	56,0	45,0;67,1	31,9**	13,8;55,2	43,5**	16,1;74,2	32,6*	18,5;49,4	Oui
6,1**	0,1;30,1	24,9**	11,8;42,7	18,2**	3,1;47,6	15,4**	8,0;25,8	22,2**	8,2;43,0	18,6**	3,5;47,3	20,2**	9,0;36,4	Non
56,9*	29,0;81,9	56,5	38,6;73,3	36,6**	11,8;68,2	28,6*	18,6;40,3	45,9*	25,4;67,4	37,9**	12,9;68,8	47,2*	31,7;63,1	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	44,4	38,0;50,7	36,3**	18,4;57,5
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	13,5*	9,6;18,2	21,2**	7,5;42,2
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	42,2	35,6;48,7	42,5*	22,6;64,4
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	0,7**	0,1;2,3	-	;
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	99,3	97,7;99,9	100,0	;
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	-	;	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	100,0	;	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]
19,2**	4,3;46,2	25,2**	12,2;42,5	51,8**	24,3;78,4	54,9	43,3;66,4	50,5*	28,3;72,6	42,0**	16,0;71,9	50,2*	34,2;66,1	Oui
6,8**	0,1;34,4	31,7**	16,3;50,6	-	;	5,5**	1,8;12,4	8,1**	1,1;25,7	-	;	20,3**	9,7;35,2	Non
74,0*	45,1;92,8	43,1*	25,9;61,6	48,2**	21,6;75,7	39,6	28,2;52,0	41,4**	20,8;64,6	58,0*	28,1;84,0	29,5*	16,0;46,4	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
-	;	-	;	-	;	2,4**	0,3;8,2	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	97,6	91,8;99,7	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autre
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	63,9	50,4;76,0	100,0	;
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	36,1*	24,0;49,6	-	;
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	87,4	80,8;92,3	90,4	67,3;99,1
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	12,6*	7,7;19,2	9,6**	0,9;32,7
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	51,8	39,7;64,0	65,7**	25,2;93,9
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	48,2	36,0;60,3	34,3**	6,1;74,8
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	33,2*	19,7;49,0	48,2**	3,9;95,1
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	66,8	51,0;80,3	51,8**	4,9;96,1
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	26,3*	17,2;37,3	-	;
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	73,7	62,7;82,8	100,0	;
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	49,5	39,4;59,5	56,4**	22,0;86,7
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	50,5	40,5;60,6	43,6**	13,3;78,0
Prière ou soutien spirituel[p, r]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	68,3	59,6;77,0	86,1	55,5;98,6
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	31,7	23,0;40,4	13,9**	1,4;44,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
52,3**	4,6;96,6	60,6**	9,6;97,4	75,5**	6,6;100,0	53,9*	31,4;75,3	77,6**	14,0;99,9	74,4**	14,0;99,7	55,8**	25,0;83,6	Oui
47,7**	3,4;95,4	39,4**	2,6;90,4	24,5**	0,0;93,4	46,1*	24,7;68,6	22,4**	0,1;86,0	25,6**	0,3;86,0	44,2**	16,4;75,0	Non
														Soutien de la famille ou des amis
100,0	;	87,8	47,8;99,7	89,1	46,3;99,9	87,8	74,6;95,7	75,5*	41,4;95,3	100,0	;	83,0	61,9;95,2	Oui
-	;	12,2**	0,3;52,2	10,9**	0,1;53,7	12,2**	4,3;25,4	24,5**	4,7;58,6	-	;	17,0**	4,8;38,1	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
41,5**	3,5;90,6	35,7**	3,0;85,2	19,2**	0,0;85,1	51,9*	28,0;75,2	63,5**	16,9;95,9	53,0**	9,4;93,1	59,6**	23,9;89,0	Oui
58,5**	9,4;96,5	64,3**	14,8;97,0	80,8**	14,9;100,0	48,1*	24,8;72,0	36,5**	4,1;83,1	47,0**	6,9;90,6	40,4**	11,0;76,1	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
-	;	-	;	-	;	46,6**	22,7;71,6	-	;	38,7**	0,6;95,8	45,8**	11,7;83,2	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	53,4*	28,4;77,3	100,0	;	61,3**	4,2;99,4	54,2**	16,8;88,3	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
33,1**	0,2;94,8	-	;	26,4**	1,5;76,1	38,3**	20,0;59,5	19,4**	1,9;57,2	42,7**	3,3;92,0	25,2**	7,2;53,0	Oui
66,9**	5,2;99,8	100,0	;	73,6**	23,9;98,5	61,7*	40,5;80,0	80,6*	42,8;98,1	57,3**	8,0;96,7	74,8	47,0;92,8	Non
														Exemple de l'entourage[p]
15,4**	0,1;67,7	29,8**	1,9;80,4	48,9**	9,4;89,5	53,9*	35,4;71,7	34,8**	9,7;68,4	78,3*	35,3;98,3	49,8*	28,7;71,0	Oui
84,6*	32,3;99,9	70,2**	19,6;98,1	51,1**	10,5;90,6	46,1*	28,3;64,6	65,2*	31,6;90,3	21,7**	1,7;64,7	50,2*	29,0;71,3	Non
														Prière ou soutien spirituel[p, r]
73,7*	27,5;97,8	58,8**	18,9;91,4	85,3*	36,9;99,8	74,7	58,2;87,3	39,0**	10,3;75,0	100,0	;	41,8**	20,7;65,4	Oui
26,3**	2,2;72,5	41,2**	8,6;81,1	14,7**	0,2;63,1	25,3**	12,7;41,8	61,0**	25,0;89,7	-	;	58,2*	34,6;79,3	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			12,0*	8,3;16,7
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	0,7**	0,1;2,8	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	3,5**	1,6;6,4	-	;
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	11,5*	7,7;16,5	4,8**	0,1;24,4
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	33,5	27,9;39,1	33,9**	17,5;53,6
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	50,8	44,9;56,7	61,4*	41,1;79,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,4*	3,1;8,5	14,6	11,3;18,4	6,2*	3,5;10,0	27,6	23,4;31,9	9,0*	5,8;13,1	6,2**	3,4;10,1	19,0	14,3;24,5	Ensemble des patients
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic
-	;	4,9**	0,4;18,9	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Mauvaise
6,8**	0,1;34,3	2,4**	0,1;12,5	-	;	2,2**	0,2;8,1	4,0**	0,1;21,1	6,6**	0,1;32,7	7,1**	1,7;18,5	Passable
19,0**	4,3;45,4	15,3**	4,9;32,8	5,6**	0,0;32,7	13,1**	5,7;24,6	8,9**	1,2;27,7	-	;	15,6**	6,3;30,0	Bonne
33,2**	11,4;62,2	57,4	39,7;73,7	7,9**	0,1;38,6	25,2*	16,0;36,4	25,0**	9,6;47,0	48,3**	22,5;74,7	34,7*	20,8;50,8	Très bonne
41,0**	17,8;67,6	20,1**	8,3;37,6	86,6	55,8;98,8	59,4	48,4;70,5	62,1*	38,5;82,1	45,1**	19,9;72,4	42,6*	27,9;58,3	Excellente

Région 12

CHAUDIÈRE-APPALACHES

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	49,0	47,7 ; 50,2
Femmes	53,9	51,0	49,8 ; 52,3
Âge			
18 à 49 ans	18,9	19,3	16,5 ; 22,2
50 à 59 ans	24,9	27,1	24,1 ; 30,1
60 à 69 ans	29,8	31,0	27,1 ; 34,8
70 ans et plus	26,5	22,6	19,8 ; 25,5
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	98,7	97,3 ; 99,5
Anglais	10,6	1,1**	0,4 ; 2,5
Autres	3,0	0,2**	0,0 ; 0,9
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	35,2	31,2 ; 39,2
Diplôme d'études secondaires	24,7	22,5	19,3 ; 25,6
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	25,7	22,3 ; 29,0
Diplôme d'études universitaires	20,6	16,7	13,8 ; 19,6
Occupation principale			
En emploi	29,3	30,5	27,2 ; 33,8
Étudiant	1,7	1,6**	0,7 ; 3,0
Retraité	55,8	51,8	48,4 ; 55,2
À la maison	7,2	10,3	7,9 ; 13,1
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	1,8**	0,9 ; 3,1
Congé de maternité / autres	3,6	4,1*	2,7 ; 5,9
Situation familiale			
Vit seul	24,1	20,4	16,9 ; 23,8
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	55,3	51,3 ; 59,4
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	16,8	14,0 ; 19,6
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	3,8*	2,3 ; 5,9
Autres	4,8	3,7*	2,1 ; 5,9
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	16,8	13,9 ; 19,7
Revenu suffisant	61,4	61,1	57,0 ; 65,2
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	22,1	18,6 ; 25,7
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	11,1	8,5 ; 14,1
2	21,1	18,4	15,1 ; 22,0
3	20,1	27,6	23,8 ; 31,4
4	19,4	23,1	19,6 ; 26,5
5 - très défavorisé	17,6	19,8	16,6 ; 23,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	14,0	11,3 ; 16,7	17,5	13,6 ; 22,1	10,6*	7,0 ; 15,2
Génital féminin	5,5	...	10,2	5,5*	3,8 ; 7,6	...	;	10,7*	7,4 ; 14,8
Prostate	15,9	34,4	...	18,1	15,9 ; 20,4	37,0	32,4 ; 41,6	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	8,0	6,1 ; 10,3	10,1*	7,1 ; 13,7	6,1*	3,6 ; 9,5
Sein	26,5	0,4**	48,8	23,9	21,1 ; 26,7	-	;	46,8	41,3 ; 52,3
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	5,7*	3,9 ; 8,0	5,7*	3,3 ; 9,1	5,7*	3,3 ; 9,2
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	7,5*	5,5 ; 10,1	7,9*	5,1 ; 11,7	7,2*	4,2 ; 11,3
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	17,2	14,1 ; 20,6	21,8	17,1 ; 26,5	12,8*	8,7 ; 17,9
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	83,8	80,4 ; 86,9	86,0	81,5 ; 89,8	81,7	76,2 ; 86,4
Récidive	7,4	7,5	7,3	9,0	6,7 ; 11,7	8,7*	5,7 ; 12,5	9,3*	6,0 ; 13,4
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	7,2*	5,2 ; 9,7	5,3**	3,0 ; 8,6	9,1*	5,8 ; 13,3
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	11,0	8,6 ; 13,5	12,7	9,2 ; 16,9	9,4*	6,2 ; 13,7
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	19,0	16,1 ; 22,0	7,3*	4,7 ; 10,7	30,3	25,4 ; 35,2
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	69,9	66,5 ; 73,4	80,0	75,3 ; 84,2	60,2	55,1 ; 65,4
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	48,7	44,6 ; 52,7	51,6	45,8 ; 57,4	45,8	40,2 ; 51,4
Non	58,8	56,6	60,7	51,3	47,3 ; 55,4	48,4	42,6 ; 54,2	54,2	48,6 ; 59,8
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	97,7	96,2 ; 98,7	97,1	94,4 ; 98,8	98,2	96,1 ; 99,3
Non	8,3	8,5	8,0	2,3**	1,3 ; 3,8	2,9**	1,2 ; 5,6	1,8**	0,7 ; 3,9
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	10,4	8,0 ; 13,1	11,1*	7,7 ; 15,3	9,7*	6,6 ; 13,7
Très bon	29,2	29,3	29,1	26,0	22,4 ; 29,7	28,6	23,4 ; 33,7	23,6	18,3 ; 28,9
Bon	34,9	34,2	35,5	39,5	35,3 ; 43,7	39,6	33,7 ; 45,5	39,4	33,4 ; 45,4
Moyen	18,8	17,8	19,6	19,4	16,4 ; 22,5	16,0	12,0 ; 20,8	22,7	17,9 ; 27,4
Mauvais	5,6	5,7	5,5	4,6*	3,0 ; 6,8	4,7**	2,5 ; 7,9	4,6**	2,5 ; 7,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p, r]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p]
14,0	11,3 ; 16,7	4,7**	1,9 ; 9,6	15,0*	10,2 ; 21,1	14,6*	9,7 ; 20,7	19,9*	12,8 ; 28,7	Colorectal
5,5*	3,8 ; 7,6	6,0**	2,4 ; 12,2	7,7**	4,3 ; 12,5	4,8**	2,1 ; 9,3	3,4**	1,0 ; 7,9	Génital féminin
18,1	15,9 ; 20,4	3,2**	0,9 ; 8,2	15,3*	10,5 ; 21,3	27,0	21,4 ; 32,6	22,1	16,2 ; 28,9	Prostate
8,0	6,1 ; 10,3	11,7**	6,6 ; 18,9	8,1*	4,6 ; 13,0	8,8*	5,3 ; 13,5	3,8**	1,4 ; 8,2	Hématopoïétique
23,9	21,1 ; 26,7	39,2	31,3 ; 47,2	30,8	24,6 ; 37,0	15,5*	10,6 ; 21,6	13,8*	8,3 ; 21,2	Sein
5,7*	3,9 ; 8,0	9,8**	5,2 ; 16,3	6,5**	3,4 ; 11,2	3,4**	1,2 ; 7,5	4,6**	1,4 ; 10,5	ORL (Tête et cou)
7,5*	5,5 ; 10,1	3,7**	1,0 ; 9,4	3,4**	1,3 ; 7,4	11,3*	7,0 ; 17,0	10,5**	4,9 ; 19,2	Broncho-pulmonaire
17,2	14,1 ; 20,6	21,6*	14,6 ; 30,0	13,1*	8,4 ; 19,2	14,6*	10,0 ; 20,3	22,0*	13,6 ; 32,3	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
83,8	80,4 ; 86,9	86,2	78,6 ; 91,8	85,6	79,5 ; 90,4	81,2	74,1 ; 87,0	83,4	74,6 ; 90,1	Premier cancer
9,0	6,7 ; 11,7	11,2**	6,2 ; 18,1	10,5*	6,3 ; 16,1	10,3*	5,9 ; 16,5	3,5**	0,7 ; 10,0	Récidive
7,2*	5,2 ; 9,7	2,6**	0,5 ; 7,7	3,9**	1,5 ; 8,2	8,5*	4,8 ; 13,7	13,1**	7,1 ; 21,5	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]
11,0	8,6 ; 13,5	15,4*	9,3 ; 23,4	9,3*	5,4 ; 14,6	11,2*	7,2 ; 16,4	9,1**	4,2 ; 16,6	Sous traitement
19,0	16,1 ; 22,0	24,2*	17,2 ; 32,4	22,0	16,3 ; 28,5	15,8*	10,9 ; 21,9	15,2*	9,1 ; 23,3	Sans traitement avec médication
69,9	66,5 ; 73,4	60,4	51,5 ; 69,2	68,8	62,5 ; 75,1	73,0	66,0 ; 79,2	75,7	66,4 ; 83,5	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p, r]
48,7	44,6 ; 52,7	34,0	25,5 ; 42,4	43,2	35,7 ; 50,7	54,3	47,2 ; 61,5	60,7	50,7 ; 70,8	Oui
51,3	47,3 ; 55,4	66,0	57,6 ; 74,5	56,8	49,3 ; 64,3	45,7	38,5 ; 52,8	39,3	29,2 ; 49,3	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]
97,7	96,2 ; 98,7	93,6	87,5 ; 97,3	97,8	94,4 ; 99,4	99,0	96,3 ; 99,9	99,3	95,8 ; 100,0	Oui
2,3**	1,3 ; 3,8	6,4**	2,7 ; 12,5	2,2**	0,6 ; 5,6	1,0**	0,1 ; 3,7	0,7**	0,0 ; 4,2	Non
										Perception de l'état de santé[p]
10,4	8,0 ; 13,1	9,1**	4,5 ; 15,9	9,3*	5,6 ; 14,3	12,4*	8,0 ; 18,1	10,1**	4,7 ; 18,3	Excellent
26,0	22,4 ; 29,7	20,8*	13,7 ; 29,6	33,1	26,2 ; 40,1	22,5	16,8 ; 28,9	26,8*	18,2 ; 36,9	Très bon
39,5	35,3 ; 43,7	42,4	33,5 ; 51,4	31,9	24,7 ; 39,1	42,4	35,1 ; 49,6	42,2	32,1 ; 52,3	Bon
19,4	16,4 ; 22,5	18,8*	12,1 ; 27,1	21,1	15,6 ; 27,5	18,8*	13,4 ; 25,3	18,9*	12,0 ; 27,6	Moyen
4,6*	3,0 ; 6,8	8,9**	4,2 ; 16,1	4,6**	1,9 ; 9,1	4,0**	1,5 ; 8,2	2,0**	0,4 ; 6,2	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	51,6	47,5;55,6	66,6	54,8;77,0
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	48,4	44,4;52,5	33,4*	23,0;45,2
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	41,0	34,4;47,5	34,1*	21,1;49,1
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	17,7	12,9;23,5	4,0**	0,4;14,4
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	21,6	16,1;28,0	25,5**	12,3;42,9
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	19,7	14,5;25,8	36,4*	22,4;52,4
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	43,7	38,2;49,2	37,9**	18,8;60,3
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	15,3	11,5;19,9	17,3**	5,2;37,8
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	14,7	10,7;19,6	20,9**	6,7;43,3
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	14,3	10,7;18,5	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	11,9*	8,2;16,5	23,9**	7,5;48,9
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	48,5	43,0;54,1	63,9	48,6;77,4
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	22,2	17,7;26,7	13,0**	5,2;25,5
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	18,9	14,7;23,7	12,2**	4,6;24,6
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	10,4*	7,1;14,5	11,0**	4,2;22,1
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	81,8	78,0;85,2	84,3	74,6;91,3
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	13,9	10,8;17,4	13,3**	6,8;22,6
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	4,3*	2,7;6,4	2,5**	0,3;8,6
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p, r]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	2,6*	1,5;4,1	2,3**	0,3;8,3
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	97,4	95,9;98,5	97,7	91,7;99,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
60,3	41,2;77,3	17,8*	10,9;26,6	65,9	50,8;79,0	53,9	46,0;61,8	57,7*	38,3;75,5	26,9**	13,6;44,0	71,1	59,9;80,8	Oui
39,7*	22,7;58,8	82,2	73,4;89,1	34,1*	21,0;49,2	46,1	38,2;54,0	42,3*	24,5;61,7	73,1	56,0;86,4	28,9*	19,2;40,1	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
14,7**	1,7;44,6	31,2**	7,0;66,9	36,8**	16,2;61,6	48,0	35,8;60,2	41,6**	17,2;69,4	13,0**	0,0;68,3	53,1	37,6;68,2	2 semaines et moins
23,7**	6,6;50,8	28,8**	5,9;64,7	24,4**	8,1;48,9	16,2**	8,3;27,4	25,6**	7,3;53,8	13,0**	0,0;67,8	22,3**	11,6;36,6	Plus de 2 semaines à 1 mois
23,2**	6,6;49,5	9,8**	0,1;49,0	25,5**	8,4;51,0	23,0*	13,3;35,4	18,4**	3,1;48,4	73,9**	22,4;98,8	10,8**	3,6;23,5	Plus d'un mois à 3 mois
38,5**	15,9;65,4	30,2**	5,2;69,5	13,3**	3,0;33,6	12,8**	5,9;23,2	14,5**	1,4;46,2	-	;	13,7**	5,6;26,6	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
7,9**	0,2;36,3	62,0	52,1;72,0	62,8*	34,7;85,7	21,9*	12,8;33,6	8,3**	0,1;42,1	57,8*	37,5;76,4	47,7*	27,3;68,6	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
-	;	20,5*	12,9;30,0	19,4**	4,0;47,5	10,3**	4,3;19,9	15,2**	1,4;48,3	8,1**	1,4;23,7	21,8**	7,9;42,8	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
60,7*	29,2;86,7	9,6**	4,6;17,1	-	;	4,2**	0,9;11,7	62,9*	30,4;88,5	10,1**	2,3;25,8	20,1**	6,9;40,9	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	60,6	48,5;71,8	-	;	-	;	3,1**	0,1;16,1	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
31,4**	8,3;64,4	7,9**	3,2;15,7	17,8**	3,2;46,0	3,0**	0,3;10,8	13,6**	1,5;42,2	24,0**	9,4;45,1	7,3**	0,8;24,9	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
40,9**	17,4;67,9	24,2*	14,5;36,3	61,9	42,7;78,7	51,5	40,0;63,0	5,8**	0,1;31,6	68,1*	42,2;87,8	54,6	41,8;67,3	2 semaines et moins
28,7**	9,5;56,1	35,3*	23,2;48,9	14,1**	4,0;32,5	17,2**	9,5;27,7	18,2**	3,4;46,7	15,3**	2,7;41,2	27,9*	17,2;40,8	Plus de 2 semaines à 1 mois
18,9**	3,9;46,7	33,8*	22,8;46,3	8,8**	1,9;23,5	21,4*	12,8;32,5	49,2**	21,4;77,4	12,8**	2,5;33,9	7,4**	2,3;16,9	Plus d'un mois à 3 mois
11,5**	1,3;36,4	6,7**	1,8;16,6	15,1**	4,7;33,1	9,8**	4,1;19,1	26,7**	7,1;57,0	3,7**	0,1;19,6	10,2**	2,9;24,0	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
82,2	64,5;93,5	82,3	73,5;89,1	73,5	58,5;85,4	83,4	75,9;89,2	85,7	68,6;95,6	80,6	60,6;93,3	80,4	69,3;88,8	Oui, tout à fait
14,7**	4,7;31,6	14,0*	8,2;21,9	15,1**	5,8;29,7	13,1*	8,0;19,8	8,3**	1,5;24,1	14,9**	3,8;35,3	15,8**	8,3;26,2	Oui, en partie
3,1**	0,0;17,6	3,7**	1,0;9,2	11,4**	4,0;24,1	3,5**	1,0;8,5	6,0**	0,6;21,1	4,5**	0,6;15,1	3,8**	0,7;11,7	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p, r]
-	;	1,0**	0,0;5,4	2,1**	0,0;11,6	8,0**	4,1;13,8	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	99,0	94,6;100,0	97,9	88,4;100,0	92,0	86,2;95,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	21,8	18,5;25,1	4,0**	0,9;11,0
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	27,2	23,6;30,7	22,2*	13,3;33,4
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	25,0	21,4;28,5	53,9	42,7;65,1
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	22,0	18,5;25,4	12,4**	6,5;20,8
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	2,5**	1,3;4,3	7,5**	2,4;17,1
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	1,0**	0,4;2,3	-	;
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	0,6**	0,1;1,6	-	;
Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	88,2	85,7;90,8	96,5	89,8;99,3
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	11,8	9,2;14,3	3,5**	0,7;10,2
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	93,4	91,0;95,4	95,2	88,5;98,6
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	6,6*	4,6;9,0	4,8**	1,4;11,5
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	90,7	88,0;93,0	92,9	85,4;97,2
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	9,3	7,0;12,0	7,1**	2,8;14,6
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	92,9	90,4;95,0	94,0	86,7;98,0
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	7,1*	5,0;9,6	6,0**	2,0;13,3
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	64,8	60,9;68,7	53,9	42,6;65,2
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	35,2	31,3;39,1	46,1	34,8;57,4
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	62,8	58,9;66,8	63,8	52,3;74,3
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	37,2	33,2;41,1	36,2	25,7;47,7
Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	53,6	48,5;58,7	49,0	36,3;61,7
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	46,4	41,3;51,5	51,0	38,3;63,7
Contact pour du soutien pratique[3, p]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	69,2	65,5;73,0	68,8	56,9;79,0
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	30,8	27,0;34,5	31,2*	21,0;43,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3. On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
9,3**	2,0;24,5	43,7	34,6;52,9	11,8**	4,3;24,3	34,5	26,7;42,2	9,6**	1,9;26,3	22,6**	9,6;41,2	7,7**	3,1;15,5	Médecin de famille
15,0**	4,6;33,0	28,0*	20,0;37,1	61,2	46,2;74,9	24,1*	17,2;32,2	21,5**	8,5;40,7	31,2**	16,2;49,8	22,4*	14,6;31,9	Médecin spécialiste du cancer
11,8**	3,3;27,6	7,7**	3,3;14,7	15,1**	6,2;28,8	33,3	25,5;41,1	23,1**	10,0;41,6	14,8**	5,5;29,9	22,1*	13,5;32,8	Chirurgien
59,3*	39,7;76,9	18,8*	12,1;27,1	11,8**	4,6;23,7	4,7**	1,8;9,6	42,5*	25,3;61,2	23,7**	12,1;39,1	42,7	32,0;53,3	Autre médecin spécialiste
4,5**	0,1;22,4	1,9**	0,2;6,5	-	;	-	;	3,3**	0,1;16,7	4,7**	0,5;16,6	1,8**	0,2;7,2	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	-	;	2,0**	0,4;5,8	-	;	3,0**	0,1;16,4	2,1**	0,3;7,2	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	-	;	-	;	1,5**	0,2;4,9	-	;	-	;	1,3**	0,0;7,1	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]
88,7	72,8;97,0	88,8	81,6;93,9	92,6	81,3;98,1	75,4	67,7;82,1	97,2	86,8;99,9	89,7	72,1;98,0	92,7	85,3;97,1	En personne
11,3**	3,0;27,2	11,2**	6,1;18,4	7,4**	1,9;18,7	24,6	17,9;32,3	2,8**	0,1;13,2	10,3**	2,0;27,9	7,3**	2,9;14,7	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
95,5	77,6;99,9	94,5	88,7;97,9	91,3	79,6;97,5	93,5	88,3;96,9	91,0	75,3;98,2	86,7	68,1;96,6	94,9	86,8;98,7	Oui
4,5**	0,1;22,4	5,5**	2,1;11,3	8,7**	2,5;20,4	6,5**	3,1;11,7	9,0**	1,8;24,7	13,3**	3,4;31,9	5,1**	1,3;13,2	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
83,4	65,2;94,5	93,6	87,4;97,4	91,3	79,6;97,5	89,2	82,9;93,7	91,0	74,0;98,4	84,3	65,9;95,1	93,0	84,5;97,7	Oui
16,6**	5,5;34,8	6,4**	2,6;12,6	8,7**	2,5;20,4	10,8*	6,3;17,1	9,0**	1,6;26,0	15,7**	4,9;34,1	7,0**	2,3;15,5	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
95,5	77,6;99,9	95,5	89,6;98,6	91,7	79,6;97,8	92,6	86,9;96,4	94,1	79,5;99,3	84,3	65,9;95,1	93,1	84,6;97,7	Oui
4,5**	0,1;22,4	4,5**	1,4;10,4	8,3**	2,2;20,4	7,4**	3,6;13,1	5,9**	0,7;20,5	15,7**	4,9;34,1	6,9**	2,3;15,4	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]
52,8*	33,2;71,8	78,8	70,2;86,0	68,1	52,6;81,2	75,1	66,8;82,3	49,4*	31,1;67,9	58,1*	39,4;75,2	54,5	43,8;65,3	Oui
47,2*	28,2;66,8	21,2*	14,0;29,8	31,9*	18,8;47,4	24,9*	17,7;33,2	50,6*	32,1;68,9	41,9*	24,8;60,6	45,5	34,7;56,2	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]
58,2*	39,1;75,7	51,5	41,9;61,2	67,6	52,5;80,4	69,0	61,3;76,6	66,3	47,2;82,1	68,0	49,7;82,9	61,3	49,7;72,0	Oui
41,8*	24,3;60,9	48,5	38,8;58,1	32,4*	19,6;47,5	31,0	23,4;38,7	33,7**	17,9;52,8	32,0**	17,1;50,3	38,7	28,0;50,3	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]
62,6*	36,2;84,4	41,2*	28,7;53,8	61,2	42,4;77,9	68,9	59,1;78,7	33,5**	15,8;55,4	53,5*	32,4;73,7	45,1*	31,3;58,8	Oui
37,4**	15,6;63,8	58,8	46,2;71,3	38,8*	22,1;57,6	31,1*	21,3;40,9	66,5	44,6;84,2	46,5*	26,3;67,6	54,9	41,2;68,7	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p]
68,3	49,1;83,8	62,4	53,3;71,5	82,3	68,6;91,8	73,5	65,6;80,4	68,5	50,2;83,4	74,5	56,6;87,9	63,4	53,0;73,7	Oui
31,7**	16,2;50,9	37,6	28,5;46,7	17,7**	8,2;31,4	26,5	19,6;34,4	31,5**	16,6;49,8	25,5**	12,1;43,4	36,6	26,3;47,0	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	11,3	8,2;15,0	2,0**	0,1;10,7
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	88,7	85,0;91,8	98,0	89,3;99,9
Infirmière pivot en oncologie[p]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	29,8	25,2;34,3	22,8*	12,6;36,0
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	70,2	65,7;74,8	77,2	64,0;87,4
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	4,5**	2,5;7,4	-	;
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	95,5	92,6;97,5	100,0	;
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	10,1*	7,2;13,7	6,0**	0,6;21,4
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	89,9	86,3;92,8	94,0	78,6;99,4
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	9,9*	7,0;13,6	16,4**	7,6;29,2
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	90,1	86,4;93,0	83,6	70,8;92,4
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	2,9**	1,5;5,0	7,7**	2,2;18,3
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	97,1	95,0;98,5	92,3	81,7;97,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]
12,9**	1,3;41,9	14,0**	6,3;25,5	13,5**	3,6;31,9	22,7*	15,0;32,1	-	;	6,5**	0,7;22,5	3,2**	0,3;11,6	Oui
87,1	58,1;98,7	86,0	74,5;93,7	86,5	68,1;96,4	77,3	67,9;85,0	100,0	;	93,5	77,5;99,3	96,8	88,4;99,7	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p]
29,4**	10,8;54,9	16,8**	8,3;28,8	43,1*	26,0;61,6	39,3	29,5;49,1	17,0**	4,8;38,1	39,1**	19,8;61,3	25,3*	14,3;39,2	Oui
70,6*	45,1;89,2	83,2	71,2;91,7	56,9*	38,4;74,0	60,7	50,9;70,5	83,0	61,9;95,2	60,9*	38,7;80,2	74,7	60,8;85,7	Non
														Psychologue[p]
8,0**	0,2;37,1	-	;	8,4**	1,6;23,2	8,8**	4,0;16,4	4,1**	0,1;20,1	-	;	4,8**	0,9;13,7	Oui
92,0	62,9;99,8	100,0	;	91,6	76,8;98,4	91,2	83,6;96,0	95,9	79,9;99,9	100,0	;	95,2	86,3;99,1	Non
														Travailleur social[p]
23,5**	6,9;49,7	3,4**	0,4;11,7	14,5**	4,4;31,9	15,3*	8,8;23,9	4,0**	0,1;20,5	15,0**	4,1;34,5	4,8**	0,9;13,7	Oui
76,5	50,3;93,1	96,6	88,3;99,6	85,5	68,1;95,6	84,7	76,1;91,2	96,0	79,5;99,9	85,0	65,5;95,9	95,2	86,3;99,1	Non
														Médecin[p]
17,9**	3,6;44,9	8,8**	2,7;20,1	15,9**	5,3;33,5	4,7**	1,4;11,3	17,5**	4,9;39,2	-	;	10,2**	3,7;21,6	Oui
82,1	55,1;96,4	91,2	79,9;97,3	84,1	66,5;94,7	95,3	88,7;98,6	82,5	60,8;95,1	100,0	;	89,8	78,4;96,3	Non
														Autre professionnel de la santé
-	;	-	;	2,8**	0,1;15,1	5,0**	1,8;10,7	-	;	-	;	1,5**	0,0;8,3	Oui
100,0	;	100,0	;	97,2	84,9;99,9	95,0	89,3;98,2	100,0	;	100,0	;	98,5	91,7;100,0	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Infirmière pivot en oncologie[p]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	19,0	15,9;22,4	16,4*	9,1;26,2
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	81,0	77,6;84,1	83,6	73,8;90,9
Médecin spécialiste du cancer[p]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	42,3	38,5;46,2	42,3	31,3;53,2
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	57,7	53,8;61,5	57,7	46,8;68,7
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	21,1	17,7;24,6	23,4*	14,1;35,1
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	78,9	75,4;82,3	76,6	64,9;85,9
Autre médecin spécialiste[p, r]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	11,2	8,5;14,3	13,1**	6,4;22,9
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	88,8	85,7;91,5	86,9	77,1;93,6
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	5,0*	3,4;7,1	5,6**	1,5;13,7
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	95,0	92,9;96,6	94,4	86,3;98,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p]
27,0**	12,7;45,9	13,5*	7,6;21,6	24,0**	12,8;38,6	23,4	17,0;30,9	22,5**	10,1;40,0	24,6**	12,0;41,5	12,1**	6,6;20,0	Oui
73,0	54,1;87,3	86,5	78,4;92,4	76,0	61,4;87,2	76,6	69,1;83,0	77,5	60,0;89,9	75,4	58,5;88,0	87,9	80,0;93,4	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p]
38,6*	22,0;57,4	42,1	33,0;51,1	62,5	46,5;76,8	46,0	38,0;53,9	33,1*	18,3;50,9	37,8*	22,0;55,8	34,6	25,3;43,9	Oui
61,4	42,6;78,0	57,9	48,9;67,0	37,5*	23,2;53,5	54,0	46,1;62,0	66,9	49,1;81,7	62,2	44,2;78,0	65,4	56,1;74,7	Non
														Médecin de famille[p]
8,0**	1,0;26,1	17,5*	10,9;25,9	13,9**	5,7;26,8	24,1*	17,3;32,1	8,3**	1,8;22,2	35,4*	20,3;52,9	24,8*	15,9;35,6	Oui
92,0	73,9;99,0	82,5	74,1;89,1	86,1	73,2;94,3	75,9	67,9;82,7	91,7	77,8;98,2	64,6	47,1;79,7	75,2	64,4;84,1	Non
														Autre médecin spécialiste[p, r]
16,6**	5,3;35,4	6,4**	2,6;12,9	4,9**	0,6;16,6	8,9**	4,1;16,2	30,4**	15,1;49,6	7,8**	1,6;21,7	13,8**	7,4;22,8	Oui
83,4	64,6;94,7	93,6	87,1;97,4	95,1	83,4;99,4	91,1	83,8;95,9	69,6	50,4;84,9	92,2	78,3;98,4	86,2	77,2;92,6	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
5,7**	0,8;18,8	2,8**	0,5;8,4	14,0**	5,1;28,5	4,8**	2,0;9,4	13,4**	3,6;31,4	4,4**	0,4;15,8	–	;	Oui
94,3	81,2;99,2	97,2	91,6;99,5	86,0	71,5;94,9	95,2	90,6;98,0	86,6	68,6;96,4	95,6	84,2;99,6	100,0	;	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	81,2	77,8;84,3	81,5	71,2;89,4
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	13,9	11,2;16,6	13,6**	7,4;22,3
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	4,9*	3,2;7,1	4,8**	1,1;13,1
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	71,0	67,1;74,8	65,5	53,0;76,7
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	16,9	13,9;20,1	19,2*	11,0;29,8
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	12,2	9,5;15,2	15,3**	7,4;26,7
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	77,4	73,1;81,6	84,4	72,6;92,5
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	14,7	11,2;18,8	9,7**	3,4;20,7
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	7,9*	5,4;11,1	6,0**	1,7;14,3
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	56,1	51,4;60,7	65,5	52,1;77,2
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	16,5	13,4;20,0	13,8**	6,6;24,4
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	27,4	23,1;31,7	20,7**	11,2;33,4
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	33,4	29,6;37,1	31,9*	21,9;42,0
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	16,0	13,2;18,8	14,7**	8,0;24,0
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	19,7	16,5;23,2	24,6*	15,5;35,7
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	9,0	6,7;11,7	16,2**	8,4;27,0
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	22,0	18,6;25,4	12,6**	6,5;21,2
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	67,4	60,4;74,3	63,7*	41,5;82,4
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	17,2*	11,8;23,8	25,0**	9,5;47,5
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	15,4*	10,4;21,7	11,2**	2,0;31,2
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	23,4	19,7;27,1	15,2**	7,6;26,1
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	76,6	72,9;80,3	84,8	73,9;92,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
77,3	58,5;90,5	87,0	79,0;92,8	79,2	65,4;89,4	77,8	70,1;84,3	79,6	62,0;91,5	79,0	63,9;90,0	83,3	74,1;90,3	Oui, tout à fait
19,8**	7,4;38,8	9,9**	5,1;16,8	15,3**	6,6;28,6	18,8*	12,8;26,2	14,6**	4,8;31,3	11,1**	3,7;24,1	9,8**	4,9;17,1	Oui, en partie
2,9**	0,0;16,4	3,1**	0,6;9,3	5,5**	1,1;15,1	3,4**	0,9;8,6	5,8**	0,6;20,5	9,8**	2,8;22,9	6,9**	2,4;15,0	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
62,4	43,8;78,7	79,0	70,4;86,0	59,3	43,1;74,2	68,6	61,0;76,1	63,4	43,7;80,4	78,7	62,5;90,2	78,1	68,0;86,2	Oui, tout à fait
20,0**	7,5;39,0	12,6*	7,2;20,2	22,3**	11,7;36,3	20,1*	14,0;27,3	25,2**	11,3;44,3	6,5**	1,2;18,4	13,0**	6,9;21,7	Oui, en partie
17,6**	6,3;35,5	8,4**	3,8;15,4	18,4**	8,4;32,9	11,4**	6,3;18,3	11,3**	3,1;26,8	14,9**	5,2;30,9	8,9**	3,6;17,5	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
83,5	57,9;96,7	81,1	69,6;89,6	84,8	68,0;94,8	69,9	60,1;79,7	70,8	46,7;88,6	78,2	55,1;93,0	71,6	57,1;83,4	Oui
10,9**	1,1;35,6	14,3**	7,1;24,6	12,0**	3,3;28,3	17,7*	10,0;27,8	14,2**	2,6;38,1	15,8**	3,3;39,8	19,1**	9,4;32,8	Non, il ne voulait pas
5,7**	0,1;30,1	4,6**	0,9;13,1	3,2**	0,1;16,3	12,5**	6,4;21,2	15,0**	3,0;38,7	6,0**	0,6;21,0	9,2**	3,0;20,5	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
62,9*	39,5;82,5	57,6	46,7;68,5	63,0	44,0;79,4	53,7	43,9;63,4	40,6**	21,0;62,7	59,2*	38,9;77,4	47,0	34,0;60,1	Oui, tout à fait
3,9**	0,1;21,2	17,3*	10,0;27,1	12,7**	3,5;29,5	17,0*	10,4;25,6	31,1**	13,4;54,1	8,7**	1,7;24,2	22,8*	13,3;35,0	Oui, en partie
33,2**	14,7;56,4	25,1*	16,0;36,1	24,4**	10,6;43,4	29,3*	20,8;39,0	28,3**	11,6;50,9	32,1**	15,7;52,7	30,1*	18,1;44,5	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
23,6**	10,6;41,7	31,3	23,0;39,6	47,8*	33,2;62,7	40,7	32,5;48,9	26,3**	11,8;45,8	34,1*	19,1;51,8	24,6*	15,6;35,6	Oui, une infirmière pivot en oncologie
12,9**	3,4;30,5	15,3*	9,0;23,6	6,4**	1,5;16,7	17,5*	11,9;24,5	21,8**	9,6;39,0	9,6**	2,3;24,2	22,8*	14,7;32,8	Oui, un autre professionnel de la santé
14,5**	5,1;30,1	20,1*	12,6;29,6	26,2*	14,7;40,8	17,2*	11,3;24,6	12,2**	3,2;29,1	19,4**	8,9;34,4	19,5*	11,6;29,7	Oui, un membre du personnel administratif
13,6**	4,1;30,5	4,4**	1,5;9,8	7,7**	2,0;18,9	8,6**	3,9;15,8	7,3**	0,8;24,5	2,2**	0,1;11,3	11,0**	4,8;20,8	Oui, un médecin
35,3*	19,1;54,5	28,9*	20,5;38,5	11,9**	4,6;24,0	16,0*	10,3;23,2	32,4**	16,4;52,0	34,7*	18,5;54,0	22,0*	12,9;33,6	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
67,2**	19,7;96,9	70,7	56,0;82,9	83,3	51,6;97,9	57,7	41,6;72,8	87,3	44,4;99,8	67,9*	39,4;89,0	65,6*	42,9;84,0	Oui, tout à fait
19,2**	0,4;71,8	18,0**	8,3;32,0	16,7**	2,1;48,4	14,6**	5,5;29,3	12,7**	0,2;55,6	11,8**	1,0;39,9	16,2**	4,0;38,4	Oui, en partie
13,6**	0,1;62,6	11,2**	3,6;24,7	-	;	27,6**	14,9;43,7	-	;	20,4**	4,2;49,6	18,3**	5,1;40,8	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]
30,7**	14,9;50,7	28,1*	19,8;37,7	12,1**	4,1;25,8	32,8	25,4;40,3	16,1**	5,5;33,5	28,1**	14,6;45,3	14,9**	8,2;24,3	Oui
69,3	49,3;85,1	71,9	62,3;80,2	87,9	74,2;95,9	67,2	59,7;74,6	83,9	66,5;94,5	71,9	54,7;85,4	85,1	75,7;91,8	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	81,5	78,7;84,4	97,9	92,0;99,8
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	18,5	15,6;21,3	2,1**	0,2;8,0
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	30,6	26,0;35,1	4,9**	1,3;12,5
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	69,4	64,9;74,0	95,1	87,5;98,7
Lieu de la chirurgie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	76,9	72,8;81,1	87,1	77,4;93,7
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	23,1	18,9;27,2	12,9**	6,3;22,6
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	48,2	41,5;54,8	65,1	47,2;80,3
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	10,3*	6,8;14,7	-	;
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	41,6	34,9;48,3	34,9*	19,7;52,8
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	64,7	60,2;69,2	72,5	61,1;82,1
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	19,0	15,5;23,0	16,7*	9,4;26,4
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	16,2	12,7;20,2	10,8**	4,3;21,4
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	95,3	92,5;97,3	100,0	;
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	4,7*	2,7;7,5	-	;
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	86,9	83,3;90,0	88,2	78,6;94,6
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	12,1	9,1;15,7	10,5**	4,6;19,9
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	1,0**	0,3;2,5	1,3**	0,0;6,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
87,6	72,2;96,2	60,4	53,0;67,7	36,5*	22,6;52,3	97,3	93,3;99,2	86,3	70,7;95,4	75,7	59,3;88,0	89,0	81,3;94,3	Oui
12,4**	3,8;27,8	39,6	32,3;47,0	63,5	47,7;77,4	2,7**	0,8;6,7	13,7**	4,6;29,3	24,3**	12,0;40,7	11,0**	5,7;18,7	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
6,5**	0,6;23,3	7,6**	2,5;17,1	57,7*	30,7;81,6	54,1	45,7;62,6	16,3**	4,9;35,8	6,0**	0,7;20,1	48,8	37,4;60,2	Oui
93,5	76,7;99,4	92,4	82,9;97,5	42,3**	18,4;69,3	45,9	37,4;54,3	83,7	64,2;95,1	94,0	79,9;99,3	51,2	39,8;62,6	Non
														Lieu de la chirurgie[p, r]
78,5	58,1;92,1	53,3	40,6;66,0	88,9	62,5;99,0	90,1	84,2;94,3	71,3	50,8;86,9	51,7*	30,4;72,5	73,3	61,7;82,9	Hôpital de la région de résidence
21,5**	7,9;41,9	46,7	34,0;59,4	11,1**	1,0;37,5	9,9*	5,7;15,8	28,7**	13,1;49,2	48,3*	27,5;69,6	26,7*	17,1;38,3	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
44,2**	19,2;71,6	40,0*	22,9;59,1	55,8**	19,3;88,0	46,1	34,1;58,2	54,0**	23,7;82,2	34,7**	12,2;63,9	48,1*	32,3;64,1	Oui, tout à fait
27,8**	7,5;58,3	15,9**	5,4;33,1	12,4**	0,3;53,9	9,1**	3,4;18,6	-	;	4,1**	0,0;24,5	15,1**	6,7;27,8	Oui, en partie
28,0**	7,5;58,8	44,2*	27,0;62,4	31,8**	5,6;71,5	44,8	32,5;57,1	46,0**	17,8;76,3	61,1*	31,7;85,6	36,9*	22,4;53,3	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
53,8*	33,8;73,0	77,6	64,9;87,4	62,4*	34,1;85,6	63,4	55,5;71,3	75,0	52,8;90,5	63,0*	38,8;83,2	51,6	40,4;62,9	Oui, tout à fait
24,6**	10,5;44,2	20,9**	11,4;33,3	18,2**	3,9;44,4	16,7*	11,1;23,8	13,6**	3,4;32,6	18,6**	6,3;38,2	23,9*	14,1;36,2	Oui, en partie
21,6**	7,9;42,2	1,5**	0,0;8,1	19,4**	3,7;49,0	19,9*	13,9;27,0	11,4**	2,0;31,7	18,4**	4,9;41,8	24,5*	14,4;37,2	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
96,3	79,8;99,9	98,5	92,5;100,0	100,0	;	93,6	87,8;97,2	96,8	82,0;100,0	85,8	60,9;97,6	93,1	83,6;98,0	Oui
3,7**	0,1;20,2	1,5**	0,0;7,5	-	;	6,4**	2,8;12,2	3,2**	0,0;18,0	14,2**	2,4;39,1	6,9**	2,0;16,4	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
88,7	69,8;97,8	90,5	80,1;96,6	86,2	58,5;98,3	84,2	77,1;89,7	92,4	75,8;99,0	91,5	71,7;99,0	83,3	70,6;92,1	Oui, tout à fait
11,3**	2,2;30,2	9,5**	3,4;19,9	13,8**	1,7;41,5	15,2*	9,7;22,1	3,7**	0,1;19,0	3,8**	0,1;18,3	16,7**	7,9;29,4	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	0,7**	0,0;3,7	3,9**	0,1;20,0	4,7**	0,1;25,6	-	;	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	44,3	41,6;47,0	64,1	54,4;73,9
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	55,7	53,0;58,4	35,9	26,1;45,6
Lieu de la chimiothérapie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	86,6	81,9;90,5	85,6	73,2;93,8
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	13,4*	9,5;18,1	14,4**	6,2;26,8
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	56,0	50,3;61,7	53,6	40,7;66,5
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	31,8	26,2;37,4	32,2*	20,5;45,9
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	12,2*	8,6;16,6	14,2**	6,1;26,5
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	52,1	43,6;60,7	54,8*	35,9;72,8
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	10,4*	6,1;16,3	2,7**	0,1;14,8
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	37,5	29,6;45,3	42,5*	24,9;61,6
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	53,1	46,7;59,6	55,0	39,9;69,4
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	36,8	30,3;43,2	41,6*	28,0;55,2
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	10,1*	6,9;14,2	3,4**	0,4;12,0
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	80,4	75,1;85,0	83,9	71,9;92,2
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	15,1	11,1;19,8	12,5**	5,1;24,2
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	4,5**	2,2;8,1	3,6**	0,4;12,7
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	87,7	83,2;91,4	89,3	77,9;96,0
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	10,4*	7,0;14,8	10,7**	4,0;22,1
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	1,9**	0,6;4,2	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
41,0*	24,7;58,9	3,2**	0,7;9,0	91,3	78,3;97,8	61,1	53,8;68,4	24,1**	11,5;41,2	51,0*	34,0;67,8	30,9	21,8;39,9	Oui
59,0	41,1;75,3	96,8	91,0;99,3	8,7**	2,2;21,7	38,9	31,6;46,2	75,9	58,8;88,5	49,0*	32,2;66,0	69,1	60,1;78,2	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p, r]
100,0	;	100,0	;	88,3	73,7;96,4	93,4	86,4;97,5	53,4**	18,7;85,7	81,4	59,1;94,6	72,9	54,1;87,2	Hôpital de la région de résidence
-	;	-	;	11,7**	3,6;26,3	6,6**	2,5;13,6	46,6**	14,3;81,3	18,6**	5,4;40,9	27,1**	12,8;45,9	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
57,7*	27,8;84,0	100,0	;	68,3	51,6;82,1	57,7	47,7;67,6	27,5**	2,5;73,4	50,5*	27,8;72,9	46,1*	26,3;66,8	Moins de 30 minutes
34,6**	11,0;65,7	-	;	18,2**	7,7;33,8	34,8	24,9;44,7	56,3**	15,4;91,4	25,5**	8,3;51,2	40,7*	22,2;61,4	De 30 à 60 minutes
7,6**	0,1;37,6	-	;	13,5**	5,1;27,3	7,5**	3,1;14,7	16,2**	0,2;67,3	24,0**	8,1;48,0	13,2**	3,9;29,8	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
60,3**	23,1;90,1	100,0	;	57,0*	36,4;75,9	42,5*	28,0;58,1	65,5**	17,4;96,7	61,1**	26,9;88,6	43,7**	18,2;71,9	Oui, tout à fait
11,1**	0,2;52,1	-	;	8,3**	1,2;25,9	14,1**	5,4;27,9	18,6**	0,2;76,1	9,2**	0,2;42,7	18,6**	3,6;47,2	Oui, en partie
28,6**	3,7;70,8	-	;	34,7**	17,1;56,0	43,4*	28,5;59,3	15,9**	0,2;67,2	29,7**	6,0;66,3	37,7**	13,1;68,2	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
41,4**	13,7;73,9	-	;	42,6*	26,6;59,8	47,8	37,1;58,5	61,5**	20,4;92,8	82,5	60,6;95,2	64,0	43,5;81,3	Moins de 30 minutes
31,3**	8,6;63,8	-	;	44,6*	28,7;61,3	39,6	28,6;51,4	38,5**	7,2;79,6	17,5**	4,8;39,4	25,4**	10,7;45,9	De 30 à 60 minutes
27,3**	6,9;58,6	100,0	;	12,8**	4,2;27,6	12,6**	6,5;21,3	-	;	-	;	10,6**	2,5;27,0	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
92,4	62,4;99,9	100,0	;	76,2	58,5;89,1	73,1	62,5;82,1	87,9	46,1;99,8	90,2	69,2;98,7	86,6	67,5;96,7	Oui, tout à fait
7,6**	0,1;37,6	-	;	17,7**	7,2;33,7	21,2*	13,3;31,0	-	;	4,8**	0,1;23,4	13,4**	3,3;32,5	Oui, en partie
-	;	-	;	6,1**	0,6;21,2	5,7**	1,9;12,6	12,1**	0,2;53,9	5,0**	0,2;23,9	-	;	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
92,4	60,9;99,9	100,0	;	86,0	72,4;94,5	86,3	77,9;92,4	78,4*	38,1;97,9	86,7	65,2;97,3	93,0	77,4;99,1	Oui, tout à fait
7,6**	0,1;39,1	-	;	9,6**	2,7;22,9	12,6**	6,7;20,9	11,4**	0,2;53,2	8,5**	1,0;28,2	7,0**	0,9;22,6	Oui, en partie
-	;	-	;	4,4**	0,5;15,7	1,1**	0,0;6,2	10,2**	0,2;45,9	4,8**	0,1;24,6	-	;	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	49,4	46,4;52,4	30,7*	21,4;40,0
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	50,6	47,6;53,6	69,3	60,0;78,6
Lieu de la radiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	48,1	42,6;53,6	41,9*	23,3;62,4
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	51,9	46,4;57,4	58,1*	37,6;76,7
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	14,4	10,7;18,8	14,0**	3,1;35,3
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	45,9	40,5;51,3	62,2*	41,2;80,3
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	39,7	34,4;44,9	23,8**	9,2;44,9
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	57,2	51,1;63,4	73,5	47,2;91,3
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	18,6	14,1;23,9	10,7**	1,3;33,7
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	24,2	18,6;29,8	15,8**	3,3;39,9
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	76,6	72,0;81,3	89,1	69,1;98,1
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	18,1	14,0;22,7	10,9**	1,9;30,9
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	5,3**	3,0;8,7	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
39,8*	24,1;57,3	54,2	46,8;61,7	32,0*	18,6;48,0	83,0	74,9;89,3	50,9*	32,4;69,2	29,0*	15,8;45,5	32,7*	23,0;42,5	Oui
60,2	42,7;75,9	45,8	38,3;53,2	68,0	52,0;81,4	17,0*	10,7;25,1	49,1*	30,8;67,6	71,0	54,5;84,2	67,3	57,5;77,0	Non
														Lieu de la radiothérapie[p]
55,3*	27,3;81,1	46,7	34,1;59,4	41,4**	16,8;69,7	52,5	44,0;61,0	46,8**	20,9;74,0	34,8**	9,9;68,2	45,6*	28,1;63,9	Hôpital de la région de résidence
44,7**	18,9;72,7	53,3	40,6;65,9	58,6*	30,3;83,2	47,5	39,0;56,0	53,2*	26,0;79,1	65,2*	31,8;90,1	54,4*	36,1;71,9	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
16,4**	2,0;48,0	10,5**	4,0;21,4	6,5**	0,2;31,3	15,3*	9,5;22,7	17,3**	4,0;41,9	25,0**	5,0;58,5	16,3**	5,3;34,6	Moins de 30 minutes
45,4**	17,0;76,2	38,5*	25,8;52,5	34,8**	11,6;65,0	46,3	37,6;54,9	52,4*	27,1;76,8	25,6**	4,6;61,2	56,0*	36,6;74,1	De 30 à 60 minutes
38,2**	14,4;67,1	51,0	38,1;64,0	58,7*	30,1;83,6	38,5	30,5;46,4	30,3**	10,5;57,7	49,5**	19,4;79,8	27,8**	13,4;46,5	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
64,6*	30,2;90,4	56,6	43,3;69,9	59,6*	28,1;86,1	55,8	45,4;66,2	41,1**	16,1;70,0	67,9*	29,8;93,6	53,2*	32,3;73,3	Oui, tout à fait
9,1**	0,2;41,9	20,9**	11,1;34,0	16,7**	2,0;49,2	19,4*	11,9;29,0	30,4**	9,5;59,9	10,1**	0,2;48,1	18,0**	6,3;36,8	Oui, en partie
26,2**	5,2;61,0	22,5**	12,2;36,0	23,8**	3,7;60,1	24,8*	15,9;35,6	28,5**	8,6;57,3	22,0**	2,6;60,6	28,8**	12,9;49,8	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
58,4*	30,5;82,8	79,4	67,2;88,7	85,9	55,0;98,6	77,2	69,3;83,9	58,9*	32,0;82,3	82,8	47,6;98,3	69,6	50,0;85,0	Oui, tout à fait
27,1**	7,8;56,1	15,6**	7,4;27,6	6,5**	0,2;31,3	19,2*	12,8;27,1	28,9**	9,0;57,7	8,4**	0,2;40,0	23,8**	10,1;43,2	Oui, en partie
14,5**	2,2;40,9	5,0**	1,0;14,2	7,6**	0,1;39,1	3,6**	1,1;8,6	12,2**	1,2;39,6	8,8**	0,1;43,8	6,6**	0,9;21,5	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Douleur et malaises ressentis[p, r]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	62,7	59,0;66,4	75,5	63,4;85,1
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	37,3	33,6;41,0	24,5*	14,9;36,6
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	21,9	17,6;26,2	17,6**	9,3;29,0
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	45,3	40,1;50,6	51,6	38,7;64,5
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	32,8	27,8;37,8	30,8*	19,3;44,4
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	81,8	77,5;85,6	88,6	78,1;95,3
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	16,4	12,8;20,6	11,4**	4,7;21,9
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	1,7**	0,6;3,9	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p, r]
75,1	55,3;89,3	31,1	22,1;40,0	71,4	56,4;83,6	70,7	63,2;77,4	69,7	51,1;84,6	67,6	49,1;82,8	61,8	49,9;72,8	Oui
24,9**	10,7;44,7	68,9	60,0;77,9	28,6*	16,4;43,6	29,3	22,6;36,8	30,3**	15,4;48,9	32,4**	17,2;50,9	38,2	27,2;50,1	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
32,6**	14,1;56,3	6,6**	0,8;21,8	23,7**	10,3;42,5	16,5*	10,2;24,6	39,3**	20,1;61,2	36,9**	18,8;58,2	24,2**	13,2;38,4	Sévères
42,7**	21,8;65,6	39,0*	22,9;57,2	49,0*	30,3;67,9	52,8	43,7;61,9	31,0**	13,7;53,2	36,1**	18,0;57,6	38,9*	25,3;53,8	Modérés
24,7**	9,3;47,1	54,4*	37,0;71,1	27,3**	12,8;46,4	30,7	21,9;39,6	29,8**	12,5;52,7	27,0**	9,9;51,2	36,9*	23,5;52,1	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
83,6	63,5;95,3	81,7	63,9;93,1	92,2	77,7;98,6	72,2	62,2;80,8	88,6	69,7;97,7	91,1	70,4;99,0	77,0	63,2;87,5	Oui, tout à fait
16,4**	4,7;36,5	18,3**	6,9;36,1	7,8**	1,4;22,3	23,8*	15,9;33,3	7,4**	0,9;24,9	3,9**	0,1;19,6	23,0**	12,5;36,8	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	4,0**	1,0;10,3	3,9**	0,1;20,0	5,0**	0,1;26,3	-	;	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	86,9	83,1;90,1	82,4	69,0;91,7
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	9,9*	7,1;13,2	9,9**	3,1;22,1
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	3,2**	1,7;5,5	7,7**	2,1;18,8
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	10,2	7,7;13,1	11,2**	5,2;20,1
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	89,8	86,9;92,3	88,8	79,9;94,8
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	66,2	62,3;70,2	68,1	56,5;78,3
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	31,8	28,0;35,7	30,7*	20,7;42,3
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	1,9**	0,8;4,0	1,2**	0,0;5,9
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	66,3	62,4;70,3	68,2	55,6;79,1
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	33,7	29,7;37,6	31,8*	20,9;44,4
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	21,6	18,1;25,1	26,7*	17,2;38,2
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	22,1	18,4;25,8	12,3**	6,2;21,2
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	56,3	52,2;60,5	61,0	49,2;71,8
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	73,3	69,0;77,6	81,6	71,0;89,6
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	19,7	15,9;24,0	14,5**	7,5;24,4
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	7,0*	4,6;10,1	4,0**	0,8;11,6
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p, r]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	58,7	53,1;64,4	67,1	53,0;79,3
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	41,3	35,6;46,9	32,9*	20,7;47,0
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	82,5	78,8;85,7	80,1	69,0;88,5
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	17,2	13,9;20,8	19,9*	11,5;31,0
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	0,3**	0,0;1,9	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
79,0	54,1;94,1	90,5	79,0;96,9	88,8	72,6;97,2	85,2	77,7;91,0	93,1	76,8;99,2	93,4	77,8;99,2	86,4	73,8;94,4	Oui, tout à fait
15,8**	3,1;40,9	7,8**	2,1;18,7	8,8**	1,7;24,4	12,5*	7,3;19,6	3,5**	0,1;17,8	3,0**	0,1;16,4	11,7**	4,3;24,2	Oui, en partie
5,2**	0,1;28,0	1,7**	0,0;9,5	2,4**	0,1;12,8	2,2**	0,3;7,3	3,4**	0,1;18,2	3,6**	0,1;17,8	1,9**	0,0;11,2	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
5,1**	0,1;24,9	5,9**	2,2;12,5	15,1**	6,6;28,0	8,9**	4,8;14,9	11,5**	3,1;27,4	10,0**	2,7;24,0	14,8**	7,8;24,7	Oui
94,9	75,1;99,9	94,1	87,5;97,8	84,9	72,0;93,4	91,1	85,1;95,2	88,5	72,6;96,9	90,0	76,0;97,3	85,2	75,3;92,2	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
56,2*	36,2;74,7	76,2	66,3;84,5	73,5	58,3;85,5	65,1	57,3;72,9	58,8*	39,4;76,4	70,0	50,4;85,3	55,4	44,4;66,3	Oui, toujours
43,8*	25,3;63,8	22,8*	14,8;32,6	26,5*	14,5;41,7	34,2	26,4;42,0	38,4*	21,2;57,9	22,2**	8,8;41,7	40,5	29,4;51,6	Oui, la plupart du temps
-	;	1,0**	0,0;5,1	-	;	0,7**	0,0;3,9	2,9**	0,0;16,7	7,8**	1,6;21,7	4,1**	0,3;16,0	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
64,9	45,0;81,6	60,1	50,6;69,6	72,5	58,2;84,0	85,8	78,1;91,5	44,0*	26,9;62,2	69,4	50,2;84,6	47,3	36,3;58,3	Oui
35,1**	18,4;55,0	39,9	30,4;49,4	27,5*	16,0;41,8	14,2*	8,5;21,9	56,0*	37,8;73,1	30,6**	15,4;49,8	52,7	41,7;63,7	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]
24,2**	10,5;43,2	11,7**	6,0;19,8	25,5**	13,5;41,1	26,6	19,7;34,4	15,7**	5,2;33,2	31,5*	17,0;49,3	15,6**	7,8;26,6	Oui
21,6**	8,7;40,5	17,4*	10,5;26,2	25,1**	13,4;40,4	28,7	21,0;37,5	16,6**	6,0;33,7	19,9**	8,8;35,8	28,1*	18,2;40,0	Non, mais il aurait aimé l'être
54,2*	34,4;73,1	71,0	61,2;79,5	49,3	34,4;64,3	44,7	36,5;52,9	67,7	48,7;83,2	48,6*	31,5;65,9	56,3	45,2;67,4	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
69,0	45,5;87,0	77,4	65,3;86,9	72,7	54,9;86,4	70,7	60,4;79,6	70,2*	44,6;89,0	83,0	65,0;94,1	62,0	48,9;73,8	Oui, tout à fait
26,6**	10,4;49,2	18,1**	9,9;29,2	21,8**	9,9;38,7	19,1*	11,4;29,0	24,5**	7,7;50,1	17,0**	5,9;35,0	24,2*	14,0;37,0	Oui, en partie
4,4**	0,1;23,2	4,5**	0,9;13,1	5,4**	0,6;18,7	10,2**	5,0;18,1	5,2**	0,1;26,4	-	;	13,9**	5,5;27,0	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p, r]
70,0*	38,6;91,6	49,9*	34,4;65,4	73,4	49,4;90,2	46,1	35,6;56,7	59,9*	37,2;79,9	67,9	47,7;84,1	63,2	46,8;77,7	Oui
30,0**	8,4;61,4	50,1*	34,6;65,6	26,6**	9,8;50,6	53,9	43,3;64,4	40,1**	20,1;62,8	32,1**	15,9;52,3	36,8*	22,3;53,2	Non
														Patient traité de manière respectueuse
85,5	66,1;96,2	92,9	85,9;97,2	90,4	79,0;96,8	80,2	73,1;86,1	85,1	68,0;95,2	69,7	50,0;85,2	75,9	64,4;85,2	Oui, toujours
14,5**	3,8;33,9	7,1**	2,8;14,1	9,6**	3,2;21,0	19,8*	13,9;26,9	14,9**	4,8;32,0	30,3**	14,8;50,0	22,1*	13,3;33,2	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	2,0**	0,0;11,0	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	1,9**	0,9;3,5	2,7**	0,3;9,4
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	5,1*	3,5;7,2	7,0**	2,2;16,0
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	1,5**	0,7;3,0	2,7**	0,3;9,7
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	91,4	88,9;93,6	87,6	77,7;94,2
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	71,3	67,3;75,2	60,9	48,5;72,3
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	23,6	20,0;27,2	33,6*	22,8;45,8
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	5,1*	3,5;7,3	5,6**	1,4;14,1
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	88,2	85,2;90,8	86,6	77,2;93,2
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	10,5	8,1;13,4	13,4**	6,8;22,8
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	1,3**	0,5;2,6	-	;
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	66,7	60,5;72,9	82,0	66,7;92,3
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	33,3	27,1;39,5	18,0**	7,7;33,3
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	4,4*	2,9;6,3	7,1**	2,5;15,3
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	95,6	93,7;97,1	92,9	84,7;97,5
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	76,5	72,1;80,9	67,3	53,4;79,2
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	9,6*	6,8;13,1	10,0**	3,7;20,7
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	13,9	10,4;18,1	22,7*	12,8;35,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
-	;	1,0**	0,0;5,7	-	;	1,5**	0,2;5,6	2,6**	0,1;13,9	3,8**	0,1;19,6	3,3**	0,6;9,8	Oui, souvent
3,8**	0,1;20,4	1,0**	0,0;5,0	6,6**	1,4;17,8	6,1**	2,9;11,2	-	;	10,6**	2,9;25,0	5,7**	1,9;12,8	Oui, parfois
3,2**	0,1;16,5	-	;	1,9**	0,0;10,4	2,6**	0,6;6,9	-	;	2,7**	0,1;14,6	-	;	Oui, une seule fois
93,1	76,4;99,2	98,0	92,9;99,8	91,5	79,3;97,8	89,8	83,2;94,4	97,4	86,1;99,9	82,9	66,6;93,4	91,0	82,6;96,1	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
62,0*	41,5;79,8	80,7	71,5;87,9	66,6	51,1;79,9	73,2	64,8;80,5	70,0	51,9;84,5	67,4	50,0;81,9	73,9	62,8;83,1	Oui, toujours
28,1**	13,5;47,0	18,3*	11,2;27,3	31,1*	18,7;46,0	19,3*	13,0;26,9	21,1**	9,1;38,5	27,5**	13,8;45,1	21,8*	13,4;32,3	Oui, la plupart du temps
10,0**	2,0;26,7	1,0**	0,0;5,5	2,2**	0,1;11,9	7,5**	3,9;12,9	8,8**	1,7;24,8	5,1**	0,7;16,5	4,3**	1,1;11,2	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
100,0	;	90,5	82,9;95,5	87,4	73,8;95,5	85,5	78,8;90,8	97,4	86,0;99,9	90,5	77,5;97,4	83,1	72,8;90,7	Oui, toujours
-	;	8,4**	3,8;15,7	10,7**	3,4;23,9	11,4*	6,9;17,5	2,6**	0,1;14,0	7,4**	1,6;20,0	16,9**	9,3;27,2	Oui, la plupart du temps
-	;	1,0**	0,0;4,9	1,9**	0,1;9,8	3,1**	0,7;8,2	-	;	2,0**	0,0;11,9	-	;	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]
82,7*	45,1;98,6	80,9	64,5;91,9	64,2*	30,2;90,0	45,9*	31,3;61,1	55,1**	15,3;90,4	67,5*	42,5;86,9	64,1	44,8;80,5	Oui
17,3**	1,4;54,9	19,1**	8,1;35,5	35,8**	10,0;69,8	54,1	38,9;68,7	44,9**	9,6;84,7	32,5**	13,1;57,5	35,9*	19,5;55,2	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
4,9**	0,1;24,1	3,6**	0,9;9,2	2,2**	0,1;11,6	4,0**	1,5;8,4	6,4**	0,8;20,7	7,8**	1,6;21,2	2,0**	0,2;7,2	Oui
95,1	75,9;99,9	96,4	90,8;99,1	97,8	88,4;99,9	96,0	91,6;98,5	93,6	79,3;99,2	92,2	78,8;98,4	98,0	92,8;99,8	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
73,8	47,5;91,5	75,8	64,3;85,1	87,9	70,5;96,9	80,3	71,3;87,4	65,1*	40,5;85,0	88,1	66,4;98,0	71,8	56,8;83,9	Oui, tout à fait
21,9**	5,9;48,1	10,1**	4,0;20,2	3,0**	0,1;16,3	10,6**	5,6;17,8	9,4**	1,2;29,4	-	;	11,8**	4,4;24,0	Oui, en partie
4,3**	0,1;23,2	14,1**	6,8;24,8	9,1**	1,8;24,9	9,2**	4,4;16,4	25,5**	8,8;50,0	11,9**	2,0;33,6	16,4**	7,0;30,6	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p, r]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	83,7	80,4;86,7	88,1	77,2;95,0
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	16,3	13,3;19,6	11,9**	5,0;22,8
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	15,2	12,2;18,6	18,8**	10,2;30,3
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	84,8	81,4;87,8	81,2	69,7;89,8
Médecin spécialiste[p, r]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	17,5	14,2;21,3	15,5**	8,0;25,9
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	82,5	78,7;85,8	84,5	74,1;92,0
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	24,4	20,8;28,0	16,4*	9,2;26,2
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	75,6	72,0;79,2	83,6	73,8;90,8
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	6,8*	4,9;9,2	10,6**	5,0;19,1
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	93,2	90,8;95,1	89,4	80,9;95,0
CLSC[p, r]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	25,3	21,5;29,0	25,5*	15,6;37,6
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	74,7	71,0;78,5	74,5	62,4;84,4
Urgence d'un hôpital[p, r]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	24,9	21,4;28,4	39,8	29,1;50,4
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	75,1	71,6;78,6	60,2	49,6;70,9
Unité de soins d'un hôpital[p]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	13,3	10,7;16,4	12,9**	6,3;22,7
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	86,7	83,6;89,3	87,1	77,3;93,7
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	1,9**	0,9;3,5	-	;
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	98,1	96,5;99,1	100,0	;
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	0,2**	0,0;0,9	-	;
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	99,8	99,1;100,0	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p, r]
93,7	78,5;99,3	69,4	60,3;78,6	89,4	76,6;96,6	90,8	84,7;95,0	62,9	42,7;80,3	79,3	60,0;92,1	88,2	76,5;95,4	Oui
6,3**	0,7;21,5	30,6*	21,4;39,7	10,6**	3,4;23,4	9,2**	5,0;15,3	37,1*	19,7;57,3	20,7**	7,9;40,0	11,8**	4,6;23,5	Non
														Médecin de famille[p]
13,1**	2,6;34,8	20,9*	13,8;29,7	9,4**	3,3;20,1	8,9**	5,0;14,6	15,7**	5,1;33,6	23,9**	11,2;41,2	14,8**	7,1;26,1	Oui
86,9	65,2;97,4	79,1	70,3;86,2	90,6	79,9;96,7	91,1	85,4;95,0	84,3	66,4;94,9	76,1	58,8;88,8	85,2	73,9;92,9	Non
														Médecin spécialiste[p, r]
27,0**	12,0;47,2	9,1**	4,3;16,3	26,9*	15,0;41,9	20,9*	14,4;28,8	29,9**	14,5;49,5	6,6**	1,3;18,7	15,7**	7,8;27,0	Oui
73,0	52,8;88,0	90,9	83,7;95,7	73,1	58,1;85,0	79,1	71,2;85,6	70,1	50,5;85,5	93,4	81,3;98,7	84,3	73,0;92,2	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
24,3**	9,9;44,7	14,7**	8,1;23,7	34,2*	21,1;49,4	34,3	26,4;42,1	24,0**	10,7;42,2	34,8*	19,4;52,9	16,3**	8,7;26,7	Oui
75,7	55,3;90,1	85,3	76,3;91,9	65,8	50,6;78,9	65,7	57,9;73,6	76,0	57,8;89,3	65,2	47,1;80,6	83,7	73,3;91,3	Non
														Info-Santé[p]
–	;	6,0**	2,2;12,6	8,2**	2,4;19,2	9,1**	5,1;14,8	6,8**	0,8;22,8	11,1**	3,0;26,3	–	;	Oui
100,0	;	94,0	87,4;97,8	91,8	80,8;97,6	90,9	85,2;94,9	93,2	77,2;99,2	88,9	73,7;97,0	100,0	;	Non
														CLSC[p, r]
15,4**	4,4;34,8	31,7	23,0;40,4	12,6**	4,6;25,7	19,9*	13,7;27,5	21,6**	8,8;40,3	23,1**	10,4;40,6	39,3	28,0;51,4	Oui
84,6	65,2;95,6	68,3	59,6;77,0	87,4	74,3;95,4	80,1	72,5;86,3	78,4	59,7;91,2	76,9	59,4;89,6	60,7	48,6;72,0	Non
														Urgence d'un hôpital[p, r]
23,3**	8,9;44,4	15,1*	8,7;23,8	38,0*	23,9;53,8	24,5	18,0;32,0	21,1**	8,5;39,7	26,9**	12,7;45,5	16,5**	9,0;26,7	Oui
76,7	55,6;91,1	84,9	76,2;91,3	62,0	46,2;76,1	75,5	68,0;82,0	78,9	60,3;91,5	73,1	54,5;87,3	83,5	73,3;91,0	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p]
16,3**	5,5;34,3	10,9**	5,6;18,6	14,2**	6,2;26,2	13,5*	8,5;20,0	18,5**	7,5;35,0	10,5**	2,9;25,1	14,1**	7,4;23,5	Oui
83,7	65,7;94,5	89,1	81,4;94,4	85,8	73,8;93,8	86,5	80,0;91,5	81,5	65,0;92,5	89,5	74,9;97,1	85,9	76,5;92,6	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
3,7**	0,1;17,7	–	;	1,7**	0,0;9,5	4,6**	1,7;10,0	–	;	2,8**	0,1;14,4	1,2**	0,0;6,2	Oui
96,3	82,3;99,9	100,0	;	98,3	90,5;100,0	95,4	90,0;98,3	100,0	;	97,2	85,6;99,9	98,8	93,8;100,0	Non
														Autre contact
–	;	–	;	–	;	0,7**	0,0;3,6	–	;	–	;	–	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	99,3	96,4;100,0	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	67,2	62,5;71,9	72,8	60,3;83,1
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	15,3	12,2;18,9	15,9**	8,3;26,5
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	17,5	13,8;21,7	11,3**	4,2;23,1
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	52,1	47,4;56,7	45,7*	32,2;59,3
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	14,0	10,9;17,6	17,9**	8,8;30,7
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	34,0	29,4;38,5	36,4*	22,9;51,6
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	43,6	39,1;48,0	48,6	35,9;61,4
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	24,0	20,2;27,8	32,7*	21,6;45,5
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	32,4	28,0;36,9	18,6**	9,1;31,9
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	41,6	36,9;46,3	38,5*	25,1;53,2
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	19,1	15,4;23,2	23,4*	13,3;36,3
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	39,3	34,6;44,1	38,1*	24,7;53,0
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	54,4	49,7;59,0	68,7	56,6;79,2
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	20,5	16,8;24,2	23,3*	14,3;34,6
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	25,1	20,8;29,4	8,0**	2,6;17,9
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	55,5	50,8;60,2	71,3	58,4;82,0
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	24,5	20,5;28,6	18,7**	10,2;30,1
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	19,9	16,1;24,2	10,1**	3,8;20,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
74,8	49,4;91,8	57,1	45,1;69,1	72,2	53,7;86,4	72,6	64,1;80,1	82,0	58,5;95,4	74,6	53,7;89,6	46,3	33,2;59,5	Oui, tout à fait
4,7**	0,1;25,8	12,8**	5,6;23,9	12,3**	3,8;27,4	19,8*	13,6;27,4	7,6**	0,7;26,6	2,3**	0,0;13,3	23,5*	13,5;36,2	Oui, en partie
20,4**	5,6;45,3	30,1*	19,8;42,2	15,6**	5,4;32,3	7,5**	3,6;13,7	10,3**	1,0;34,6	23,1**	8,5;44,6	30,2*	17,5;45,6	Non
														La sexualité[p]
54,4*	31,1;76,3	76,7	67,2;84,5	36,8*	20,1;56,3	44,1	34,9;53,3	48,6**	21,6;76,2	61,2*	40,3;79,5	36,1*	24,3;49,3	Oui, tout à fait
16,4**	4,6;37,1	13,2**	7,4;21,2	21,5**	9,1;39,3	12,3**	6,9;19,8	6,8**	0,1;34,0	-	;	18,3**	9,0;31,4	Oui, en partie
29,2**	11,8;52,6	10,1**	5,1;17,5	41,7*	23,8;61,3	43,6	34,2;52,9	44,6**	18,8;72,8	38,8*	20,5;59,7	45,6*	32,0;59,2	Non
														Les émotions[p]
38,1**	18,4;61,2	42,3	31,2;53,5	33,0*	18,3;50,8	48,0	38,6;57,3	53,7*	30,6;75,7	46,5*	28,9;64,7	34,4*	22,5;47,8	Oui, tout à fait
23,0**	7,8;46,1	27,3*	17,9;38,4	30,9*	17,0;47,9	21,0*	14,3;29,0	24,2**	8,7;47,3	14,7**	4,6;32,2	18,9**	9,3;32,1	Oui, en partie
38,8**	18,2;63,0	30,4*	20,5;40,3	36,1*	20,8;53,8	31,1	22,7;39,4	22,0**	6,9;45,9	38,8*	21,7;58,1	46,8*	32,4;61,5	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
38,6**	18,8;61,5	52,4	41,9;63,0	28,3**	13,5;47,6	45,5	36,0;55,0	30,2**	10,5;57,4	43,1*	25,2;62,5	31,1*	19,3;45,0	Oui, tout à fait
25,1**	8,5;49,7	19,4*	11,4;29,9	27,7**	12,9;47,3	16,9*	10,6;24,8	16,3**	3,1;42,1	10,1**	1,7;29,1	17,5**	7,7;31,8	Oui, en partie
36,4**	15,9;61,2	28,1*	19,4;38,3	44,0*	25,7;63,6	37,6	28,4;46,9	53,5*	27,9;77,9	46,8*	26,8;67,5	51,4	36,0;66,7	Non
														Les besoins alimentaires[p]
56,2*	33,3;77,3	48,4	36,6;60,3	53,2*	36,1;69,7	48,7	39,9;57,5	63,5*	42,0;81,7	59,6*	40,1;77,1	48,7	35,6;61,8	Oui, tout à fait
11,8**	1,4;36,9	15,6**	7,8;26,7	26,3**	12,5;44,5	19,0*	13,4;25,9	6,6**	0,9;21,6	17,0**	6,3;33,9	32,4*	20,5;46,2	Oui, en partie
32,0**	13,2;56,5	36,0*	24,8;48,4	20,6**	9,2;36,7	32,3	24,2;40,3	29,9**	13,8;50,6	23,4**	9,6;43,2	18,9**	8,6;33,6	Non
														Les activités courantes[p]
63,8*	41,8;82,2	59,9	49,0;70,8	59,0	40,7;75,7	49,4	40,2;58,6	51,4*	28,3;74,0	44,0*	25,8;63,6	48,6	35,6;61,7	Oui, tout à fait
28,0**	11,3;50,8	9,9**	4,0;19,4	20,0**	8,3;37,2	30,8	22,5;39,0	28,3**	10,5;53,0	27,0**	12,6;46,1	33,7*	21,4;47,9	Oui, en partie
8,2**	1,0;26,4	30,2*	20,4;41,5	21,0**	9,3;37,8	19,8*	13,0;28,4	20,3**	6,0;43,8	29,0**	12,7;50,6	17,6**	8,1;31,4	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	88,3	85,1;91,0	86,2	77,0;92,7
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	10,5	8,0;13,5	13,8**	7,3;23,0
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	1,2**	0,3;3,3	-	;
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	66,4	62,4;70,4	74,8	64,5;83,4
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	28,0	24,3;31,7	19,5*	11,8;29,4
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	4,2*	2,5;6,5	4,5**	1,3;11,0
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	1,5**	0,6;2,9	1,2**	0,0;6,5
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	63,6	59,5;67,8	62,6	50,5;73,6
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	21,6	18,1;25,2	25,8*	16,4;37,2
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	14,8	11,8;18,2	11,6**	5,5;20,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
91,6	72,8;99,0	89,7	82,8;94,5	95,9	86,0;99,5	91,7	86,0;95,6	84,9	67,4;95,1	92,9	80,4;98,5	77,4	65,3;86,9	Oui, tout à fait
8,4**	1,0;27,2	9,4**	4,7;16,5	1,9**	0,1;9,8	7,6**	3,9;13,3	15,1**	4,9;32,6	7,1**	1,5;19,6	18,3**	9,7;30,0	Oui, en partie
-	;	0,9**	0,0;4,8	2,2**	0,1;11,6	0,7**	0,0;4,0	-	;	-	;	4,3**	0,3;17,4	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
45,3*	27,2;64,4	71,5	61,9;79,8	62,3	46,6;76,3	66,4	58,1;74,6	63,0	44,2;79,3	68,5	51,3;82,6	62,4	50,0;73,7	Toujours
51,7*	33,1;69,9	23,9*	16,0;33,3	33,3*	20,2;48,5	25,6	18,4;33,9	34,5*	18,7;53,3	29,5**	15,7;46,7	30,1*	20,1;41,6	La plupart du temps
3,0**	0,1;17,0	3,7**	1,0;9,2	2,2**	0,1;11,0	5,4**	2,2;10,8	-	;	-	;	7,5**	1,7;19,6	À l'occasion
-	;	0,9**	0,0;5,1	2,2**	0,0;12,1	2,6**	0,5;7,7	2,5**	0,1;13,8	2,0**	0,0;11,6	-	;	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
55,8*	36,0;74,4	74,9	65,3;83,0	60,7	45,0;74,8	63,4	55,3;71,4	55,3*	35,5;74,0	72,7	55,1;86,3	54,4	42,9;65,9	Oui, tout à fait
22,6**	9,4;41,7	16,8*	10,5;24,9	25,5**	13,5;41,0	20,0*	13,3;28,2	24,1**	10,3;43,4	16,3**	5,8;33,2	25,4*	15,5;37,7	Oui, en partie
21,5**	8,1;41,6	8,3**	3,8;15,2	13,8**	5,7;26,6	16,6*	10,9;23,8	20,6**	7,9;39,6	11,0**	3,4;24,6	20,2*	11,3;31,8	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	80,8	77,2;84,1	84,2	73,9;91,6
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	10,1	7,7;13,1	9,8**	4,0;19,4
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	9,0	6,7;11,8	5,9**	1,9;13,7
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	88,5	85,2;91,4	87,4	77,1;94,2
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	8,4*	6,0;11,4	10,8**	4,8;20,1
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	3,0**	1,6;5,2	1,8**	0,0;10,0
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	79,2	74,1;84,3	78,3	65,4;88,1
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	12,2*	8,6;16,6	12,5**	5,2;24,0
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	8,6*	5,4;12,9	9,2**	3,0;20,3
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	61,6	56,1;67,1	66,7	47,1;82,8
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	17,4	13,3;22,1	26,5**	11,6;46,7
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	21,0	16,5;25,5	6,8**	0,8;23,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
88,8	70,0;97,8	74,0	64,4;82,1	81,3	65,6;91,9	85,7	78,7;91,1	81,0	61,9;93,2	80,1	61,1;92,6	76,3	66,2;84,6	Aucun report
-	;	12,9**	7,2;20,7	10,1**	3,1;22,8	8,4**	4,3;14,3	10,4**	2,2;27,7	3,2**	0,1;15,9	16,3**	8,9;26,2	Un report
11,2**	2,2;30,0	13,2**	7,3;21,4	8,6**	2,2;21,4	5,9**	2,5;11,5	8,6**	1,5;24,5	16,6**	5,6;34,7	7,4**	2,9;15,1	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
93,1	76,6;99,2	86,1	74,8;93,6	94,0	68,2;99,9	92,0	86,2;96,0	86,1	68,1;96,0	74,4	52,7;89,8	89,7	80,3;95,6	Aucun report
-	;	7,8**	2,4;17,9	6,0**	0,1;31,8	8,0**	4,0;13,8	10,4**	2,2;27,3	14,4**	3,6;34,6	7,7**	2,6;17,0	Un report
6,9**	0,8;23,4	6,1**	1,7;14,6	-	;	-	;	3,6**	0,1;18,3	11,2**	2,0;31,3	2,5**	0,4;8,5	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
66,2*	32,9;90,7	100,0	;	68,1	51,8;81,7	83,4	73,9;90,5	78,4*	38,1;97,9	88,6	65,7;98,4	81,6	64,0;93,0	Aucun report
15,7**	1,5;49,0	-	;	18,9**	8,8;33,2	9,8**	4,5;18,0	11,4**	0,2;53,2	6,8**	0,2;30,7	12,8**	3,6;29,8	Un report
18,1**	2,0;53,0	-	;	13,0**	4,4;27,5	6,8**	2,6;14,0	10,2**	0,2;45,9	4,6**	0,1;22,3	5,6**	0,7;19,1	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
56,9*	27,1;83,4	40,0*	27,2;52,8	87,4	58,0;98,9	68,6	60,4;76,7	59,5*	34,1;81,6	74,6*	40,5;95,0	56,1*	37,9;73,3	Aucun report
14,5**	1,9;42,5	15,2**	7,2;27,1	12,6**	1,1;42,0	17,6*	11,6;25,0	22,5**	5,7;50,3	17,1**	1,8;51,5	14,1**	4,5;30,8	Un report
28,6**	7,7;59,8	44,7	31,7;57,8	-	;	13,8*	8,4;21,1	18,0**	4,4;42,3	8,3**	0,1;41,6	29,7**	14,7;48,9	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	8,3	6,2;10,9	7,3**	2,5;15,7
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	5,8*	4,1;8,0	6,1**	1,9;13,9
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	85,9	82,8;88,6	86,6	77,2;93,2
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	32,3	28,6;36,0	56,5	44,3;68,7
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	9,7	7,3;12,5	3,9**	0,8;10,9
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	58,0	54,1;61,9	39,6*	27,8;52,4
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	56,0	52,0;60,0	73,9	61,8;83,8
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	2,6*	1,5;4,2	1,3**	0,0;7,4
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	41,4	37,5;45,4	24,8*	15,0;36,9
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	8,5	6,2;11,2	7,3**	2,6;15,7
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	9,1	6,8;11,8	7,7**	3,0;15,7
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	82,4	79,1;85,4	85,0	74,6;92,3
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	13,0	10,3;15,6	11,6**	5,0;21,9
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	5,8*	4,0;8,0	1,1**	0,0;5,8
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	81,3	78,2;84,3	87,3	76,9;94,1
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	43,0	38,9;47,1	49,2	38,1;60,4
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	2,6**	1,2;4,9	4,0**	0,8;11,4
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	54,4	50,2;58,5	46,8	35,3;58,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
8,7**	1,1;28,0	2,8**	0,5;8,4	5,8**	1,0;17,4	13,3*	8,4;19,6	5,5**	0,8;17,5	14,4**	5,1;29,8	7,6**	3,0;15,3	Oui
6,3**	0,6;22,7	1,9**	0,2;6,9	2,0**	0,1;10,1	11,1*	6,4;17,5	3,2**	0,1;16,1	2,5**	0,1;12,4	6,8**	2,5;14,1	Non, mais il aurait souhaité le consulter
85,0	65,9;95,7	95,3	88,8;98,7	92,2	80,2;98,1	75,6	67,8;82,4	91,3	77,1;98,1	83,1	67,2;93,4	85,7	76,5;92,3	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
36,0**	18,8;56,2	15,6*	9,4;23,8	44,0*	30,4;57,6	18,8*	12,5;26,7	55,0*	36,8;72,3	44,9*	27,8;62,8	29,4*	20,4;39,8	Oui
2,9**	0,1;15,4	2,7**	0,6;7,7	3,9**	0,5;13,6	23,2*	16,2;31,6	5,9**	0,8;18,8	7,3**	1,5;19,8	10,7**	4,1;21,5	Non, mais il aurait souhaité le consulter
61,1*	40,5;79,2	81,6	72,8;88,6	52,1	38,3;65,8	57,9	49,6;66,3	39,1*	22,7;57,6	47,8*	30,1;66,0	59,9	49,4;70,4	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
52,4*	33,9;70,5	29,9	21,4;39,6	79,5	66,7;89,0	60,3	52,3;68,3	61,6	43,2;77,9	58,5*	38,9;76,2	49,8	38,4;61,3	Oui
-	;	1,8**	0,2;6,4	1,9**	0,0;10,0	5,0**	2,1;9,7	-	;	2,4**	0,1;12,1	3,3**	0,6;9,4	Non, mais il aurait souhaité le consulter
47,6*	29,5;66,1	68,3	59,3;77,3	18,6**	9,3;31,6	34,7	26,8;42,6	38,4*	22,1;56,8	39,1*	21,7;58,8	46,9	35,5;58,3	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
4,9**	0,1;24,1	2,9**	0,6;8,4	10,2**	3,1;23,0	13,7*	8,4;20,5	2,8**	0,1;14,5	13,3**	4,3;28,8	8,3**	3,3;16,6	Oui
12,7**	3,1;31,0	6,6**	2,6;13,2	7,8**	2,1;19,0	10,1**	5,7;16,4	12,8**	3,5;30,0	8,9**	2,2;22,6	9,9**	4,2;19,1	Non, mais il aurait souhaité le consulter
82,4	62,7;94,3	90,5	83,1;95,4	82,1	68,5;91,6	76,2	67,9;83,3	84,4	66,8;94,9	77,8	60,6;90,0	81,8	71,9;89,3	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
14,9**	4,5;33,0	5,2**	1,7;11,6	23,0**	12,0;37,6	17,1*	11,3;24,2	5,4**	0,6;18,7	24,9**	11,8;42,5	8,1**	3,3;16,2	Oui
3,6**	0,1;19,6	3,7**	1,0;9,0	9,5**	2,9;21,7	6,9**	3,3;12,5	9,1**	2,0;23,9	-	;	10,7**	4,7;20,0	Non, mais il aurait souhaité le consulter
81,5	62,9;93,3	91,2	83,6;96,0	67,5	52,3;80,4	76,0	68,5;82,5	85,5	69,3;95,1	75,1	57,5;88,2	81,2	71,0;89,0	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
37,4*	19,7;58,1	47,9	39,3;56,5	31,6*	18,5;47,1	53,7	45,5;61,8	22,2**	9,9;39,6	29,3*	16,1;45,8	38,0	27,4;48,6	Oui
-	;	-	;	3,8**	0,4;13,3	3,4**	1,0;8,1	2,7**	0,1;14,1	2,0**	0,0;11,3	3,9**	0,2;16,5	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
62,6	41,9;80,3	52,1	43,5;60,7	64,6	49,5;77,9	42,9	35,1;50,7	75,1	57,1;88,4	68,7	51,8;82,5	58,2	46,9;69,4	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	10,3	8,1;12,6	9,7**	4,2;18,3
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	10,9	8,5;13,4	8,1**	3,1;16,6
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	78,8	75,9;81,6	82,2	72,2;89,8
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	10,0	7,6;12,9	8,8**	3,6;17,5
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	8,1	5,9;10,7	5,4**	1,9;11,8
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	82,0	78,5;85,0	85,8	76,5;92,4
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	10,4	8,0;13,2	10,1**	4,8;18,2
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	16,4	13,4;19,7	10,8**	5,4;18,9
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	73,2	69,5;77,0	79,0	69,3;86,8
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	16,0	13,2;18,7	6,8**	2,5;14,5
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	3,2*	1,9;5,2	2,1**	0,3;7,4
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	80,8	77,8;83,8	91,1	83,1;96,1
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	7,7*	5,4;10,4	9,5**	4,2;17,9
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	13,1	10,4;15,7	6,9**	2,6;14,3
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	79,3	75,9;82,6	83,6	73,7;90,9
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	13,5	10,7;16,7	26,0*	15,8;38,4
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	6,1*	4,1;8,6	3,2**	0,6;9,4
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	80,5	76,7;83,8	70,9	58,6;81,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
17,1**	5,7;35,7	3,7**	1,0;9,3	10,8**	3,3;24,2	17,4*	11,9;24,2	7,8**	1,5;21,9	11,1**	3,3;25,2	6,3**	2,3;13,3	Oui
12,7**	3,2;30,6	4,0**	1,1;9,7	12,2**	4,4;25,4	20,5*	14,5;27,7	8,6**	2,0;22,0	7,6**	1,5;21,5	8,6**	3,6;16,7	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
70,2	49,8;86,1	92,3	85,9;96,5	77,0	61,8;88,3	62,1	54,8;69,4	83,6	68,1;93,5	81,3	65,8;91,9	85,1	76,2;91,7	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
13,4**	3,8;30,8	5,8**	2,1;12,5	7,7**	2,1;18,7	19,0*	12,7;26,9	2,8**	0,1;14,8	8,9**	2,2;22,2	6,1**	2,1;13,3	Oui
18,0**	5,8;38,3	4,6**	1,4;10,5	11,7**	4,4;23,7	9,7**	5,2;16,3	2,7**	0,0;15,6	7,9**	1,5;22,1	9,0**	3,2;19,0	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
68,6	47,4;85,2	89,6	82,1;94,7	80,6	67,3;90,3	71,2	62,7;78,8	94,5	80,8;99,4	83,2	67,1;93,5	84,9	74,5;92,3	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
11,4**	2,4;29,8	4,7**	1,5;10,7	9,7**	3,4;20,6	14,0*	8,6;21,0	8,7**	1,8;23,6	7,6**	1,7;20,4	13,8**	7,2;23,2	Oui
22,3**	9,7;40,3	14,6*	8,3;23,0	15,9**	7,0;29,2	20,6*	14,1;28,4	10,8**	2,7;26,4	12,2**	3,9;26,8	19,6*	11,1;30,9	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
66,3	47,5;82,0	80,7	71,7;87,9	74,3	60,1;85,6	65,5	57,4;73,6	80,5	62,9;92,2	80,2	64,4;91,2	66,6	54,9;76,9	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
16,2**	5,2;34,5	19,6*	13,0;27,8	3,7**	0,4;13,3	25,5	18,6;33,3	11,4**	2,8;28,5	21,8**	10,2;37,9	10,8**	5,0;19,6	Oui
3,1**	0,1;14,9	2,9**	0,6;8,2	4,8**	0,6;16,2	1,4**	0,2;4,8	2,7**	0,0;15,6	6,8**	1,6;17,8	5,3**	1,2;13,9	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
80,7	61,6;93,0	77,5	69,0;84,6	91,5	79,9;97,5	73,2	65,5;79,9	85,8	67,5;96,0	71,4	55,3;84,4	83,9	74,1;91,2	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
11,5**	2,6;29,4	1,7**	0,2;6,1	12,7**	4,5;26,3	6,7**	3,2;12,1	-	;	11,4**	2,9;27,8	11,5**	4,5;22,9	Oui
23,1**	9,7;42,2	7,3**	3,0;14,5	7,6**	2,1;18,4	25,2	18,4;33,0	5,5**	0,5;20,6	8,7**	2,2;21,7	11,8**	5,8;20,7	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
65,4	45,9;81,7	90,9	83,3;95,9	79,7	65,1;90,2	68,1	60,7;75,5	94,5	79,4;99,5	79,9	63,3;91,4	76,7	65,1;86,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
17,6**	5,8;36,9	13,0*	7,3;20,9	10,9**	3,3;24,7	10,9*	6,3;17,0	13,0**	3,4;31,1	6,7**	1,3;18,8	10,3**	5,0;18,3	Oui
3,5**	0,1;19,1	3,6**	1,0;8,9	6,4**	1,2;18,4	9,1**	4,8;15,4	2,8**	0,1;14,9	9,3**	2,4;22,9	7,2**	1,9;17,8	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
78,9	58,7;92,3	83,4	74,8;90,0	82,6	67,9;92,5	80,0	72,5;86,3	84,2	66,4;94,8	84,0	68,6;93,8	82,5	71,4;90,6	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p, r]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	7,0	5,2;9,3	1,0**	0,0;5,8
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	93,0	90,7;94,8	99,0	94,2;100,0
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p, r]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	10,2**	2,7;24,6	-	;
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	89,8	75,4;97,3	100,0	;
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	16,9**	7,0;32,0	-	;
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	83,1	68,0;93,0	100,0	;
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	20,3**	8,9;36,7	-	;
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	79,7	63,3;91,1	100,0	;
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	16,1**	5,9;32,6	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	83,9	67,4;94,1	100,0	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	35,5*	20,9;52,4	-	;
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	64,5	47,6;79,1	100,0	;
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	14,9**	5,7;29,6	-	;
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	85,1	70,4;94,3	100,0	;
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	33,3*	18,6;51,0	100,0	;
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	66,7	49,0;81,4	-	;
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	48,2*	32,0;64,6	100,0	;
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	51,8*	35,4;68,0	-	;
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	9,6**	2,5;23,4	100,0	;
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	90,4	76,6;97,5	-	;
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	8,4**	2,0;21,4	-	;
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	91,6	78,6;98,0	100,0	;
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	-	;	-	;
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	100,0	;	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p, r]
8,8**	1,5;25,3	3,5**	0,9;9,0	8,6**	2,5;20,3	12,8*	8,1;19,0	3,3**	0,1;17,2	4,2**	0,4;15,0	9,2**	4,2;16,9	Oui
91,2	74,7;98,5	96,5	91,0;99,1	91,4	79,7;97,5	87,2	81,0;91,9	96,7	82,8;99,9	95,8	85,0;99,6	90,8	83,1;95,8	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p, r]
-	;	-	;	25,3**	0,3;86,1	5,6**	0,1;28,4	-	;	100,0	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	74,7**	13,9;99,7	94,4	71,6;99,9	100,0	;	-	;	100,0	;	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	33,0**	0,2;94,9	-	;	28,4**	9,7;55,0	-	;	-	;	11,5**	0,0;63,4	Oui
100,0	;	67,0**	5,1;99,8	100,0	;	71,6*	45,0;90,3	100,0	;	100,0	;	88,5*	36,6;100,0	Non
														Psychologue
63,6**	6,0;99,3	-	;	-	;	23,8**	6,9;50,2	100,0	;	-	;	11,2**	0,1;56,1	Oui
36,4**	0,7;94,0	100,0	;	100,0	;	76,2	49,8;93,1	-	;	100,0	;	88,8	43,9;99,9	Non
														Travailleur social
-	;	-	;	30,4**	0,7;88,2	17,5**	3,7;43,3	100,0	;	-	;	11,2**	0,1;56,1	Oui
100,0	;	100,0	;	69,6**	11,8;99,3	82,5	56,7;96,3	-	;	100,0	;	88,8	43,9;99,9	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
-	;	-	;	-	;	58,9*	33,3;81,4	-	;	-	;	50,1**	12,2;87,9	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	41,1**	18,6;66,7	100,0	;	100,0	;	49,9**	12,1;87,8	Non
														Médicaments
-	;	34,0**	0,3;94,8	22,7**	0,1;87,2	11,5**	1,5;35,1	-	;	50,0**	0,8;99,2	11,2**	0,1;56,1	Oui
100,0	;	66,0**	5,2;99,7	77,3**	12,8;99,9	88,5	64,9;98,5	100,0	;	50,0**	0,8;99,2	88,8	43,9;99,9	Non
														Services de transport
-	;	33,0**	0,3;94,0	51,9**	4,8;96,2	35,7**	13,3;63,8	-	;	-	;	36,8**	5,6;80,2	Oui
100,0	;	67,0**	6,0;99,7	48,1**	3,8;95,2	64,3*	36,2;86,7	100,0	;	100,0	;	63,2**	19,8;94,4	Non
														Services d'aide à domicile
36,4**	0,7;94,0	-	;	53,1**	5,2;96,6	57,7*	32,5;80,2	-	;	50,0**	0,8;99,2	48,9**	10,8;88,1	Oui
63,6**	6,0;99,3	100,0	;	46,9**	3,4;94,8	42,3**	19,8;67,5	100,0	;	50,0**	0,8;99,2	51,1**	11,9;89,2	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
32,8**	0,3;93,8	33,0**	0,2;94,9	-	;	-	;	-	;	-	;	11,2**	0,1;56,1	Oui
67,2**	6,2;99,7	67,0**	5,1;99,8	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	88,8	43,9;99,9	Non
														Soins infirmiers à domicile
-	;	-	;	30,4**	0,7;88,2	11,9**	1,6;35,8	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	69,6**	11,8;99,3	88,1	64,2;98,4	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autres services ou ressources
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	99,2	97,9;99,8	100,0	;
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	0,8**	0,2;2,1	-	;
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	49,4	45,0;53,7	40,3	28,5;52,1
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	7,3*	5,2;10,0	7,0**	2,3;15,6
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	25,2	21,7;28,8	38,8*	27,0;51,7
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	18,1	15,0;21,6	13,9**	6,7;24,5
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	39,9	35,9;44,0	39,3*	27,3;52,4
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	17,7	14,5;21,3	16,9**	9,2;27,5
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	23,3	19,9;26,8	33,1*	21,7;46,1
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	19,0	15,9;22,4	10,6**	4,8;19,7
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	7,0*	5,0;9,4	10,3**	4,5;19,4
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	5,4*	3,5;7,8	4,0**	0,7;11,6
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	21,0	17,4;24,6	21,5*	12,5;33,2
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	13,3	10,3;16,7	18,3**	9,8;29,8
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	38,6	34,6;42,6	30,9*	20,3;43,3
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	14,8	11,7;18,3	15,0**	7,0;26,7
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	0,4**	0,0;1,7	-	;
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	6,4*	4,4;8,8	11,0**	4,8;20,6
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	93,2	90,7;95,2	89,0	79,4;95,2
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	85,8	82,2;88,9	88,3	78,0;94,9
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	13,2	10,3;16,5	11,7**	5,1;22,0
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	1,1**	0,2;3,2	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
100,0	;	100,0	;	98,1	89,3;100,0	98,2	93,9;99,8	100,0	;	96,9	82,4;99,9	100,0	;	Oui
-	;	-	;	1,9**	0,0;10,7	1,8**	0,2;6,1	-	;	3,1**	0,1;17,6	-	;	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
42,1*	23,7;62,3	53,9	44,4;63,5	85,1	71,7;93,9	50,9	42,0;59,7	26,1**	12,4;44,3	55,6*	34,8;75,0	39,0*	27,4;51,7	Médecin spécialiste du cancer
5,0**	0,1;24,3	3,8**	1,1;9,5	4,2**	0,5;14,3	7,1**	3,5;12,4	8,7**	2,0;22,8	11,4**	2,9;27,7	12,2**	5,0;23,8	Médecin de famille
23,0**	9,5;42,4	23,9*	16,2;33,2	4,4**	0,7;14,0	16,0*	9,9;23,9	46,4*	29,0;64,4	17,6**	4,7;40,1	36,8*	25,4;49,4	Autre médecin spécialiste
29,9**	14,0;50,2	18,3*	11,4;27,0	6,2**	1,2;17,9	26,0	18,7;34,5	18,8**	7,2;36,5	15,4**	5,4;32,0	11,9**	5,6;21,4	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
31,9**	16,0;51,7	41,3	31,7;50,9	81,1	67,5;90,8	36,5	28,8;44,3	21,1**	9,2;38,1	31,8**	16,0;51,4	36,7	26,2;47,2	Médecin spécialiste du cancer
7,9**	1,0;25,8	11,0**	5,9;18,3	6,2**	1,3;17,1	20,9*	14,5;28,5	20,7**	8,6;38,4	37,1*	20,1;56,8	21,0**	11,6;33,5	Médecin de famille
27,5**	12,9;46,6	24,2*	16,5;33,3	2,2**	0,1;10,9	17,1*	10,8;25,1	43,5*	26,3;61,9	16,4**	4,8;36,5	28,4*	19,5;38,8	Autre médecin spécialiste
32,7**	16,3;53,0	23,6*	15,9;32,8	10,5**	3,5;22,7	25,5	18,6;33,5	14,7**	4,9;31,2	14,7**	5,4;29,9	13,8**	7,6;22,3	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
2,9**	0,1;15,2	2,7**	0,6;7,6	2,1**	0,1;10,6	8,4**	4,2;14,6	20,8**	9,6;36,6	8,1**	1,5;22,7	5,8**	1,6;14,2	Au besoin
7,9**	1,1;24,7	1,8**	0,2;6,3	9,0**	2,5;21,5	4,3**	1,6;9,2	5,8**	0,8;19,0	8,5**	1,7;23,6	8,0**	2,5;18,1	À tous les mois
22,7**	9,9;40,7	8,9**	4,0;16,5	55,1	39,2;70,3	11,8*	6,8;18,6	19,2**	7,8;36,2	28,0**	13,8;46,3	27,9*	18,9;38,4	À tous les 2 ou 3 mois
9,7**	2,1;25,4	10,1**	5,0;17,5	9,3**	2,6;22,1	12,9*	7,8;19,7	6,0**	0,7;20,5	21,2**	7,8;41,4	15,9**	7,6;28,1	À tous les 4 mois
40,8*	22,5;61,1	55,2	45,8;64,5	24,5**	12,6;40,2	50,7	42,3;59,0	34,5*	18,9;53,0	26,9**	12,3;46,4	20,9*	12,7;31,4	À tous les 6 mois
16,2**	5,4;34,0	21,4*	13,5;31,1	-	;	12,0*	7,2;18,3	13,6**	3,7;31,7	7,3**	1,5;20,2	21,5*	13,2;31,9	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	3,6**	0,1;19,3	1,0**	0,0;5,6	Trop long
6,8**	0,7;23,4	3,6**	1,1;8,8	7,2**	1,4;20,1	7,6**	3,8;13,2	2,8**	0,1;14,7	4,8**	0,7;15,4	5,5**	1,3;14,3	Trop court
93,2	76,6;99,3	96,4	91,2;98,9	92,8	79,9;98,6	92,4	86,8;96,2	97,2	85,3;99,9	91,6	77,0;98,3	93,5	84,4;98,2	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
81,7	61,7;94,0	92,6	86,3;96,6	81,5	66,6;91,7	78,9	70,3;85,9	86,9	69,5;96,4	89,0	73,8;97,1	87,1	75,2;94,7	Tout à fait capable
11,0**	2,2;29,6	7,4**	3,4;13,7	18,5**	8,3;33,4	20,4*	13,4;28,9	13,1**	3,6;30,5	11,0**	2,9;26,2	9,8**	3,9;19,5	En partie capable
7,3**	1,0;22,8	-	;	-	;	0,8**	0,0;3,8	-	;	-	;	3,1**	0,1;17,5	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	47,7	43,4;52,0	50,5	38,5;62,5
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	22,5	19,0;26,0	20,4*	11,9;31,2
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	29,8	25,8;33,8	29,1*	17,9;42,7
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	38,0	29,2;46,7	34,8**	13,4;61,8
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	62,0	53,3;70,8	65,2*	38,2;86,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
42,2*	23,6;62,6	56,2	45,8;66,6	59,0	45,5;72,4	36,6	28,1;45,0	58,0*	38,9;75,4	45,2*	27,1;64,4	45,5	33,8;57,1	Oui, tout à fait
23,1**	10,3;40,9	17,5*	10,8;26,1	24,5**	13,1;39,2	31,1	23,3;38,9	14,1**	4,0;32,3	15,9**	5,4;33,2	22,1*	12,3;34,8	oui, en partie
34,8**	18,0;54,8	26,3*	17,7;36,5	16,5**	7,4;30,0	32,4	24,6;40,1	27,9**	14,0;45,9	38,9*	21,9;58,1	32,5*	21,4;45,2	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
45,1**	7,8;87,5	35,9**	14,1;63,2	31,0**	8,7;62,6	43,2*	28,8;58,5	26,2**	2,6;70,3	41,4**	10,4;78,7	35,0**	12,5;63,9	Oui
54,9**	12,5;92,2	64,1*	36,8;85,9	69,0*	37,4;91,3	56,8	41,5;71,2	73,8*	29,7;97,4	58,6**	21,3;89,6	65,0*	36,1;87,5	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	23,8	20,3;27,4	20,6*	12,0;31,6
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	48,2	44,1;52,2	53,3	42,3;64,3
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	28,0	24,4;31,5	26,2*	17,1;37,0
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	25,1	21,7;28,5	23,3*	14,7;33,9
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	41,5	37,5;45,6	46,8	34,9;58,6
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	33,4	29,6;37,2	30,0*	19,7;41,9
Modification de l'alimentation[p, r]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	41,1	37,0;45,1	57,9	47,0;68,8
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	32,5	28,7;36,3	22,9*	14,3;33,5
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	26,5	22,8;30,1	19,2*	11,4;29,3
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	12,3	9,8;14,9	11,2**	5,5;19,7
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	7,3	5,5;9,5	5,6**	1,8;12,7
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	80,4	77,3;83,5	83,2	73,8;90,3
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	0,5**	0,1;1,6	-	;
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	1,8**	0,9;3,1	-	;
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	97,7	96,2;98,7	100,0	;
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	5,5*	3,8;7,6	7,9**	3,1;15,9
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	10,8	8,4;13,6	6,7**	2,5;14,1
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	83,7	80,4;86,7	85,4	76,2;92,1
Gestion du stress[p]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	37,3	33,6;41,0	35,7	25,3;46,1
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	28,5	24,9;32,2	33,6*	23,4;45,1
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	34,2	30,3;38,1	30,7*	20,6;40,8

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p]
32,8**	17,4;51,5	18,8*	11,6;27,9	27,6*	15,6;42,5	31,0	23,8;38,1	20,2**	8,6;37,2	17,9**	7,1;34,6	21,1*	12,9;31,5	Oui
41,4*	24,0;60,5	51,0	41,0;60,9	40,8*	26,7;56,1	43,8	36,2;51,4	57,5	40,5;73,2	64,6	45,8;80,6	42,5	31,4;53,7	Non
25,8**	12,6;43,3	30,2	21,4;39,1	31,6*	19,1;46,5	25,2	18,6;32,8	22,3**	10,2;39,1	17,5**	6,0;35,9	36,4	26,4;46,3	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
24,2**	11,4;41,5	21,5*	14,5;30,0	29,0*	16,4;44,4	26,1*	18,7;34,7	37,0*	21,4;54,9	26,7**	13,3;44,2	22,6*	14,7;32,2	Oui
36,1*	20,1;54,7	48,4	39,0;57,8	35,6*	21,7;51,6	36,1	28,4;43,9	39,5*	23,0;57,9	39,5*	22,3;58,9	43,5	32,6;54,5	Non
39,7*	22,1;59,6	30,1	21,5;38,7	35,5*	21,8;51,1	37,8	29,3;46,2	23,5**	11,2;40,1	33,8**	17,4;53,7	33,9*	23,7;44,1	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p, r]
39,9*	23,1;58,7	27,6*	19,5;37,0	46,6	33,3;59,9	41,3	33,3;49,3	45,1*	27,9;63,1	27,9**	13,6;46,5	43,2	32,7;53,7	Oui
21,8**	9,5;39,1	45,7	35,8;55,5	27,8*	15,9;42,5	27,6	20,6;35,6	32,2**	16,3;51,8	35,4*	19,3;54,4	37,6	27,0;49,2	Non
38,3*	21,3;57,7	26,7*	18,4;36,4	25,6*	14,4;39,8	31,1	23,4;38,8	22,8**	9,9;40,9	36,7*	19,6;56,7	19,2*	11,6;28,9	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
2,7**	0,1;14,5	7,2**	3,1;13,9	14,0**	5,7;27,0	13,4*	8,5;19,9	8,1**	1,7;21,8	32,5*	18,3;49,5	12,2**	6,2;20,7	Oui
2,8**	0,0;16,1	5,2**	1,9;11,4	6,6**	1,2;18,8	7,2**	3,8;12,2	14,9**	4,9;31,7	10,4**	2,7;25,4	8,8**	4,2;16,0	Non
94,5	80,3;99,5	87,6	79,8;93,2	79,4	64,8;90,0	79,3	72,0;85,5	77,1	59,2;89,8	57,1	40,2;72,9	79,0	69,0;87,0	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	-	;	4,6**	0,5;16,8	-	;	2,7**	0,1;14,2	-	;	-	;	Oui
6,0**	0,6;21,4	-	;	-	;	2,0**	0,5;5,4	2,6**	0,1;14,2	-	;	5,0**	1,7;11,1	Non
94,0	78,6;99,4	100,0	;	95,4	83,2;99,5	98,0	94,6;99,5	94,7	81,4;99,4	100,0	;	95,0	88,9;98,3	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
-	;	12,5*	7,1;19,9	4,7**	0,5;16,7	1,3**	0,2;4,5	2,8**	0,1;14,8	4,7**	0,5;16,1	5,3**	1,7;12,1	Oui
6,4**	0,7;21,7	14,9*	8,8;23,1	9,4**	2,9;21,4	7,8**	4,1;13,3	13,8**	4,3;30,4	8,6**	2,1;21,9	15,9*	9,2;24,8	Non
93,6	78,3;99,3	72,5	63,1;80,7	85,8	71,5;94,7	90,9	85,2;94,9	83,4	66,8;93,9	86,7	72,2;95,4	78,8	69,1;86,6	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p]
41,2*	23,7;60,4	28,0*	20,0;37,2	53,9	39,1;68,3	39,7	32,2;47,2	29,1**	15,1;46,8	49,3*	31,2;67,4	33,4	24,0;42,7	Oui
20,8**	8,0;40,0	33,7	25,1;42,3	12,0**	4,1;25,4	30,6	23,1;38,1	40,3*	23,2;59,2	20,8**	9,5;36,8	25,5*	16,7;36,0	Non
38,1*	21,1;57,5	38,2	29,5;46,9	34,1*	21,2;48,9	29,7	22,2;38,0	30,6**	15,8;49,1	30,0**	14,6;49,6	41,1	30,3;52,0	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p, r]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	40,1	36,0;44,2	42,0	31,0;52,9
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	21,3	18,0;24,6	20,2*	11,6;31,4
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	38,6	34,4;42,8	37,8	26,9;49,7
Plus de repos[p, r]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	0,8**	0,2;1,9	-	;
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	99,2	98,1;99,8	100,0	;
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	0,5**	0,0;2,1	2,5**	0,1;13,4
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	99,5	97,9;100,0	97,5	86,6;99,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p, r]
26,8**	12,5;45,7	23,9*	16,2;33,1	27,9*	15,5;43,4	50,1	41,8;58,4	46,4*	28,6;64,9	55,8*	37,3;73,1	43,4	32,7;54,1	Oui
26,8**	13,1;44,6	36,9	27,7;46,1	20,2**	10,3;33,9	10,8*	6,2;17,3	25,4**	11,8;43,7	20,5**	8,7;37,5	17,4*	9,9;27,3	Non
46,5*	29,2;64,3	39,1	29,8;48,5	51,9	35,9;67,5	39,0	31,3;46,8	28,2**	12,8;48,6	23,7**	10,1;42,9	39,2	28,0;51,4	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p, r]
9,2**	1,8;25,3	-	;	-	;	0,6**	0,0;3,4	-	;	2,0**	0,0;11,4	-	;	Oui
90,8	74,7;98,2	100,0	;	100,0	;	99,4	96,6;100,0	100,0	;	98,0	88,6;100,0	100,0	;	Non
														Autre
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	1,1**	0,0;6,4	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	98,9	93,6;100,0	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	46,1	37,3;55,0	66,4*	42,3;85,5
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	53,9	45,0;62,7	33,6**	14,5;57,7
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	78,1	73,0;83,2	86,2	69,6;95,7
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	21,9	16,8;27,0	13,8**	4,3;30,4
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	44,2	34,2;54,3	47,5**	21,0;75,1
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	55,8	45,7;65,8	52,5**	24,9;79,0
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	22,2*	14,5;31,7	-	;
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	77,8	68,3;85,5	100,0	;
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	16,8*	11,1;24,0	26,2**	10,4;48,3
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	83,2	76,0;88,9	73,8	51,7;89,6
Exemple de l'entourage[p, r]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	51,3	44,5;58,1	58,7*	39,3;76,3
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	48,7	41,9;55,5	41,3*	23,7;60,7
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	70,2	64,3;76,1	83,4	69,2;92,8
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	29,8	23,9;35,7	16,6**	7,2;30,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
33,3**	3,1;81,3	72,1*	42,9;91,8	56,4**	24,2;85,1	33,5*	19,6;49,8	23,3**	2,3;65,1	29,5**	6,0;66,0	49,5*	26,5;72,6	Oui
66,7**	18,7;96,9	27,9**	8,2;57,1	43,6**	14,9;75,8	66,5	50,2;80,4	76,7*	34,9;97,7	70,5*	34,0;94,0	50,5*	27,4;73,5	Non
														Soutien de la famille ou des amis
87,3	55,7;99,1	75,1	58,3;87,8	83,8	63,5;95,4	76,8	65,5;85,8	66,8*	42,6;85,9	75,0	47,8;92,7	76,3	60,1;88,3	Oui
12,7**	0,9;44,3	24,9**	12,2;41,7	16,2**	4,6;36,5	23,2*	14,2;34,5	33,2**	14,1;57,4	25,0**	7,3;52,2	23,7**	11,7;39,9	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
58,7**	6,1;98,2	23,0**	4,4;55,8	58,7**	15,0;93,7	54,6*	35,1;73,1	36,5**	3,4;85,0	29,0**	5,3;66,8	42,5**	19,8;67,8	Oui
41,3**	1,8;93,9	77,0*	44,2;95,6	41,3**	6,3;85,0	45,4*	26,9;64,9	63,5**	15,0;96,6	71,0*	33,2;94,7	57,5*	32,2;80,2	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
47,1**	3,0;95,6	10,3**	1,2;33,1	33,8**	3,2;81,7	26,1**	12,9;43,4	-	;	34,2**	3,4;81,7	30,2**	10,4;57,6	Oui
52,9**	4,4;97,0	89,7	66,9;98,8	66,2**	18,3;96,8	73,9	56,6;87,1	100,0	;	65,8**	18,3;96,6	69,8*	42,4;89,6	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
36,0**	6,5;77,0	17,5**	4,5;40,5	10,7**	0,0;59,1	10,0**	3,4;21,5	-	;	8,5**	0,1;47,4	26,4**	9,5;50,5	Oui
64,0**	23,0;93,5	82,5	59,5;95,5	89,3	40,9;100,0	90,0	78,5;96,6	100,0	;	91,5	52,6;99,9	73,6	49,5;90,5	Non
														Exemple de l'entourage[p, r]
78,6*	38,7;97,9	32,9**	15,9;54,1	73,0*	43,7;92,4	45,8	33,2;58,3	22,9**	4,1;56,5	41,2**	15,6;70,8	66,0	46,9;81,9	Oui
21,4**	2,1;61,3	67,1	45,9;84,1	27,0**	7,6;56,3	54,2	41,7;66,8	77,1*	43,5;95,9	58,8*	29,2;84,4	34,0*	18,1;53,1	Non
														Prière ou soutien spirituel[p]
91,9	55,8;99,9	49,1*	31,4;67,0	77,8	51,5;93,9	70,1	57,7;80,6	52,3**	17,9;85,1	71,4*	43,5;90,9	70,7	52,7;85,0	Oui
8,1**	0,1;44,2	50,9*	33,0;68,6	22,2**	6,1;48,5	29,9*	19,4;42,3	47,7**	14,9;82,1	28,6**	9,1;56,5	29,3**	15,0;47,3	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Chaudière-Appalaches et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			14,0	11,3;16,7
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	0,6**	0,1;1,7	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	1,7**	0,7;3,4	2,3**	0,3;7,9
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	12,0	9,3;15,2	11,6**	5,5;20,9
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	40,3	36,2;44,3	28,0*	18,6;39,0
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	45,4	41,2;49,7	58,1	47,2;69,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région															
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
5,5*	3,8;7,6	18,1	15,9;20,4	8,0	6,1;10,3	23,9	21,1;26,7	5,7*	3,9;8,0	7,5*	5,5;10,1	17,2	14,1;20,6	Ensemble des patients	
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic	
-	;	1,4**	0,0;7,1	2,2**	0,0;11,9	0,6**	0,0;3,4	-	;	-	;	-	;	Mauvaise	
3,0**	0,1;14,8	0,9**	0,0;5,1	-	;	1,8**	0,2;6,3	-	;	-	;	3,6**	0,3;14,1	Passable	
18,2**	6,6;36,6	9,1**	4,5;16,1	8,5**	2,3;20,9	11,2*	6,5;17,6	9,4**	1,8;26,1	21,4**	8,6;40,2	13,4**	6,9;22,9	Bonne	
34,4*	18,9;52,8	41,4	32,4;50,5	33,3*	21,1;47,3	48,0	39,8;56,3	50,2*	31,1;69,3	34,6*	18,6;53,6	42,7	31,5;53,8	Très bonne	
44,3*	26,8;62,9	47,2	37,9;56,5	56,0	42,6;69,5	38,3	30,2;46,4	40,3*	22,6;60,1	44,0*	25,5;63,8	40,3	29,3;51,3	Excellente	

Région 13

LAVAL

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	45,7	44,4 ; 47,0
Femmes	53,9	54,3	53,0 ; 55,6
Âge			
18 à 49 ans	18,9	19,4	16,5 ; 22,2
50 à 59 ans	24,9	21,3	18,5 ; 24,2
60 à 69 ans	29,8	31,8	28,2 ; 35,4
70 ans et plus	26,5	27,5	24,8 ; 30,3
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	83,4	80,1 ; 86,3
Anglais	10,6	9,9	7,6 ; 12,6
Autres	3,0	6,7*	4,8 ; 9,1
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	24,4	20,9 ; 27,8
Diplôme d'études secondaires	24,7	26,5	22,8 ; 30,1
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	28,7	25,1 ; 32,4
Diplôme d'études universitaires	20,6	20,4	17,2 ; 23,7
Occupation principale			
En emploi	29,3	29,3	26,1 ; 32,5
Étudiant	1,7	1,1**	0,4 ; 2,3
Retraité	55,8	57,4	54,1 ; 60,7
À la maison	7,2	6,7*	4,8 ; 9,1
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	1,4**	0,6 ; 2,8
Congé de maternité / autres	3,6	4,1*	2,6 ; 6,0
Situation familiale			
Vit seul	24,1	21,7	18,3 ; 25,1
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	52,8	48,9 ; 56,8
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	18,3	15,3 ; 21,3
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	3,7*	2,4 ; 5,5
Autres	4,8	3,4*	2,0 ; 5,5
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	20,4	17,0 ; 23,8
Revenu suffisant	61,4	64,7	60,7 ; 68,7
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	14,9	12,1 ; 18,0
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	26,3	22,7 ; 29,8
2	21,1	31,2	27,4 ; 35,0
3	20,1	21,8	18,5 ; 25,2
4	19,4	13,6	10,8 ; 16,7
5 - très défavorisé	17,6	7,1*	5,1 ; 9,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	13,3	10,6 ; 16,4	16,7	12,3 ; 21,9	10,5*	7,3 ; 14,5
Génital féminin	5,5	...	10,2	5,9*	4,2 ; 8,1	...	;	10,9*	7,7 ; 14,9
Prostate	15,9	34,4	...	15,8	13,5 ; 18,0	34,5	29,7 ; 39,3	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	9,2	7,0 ; 11,7	9,7*	6,7 ; 13,5	8,7*	5,9 ; 12,4
Sein	26,5	0,4**	48,8	26,2	23,5 ; 28,8	-	;	48,2	43,4 ; 53,1
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	4,5*	3,0 ; 6,4	4,6**	2,5 ; 7,7	4,5**	2,5 ; 7,3
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	5,1*	3,5 ; 7,3	6,9*	4,1 ; 10,9	3,6**	1,8 ; 6,5
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	20,0	16,8 ; 23,2	27,6	22,5 ; 32,7	13,5	9,8 ; 18,1
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	87,0	84,4 ; 89,7	88,0	83,5 ; 91,6	86,2	81,9 ; 89,8
Récidive	7,4	7,5	7,3	6,2*	4,5 ; 8,3	5,5*	3,3 ; 8,7	6,8*	4,4 ; 10,1
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	6,8*	4,8 ; 9,3	6,5*	3,8 ; 10,2	7,0*	4,3 ; 10,8
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	12,5	9,9 ; 15,5	13,4*	9,4 ; 18,4	11,7*	8,4 ; 15,8
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	18,3	15,3 ; 21,2	4,1**	2,0 ; 7,4	30,1	25,3 ; 35,0
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	69,2	65,5 ; 72,9	82,5	77,0 ; 87,1	58,2	53,0 ; 63,3
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	38,5	34,6 ; 42,5	42,6	36,7 ; 48,5	35,1	29,6 ; 40,6
Non	58,8	56,6	60,7	61,5	57,5 ; 65,4	57,4	51,5 ; 63,3	64,9	59,4 ; 70,4
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	92,6	90,2 ; 94,6	91,1	86,9 ; 94,4	93,8	90,6 ; 96,1
Non	8,3	8,5	8,0	7,4	5,4 ; 9,8	8,9*	5,6 ; 13,1	6,2*	3,9 ; 9,4
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	10,7	8,3 ; 13,6	12,1*	8,4 ; 16,8	9,6*	6,6 ; 13,4
Très bon	29,2	29,3	29,1	28,6	24,9 ; 32,4	28,9	23,3 ; 34,6	28,4	23,5 ; 33,3
Bon	34,9	34,2	35,5	36,8	32,9 ; 40,7	36,0	30,4 ; 41,6	37,5	32,3 ; 42,8
Moyen	18,8	17,8	19,6	16,8	13,6 ; 20,3	17,0	12,4 ; 22,4	16,6	12,6 ; 21,2
Mauvais	5,6	5,7	5,5	7,0*	5,0 ; 9,5	6,0**	3,3 ; 9,7	7,9*	5,1 ; 11,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p, r]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p]
13,3	10,6 ; 16,4	3,2**	0,7 ; 8,8	13,6*	8,3 ; 20,5	13,2*	8,9 ; 18,5	20,5*	13,9 ; 28,5	Colorectal
5,9*	4,2 ; 8,1	7,0**	3,2 ; 13,1	9,8**	5,3 ; 16,4	5,6**	2,7 ; 10,1	2,4**	0,5 ; 7,1	Génital féminin
15,8	13,5 ; 18,0	1,1**	0,0 ; 5,9	16,3*	10,9 ; 22,9	26,3	20,5 ; 32,2	13,6*	9,7 ; 18,3	Prostate
9,2	7,0 ; 11,7	13,3**	7,2 ; 21,8	8,5**	4,3 ; 14,6	9,0*	5,3 ; 14,0	7,0**	3,6 ; 12,2	Hématopoïétique
26,2	23,5 ; 28,8	41,4	33,0 ; 49,7	31,9	24,4 ; 39,4	16,2*	11,6 ; 21,7	22,5	16,7 ; 29,1	Sein
4,5*	3,0 ; 6,4	10,4**	5,2 ; 17,9	4,4**	1,6 ; 9,4	3,3**	1,3 ; 6,8	1,8**	0,4 ; 5,1	ORL (Tête et cou)
5,1*	3,5 ; 7,3	1,6**	0,2 ; 5,8	3,0**	0,9 ; 7,3	5,7**	2,8 ; 10,0	8,7**	4,6 ; 14,8	Broncho-pulmonaire
20,0	16,8 ; 23,2	22,1*	14,5 ; 31,4	12,6*	7,7 ; 18,9	20,7	15,2 ; 27,1	23,5*	16,4 ; 31,8	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
87,0	84,4 ; 89,7	91,2	84,4 ; 95,7	89,0	82,3 ; 93,8	85,1	79,7 ; 89,6	84,7	77,6 ; 90,3	Premier cancer
6,2*	4,5 ; 8,3	5,9**	2,6 ; 11,4	4,8**	1,8 ; 10,2	7,9*	4,8 ; 12,3	5,5**	2,5 ; 10,3	Récidive
6,8*	4,8 ; 9,3	2,9**	0,6 ; 8,2	6,2**	2,8 ; 11,4	6,9**	3,9 ; 11,2	9,8**	5,0 ; 16,8	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]
12,5	9,9 ; 15,5	7,5**	3,5 ; 13,6	14,7*	9,2 ; 21,9	13,6*	8,9 ; 19,6	13,1*	7,7 ; 20,3	Sous traitement
18,3	15,3 ; 21,2	26,0*	18,3 ; 34,8	18,8*	12,4 ; 26,8	14,2*	9,7 ; 19,7	17,0*	11,1 ; 24,4	Sans traitement avec médication
69,2	65,5 ; 72,9	66,6	58,4 ; 74,7	66,4	58,0 ; 74,8	72,2	64,8 ; 78,8	69,9	61,8 ; 78,0	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p, r]
38,5	34,6 ; 42,5	24,3*	16,3 ; 33,9	38,0	29,5 ; 46,5	40,7	33,9 ; 47,5	46,4	37,8 ; 55,0	Oui
61,5	57,5 ; 65,4	75,7	66,1 ; 83,7	62,0	53,5 ; 70,5	59,3	52,5 ; 66,1	53,6	45,0 ; 62,2	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]
92,6	90,2 ; 94,6	83,7	75,1 ; 90,2	87,9	80,9 ; 93,0	95,6	91,7 ; 98,0	99,1	94,7 ; 100,0	Oui
7,4	5,4 ; 9,8	16,3*	9,8 ; 24,9	12,1*	7,0 ; 19,1	4,4**	2,0 ; 8,3	0,9**	0,0 ; 5,3	Non
										Perception de l'état de santé[p]
10,7	8,3 ; 13,6	11,4**	6,2 ; 18,7	8,8**	4,6 ; 15,0	10,5*	6,6 ; 15,8	12,1*	7,0 ; 19,0	Excellent
28,6	24,9 ; 32,4	27,7*	19,1 ; 37,8	34,9	26,5 ; 43,3	22,6	16,9 ; 29,0	31,5	23,6 ; 39,4	Très bon
36,8	32,9 ; 40,7	31,3	22,2 ; 40,5	34,6	26,7 ; 42,5	46,0	39,1 ; 52,8	31,8	24,3 ; 39,3	Bon
16,8	13,6 ; 20,3	18,9*	11,9 ; 27,7	15,4*	9,9 ; 22,5	14,8*	10,2 ; 20,4	18,6*	12,4 ; 26,3	Moyen
7,0*	5,0 ; 9,5	10,7**	5,5 ; 18,2	6,2**	2,9 ; 11,4	6,2**	3,2 ; 10,6	6,0**	2,4 ; 12,2	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	50,0	46,0;54,0	45,3	33,8;56,8
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	50,0	46,0;54,0	54,7	43,2;66,2
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	38,7	32,2;45,3	33,0**	16,0;53,9
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	18,9	13,7;25,0	20,9**	7,8;40,8
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	18,3	13,4;24,0	6,9**	0,7;24,0
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	24,1	18,2;29,9	39,2*	20,6;60,5
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	40,5	34,7;46,4	44,3*	27,7;61,8
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	11,9*	8,5;16,2	12,9**	4,7;26,5
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	18,6	14,0;24,0	9,9**	1,9;27,3
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	14,2	10,7;18,3	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	14,7	10,8;19,4	32,9*	18,2;50,6
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	49,3	44,0;54,7	59,7	42,1;75,7
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	25,8	20,9;30,6	21,4**	9,5;38,5
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	17,8	13,7;22,5	9,8**	2,7;23,5
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	7,1*	4,5;10,6	9,0**	2,6;21,1
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	82,6	79,1;85,8	83,6	70,9;92,4
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	12,9	10,0;16,3	12,1**	4,5;24,7
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	4,4*	2,9;6,5	4,3**	0,9;11,9
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	16,5	13,5;19,9	8,1**	2,9;17,3
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	83,5	80,1;86,5	91,9	82,7;97,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
62,8	42,5;80,3	13,7**	7,3;22,6	61,6	46,6;75,1	55,8	48,0;63,5	59,3*	38,2;78,2	35,6*	19,4;54,7	66,8	58,0;75,6	Oui
37,2*	19,7;57,5	86,3	77,4;92,7	38,4*	24,9;53,4	44,2	36,5;52,0	40,7*	21,8;61,8	64,4	45,3;80,6	33,2	24,4;42,0	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
34,1**	12,5;61,9	32,6**	5,9;72,5	26,0**	10,9;46,9	40,2*	28,3;52,1	29,5**	5,4;67,7	41,8**	7,8;83,3	50,9*	34,9;66,7	2 semaines et moins
20,2**	4,5;47,8	9,6**	0,2;45,1	24,8**	10,6;44,6	27,2*	16,4;40,4	23,8**	4,4;57,9	-	;	6,9**	1,4;19,0	Plus de 2 semaines à 1 mois
18,1**	3,0;47,8	11,2**	0,2;52,1	25,8**	11,2;45,8	19,8*	11,1;31,4	30,5**	7,0;65,6	29,4**	3,1;74,5	15,3**	6,0;30,1	Plus d'un mois à 3 mois
27,7**	9,2;54,4	46,6**	12,8;83,0	23,3**	8,6;45,2	12,7**	5,5;24,0	16,1**	1,5;50,3	28,8**	2,6;75,3	26,9**	14,2;43,2	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
25,2**	4,5;60,7	54,2	43,5;64,8	45,8*	24,5;68,3	23,5*	14,5;34,8	18,2**	1,8;54,7	45,9**	22,7;70,4	43,6*	25,4;63,2	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
-	;	17,1*	10,0;26,5	18,2**	5,3;39,8	2,9**	0,3;11,0	25,2**	4,6;60,4	-	;	18,8**	7,3;36,2	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
44,9**	15,3;77,5	23,8*	14,9;34,7	19,2**	5,2;43,3	4,2**	0,8;12,2	38,6**	11,0;73,2	23,1**	7,0;48,3	25,6**	11,5;44,8	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	60,6	48,4;71,9	-	;	-	;	2,2**	0,1;11,0	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
29,9**	6,5;65,5	5,0**	1,2;12,7	16,8**	3,5;42,1	8,7**	3,2;18,1	18,0**	1,4;57,0	31,1**	12,3;55,8	9,8**	1,7;27,7	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
65,0*	37,7;86,5	25,5*	14,7;39,0	60,3	42,3;76,4	54,7	44,6;64,8	25,8**	6,9;55,3	48,0**	21,7;75,2	51,1	38,0;64,1	2 semaines et moins
14,3**	3,0;36,8	30,8*	19,1;44,8	20,8**	8,5;39,0	28,7*	19,6;39,2	29,2**	8,3;59,8	25,3**	6,5;55,0	25,9*	15,9;38,1	Plus de 2 semaines à 1 mois
20,7**	5,4;46,7	28,9*	17,9;42,1	14,1**	4,4;30,8	13,2**	6,8;22,4	45,0**	17,9;74,5	19,9**	4,5;47,2	14,0**	6,1;26,1	Plus d'un mois à 3 mois
-	;	14,7**	6,3;27,6	4,8**	0,2;22,0	3,4**	0,7;9,8	-	;	6,8**	0,1;36,0	9,1**	3,1;19,7	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
73,9	53,7;88,7	89,6	81,6;95,0	77,3	64,6;87,2	82,8	76,1;88,3	83,8	60,4;96,3	93,4	77,7;99,2	77,9	68,8;85,4	Oui, tout à fait
19,7**	6,9;39,8	10,4**	5,0;18,4	13,3**	5,6;25,1	13,2*	8,5;19,2	16,2**	3,7;39,6	6,6**	0,8;22,3	14,1**	7,8;22,8	Oui, en partie
6,4**	0,8;21,1	-	;	9,4**	3,3;20,2	4,1**	1,5;8,6	-	;	-	;	7,9**	3,5;14,9	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]
24,8**	11,5;43,0	19,8*	12,3;29,4	16,6**	7,5;29,9	15,5*	10,2;22,2	27,2**	10,3;51,0	10,5**	2,0;29,1	17,0*	9,9;26,5	Oui
75,2	57,0;88,5	80,2	70,6;87,7	83,4	70,1;92,5	84,5	77,8;89,8	72,8	49,0;89,7	89,5	70,9;98,0	83,0	73,5;90,1	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	13,9	11,3;16,5	11,4**	4,6;22,4
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	27,3	23,7;30,8	26,3*	15,7;39,4
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	25,7	22,3;29,1	38,4*	26,8;50,9
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	29,3	25,6;33,1	17,1**	8,9;28,4
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	2,7**	1,4;4,6	5,5**	1,0;16,5
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	0,8**	0,2;2,0	-	;
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	0,3**	0,0;1,3	1,4**	0,0;7,4
Façon d'annoncer le diagnostic[p]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	92,6	90,3;94,6	98,6	92,5;100,0
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	7,4	5,4;9,7	1,4**	0,0;7,5
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	94,1	91,8;95,8	100,0	;
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	5,9*	4,2;8,2	-	;
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	93,1	90,7;95,1	98,6	92,5;100,0
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	6,9*	4,9;9,3	1,4**	0,0;7,5
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	94,9	92,8;96,6	98,6	92,6;100,0
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	5,1*	3,4;7,2	1,4**	0,0;7,4
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	63,7	59,6;67,8	57,7	45,6;69,8
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	36,3	32,2;40,4	42,3	30,2;54,4
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	66,1	62,3;69,9	61,9	49,4;73,3
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	33,9	30,1;37,7	38,1*	26,7;50,6
Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	59,7	55,0;64,4	61,9	45,3;76,7
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	40,3	35,6;45,0	38,1*	23,3;54,7
Contact pour du soutien pratique[3, p]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	74,0	70,4;77,7	75,5	62,9;85,6
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	26,0	22,3;29,6	24,5*	14,4;37,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3. On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
9,1**	1,8;24,8	14,9*	8,4;23,7	9,9**	3,8;20,3	22,0*	15,7;29,4	-	;	19,3**	7,1;38,1	9,2**	4,6;16,1	Médecin de famille
16,4**	5,8;33,5	28,7*	20,0;38,6	59,5	46,9;72,1	20,7	15,1;27,4	36,2**	17,8;58,1	15,8**	5,2;33,5	24,6*	16,5;34,2	Médecin spécialiste du cancer
-	;	9,5**	4,3;17,5	13,6**	5,7;25,8	43,9	36,2;51,5	25,3**	10,7;45,7	20,6**	7,6;40,4	21,3*	14,0;30,4	Chirurgien
72,0	53,8;86,1	45,8	35,8;55,8	15,2**	6,7;27,9	8,0**	4,1;13,6	38,5**	19,9;59,9	44,3*	25,8;64,0	40,0	30,1;49,9	Autre médecin spécialiste
2,4**	0,0;13,6	1,1**	0,0;6,5	1,8**	0,0;10,1	1,7**	0,3;5,2	-	;	-	;	4,9**	1,4;11,7	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	-	;	3,0**	0,9;7,5	-	;	-	;	-	;	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	-	;	-	;	0,6**	0,0;3,6	-	;	-	;	-	;	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p]
91,9	77,2;98,5	95,7	88,9;98,9	93,4	83,4;98,3	86,2	80,0;91,0	95,3	77,4;99,9	96,9	83,1;99,9	92,7	85,9;96,9	En personne
8,1**	1,5;22,8	4,3**	1,1;11,1	6,6**	1,7;16,6	13,8*	9,0;20,0	4,7**	0,1;22,6	3,1**	0,1;16,9	7,3**	3,1;14,1	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
91,8	77,5;98,3	96,0	89,8;98,9	96,1	86,2;99,6	93,1	87,9;96,6	90,9	69,5;99,1	93,5	78,2;99,2	90,5	82,9;95,5	Oui
8,2**	1,7;22,5	4,0**	1,1;10,2	3,9**	0,4;13,8	6,9**	3,4;12,1	9,1**	0,9;30,5	6,5**	0,8;21,8	9,5**	4,5;17,1	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
86,9	71,5;95,8	93,8	86,8;97,7	96,2	86,7;99,5	93,7	88,5;97,0	80,3	54,4;95,2	93,5	78,2;99,2	91,3	84,0;96,0	Oui
13,1**	4,2;28,5	6,2**	2,3;13,2	3,8**	0,5;13,3	6,3**	3,0;11,5	19,7**	4,8;45,6	6,5**	0,8;21,8	8,7**	4,0;16,0	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
89,0	73,6;97,1	98,0	93,1;99,8	98,1	89,5;100,0	93,5	88,1;97,0	87,0	66,0;97,3	97,0	84,1;99,9	93,4	87,1;97,3	Oui
11,0**	2,9;26,4	2,0**	0,2;6,9	1,9**	0,0;10,5	6,5**	3,0;11,9	13,0**	2,7;34,0	3,0**	0,1;15,9	6,6**	2,7;12,9	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]
47,0*	29,0;65,6	76,6	67,1;84,6	56,0	42,4;69,7	77,4	69,8;83,9	66,8	45,9;83,7	54,0*	34,5;72,6	50,4	40,6;60,2	Oui
53,0*	34,4;71,0	23,4*	15,4;32,9	44,0*	30,3;57,6	22,6*	16,1;30,2	33,2**	16,3;54,1	46,0*	27,4;65,5	49,6	39,8;59,4	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p]
60,4	41,1;77,6	54,7	44,6;64,8	68,8	55,1;80,4	76,2	69,2;82,2	75,3	55,2;89,6	68,8	48,4;85,0	63,0	53,8;72,3	Oui
39,6*	22,4;58,9	45,3	35,2;55,4	31,2*	19,6;44,9	23,8	17,8;30,8	24,7**	10,4;44,8	31,2**	15,0;51,6	37,0	27,7;46,2	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]
56,0*	32,6;77,6	58,5	44,9;72,1	39,6*	24,2;56,6	75,2	66,5;82,5	42,2**	20,4;66,5	52,1*	28,9;74,7	53,2	40,9;65,5	Oui
44,0**	22,4;67,4	41,5*	27,9;55,1	60,4	43,4;75,8	24,8*	17,5;33,5	57,8*	33,5;79,6	47,9*	25,3;71,1	46,8	34,5;59,1	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p]
70,5	51,6;85,3	71,7	61,9;80,1	69,2	54,4;81,6	78,7	70,9;85,2	71,5	49,4;87,9	74,1	53,2;89,1	73,0	63,3;81,3	Oui
29,5**	14,7;48,4	28,3*	19,9;38,1	30,8*	18,4;45,6	21,3*	14,8;29,1	28,5**	12,1;50,6	25,9**	10,9;46,8	27,0*	18,7;36,7	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	17,3	13,6;21,5	3,7**	0,4;12,9
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	82,7	78,5;86,4	96,3	87,1;99,6
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	34,0	29,4;38,6	49,7*	34,0;65,5
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	66,0	61,4;70,6	50,3*	34,5;66,0
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	6,3*	4,1;9,2	1,9**	0,0;10,5
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	93,7	90,8;95,9	98,1	89,5;100,0
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	6,2*	4,0;9,3	7,0**	1,4;19,5
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	93,8	90,7;96,0	93,0	80,5;98,6
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	6,0*	3,8;9,1	10,4**	2,7;25,4
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	94,0	90,9;96,2	89,6	74,6;97,3
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	2,6**	1,2;4,9	-	;
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	97,4	95,1;98,8	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]
13,3**	2,6;35,3	30,6*	17,9;46,0	10,5**	2,9;24,9	26,1*	18,4;35,1	-	;	10,3**	1,2;32,8	14,4**	6,7;25,9	Oui
86,7	64,7;97,4	69,4	54,0;82,1	89,5	75,1;97,1	73,9	64,9;81,6	100,0	;	89,7	67,2;98,8	85,6	74,1;93,3	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
31,9**	13,4;56,0	18,4**	8,8;31,9	24,3**	11,9;41,0	47,7	38,2;57,2	23,4**	7,5;47,9	18,4**	4,3;44,0	26,2*	15,7;39,1	Oui
68,1*	44,0;86,6	81,6	68,1;91,2	75,7	59,0;88,1	52,3	42,8;61,8	76,6	52,1;92,5	81,6	56,0;95,7	73,8	60,9;84,3	Non
														Psychologue[p]
13,8**	2,5;37,2	-	;	5,2**	0,7;17,5	12,5*	7,2;19,7	4,2**	0,1;23,1	-	;	4,7**	0,9;13,6	Oui
86,2	62,8;97,5	100,0	;	94,8	82,5;99,3	87,5	80,3;92,8	95,8	76,9;99,9	100,0	;	95,3	86,4;99,1	Non
														Travailleur social[p]
-	;	-	;	4,9**	0,6;16,4	8,1**	4,0;14,3	5,3**	0,1;26,4	5,3**	0,2;25,6	10,0**	3,9;20,1	Oui
100,0	;	100,0	;	95,1	83,6;99,4	91,9	85,7;96,0	94,7	73,6;99,9	94,7	74,4;99,8	90,0	79,9;96,1	Non
														Médecin[p]
-	;	9,5**	3,2;20,4	2,4**	0,1;11,9	3,4**	0,9;8,5	5,2**	0,1;25,9	18,3**	4,3;43,5	5,3**	1,3;13,5	Oui
100,0	;	90,5	79,6;96,8	97,6	88,1;99,9	96,6	91,5;99,1	94,8	74,1;99,9	81,7	56,5;95,7	94,7	86,5;98,7	Non
														Autre professionnel de la santé
5,2**	0,1;27,3	-	;	-	;	2,5**	0,6;7,0	4,1**	0,1;22,9	5,1**	0,1;27,9	5,7**	1,5;14,1	Oui
94,8	72,7;99,9	100,0	;	100,0	;	97,5	93,0;99,4	95,9	77,1;99,9	94,9	72,1;99,9	94,3	85,9;98,5	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	22,2	18,8;25,5	31,8*	20,7;44,7
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	77,8	74,5;81,2	68,2	55,3;79,3
Médecin spécialiste du cancer[p]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	44,1	40,1;48,1	46,8	34,4;59,1
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	55,9	51,9;59,9	53,2	40,9;65,6
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	13,4	10,6;16,7	12,3**	5,1;23,6
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	86,6	83,3;89,4	87,7	76,4;94,9
Autre médecin spécialiste[p, r]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	17,2	14,0;20,7	13,3**	6,2;23,9
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	82,8	79,3;86,0	86,7	76,1;93,8
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	3,5*	2,0;5,4	5,0**	0,5;17,6
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	96,5	94,6;98,0	95,0	82,4;99,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
19,1**	8,0;35,7	10,1**	5,0;17,6	24,4*	14,4;37,0	31,8	24,3;39,3	17,5**	5,7;36,9	12,9**	3,3;30,9	16,5*	9,8;25,5	Oui
80,9	64,3;92,0	89,9	82,4;95,0	75,6	63,0;85,6	68,2	60,7;75,7	82,5	63,1;94,3	87,1	69,1;96,7	83,5	74,5;90,2	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p]
31,1**	16,6;48,9	40,9	31,7;50,1	58,7	45,0;72,3	47,6	39,4;55,9	43,9*	23,9;65,5	47,6*	27,8;68,0	36,4	27,1;45,8	Oui
68,9	51,1;83,4	59,1	49,9;68,3	41,3*	27,7;55,0	52,4	44,1;60,6	56,1*	34,5;76,1	52,4*	32,0;72,2	63,6	54,2;72,9	Non
														Médecin de famille[p]
16,3**	5,3;34,9	15,3**	8,5;24,6	3,5**	0,3;13,3	12,4*	7,7;18,6	10,8**	2,2;29,1	20,6**	7,8;39,9	16,6*	10,0;25,1	Oui
83,7	65,1;94,7	84,7	75,4;91,5	96,5	86,7;99,7	87,6	81,4;92,3	89,2	70,9;97,8	79,4	60,1;92,2	83,4	74,9;90,0	Non
														Autre médecin spécialiste[p, r]
17,0**	6,2;34,2	20,0*	12,9;29,0	1,8**	0,0;9,5	12,3*	7,1;19,4	27,9**	11,7;49,8	27,4**	12,4;47,4	26,0*	17,3;36,5	Oui
83,0	65,8;93,8	80,0	71,0;87,1	98,2	90,5;100,0	87,7	80,6;92,9	72,1	50,2;88,3	72,6	52,6;87,6	74,0	63,5;82,7	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
2,4**	0,0;13,7	-	;	7,1**	1,8;17,8	4,1**	1,3;9,6	3,6**	0,1;18,1	-	;	3,8**	1,1;9,4	Oui
97,6	86,3;100,0	100,0	;	92,9	82,2;98,2	95,9	90,4;98,7	96,4	81,9;99,9	100,0	;	96,2	90,6;98,9	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	82,2	78,7;85,4	85,1	73,5;93,0
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	12,6	9,9;15,7	11,5**	4,8;22,2
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	5,2*	3,5;7,4	3,4**	0,4;11,9
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	69,5	65,9;73,1	71,5	58,6;82,3
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	17,5	14,4;20,9	14,8**	6,7;27,1
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	13,0	10,4;16,0	13,6**	6,3;24,6
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	76,3	72,0;80,6	84,4	70,2;93,6
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	13,6	10,1;17,8	15,6**	6,4;29,8
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	10,1*	7,1;13,7	-	;
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	55,2	50,5;60,0	58,8	43,5;72,9
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	15,5	12,3;19,3	12,1**	4,8;23,9
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	29,2	24,7;33,8	29,1*	17,1;43,6
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	30,7	27,2;34,2	30,6*	20,3;42,5
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	15,5	12,7;18,8	16,9**	8,1;29,7
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	25,2	21,9;28,6	17,9**	9,4;29,5
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	7,6*	5,4;10,5	12,2**	4,4;25,4
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	20,9	17,5;24,2	22,4*	12,8;34,7
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	70,5	63,3;77,1	75,9	50,6;92,4
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	16,0*	10,8;22,4	7,9**	0,6;29,2
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	13,5*	8,7;19,6	16,2**	3,5;40,1
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	17,8	14,7;20,9	14,1**	7,2;23,9
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	82,2	79,1;85,3	85,9	76,1;92,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
83,1	65,5;94,0	91,2	83,6;96,0	76,9	63,6;87,1	82,7	75,4;88,5	80,2	58,9;93,5	81,1	63,1;92,8	75,8	66,2;83,9	Oui, tout à fait
5,4**	0,6;18,8	8,8**	4,0;16,4	20,8**	11,1;33,8	11,5*	6,8;17,7	12,2**	2,5;32,1	15,6**	5,0;33,5	15,3*	9,0;23,7	Oui, en partie
11,5**	3,1;27,4	-	;	2,3**	0,1;11,7	5,9**	2,5;11,5	7,6**	0,7;26,8	3,4**	0,1;19,1	8,8**	3,8;16,9	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
65,9	46,5;82,1	79,2	69,7;86,7	60,4	46,1;73,5	66,9	59,3;74,5	67,2	45,4;84,6	81,0	62,3;93,1	66,8	58,0;75,7	Oui, tout à fait
14,5**	3,6;34,8	13,6**	7,4;22,1	23,6*	13,1;37,1	21,2*	15,0;28,4	11,1**	2,2;29,5	12,8**	3,5;29,9	18,3*	11,4;27,1	Oui, en partie
19,6**	7,7;37,6	7,3**	3,0;14,3	16,1**	7,5;28,5	11,9*	6,7;19,1	21,8**	7,8;42,8	6,2**	0,6;21,5	14,9*	9,0;22,6	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
81,8	57,9;95,3	75,9	63,3;85,9	85,1	66,8;95,5	70,3	60,1;79,3	56,6*	27,6;82,6	81,2	61,8;93,5	74,7	62,6;84,6	Oui
18,2**	4,7;42,1	13,8**	6,3;25,3	6,5**	0,7;22,2	16,9*	10,0;26,1	13,2**	1,4;41,8	11,0**	2,1;29,8	11,1**	4,7;21,3	Non, il ne voulait pas
-	;	10,2**	4,1;20,3	8,4**	1,6;23,2	12,7**	6,7;21,2	30,2**	8,7;61,0	7,8**	1,0;25,0	14,1**	6,8;24,9	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
45,7*	24,0;68,6	56,8	45,7;67,9	49,1	34,6;63,7	50,2	41,1;59,3	47,0*	24,3;70,7	75,8	51,1;92,1	61,3	48,4;73,1	Oui, tout à fait
28,3**	11,1;51,9	15,7**	8,1;26,4	21,4**	10,2;36,8	17,4*	11,5;24,9	11,1**	1,2;36,1	14,4**	2,7;38,2	9,4**	3,2;20,5	Oui, en partie
26,1**	9,5;49,9	27,5*	17,6;39,2	29,6*	17,4;44,4	32,4	23,5;41,2	41,9**	20,0;66,4	9,7**	1,1;31,5	29,3*	18,8;41,7	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
29,1**	14,5;47,8	30,4	22,0;38,8	47,6	34,5;60,7	31,0	23,6;38,4	26,8**	11,8;46,9	31,0**	15,1;51,1	24,0*	16,3;33,2	Oui, une infirmière pivot en oncologie
11,6**	2,1;31,8	12,9**	6,7;21,8	12,5**	5,0;24,7	17,4*	11,7;24,4	10,5**	2,1;28,1	16,5**	5,1;35,9	18,0*	11,0;27,0	Oui, un autre professionnel de la santé
43,9*	26,5;62,6	19,5*	11,8;29,3	24,5*	13,6;38,4	27,4	20,5;35,1	19,0**	6,3;39,5	35,2**	18,2;55,5	25,7*	17,6;35,1	Oui, un membre du personnel administratif
2,6**	0,1;14,2	10,7**	4,9;19,7	1,6**	0,0;8,9	5,8**	2,6;10,8	16,0**	4,2;37,3	6,5**	0,8;21,6	7,3**	3,1;14,1	Oui, un médecin
12,8**	3,6;29,5	26,5*	17,6;37,0	13,8**	6,2;25,3	18,5*	12,2;26,5	27,7**	11,7;49,4	10,8**	2,1;29,3	25,1*	16,7;35,2	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
67,5**	27,1;94,4	64,2	44,4;80,9	66,3*	32,6;90,9	71,8	58,8;82,5	58,8**	18,9;91,4	85,6*	36,9;99,8	72,7	52,4;87,8	Oui, tout à fait
32,5**	5,6;72,9	19,3**	7,6;37,1	16,9**	1,3;54,7	13,3**	5,9;24,7	10,9**	0,1;52,2	14,4**	0,2;63,1	20,1**	7,9;38,4	Oui, en partie
-	;	16,5**	5,4;34,9	16,8**	1,7;51,0	14,9**	6,9;26,7	30,3**	3,6;74,5	-	;	7,2**	0,7;25,1	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]
20,3**	8,4;37,8	16,0*	9,2;25,1	10,2**	3,8;21,1	25,3	18,6;32,9	6,7**	0,9;21,5	23,8**	9,7;44,1	15,7*	9,8;23,2	Oui
79,7	62,2;91,6	84,0	74,9;90,8	89,8	78,9;96,2	74,7	67,1;81,4	93,3	78,5;99,1	76,2	55,9;90,3	84,3	76,8;90,2	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	81,5	78,8;84,2	95,3	87,5;98,9
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	18,5	15,8;21,2	4,7**	1,1;12,5
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	40,6	36,2;45,0	3,0**	0,3;10,8
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	59,4	55,0;63,8	97,0	89,2;99,7
Lieu de la chirurgie[p]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	78,3	74,4;82,3	81,8	70,6;90,1
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	21,7	17,7;25,6	18,2**	9,9;29,4
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	54,7	48,3;61,0	70,3	52,4;84,5
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	8,0*	4,8;12,3	2,4**	0,0;13,7
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	37,4	31,3;43,5	27,3**	13,8;44,8
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	64,9	60,2;69,6	61,6	48,1;74,0
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	15,7	12,5;19,5	25,3*	15,3;37,5
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	19,4	15,8;23,4	13,1**	5,7;24,5
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	95,8	93,5;97,5	98,6	91,5;100,0
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	4,2*	2,5;6,5	1,4**	0,0;8,5
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	86,5	83,0;89,5	89,5	79,0;95,9
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	12,3	9,4;15,7	10,5**	4,1;21,0
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	1,2**	0,4;2,8	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
92,0	77,6;98,5	70,4	62,2;77,6	29,1*	17,9;42,5	95,1	90,6;97,8	66,7	45,1;84,1	74,4	56,1;88,1	89,5	82,7;94,3	Oui
8,0**	1,5;22,4	29,6	22,4;37,8	70,9	57,5;82,1	4,9**	2,2;9,4	33,3**	15,9;54,9	25,6**	11,9;43,9	10,5**	5,7;17,3	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
7,2**	0,8;24,6	9,6**	3,5;20,1	63,0*	35,8;85,2	77,5	69,7;84,0	48,4**	22,5;74,9	9,5**	1,0;31,8	45,1	34,7;55,4	Oui
92,8	75,4;99,2	90,4	79,9;96,5	37,0**	14,8;64,2	22,5*	16,0;30,3	51,6**	25,1;77,5	90,5	68,2;99,0	54,9	44,6;65,3	Non
														Lieu de la chirurgie[p]
72,3	54,3;86,2	71,1	57,3;82,6	66,2*	36,6;88,6	85,6	79,1;90,7	75,7	48,3;93,1	63,8*	39,3;83,9	77,4	66,3;86,2	Hôpital de la région de résidence
27,7**	13,8;45,7	28,9*	17,4;42,7	33,8**	11,4;63,4	14,4*	9,3;20,9	24,3**	6,9;51,7	36,2**	16,1;60,7	22,6*	13,8;33,7	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
64,4*	32,2;89,1	48,8*	30,6;67,2	53,8**	14,9;89,4	44,1	32,7;55,5	40,5**	6,2;84,3	70,0*	36,6;92,5	58,4	41,4;74,1	Oui, tout à fait
7,5**	0,1;37,5	11,9**	3,2;28,1	11,6**	0,2;54,2	10,3**	4,1;20,5	-	;	-	;	9,0**	2,7;20,9	Oui, en partie
28,2**	6,7;61,2	39,3*	22,9;57,7	34,6**	5,6;76,7	45,6	33,9;57,3	59,5**	15,7;93,8	30,0**	7,5;63,4	32,5*	18,2;49,7	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
57,9*	37,6;76,4	81,3	69,3;90,1	54,8*	27,0;80,6	61,2	52,9;69,6	64,9*	37,8;86,3	77,9	51,5;94,0	63,4	53,0;73,8	Oui, tout à fait
15,0**	4,5;33,3	9,3**	3,5;19,2	25,5**	7,0;54,1	15,7*	10,2;22,7	5,7**	0,1;29,1	9,6**	0,8;33,6	14,9**	8,2;24,1	Oui, en partie
27,1**	12,2;47,1	9,4**	3,3;19,9	19,7**	3,9;48,9	23,1*	16,5;30,8	29,4**	9,5;57,7	12,6**	1,4;40,0	21,7*	13,3;32,4	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
96,6	83,1;99,9	97,1	90,0;99,6	94,4	69,5;99,9	95,9	90,4;98,7	88,0	61,9;98,7	96,0	76,8;99,9	94,3	86,9;98,2	Oui
3,4**	0,1;16,9	2,9**	0,4;10,0	5,6**	0,1;30,5	4,1**	1,3;9,6	12,0**	1,3;38,1	4,0**	0,1;23,2	5,7**	1,8;13,1	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
90,2	73,1;98,1	85,1	73,5;93,0	85,6	54,8;98,5	83,6	76,7;89,2	93,3	67,2;99,8	100,0	;	84,2	74,3;91,5	Oui, tout à fait
6,1**	0,7;21,1	11,5**	4,6;22,7	14,4**	1,5;45,2	15,7*	10,3;22,4	6,7**	0,2;32,8	-	;	14,4**	7,5;24,1	Oui, en partie
3,6**	0,1;19,9	3,4**	0,4;11,5	-	;	0,7**	0,0;3,8	-	;	-	;	1,3**	0,0;7,5	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	39,5	37,2;41,9	47,0	36,4;57,6
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	60,5	58,1;62,8	53,0	42,4;63,6
Lieu de la chimiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	80,0	74,8;85,1	81,8	65,4;92,7
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	20,0	14,9;25,2	18,2**	7,3;34,6
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	62,6	56,2;69,1	74,4	56,6;87,7
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	33,0	26,6;39,3	25,6**	12,3;43,4
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	4,4**	2,2;7,9	-	;
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	49,3	40,4;58,3	64,7*	39,2;85,3
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	12,8*	7,4;20,3	4,2**	0,1;24,0
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	37,8	29,2;46,4	31,1**	12,1;56,3
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	52,4	45,8;59,0	70,9	52,5;85,4
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	24,2	18,7;29,7	17,5**	6,5;35,0
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	23,4	17,9;28,9	11,6**	3,3;26,9
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	80,4	74,6;85,3	97,0	84,9;99,9
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	17,0	12,4;22,4	-	;
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	2,7**	1,0;5,9	3,0**	0,1;15,1
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	86,8	81,4;91,0	91,3	75,5;98,4
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	10,4*	6,6;15,4	8,7**	1,6;24,5
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	2,8**	1,0;6,1	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
35,7*	20,1;53,9	2,2**	0,3;7,6	93,6	82,3;98,7	51,7	45,1;58,3	28,1**	12,1;49,5	45,8*	27,8;64,6	25,4*	17,6;34,6	Oui
64,3	46,1;79,9	97,8	92,4;99,7	6,4**	1,3;17,7	48,3	41,7;54,9	71,9	50,5;87,9	54,2*	35,4;72,2	74,6	65,4;82,4	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p]
62,6*	30,1;88,3	48,3**	0,6;99,2	83,5	70,5;92,4	86,4	76,9;93,1	56,1**	14,9;91,5	87,4	59,6;98,7	65,6	44,5;83,1	Hôpital de la région de résidence
37,4**	11,7;69,9	51,7**	0,8;99,4	16,5**	7,6;29,5	13,6**	6,9;23,1	43,9**	8,5;85,1	12,6**	1,3;40,4	34,4**	16,9;55,5	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
45,6**	17,2;76,3	48,3**	0,6;99,2	65,9	51,5;78,5	63,5	51,6;74,2	34,5**	2,8;84,1	67,9*	39,3;89,1	52,6*	30,9;73,7	Moins de 30 minutes
47,7**	19,5;77,1	51,7**	0,8;99,4	30,5*	18,6;44,6	32,9*	22,6;44,5	65,5**	15,9;97,2	32,1**	10,9;60,7	31,7**	14,2;54,0	De 30 à 60 minutes
6,7**	0,1;34,7	-	;	3,6**	0,4;12,8	3,6**	0,7;10,3	-	;	-	;	15,7**	4,2;36,1	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
50,8**	9,9;90,8	100,0	;	48,2*	27,0;69,8	38,2*	24,8;53,2	23,2**	0,1;86,1	100,0	;	57,2*	29,0;82,3	Oui, tout à fait
14,3**	0,0;71,2	-	;	8,8**	0,9;30,3	15,2**	6,9;27,7	51,2**	4,1;96,5	-	;	15,6**	1,6;48,6	Oui, en partie
35,0**	3,2;83,5	-	;	43,0*	22,1;65,9	46,5*	32,8;60,2	25,6**	0,3;86,8	-	;	27,2**	9,2;53,2	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
60,2*	29,1;86,1	100,0	;	43,0*	29,0;57,9	46,7	35,5;57,8	66,0**	16,3;97,3	58,9*	29,6;84,1	50,7*	29,0;72,1	Moins de 30 minutes
24,0**	5,0;56,3	-	;	28,0*	17,0;41,5	23,4*	15,0;33,7	16,8**	0,3;67,8	27,6**	7,6;57,6	29,0**	12,8;50,5	De 30 à 60 minutes
15,8**	2,0;46,6	-	;	28,9*	16,7;43,9	29,9*	20,1;41,3	17,3**	0,2;72,1	13,6**	1,4;43,1	20,4**	6,8;41,7	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
91,5	57,5;99,9	100,0	;	75,5	61,8;86,3	72,0	60,6;81,6	66,0**	18,6;96,6	92,4	64,3;99,8	84,4	65,1;95,5	Oui, tout à fait
8,5**	0,1;42,5	-	;	20,5**	10,7;33,8	24,2*	15,6;34,8	34,0**	3,4;81,4	7,6**	0,2;35,7	15,6**	4,5;34,9	Oui, en partie
-	;	-	;	4,0**	0,4;14,0	3,8**	0,8;10,3	-	;	-	;	-	;	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
85,4	54,8;98,4	100,0	;	80,2	66,0;90,4	92,5	84,2;97,3	100,0	;	86,4	56,9;98,6	74,5	51,7;90,4	Oui, tout à fait
6,7**	0,1;35,4	-	;	17,3**	7,8;31,2	7,5**	2,7;15,8	-	;	7,6**	0,2;35,7	13,9**	2,9;35,9	Oui, en partie
7,9**	0,2;37,8	-	;	2,5**	0,1;12,7	-	;	-	;	6,0**	0,1;31,4	11,6**	2,2;31,2	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	45,7	43,0;48,4	20,9*	12,3;32,0
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	54,3	51,6;57,0	79,1	68,0;87,7
Lieu de la radiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	50,1	44,2;55,9	34,9**	11,9;64,8
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	49,9	44,1;55,8	65,1*	35,2;88,1
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	20,0	15,4;24,7	20,0**	3,8;50,0
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	67,1	62,0;72,2	53,7*	26,4;79,4
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	12,8*	9,2;17,2	26,4**	7,5;55,1
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	52,2	45,6;58,8	75,3*	43,6;94,5
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	15,4*	10,8;20,9	18,1**	2,2;52,2
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	32,4	26,3;38,6	6,5**	0,1;36,0
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	74,9	69,5;80,2	77,7	49,0;94,7
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	14,6*	10,5;19,7	5,1**	0,1;27,3
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	10,5*	7,1;14,7	17,3**	2,9;45,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
27,4**	14,6;43,8	51,8	44,4;59,1	32,4*	20,2;46,6	80,7	74,3;86,1	66,9	45,1;84,4	37,8*	20,4;57,9	20,2*	13,5;28,4	Oui
72,6	56,2;85,4	48,2	40,9;55,6	67,6	53,4;79,8	19,3	13,9;25,7	33,1**	15,6;54,9	62,2	42,1;79,6	79,8	71,6;86,5	Non
														Lieu de la radiothérapie[p]
44,4**	15,2;76,9	51,2	36,3;66,0	41,8**	18,6;68,0	47,7	38,9;56,6	63,1*	36,9;84,6	40,9**	13,3;73,7	73,6	52,0;89,2	Hôpital de la région de résidence
55,6**	23,1;84,8	48,8	34,0;63,7	58,2*	32,0;81,4	52,3	43,4;61,1	36,9**	15,4;63,1	59,1**	26,3;86,7	26,4**	10,8;48,0	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
26,7**	5,7;60,4	11,9**	4,4;24,4	5,5**	0,1;28,7	20,0*	13,8;27,5	42,9**	19,9;68,4	8,4**	0,1;42,2	35,0**	16,5;57,5	Moins de 30 minutes
73,3*	39,6;94,3	70,4	54,9;83,1	89,3	64,8;98,9	66,4	59,2;73,6	57,1*	31,6;80,1	84,3	52,4;98,3	52,0*	29,8;73,6	De 30 à 60 minutes
-	;	17,7**	7,9;32,0	5,2**	0,2;24,7	13,6*	8,4;20,3	-	;	7,3**	0,1;36,9	13,0**	2,9;33,1	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
56,6**	15,5;91,6	61,6	43,7;77,4	64,3*	35,3;87,1	43,5	33,1;53,8	29,3**	5,3;67,4	67,1**	21,7;96,1	59,0*	32,5;82,2	Oui, tout à fait
27,5**	2,4;73,8	13,3**	4,2;29,3	-	;	19,5*	12,2;28,8	29,1**	6,6;63,3	-	;	-	;	Oui, en partie
15,9**	0,4;62,2	25,1**	11,9;42,8	35,7**	12,9;64,7	37,0	27,3;46,7	41,6**	12,5;76,0	32,9**	3,9;78,3	41,0**	17,8;67,5	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
72,0*	34,5;95,0	79,1	63,6;90,1	66,7*	42,0;86,2	73,7	64,9;81,2	80,7	53,1;95,9	77,3*	45,0;95,6	73,1	49,4;89,9	Oui, tout à fait
17,8**	1,4;55,9	15,0**	6,2;28,8	26,2**	9,6;50,0	14,3*	8,6;21,8	12,6**	1,4;39,9	22,7**	4,4;55,0	9,5**	1,0;31,3	Oui, en partie
10,3**	0,3;45,4	5,9**	1,0;17,7	7,1**	0,2;33,5	12,0*	7,1;18,7	6,7**	0,1;34,3	-	;	17,4**	4,9;39,0	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Douleur et malaises ressentis[p, r]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	54,6	50,6;58,5	58,1	45,5;70,7
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	45,4	41,5;49,4	41,9*	29,3;54,5
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	24,3	19,5;29,1	17,5**	7,1;33,4
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	48,5	42,8;54,1	65,7	49,0;79,9
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	27,2	22,0;32,4	16,8**	7,2;31,4
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	78,5	74,1;82,9	82,6	67,0;92,9
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	16,5	12,7;21,1	14,9**	5,5;30,1
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	5,0*	2,9;7,9	2,5**	0,1;12,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p, r]
62,8	43,0;79,8	32,4*	22,6;42,2	72,6	59,0;83,6	60,3	53,1;67,6	61,6*	39,4;80,7	65,5	44,2;83,1	46,4	36,6;56,2	Oui
37,2*	20,2;57,0	67,6	57,8;77,4	27,4*	16,4;41,0	39,7	32,4;46,9	38,4**	19,3;60,6	34,5**	16,9;55,8	53,6	43,8;63,4	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
22,8**	7,6;46,0	31,2**	15,8;50,4	21,7**	10,5;37,1	26,2*	18,1;35,7	11,2**	1,3;36,1	38,3**	17,0;63,6	24,4**	12,5;40,2	Sévères
64,9*	40,4;84,7	28,8**	13,8;48,2	56,6	39,3;72,8	40,6	31,0;50,2	61,2*	34,5;83,7	41,0**	18,1;67,1	44,9*	30,7;59,8	Modérés
12,3**	2,2;34,1	40,0*	22,7;59,3	21,7**	9,6;38,9	33,2	23,8;42,6	27,5**	9,2;54,0	20,7**	5,8;45,4	30,6*	18,1;45,7	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
87,4	67,9;97,2	64,5	45,0;81,0	73,4	56,4;86,5	77,1	67,6;84,8	76,9	49,9;93,6	76,7	49,4;93,7	86,8	73,6;94,9	Oui, tout à fait
8,7**	1,0;28,6	29,2**	14,1;48,6	24,2**	11,8;40,8	15,9*	9,2;24,9	17,0**	3,8;41,5	11,2**	1,4;35,0	11,3**	3,9;23,9	Oui, en partie
3,9**	0,1;18,3	6,3**	0,6;22,5	2,4**	0,1;13,0	7,0**	3,0;13,7	6,2**	0,1;31,3	12,2**	1,6;36,9	2,0**	0,0;10,7	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	85,7	81,7;89,1	83,9	69,7;93,3
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	10,2	7,4;13,7	13,8**	5,3;27,6
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	4,1**	2,3;6,7	2,3**	0,1;12,0
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	11,0	8,6;13,8	17,6**	9,1;29,3
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	89,0	86,2;91,4	82,4	70,7;90,9
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	69,4	65,6;73,3	69,0	55,6;80,5
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	29,1	25,3;32,9	31,0*	19,5;44,4
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	1,5**	0,6;2,9	-	;
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	61,0	57,3;64,7	57,9	45,3;70,5
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	39,0	35,3;42,7	42,1*	29,5;54,7
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	19,3	16,2;22,3	17,2**	9,5;27,5
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	15,8	12,9;19,0	8,7**	3,4;17,6
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	65,0	61,3;68,6	74,2	62,6;83,7
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	72,8	68,6;77,1	75,3	61,3;86,2
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	21,2	17,2;25,2	23,2**	12,6;37,2
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	6,0*	3,8;8,8	1,5**	0,0;8,0
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	57,6	51,9;63,2	74,9	58,2;87,5
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	42,4	36,8;48,1	25,1**	12,5;41,8
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	86,0	82,8;88,7	94,2	86,2;98,3
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	13,2	10,5;16,3	5,8**	1,7;13,8
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	0,9**	0,3;2,1	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
94,6	71,6;99,9	74,8	60,2;86,1	89,3	76,6;96,5	86,1	78,4;91,8	80,1	51,2;95,9	87,2	67,8;97,1	90,4	78,3;97,0	Oui, tout à fait
5,4**	0,1;28,4	17,4**	8,0;30,9	6,5**	1,4;17,6	10,8**	5,8;18,0	7,6**	0,1;38,0	8,6**	1,1;27,3	6,3**	1,3;17,5	Oui, en partie
-	;	7,9**	2,0;19,6	4,2**	0,4;15,2	3,1**	0,8;7,9	12,4**	1,5;38,4	4,2**	0,1;23,4	3,3**	0,4;11,8	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
15,2**	4,8;32,9	12,1**	6,1;20,6	9,2**	3,0;20,4	8,1**	4,5;13,1	7,5**	0,9;24,4	6,8**	0,8;22,4	11,4**	6,0;19,1	Oui
84,8	67,1;95,2	87,9	79,4;93,9	90,8	79,6;97,0	91,9	86,9;95,5	92,5	75,6;99,1	93,2	77,6;99,2	88,6	80,9;94,0	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
61,3	42,2;78,2	75,9	65,6;84,3	60,9	46,3;74,2	69,5	62,0;77,0	71,1	49,6;87,4	83,8	66,5;94,4	66,8	57,6;76,0	Oui, toujours
38,7*	21,8;57,8	23,2*	14,8;33,5	37,3*	24,2;52,0	29,1	21,9;37,2	28,9**	12,6;50,4	16,2**	5,6;33,5	29,2*	20,5;39,1	Oui, la plupart du temps
-	;	1,0**	0,0;5,0	1,8**	0,0;9,9	1,4**	0,2;5,0	-	;	-	;	4,0**	0,9;10,7	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
48,9*	31,3;66,8	60,0	49,5;70,5	71,0	57,4;82,4	80,0	72,9;86,0	50,9*	31,0;70,6	50,3*	32,1;68,4	42,4	32,8;52,0	Oui
51,1*	33,2;68,7	40,0	29,5;50,5	29,0*	17,6;42,6	20,0*	14,0;27,1	49,1*	29,4;69,0	49,7*	31,6;67,9	57,6	48,0;67,2	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]
10,6**	3,0;25,0	9,3**	4,5;16,6	30,1*	18,2;44,3	30,1	23,1;37,0	13,7**	3,5;32,5	11,2**	2,3;29,5	14,5*	8,3;22,9	Oui
10,7**	2,8;25,7	7,3**	3,0;14,5	23,7*	13,5;36,7	24,7	18,3;32,1	15,9**	4,8;35,0	15,2**	3,9;35,8	12,7**	6,8;21,1	Non, mais il aurait aimé l'être
78,7	60,8;91,0	83,4	74,8;90,0	46,3	33,1;59,4	45,2	37,5;52,8	70,4	48,9;86,8	73,6	52,3;89,1	72,8	63,1;81,1	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
80,5	58,8;93,8	81,7	69,4;90,6	65,9	48,7;80,5	76,3	66,7;84,2	69,0*	41,7;89,1	63,8*	42,2;82,0	66,0	54,4;76,3	Oui, tout à fait
19,5**	6,2;41,2	14,9**	6,7;27,0	20,6**	9,3;36,6	19,4*	12,3;28,2	17,4**	4,1;41,7	32,3**	14,9;54,2	24,0*	15,2;34,7	Oui, en partie
-	;	3,4**	0,4;11,7	13,5**	4,8;28,1	4,4**	1,1;11,3	13,6**	1,6;41,8	3,9**	0,1;19,4	10,0**	4,0;19,8	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
69,9	46,1;87,7	58,1*	39,4;75,2	56,8*	35,7;76,3	47,1	37,0;57,1	30,5**	10,4;58,2	65,3*	38,7;86,3	62,8	47,7;76,3	Oui
30,1**	12,3;53,9	41,9*	24,8;60,6	43,2*	23,7;64,3	52,9	42,9;63,0	69,5*	41,8;89,6	34,7**	13,7;61,3	37,2*	23,7;52,3	Non
														Patient traité de manière respectueuse
84,9	68,3;94,8	90,1	82,6;95,1	84,3	72,1;92,6	81,7	74,3;87,7	80,1	59,5;93,2	79,4	58,6;92,9	87,6	79,6;93,3	Oui, toujours
15,1**	5,2;31,7	7,7**	3,2;15,0	15,7**	7,4;27,9	16,3*	10,6;23,5	19,9**	6,8;40,5	20,6**	7,1;41,4	12,4**	6,7;20,4	Oui, la plupart du temps
-	;	2,2**	0,3;7,6	-	;	1,9**	0,4;5,6	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	1,8**	0,9;3,2	2,9**	0,3;10,3
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	4,5*	2,9;6,6	1,4**	0,0;7,1
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	2,9*	1,7;4,6	1,5**	0,0;8,0
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	90,8	88,2;93,0	94,3	86,0;98,4
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	74,8	71,1;78,5	67,6	53,5;79,6
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	18,6	15,4;22,3	21,3**	11,7;34,0
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	6,5*	4,6;8,9	11,2**	4,3;22,4
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	88,0	84,9;90,6	84,1	71,3;92,8
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	11,3	8,8;14,3	14,5**	6,1;27,5
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	0,7**	0,2;1,9	1,4**	0,0;8,4
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	63,7	57,2;70,1	76,6	55,0;91,3
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	36,3	29,9;42,8	23,4**	8,7;45,0
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	5,1*	3,4;7,2	3,9**	0,9;10,6
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	94,9	92,8;96,6	96,1	89,4;99,1
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	76,1	71,6;80,6	81,0	63,4;92,6
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	10,8	7,8;14,3	7,8**	1,5;21,7
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	13,1	9,9;17,0	11,2**	2,7;28,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
-	;	1,1**	0,0;6,4	1,7**	0,1;8,7	0,7**	0,0;3,4	3,4**	0,1;18,4	3,7**	0,1;19,4	2,9**	0,6;8,7	Oui, souvent
8,6**	1,8;23,4	3,5**	0,7;9,8	5,3**	1,1;14,5	4,9**	2,0;10,0	3,8**	0,1;19,0	-	;	6,1**	2,2;12,8	Oui, parfois
3,1**	0,1;16,8	3,5**	0,7;9,8	1,8**	0,1;9,2	2,7**	0,8;6,4	3,4**	0,1;17,8	3,7**	0,1;21,2	3,8**	1,0;9,8	Oui, une seule fois
88,3	71,9;96,9	91,9	84,4;96,5	91,3	80,7;97,1	91,7	86,3;95,5	89,5	71,6;97,9	92,5	74,5;99,2	87,2	79,0;93,0	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
74,2	56,9;87,3	80,1	71,1;87,4	74,5	59,8;86,0	74,7	67,0;81,4	87,9	68,0;97,5	75,8	57,0;89,3	72,6	62,6;81,2	Oui, toujours
17,0**	6,3;33,8	11,0**	5,7;18,7	20,0**	10,0;33,7	20,8*	14,7;28,1	12,1**	2,5;32,0	24,2**	10,7;43,0	19,9*	12,0;30,1	Oui, la plupart du temps
8,8**	1,7;24,4	8,9**	4,1;16,3	5,5**	1,2;14,9	4,5**	1,8;9,1	-	;	-	;	7,5**	3,2;14,4	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
76,0	56,5;89,9	94,4	87,1;98,3	87,0	74,1;95,0	84,3	77,2;89,9	96,4	81,5;99,9	88,7	68,6;98,0	92,4	85,4;96,7	Oui, toujours
20,9**	8,0;40,3	5,6**	1,7;12,9	13,0**	5,0;25,9	15,1*	9,6;22,1	3,6**	0,1;18,5	11,3**	2,0;31,4	6,7**	2,7;13,4	Oui, la plupart du temps
3,0**	0,1;16,2	-	;	-	;	0,6**	0,0;3,6	-	;	-	;	0,9**	0,0;5,0	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]
52,6**	20,7;83,0	48,8*	28,8;69,2	71,5	46,4;89,6	59,9	47,6;72,2	41,7**	11,7;77,2	78,9*	45,3;96,6	68,4	50,9;82,8	Oui
47,4**	17,0;79,3	51,2*	30,8;71,2	28,5**	10,4;53,6	40,1*	27,8;52,4	58,3**	22,8;88,3	21,1**	3,4;54,7	31,6*	17,2;49,1	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
5,8**	0,7;19,2	2,1**	0,2;7,7	7,1**	2,0;17,2	7,4**	3,5;13,3	-	;	3,3**	0,1;18,7	5,5**	1,8;12,3	Oui
94,2	80,8;99,3	97,9	92,3;99,8	92,9	82,8;98,0	92,6	86,7;96,5	100,0	;	96,7	81,3;99,9	94,5	87,7;98,2	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
78,1	54,6;93,0	73,3	59,9;84,2	68,4	49,4;83,7	78,9	69,7;86,3	64,0*	38,1;85,0	81,6	57,2;95,4	75,0	63,2;84,5	Oui, tout à fait
10,9**	1,8;31,2	4,8**	1,0;13,7	22,7**	9,5;41,5	11,8*	6,7;18,7	-	;	13,8**	2,4;37,5	11,9**	5,2;22,4	Oui, en partie
11,0**	2,0;30,7	21,9*	12,5;33,9	9,0**	1,6;25,5	9,3**	4,4;16,8	36,0**	15,0;61,9	4,6**	0,1;24,1	13,1**	6,3;23,2	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	82,3	78,8;85,4	90,4	78,3;97,0
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	17,7	14,6;21,2	9,6**	3,0;21,7
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	5,4*	3,6;7,8	3,1**	0,4;10,7
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	94,6	92,2;96,4	96,9	89,3;99,6
Médecin spécialiste[p]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	17,7	14,7;21,0	24,2*	14,0;37,2
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	82,3	79,0;85,3	75,8	62,8;86,0
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	26,6	23,1;30,0	38,8*	25,9;52,9
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	73,4	70,0;76,9	61,2	47,1;74,1
Info-Santé[p, r]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	7,7*	5,5;10,5	19,5**	10,2;32,2
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	92,3	89,5;94,5	80,5	67,8;89,8
CLSC[p]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	21,6	18,0;25,2	32,1*	19,9;46,3
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	78,4	74,8;82,0	67,9	53,7;80,1
Urgence d'un hôpital[p]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	32,0	28,3;35,7	25,3*	14,8;38,6
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	68,0	64,3;71,7	74,7	61,4;85,2
Unité de soins d'un hôpital[p]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	14,7	11,9;18,0	10,8**	4,4;21,1
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	85,3	82,0;88,1	89,2	78,9;95,6
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	2,1**	1,1;3,6	-	;
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	97,9	96,4;98,9	100,0	;
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	0,4**	0,0;1,4	-	;
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	99,6	98,6;100,0	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]
82,9	65,9;93,7	78,5	69,2;86,0	92,6	81,9;98,0	82,5	75,2;88,3	70,4	48,3;87,2	86,0	64,6;97,0	76,9	67,3;84,9	Oui
17,1**	6,3;34,1	21,5*	14,0;30,8	7,4**	2,0;18,1	17,5*	11,7;24,8	29,6**	12,8;51,7	14,0**	3,0;35,4	23,1*	15,1;32,7	Non
														Médecin de famille[p]
14,2**	3,9;33,0	8,2**	3,2;16,7	5,0**	1,0;14,3	2,6**	0,7;6,8	3,8**	0,1;18,6	7,5**	1,1;23,0	5,4**	1,7;12,2	Oui
85,8	67,0;96,1	91,8	83,3;96,8	95,0	85,7;99,0	97,4	93,2;99,3	96,2	81,4;99,9	92,5	77,0;98,9	94,6	87,8;98,3	Non
														Médecin spécialiste[p]
10,9**	3,1;25,4	26,6*	17,4;37,4	21,4**	11,1;35,1	14,3*	9,3;20,7	8,1**	0,9;26,9	14,3**	4,0;32,9	15,0*	8,5;23,7	Oui
89,1	74,6;96,9	73,4	62,6;82,6	78,6	64,9;88,9	85,7	79,3;90,7	91,9	73,1;99,1	85,7	67,1;96,0	85,0	76,3;91,5	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
34,0*	19,7;50,7	14,0**	7,7;22,7	36,2*	23,7;50,3	29,1	21,9;37,1	23,3**	8,5;45,2	24,5**	10,4;44,3	20,2*	12,9;29,3	Oui
66,0	49,3;80,3	86,0	77,3;92,3	63,8	49,7;76,3	70,9	62,9;78,1	76,7	54,8;91,5	75,5	55,7;89,6	79,8	70,7;87,1	Non
														Info-Santé[p, r]
-	;	4,5**	1,3;10,9	7,3**	1,9;18,3	9,5**	5,1;15,9	3,8**	0,1;18,6	3,2**	0,1;17,6	5,6**	2,0;12,3	Oui
100,0	;	95,5	89,1;98,7	92,7	81,7;98,1	90,5	84,1;94,9	96,2	81,4;99,9	96,8	82,4;99,9	94,4	87,7;98,0	Non
														CLSC[p]
10,9**	2,7;26,9	19,5*	12,4;28,5	12,5**	5,3;23,9	24,4	17,7;32,0	10,9**	2,1;29,8	18,0**	5,5;38,8	24,7*	16,0;35,2	Oui
89,1	73,1;97,3	80,5	71,5;87,6	87,5	76,1;94,7	75,6	68,0;82,3	89,1	70,2;97,9	82,0	61,2;94,5	75,3	64,8;84,0	Non
														Urgence d'un hôpital[p]
33,7*	18,2;52,3	28,1*	19,3;38,3	49,0	35,5;62,4	34,0	26,7;41,3	23,3**	8,7;44,8	32,5**	15,5;53,8	29,2*	20,5;39,2	Oui
66,3	47,7;81,8	71,9	61,7;80,7	51,0	37,6;64,5	66,0	58,7;73,3	76,7	55,2;91,3	67,5	46,2;84,5	70,8	60,8;79,5	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p]
16,8**	6,1;33,8	10,3**	4,9;18,5	16,5**	7,7;29,2	16,3*	10,9;23,0	25,7**	11,1;45,7	36,2**	19,0;56,5	9,1**	4,2;16,7	Oui
83,2	66,2;93,9	89,7	81,5;95,1	83,5	70,8;92,3	83,7	77,0;89,1	74,3	54,3;88,9	63,8	43,5;81,0	90,9	83,3;95,8	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
-	;	1,1**	0,0;6,1	6,0**	1,1;17,2	2,8**	0,8;7,0	5,1**	0,1;26,4	3,5**	0,1;19,0	0,8**	0,0;4,5	Oui
100,0	;	98,9	93,9;100,0	94,0	82,8;98,9	97,2	93,0;99,2	94,9	73,6;99,9	96,5	81,0;99,9	99,2	95,5;100,0	Non
														Autre contact
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	3,6**	0,1;19,8	1,0**	0,0;5,5	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	96,4	80,2;99,9	99,0	94,5;100,0	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	63,8	59,1;68,6	53,7	37,1;69,7
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	13,9	10,8;17,5	16,7**	7,4;30,5
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	22,3	18,1;26,4	29,6*	16,0;46,5
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	50,2	45,2;55,1	42,6*	25,9;60,7
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	14,5	11,4;18,2	11,4**	3,2;26,5
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	35,3	30,5;40,1	46,0*	28,3;64,5
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	43,6	39,0;48,2	37,6*	23,7;53,3
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	21,2	17,5;24,9	22,5**	11,1;37,9
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	35,2	30,7;39,7	39,9*	24,9;56,4
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	38,9	34,1;43,8	40,1*	25,7;55,9
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	19,2	15,4;23,5	21,1**	10,1;36,3
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	41,9	36,8;47,0	38,8*	23,5;55,9
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	54,3	49,8;58,8	55,4	42,2;68,7
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	19,1	15,6;23,1	25,2*	14,1;39,3
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	26,6	22,6;30,6	19,3**	9,9;32,2
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	54,5	49,4;59,6	49,7*	34,2;65,3
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	22,1	17,9;26,2	23,6**	12,2;38,8
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	23,5	19,2;27,8	26,7**	14,0;43,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
60,0*	37,1;80,0	50,9	37,2;64,7	78,2	64,7;88,4	66,9	58,8;74,9	59,9*	34,5;81,9	76,4	52,2;92,3	61,7	48,2;74,1	Oui, tout à fait
26,0**	9,4;50,0	6,2**	1,3;16,8	12,4**	5,1;23,9	13,6*	8,3;20,5	30,2**	10,9;56,6	9,0**	0,9;30,8	12,0**	5,1;23,0	Oui, en partie
14,0**	3,1;35,3	42,9*	28,6;58,1	9,5**	3,0;21,0	19,5*	13,0;27,5	9,9**	1,2;31,8	14,6**	3,1;37,2	26,2*	15,5;39,5	Non
														La sexualité[p]
61,0*	36,9;81,6	75,0	64,5;83,7	48,2*	32,0;64,7	43,6	34,2;53,0	17,7**	3,4;45,0	30,6**	9,5;60,2	41,4*	28,0;54,7	Oui, tout à fait
26,2**	9,7;49,8	18,8*	11,1;28,7	11,1**	3,2;25,8	10,7**	5,7;17,8	12,8**	1,6;39,2	5,8**	0,1;30,1	18,0**	9,2;30,3	Oui, en partie
12,8**	2,8;32,8	6,3**	2,4;12,9	40,6*	26,0;56,5	45,8	36,0;55,5	69,5*	41,2;89,9	63,6*	35,0;86,5	40,6*	27,3;53,9	Non
														Les émotions[p]
46,2*	26,1;67,2	49,8	38,3;61,4	43,9*	28,8;60,0	45,2	36,4;54,1	48,8*	24,8;73,2	38,1**	18,0;61,7	38,4*	26,5;51,4	Oui, tout à fait
24,8**	9,0;47,8	14,4**	7,3;24,4	25,6**	13,8;40,8	20,8*	14,4;28,5	29,9**	12,0;54,0	20,9**	6,6;43,9	21,2*	12,5;32,3	Oui, en partie
29,0**	12,3;51,3	35,8*	24,8;48,0	30,4*	17,6;45,9	33,9	25,6;42,3	21,3**	6,2;45,8	41,0**	20,5;64,0	40,4	28,7;52,2	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
47,3**	23,0;72,6	55,1	44,0;66,2	38,6*	23,6;55,4	34,1	24,9;43,2	25,3**	4,9;59,7	35,1**	11,2;66,3	29,5*	18,0;43,2	Oui, tout à fait
11,0**	1,0;37,7	21,2*	12,3;32,8	19,6**	8,8;35,3	19,6*	12,9;27,7	14,4**	1,4;45,8	34,5**	10,8;65,7	14,8**	6,7;27,0	Oui, en partie
41,7**	18,4;68,2	23,7*	15,2;33,9	41,7*	27,2;57,5	46,4	36,9;55,8	60,3**	26,0;88,3	30,4**	8,2;62,6	55,7	42,2;69,2	Non
														Les besoins alimentaires[p]
53,2*	32,8;73,0	60,1	46,5;72,7	53,3	36,9;69,1	51,3	42,6;60,1	70,3	45,4;88,7	63,2*	40,0;82,7	46,7	34,7;58,8	Oui, tout à fait
19,4**	7,0;38,7	14,9**	6,7;27,2	27,5*	15,5;42,6	16,2*	10,5;23,4	10,1**	1,1;32,8	13,5**	2,5;36,4	21,7*	12,7;33,2	Oui, en partie
27,3**	11,4;49,1	25,0*	14,7;37,9	19,2**	8,8;34,0	32,5	24,5;40,5	19,6**	5,6;42,9	23,3**	8,0;46,4	31,6*	20,4;44,6	Non
														Les activités courantes[p]
73,1	48,7;90,3	60,7	47,3;73,0	50,2*	33,3;67,1	56,2	47,3;65,2	46,3**	22,4;71,5	59,4*	32,5;82,7	47,0	34,6;59,4	Oui, tout à fait
8,4**	0,8;29,4	17,9**	9,3;29,6	28,2**	14,9;45,0	22,0*	15,0;30,3	21,7**	4,9;50,9	16,5**	3,0;43,6	26,9*	16,6;39,3	Oui, en partie
18,5**	4,7;42,5	21,4**	11,7;34,2	21,6**	9,7;38,4	21,8*	15,0;29,9	32,0**	11,3;59,6	24,1**	6,8;51,4	26,1*	15,7;38,9	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	88,6	85,8;91,1	89,2	78,3;95,8
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	9,9	7,6;12,7	10,8**	4,2;21,7
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	1,4**	0,6;2,8	-	;
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	71,4	67,5;75,4	71,5	58,7;82,2
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	23,0	19,4;26,7	20,3*	11,3;32,2
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	4,3*	2,7;6,4	5,3**	0,9;16,2
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	1,3**	0,5;2,6	2,9**	0,4;9,8
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	59,3	55,1;63,6	69,8	56,2;81,3
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	13,9	11,2;17,1	7,1**	2,4;15,8
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	26,7	23,0;30,5	23,0*	13,0;35,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
82,9	66,3;93,6	90,1	82,2;95,2	90,8	79,3;97,1	88,3	81,9;93,1	100,0	;	83,5	61,5;95,8	87,1	78,4;93,2	Oui, tout à fait
17,1**	6,4;33,7	7,8**	3,3;15,2	9,2**	2,9;20,7	9,0**	4,8;15,0	-	;	16,5**	4,2;38,5	11,1**	5,5;19,3	Oui, en partie
-	;	2,1**	0,2;7,7	-	;	2,7**	0,7;7,0	-	;	-	;	1,8**	0,2;6,7	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
81,5	61,6;93,9	70,8	60,0;80,1	76,5	61,8;87,7	67,6	60,3;74,9	64,0*	42,4;82,0	77,9	56,4;92,1	71,7	61,3;80,6	Toujours
18,5**	6,1;38,4	22,5*	13,8;33,3	21,6**	11,0;36,0	26,4	20,0;33,7	27,9**	12,4;48,5	18,6**	5,7;39,9	22,7*	14,7;32,4	La plupart du temps
-	;	5,5**	1,9;12,3	1,8**	0,0;10,0	3,9**	1,5;8,2	4,2**	0,1;22,1	3,5**	0,1;18,7	5,7**	2,0;12,2	À l'occasion
-	;	1,2**	0,0;6,2	-	;	2,1**	0,4;5,9	4,0**	0,1;21,8	-	;	-	;	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
67,1	47,3;83,2	62,2	50,5;72,9	50,1	35,5;64,8	55,8	47,9;63,7	54,8*	33,3;75,0	64,1*	42,3;82,3	56,9	46,3;67,6	Oui, tout à fait
6,8**	0,8;23,1	15,2**	8,2;24,9	13,0**	5,3;25,1	15,9*	10,6;22,4	11,1**	2,3;29,4	24,2**	9,0;46,3	15,5*	8,8;24,6	Oui, en partie
26,2**	12,0;45,2	22,6*	13,9;33,5	36,9*	23,3;52,2	28,3	21,4;36,2	34,1**	15,8;56,8	11,7**	2,4;31,2	27,6*	18,4;38,4	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	84,7	81,4;87,6	85,8	74,7;93,4
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	7,9	5,8;10,6	9,3**	3,1;20,3
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	7,4*	5,3;10,0	4,9**	1,0;13,6
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	87,7	84,2;90,7	89,2	79,6;95,3
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	10,5	7,8;13,9	9,6**	3,8;19,1
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	1,7**	0,7;3,4	1,2**	0,0;6,4
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	87,3	82,7;91,0	84,6	69,4;94,1
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	6,1*	3,5;9,8	7,4**	1,6;20,0
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	6,6*	3,9;10,4	8,0**	1,6;21,7
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	73,1	68,2;78,1	83,6	57,7;96,8
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	16,2	12,1;21,0	16,4**	3,2;42,3
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	10,7*	7,5;14,5	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
82,4	64,0;93,8	84,5	75,5;91,1	80,5	67,7;89,8	86,2	79,5;91,4	88,1	67,3;97,9	86,1	68,3;96,0	83,6	74,6;90,3	Aucun report
6,2**	0,7;21,3	5,9**	1,9;13,3	10,8**	4,0;22,2	8,9**	4,7;15,2	3,4**	0,1;18,9	-	;	9,6**	4,8;16,7	Un report
11,4**	3,0;27,4	9,6**	4,7;17,0	8,8**	2,9;19,1	4,9**	2,2;9,3	8,5**	1,0;28,1	13,9**	4,0;31,7	6,8**	2,7;13,8	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
93,6	77,7;99,3	82,3	70,3;91,0	94,2	68,3;99,9	90,7	84,5;94,9	81,0	53,6;96,0	80,2	56,6;94,3	85,8	76,3;92,5	Aucun report
6,4**	0,7;22,3	16,0**	7,8;27,7	5,8**	0,1;31,7	7,3**	3,5;13,2	19,0**	4,0;46,4	19,8**	5,7;43,4	11,0**	5,2;19,9	Un report
-	;	1,7**	0,0;9,5	-	;	2,0**	0,4;5,9	-	;	-	;	3,2**	0,7;8,9	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
85,7	56,1;98,4	100,0	;	81,4	68,9;90,5	91,7	84,2;96,4	100,0	;	78,7	47,0;96,1	90,3	74,5;97,9	Aucun report
-	;	-	;	12,9**	5,5;24,4	3,6**	0,8;9,8	-	;	7,6**	0,2;35,7	2,9**	0,1;15,2	Un report
14,3**	1,6;43,9	-	;	5,7**	1,1;15,9	4,7**	1,5;11,0	-	;	13,7**	1,6;42,2	6,8**	0,9;21,8	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
73,3*	37,5;95,0	57,6	44,0;71,1	69,7*	40,9;90,2	78,2	70,0;85,0	83,5	56,4;97,0	65,2*	33,0;89,5	69,5	46,6;87,0	Aucun report
17,8**	1,8;53,6	17,8**	8,1;31,9	19,6**	4,1;47,7	15,3*	9,4;23,1	11,0**	1,0;37,1	18,1**	2,0;53,1	16,9**	4,6;38,8	Un report
8,9**	0,2;40,5	24,6*	13,9;38,3	10,7**	1,1;35,2	6,5**	3,0;11,9	5,5**	0,1;26,8	16,7**	1,9;49,5	13,5**	2,9;34,7	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	7,0*	4,9;9,6	3,3**	0,4;11,0
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	8,9	6,7;11,6	6,4**	2,0;15,0
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	84,1	80,7;87,1	90,3	80,2;96,3
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	25,2	21,6;28,8	37,0*	25,1;50,2
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	13,3	10,6;16,4	12,2**	5,4;22,5
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	61,5	57,5;65,5	50,8	38,4;63,2
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	48,4	44,4;52,5	42,1	30,8;53,4
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	3,6*	2,3;5,4	2,7**	0,3;10,0
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	48,0	43,9;52,0	55,2	44,1;66,4
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	12,2	9,8;14,7	7,4**	2,8;15,4
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	9,5	7,4;12,1	7,4**	2,3;16,9
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	78,2	75,1;81,4	85,2	74,6;92,5
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	10,5	7,9;13,5	11,1**	4,0;23,1
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	6,9*	5,0;9,4	3,8**	0,8;10,9
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	82,6	79,0;85,8	85,1	72,5;93,5
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	36,1	32,3;39,8	39,1	27,6;51,5
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	6,4*	4,5;8,8	4,2**	0,8;12,4
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	57,5	53,5;61,6	56,7	44,7;68,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
2,5**	0,0;14,0	5,7**	1,9;12,7	5,6**	1,1;15,5	10,8*	6,3;17,1	11,4**	2,1;31,2	11,3**	2,1;31,2	5,0**	1,7;11,2	Oui
3,1**	0,1;17,1	7,8**	3,3;15,2	13,0**	5,5;24,7	11,9*	7,1;18,5	-	;	20,2**	7,0;40,9	6,1**	2,0;13,8	Non, mais il aurait souhaité le consulter
94,4	80,5;99,4	86,5	77,5;92,9	81,5	68,8;90,6	77,2	69,7;83,7	88,6	68,8;97,9	68,5	47,1;85,4	88,9	80,2;94,7	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
39,7*	23,8;57,4	16,3*	9,5;25,3	24,8*	14,2;38,2	14,2*	9,0;20,8	46,0*	26,8;66,1	41,6*	23,0;62,2	25,9*	17,7;35,7	Oui
14,9**	5,0;31,4	6,8**	2,7;13,6	20,9**	10,6;35,0	21,7*	15,6;28,9	11,9**	2,4;31,7	6,8**	0,9;22,4	5,0**	1,4;11,9	Non, mais il aurait souhaité le consulter
45,4*	28,3;63,3	76,9	67,1;85,0	54,3	40,5;68,0	64,1	56,8;71,4	42,1*	23,1;63,0	51,5*	31,2;71,5	69,1	59,7;78,5	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
46,9*	29,1;65,3	28,0*	18,9;38,6	70,3	56,0;82,2	54,8	46,9;62,7	44,9*	25,3;65,9	58,4*	37,7;77,2	47,4	37,7;57,1	Oui
-	;	7,6**	3,2;15,0	1,7**	0,0;9,9	5,1**	2,1;10,0	4,0**	0,1;19,0	-	;	1,9**	0,2;6,6	Non, mais il aurait souhaité le consulter
53,1*	34,7;70,9	64,4	54,7;74,1	27,9*	16,1;42,5	40,1	32,3;48,0	51,1*	30,4;71,5	41,6*	22,8;62,3	50,7	40,8;60,6	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
7,6**	1,4;21,7	4,6**	1,3;11,2	5,3**	1,1;14,7	22,7	16,7;29,6	10,2**	2,0;27,4	3,6**	0,1;18,1	14,7*	8,6;23,0	Oui
3,0**	0,1;16,8	8,6**	3,6;16,6	17,2**	8,4;29,6	10,1*	5,8;16,0	18,8**	6,3;38,8	9,6**	1,8;26,8	6,8**	2,6;14,0	Non, mais il aurait souhaité le consulter
89,3	74,3;97,2	86,8	77,8;93,2	77,5	64,1;87,8	67,3	60,1;74,5	71,1	50,6;86,7	86,8	68,0;96,7	78,5	69,2;86,0	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
2,4**	0,1;12,4	2,3**	0,2;8,6	8,5**	2,7;19,0	13,7*	8,4;20,5	11,4**	2,5;29,5	15,0**	3,8;35,6	14,1**	7,8;22,8	Oui
3,0**	0,1;16,8	7,8**	3,2;15,4	18,4**	9,1;31,5	7,6**	4,0;13,0	4,0**	0,1;19,0	3,5**	0,0;20,2	4,6**	1,4;11,1	Non, mais il aurait souhaité le consulter
94,6	81,2;99,4	89,8	81,3;95,4	73,1	59,0;84,4	78,7	71,1;85,1	84,6	65,9;95,4	81,5	61,7;93,8	81,2	71,9;88,5	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
34,6*	19,1;52,8	25,1*	17,1;34,4	24,9*	14,4;38,2	53,3	45,6;61,1	9,8**	1,8;27,5	34,3*	18,8;52,8	31,3	22,2;40,4	Oui
11,7**	3,1;27,9	3,3**	0,7;9,1	5,2**	1,1;14,5	6,4**	3,2;11,3	7,9**	1,1;25,2	17,4**	5,4;37,6	5,8**	1,9;13,2	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
53,8*	35,3;71,5	71,7	62,1;80,0	69,9	55,8;81,7	40,2	32,7;47,8	82,2	61,8;94,5	48,2*	29,9;66,9	62,9	53,6;72,2	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	10,5	8,1;13,3	9,1**	3,6;18,3
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	11,0	8,5;13,5	10,3**	4,4;19,5
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	78,5	75,2;81,9	80,6	69,8;88,8
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	8,9	6,8;11,3	3,8**	0,3;14,3
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	8,6	6,4;11,3	3,7**	0,7;10,8
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	82,5	79,5;85,5	92,5	82,3;97,8
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	8,8	6,5;11,5	4,6**	0,9;13,3
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	10,8	8,4;13,3	9,3**	3,8;18,4
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	80,4	76,8;83,6	86,0	75,6;93,2
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	4,0*	2,6;5,9	4,9**	1,3;12,1
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	1,9**	0,9;3,3	-	;
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	94,1	91,8;96,0	95,1	87,9;98,7
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	6,9*	4,9;9,5	8,4**	2,6;19,1
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	12,9	10,3;15,6	6,5**	2,1;14,8
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	80,1	76,6;83,3	85,1	74,0;92,8
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	7,7	5,6;10,3	11,7**	4,6;23,5
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	5,5*	3,8;7,6	5,7**	1,5;14,4
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	86,8	83,7;89,5	82,5	70,0;91,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
10,0**	2,5;25,0	2,1**	0,2;7,5	12,4**	4,9;24,4	19,3*	13,5;26,4	14,2**	3,2;35,6	-	;	6,7**	2,7;13,4	Oui
5,5**	0,7;18,3	4,4**	1,0;11,5	15,9**	6,9;29,3	16,0*	10,6;22,8	11,4**	2,5;29,4	10,0**	2,1;26,3	9,2**	4,4;16,6	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
84,5	67,9;94,6	93,6	85,6;97,9	71,8	56,4;84,2	64,6	57,1;72,2	74,4	52,9;89,7	90,0	73,7;97,9	84,1	75,5;90,6	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
6,0**	0,6;21,4	8,9**	3,7;17,3	5,3**	1,2;14,3	18,2*	13,0;24,4	-	;	6,6**	0,7;23,2	4,7**	1,3;11,4	Oui
3,0**	0,0;17,5	6,6**	2,3;14,2	19,5**	10,0;32,6	10,3*	5,9;16,3	8,1**	0,9;27,3	9,8**	1,8;27,6	7,3**	2,9;14,7	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
90,9	74,4;98,3	84,5	75,4;91,2	75,2	61,9;85,8	71,5	64,1;78,1	91,9	72,7;99,1	83,6	64,4;94,9	88,0	79,4;93,9	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
5,2**	0,6;17,6	4,4**	1,1;11,7	7,6**	2,1;18,4	13,3*	8,2;20,0	7,0**	0,9;23,1	27,4**	12,6;47,1	5,7**	1,9;12,8	Oui
10,4**	2,9;24,5	8,5**	3,6;16,3	18,9**	10,1;30,7	12,1*	7,6;17,8	14,9**	4,3;33,5	7,1**	0,7;24,7	8,2**	3,8;15,1	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
84,4	68,7;94,2	87,1	78,1;93,4	73,5	60,1;84,3	74,7	67,1;81,3	78,2	59,3;91,1	65,6	45,4;82,3	86,0	76,8;92,6	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
-	;	4,2**	1,0;11,2	-	;	7,8**	4,4;12,7	-	;	5,0**	0,1;24,7	1,9**	0,2;6,9	Oui
2,7**	0,1;14,0	2,1**	0,3;7,3	-	;	3,7**	1,4;7,7	-	;	3,5**	0,0;20,2	0,9**	0,0;5,0	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
97,3	86,0;99,9	93,7	86,6;97,7	100,0	;	88,5	82,5;93,0	100,0	;	91,5	70,9;99,1	97,2	91,8;99,4	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
17,2**	5,8;35,8	1,2**	0,0;6,7	5,4**	1,1;15,4	7,0**	3,3;12,8	3,5**	0,1;17,3	14,1**	3,1;35,7	6,7**	2,6;13,9	Oui
14,1**	4,5;30,7	4,2**	1,0;11,0	12,7**	5,0;25,2	23,9	17,6;31,2	10,9**	1,9;30,5	23,8**	9,9;43,3	6,1**	2,5;12,1	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
68,7	49,3;84,2	94,6	87,0;98,4	81,9	69,2;90,9	69,0	61,7;76,4	85,6	66,3;96,2	62,1	42,7;79,1	87,2	79,0;93,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
5,4**	0,2;25,3	3,7**	0,8;10,4	5,9**	1,3;16,3	5,4**	2,4;10,4	6,3**	0,6;22,5	20,0**	7,6;39,0	10,2**	4,9;18,1	Oui
11,6**	3,4;26,6	2,1**	0,2;7,8	8,7**	2,8;19,6	5,8**	2,9;10,1	7,9**	1,1;25,2	9,8**	1,8;27,6	2,2**	0,2;8,5	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
83,0	63,7;94,6	94,1	86,8;98,1	85,4	73,8;93,2	88,8	83,1;93,1	85,8	67,1;96,1	70,1	50,1;85,8	87,6	79,1;93,5	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	5,1*	3,4;7,3	3,4**	0,5;11,0
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	94,9	92,7;96,6	96,6	89,0;99,5
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	27,7**	11,4;50,0	33,5**	0,3;94,9
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	72,3	50,0;88,6	66,5**	5,1;99,7
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	24,6**	9,5;46,1	-	;
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	75,4	53,9;90,5	100,0	;
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	25,2**	10,1;46,5	-	;
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	74,8	53,5;89,9	100,0	;
Travailleur social[r]													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	10,7**	1,9;29,9	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	89,3	70,1;98,1	100,0	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	35,9**	18,1;57,1	-	;
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	64,1	42,9;81,9	100,0	;
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	10,6**	2,1;28,6	-	;
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	89,4	71,4;97,9	100,0	;
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	39,7*	22,0;59,6	33,5**	0,2;95,3
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	60,3*	40,4;78,0	66,5**	4,7;99,8
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	40,3*	22,0;60,8	-	;
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	59,7*	39,2;78,0	100,0	;
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	8,3**	1,1;26,4	-	;
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	91,7	73,6;98,9	100,0	;
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	..	;	..	;
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	..	;	..	;
Autres services ou ressources[r]													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	10,5**	1,9;29,2	33,0**	0,4;93,4
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	89,5	70,8;98,1	67,0**	6,6;99,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]
-	;	1,2**	0,0;7,0	3,5**	0,3;12,8	8,9**	4,9;14,6	12,5**	2,5;32,9	6,6**	0,6;23,5	4,5**	1,5;9,9	Oui
100,0	;	98,8	93,0;100,0	96,5	87,2;99,7	91,1	85,4;95,1	87,5	67,1;97,5	93,4	76,5;99,4	95,5	90,1;98,5	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	-	;	51,0**	1,0;99,2	34,7**	10,2;67,3	-	;	51,2**	0,7;99,4	-	;	Oui
-	;	100,0	;	49,0**	0,8;99,0	65,3*	32,7;89,8	100,0	;	48,8**	0,6;99,3	100,0	;	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	-	;	51,0**	1,0;99,2	34,3**	10,1;66,7	51,3**	0,9;99,3	-	;	-	;	Oui
-	;	100,0	;	49,0**	0,8;99,0	65,7*	33,3;89,9	48,7**	0,7;99,1	100,0	;	100,0	;	Non
														Psychologue
-	;	-	;	51,0**	1,0;99,2	21,8**	3,6;55,7	51,3**	0,9;99,3	51,2**	0,7;99,4	20,5**	0,1;84,0	Oui
-	;	100,0	;	49,0**	0,8;99,0	78,2*	44,3;96,4	48,7**	0,7;99,1	48,8**	0,6;99,3	79,5**	16,0;99,9	Non
														Travailleur social[r]
-	;	-	;	51,0**	1,0;99,2	6,9**	0,2;33,0	-	;	51,2**	0,7;99,4	-	;	Oui
-	;	100,0	;	49,0**	0,8;99,0	93,1	67,0;99,8	100,0	;	48,8**	0,6;99,3	100,0	;	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
-	;	-	;	51,0**	1,0;99,2	43,2**	16,2;73,6	51,3**	0,9;99,3	-	;	45,3**	2,3;95,5	Oui
-	;	100,0	;	49,0**	0,8;99,0	56,8**	26,4;83,8	48,7**	0,7;99,1	100,0	;	54,7**	4,5;97,7	Non
														Médicaments
-	;	-	;	100,0	;	-	;	-	;	51,2**	0,7;99,4	-	;	Oui
-	;	100,0	;	-	;	100,0	;	100,0	;	48,8**	0,6;99,3	100,0	;	Non
														Services de transport
-	;	100,0	;	51,0**	1,0;99,2	49,3**	22,3;76,7	-	;	-	;	30,0**	0,4;90,9	Oui
-	;	-	;	49,0**	0,8;99,0	50,7**	23,3;77,7	100,0	;	100,0	;	70,0**	9,1;99,6	Non
														Services d'aide à domicile
-	;	-	;	51,0**	1,0;99,2	34,4**	12,1;63,4	100,0	;	51,2**	0,7;99,4	54,7**	4,5;97,7	Oui
-	;	100,0	;	49,0**	0,8;99,0	65,6*	36,6;87,9	-	;	48,8**	0,6;99,3	45,3**	2,3;95,5	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
-	;	-	;	-	;	7,6**	0,2;35,6	-	;	-	;	30,0**	0,4;90,9	Oui
-	;	100,0	;	100,0	;	92,4	64,4;99,8	100,0	;	100,0	;	70,0**	9,1;99,6	Non
														Soins infirmiers à domicile
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Oui
..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	..	;	Non
														Autres services ou ressources[r]
-	;	-	;	-	;	7,7**	0,2;36,6	-	;	48,8**	0,6;99,3	-	;	Oui
-	;	100,0	;	100,0	;	92,3	63,4;99,8	100,0	;	51,2**	0,7;99,4	100,0	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	97,6	95,8;98,8	97,4	86,2;99,9
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	2,4**	1,2;4,2	2,6**	0,1;13,8
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	53,4	49,4;57,5	47,1	33,8;60,3
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	4,4*	2,7;6,8	15,8**	6,8;29,2
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	26,6	22,9;30,3	27,5*	16,5;40,9
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	15,5	12,7;18,7	9,7**	3,7;19,8
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	45,5	41,5;49,5	38,1*	26,5;50,7
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	10,7	8,2;13,5	24,3*	14,2;37,1
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	26,8	23,1;30,5	24,6*	13,7;38,4
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	17,0	14,0;20,3	13,1**	6,4;22,9
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	5,1*	3,3;7,5	16,5**	8,3;28,1
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	4,9*	3,3;7,1	12,1**	5,3;22,7
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	20,3	16,9;23,7	15,3**	7,4;26,6
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	12,1	9,5;15,2	8,8**	3,2;18,5
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	50,1	45,8;54,5	37,4*	25,4;50,7
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	7,4*	5,2;10,2	9,8**	3,3;21,3
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	0,6**	0,1;1,8	3,4**	0,3;12,6
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	9,0	6,7;11,9	8,8**	3,3;18,3
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	90,4	87,4;92,9	87,8	76,9;94,8
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	88,0	84,9;90,7	89,2	78,3;95,8
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	11,0	8,4;14,1	10,8**	4,2;21,7
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	0,9**	0,3;2,1	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
100,0	;	98,9	93,8;100,0	100,0	;	96,7	92,2;99,0	100,0	;	100,0	;	95,0	88,7;98,4	Oui
-	;	1,1**	0,0;6,2	-	;	3,3**	1,0;7,8	-	;	-	;	5,0**	1,6;11,3	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
52,0*	33,7;70,0	55,2	45,5;64,8	78,9	65,3;89,1	56,0	48,0;64,1	42,4**	21,6;65,5	33,7**	17,1;53,8	48,8	38,9;58,8	Médecin spécialiste du cancer
3,1**	0,1;16,3	1,2**	0,0;6,7	-	;	5,6**	2,3;11,2	-	;	3,4**	0,1;18,6	2,2**	0,2;8,3	Médecin de famille
34,2*	18,3;53,2	30,9	22,4;39,4	-	;	20,7*	14,4;28,2	34,8**	16,0;57,9	33,5**	16,9;53,8	37,0	27,1;47,0	Autre médecin spécialiste
10,7**	2,7;26,2	12,8**	6,9;21,1	21,1**	10,9;34,7	17,7*	11,9;25,0	22,8**	8,9;43,1	29,4**	14,4;48,6	11,9**	6,0;20,4	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
44,7*	27,7;62,5	44,4	34,5;54,3	74,5	60,1;85,8	47,8	40,1;55,5	39,4**	19,5;62,2	30,1**	14,2;50,5	40,4	30,2;50,6	Médecin spécialiste du cancer
3,7**	0,1;20,0	10,5**	5,2;18,5	9,5**	3,1;21,0	9,0**	5,1;14,6	7,8**	0,9;25,6	10,2**	2,1;27,4	7,6**	3,1;15,0	Médecin de famille
29,7**	14,9;48,6	33,0	23,9;42,1	-	;	24,6	18,1;32,0	41,9**	21,4;64,6	28,8**	13,3;49,2	34,0	24,5;43,6	Autre médecin spécialiste
21,9**	9,5;39,7	12,1**	6,4;20,2	16,0**	6,9;29,7	18,5*	12,5;26,0	10,9**	1,9;30,7	30,8**	15,7;49,7	17,9*	11,2;26,6	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
9,0**	1,1;28,8	2,4**	0,3;8,3	1,9**	0,0;10,6	0,9**	0,0;4,4	3,8**	0,1;19,8	3,4**	0,1;18,6	6,8**	2,7;13,9	Au besoin
8,9**	1,6;25,3	2,1**	0,2;7,8	5,5**	1,2;15,1	2,0**	0,4;5,8	4,1**	0,1;22,3	3,6**	0,1;18,1	5,6**	2,0;12,0	À tous les mois
17,5**	6,4;34,9	11,2**	5,4;20,0	33,6*	20,2;49,2	19,7*	13,3;27,4	11,6**	2,5;30,3	22,8**	9,3;42,5	28,1*	19,3;38,4	À tous les 2 ou 3 mois
8,1**	1,8;21,5	12,9**	6,9;21,5	22,6**	11,7;37,2	11,5*	6,8;17,9	22,3**	8,5;42,7	22,1**	8,6;42,1	5,4**	1,5;13,2	À tous les 4 mois
43,7*	26,1;62,5	64,1	54,1;74,1	36,4*	22,3;52,4	54,6	46,3;62,8	48,8*	28,0;69,9	48,0*	29,6;66,8	50,3	40,0;60,6	À tous les 6 mois
12,9**	3,5;30,0	7,2**	3,1;14,0	-	;	11,4*	6,7;17,8	9,4**	1,0;31,6	-	;	3,8**	0,7;11,1	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	-	;	1,9**	0,1;9,7	-	;	-	;	-	;	-	;	Trop long
19,0**	6,9;37,9	7,7**	3,4;14,6	11,3**	4,2;23,2	8,1**	4,1;14,0	4,2**	0,1;21,1	3,6**	0,1;18,1	10,1**	4,8;18,0	Trop court
81,0	62,1;93,1	92,3	85,4;96,6	86,8	75,0;94,4	91,9	86,0;95,9	95,8	78,9;99,9	96,4	81,9;99,9	89,9	82,0;95,2	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
89,8	70,9;98,3	87,5	78,6;93,6	86,6	72,8;95,0	84,5	77,0;90,3	90,9	70,7;98,9	93,1	77,7;99,1	90,7	82,8;95,8	Tout à fait capable
6,6**	0,5;24,6	12,5**	6,4;21,4	11,5**	3,9;24,8	14,8*	9,1;22,2	9,1**	1,1;29,3	3,5**	0,1;17,1	8,4**	3,6;16,2	En partie capable
3,6**	0,1;18,9	-	;	1,9**	0,0;10,8	0,7**	0,0;3,8	-	;	3,4**	0,1;17,4	0,9**	0,0;4,5	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	51,8	47,6;56,1	43,6	31,3;56,0
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	21,7	18,1;25,3	25,5*	14,9;38,9
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	26,5	22,5;30,4	30,8*	19,3;44,4
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	47,8	39,3;56,2	55,3**	23,2;84,4
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	52,2	43,8;60,7	44,7**	15,6;76,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
34,3*	18,3;53,4	60,8	50,5;71,2	55,7	40,7;70,0	52,2	43,6;60,8	24,6**	10,2;44,8	66,1	46,8;82,1	55,7	45,3;66,1	Oui, tout à fait
31,8**	16,0;51,4	19,6*	12,0;29,2	21,1**	11,0;34,6	16,9*	11,3;23,9	33,8**	15,6;56,3	16,0**	5,3;33,8	23,3*	15,2;33,1	oui, en partie
33,9**	16,6;55,1	19,6*	12,0;29,2	23,2**	12,2;37,8	30,9	23,2;38,5	41,6*	22,3;63,1	17,9**	6,2;36,6	21,1*	13,0;31,2	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
54,5**	13,2;91,4	40,1**	17,2;66,7	12,9**	1,4;41,3	52,3	36,9;67,3	44,2**	15,6;76,0	79,4**	22,2;99,7	56,2*	31,4;78,9	Oui
45,5**	8,6;86,8	59,9*	33,3;82,8	87,1	58,7;98,6	47,7*	32,7;63,1	55,8**	24,0;84,4	20,6**	0,3;77,8	43,8**	21,1;68,6	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	25,2	21,8;28,6	27,7*	17,8;39,4
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	49,2	45,3;53,2	53,2	40,9;65,5
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	25,6	22,1;29,1	19,1**	10,6;30,6
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	24,6	21,1;28,0	16,9**	8,9;27,8
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	45,6	41,8;49,5	53,7	41,8;65,6
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	29,8	26,1;33,5	29,4*	19,6;41,0
Modification de l'alimentation[p]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	46,5	42,4;50,6	50,9	38,7;63,1
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	27,0	23,3;30,6	24,0*	14,8;35,4
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	26,5	22,8;30,3	25,1*	14,8;37,9
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	17,5	14,5;20,9	8,6**	3,4;17,3
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	7,5	5,5;9,8	6,7**	2,2;15,0
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	75,0	71,6;78,4	84,7	74,2;92,1
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	1,0**	0,4;2,2	-	;
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	2,2**	1,1;3,8	5,0**	1,0;13,9
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	96,8	94,9;98,2	95,0	86,1;99,0
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	8,5	6,3;11,0	1,1**	0,0;7,1
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	10,2	7,9;13,0	10,6**	4,7;19,8
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	81,3	78,3;84,3	88,3	79,1;94,5
Gestion du stress[p]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	36,3	32,4;40,2	28,9*	18,5;41,2
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	27,0	23,3;30,7	29,1*	18,1;42,3
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	36,7	32,9;40,5	42,0	29,7;54,3

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p]
35,7*	19,9;54,3	21,8*	14,4;30,7	26,6*	15,5;40,3	28,3	21,4;36,1	15,1**	4,1;34,8	20,0**	7,8;38,3	21,9*	14,5;30,8	Oui
46,7*	29,4;64,6	39,7	29,9;49,5	52,3	39,0;65,6	48,1	40,2;55,9	74,2	53,3;89,3	60,8*	40,6;78,6	46,6	36,7;56,5	Non
17,6**	6,7;34,4	38,5	28,7;48,4	21,1**	11,1;34,4	23,6	17,2;31,0	10,7**	2,2;28,7	19,3**	7,1;38,2	31,5	22,9;40,1	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
39,0*	22,4;57,6	18,3*	11,3;27,2	26,6*	15,6;40,2	27,7	21,1;35,2	26,4**	11,0;47,5	30,5**	14,6;50,8	23,4*	16,0;32,2	Oui
42,1*	24,6;61,3	47,2	37,6;56,8	48,6	35,4;61,9	40,6	33,0;48,2	43,1*	24,0;63,9	53,2*	34,0;71,8	43,9	34,1;53,7	Non
18,9**	8,0;34,9	34,5	25,0;44,1	24,8*	14,0;38,5	31,7	24,5;38,8	30,5**	13,8;52,2	16,3**	5,7;33,6	32,7	23,4;42,0	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p]
58,4*	38,8;76,3	32,6	23,2;42,1	43,4*	29,8;56,9	51,8	44,0;59,6	56,9*	37,3;75,0	40,5*	21,9;61,3	45,1	35,6;54,6	Oui
21,5**	9,1;39,3	35,8	26,5;45,2	33,9*	21,6;47,9	21,7*	15,4;29,2	23,5**	9,2;44,2	29,7**	13,7;50,5	27,2*	18,9;36,8	Non
20,1**	8,0;38,1	31,5*	22,0;41,0	22,8**	12,3;36,6	26,5	19,9;34,0	19,7**	6,6;40,4	29,8**	14,4;49,4	27,8*	19,0;38,0	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
8,2**	1,6;22,8	14,3*	8,3;22,5	8,7**	2,5;20,5	21,4*	15,4;28,5	32,8**	16,1;53,5	54,8*	34,0;74,5	14,4**	8,0;23,1	Oui
9,0**	1,8;24,9	6,4**	2,3;13,6	12,5**	4,9;24,8	10,0*	5,9;15,6	8,1**	0,9;26,9	-	;	4,4**	1,5;9,8	Non
82,8	66,0;93,5	79,3	69,9;86,8	78,8	65,4;88,8	68,6	62,0;75,1	59,1*	38,6;77,5	45,2*	25,5;66,0	81,2	72,4;88,2	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	1,1**	0,0;5,9	3,5**	0,4;12,3	-	;	4,2**	0,1;19,8	3,2**	0,1;18,1	0,8**	0,0;4,6	Oui
2,4**	0,0;13,4	4,3**	1,2;10,7	3,4**	0,4;12,3	0,7**	0,0;3,9	-	;	-	;	0,9**	0,0;4,9	Non
97,6	86,6;100,0	94,6	87,5;98,3	93,0	82,2;98,3	99,3	96,1;100,0	95,8	80,2;99,9	96,8	81,9;99,9	98,3	94,0;99,8	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
5,8**	0,7;19,6	10,3**	4,8;18,5	3,7**	0,4;13,2	7,4**	3,9;12,4	19,3**	6,0;41,1	16,1**	5,0;35,1	11,9**	6,5;19,6	Oui
3,0**	0,1;15,4	20,0*	12,7;29,1	9,7**	3,6;20,0	7,4**	3,8;12,6	-	;	6,4**	0,6;22,5	11,6**	5,6;20,5	Non
91,2	76,1;98,2	69,7	60,5;78,9	86,6	75,6;93,9	85,2	79,0;90,2	80,7	58,9;94,0	77,5	58,0;90,9	76,5	66,8;84,5	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p]
29,6**	15,6;47,1	26,1*	17,3;36,6	36,8*	23,6;51,6	47,5	39,6;55,5	34,5**	17,0;55,7	33,8**	17,3;53,9	37,0	27,5;46,5	Oui
31,2**	16,2;49,9	27,1*	18,1;37,7	28,9*	16,9;43,5	26,8	19,7;34,8	36,8**	18,6;58,3	26,9**	11,8;47,2	21,5*	14,1;30,4	Non
39,1*	22,8;57,4	46,8	36,8;56,8	34,4*	22,0;48,4	25,7	19,0;33,4	28,7**	12,2;50,7	39,3*	21,6;59,3	41,5	31,9;51,2	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	41,4	37,3;45,5	31,0*	20,7;42,9
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	14,8	12,0;18,0	20,2*	11,3;32,0
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	43,8	39,7;47,9	48,8	37,3;60,2
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	1,2**	0,5;2,5	-	;
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	98,8	97,5;99,5	100,0	;
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	0,2**	0,0;0,9	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	99,8	99,1;100,0	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]
30,7**	15,9;49,0	31,3*	21,8;40,9	39,6*	26,7;53,7	56,4	49,0;63,8	38,6*	20,4;59,4	34,2**	17,6;54,1	42,8	33,4;52,1	Oui
17,3**	5,6;36,8	25,4*	17,2;35,1	9,5**	3,1;21,0	4,2**	1,9;8,1	20,2**	6,5;42,2	26,0**	11,5;45,6	14,6**	8,1;23,5	Non
52,0*	32,9;70,7	43,3	33,8;52,9	50,9	37,9;64,0	39,4	32,0;46,8	41,2**	21,0;63,9	39,9*	21,8;60,2	42,6	33,0;52,1	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
2,4**	0,1;11,9	2,0**	0,2;7,1	3,8**	0,4;13,5	-	;	-	;	-	;	2,0**	0,2;7,2	Oui
97,6	88,1;99,9	98,0	92,9;99,8	96,2	86,5;99,6	100,0	;	100,0	;	100,0	;	98,0	92,8;99,8	Non
														Autre
-	;	-	;	-	;	0,6**	0,0;3,3	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	99,4	96,7;100,0	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	41,5	34,0;49,0	42,4**	18,0;69,9
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	58,5	51,0;66,0	57,6*	30,1;82,0
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	79,9	74,9;84,9	90,0	73,3;98,0
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	20,1	15,1;25,1	10,0**	2,0;26,7
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	59,1	50,1;68,1	75,7*	39,7;96,0
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	40,9	31,9;49,9	24,3**	4,0;60,3
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	25,5*	16,9;35,8	40,5**	10,9;76,4
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	74,5	64,2;83,1	59,5**	23,6;89,1
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	17,5*	11,6;24,8	6,2**	0,1;33,1
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	82,5	75,2;88,4	93,8	66,9;99,9
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	49,7	43,1;56,3	51,7*	29,4;73,5
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	50,3	43,7;56,9	48,3*	26,5;70,6
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	61,8	55,7;67,9	59,3*	36,4;79,6
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	38,2	32,1;44,3	40,7**	20,4;63,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
48,0**	18,1;79,0	44,5**	22,2;68,5	35,4**	13,8;62,6	33,0*	20,3;47,9	48,4**	12,2;86,0	52,3**	10,7;91,5	52,8*	30,1;74,7	Oui
52,0**	21,0;81,9	55,5*	31,5;77,8	64,6*	37,4;86,2	67,0	52,1;79,7	51,6**	14,0;87,8	47,7**	8,5;89,3	47,2*	25,3;69,9	Non
														Soutien de la famille ou des amis
78,7	53,4;94,1	84,6	67,7;94,8	88,0	68,3;97,5	75,7	64,9;84,6	69,8*	38,9;91,4	84,0	51,2;98,3	77,1	62,8;87,9	Oui
21,3**	5,9;46,6	15,4**	5,2;32,3	12,0**	2,5;31,7	24,3*	15,4;35,1	30,2**	8,6;61,1	16,0**	1,7;48,8	22,9**	12,1;37,2	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
53,2**	12,6;90,7	71,1*	33,9;94,6	66,5**	25,2;94,4	56,6	41,1;71,3	53,7**	14,2;89,9	43,2**	8,6;83,8	56,3*	29,1;81,0	Oui
46,8**	9,3;87,4	28,9**	5,4;66,1	33,5**	5,6;74,8	43,4*	28,7;58,9	46,3**	10,1;85,8	56,8**	16,2;91,4	43,7**	19,0;70,9	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
46,5**	7,4;89,4	14,2**	0,0;70,4	38,9**	10,3;74,8	16,0**	6,7;30,2	-	;	-	;	40,6**	13,4;72,9	Oui
53,5**	10,6;92,6	85,8*	29,6;100,0	61,1**	25,2;89,7	84,0	69,8;93,3	100,0	;	100,0	;	59,4**	27,1;86,6	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
23,3**	3,7;59,0	26,3**	6,4;57,6	27,2**	9,4;52,9	19,8**	10,5;32,2	-	;	20,2**	0,2;77,6	5,4**	0,1;28,4	Oui
76,7*	41,0;96,3	73,7*	42,4;93,6	72,8	47,1;90,6	80,2	67,8;89,5	100,0	;	79,8**	22,4;99,8	94,6	71,6;99,9	Non
														Exemple de l'entourage[p]
46,5**	22,2;72,0	65,4*	34,7;88,8	45,6*	25,1;67,2	42,5	31,3;53,6	64,6*	30,2;90,4	70,0*	31,7;94,5	51,2*	31,9;70,2	Oui
53,5*	28,0;77,8	34,6**	11,2;65,3	54,4*	32,8;74,9	57,5	46,4;68,7	35,4**	9,6;69,8	30,0**	5,5;68,3	48,8*	29,8;68,1	Non
														Prière ou soutien spirituel[p]
61,8*	36,7;83,0	55,8*	34,8;75,4	58,5*	38,4;76,8	59,6	49,7;69,6	86,1	56,9;98,5	88,0	49,4;99,7	58,2*	39,4;75,4	Oui
38,2**	17,0;63,3	44,2*	24,6;65,2	41,5*	23,2;61,6	40,4	30,4;50,3	13,9**	1,5;43,1	12,0**	0,3;50,6	41,8*	24,6;60,6	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Laval et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			13,3	10,6;16,4
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	0,7**	0,2;1,7	1,2**	0,0;6,1
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	2,4**	1,3;4,1	1,2**	0,0;6,2
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	11,5	8,9;14,5	6,3**	1,7;15,4
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	33,8	29,8;37,9	35,9*	23,7;49,5
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	51,6	47,5;55,8	55,4	43,0;67,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,9*	4,2;8,1	15,8	13,5;18,0	9,2	7,0;11,7	26,2	23,5;28,8	4,5*	3,0;6,4	5,1*	3,5;7,3	20,0	16,8;23,2	Ensemble des patients
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic
-	;	2,0**	0,2;7,3	-	;	-	;	-	;	-	;	0,9**	0,0;4,8	Mauvaise
-	;	3,3**	0,7;9,1	1,7**	0,0;9,8	3,1**	1,0;7,3	-	;	3,4**	0,1;18,9	2,9**	0,5;8,8	Passable
11,4**	3,0;27,5	14,7**	8,0;23,8	12,3**	5,1;23,6	11,8*	7,1;18,1	8,3**	0,9;27,3	11,7**	2,5;30,5	12,3**	6,6;20,4	Bonne
28,6**	14,3;46,9	33,1	23,4;42,9	37,2*	24,8;51,1	38,9	31,0;46,7	45,0*	24,2;67,2	19,4**	7,4;37,7	27,4*	19,1;37,1	Très bonne
60,0	41,0;77,1	46,9	36,7;57,2	48,8	35,3;62,2	46,2	38,3;54,1	46,7*	26,6;67,7	65,5	45,6;82,1	56,4	47,0;65,9	Excellente

Région 14

LANAUDIÈRE

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	46,3	45,1 ; 47,5
Femmes	53,9	53,7	52,5 ; 54,9
Âge			
18 à 49 ans	18,9	21,1	18,1 ; 24,2
50 à 59 ans	24,9	26,2	23,1 ; 29,4
60 à 69 ans	29,8	33,9	30,2 ; 37,6
70 ans et plus	26,5	18,7	16,2 ; 21,2
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	97,4	95,9 ; 98,5
Anglais	10,6	1,6**	0,8 ; 2,9
Autres	3,0	1,0**	0,4 ; 2,1
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	29,6	25,9 ; 33,3
Diplôme d'études secondaires	24,7	27,3	23,6 ; 31,0
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	28,3	24,7 ; 31,9
Diplôme d'études universitaires	20,6	14,8	12,0 ; 18,0
Occupation principale			
En emploi	29,3	27,1	23,9 ; 30,4
Étudiant	1,7	2,3**	1,3 ; 3,9
Retraité	55,8	54,8	51,5 ; 58,1
À la maison	7,2	7,7	5,9 ; 10,0
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	2,6*	1,5 ; 4,3
Congé de maternité / autres	3,6	5,4*	3,7 ; 7,6
Situation familiale			
Vit seul	24,1	20,3	16,9 ; 23,6
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	55,5	51,5 ; 59,5
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	17,2	14,4 ; 20,0
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	2,5**	1,4 ; 4,1
Autres	4,8	4,5*	3,0 ; 6,6
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	18,9	15,8 ; 22,3
Revenu suffisant	61,4	58,6	54,5 ; 62,7
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	22,6	18,9 ; 26,3
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	10,9	8,5 ; 13,4
2	21,1	22,3	18,9 ; 25,7
3	20,1	21,6	18,3 ; 25,0
4	19,4	25,3	21,8 ; 28,9
5 - très défavorisé	17,6	19,8	16,6 ; 23,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	11,0	8,6 ; 13,8	14,3*	10,3 ; 19,1	8,1*	5,4 ; 11,7
Génital féminin	5,5	...	10,2	5,3*	3,7 ; 7,2	...	;	9,8*	6,9 ; 13,4
Prostate	15,9	34,4	...	13,1	10,9 ; 15,3	28,3	23,6 ; 33,1	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	8,9	7,0 ; 11,1	13,0	9,8 ; 16,8	5,4*	3,4 ; 8,2
Sein	26,5	0,4**	48,8	29,2	26,7 ; 31,7	-	;	54,3	49,7 ; 58,9
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	6,2	4,5 ; 8,3	7,6*	4,9 ; 11,2	5,0*	3,0 ; 7,9
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	5,4*	3,8 ; 7,5	7,1*	4,3 ; 11,0	4,0**	2,1 ; 6,7
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	20,9	17,8 ; 23,9	29,6	24,5 ; 34,8	13,3	9,8 ; 17,5
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	86,1	83,0 ; 88,8	84,5	79,6 ; 88,7	87,5	83,3 ; 90,9
Récidive	7,4	7,5	7,3	8,6	6,4 ; 11,2	9,6*	6,3 ; 14,0	7,7*	5,0 ; 11,2
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	5,3*	3,6 ; 7,5	5,8*	3,5 ; 9,1	4,9**	2,7 ; 8,0
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	12,1	9,5 ; 15,1	16,1	11,7 ; 21,4	8,7*	5,9 ; 12,1
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	22,4	19,5 ; 25,4	5,2**	2,6 ; 9,1	37,1	32,3 ; 41,9
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	65,5	61,7 ; 69,3	78,7	73,4 ; 84,0	54,2	48,8 ; 59,6
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	37,3	33,4 ; 41,2	36,4	30,6 ; 42,1	38,1	32,8 ; 43,4
Non	58,8	56,6	60,7	62,7	58,8 ; 66,6	63,6	57,9 ; 69,4	61,9	56,6 ; 67,2
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	94,0	91,6 ; 95,9	92,4	88,3 ; 95,4	95,3	92,5 ; 97,3
Non	8,3	8,5	8,0	6,0*	4,1 ; 8,4	7,6*	4,6 ; 11,7	4,7*	2,7 ; 7,5
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	13,0	10,3 ; 15,6	14,7	10,7 ; 19,6	11,4	8,3 ; 15,2
Très bon	29,2	29,3	29,1	28,5	24,8 ; 32,2	26,4	21,1 ; 31,6	30,4	25,2 ; 35,6
Bon	34,9	34,2	35,5	33,2	29,5 ; 36,8	31,4	25,8 ; 36,9	34,7	29,7 ; 39,7
Moyen	18,8	17,8	19,6	17,9	14,8 ; 20,9	19,3	14,7 ; 24,7	16,6	12,6 ; 21,2
Mauvais	5,6	5,7	5,5	7,5	5,5 ; 9,9	8,2*	5,3 ; 12,0	6,8*	4,4 ; 10,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p]
11,0	8,6 ; 13,8	4,3**	1,5 ; 9,4	12,7*	8,2 ; 18,5	12,1*	8,3 ; 16,8	14,1**	7,1 ; 24,1	Colorectal
5,3*	3,7 ; 7,2	7,8**	3,9 ; 13,4	7,5**	4,1 ; 12,4	3,7**	1,7 ; 7,1	2,1**	0,2 ; 7,7	Génital féminin
13,1	10,9 ; 15,3	0,9**	0,0 ; 4,7	8,2**	4,6 ; 13,3	20,2	15,2 ; 25,1	21,0*	14,4 ; 28,9	Prostate
8,9	7,0 ; 11,1	18,2*	12,2 ; 25,4	8,3**	4,6 ; 13,5	6,3*	3,6 ; 10,2	4,1**	1,2 ; 9,9	Hématopoïétique
29,2	26,7 ; 31,7	39,1	31,5 ; 46,8	34,0	28,0 ; 40,0	25,1	20,3 ; 29,8	18,8*	11,9 ; 27,3	Sein
6,2	4,5 ; 8,3	6,6**	2,8 ; 12,8	7,8**	4,2 ; 13,0	5,5**	2,9 ; 9,2	5,1**	2,0 ; 10,5	ORL (Tête et cou)
5,4*	3,8 ; 7,5	3,2**	0,8 ; 8,1	2,8**	1,0 ; 6,1	9,3*	5,7 ; 14,1	4,6**	1,5 ; 10,5	Broncho-pulmonaire
20,9	17,8 ; 23,9	20,1*	13,1 ; 28,7	18,8*	13,2 ; 25,4	17,9	13,0 ; 23,6	30,3*	21,0 ; 39,5	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
86,1	83,0 ; 88,8	89,5	82,1 ; 94,6	88,2	82,1 ; 92,8	83,8	78,3 ; 88,3	83,5	73,5 ; 90,9	Premier cancer
8,6	6,4 ; 11,2	8,9**	4,3 ; 15,8	7,1**	3,7 ; 12,0	9,7*	6,0 ; 14,7	8,3**	3,7 ; 15,7	Récidive
5,3*	3,6 ; 7,5	1,6**	0,2 ; 5,9	4,7**	1,9 ; 9,4	6,5**	3,7 ; 10,6	8,2**	3,1 ; 16,9	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]
12,1	9,5 ; 15,1	11,8*	7,0 ; 18,2	13,6*	8,9 ; 19,6	9,9*	6,3 ; 14,7	14,2**	7,4 ; 23,8	Sous traitement
22,4	19,5 ; 25,4	29,4	21,9 ; 37,8	23,4	17,7 ; 29,0	18,2	13,7 ; 23,5	20,9*	12,9 ; 30,9	Sans traitement avec médication
65,5	61,7 ; 69,3	58,8	50,2 ; 67,5	63,0	55,8 ; 70,2	71,8	66,3 ; 77,4	64,9	53,3 ; 75,4	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p]
37,3	33,4 ; 41,2	32,1	23,8 ; 40,3	33,5	26,5 ; 40,6	38,1	31,6 ; 44,6	47,0	36,3 ; 57,8	Oui
62,7	58,8 ; 66,6	67,9	59,7 ; 76,2	66,5	59,4 ; 73,5	61,9	55,4 ; 68,4	53,0	42,2 ; 63,7	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p]
94,0	91,6 ; 95,9	90,0	82,9 ; 94,9	93,0	88,0 ; 96,4	96,4	92,9 ; 98,5	95,5	87,7 ; 99,0	Oui
6,0*	4,1 ; 8,4	10,0**	5,1 ; 17,1	7,0**	3,6 ; 12,0	3,6**	1,5 ; 7,1	4,5**	1,0 ; 12,3	Non
										Perception de l'état de santé[p]
13,0	10,3 ; 15,6	11,8**	6,6 ; 19,1	15,9*	11,0 ; 21,8	10,6*	6,6 ; 15,7	14,7**	7,7 ; 24,6	Excellent
28,5	24,8 ; 32,2	26,7*	19,1 ; 35,6	28,9	22,2 ; 36,4	33,1	27,1 ; 39,1	21,8*	13,5 ; 32,1	Très bon
33,2	29,5 ; 36,8	31,1	22,8 ; 39,4	33,0	26,1 ; 40,0	31,8	26,1 ; 37,6	38,0	27,2 ; 49,8	Bon
17,9	14,8 ; 20,9	16,1*	9,9 ; 24,1	13,8*	9,0 ; 19,9	19,4	14,5 ; 25,0	22,7*	13,8 ; 34,0	Moyen
7,5	5,5 ; 9,9	14,3*	8,5 ; 22,0	8,4**	4,7 ; 13,5	5,1**	2,6 ; 9,0	2,8**	0,6 ; 7,8	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	50,7	46,7;54,7	69,4	54,9;81,6
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	49,3	45,3;53,3	30,6*	18,4;45,1
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	36,0	29,7;42,4	30,7**	14,5;51,4
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	21,8	16,4;27,3	17,8**	6,2;36,3
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	23,0	17,3;28,7	20,6**	8,2;39,1
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	19,1	14,5;24,3	30,9**	15,8;49,6
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	34,0	28,9;39,0	39,8**	17,2;66,1
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	17,6	13,5;22,4	29,0**	10,3;54,9
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	16,7	12,7;21,4	4,5**	0,1;26,1
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	20,9	17,0;24,8	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	10,8*	7,1;15,5	26,7**	7,3;56,3
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	53,7	48,2;59,2	64,5	47,3;79,3
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	23,4	18,7;28,0	13,5**	4,6;28,6
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	16,4	12,6;20,9	17,4**	6,8;33,8
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	6,5*	4,0;9,9	4,6**	0,5;16,7
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	85,9	82,8;88,6	79,9	67,6;89,2
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	10,6	8,1;13,5	14,2**	6,2;26,3
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	3,5*	2,1;5,4	5,9**	1,3;16,1
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	14,2	11,5;17,3	7,5**	2,2;17,6
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	85,8	82,7;88,5	92,5	82,4;97,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
55,7	38,3;72,0	17,3**	9,6;27,8	66,7	52,7;78,7	47,6	40,5;54,8	57,7	40,6;73,6	22,1**	9,9;39,3	63,5	54,6;72,3	Oui
44,3*	28,0;61,7	82,7	72,2;90,4	33,3*	21,3;47,3	52,4	45,2;59,5	42,3*	26,4;59,4	77,9	60,7;90,1	36,5	27,7;45,4	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
17,1**	3,3;43,6	9,4**	0,1;46,7	35,7**	16,5;59,0	41,2	30,4;52,0	9,7**	1,1;31,8	28,0**	2,5;74,2	53,8	37,9;69,1	2 semaines et moins
13,4**	1,3;43,4	17,1**	0,4;64,8	26,9**	11,7;47,5	30,0*	19,2;42,7	33,1**	13,8;57,8	-	;	12,5**	5,0;24,7	Plus de 2 semaines à 1 mois
44,6**	19,6;71,8	18,6**	1,9;55,4	25,3**	9,5;48,0	18,9*	11,0;29,3	32,4**	13,9;56,2	14,7**	0,2;62,4	21,1**	10,0;36,5	Plus d'un mois à 3 mois
24,9**	7,4;51,8	54,9**	19,5;86,9	12,1**	2,1;33,6	9,9**	4,5;18,2	24,7**	8,3;49,2	57,3**	15,8;92,0	12,6**	5,2;24,3	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
23,7**	4,3;57,7	41,6	30,4;52,8	45,9**	21,6;71,7	19,2*	11,5;29,2	55,2**	25,4;82,4	42,5*	23,4;63,4	37,5*	22,2;54,8	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
23,7**	4,6;56,7	25,7*	16,2;37,3	37,0**	14,3;64,9	6,2**	2,4;12,5	12,5**	1,2;40,8	19,8**	6,7;40,4	15,9**	5,7;32,5	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
46,2**	18,4;75,9	22,7*	13,5;34,2	5,4**	0,2;25,9	5,6**	2,1;11,9	26,4**	6,6;57,4	21,3**	7,5;42,6	26,2**	13,0;43,5	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	65,0	54,9;75,1	-	;	-	;	2,0**	0,1;10,4	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
6,4**	0,1;35,4	10,0**	4,1;19,7	11,7**	1,3;37,3	4,0**	0,8;11,3	5,9**	0,1;31,4	16,4**	4,7;36,9	18,4**	7,5;35,0	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
46,0**	20,4;73,2	29,1**	15,4;46,2	51,2*	33,2;69,0	59,8	48,7;70,8	48,4*	28,7;68,5	60,8*	35,0;82,8	55,7	43,7;67,6	2 semaines et moins
30,6**	10,1;58,9	36,6*	20,6;55,1	27,7**	13,4;46,3	16,9**	9,1;27,6	25,3**	10,9;45,4	34,2**	13,3;60,8	23,2*	13,4;35,7	Plus de 2 semaines à 1 mois
11,2**	1,0;37,8	31,7*	17,0;49,7	21,1**	9,5;37,5	14,7**	7,8;24,2	22,8**	8,5;44,0	5,0**	0,1;26,0	9,2**	3,4;19,2	Plus d'un mois à 3 mois
12,3**	1,3;39,4	2,6**	0,1;14,2	-	;	8,6**	3,5;17,0	3,5**	0,1;18,3	-	;	11,9**	5,0;22,7	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
70,7	51,5;85,8	94,0	86,9;97,9	77,1	62,3;88,3	90,4	85,0;94,4	89,4	73,9;97,3	88,4	73,6;96,6	83,3	73,9;90,3	Oui, tout à fait
26,5**	12,4;45,1	4,8**	1,4;11,6	16,7**	7,4;30,5	8,5**	4,8;13,8	8,2**	1,5;23,1	2,6**	0,0;14,9	11,5**	5,5;20,6	Oui, en partie
2,8**	0,1;14,5	1,2**	0,1;5,9	6,2**	1,0;18,8	1,0**	0,1;3,8	2,4**	0,0;13,5	9,0**	2,0;23,6	5,2**	1,9;11,1	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p]
12,2**	3,4;28,5	18,8*	11,1;28,9	5,3**	1,0;15,4	18,7*	13,3;25,1	8,3**	1,7;22,7	27,5**	13,0;46,5	11,1**	6,0;18,1	Oui
87,8	71,5;96,6	81,2	71,1;88,9	94,7	84,6;99,0	81,3	74,9;86,7	91,7	77,3;98,3	72,5	53,5;87,0	88,9	81,9;94,0	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	15,2	12,4;18,3	7,0**	1,8;17,6
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	25,9	22,3;29,4	28,2*	18,2;39,9
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	28,5	24,9;32,1	48,0	36,9;59,2
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	26,7	23,2;30,2	13,9**	7,1;23,8
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	2,3**	1,2;3,8	2,9**	0,3;10,2
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	0,9**	0,3;2,0	-	;
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	0,6**	0,1;1,8	-	;
Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	93,2	91,1;95,0	97,1	89,5;99,7
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	6,8	5,0;8,9	2,9**	0,3;10,5
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	92,4	90,3;94,2	93,1	84,4;97,7
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	7,6	5,8;9,7	6,9**	2,3;15,6
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	90,8	88,3;92,9	90,1	80,5;96,0
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	9,2	7,1;11,7	9,9**	4,0;19,5
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	94,0	91,9;95,8	92,6	83,5;97,6
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	6,0*	4,2;8,1	7,4**	2,4;16,5
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	60,8	57,0;64,6	57,3	45,0;69,6
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	39,2	35,4;43,0	42,7	30,4;55,0
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	58,8	54,7;62,9	58,3	45,5;71,2
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	41,2	37,1;45,3	41,7*	28,8;54,5
Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	66,4	61,3;71,4	72,9	55,3;86,5
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	33,6	28,6;38,7	27,1**	13,5;44,7
Contact pour du soutien pratique[3, p, r]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	74,8	71,4;78,2	79,9	67,8;89,1
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	25,2	21,8;28,6	20,1**	10,9;32,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3. On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
-	;	12,9**	6,4;22,5	14,1**	5,9;27,0	31,5	24,8;38,1	-	;	16,9**	6,6;32,7	6,6**	2,6;13,4	Médecin de famille
12,6**	3,9;28,0	33,4*	23,5;43,4	52,2	36,7;67,3	17,7*	12,3;24,1	26,0**	12,9;43,0	20,2**	8,0;38,2	25,1*	16,9;34,9	Médecin spécialiste du cancer
5,8**	0,7;19,8	20,0*	12,2;29,8	21,4**	10,4;36,5	36,6	29,7;43,6	28,0**	15,0;44,4	17,7**	6,7;34,8	23,7*	16,1;32,7	Chirurgien
72,7	54,9;86,4	32,5*	22,6;42,3	7,7**	1,9;19,4	9,6*	5,7;14,8	46,0*	29,3;63,4	42,4*	25,1;61,1	40,3	31,1;49,5	Autre médecin spécialiste
8,9**	2,0;23,6	1,2**	0,0;6,0	-	;	2,2**	0,6;5,6	-	;	2,9**	0,0;17,1	2,5**	0,6;6,9	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	1,8**	0,0;11,1	2,0**	0,5;5,1	-	;	-	;	0,7**	0,0;4,4	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	-	;	2,8**	0,1;14,3	0,5**	0,0;2,3	-	;	-	;	1,1**	0,0;5,6	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]
82,3	65,4;93,2	98,8	93,2;100,0	93,8	83,5;98,6	86,3	80,8;90,7	94,4	81,2;99,3	97,1	86,0;99,9	98,5	94,5;99,8	En personne
17,7**	6,8;34,6	1,2**	0,0;6,8	6,2**	1,4;16,5	13,7*	9,3;19,2	5,6**	0,7;18,8	2,9**	0,1;14,0	1,5**	0,2;5,5	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
88,4	73,1;96,7	92,6	85,0;97,1	87,7	74,7;95,5	95,9	92,0;98,2	91,6	77,2;98,3	85,1	70,0;94,5	92,0	85,9;96,1	Oui
11,6**	3,3;26,9	7,4**	2,9;15,0	12,3**	4,5;25,3	4,1**	1,8;8,0	8,4**	1,7;22,8	14,9**	5,5;30,0	8,0**	3,9;14,1	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
88,4	73,1;96,7	92,4	84,9;96,9	90,0	76,8;97,1	94,9	90,4;97,7	89,0	73,5;97,1	82,2	66,3;92,8	88,3	80,8;93,7	Oui
11,6**	3,3;26,9	7,6**	3,1;15,1	10,0**	2,9;23,2	5,1**	2,3;9,6	11,0**	2,9;26,5	17,8**	7,2;33,7	11,7**	6,3;19,2	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
93,9	79,1;99,3	97,6	91,9;99,7	92,6	81,9;98,0	95,8	91,8;98,2	97,2	84,3;99,9	85,2	70,0;94,6	91,9	85,3;96,2	Oui
6,1**	0,7;20,9	2,4**	0,3;8,1	7,4**	2,0;18,1	4,2**	1,8;8,2	2,8**	0,1;15,7	14,8**	5,4;30,0	8,1**	3,8;14,7	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]
52,5*	34,0;70,6	62,7	51,2;73,3	80,5	66,6;90,4	71,4	64,5;77,7	57,8	39,7;74,6	68,6	49,5;84,0	39,3	29,6;49,0	Oui
47,5*	29,4;66,0	37,3	26,7;48,8	19,5**	9,6;33,4	28,6	22,3;35,5	42,2*	25,4;60,3	31,4**	16,0;50,5	60,7	51,0;70,4	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]
70,2	50,7;85,5	46,6	35,6;57,6	65,7	50,3;79,1	66,6	59,5;73,6	64,2	45,4;80,3	66,4	48,3;81,5	46,8	37,2;56,3	Oui
29,8**	14,5;49,3	53,4	42,4;64,4	34,3*	20,9;49,7	33,4	26,4;40,5	35,8*	19,7;54,6	33,6*	18,5;51,7	53,2	43,7;62,8	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]
69,3*	44,5;87,9	45,1*	28,3;62,8	85,0	70,0;94,3	77,4	68,7;84,7	55,5*	33,7;75,8	75,8	52,4;91,6	42,4*	29,3;55,5	Oui
30,7**	12,1;55,5	54,9*	37,2;71,7	15,0**	5,7;30,0	22,6*	15,3;31,3	44,5*	24,2;66,3	24,2**	8,4;47,6	57,6	44,5;70,7	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p, r]
79,6	61,2;91,9	64,9	53,3;75,3	88,2	75,8;95,7	83,2	76,8;88,4	75,1	57,8;88,0	76,6	58,2;89,7	58,8	49,3;68,3	Oui
20,4**	8,1;38,8	35,1*	24,7;46,7	11,8**	4,3;24,2	16,8*	11,6;23,2	24,9**	12,0;42,2	23,4**	10,3;41,8	41,2	31,7;50,7	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	12,9	9,8;16,6	5,5**	0,6;19,4
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	87,1	83,4;90,2	94,5	80,6;99,4
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	43,0	38,0;48,1	55,2	37,9;71,7
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	57,0	51,9;62,0	44,8*	28,3;62,1
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	8,2*	5,7;11,4	-	;
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	91,8	88,6;94,3	100,0	;
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	5,1*	3,2;7,6	2,3**	0,0;12,5
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	94,9	92,4;96,8	97,7	87,5;100,0
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	11,9	8,7;15,7	14,4**	5,6;28,6
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	88,1	84,3;91,3	85,6	71,4;94,4
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	2,1**	0,9;4,0	2,6**	0,0;15,5
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	97,9	96,0;99,1	97,4	84,5;100,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]
20,6**	7,2;41,5	4,9**	0,6;16,8	13,1**	4,1;28,9	19,9*	13,5;27,7	24,3**	8,9;46,9	8,2**	1,1;26,3	3,3**	0,4;11,6	Oui
79,4	58,5;92,8	95,1	83,2;99,4	86,9	71,1;95,9	80,1	72,3;86,5	75,7	53,1;91,1	91,8	73,7;98,9	96,7	88,4;99,6	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
38,8**	18,3;62,6	20,2**	8,7;37,1	64,9	46,7;80,5	52,4	43,5;61,3	23,0**	7,4;47,3	55,0*	33,1;75,6	23,0*	12,8;36,3	Oui
61,2*	37,4;81,7	79,8	62,9;91,3	35,1*	19,5;53,3	47,6	38,7;56,5	77,0	52,7;92,6	45,0*	24,4;66,9	77,0	63,7;87,2	Non
														Psychologue[p]
8,1**	0,8;27,6	-	;	23,2**	9,6;42,6	10,8*	6,2;17,0	8,3**	1,0;27,1	8,2**	1,1;26,2	4,8**	1,0;13,5	Oui
91,9	72,4;99,2	100,0	;	76,8	57,4;90,4	89,2	83,0;93,8	91,7	72,9;99,0	91,8	73,8;98,9	95,2	86,5;99,0	Non
														Travailleur social[p]
12,7**	2,5;33,7	-	;	10,0**	2,5;24,8	6,9**	3,3;12,4	-	;	7,8**	0,7;27,2	1,6**	0,1;8,2	Oui
87,3	66,3;97,5	100,0	;	90,0	75,2;97,5	93,1	87,6;96,7	100,0	;	92,2	72,8;99,3	98,4	91,8;99,9	Non
														Médecin[p]
16,9**	4,5;38,9	22,4**	10,6;38,7	2,7**	0,0;15,6	11,0**	6,1;17,9	8,1**	0,9;26,9	4,3**	0,1;25,0	13,1**	5,1;26,0	Oui
83,1	61,1;95,5	77,6	61,3;89,4	97,3	84,4;100,0	89,0	82,1;93,9	91,9	73,1;99,1	95,7	75,0;99,9	86,9	74,0;94,9	Non
														Autre professionnel de la santé
4,5**	0,1;24,0	-	;	2,4**	0,1;13,3	2,3**	0,5;6,5	3,9**	0,1;19,9	-	;	1,6**	0,0;8,5	Oui
95,5	76,0;99,9	100,0	;	97,6	86,7;99,9	97,7	93,5;99,5	96,1	80,1;99,9	100,0	;	98,4	91,5;100,0	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	23,8	20,5;27,0	32,3*	21,2;45,2
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	76,2	73,0;79,5	67,7	54,8;78,8
Médecin spécialiste du cancer[p, r]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	45,0	40,9;49,2	45,0	32,3;57,7
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	55,0	50,8;59,1	55,0	42,3;67,7
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	13,9	11,2;17,0	18,9**	9,9;31,2
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	86,1	83,0;88,8	81,1	68,8;90,1
Autre médecin spécialiste[p, r]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	17,3	14,3;20,6	17,2**	8,9;28,6
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	82,7	79,4;85,7	82,8	71,4;91,1
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	3,3*	1,9;5,3	1,5**	0,0;8,2
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	96,7	94,7;98,1	98,5	91,8;100,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
29,7**	14,5;49,1	9,2**	3,9;17,6	48,1	33,5;62,9	29,8	23,4;36,7	24,7**	11,5;42,7	25,0**	12,4;41,8	7,5**	3,5;13,7	Oui
70,3	50,9;85,5	90,8	82,4;96,1	51,9	37,1;66,5	70,2	63,3;76,6	75,3	57,3;88,5	75,0	58,2;87,6	92,5	86,3;96,5	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p, r]
48,5*	31,0;66,3	40,6	29,5;51,6	66,0	50,5;79,3	56,0	48,8;63,2	33,5*	18,4;51,5	44,4*	26,5;63,4	25,8*	17,6;35,4	Oui
51,5*	33,7;69,0	59,4	48,4;70,5	34,0*	20,7;49,5	44,0	36,8;51,2	66,5	48,5;81,6	55,6*	36,6;73,5	74,2	64,6;82,4	Non
														Médecin de famille[p]
8,6**	1,8;23,0	11,5**	5,7;20,1	8,7**	2,8;19,3	17,2*	11,8;23,7	15,9**	6,3;31,0	11,3**	3,1;26,7	11,9**	6,4;19,7	Oui
91,4	77,0;98,2	88,5	79,9;94,3	91,3	80,7;97,2	82,8	76,3;88,2	84,1	69,0;93,7	88,7	73,3;96,9	88,1	80,3;93,6	Non
														Autre médecin spécialiste[p, r]
13,2**	4,0;29,2	14,0**	7,3;23,5	1,6**	0,0;9,2	14,1*	9,5;20,0	25,2**	12,5;42,0	37,8*	21,3;56,7	24,2*	16,8;33,1	Oui
86,8	70,8;96,0	86,0	76,5;92,7	98,4	90,8;100,0	85,9	80,0;90,5	74,8	58,0;87,5	62,2	43,3;78,7	75,8	66,9;83,2	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
2,9**	0,1;15,6	-	;	4,4**	0,4;16,5	4,8**	2,0;9,5	5,4**	0,6;18,5	3,0**	0,0;17,5	3,4**	0,9;8,7	Oui
97,1	84,4;99,9	100,0	;	95,6	83,5;99,6	95,2	90,5;98,0	94,6	81,5;99,4	97,0	82,5;100,0	96,6	91,3;99,1	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	82,2	78,9;85,2	74,2	60,8;84,9
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	11,2	8,9;13,5	15,5**	7,1;28,0
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	6,5*	4,5;9,1	10,3**	3,5;22,3
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	71,5	67,9;75,1	71,8	58,2;83,0
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	15,9	13,0;18,7	14,5**	6,2;27,3
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	12,6	10,0;15,6	13,7**	5,7;26,0
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	80,1	75,5;84,2	95,4	83,9;99,5
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	11,1	8,1;14,8	2,4**	0,1;12,9
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	8,7*	5,9;12,3	2,2**	0,0;12,0
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	59,6	55,1;64,1	58,7	42,2;73,9
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	13,9	10,9;17,3	16,0**	6,5;30,5
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	26,5	22,4;30,6	25,3**	13,1;41,3
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	32,0	28,3;35,6	33,8*	22,0;47,2
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	13,0	10,2;16,2	14,8**	6,7;26,7
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	24,2	20,5;27,9	31,9*	19,7;46,2
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	8,3	6,3;10,6	3,1**	0,3;11,1
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	22,5	19,2;25,9	16,5**	7,8;29,1
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	75,1	68,5;80,9	55,1*	31,1;77,5
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	16,1*	11,4;21,8	44,9**	22,5;68,9
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	8,8*	5,1;13,9	-	;
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	16,5	13,6;19,8	10,6**	4,5;20,5
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	83,5	80,2;86,4	89,4	79,5;95,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
88,8	73,5;96,9	92,4	84,7;97,0	83,2	69,8;92,3	84,7	78,3;89,8	87,0	72,6;95,5	81,0	63,1;92,7	73,1	64,1;80,8	Oui, tout à fait
11,2**	3,1;26,5	5,2**	1,6;12,0	11,7**	4,4;23,7	11,2*	7,1;16,5	10,6**	3,1;24,4	12,6**	3,7;28,5	12,7*	7,5;19,8	Oui, en partie
-	;	2,4**	0,2;9,1	5,2**	0,6;18,1	4,1**	1,4;9,1	2,4**	0,1;12,8	6,4**	0,8;21,5	14,2*	8,1;22,5	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
63,2	44,6;79,4	85,6	76,4;92,3	68,8	54,4;81,0	73,5	65,7;80,4	79,1	62,5;90,7	79,2	61,9;91,1	58,4	49,3;67,6	Oui, tout à fait
25,5**	11,7;44,2	8,2**	3,3;16,3	15,2**	6,8;27,7	16,7*	11,7;22,8	10,2**	2,6;25,3	14,2**	4,6;30,7	20,0*	13,1;28,7	Oui, en partie
11,2**	3,5;25,0	6,1**	2,0;13,8	16,0**	6,9;29,6	9,8**	5,5;15,8	10,6**	3,3;24,0	6,6**	0,9;21,2	21,5*	14,1;30,6	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
74,4	51,8;90,2	82,0	67,0;92,2	86,6	69,3;96,2	75,4	66,2;83,1	68,2*	43,2;87,3	87,2	67,1;97,3	76,2	63,5;86,3	Oui
13,2**	2,8;34,0	13,6**	4,9;27,9	5,6**	0,8;17,6	13,4*	7,7;21,2	21,4**	6,2;46,0	7,9**	0,9;26,6	11,7**	4,6;23,2	Non, il ne voulait pas
12,4**	2,2;34,1	4,3**	0,5;15,3	7,8**	0,9;26,0	11,2**	6,0;18,7	10,4**	1,3;32,9	4,8**	0,1;23,5	12,1**	5,2;22,9	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
62,0*	40,9;80,3	67,0	52,7;79,3	67,6	49,6;82,5	62,4	54,4;70,5	58,2	40,4;74,6	65,8	46,1;82,1	44,4	33,0;55,9	Oui, tout à fait
13,5**	3,4;32,6	10,7**	4,0;21,8	12,3**	3,3;28,9	14,8*	9,5;21,5	11,5**	3,0;27,4	16,5**	5,4;34,7	14,4**	7,6;24,0	Oui, en partie
24,5**	9,7;45,7	22,3*	12,4;35,2	20,1**	8,0;38,3	22,8*	16,1;30,6	30,3**	15,3;49,1	17,8**	6,0;36,8	41,1	30,4;51,8	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
26,5**	12,6;45,1	29,1*	19,8;39,8	37,6*	24,1;52,7	37,8	31,1;44,5	50,5*	32,7;68,2	29,4**	15,1;47,6	19,1*	12,1;28,1	Oui, une infirmière pivot en oncologie
9,0**	1,8;24,4	11,9**	5,5;21,6	6,9**	1,2;20,1	12,1*	7,8;17,7	7,8**	1,5;21,6	11,6**	3,2;27,3	19,6*	12,6;28,4	Oui, un autre professionnel de la santé
27,7**	13,3;46,6	20,2*	11,6;31,4	38,2*	24,4;53,6	21,4	16,0;26,9	10,6**	2,8;25,5	27,0**	13,6;44,5	22,9*	15,3;32,1	Oui, un membre du personnel administratif
19,3**	7,7;36,7	10,9**	5,3;19,2	3,7**	0,4;12,8	7,8**	4,2;13,1	8,4**	1,6;23,4	10,2**	2,1;27,0	8,4**	4,1;14,8	Oui, un médecin
17,4**	6,4;34,8	28,0*	18,7;38,8	13,6**	5,7;25,7	20,8	15,1;27,6	22,7**	10,0;40,6	21,7**	8,9;40,3	29,9	21,9;39,0	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
57,1**	26,3;84,3	91,5	73,5;98,8	62,0*	29,5;88,1	71,6	59,3;81,9	75,1*	41,2;95,1	100,0	;	88,1	72,1;96,7	Oui, tout à fait
20,0**	3,5;51,3	8,5**	1,2;26,5	21,8**	4,1;53,9	14,3**	6,8;25,2	24,9**	4,9;58,8	-	;	5,8**	0,7;19,9	Oui, en partie
22,9**	4,4;55,4	-	;	16,1**	1,4;51,2	14,2**	7,0;24,5	-	;	-	;	6,0**	0,7;20,8	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]
6,7**	0,8;22,2	20,9*	12,6;31,5	28,2*	15,7;43,7	19,0	13,7;25,2	12,8**	4,3;27,4	11,3**	3,3;26,1	13,2**	7,4;21,2	Oui
93,3	77,8;99,2	79,1	68,5;87,4	71,8	56,3;84,3	81,0	74,8;86,3	87,2	72,6;95,7	88,7	73,9;96,7	86,8	78,8;92,6	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	81,7	79,1;84,2	94,3	85,9;98,5
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	18,3	15,8;20,9	5,7**	1,5;14,1
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	41,2	36,8;45,6	4,7**	1,0;13,4
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	58,8	54,4;63,2	95,3	86,6;99,0
Lieu de la chirurgie[p]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	72,6	68,7;76,5	84,1	72,3;92,2
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	27,4	23,5;31,3	15,9**	7,8;27,7
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	56,3	50,0;62,6	44,8*	24,8;66,1
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	8,3*	5,0;12,8	7,5**	0,7;26,3
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	35,4	29,1;41,7	47,7*	27,5;68,5
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	68,7	64,6;72,8	57,9	45,2;70,5
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	12,3	9,4;15,7	18,1**	8,6;31,8
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	19,0	15,7;22,7	24,0*	13,2;38,0
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	96,1	93,8;97,7	95,6	85,9;99,4
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	3,9*	2,3;6,2	4,4**	0,6;14,1
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	88,1	84,8;90,9	85,9	73,1;94,2
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	10,9	8,2;14,0	14,1**	5,8;26,9
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	1,0**	0,2;2,7	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
86,2	69,9;95,6	63,0	54,5;71,5	18,1**	8,6;31,6	95,9	92,2;98,2	76,6	60,7;88,4	73,7	54,8;87,8	96,4	92,0;98,8	Oui
13,8**	4,4;30,1	37,0	28,5;45,5	81,9	68,4;91,4	4,1**	1,8;7,8	23,4**	11,6;39,3	26,3**	12,2;45,2	3,6**	1,2;8,0	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
16,2**	4,5;36,7	11,4**	4,2;23,6	65,9**	24,7;94,2	74,8	67,6;81,1	20,2**	7,5;39,7	-	;	41,1	31,5;50,7	Oui
83,8	63,3;95,5	88,6	76,4;95,8	34,1**	5,8;75,3	25,2	18,9;32,4	79,8	60,3;92,5	100,0	;	58,9	49,3;68,5	Non
														Lieu de la chirurgie[p, r]
64,4	44,2;81,4	62,7	48,2;75,7	80,7*	40,4;98,5	73,8	66,8;80,0	67,3	46,9;83,9	72,1	50,1;88,3	71,6	62,7;79,4	Hôpital de la région de résidence
35,6**	18,6;55,8	37,3*	24,3;51,8	19,3**	1,5;59,6	26,2	20,0;33,2	32,7**	16,1;53,1	27,9**	11,7;49,9	28,4	20,6;37,3	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
74,6*	39,2;95,4	51,7*	27,7;75,0	50,3**	3,5;96,7	66,2	56,9;75,4	48,3*	24,2;73,0	67,0*	34,7;90,6	45,7	32,9;58,6	Oui, tout à fait
-	;	5,0**	0,1;25,9	19,3**	0,1;79,8	3,2**	0,6;9,2	25,6**	8,4;51,2	-	;	14,3**	5,7;28,0	Oui, en partie
25,4**	4,6;60,8	43,3**	20,8;68,0	30,3**	0,5;90,0	30,6*	21,6;39,6	26,1**	7,8;53,5	33,0**	9,4;65,3	40,0*	26,6;54,5	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
68,5	46,5;85,8	83,0	70,3;91,8	51,9**	13,5;88,6	77,2	70,6;83,0	76,0	55,4;90,4	62,1*	41,4;80,0	57,4	48,3;66,4	Oui, tout à fait
24,4**	9,2;46,5	5,7**	1,1;16,1	26,2**	2,3;71,5	6,5**	3,4;11,1	16,9**	5,2;36,9	24,4**	9,4;46,0	13,2*	7,7;20,5	Oui, en partie
7,0**	0,7;24,2	11,4**	4,4;22,9	21,9**	1,8;64,8	16,3*	11,2;22,6	7,0**	0,8;23,8	13,5**	3,0;34,3	29,4*	20,9;39,2	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
100,0	;	98,2	90,5;99,9	88,5	40,3;99,9	95,1	90,5;97,9	96,7	81,4;99,9	100,0	;	95,4	89,3;98,6	Oui
-	;	1,8**	0,1;9,5	11,5**	0,1;59,7	4,9**	2,1;9,5	3,3**	0,1;18,6	-	;	4,6**	1,4;10,7	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
95,5	76,9;99,9	93,9	83,3;98,7	88,3	46,4;99,8	91,2	86,1;94,9	89,8	72,4;98,0	82,9	62,2;95,0	81,7	73,0;88,6	Oui, tout à fait
-	;	6,1**	1,3;16,7	11,7**	0,2;53,6	8,8*	5,1;13,9	10,2**	2,0;27,6	17,1**	5,0;37,8	15,3*	9,1;23,4	Oui, en partie
4,5**	0,1;23,1	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	3,0**	0,4;9,9	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	42,5	39,8;45,2	60,2	47,4;72,0
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	57,5	54,8;60,2	39,8*	28,0;52,6
Lieu de la chimiothérapie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	69,4	63,3;75,5	75,0	57,9;87,8
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	30,6	24,5;36,7	25,0**	12,2;42,1
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	47,6	41,3;53,9	46,2*	29,9;63,1
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	40,9	34,6;47,3	46,0*	30,0;62,7
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	11,4*	7,6;16,2	7,7**	1,5;21,7
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	52,8	44,7;60,8	52,3*	29,9;74,0
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	10,0*	5,9;15,6	12,3**	2,7;31,2
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	37,3	29,3;45,3	35,4**	16,2;58,8
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	41,9	35,6;48,2	38,4*	22,7;56,1
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	29,9	24,2;35,7	38,1*	23,0;55,1
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	28,2	22,1;34,2	23,5**	11,5;39,5
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	86,2	81,3;90,2	89,9	75,8;97,3
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	11,9*	8,2;16,6	10,1**	2,7;24,2
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	1,9**	0,6;4,5	-	;
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	87,0	82,0;91,0	97,3	86,6;99,9
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	10,3*	6,7;15,1	2,7**	0,1;13,4
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	2,7**	1,1;5,4	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
34,0**	18,0;53,2	3,3**	0,3;12,4	98,3	91,5;99,9	51,3	45,3;57,2	19,8**	9,0;35,2	57,0	39,5;73,3	26,9	19,4;35,4	Oui
66,0	46,8;82,0	96,7	87,6;99,7	1,7**	0,1;8,5	48,7	42,8;54,7	80,2	64,8;91,0	43,0*	26,7;60,5	73,1	64,6;80,6	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p, r]
39,6**	13,0;71,8	65,8**	1,0;100,0	68,7	53,5;81,4	73,0	63,2;81,4	38,0**	6,7;79,8	95,2	77,2;99,8	55,3*	34,1;75,2	Hôpital de la région de résidence
60,4*	28,2;87,0	34,2**	0,0;99,0	31,3*	18,6;46,5	27,0*	18,6;36,8	62,0**	20,2;93,3	4,8**	0,2;22,8	44,7*	24,8;65,9	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
32,9**	8,3;67,5	-	;	49,2	34,8;63,8	49,6	39,7;59,4	12,7**	0,1;59,8	77,8	51,2;94,0	38,7**	19,7;60,8	Moins de 30 minutes
49,8**	17,6;82,1	-	;	43,5*	28,6;59,3	42,0	32,1;52,0	62,0**	21,8;92,5	22,2**	6,0;48,8	28,5**	11,9;51,0	De 30 à 60 minutes
17,3**	2,2;49,4	100,0	;	7,2**	1,6;19,5	8,4**	3,5;16,4	25,4**	2,5;69,0	-	;	32,7**	15,1;54,9	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
42,1**	7,0;84,9	-	;	58,2	39,5;75,4	55,5	42,8;68,3	42,0**	7,9;83,5	47,7**	21,1;75,2	46,2**	20,5;73,4	Oui, tout à fait
18,1**	0,5;66,6	100,0	;	13,1**	3,9;29,4	3,4**	0,4;12,1	29,0**	2,2;77,6	15,3**	1,6;47,1	-	;	Oui, en partie
39,8**	6,1;83,4	-	;	28,7**	13,6;48,4	41,1*	28,3;53,8	29,0**	2,6;76,0	37,0**	11,9;68,9	53,8*	26,6;79,5	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
44,2**	16,4;75,1	65,8**	1,0;100,0	43,4*	28,4;59,4	30,4*	21,4;39,4	100,0	;	44,4**	20,5;70,4	61,0*	38,8;80,3	Moins de 30 minutes
32,2**	8,4;66,0	-	;	29,6*	16,5;45,7	34,0	24,4;43,7	-	;	17,0**	3,4;43,1	24,4**	8,8;47,3	De 30 à 60 minutes
23,5**	4,5;56,9	34,2**	0,0;99,0	27,0**	14,4;43,1	35,6	25,5;45,6	-	;	38,6**	16,4;65,0	14,6**	3,3;36,4	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
92,2	60,4;99,9	100,0	;	92,5	81,6;98,0	79,5	70,6;86,7	87,3*	37,0;99,9	94,3	74,5;99,8	80,6	60,6;93,3	Oui, tout à fait
7,8**	0,1;39,6	-	;	7,5**	2,0;18,4	16,2*	9,8;24,7	12,7**	0,1;63,0	5,7**	0,2;25,5	15,8**	4,4;35,9	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	4,3**	1,2;10,5	-	;	-	;	3,6**	0,1;19,6	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
92,2	60,4;99,9	100,0	;	86,5	74,3;94,3	87,2	78,8;93,2	74,6*	30,1;97,7	93,5	69,4;99,8	69,1	47,0;86,2	Oui, tout à fait
7,8**	0,1;39,6	-	;	13,5**	5,7;25,7	10,8**	5,3;18,8	12,7**	0,2;55,3	6,5**	0,2;30,6	17,0**	4,7;38,7	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	2,0**	0,3;7,1	12,7**	0,1;59,4	-	;	13,9**	3,7;32,4	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	46,0	43,2;48,7	26,9*	17,4;38,3
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	54,0	51,3;56,8	73,1	61,7;82,6
Lieu de la radiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	22,5	17,8;27,3	26,9**	9,6;51,7
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	77,5	72,7;82,2	73,1	48,3;90,4
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	14,1	10,5;18,5	5,3**	0,1;27,2
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	57,8	52,3;63,3	75,0	49,7;91,8
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	28,0	23,2;32,9	19,8**	5,5;43,7
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	63,1	56,9;69,3	77,9	46,7;95,6
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	13,4*	9,4;18,5	15,0**	1,6;46,1
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	23,4	17,9;28,9	7,2**	0,1;35,9
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	79,7	75,2;84,1	79,0	54,8;93,9
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	13,5	10,0;17,7	15,6**	3,5;38,8
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	6,8*	4,2;10,4	5,3**	0,1;27,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
34,0*	19,3;51,3	50,0	41,5;58,6	20,5**	10,0;34,9	79,5	73,0;85,0	79,0	62,7;90,5	22,0**	9,4;40,0	16,8*	10,8;24,5	Oui
66,0	48,7;80,7	50,0	41,4;58,5	79,5	65,1;90,0	20,5	15,0;27,0	21,0**	9,5;37,3	78,0	60,0;90,6	83,2	75,5;89,2	Non
														Lieu de la radiothérapie[p]
32,7**	9,3;65,1	25,6**	13,0;41,9	40,8**	10,0;78,4	17,2*	11,5;24,2	30,3**	15,0;49,6	11,7**	0,2;51,6	26,7**	8,7;53,0	Hôpital de la région de résidence
67,3*	34,9;90,7	74,4	58,1;87,0	59,2**	21,6;90,0	82,8	75,8;88,5	69,7	50,4;85,0	88,3	48,4;99,8	73,3	47,0;91,3	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
27,3**	5,7;61,9	9,3**	2,6;22,3	7,7**	0,1;38,4	17,1*	11,5;23,9	17,5**	5,7;36,9	-	;	9,0**	0,9;30,7	Moins de 30 minutes
54,0**	22,6;83,1	54,3	37,3;70,5	81,2*	42,9;98,3	56,4	48,3;64,5	58,9*	38,1;77,6	67,7**	22,9;96,1	43,3**	20,7;68,2	De 30 à 60 minutes
18,7**	2,3;53,5	36,4*	21,6;53,4	11,1**	0,2;50,8	26,5	19,8;34,1	23,6**	9,6;43,4	32,3**	3,9;77,1	47,7*	24,6;71,5	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
67,2*	32,5;91,8	68,9	49,8;84,3	56,9**	18,0;90,1	63,1	54,5;71,7	63,8*	41,7;82,3	42,4**	8,8;82,6	46,6**	19,7;75,0	Oui, tout à fait
-	;	16,1**	5,5;33,7	8,9**	0,1;44,5	14,0*	8,4;21,4	7,9**	0,8;27,1	26,6**	2,1;73,6	19,2**	2,4;54,3	Oui, en partie
32,8**	8,2;67,5	15,0**	4,7;32,5	34,2**	5,3;76,5	22,9*	16,0;31,0	28,3**	11,9;50,5	31,0**	3,6;75,9	34,2**	11,4;64,1	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
66,3*	32,1;91,1	72,2	55,8;85,1	83,8	49,5;98,4	81,7	75,2;87,1	87,3	70,5;96,4	74,9*	32,8;97,3	76,9	52,9;92,5	Oui, tout à fait
17,1**	1,8;51,6	13,8**	5,1;27,8	7,7**	0,1;38,4	14,3*	9,3;20,5	9,5**	1,9;25,6	11,7**	0,1;56,1	13,8**	2,6;36,7	Oui, en partie
16,7**	1,8;50,0	14,1**	5,1;28,8	8,6**	0,2;41,7	4,0**	1,5;8,4	3,3**	0,1;16,9	13,3**	0,2;57,8	9,3**	1,0;31,0	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Douleur et malaises ressentis[p, r]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	58,4	54,8;62,0	77,9	63,5;88,6
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	41,6	38,0;45,2	22,1**	11,4;36,5
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	30,6	25,9;35,3	40,1*	26,8;53,3
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	35,8	30,6;41,0	35,8*	23,1;50,1
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	33,6	28,5;38,8	24,1**	13,1;38,5
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	80,8	76,2;84,8	80,7	65,8;91,1
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	14,7	11,3;18,8	14,1**	5,1;28,8
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	4,5*	2,6;7,2	5,2**	0,6;17,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p, r]
58,8*	39,8;76,0	35,7	25,2;46,2	80,8	66,8;90,8	58,2	51,6;64,8	63,6	46,2;78,7	51,2*	33,4;68,8	52,2	42,5;62,0	Oui
41,2*	24,0;60,2	64,3	53,8;74,8	19,2**	9,2;33,2	41,8	35,2;48,4	36,4*	21,3;53,8	48,8*	31,2;66,6	47,8	38,0;57,5	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
26,7**	9,6;51,1	28,9**	13,2;49,4	28,9**	15,1;46,3	30,5	21,9;39,0	19,5**	6,1;41,2	49,0**	23,8;74,6	25,1*	14,7;38,1	Sévères
48,3*	24,8;72,4	17,5**	5,7;37,0	28,4*	15,6;44,5	38,4	28,8;47,9	50,9*	29,8;71,7	23,0**	6,3;49,9	38,6*	25,7;52,9	Modérés
25,0**	7,6;51,5	53,6*	32,7;73,5	42,7*	26,9;59,6	31,2	22,3;40,0	29,6**	12,8;51,9	28,0**	9,3;55,0	36,3*	23,4;50,8	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
73,8	50,2;90,3	81,1	60,8;93,7	84,4	68,6;94,2	84,2	75,2;91,0	83,8	63,1;95,5	76,4	50,5;93,0	75,0	61,4;85,7	Oui, tout à fait
26,2**	9,7;49,8	18,9**	6,3;39,2	13,4**	4,4;28,9	11,5**	5,9;19,4	12,1**	2,5;31,9	23,6**	7,0;49,5	15,0**	7,1;26,6	Oui, en partie
-	;	-	;	2,2**	0,1;11,6	4,3**	1,3;10,1	4,1**	0,1;21,0	-	;	10,0**	3,6;20,9	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	92,3	89,5;94,5	93,4	82,2;98,6
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	5,6*	3,7;8,0	4,4**	0,5;15,0
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	2,2**	1,0;3,9	2,2**	0,0;12,1
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	7,6	5,7;10,0	5,7**	1,5;14,5
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	92,4	90,0;94,3	94,3	85,5;98,5
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	73,0	69,4;76,6	70,0	56,6;81,3
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	25,6	22,0;29,1	30,0*	18,7;43,4
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	1,4**	0,6;2,8	-	;
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	62,0	58,3;65,6	56,1	43,4;68,8
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	38,0	34,4;41,7	43,9	31,2;56,6
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	22,7	19,5;25,9	28,7*	18,0;41,5
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	17,3	14,3;20,2	11,6**	5,3;21,1
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	60,0	56,2;63,8	59,7	47,3;72,1
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	78,7	74,9;82,5	85,1	72,0;93,7
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	16,7	13,4;20,5	14,9**	6,3;28,0
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	4,6*	2,8;7,1	-	;
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	62,6	57,5;67,8	70,2	55,6;82,2
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	37,4	32,2;42,5	29,8*	17,8;44,4
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	87,5	84,4;90,2	92,7	81,9;98,1
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	11,6	9,0;14,6	7,3**	1,9;18,1
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	0,9**	0,3;2,2	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
87,0	66,8;97,1	91,3	79,1;97,6	98,1	89,8;100,0	91,7	86,3;95,5	86,7	68,3;96,6	87,3	67,7;97,2	94,8	87,2;98,5	Oui, tout à fait
13,0**	2,9;33,2	4,5**	0,6;15,0	1,9**	0,0;10,2	6,5**	3,3;11,5	6,1**	0,7;21,0	12,7**	2,8;32,3	2,7**	0,4;8,9	Oui, en partie
-	;	4,2**	0,5;14,8	-	;	1,8**	0,4;5,0	7,1**	0,8;23,9	-	;	2,6**	0,3;9,0	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
12,6**	3,3;29,9	5,5**	1,5;13,6	9,8**	3,0;22,4	8,1*	4,7;12,8	3,1**	0,1;16,4	9,7**	2,2;25,2	7,9**	3,4;15,0	Oui
87,4	70,1;96,7	94,5	86,4;98,5	90,2	77,6;97,0	91,9	87,2;95,3	96,9	83,6;99,9	90,3	74,8;97,8	92,1	85,0;96,6	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
70,7	51,5;85,7	75,7	64,7;84,7	69,4	53,5;82,5	75,8	68,4;82,2	72,1	56,4;84,6	77,4	59,3;90,2	70,2	60,4;78,9	Oui, toujours
29,3**	14,3;48,5	21,6*	12,9;32,6	29,0*	16,1;44,9	23,2	16,9;30,5	27,9*	15,4;43,6	22,6**	9,8;40,7	26,6*	18,3;36,2	Oui, la plupart du temps
-	;	2,8**	0,3;10,1	1,6**	0,0;9,3	1,0**	0,1;3,6	-	;	-	;	3,2**	0,6;9,5	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
39,1*	22,2;58,2	50,4	39,4;61,4	83,1	67,6;93,2	84,7	78,0;89,9	57,7	40,0;74,0	56,4*	38,1;73,5	39,3	30,6;47,9	Oui
60,9	41,8;77,8	49,6	38,6;60,6	16,9**	6,8;32,4	15,3*	10,1;22,0	42,3*	26,0;60,0	43,6*	26,5;61,9	60,7	52,1;69,4	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]
19,5**	7,8;37,0	13,6**	6,5;24,2	30,1*	17,8;45,0	31,5	24,9;38,1	19,4**	8,3;35,8	14,2**	4,4;31,3	13,3**	7,4;21,5	Oui
10,8**	2,8;26,2	16,5*	9,3;26,3	23,8**	12,6;38,6	20,6	15,1;26,1	15,3**	5,7;30,7	24,2**	11,0;42,3	13,5**	7,5;21,9	Non, mais il aurait aimé l'être
69,7	51,7;84,1	69,9	58,2;79,9	46,0	32,5;59,6	47,9	41,2;54,6	65,3	48,2;79,9	61,6	41,7;79,1	73,2	63,8;81,2	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
71,8	47,4;89,4	86,3	74,0;94,2	75,7	60,4;87,4	81,2	73,6;87,4	71,9	51,6;87,3	89,6	72,4;97,8	68,2	58,0;78,4	Oui, tout à fait
28,2**	10,6;52,6	5,9**	1,5;15,1	21,1**	10,3;35,8	13,6*	8,3;20,6	24,7**	10,3;45,0	10,4**	2,2;27,6	23,5*	14,7;34,3	Oui, en partie
-	;	7,8**	2,1;19,2	3,2**	0,1;17,8	5,2**	2,0;10,8	3,3**	0,1;17,4	-	;	8,3**	3,1;17,4	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
55,6*	33,0;76,6	50,4*	31,7;68,9	80,3	62,1;92,4	57,8	48,1;67,4	73,7	51,0;89,9	69,1	45,3;87,2	56,8	43,4;70,3	Oui
44,4*	23,4;67,0	49,6*	31,1;68,3	19,7**	7,6;37,9	42,2	32,6;51,9	26,3**	10,1;49,0	30,9**	12,8;54,7	43,2*	29,7;56,6	Non
														Patient traité de manière respectueuse
74,8	56,5;88,4	92,3	84,6;96,9	87,6	74,3;95,6	88,7	83,3;92,9	92,4	79,2;98,4	90,4	74,5;98,0	80,7	71,9;87,8	Oui, toujours
25,2**	11,6;43,5	7,7**	3,1;15,4	12,4**	4,4;25,7	9,7*	6,0;14,7	7,6**	1,6;20,8	9,6**	2,0;25,5	17,0*	10,6;25,2	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	-	;	1,5**	0,3;4,4	-	;	-	;	2,3**	0,2;8,4	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	1,6**	0,8;3,0	5,8**	1,6;14,4
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	5,8*	4,0;8,2	8,7**	2,9;19,0
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	1,6**	0,7;3,0	1,3**	0,0;7,2
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	90,9	88,3;93,1	84,2	72,5;92,3
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	75,1	71,5;78,7	69,5	55,7;81,1
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	20,5	17,1;24,0	29,0*	17,6;42,7
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	4,4*	2,8;6,4	1,5**	0,1;7,4
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	86,5	83,3;89,2	81,1	68,0;90,5
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	12,1	9,4;15,1	18,9**	9,5;32,0
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	1,5**	0,7;2,8	-	;
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	65,3	58,8;71,9	77,3	58,5;90,4
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	34,7	28,1;41,2	22,7**	9,6;41,5
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	5,1*	3,5;7,3	1,6**	0,1;7,9
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	94,9	92,7;96,5	98,4	92,1;99,9
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	73,7	69,3;78,1	70,6	54,3;83,8
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	10,6*	7,7;14,2	17,6**	7,2;33,3
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	15,7	12,1;19,8	11,8**	3,4;27,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
-	;	1,3**	0,0;8,1	1,7**	0,0;9,6	1,1**	0,1;3,8	-	;	3,1**	0,1;16,5	0,8**	0,0;4,7	Oui, souvent
2,8**	0,1;15,8	5,3**	1,4;13,4	3,8**	0,4;13,6	6,2**	3,1;11,0	5,0**	0,6;17,5	6,6**	0,8;22,0	5,8**	2,3;11,9	Oui, parfois
-	;	2,6**	0,3;8,8	1,8**	0,0;9,7	1,7**	0,3;4,9	2,5**	0,1;13,6	-	;	1,5**	0,0;8,4	Oui, une seule fois
97,2	84,2;99,9	90,8	81,8;96,3	92,7	82,3;98,0	91,0	85,5;95,0	92,5	79,7;98,4	90,3	73,9;98,0	91,9	84,7;96,4	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
72,2	53,2;86,7	85,6	75,6;92,6	74,2	59,6;85,7	79,5	72,8;85,1	67,6	51,2;81,3	69,8	51,1;84,6	70,5	61,5;78,5	Oui, toujours
18,8**	6,9;37,4	10,3**	4,7;19,1	23,7**	12,7;38,1	17,8*	12,5;24,2	27,0**	14,5;42,9	15,4**	4,7;33,7	24,4*	16,9;33,2	Oui, la plupart du temps
9,0**	1,8;24,9	4,1**	0,8;11,9	2,1**	0,0;11,2	2,7**	0,9;6,2	5,4**	0,7;17,7	14,9**	4,7;32,2	5,1**	1,7;11,6	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
80,7	62,6;92,6	92,2	83,5;97,2	80,1	66,3;90,1	90,4	85,2;94,3	86,5	71,2;95,5	90,1	73,8;97,9	83,6	74,8;90,2	Oui, toujours
19,3**	7,4;37,4	6,4**	2,1;14,5	15,9**	7,1;29,0	9,1*	5,4;14,2	11,0**	3,0;25,9	2,9**	0,0;16,3	15,2*	8,9;23,8	Oui, la plupart du temps
-	;	1,4**	0,1;6,7	4,0**	0,5;13,9	0,5**	0,0;2,7	2,5**	0,1;12,9	7,0**	1,0;21,8	1,2**	0,0;6,4	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]
63,2**	25,1;91,8	73,7	52,3;89,2	81,8	58,9;95,1	56,5	43,7;69,3	66,6*	38,2;88,2	47,6**	15,5;81,3	58,3	40,1;75,0	Oui
36,8**	8,2;74,9	26,3**	10,8;47,7	18,2**	4,9;41,1	43,5*	30,7;56,3	33,4**	11,8;61,8	52,4**	18,7;84,5	41,7*	25,0;59,9	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
-	;	6,9**	2,3;15,2	7,1**	1,5;19,3	6,0**	3,1;10,3	5,7**	0,6;19,9	9,5**	2,0;25,7	3,7**	1,0;9,3	Oui
100,0	;	93,1	84,8;97,7	92,9	80,7;98,5	94,0	89,7;96,9	94,3	80,1;99,4	90,5	74,3;98,0	96,3	90,7;99,0	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
89,4	64,2;99,0	75,5	61,4;86,5	73,3	54,8;87,3	76,0	68,2;82,8	70,6	49,3;86,8	72,4	47,1;90,2	68,7	56,8;79,0	Oui, tout à fait
-	;	12,5**	4,6;25,4	10,4**	1,9;28,9	9,8**	5,4;16,1	10,5**	2,2;28,0	13,3**	2,8;34,6	8,5**	3,1;17,8	Oui, en partie
10,6**	1,0;35,8	12,0**	4,3;24,9	16,3**	6,5;31,3	14,2*	8,8;21,1	19,0**	6,1;39,7	14,2**	2,7;37,9	22,8*	13,7;34,3	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p, r]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	84,1	80,8;87,1	89,7	78,4;96,3
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	15,9	12,9;19,2	10,3**	3,7;21,6
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	8,7	6,5;11,5	8,9**	2,7;20,5
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	91,3	88,5;93,5	91,1	79,5;97,3
Médecin spécialiste[p]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	18,3	15,2;21,8	12,4**	5,5;22,9
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	81,7	78,2;84,8	87,6	77,1;94,5
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	28,8	25,4;32,3	33,7*	23,2;45,6
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	71,2	67,7;74,6	66,3	54,4;76,8
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	15,7	12,8;18,9	16,7**	8,5;28,1
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	84,3	81,1;87,2	83,3	71,9;91,5
CLSC[p, r]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	26,1	22,5;29,7	48,2	35,5;60,9
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	73,9	70,3;77,5	51,8	39,1;64,5
Urgence d'un hôpital[p, r]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	27,9	24,2;31,5	33,0*	20,8;47,2
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	72,1	68,5;75,8	67,0	52,8;79,2
Unité de soins d'un hôpital[p, r]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	12,2	9,6;14,8	9,2**	3,3;19,2
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	87,8	85,2;90,4	90,8	80,8;96,7
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	1,1**	0,4;2,3	-	;
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	98,9	97,7;99,6	100,0	;
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	0,2**	0,0;0,8	1,4**	0,0;7,5
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	99,8	99,2;100,0	98,6	92,5;100,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p, r]
82,0	63,3;93,7	77,6	66,8;86,3	97,7	88,2;99,9	88,9	83,4;93,0	81,3	65,6;92,0	90,6	74,1;98,2	71,9	61,8;80,6	Oui
18,0**	6,3;36,7	22,4*	13,7;33,2	2,3**	0,1;11,8	11,1*	7,0;16,6	18,7**	8,0;34,4	9,4**	1,8;25,9	28,1*	19,4;38,2	Non
														Médecin de famille[p]
3,1**	0,1;16,4	10,3**	4,8;18,9	4,1**	0,4;15,2	10,7*	6,4;16,4	10,0**	2,8;23,7	10,1**	1,7;28,9	7,5**	3,3;14,1	Oui
96,9	83,6;99,9	89,7	81,1;95,2	95,9	84,8;99,6	89,3	83,6;93,6	90,0	76,3;97,2	89,9	71,1;98,3	92,5	85,9;96,7	Non
														Médecin spécialiste[p]
15,9**	5,3;33,4	13,9**	6,7;24,3	24,0**	11,8;40,3	22,5	16,5;29,3	18,2**	8,1;33,0	19,3**	6,8;38,9	16,0*	9,3;24,8	Oui
84,1	66,6;94,7	86,1	75,7;93,3	76,0	59,7;88,2	77,5	70,7;83,5	81,8	67,0;91,9	80,7	61,1;93,2	84,0	75,2;90,7	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
30,4**	14,4;50,8	15,6**	7,8;26,7	55,4	40,2;69,8	32,3	25,8;38,8	20,5**	9,0;37,0	36,3*	20,1;55,2	17,7*	10,8;26,5	Oui
69,6	49,2;85,6	84,4	73,3;92,2	44,6*	30,2;59,8	67,7	61,2;74,2	79,5	63,0;91,0	63,7	44,8;79,9	82,3	73,5;89,2	Non
														Info-Santé[p]
9,3**	2,0;24,6	14,3**	7,6;23,7	7,3**	1,3;20,8	17,9*	12,7;24,3	21,7**	9,5;39,0	26,6**	11,9;46,3	13,4*	7,6;21,5	Oui
90,7	75,4;98,0	85,7	76,3;92,4	92,7	79,2;98,7	82,1	75,7;87,3	78,3	61,0;90,5	73,4	53,7;88,1	86,6	78,5;92,4	Non
														CLSC[p, r]
16,9**	5,4;35,9	26,0*	16,5;37,5	6,6**	1,3;18,6	28,4	21,9;35,6	24,4**	11,7;41,3	24,7**	11,6;42,4	23,2*	15,1;32,9	Oui
83,1	64,1;94,6	74,0	62,5;83,5	93,4	81,4;98,7	71,6	64,4;78,1	75,6	58,7;88,3	75,3	57,6;88,4	76,8	67,1;84,9	Non
														Urgence d'un hôpital[p, r]
31,5**	15,3;51,9	25,7*	16,1;37,2	53,0	37,5;68,2	24,2	18,2;30,1	15,2**	5,7;30,6	27,1**	13,1;45,6	23,7*	15,7;33,4	Oui
68,5	48,1;84,7	74,3	62,8;83,9	47,0*	31,8;62,5	75,8	69,9;81,8	84,8	69,4;94,3	72,9	54,4;86,9	76,3	66,6;84,3	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p, r]
12,2**	3,2;29,3	11,5**	4,8;21,9	25,1**	13,2;40,6	12,8*	8,2;18,7	22,7**	10,8;38,9	3,1**	0,1;15,6	6,7**	2,9;12,9	Oui
87,8	70,7;96,8	88,5	78,1;95,2	74,9	59,4;86,8	87,2	81,3;91,8	77,3	61,1;89,2	96,9	84,4;99,9	93,3	87,1;97,1	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
3,0**	0,1;14,6	-	;	3,7**	0,4;13,3	1,6**	0,3;4,5	-	;	2,8**	0,0;16,6	-	;	Oui
97,0	85,4;99,9	100,0	;	96,3	86,7;99,6	98,4	95,5;99,7	100,0	;	97,2	83,4;100,0	100,0	;	Non
														Autre contact
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	69,7	65,2;74,2	69,7	53,7;82,8
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	14,8	11,8;18,2	12,7**	5,1;24,7
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	15,5	12,1;19,4	17,6**	7,4;32,9
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	55,2	50,3;60,2	44,4*	29,0;60,6
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	12,7	9,7;16,1	2,3**	0,0;13,1
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	32,1	27,6;36,6	53,3	37,2;68,9
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	51,3	46,5;56,0	47,9*	33,2;62,8
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	17,2	14,0;20,9	12,6**	5,1;24,7
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	31,5	27,1;35,9	39,5*	25,0;55,4
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	45,9	40,8;51,0	41,5*	26,8;57,4
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	16,8	13,6;20,5	10,6**	3,4;23,5
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	37,3	32,3;42,2	47,9*	32,2;63,8
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	58,8	54,1;63,5	57,4	44,1;70,8
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	16,8	13,4;20,6	29,4*	17,8;43,5
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	24,4	20,3;28,5	13,2**	5,2;25,9
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	63,9	59,5;68,3	59,1	43,0;74,0
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	14,6	11,4;18,4	24,7**	12,8;40,3
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	21,5	17,7;25,2	16,2**	6,4;31,4

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
63,9*	38,5;84,6	63,6	47,5;77,7	85,3	70,6;94,4	78,2	71,0;84,4	50,8*	32,4;69,0	66,3	45,7;83,2	56,0	43,3;68,7	Oui, tout à fait
24,5**	8,2;48,8	15,6**	5,9;31,1	9,4**	2,7;22,0	11,8*	7,4;17,5	29,7**	14,9;48,5	7,6**	0,9;25,3	19,1*	10,8;29,9	Oui, en partie
11,6**	1,6;35,1	20,8**	9,7;36,5	5,3**	0,6;18,6	10,0*	5,7;15,8	19,5**	7,3;38,3	26,1**	10,9;47,3	24,9*	15,0;37,3	Non
														La sexualité[p]
46,9*	26,5;68,0	81,8	70,5;90,1	68,8	52,6;82,3	48,9	39,9;57,9	33,7**	13,2;60,1	53,2*	31,0;74,5	47,8	35,8;59,8	Oui, tout à fait
26,0**	9,6;49,3	15,5**	7,7;26,5	13,7**	5,1;27,6	11,9*	7,0;18,6	18,8**	5,0;42,5	8,7**	1,0;28,6	12,5**	5,8;22,7	Oui, en partie
27,2**	10,8;49,8	2,8**	0,3;9,8	17,5**	7,1;33,4	39,2	30,6;47,7	47,5*	25,3;70,4	38,0**	18,2;61,3	39,7*	27,5;52,9	Non
														Les émotions[p]
44,9*	24,2;66,9	61,7	46,9;75,0	60,8	44,5;75,5	53,3	45,0;61,6	40,9*	22,8;61,0	52,2*	31,9;72,0	43,0	31,5;54,4	Oui, tout à fait
14,9**	3,9;34,9	12,6**	5,1;24,6	21,4**	10,2;37,1	20,5*	14,3;28,0	25,6**	10,6;46,4	7,8**	0,8;26,6	15,4**	8,1;25,5	Oui, en partie
40,3**	20,2;63,2	25,7*	14,7;39,6	17,8**	7,8;32,4	26,2	18,9;34,6	33,5**	17,3;53,2	39,9**	20,5;62,0	41,6	30,3;53,0	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
37,2**	17,2;61,1	74,1	60,3;85,0	53,3*	35,9;70,2	43,8	34,8;52,9	33,4**	13,5;58,9	50,0*	28,1;72,0	31,1*	20,0;44,0	Oui, tout à fait
21,9**	7,1;45,0	11,9**	4,7;23,6	21,4**	9,8;37,7	20,0*	13,9;27,4	39,6**	18,4;64,0	4,2**	0,1;23,2	11,5**	5,3;20,9	Oui, en partie
40,8**	19,8;64,6	14,0**	6,2;25,9	25,3**	12,2;42,7	36,1	27,8;44,4	27,0**	10,3;50,4	45,7*	23,8;68,9	57,4	45,5;69,4	Non
														Les besoins alimentaires[p]
47,8*	25,7;70,5	56,9	40,9;71,8	85,9	72,9;94,2	57,7	49,0;66,3	61,6	41,4;79,2	59,7*	36,7;79,9	47,9	36,8;59,0	Oui, tout à fait
28,9**	11,8;51,9	8,9**	2,5;21,0	6,2**	1,3;16,8	17,5*	11,7;24,7	22,1**	9,4;40,4	8,6**	1,0;28,2	13,9**	6,9;24,2	Oui, en partie
23,3**	8,3;45,7	34,2*	21,0;49,6	8,0**	2,0;19,9	24,9*	17,7;33,3	16,3**	5,4;34,3	31,7**	14,1;54,3	38,2	27,2;50,1	Non
														Les activités courantes[p]
58,6*	37,3;77,8	74,7	61,0;85,6	75,3	58,2;88,0	62,1	54,0;70,1	63,5	42,4;81,4	64,8*	42,9;82,9	58,2	47,0;69,4	Oui, tout à fait
24,4**	9,5;45,7	2,0**	0,1;10,1	11,6**	3,6;25,9	16,2*	10,5;23,5	24,5**	9,5;46,0	7,8**	0,8;26,8	12,0**	5,9;21,1	Oui, en partie
17,0**	4,7;38,2	23,3*	12,8;36,9	13,1**	4,7;27,1	21,7*	14,9;29,8	12,0**	2,5;31,3	27,4**	11,4;49,3	29,8*	19,7;41,5	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	91,9	89,2;94,1	95,4	86,5;99,2
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	7,0*	5,0;9,4	4,6**	0,8;13,5
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	1,1**	0,4;2,6	-	;
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	67,8	64,0;71,5	60,7	47,8;72,6
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	26,0	22,4;29,5	33,6*	22,4;46,4
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	3,5*	2,1;5,5	3,0**	0,4;10,3
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	2,7**	1,5;4,5	2,7**	0,1;13,5
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	58,2	53,7;62,7	59,5	45,9;73,1
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	18,0	14,8;21,5	29,8*	17,7;44,3
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	23,8	20,1;27,5	10,7**	4,0;21,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
93,9	78,8;99,3	98,7	92,4;100,0	84,2	69,6;93,6	94,2	89,7;97,2	95,0	83,5;99,4	93,5	79,3;99,1	84,2	75,4;90,8	Oui, tout à fait
6,1**	0,7;21,2	1,3**	0,0;7,6	13,0**	4,6;26,9	5,3**	2,5;9,6	2,4**	0,1;11,9	6,5**	0,9;20,7	13,1**	7,3;21,1	Oui, en partie
-	;	-	;	2,8**	0,1;15,8	0,5**	0,0;2,7	2,6**	0,1;13,6	-	;	2,7**	0,5;7,8	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
68,2	49,5;83,4	75,4	64,2;84,5	65,8	50,9;78,7	72,8	66,0;78,9	67,6	51,1;81,4	69,8	51,6;84,4	60,3	51,3;69,2	Toujours
28,9**	14,2;47,8	22,0*	13,6;32,5	28,1*	16,5;42,5	24,1	18,2;30,8	23,6**	11,6;39,8	24,3**	11,0;42,6	26,3*	18,2;35,7	La plupart du temps
2,9**	0,1;15,4	1,3**	0,0;7,2	3,6**	0,4;12,9	2,6**	0,9;5,9	2,8**	0,1;14,3	3,0**	0,0;17,0	7,0**	2,6;14,5	À l'occasion
-	;	1,3**	0,0;7,3	2,5**	0,1;13,0	0,5**	0,0;2,9	6,1**	0,8;19,8	2,9**	0,1;15,9	6,5**	2,6;13,0	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
45,8*	26,9;65,6	69,2	57,2;79,5	51,1*	35,2;66,9	63,5	56,0;71,0	56,8	39,5;73,0	59,8	41,3;76,5	48,9	39,2;58,6	Oui, tout à fait
26,0**	11,6;45,7	11,5**	5,2;21,2	15,6**	5,4;32,4	16,0*	10,7;22,8	16,0**	6,3;31,2	24,1**	10,9;42,2	16,4*	10,0;24,8	Oui, en partie
28,2**	13,4;47,4	19,4*	11,3;29,8	33,3*	19,3;49,8	20,4*	14,6;27,4	27,2**	13,6;44,9	16,1**	5,5;33,5	34,6	25,8;43,4	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	82,8	79,5;85,8	82,5	70,4;91,1
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	10,7	8,3;13,1	11,6**	4,8;22,5
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	6,5*	4,6;8,9	5,9**	1,5;15,2
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	88,5	85,5;91,1	86,1	74,8;93,6
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	9,0	6,6;11,8	9,4**	3,4;19,7
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	2,5**	1,4;4,3	4,6**	0,9;13,0
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	87,8	82,8;91,7	87,7	73,1;96,0
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	7,2*	4,3;11,2	7,3**	1,6;19,5
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	5,0**	2,6;8,8	5,1**	0,5;17,9
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	73,8	68,9;78,6	62,3*	38,5;82,5
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	18,2	14,1;22,9	22,3**	6,3;48,0
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	8,0*	5,1;11,8	15,4**	3,8;36,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
71,0	53,2;85,1	81,2	70,0;89,6	86,4	74,3;94,2	85,3	79,5;89,9	91,7	76,7;98,4	88,5	73,4;96,7	77,4	68,3;84,9	Aucun report
23,6**	10,8;41,1	11,9**	5,1;22,5	1,7**	0,1;8,5	11,1*	7,0;16,5	3,1**	0,1;15,2	8,7**	2,0;22,6	12,5*	7,1;19,8	Un report
5,4**	0,6;19,0	6,9**	2,2;15,5	11,9**	4,6;23,6	3,6**	1,5;7,3	5,3**	0,6;18,2	2,9**	0,1;14,6	10,1**	5,1;17,4	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
96,4	82,0;99,9	91,7	78,5;98,1	100,0	;	90,5	85,2;94,4	90,4	75,3;97,8	83,7	63,5;95,3	83,5	75,5;89,7	Aucun report
-	;	6,2**	1,0;18,9	-	;	7,9**	4,3;13,1	9,6**	2,2;24,7	12,8**	2,8;32,9	13,1*	7,6;20,5	Un report
3,6**	0,1;18,0	2,1**	0,0;12,0	-	;	1,6**	0,3;4,7	-	;	3,5**	0,1;17,0	3,4**	1,0;8,1	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
92,2	60,3;99,9	-	;	92,9	80,2;98,6	85,5	76,4;92,0	100,0	;	83,3	61,4;95,6	86,3	67,9;96,3	Aucun report
7,8**	0,1;39,7	100,0	;	2,5**	0,0;14,4	9,4**	4,2;17,5	-	;	10,5**	1,5;31,5	5,9**	0,6;20,6	Un report
-	;	-	;	4,6**	0,5;16,0	5,2**	1,5;12,3	-	;	6,2**	0,2;29,1	7,7**	0,9;25,9	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
49,8**	18,9;80,8	63,6	46,8;78,3	70,3*	31,8;94,7	77,0	69,6;83,4	86,6	68,4;96,5	74,3*	32,9;96,9	76,1	52,6;91,8	Aucun report
33,7**	9,3;67,1	27,9**	14,3;45,3	7,7**	0,1;39,1	18,0*	12,3;24,9	6,7**	0,9;21,9	12,4**	0,3;53,8	14,6**	3,2;36,7	Un report
16,4**	1,6;50,6	8,5**	2,0;21,7	21,9**	2,2;62,2	5,0**	2,1;9,7	6,6**	0,7;22,8	13,3**	0,2;57,8	9,3**	0,9;31,7	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	9,2	6,9;12,0	13,7**	5,4;26,8
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	4,8*	3,2;6,9	4,7**	0,9;13,4
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	85,9	82,8;88,7	81,6	68,3;91,1
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	27,4	23,8;31,0	54,9	42,1;67,8
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	11,7	9,1;14,3	3,1**	0,4;10,9
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	60,9	56,9;64,9	42,0*	29,0;54,9
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	58,3	54,5;62,0	61,1	47,1;73,8
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	2,1**	1,1;3,6	1,5**	0,0;7,9
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	39,6	35,8;43,4	37,4*	24,8;51,4
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	11,0	8,5;13,5	6,3**	1,7;15,5
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	6,9	5,2;9,1	9,0**	3,4;18,6
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	82,1	79,2;85,0	84,7	74,0;92,2
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	11,2	8,6;14,2	21,4**	11,4;34,9
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	4,3*	2,8;6,2	4,4**	1,0;12,2
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	84,5	81,1;87,5	74,2	60,1;85,3
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	30,4	26,6;34,1	50,4	38,3;62,5
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	5,1*	3,4;7,3	7,6**	2,3;17,7
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	64,6	60,7;68,4	42,0*	29,3;54,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	6,8**	2,1;15,6	6,3**	1,3;17,5	10,1*	6,3;15,3	13,3**	4,4;28,7	18,8**	7,7;35,4	7,1**	3,2;13,3	Oui
-	;	4,1**	0,9;11,5	12,2**	4,8;24,2	8,0**	4,4;13,2	-	;	-	;	1,6**	0,2;5,9	Non, mais il aurait souhaité le consulter
100,0	;	89,0	79,3;95,3	81,6	67,7;91,3	81,8	75,5;87,1	86,7	71,3;95,6	81,2	64,6;92,3	91,3	84,7;95,8	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
30,0**	15,7;47,8	10,9**	4,7;20,7	57,5	42,0;72,1	16,0*	11,0;22,1	54,1	37,8;69,7	28,9**	14,4;47,6	16,6*	10,1;25,1	Oui
6,2**	0,6;21,7	4,4**	1,0;11,9	14,0**	5,4;27,7	19,9	14,3;26,4	5,5**	0,7;18,7	13,6**	3,9;30,9	10,6**	5,4;18,2	Non, mais il aurait souhaité le consulter
63,8	45,4;79,7	84,7	74,1;92,2	28,5*	15,8;44,3	64,1	57,1;71,2	40,4*	25,1;57,2	57,5*	38,6;74,9	72,8	63,6;80,7	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
52,1*	33,2;70,5	43,9	32,4;55,4	84,0	71,5;92,5	63,4	56,8;70,1	58,5	41,0;74,6	68,6	49,8;83,8	45,7	36,5;54,9	Oui
-	;	1,3**	0,0;7,0	-	;	3,0**	1,2;6,3	2,8**	0,1;14,8	6,7**	0,7;22,8	1,6**	0,2;5,6	Non, mais il aurait souhaité le consulter
47,9*	29,5;66,8	54,8	43,2;66,3	16,0**	7,5;28,5	33,5	27,0;40,1	38,7*	23,1;56,1	24,7**	11,3;43,0	52,7	43,5;61,9	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
11,5**	3,3;26,8	-	;	30,9*	18,2;46,1	15,8*	11,1;21,7	7,9**	1,5;21,8	15,4**	4,9;33,2	4,1**	1,5;8,8	Oui
12,7**	3,2;30,9	5,3**	1,5;12,8	3,6**	0,4;12,9	7,8*	4,6;12,3	2,5**	0,1;12,9	13,2**	3,7;30,3	5,2**	1,9;11,0	Non, mais il aurait souhaité le consulter
75,8	56,6;89,5	94,7	87,2;98,5	65,5	50,0;78,9	76,3	69,7;82,1	89,6	75,0;97,2	71,5	52,9;85,9	90,7	84,3;95,1	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
11,8**	3,2;28,0	2,4**	0,1;13,2	22,9**	12,1;37,2	11,5*	7,1;17,3	4,8**	0,6;16,5	11,6**	3,1;27,4	7,4**	3,3;14,0	Oui
2,9**	0,1;15,6	-	;	6,1**	1,1;18,0	8,4*	4,9;13,1	2,8**	0,1;14,4	3,0**	0,1;15,4	1,5**	0,1;7,4	Non, mais il aurait souhaité le consulter
85,2	68,7;95,1	97,6	86,8;99,9	71,0	55,2;83,8	80,1	73,6;85,7	92,4	79,4;98,4	85,4	69,0;95,2	91,1	83,7;95,9	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
12,2**	2,8;30,8	31,2*	21,1;41,3	25,4**	13,8;40,3	35,7	28,9;42,5	15,9**	6,0;31,7	37,8*	21,1;56,9	21,0*	13,9;29,7	Oui
2,8**	0,1;14,8	1,3**	0,1;6,3	4,5**	0,4;16,8	7,2**	3,8;12,1	4,9**	0,5;17,1	9,3**	1,9;25,1	2,6**	0,5;7,7	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
85,0	67,0;95,4	67,5	57,3;77,6	70,1	54,8;82,6	57,1	50,1;64,1	79,2	62,6;90,8	52,9*	33,8;71,4	76,4	67,4;84,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	12,9	10,3;15,9	8,9**	3,3;18,3
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	11,0	8,6;13,9	12,2**	5,5;22,5
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	76,1	72,7;79,5	78,9	67,2;88,0
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	9,5	7,3;12,1	5,2**	1,1;14,1
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	7,4*	5,3;10,0	7,7**	2,5;17,3
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	83,1	79,8;86,1	87,1	76,7;94,0
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	10,6	8,3;13,4	13,6**	6,0;25,2
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	12,5	9,9;15,6	11,9**	5,2;22,2
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	76,9	73,5;80,2	74,5	61,5;85,0
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	11,2	8,7;13,6	7,3**	2,4;16,1
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	4,5*	2,9;6,7	4,6**	0,9;13,1
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	84,3	81,0;87,2	88,1	77,8;94,8
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	7,4*	5,4;9,9	21,2*	12,0;33,3
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	13,1	10,3;16,4	6,2**	1,5;16,2
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	79,5	76,1;82,9	72,6	59,2;83,5
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	5,6*	3,9;7,7	7,6**	2,6;16,3
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	4,9*	3,2;7,0	2,9**	0,4;9,5
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	89,5	86,8;91,9	89,6	80,0;95,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
24,6**	10,8;43,6	5,3**	1,4;13,3	15,9**	6,9;29,7	19,2*	13,8;25,6	12,5**	4,0;27,3	15,0**	5,2;31,2	5,5**	2,1;11,5	Oui
12,6**	3,6;29,2	7,1**	2,5;15,4	22,1**	11,0;37,2	15,0*	10,4;20,8	2,6**	0,1;13,3	12,9**	3,5;30,4	3,7**	1,0;9,2	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
62,8	43,7;79,4	87,6	77,8;94,2	61,9	46,8;75,5	65,8	58,9;72,7	84,9	69,3;94,5	72,2	53,8;86,3	90,8	83,2;95,7	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
6,8**	0,8;22,3	2,7**	0,4;9,3	5,1**	1,2;13,8	22,4	16,7;29,1	7,3**	1,3;21,3	2,6**	0,0;14,8	2,4**	0,5;6,7	Oui
5,7**	0,6;19,9	4,0**	0,8;11,2	15,6**	6,2;30,1	5,8**	2,9;10,2	5,1**	0,7;16,8	18,9**	6,9;37,8	5,8**	2,2;12,0	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
87,5	70,8;96,6	93,3	85,1;97,8	79,3	64,8;89,9	71,8	64,7;78,1	87,6	72,1;96,3	78,4	59,6;91,2	91,8	85,3;96,1	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
14,0**	4,4;30,6	4,3**	1,0;11,7	8,3**	1,9;21,6	15,4*	10,3;22,0	18,1**	7,3;34,6	12,1**	3,8;26,7	3,1**	0,8;8,0	Oui
5,5**	0,7;18,4	8,0**	2,9;17,0	20,3**	10,0;34,7	13,2*	8,8;18,7	17,7**	7,4;33,4	12,7**	3,6;29,5	11,2**	6,2;18,1	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
80,5	63,6;91,9	87,7	77,9;94,2	71,3	56,8;83,2	71,4	64,2;77,8	64,1	45,9;79,7	75,2	56,9;88,6	85,7	78,0;91,5	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
9,2**	1,8;25,4	11,0**	4,8;20,8	4,5**	0,5;15,7	21,3	15,6;28,0	12,7**	4,0;28,0	12,0**	3,3;28,2	1,5**	0,2;5,0	Oui
6,8**	0,8;22,9	1,3**	0,0;7,2	9,6**	2,9;22,0	4,7**	2,0;9,2	5,3**	0,6;18,1	3,5**	0,1;17,5	3,3**	0,9;8,4	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
84,0	66,0;94,8	87,7	77,4;94,5	85,9	71,7;94,7	74,0	66,8;80,4	82,1	66,1;92,7	84,4	67,6;94,6	95,2	90,1;98,1	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
9,3**	1,8;25,7	5,1**	1,0;14,9	3,4**	0,3;13,5	7,2**	4,0;11,9	3,1**	0,1;15,2	5,4**	0,6;18,6	5,0**	1,5;11,6	Oui
13,8**	4,3;30,3	4,3**	1,0;11,8	17,2**	7,5;31,8	16,8*	11,9;22,7	10,0**	2,8;23,7	18,0**	6,6;35,9	14,0**	7,4;23,1	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
77,0	59,1;89,7	90,5	80,1;96,6	79,4	64,4;90,2	76,0	69,5;81,8	87,0	71,3;95,9	76,6	57,7;90,0	81,1	71,6;88,4	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
9,2**	2,0;24,2	1,4**	0,0;8,0	6,1**	1,1;17,9	4,7**	2,1;9,0	2,7**	0,1;15,0	3,1**	0,1;15,6	8,7**	4,3;15,3	Oui
6,4**	0,6;22,9	2,6**	0,3;9,2	7,0**	1,7;18,1	5,8**	2,6;10,9	7,7**	1,5;21,6	9,6**	2,0;25,7	2,4**	0,5;6,9	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
84,4	67,4;94,7	96,0	88,5;99,2	86,9	73,8;95,0	89,5	83,9;93,7	89,6	75,4;97,1	87,3	70,3;96,5	88,9	81,6;94,0	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	5,5*	3,9;7,6	2,9**	0,4;10,0
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	94,5	92,4;96,1	97,1	90,0;99,6
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	11,3**	3,0;27,0	-	;
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	88,7	73,0;97,0	100,0	;
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	30,4**	15,0;49,8	-	;
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	69,6	50,2;85,0	100,0	;
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	49,8*	31,4;68,3	51,2**	0,7;99,4
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	50,2*	31,7;68,6	48,8**	0,6;99,3
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	3,4**	0,1;18,8	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	96,6	81,2;99,9	100,0	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	45,3*	27,6;63,8	-	;
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	54,7*	36,2;72,4	100,0	;
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	21,5**	9,1;39,3	-	;
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	78,5	60,7;90,9	100,0	;
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	35,6*	19,2;54,9	-	;
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	64,4	45,1;80,8	100,0	;
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	35,2*	18,9;54,3	51,2**	0,7;99,4
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	64,8	45,7;81,1	48,8**	0,6;99,3
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	22,6**	9,2;41,9	48,8**	0,6;99,3
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	77,4	58,1;90,8	51,2**	0,7;99,4
Soins infirmiers à domicile[r]													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	6,0**	0,8;19,8	-	;
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	94,0	80,2;99,2	100,0	;
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	5,2**	0,5;18,9	-	;
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	94,8	81,1;99,5	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p]
3,6**	0,1;17,3	3,7**	0,8;10,3	5,3**	0,8;16,4	7,4**	4,2;12,1	8,0**	1,6;21,8	10,0**	2,2;26,0	4,0**	1,1;10,0	Oui
96,4	82,7;99,9	96,3	89,7;99,2	94,7	83,6;99,2	92,6	87,9;95,8	92,0	78,2;98,4	90,0	74,0;97,8	96,0	90,0;98,9	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	33,3**	0,2;95,1	-	;	6,5**	0,2;30,8	-	;	30,2**	0,1;95,5	19,5**	0,1;81,1	Oui
100,0	;	66,7**	4,9;99,8	100,0	;	93,5	69,2;99,8	100,0	;	69,8**	4,5;99,9	80,5**	18,9;99,9	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	-	;	-	;	39,7**	15,6;68,2	62,5**	4,5;99,4	35,4**	0,4;95,1	35,7**	1,1;91,6	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	60,3*	31,8;84,4	37,5**	0,6;95,5	64,6**	4,9;99,6	64,3**	8,4;98,9	Non
														Psychologue
-	;	-	;	33,8**	0,3;95,0	47,4**	19,7;76,3	32,9**	0,2;94,7	100,0	;	80,5**	18,9;99,9	Oui
100,0	;	100,0	;	66,2**	5,0;99,7	52,6**	23,7;80,3	67,1**	5,3;99,8	-	;	19,5**	0,1;81,1	Non
														Travailleur social
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	34,4**	0,3;94,9	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	65,6**	5,1;99,7	100,0	;	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
-	;	-	;	32,5**	0,4;92,7	66,3*	35,9;89,2	32,9**	0,2;94,7	100,0	;	22,0**	0,1;86,1	Oui
100,0	;	100,0	;	67,5**	7,3;99,6	33,7**	10,8;64,1	67,1**	5,3;99,8	-	;	78,0**	13,9;99,9	Non
														Médicaments
100,0	;	32,4**	0,2;94,5	33,8**	0,4;94,2	6,4**	0,2;31,0	37,5**	0,6;95,5	35,4**	0,4;95,1	19,5**	0,1;81,1	Oui
-	;	67,6**	5,5;99,8	66,2**	5,8;99,6	93,6	69,0;99,8	62,5**	4,5;99,4	64,6**	4,9;99,6	80,5**	18,9;99,9	Non
														Services de transport
-	;	66,7**	4,9;99,8	-	;	26,1**	6,6;56,8	70,3**	4,4;99,9	35,4**	0,4;95,1	64,3**	8,4;98,9	Oui
100,0	;	33,3**	0,2;95,1	100,0	;	73,9*	43,2;93,4	29,7**	0,1;95,6	64,6**	4,9;99,6	35,7**	1,1;91,6	Non
														Services d'aide à domicile
-	;	-	;	66,2**	5,0;99,7	27,0**	7,6;56,3	37,5**	0,6;95,5	35,4**	0,4;95,1	58,5**	5,7;98,3	Oui
100,0	;	100,0	;	33,8**	0,3;95,0	73,0*	43,7;92,4	62,5**	4,5;99,4	64,6**	4,9;99,6	41,5**	1,7;94,3	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
-	;	32,4**	0,2;94,5	-	;	20,4**	4,0;50,5	-	;	35,4**	0,4;95,1	35,7**	1,1;91,6	Oui
100,0	;	67,6**	5,5;99,8	100,0	;	79,6	49,5;96,0	100,0	;	64,6**	4,9;99,6	64,3**	8,4;98,9	Non
														Soins infirmiers à domicile
-	;	-	;	-	;	6,5**	0,2;30,8	37,5**	0,6;95,5	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	93,5	69,2;99,8	62,5**	4,5;99,4	100,0	;	100,0	;	Non
														Autres services ou ressources
-	;	-	;	-	;	13,2**	1,6;40,7	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	86,8	59,3;98,4	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	98,0	96,1;99,1	97,2	86,8;99,9
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	2,0**	0,9;3,9	2,8**	0,1;13,2
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	47,1	42,9;51,3	44,8	32,0;57,6
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	4,3*	2,7;6,4	7,9**	2,7;17,1
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	28,3	24,4;32,2	24,5*	14,3;37,5
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	20,3	17,1;23,6	22,8*	13,0;35,3
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	38,7	34,7;42,7	36,0*	23,4;50,2
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	11,4	8,8;14,3	14,3**	6,9;25,1
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	27,4	23,7;31,1	25,1*	14,5;38,4
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	22,5	18,9;26,1	24,6*	13,9;38,3
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	4,9*	3,2;7,1	6,3**	1,2;17,6
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	5,7*	3,8;8,1	11,5**	4,0;24,2
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	18,4	15,3;21,7	11,2**	4,6;21,9
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	10,9	8,5;13,7	16,5**	7,6;29,5
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	51,5	47,2;55,8	46,4	32,9;59,9
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	8,7	6,5;11,4	8,2**	2,7;18,2
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	0,5**	0,1;1,4	-	;
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	6,8*	4,9;9,2	6,6**	1,5;17,5
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	92,7	90,3;94,6	93,4	82,5;98,5
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	89,9	87,1;92,3	93,4	83,7;98,3
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	8,5	6,3;11,1	6,6**	1,7;16,3
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	1,6**	0,7;3,0	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
100,0	;	98,8	93,3;100,0	100,0	;	97,3	92,7;99,4	100,0	;	100,0	;	96,2	89,0;99,2	Oui
-	;	1,2**	0,0;6,7	-	;	2,7**	0,6;7,3	-	;	-	;	3,8**	0,8;11,0	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
56,6*	37,5;74,4	38,1	27,1;50,2	85,6	72,6;94,0	49,8	42,4;57,3	29,4**	15,3;47,1	29,8**	14,1;49,9	41,6	32,0;51,2	Médecin spécialiste du cancer
3,1**	0,1;16,2	1,7**	0,1;8,2	2,2**	0,1;11,4	3,3**	1,0;8,1	8,0**	1,6;22,2	-	;	6,5**	2,7;12,9	Médecin de famille
33,8**	17,2;54,1	38,3	27,6;48,9	2,0**	0,1;9,7	17,7*	12,2;24,5	34,3*	19,5;51,6	53,9*	33,9;73,1	40,4	30,7;50,2	Autre médecin spécialiste
6,4**	0,7;22,2	21,9*	13,0;33,3	10,3**	3,3;22,6	29,1	22,5;36,4	28,3**	15,2;44,9	16,3**	5,0;35,5	11,5**	5,9;19,4	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
35,9**	18,8;56,2	36,0	25,5;46,4	74,6	59,4;86,4	39,4	31,9;46,8	20,4**	8,9;37,0	30,1**	15,4;48,5	35,0	25,7;44,3	Médecin spécialiste du cancer
11,9**	2,6;30,6	8,4**	3,2;17,1	6,8**	1,3;19,5	10,9*	6,4;17,1	16,7**	6,1;33,7	8,3**	1,7;22,8	13,2**	7,2;21,7	Médecin de famille
29,0**	13,1;49,7	40,3	29,7;51,0	-	;	21,6	15,7;28,6	27,0**	13,6;44,4	37,4*	21,1;56,1	37,6	27,9;47,3	Autre médecin spécialiste
23,2**	9,8;42,4	15,3**	8,2;25,3	18,6**	8,4;33,3	28,1	21,7;35,2	35,8*	21,1;52,8	24,1**	10,6;42,9	14,1*	8,2;22,1	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
3,6**	0,1;19,5	2,6**	0,3;9,2	2,1**	0,0;12,0	2,7**	0,6;7,1	5,3**	0,6;17,7	5,7**	0,7;19,4	10,1**	4,7;18,3	Au besoin
3,1**	0,1;17,3	-	;	14,4**	5,1;29,7	2,7**	0,7;7,1	-	;	21,1**	8,9;38,8	5,3**	2,1;10,8	À tous les mois
18,4**	6,1;38,4	15,6**	8,1;26,1	32,6*	18,2;49,9	12,7*	8,2;18,4	34,0*	18,6;52,3	24,6**	11,3;42,9	19,5*	12,4;28,3	À tous les 2 ou 3 mois
4,2**	0,1;20,0	9,4**	4,1;18,0	16,1**	6,6;30,7	12,7*	8,5;18,1	7,5**	1,8;19,3	9,0**	1,7;25,1	7,1**	2,9;14,2	À tous les 4 mois
58,7*	38,8;76,7	63,4	51,1;74,5	33,0*	19,6;48,8	59,5	52,1;67,0	45,5*	28,8;63,0	39,5*	22,5;58,7	45,7	35,7;55,7	À tous les 6 mois
11,9**	2,5;31,1	9,0**	3,7;17,6	1,8**	0,1;9,2	9,7*	5,8;15,0	7,8**	1,5;21,9	-	;	12,2**	6,5;20,3	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
3,2**	0,1;17,2	-	;	1,8**	0,1;9,2	0,6**	0,0;3,2	-	;	-	;	-	;	Trop long
6,8**	1,0;21,6	5,3**	1,4;13,2	1,8**	0,0;9,9	7,2**	3,8;12,0	13,0**	4,2;28,3	3,2**	0,1;16,5	8,5**	3,9;15,6	Trop court
89,9	74,1;97,7	94,7	86,8;98,6	96,4	87,9;99,5	92,3	87,3;95,7	87,0	71,7;95,8	96,8	83,5;99,9	91,5	84,4;96,1	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
93,3	76,9;99,3	91,6	82,4;96,9	95,9	86,6;99,5	86,1	80,5;90,5	86,6	71,7;95,4	94,2	79,1;99,4	89,4	81,8;94,6	Tout à fait capable
3,4**	0,1;17,3	5,4**	1,4;13,5	4,1**	0,5;13,4	11,8*	7,6;17,2	13,4**	4,6;28,3	5,8**	0,6;20,9	8,8**	4,1;16,1	En partie capable
3,4**	0,1;18,1	3,0**	0,3;10,9	-	;	2,2**	0,6;5,4	-	;	-	;	1,8**	0,2;6,2	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	56,5	52,4;60,7	58,5	45,7;71,2
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	18,1	15,1;21,5	21,7**	11,4;35,4
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	25,4	21,7;29,1	19,8**	10,5;32,4
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	53,5	44,7;62,2	92,9	64,2;99,9
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	46,5	37,8;55,3	7,1**	0,1;35,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
49,5*	29,7;69,5	70,4	59,1;80,2	56,4	40,1;71,8	58,0	50,6;65,4	38,3*	23,3;55,2	73,4	54,7;87,5	47,9	38,0;57,8	Oui, tout à fait
14,2**	3,8;33,1	16,3**	9,0;26,1	18,5**	8,2;33,7	19,4*	13,6;26,4	28,7**	14,9;46,3	14,6**	4,9;30,7	13,6*	7,8;21,6	oui, en partie
36,3**	18,8;56,9	13,3**	6,4;23,5	25,0**	13,2;40,5	22,6	16,7;29,5	33,0*	18,4;50,3	12,0**	2,9;29,9	38,5	28,3;48,7	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
23,7**	0,1;87,1	27,6**	2,1;75,4	53,8**	24,7;81,0	50,9	37,2;64,7	50,0**	14,7;85,4	30,8**	3,6;75,3	54,9*	29,3;78,8	Oui
76,3**	12,9;99,9	72,4**	24,6;97,9	46,2**	19,0;75,3	49,1	35,3;62,8	50,0**	14,6;85,3	69,2**	24,7;96,4	45,1**	21,2;70,7	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	24,4	21,2;27,6	24,9*	14,9;37,4
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	50,2	46,3;54,2	53,5	40,9;66,1
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	25,4	21,8;28,9	21,6*	12,4;33,3
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	23,5	20,0;26,9	29,2*	18,1;42,4
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	45,2	41,2;49,2	42,4*	29,6;55,1
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	31,3	27,5;35,2	28,4*	17,0;42,4
Modification de l'alimentation[p]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	41,5	37,6;45,3	55,8	43,3;68,3
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	27,3	23,9;30,6	20,3**	11,0;32,8
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	31,3	27,5;35,0	23,9*	14,2;36,1
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	14,3	11,6;17,5	12,7**	5,8;23,1
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	10,2	8,0;12,5	4,0**	0,9;11,3
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	75,4	72,0;78,9	83,3	72,4;91,2
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	1,2**	0,5;2,5	-	;
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	1,5**	0,7;3,0	2,7**	0,3;9,8
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	97,3	95,5;98,5	97,3	90,2;99,7
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	7,4	5,4;9,8	2,7**	0,3;10,2
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	10,5	8,2;12,9	16,5**	7,9;28,8
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	82,1	79,1;85,1	80,8	68,5;89,9
Gestion du stress[p]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	37,5	33,9;41,1	41,1	29,2;52,9
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	21,8	18,4;25,1	18,6**	9,7;30,8
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	40,7	36,8;44,7	40,3*	28,3;52,4

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p]
20,1**	8,6;37,0	19,3*	11,4;29,6	38,8*	25,5;53,3	26,1	19,9;33,1	19,7**	8,5;36,1	31,1**	16,3;49,4	19,5*	12,7;27,9	Oui
49,7*	31,1;68,4	48,5	37,7;59,3	39,7*	26,2;54,5	47,5	40,1;54,9	49,6*	33,4;65,8	46,8*	29,1;65,2	59,2	50,0;68,4	Non
30,1**	15,4;48,7	32,2*	21,9;44,1	21,5**	11,4;34,9	26,4	20,2;33,4	30,7*	16,7;47,8	22,1**	9,2;40,7	21,3*	14,4;29,8	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
35,6*	20,0;53,7	17,6**	9,5;28,5	30,4*	17,6;46,0	21,7	16,0;27,4	31,3**	16,8;49,1	19,7**	7,9;37,4	19,0*	12,6;27,0	Oui
39,3*	22,5;58,3	54,6	44,1;65,2	30,4*	18,0;45,3	45,4	38,0;52,8	43,0*	26,8;60,3	35,7*	19,7;54,4	51,8	42,5;61,2	Non
25,1**	11,9;42,9	27,8*	18,6;38,6	39,2*	25,0;54,9	33,0	26,0;39,9	25,7**	13,0;42,4	44,6*	26,8;63,4	29,1	21,1;38,3	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p]
57,8*	38,6;75,4	25,3*	15,4;37,5	64,8	50,0;77,8	39,9	33,1;46,8	43,8*	27,5;61,2	22,9**	10,7;39,5	35,9	26,8;45,0	Oui
9,3**	1,8;25,6	42,2	31,5;52,8	14,1**	6,0;26,6	25,4	19,3;32,3	27,8**	14,3;45,0	34,6*	19,5;52,4	32,6	24,2;41,1	Non
33,0**	17,4;51,9	32,5*	22,4;42,6	21,1**	10,7;35,1	34,7	27,4;41,9	28,4*	15,6;44,5	42,5*	25,4;61,1	31,5	22,2;40,7	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
5,7**	0,6;19,8	10,0**	4,4;18,9	11,3**	4,0;24,0	15,1*	10,2;21,2	24,3**	11,8;41,1	37,3*	21,5;55,4	11,3**	6,0;18,7	Oui
11,5**	3,1;27,6	8,4**	3,4;16,6	8,7**	2,4;21,1	9,4*	5,8;14,3	13,2**	4,1;29,1	5,8**	0,8;18,8	16,2*	10,2;23,9	Non
82,8	64,7;94,0	81,6	71,1;89,5	79,9	65,8;90,2	75,5	69,5;81,4	62,5	45,7;77,2	56,9	39,1;73,4	72,5	62,9;80,8	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	-	;	1,7**	0,1;8,2	1,0**	0,1;3,7	2,2**	0,1;11,2	3,5**	0,1;17,5	1,9**	0,2;6,6	Oui
-	;	-	;	4,6**	0,6;15,8	1,0**	0,1;3,5	-	;	-	;	2,5**	0,3;8,7	Non
100,0	;	100,0	;	93,7	82,6;98,7	98,0	94,9;99,5	97,8	88,8;99,9	96,5	82,5;99,9	95,6	89,4;98,7	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
-	;	8,8**	3,5;17,8	4,4**	0,4;16,6	7,0**	3,5;12,2	22,2**	10,7;38,1	12,1**	3,3;28,5	7,0**	3,2;12,9	Oui
15,3**	4,8;33,2	17,0*	9,6;26,7	3,5**	0,4;12,1	8,7**	4,9;14,0	8,1**	1,7;21,7	8,6**	1,6;24,0	9,2**	4,5;16,1	Non
84,7	66,8;95,2	74,2	62,9;83,6	92,1	79,4;98,2	84,3	78,0;89,5	69,7	53,9;82,7	79,2	62,1;91,1	83,8	75,5;90,2	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p]
35,2*	19,3;53,9	21,2*	12,6;32,2	45,3*	31,7;58,8	50,5	43,2;57,7	17,2**	7,0;32,7	40,6*	25,1;57,7	29,3	21,1;38,7	Oui
18,3**	6,6;36,7	30,5*	20,4;42,2	20,1**	9,8;34,5	18,6*	13,3;25,1	26,0**	13,5;42,2	8,5**	1,9;22,4	26,6*	18,5;35,9	Non
46,6*	28,7;65,1	48,3	36,7;59,9	34,6*	21,2;50,1	30,9	24,1;37,6	56,8	40,0;72,5	50,8*	33,3;68,2	44,1	35,4;52,8	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	41,1	37,1;45,0	32,0*	21,4;44,3
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	16,4	13,5;19,2	21,3**	11,7;33,8
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	42,6	38,5;46,6	46,7	34,1;59,3
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	0,6**	0,2;1,5	-	;
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	99,4	98,5;99,8	100,0	;
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	0,5**	0,1;1,8	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	99,5	98,2;99,9	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]
25,4**	12,3;42,8	19,3*	11,5;29,3	41,7*	27,2;57,3	54,9	47,5;62,3	50,0*	33,4;66,7	45,6*	28,5;63,4	39,7	30,7;48,7	Oui
28,0**	13,6;46,6	32,5*	22,1;44,4	17,0**	7,8;30,5	4,5**	2,0;8,5	6,1**	0,7;20,8	12,1**	3,1;29,4	21,4*	14,2;30,1	Non
46,6*	28,9;65,0	48,2	37,8;58,6	41,3*	27,1;56,7	40,6	33,2;48,0	43,8*	28,2;60,4	42,3*	25,3;60,7	38,9	29,8;48,0	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
-	;	-	;	-	;	1,0**	0,1;3,6	2,4**	0,0;13,1	-	;	0,8**	0,0;4,1	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	99,0	96,4;99,9	97,6	86,9;100,0	100,0	;	99,2	95,9;100,0	Non
														Autre
-	;	-	;	5,5**	0,6;18,7	-	;	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	94,5	81,3;99,4	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	52,2	43,7;60,6	68,3*	38,1;90,2
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	47,8	39,4;56,3	31,7**	9,8;61,9
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	84,5	79,0;88,9	89,3	73,1;97,5
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	15,5*	11,1;21,0	10,7**	2,5;26,9
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	50,2	40,8;59,6	46,9**	21,4;73,7
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	49,8	40,4;59,2	53,1*	26,3;78,6
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	28,1	20,2;37,1	28,5**	8,1;58,5
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	71,9	62,9;79,8	71,5*	41,5;91,9
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	17,7*	11,6;25,4	18,6**	3,2;48,3
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	82,3	74,6;88,4	81,4	51,7;96,8
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	49,9	43,0;56,7	22,9**	7,9;45,7
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	50,1	43,3;57,0	77,1	54,3;92,1
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	65,5	59,2;71,8	68,1	48,9;83,7
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	34,5	28,2;40,8	31,9**	16,3;51,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
44,9**	9,2;85,3	32,0**	5,5;72,2	59,0*	27,3;85,9	45,0	32,5;57,5	63,9**	17,4;95,9	43,8**	11,9;80,1	62,2*	39,8;81,3	Oui
55,1**	14,7;90,8	68,0*	27,8;94,5	41,0**	14,1;72,7	55,0	42,5;67,5	36,1**	4,1;82,6	56,2**	19,9;88,1	37,8**	18,7;60,2	Non
														Soutien de la famille ou des amis
82,5	54,9;96,7	92,1	72,9;99,2	86,0	63,5;97,2	85,0	75,1;92,0	82,0	54,0;96,6	93,0	65,7;99,8	75,8	61,1;87,1	Oui
17,5**	3,3;45,1	7,9**	0,8;27,1	14,0**	2,8;36,5	15,0**	8,0;24,9	18,0**	3,4;46,0	7,0**	0,2;34,3	24,2**	12,9;38,9	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
59,4**	10,2;96,6	17,1**	0,4;66,4	44,1**	9,2;84,3	51,0	35,5;66,4	52,0**	20,7;82,2	73,1*	32,0;96,5	50,5*	28,9;72,0	Oui
40,6**	3,4;89,8	82,9*	33,6;99,6	55,9**	15,7;90,8	49,0*	33,6;64,5	48,0**	17,8;79,3	26,9**	3,5;68,0	49,5*	28,0;71,1	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
37,7**	3,1;87,2	14,6**	0,4;58,5	13,0**	0,2;56,2	31,3*	18,2;47,1	-	;	36,5**	0,4;95,9	33,4**	15,0;56,4	Oui
62,3**	12,8;96,9	85,4*	41,5;99,6	87,0	43,8;99,8	68,7	52,9;81,8	100,0	;	63,5**	4,1;99,6	66,6*	43,6;85,0	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
12,0**	0,2;53,9	10,0**	0,2;45,1	39,9**	12,6;72,8	21,6**	11,4;35,3	23,2**	0,1;85,9	14,7**	0,3;60,6	3,4**	0,1;17,9	Oui
88,0	46,1;99,8	90,0	54,9;99,8	60,1**	27,2;87,4	78,4	64,7;88,6	76,8**	14,1;99,9	85,3*	39,4;99,7	96,6	82,1;99,9	Non
														Exemple de l'entourage[p]
64,9*	33,7;88,8	55,1*	27,9;80,2	38,6**	15,0;67,0	51,3	40,6;62,0	62,5*	29,2;88,8	51,5**	17,9;84,1	54,8*	37,0;71,8	Oui
35,1**	11,2;66,3	44,9**	19,8;72,1	61,4*	33,0;85,0	48,7	38,0;59,4	37,5**	11,2;70,8	48,5**	15,9;82,1	45,2*	28,2;63,0	Non
														Prière ou soutien spirituel[p]
73,6*	39,3;94,6	43,5**	18,3;71,4	46,8**	20,6;74,4	69,4	60,1;78,7	75,0*	39,9;95,4	70,7*	42,0;90,8	64,2	46,5;79,5	Oui
26,4**	5,4;60,7	56,5*	28,6;81,7	53,2**	25,6;79,4	30,6*	21,3;39,9	25,0**	4,6;60,1	29,3**	9,2;58,0	35,8*	20,5;53,5	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Lanaudière et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,0	8,6;13,8
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	0,3**	0,0;1,1	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	1,1**	0,3;2,6	-	;
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	10,5	8,2;13,3	4,2**	0,9;11,4
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	31,9	28,1;35,7	23,6*	13,3;36,9
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	56,2	52,0;60,4	72,2	58,9;83,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,3*	3,7;7,2	13,1	10,9;15,3	8,9	7,0;11,1	29,2	26,7;31,7	6,2	4,5;8,3	5,4*	3,8;7,5	20,9	17,8;23,9	Ensemble des patients
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic
-	;	-	;	-	;	0,5**	0,0;2,6	-	;	-	;	0,8**	0,0;4,4	Mauvaise
-	;	-	;	-	;	-	;	2,6**	0,1;13,6	3,5**	0,1;17,5	3,5**	0,7;10,5	Passable
18,5**	6,4;37,9	12,9**	6,0;23,2	8,3**	2,0;21,2	9,3*	5,6;14,3	10,5**	2,8;25,3	13,5**	3,7;31,5	12,5*	7,3;19,5	Bonne
36,6*	20,3;55,5	30,9*	20,8;42,4	28,5*	16,4;43,5	35,7	28,4;42,9	25,2**	13,6;40,1	36,3*	20,7;54,3	32,7	23,5;41,8	Très bonne
44,9*	26,3;64,6	56,3	45,5;67,1	63,2	47,9;76,8	54,5	46,7;62,4	61,7	44,1;77,3	46,6*	29,1;64,8	50,5	40,9;60,2	Excellente

Région 15

LAURENTIDES

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	46,4	45,2 ; 47,7
Femmes	53,9	53,6	52,3 ; 54,8
Âge			
18 à 49 ans	18,9	19,6	16,7 ; 22,5
50 à 59 ans	24,9	28,4	25,2 ; 31,6
60 à 69 ans	29,8	29,7	26,0 ; 33,3
70 ans et plus	26,5	22,3	19,8 ; 24,8
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	92,5	89,9 ; 94,6
Anglais	10,6	7,1*	5,1 ; 9,6
Autres	3,0	0,4**	0,0 ; 1,3
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	25,6	22,2 ; 29,0
Diplôme d'études secondaires	24,7	27,9	24,4 ; 31,4
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	30,4	26,7 ; 34,1
Diplôme d'études universitaires	20,6	16,1	13,3 ; 19,0
Occupation principale			
En emploi	29,3	30,8	27,6 ; 34,1
Étudiant	1,7	2,3*	1,3 ; 3,7
Retraité	55,8	54,0	50,6 ; 57,5
À la maison	7,2	7,2	5,3 ; 9,5
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	1,9**	0,9 ; 3,4
Congé de maternité / autres	3,6	3,7*	2,3 ; 5,5
Situation familiale			
Vit seul	24,1	19,5	16,5 ; 22,6
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	59,6	55,8 ; 63,4
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	14,1	11,5 ; 16,8
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	2,9*	1,7 ; 4,6
Autres	4,8	3,8*	2,4 ; 5,8
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	18,4	15,1 ; 22,0
Revenu suffisant	61,4	61,6	57,2 ; 65,9
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	20,0	16,5 ; 23,6
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	17,9	14,9 ; 20,9
2	21,1	22,7	19,6 ; 25,8
3	20,1	20,6	17,2 ; 23,9
4	19,4	21,7	18,5 ; 25,0
5 - très défavorisé	17,6	17,0	13,9 ; 20,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p, r]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	11,4	8,7 ; 14,5	15,1*	10,9 ; 20,2	8,1*	5,2 ; 12,1
Génital féminin	5,5	...	10,2	5,7*	4,1 ; 7,8	...	;	10,7*	7,6 ; 14,5
Prostate	15,9	34,4	...	16,0	13,6 ; 18,4	34,4	29,3 ; 39,5	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	8,2	6,2 ; 10,7	9,4*	6,3 ; 13,3	7,2*	4,6 ; 10,7
Sein	26,5	0,4**	48,8	28,2	25,5 ; 30,8	0,6**	0,1 ; 2,3	52,0	47,2 ; 56,9
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	5,4*	3,9 ; 7,4	4,6**	2,5 ; 7,7	6,1*	3,9 ; 9,1
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	6,3*	4,4 ; 8,5	7,7*	4,8 ; 11,6	5,0*	2,8 ; 8,0
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	18,8	15,7 ; 21,9	28,0	22,6 ; 33,5	10,8*	7,7 ; 14,7
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	85,0	81,8 ; 87,8	85,0	80,0 ; 89,2	85,0	80,4 ; 88,8
Récidive	7,4	7,5	7,3	6,0*	4,2 ; 8,2	7,1*	4,3 ; 10,9	5,1*	2,9 ; 8,1
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	9,0	6,8 ; 11,7	8,0*	4,9 ; 12,1	10,0*	6,9 ; 13,8
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	13,4	10,6 ; 16,5	15,0	11,0 ; 19,7	12,0*	8,5 ; 16,3
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	22,5	19,4 ; 25,6	4,5**	2,4 ; 7,7	37,7	32,4 ; 43,0
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	64,1	60,5 ; 67,7	80,5	75,5 ; 84,8	50,3	44,7 ; 55,8
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	39,1	35,2 ; 43,1	42,7	36,8 ; 48,7	36,0	30,8 ; 41,2
Non	58,8	56,6	60,7	60,9	56,9 ; 64,8	57,3	51,3 ; 63,2	64,0	58,8 ; 69,2
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	91,4	88,9 ; 93,5	91,6	87,5 ; 94,8	91,2	87,7 ; 94,0
Non	8,3	8,5	8,0	8,6	6,5 ; 11,1	8,4*	5,2 ; 12,5	8,8*	6,0 ; 12,3
Perception de l'état de santé[p, r]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	10,8	8,2 ; 13,8	13,5*	9,3 ; 18,8	8,4*	5,6 ; 12,1
Très bon	29,2	29,3	29,1	29,4	25,9 ; 33,0	31,9	26,2 ; 37,5	27,4	22,7 ; 32,0
Bon	34,9	34,2	35,5	35,7	32,0 ; 39,5	30,2	24,9 ; 35,5	40,5	35,1 ; 45,9
Moyen	18,8	17,8	19,6	17,7	14,8 ; 20,7	16,5	12,6 ; 21,2	18,7	14,6 ; 23,4
Mauvais	5,6	5,7	5,5	6,3*	4,5 ; 8,6	7,9*	5,0 ; 11,7	5,0*	2,9 ; 8,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p]
11,4	8,7 ; 14,5	4,0**	1,3 ; 9,0	8,3**	4,6 ; 13,4	11,9*	7,2 ; 18,2	21,1*	13,8 ; 30,1	Colorectal
5,7*	4,1 ; 7,8	7,4**	3,3 ; 14,0	8,1*	4,6 ; 13,1	4,0**	1,7 ; 7,9	3,4**	0,8 ; 9,1	Génital féminin
16,0	13,6 ; 18,4	3,1**	0,7 ; 8,7	15,0*	10,6 ; 20,2	27,3	21,4 ; 33,3	13,6*	8,7 ; 19,9	Prostate
8,2	6,2 ; 10,7	11,0**	5,7 ; 18,6	7,7**	4,3 ; 12,6	5,8**	2,8 ; 10,4	9,8**	5,2 ; 16,3	Hématopoïétique
28,2	25,5 ; 30,8	39,9	31,9 ; 48,0	33,3	27,5 ; 39,2	22,7	17,1 ; 28,3	18,5*	12,3 ; 26,1	Sein
5,4*	3,9 ; 7,4	8,8**	4,4 ; 15,4	5,4**	2,6 ; 9,8	5,2**	2,6 ; 9,2	2,9**	0,8 ; 7,1	ORL (Tête et cou)
6,3*	4,4 ; 8,5	4,7**	1,6 ; 10,4	7,8**	4,3 ; 12,7	4,9**	2,1 ; 9,3	7,5**	3,7 ; 13,4	Broncho-pulmonaire
18,8	15,7 ; 21,9	21,0*	13,7 ; 29,9	14,5*	9,8 ; 20,4	18,1*	12,9 ; 24,4	23,2*	15,3 ; 32,8	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
85,0	81,8 ; 87,8	92,2	86,2 ; 96,2	86,1	80,2 ; 90,8	81,3	75,4 ; 86,3	81,9	73,1 ; 88,8	Premier cancer
6,0*	4,2 ; 8,2	3,6**	1,1 ; 8,6	6,1**	3,0 ; 11,0	8,4*	4,9 ; 13,3	4,8**	1,9 ; 9,8	Récidive
9,0	6,8 ; 11,7	4,2**	1,5 ; 9,1	7,8**	4,3 ; 12,6	10,3*	6,3 ; 15,6	13,4**	7,4 ; 21,6	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]
13,4	10,6 ; 16,5	8,2**	3,8 ; 15,0	12,3*	7,8 ; 18,0	16,7*	11,3 ; 23,4	15,0*	8,9 ; 23,3	Sous traitement
22,5	19,4 ; 25,6	30,2	22,1 ; 38,4	23,3	17,7 ; 28,9	22,3	16,4 ; 29,1	14,6*	8,8 ; 22,3	Sans traitement avec médication
64,1	60,5 ; 67,7	61,6	52,7 ; 70,5	64,4	57,4 ; 71,3	61,0	54,0 ; 68,0	70,4	61,6 ; 78,2	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p]
39,1	35,2 ; 43,1	37,0	28,5 ; 45,5	36,5	29,8 ; 43,2	41,0	33,9 ; 48,2	42,1	32,3 ; 51,9	Oui
60,9	56,9 ; 64,8	63,0	54,5 ; 71,5	63,5	56,8 ; 70,2	59,0	51,8 ; 66,1	57,9	48,1 ; 67,7	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]
91,4	88,9 ; 93,5	84,5	76,5 ; 90,6	89,9	84,8 ; 93,7	92,5	87,6 ; 95,9	97,9	94,0 ; 99,6	Oui
8,6	6,5 ; 11,1	15,5*	9,4 ; 23,5	10,1*	6,3 ; 15,2	7,5**	4,1 ; 12,4	2,1**	0,4 ; 6,0	Non
										Perception de l'état de santé[p]
10,8	8,2 ; 13,8	16,6*	10,0 ; 25,2	9,8*	5,8 ; 15,2	8,8*	5,0 ; 14,1	9,6**	4,8 ; 16,6	Excellent
29,4	25,9 ; 33,0	22,9*	15,6 ; 31,5	34,2	27,2 ; 41,2	32,6	25,7 ; 39,5	25,1*	17,5 ; 34,0	Très bon
35,7	32,0 ; 39,5	33,9	25,6 ; 42,3	30,0	23,4 ; 36,7	36,0	28,8 ; 43,2	44,2	35,2 ; 53,1	Bon
17,7	14,8 ; 20,7	17,1*	10,7 ; 25,3	18,1*	12,8 ; 24,6	18,5*	13,2 ; 24,9	16,6*	10,1 ; 25,2	Moyen
6,3*	4,5 ; 8,6	9,5**	4,6 ; 17,0	7,9**	4,2 ; 13,2	4,1**	1,8 ; 7,8	4,6**	1,5 ; 10,2	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	50,4	46,3;54,4	60,7	47,8;72,6
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	49,6	45,6;53,7	39,3*	27,4;52,2
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	43,9	37,0;50,7	31,2**	15,0;51,6
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	17,2	12,6;22,8	16,0**	5,7;32,8
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	20,2	14,7;25,7	25,2**	11,5;43,9
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	18,7	13,5;24,9	27,6**	13,3;46,2
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	41,1	35,5;46,7	28,2**	12,2;49,6
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	18,1	13,8;23,0	23,6**	9,1;44,9
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	13,7	10,0;18,1	22,6**	8,6;43,1
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	15,8	12,4;19,7	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	11,4*	8,0;15,5	25,6**	10,2;47,3
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	48,6	43,1;54,1	52,4*	35,7;68,7
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	25,6	20,9;30,2	27,7**	14,1;45,1
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	14,9	11,1;19,3	2,6**	0,0;14,7
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	11,0*	7,7;15,1	17,3**	7,1;33,0
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	86,8	83,5;89,6	83,4	69,8;92,5
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	10,9	8,4;13,9	12,2**	4,3;25,7
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	2,3**	1,1;4,1	4,4**	0,9;12,1
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p, r]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	15,7	12,8;18,8	7,6**	2,4;17,0
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	84,3	81,2;87,2	92,4	83,0;97,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
67,1	49,5;81,8	7,9**	3,6;14,6	56,8	41,6;71,2	54,3	47,3;61,2	69,2	50,3;84,4	47,8*	31,1;64,9	61,9	51,9;71,9	Oui
32,9*	18,2;50,5	92,1	85,4;96,4	43,2*	28,8;58,4	45,7	38,8;52,7	30,8**	15,6;49,7	52,2*	35,1;68,9	38,1	28,1;48,1	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
28,9**	9,3;56,8	17,8**	0,1;75,2	51,1*	25,9;75,9	47,1	34,9;59,4	37,2**	16,5;62,0	29,8**	5,6;67,6	57,0	41,1;72,0	2 semaines et moins
18,0**	2,9;48,2	19,8**	0,2;76,3	29,5**	11,2;54,3	23,1*	13,7;35,1	17,2**	3,3;44,2	18,4**	1,9;54,5	5,4**	1,0;15,6	Plus de 2 semaines à 1 mois
12,8**	1,5;40,1	20,0**	0,2;77,2	14,8**	3,1;37,6	13,8**	6,6;24,5	40,5**	17,0;67,8	39,4**	10,8;74,9	18,8**	8,5;33,6	Plus d'un mois à 3 mois
40,2**	16,9;67,4	42,4**	4,3;90,0	4,7**	0,1;23,4	15,9**	8,1;26,9	5,1**	0,1;25,0	12,4**	0,2;54,3	18,7**	8,2;34,1	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
45,9**	15,6;78,7	56,4	46,1;66,8	27,5**	9,6;53,1	19,7*	11,5;30,4	56,2**	21,7;86,7	59,9*	33,2;82,9	50,8*	33,4;68,2	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
20,3**	1,9;60,0	25,3*	16,6;35,8	31,1**	12,1;56,4	4,5**	1,3;10,9	22,8**	2,8;61,7	20,7**	5,6;46,0	14,6**	5,4;29,6	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
22,0**	2,6;60,6	13,0**	7,0;21,3	17,5**	3,9;42,7	6,3**	2,2;13,7	10,6**	0,2;49,1	11,4**	1,4;35,3	21,1**	9,1;38,3	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	59,8	49,4;70,2	-	;	-	;	-	;	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
11,8**	0,3;51,8	5,2**	1,7;11,8	23,8**	7,1;49,9	9,7**	4,3;18,2	10,5**	0,3;46,4	8,0**	0,2;35,9	13,4**	5,0;27,1	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
58,0*	36,0;77,9	30,6*	18,5;45,1	57,9*	34,7;78,8	53,0	41,4;64,5	39,5**	19,0;63,1	52,7*	31,1;73,6	49,7	36,7;62,7	2 semaines et moins
22,9**	8,2;44,9	36,2*	23,0;51,0	15,0**	3,9;35,0	27,5*	17,7;39,4	19,3**	6,4;40,0	15,6**	3,8;37,4	24,8*	14,2;38,2	Plus de 2 semaines à 1 mois
14,8**	3,3;37,0	27,5*	15,6;42,3	16,4**	4,2;38,5	12,3**	6,1;21,4	23,7**	7,5;48,7	17,9**	4,7;41,1	11,3**	4,3;22,9	Plus d'un mois à 3 mois
4,3**	0,1;24,3	5,7**	1,3;15,5	10,7**	2,0;29,5	7,2**	2,7;14,9	17,5**	4,5;40,6	13,8**	2,7;36,3	14,2**	5,8;27,5	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
90,3	74,6;97,9	93,6	86,6;97,6	76,2	60,7;87,8	89,7	84,2;93,8	88,4	68,1;97,9	79,6	61,6;91,7	83,6	73,2;91,2	Oui, tout à fait
6,4**	0,8;21,1	5,3**	1,7;12,0	19,9**	9,4;34,8	9,2*	5,3;14,6	7,3**	0,7;25,5	17,5**	6,6;34,5	14,3**	7,5;23,9	Oui, en partie
3,3**	0,1;17,6	1,1**	0,0;6,4	3,9**	0,4;14,4	1,1**	0,1;4,1	4,3**	0,1;22,2	2,9**	0,0;16,6	2,1**	0,0;11,0	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p, r]
25,3**	12,6;41,9	25,5*	16,6;36,2	16,3**	7,5;29,1	15,3*	10,6;21,2	19,1**	6,8;38,4	3,0**	0,1;16,6	11,8**	6,2;19,9	Oui
74,7	58,1;87,4	74,5	63,8;83,4	83,7	70,9;92,5	84,7	78,8;89,4	80,9	61,6;93,2	97,0	83,4;99,9	88,2	80,1;93,8	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	12,1	9,6;14,7	4,2**	0,9;11,4
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	26,4	22,8;30,0	17,2**	9,1;28,2
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	29,8	25,9;33,8	63,9	50,9;75,6
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	27,1	23,4;30,9	8,9**	3,2;18,7
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	3,2*	1,9;4,9	4,4**	0,9;12,7
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	1,2**	0,5;2,2	-	;
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	0,2**	0,0;0,9	1,4**	0,0;7,5
Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	93,5	91,2;95,4	98,4	89,7;100,0
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	6,5*	4,6;8,8	1,6**	0,0;10,3
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	94,3	91,9;96,2	95,6	86,9;99,2
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	5,7*	3,8;8,1	4,4**	0,8;13,1
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	92,0	89,3;94,2	90,8	80,5;96,7
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	8,0*	5,8;10,7	9,2**	3,3;19,5
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	94,6	92,3;96,3	95,4	86,2;99,2
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	5,4*	3,7;7,7	4,6**	0,8;13,8
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	63,9	59,9;67,8	59,5	47,4;71,5
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	36,1	32,2;40,1	40,5*	28,5;52,6
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	63,2	59,2;67,1	66,6	53,7;77,9
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	36,8	32,9;40,8	33,4*	22,1;46,3
Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	61,0	56,0;66,0	60,4	43,7;75,6
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	39,0	34,0;44,0	39,6*	24,4;56,3
Contact pour du soutien pratique[3, p, r]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	71,5	68,0;75,0	68,2	54,9;79,7
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	28,5	25,0;32,0	31,8*	20,3;45,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3 . On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
6,4**	0,7;21,6	8,2**	3,7;15,2	6,5**	1,3;17,8	26,9	20,5;34,1	2,6**	0,1;14,3	2,4**	0,1;12,4	8,2**	3,7;15,3	Médecin de famille
20,8**	8,7;38,4	39,4	29,7;49,0	42,8*	28,6;57,9	18,4*	12,8;25,1	16,3**	5,4;34,2	32,9*	18,0;50,9	27,9*	19,2;38,0	Médecin spécialiste du cancer
6,4**	0,8;21,5	10,2**	4,9;18,4	24,3**	12,7;39,5	38,7	31,5;45,9	23,6**	10,1;42,6	19,4**	7,6;37,3	27,0*	18,2;37,4	Chirurgien
63,7	44,6;80,0	40,2	30,9;49,6	21,9**	10,7;37,0	6,6**	3,5;11,2	54,6*	34,9;73,2	45,2*	27,4;64,0	35,9	26,0;45,8	Autre médecin spécialiste
2,7**	0,1;13,7	2,0**	0,2;6,9	4,5**	0,5;15,5	5,9**	2,9;10,6	-	;	-	;	1,0**	0,0;5,4	Autre médecin non spécifié
-	;	-	;	-	;	3,5**	1,5;7,0	3,0**	0,1;14,6	-	;	-	;	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]
92,0	77,9;98,4	95,1	88,5;98,5	98,2	89,3;100,0	87,5	81,5;92,2	93,8	79,1;99,3	97,1	84,3;99,9	95,3	89,2;98,5	En personne
8,0**	1,6;22,1	4,9**	1,5;11,5	1,8**	0,0;10,7	12,5*	7,8;18,5	6,2**	0,7;20,9	2,9**	0,1;15,7	4,7**	1,5;10,8	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
94,0	80,4;99,2	95,7	89,2;98,9	92,5	81,6;98,0	94,1	89,9;96,9	85,2	65,9;96,0	94,8	83,1;99,3	96,2	88,3;99,3	Oui
6,0**	0,8;19,6	4,3**	1,1;10,8	7,5**	2,0;18,4	5,9**	3,1;10,1	14,8**	4,0;34,1	5,2**	0,7;16,9	3,8**	0,7;11,7	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
91,1	75,7;98,2	91,8	84,2;96,5	88,6	76,4;95,9	95,2	91,2;97,7	92,8	75,8;99,2	85,0	68,7;94,9	92,0	83,5;96,9	Oui
8,9**	1,8;24,3	8,2**	3,5;15,8	11,4**	4,1;23,6	4,8**	2,3;8,8	7,2**	0,8;24,2	15,0**	5,1;31,3	8,0**	3,1;16,5	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
94,2	80,9;99,2	94,6	88,1;98,2	92,2	80,8;97,9	96,1	92,6;98,3	85,2	65,9;96,0	90,6	74,9;98,0	96,8	91,1;99,3	Oui
5,8**	0,8;19,1	5,4**	1,8;11,9	7,8**	2,1;19,2	3,9**	1,7;7,4	14,8**	4,0;34,1	9,4**	2,0;25,1	3,2**	0,7;8,9	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]
70,9	52,4;85,4	66,0	56,3;75,7	76,4	59,9;88,6	74,7	67,5;81,0	45,1*	27,3;63,9	65,9	48,8;80,4	45,1	34,6;55,6	Oui
29,1**	14,6;47,6	34,0	24,3;43,7	23,6**	11,4;40,1	25,3	19,0;32,5	54,9*	36,1;72,7	34,1*	19,6;51,2	54,9	44,4;65,4	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]
75,2	56,9;88,7	54,8	45,0;64,5	73,9	59,2;85,6	70,6	63,0;77,4	65,6	45,4;82,4	56,3*	37,6;73,7	50,2	39,8;60,6	Oui
24,8**	11,3;43,1	45,2	35,5;55,0	26,1*	14,4;40,8	29,4	22,6;37,0	34,4**	17,6;54,6	43,7*	26,3;62,4	49,8	39,4;60,2	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]
60,8*	38,3;80,4	42,1*	28,7;55,5	75,7	56,9;89,3	75,2	67,2;82,2	36,4**	16,7;60,0	67,3*	43,4;86,0	47,1	33,7;60,5	Oui
39,2**	19,6;61,7	57,9	44,5;71,3	24,3**	10,7;43,1	24,8	17,8;32,8	63,6*	40,0;83,3	32,7**	14,0;56,6	52,9	39,5;66,3	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p, r]
75,2	56,2;89,0	62,8	53,4;72,2	85,8	72,5;94,3	79,4	72,6;85,2	77,5	58,8;90,6	64,0	45,2;80,1	62,1	52,3;71,8	Oui
24,8**	11,0;43,8	37,2	27,8;46,6	14,2**	5,7;27,5	20,6*	14,8;27,4	22,5**	9,4;41,2	36,0*	19,9;54,8	37,9	28,2;47,7	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	12,3	9,2;15,9	7,9**	2,0;19,5
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	87,7	84,1;90,8	92,1	80,5;98,0
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	40,0	35,2;44,8	39,7*	25,1;55,8
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	60,0	55,2;64,8	60,3	44,2;74,9
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	6,3*	4,2;9,0	4,0**	0,5;13,4
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	93,7	91,0;95,8	96,0	86,6;99,5
Travailleur social[p]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	4,8*	2,9;7,5	2,3**	0,0;13,1
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	95,2	92,5;97,1	97,7	86,9;100,0
Médecin[p]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	9,3*	6,7;12,6	14,5**	5,9;27,9
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	90,7	87,4;93,3	85,5	72,1;94,1
Autre professionnel de la santé													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	2,5**	1,0;4,9	2,4**	0,0;15,2
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	97,5	95,1;99,0	97,6	84,8;100,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p]
10,5**	2,1;28,6	7,0**	1,8;17,4	10,6**	3,0;24,8	18,6*	12,3;26,3	8,7**	1,0;28,2	4,4**	0,1;23,8	13,7**	5,3;27,3	Oui
89,5	71,4;97,9	93,0	82,6;98,2	89,4	75,2;97,0	81,4	73,7;87,7	91,3	71,8;99,0	95,6	76,2;99,9	86,3	72,7;94,7	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
38,0**	19,1;60,1	29,5*	18,1;43,1	63,8	45,6;79,6	50,3	41,7;59,0	12,8**	2,4;34,4	34,7**	15,6;58,3	26,3*	15,2;40,2	Oui
62,0*	39,9;80,9	70,5	56,9;81,9	36,2*	20,4;54,4	49,7	41,0;58,3	87,2	65,6;97,6	65,3*	41,7;84,4	73,7	59,8;84,8	Non
														Psychologue[p]
-	;	1,8**	0,0;9,9	6,2**	0,6;22,0	9,8**	5,5;15,9	4,3**	0,1;21,7	15,4**	3,1;39,8	5,2**	1,1;14,4	Oui
100,0	;	98,2	90,1;100,0	93,8	78,0;99,4	90,2	84,1;94,5	95,7	78,3;99,9	84,6	60,2;96,9	94,8	85,6;98,9	Non
														Travailleur social[p]
4,2**	0,1;20,7	-	;	9,1**	1,8;24,8	9,3**	4,9;15,6	-	;	4,2**	0,1;24,0	1,8**	0,0;9,2	Oui
95,8	79,3;99,9	100,0	;	90,9	75,2;98,2	90,7	84,4;95,1	100,0	;	95,8	76,0;99,9	98,2	90,8;100,0	Non
														Médecin[p]
3,6**	0,1;19,9	5,6**	1,1;15,9	8,0**	1,6;22,2	9,8**	4,9;17,0	14,2**	3,3;35,3	15,4**	3,2;39,1	6,9**	1,6;17,7	Oui
96,4	80,1;99,9	94,4	84,1;98,9	92,0	77,8;98,4	90,2	83,0;95,1	85,8	64,7;96,7	84,6	60,9;96,8	93,1	82,3;98,4	Non
														Autre professionnel de la santé
11,7**	2,3;31,5	-	;	3,8**	0,1;20,0	2,3**	0,5;6,6	5,0**	0,1;25,3	-	;	-	;	Oui
88,3	68,5;97,7	100,0	;	96,2	80,0;99,9	97,7	93,4;99,5	95,0	74,7;99,9	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	25,4	21,9;28,9	27,6*	17,4;39,8
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	74,6	71,1;78,1	72,4	60,2;82,6
Médecin spécialiste du cancer[p, r]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	43,6	39,8;47,4	37,6*	25,9;50,4
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	56,4	52,6;60,2	62,4	49,6;74,1
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	16,1	13,3;18,9	15,5**	7,9;26,5
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	83,9	81,1;86,7	84,5	73,5;92,1
Autre médecin spécialiste[p]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	14,9	12,1;18,1	20,1**	10,7;32,7
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	85,1	81,9;87,9	79,9	67,3;89,3
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	3,7*	2,3;5,6	4,2**	0,8;12,0
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	96,3	94,4;97,7	95,8	88,0;99,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
33,1**	17,3;52,4	9,4**	4,3;17,5	37,3*	23,5;52,8	36,5	29,9;43,1	20,3**	8,3;38,0	20,7**	8,5;38,7	16,3*	9,9;24,4	Oui
66,9	47,6;82,7	90,6	82,5;95,7	62,7	47,2;76,5	63,5	56,9;70,1	79,7	62,0;91,7	79,3	61,3;91,5	83,7	75,6;90,1	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p, r]
48,3*	30,3;66,7	32,5	23,4;41,5	74,2	59,9;85,6	50,0	42,5;57,6	27,0**	13,3;44,9	45,6*	29,1;63,0	36,1	26,5;45,8	Oui
51,7*	33,3;69,7	67,5	58,5;76,6	25,8*	14,4;40,1	50,0	42,4;57,5	73,0	55,1;86,7	54,4*	37,0;70,9	63,9	54,2;73,5	Non
														Médecin de famille[p]
15,1**	5,3;31,5	11,7**	6,2;19,4	19,8**	9,4;34,5	19,5*	13,8;26,3	22,3**	9,4;40,6	18,0**	6,9;35,2	11,2**	5,7;19,3	Oui
84,9	68,5;94,7	88,3	80,6;93,8	80,2	65,5;90,6	80,5	73,7;86,2	77,7	59,4;90,6	82,0	64,8;93,1	88,8	80,7;94,3	Non
														Autre médecin spécialiste[p]
9,6**	2,1;25,3	19,6*	12,3;28,8	7,4**	1,5;20,4	9,4**	5,2;15,1	28,2**	13,6;47,1	14,2**	4,5;30,7	17,2*	10,3;26,1	Oui
90,4	74,7;97,9	80,4	71,2;87,7	92,6	79,6;98,5	90,6	84,9;94,8	71,8	52,9;86,4	85,8	69,3;95,5	82,8	73,9;89,7	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
-	;	-	;	3,9**	0,5;13,2	5,6**	2,7;10,0	10,0**	2,0;26,9	-	;	3,9**	0,7;11,2	Oui
100,0	;	100,0	;	96,1	86,8;99,5	94,4	90,0;97,3	90,0	73,1;98,0	100,0	;	96,1	88,8;99,3	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	82,3	78,8;85,5	83,8	71,1;92,5
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	12,8	10,0;16,0	11,9**	4,5;24,2
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	4,9*	3,2;7,3	4,3**	0,4;15,9
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	76,3	72,8;79,7	78,2	65,5;87,9
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	12,2	9,5;15,3	15,0**	6,5;27,7
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	11,5	9,0;14,4	6,9**	2,2;15,6
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	78,6	74,3;82,9	89,1	78,0;95,8
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	12,8*	9,1;17,1	5,4**	1,0;15,7
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	8,6*	5,9;12,1	5,5**	1,2;15,1
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	59,5	54,9;64,2	52,6	37,8;67,1
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	14,8	11,6;18,6	18,6**	8,5;33,2
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	25,7	21,6;29,7	28,8*	16,6;43,6
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	31,8	28,2;35,4	37,8*	26,1;50,5
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	11,2	8,7;13,7	6,9**	1,8;17,2
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	25,7	22,0;29,4	15,2**	6,7;28,2
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	9,7	7,5;12,4	5,8**	1,4;15,0
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	21,6	18,0;25,1	34,3*	22,2;48,0
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	75,2	68,4;81,1	74,3	53,6;89,2
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	12,7*	8,4;18,2	3,5**	0,1;18,0
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	12,1*	8,2;17,2	22,2**	8,6;42,3
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	15,4	12,5;18,5	11,9**	5,0;22,8
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	84,6	81,5;87,5	88,1	77,2;95,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
85,1	67,7;95,3	84,5	75,7;91,1	89,3	77,0;96,4	83,7	77,4;88,9	82,6	63,4;94,3	75,5	58,1;88,3	75,4	65,0;84,0	Oui, tout à fait
5,9**	0,7;19,7	11,2**	5,6;19,3	7,9**	2,2;19,1	15,2*	10,2;21,5	17,4**	5,7;36,6	15,1**	5,4;30,9	13,1**	7,1;21,6	Oui, en partie
9,0**	1,8;24,6	4,3**	1,1;10,9	2,8**	0,1;14,4	1,0**	0,1;3,6	-	;	9,4**	2,0;25,2	11,5**	5,3;21,0	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
68,4	49,2;83,9	79,5	70,7;86,7	77,2	62,8;88,0	77,7	70,7;83,6	82,3	62,6;94,2	68,6	51,3;82,8	73,1	62,1;82,3	Oui, tout à fait
14,4**	4,5;31,5	11,6**	6,0;19,6	10,0**	3,2;22,5	13,0*	8,4;19,1	3,3**	0,1;17,1	11,4**	3,7;24,9	13,0**	6,6;22,2	Oui, en partie
17,2**	6,3;34,4	8,9**	4,0;16,8	12,8**	4,8;26,0	9,3*	5,6;14,3	14,5**	3,9;33,6	20,0**	8,3;37,3	13,9**	7,2;23,5	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
81,3	57,7;95,0	80,8	67,1;90,6	74,8	51,9;90,7	70,2	60,6;78,7	84,1	59,9;96,7	75,3	52,6;90,9	84,3	70,1;93,5	Oui
4,7**	0,1;24,6	7,3**	1,8;18,6	25,2**	9,3;48,1	14,3*	8,2;22,7	10,4**	1,2;33,5	24,7**	9,1;47,4	13,5**	5,1;27,3	Non, il ne voulait pas
14,0**	3,0;35,8	11,9**	4,5;24,2	-	;	15,4*	9,3;23,6	5,5**	0,1;27,9	-	;	2,1**	0,1;11,2	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
66,9	44,9;84,5	64,5	51,7;75,9	66,3	48,1;81,5	59,4	51,3;67,4	69,3	48,3;85,7	57,7*	38,1;75,6	50,2	37,1;63,3	Oui, tout à fait
11,4**	2,3;30,0	10,9**	4,7;20,7	23,3**	11,0;40,2	13,6*	8,0;20,9	7,5**	0,9;24,6	24,9**	10,8;44,3	13,8**	6,1;25,5	Oui, en partie
21,7**	6,8;45,4	24,6*	14,9;36,8	10,4**	2,6;25,8	27,1	20,2;34,9	23,2**	8,8;44,3	17,5**	5,7;36,8	36,0*	23,2;50,4	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
27,7**	13,7;45,9	25,6*	17,4;35,2	45,1*	30,3;60,5	35,3	28,0;42,7	28,6**	14,2;47,1	38,0*	21,9;56,4	22,2*	14,0;32,3	Oui, une infirmière pivot en oncologie
11,9**	3,4;27,5	6,4**	2,5;12,9	3,9**	0,5;13,4	13,9*	9,0;20,1	22,0**	9,2;40,3	13,4**	4,3;29,3	13,2**	7,0;21,9	Oui, un autre professionnel de la santé
34,6**	17,5;55,1	28,0*	19,1;38,3	35,3*	22,2;50,3	26,4	19,8;33,9	18,5**	6,7;37,0	23,5**	10,9;40,9	24,9*	16,5;35,1	Oui, un membre du personnel administratif
8,5**	1,6;23,8	14,9*	8,5;23,6	3,7**	0,5;12,7	7,9**	4,3;13,2	13,2**	3,7;30,7	8,5**	1,7;23,2	13,0**	6,5;22,6	Oui, un médecin
17,4**	6,2;35,3	25,2*	17,1;34,9	12,0**	3,9;26,2	16,5*	11,4;22,7	17,7**	5,8;37,2	16,6**	6,3;32,6	26,6*	17,2;38,0	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
40,9**	11,9;75,7	86,1	69,9;95,5	84,4	64,2;95,7	62,3	47,8;75,4	100,0	;	78,9	48,7;95,8	80,7	57,8;94,5	Oui, tout à fait
28,4**	4,2;68,8	7,8**	1,7;21,0	8,2**	1,0;27,1	19,9**	10,3;33,1	-	;	15,2**	1,7;46,3	15,3**	3,3;38,5	Oui, en partie
30,7**	6,0;68,4	6,1**	0,8;19,9	7,4**	0,8;24,7	17,7**	8,4;31,0	-	;	5,9**	0,1;29,6	4,0**	0,1;19,9	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p]
18,7**	7,4;35,8	13,4**	7,3;21,8	18,5**	8,0;33,9	17,6*	12,3;24,0	17,4**	6,9;33,3	25,8**	11,5;45,3	9,5**	4,8;16,6	Oui
81,3	64,2;92,6	86,6	78,2;92,7	81,5	66,1;92,0	82,4	76,0;87,7	82,6	66,7;93,1	74,2	54,7;88,5	90,5	83,4;95,2	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	83,9	81,1;86,6	95,7	88,1;99,0
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	16,1	13,4;18,9	4,3**	1,0;11,9
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	32,0	27,9;36,0	1,8**	0,0;10,1
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	68,0	64,0;72,1	98,2	89,9;100,0
Lieu de la chirurgie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	69,1	65,0;73,3	79,2	67,0;88,4
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	30,9	26,7;35,0	20,8*	11,6;33,0
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	51,6	45,6;57,6	46,5*	27,5;66,3
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	7,8*	4,9;11,8	6,4**	0,9;20,6
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	40,6	34,7;46,4	47,0*	28,2;66,5
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	67,1	62,7;71,6	62,2	47,9;75,1
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	12,5	9,6;15,9	15,7**	7,3;27,9
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	20,4	16,7;24,0	22,2**	11,9;35,8
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	96,3	94,1;97,9	100,0	;
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	3,7*	2,1;5,9	-	;
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	89,2	85,9;91,9	88,3	77,5;95,1
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	9,7	7,1;12,9	11,7**	4,9;22,5
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	1,1**	0,4;2,7	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
71,1	53,0;85,3	80,2	72,3;86,6	32,7*	18,5;49,8	95,6	91,7;98,0	76,7	58,4;89,7	79,2	61,9;91,1	92,3	86,3;96,2	Oui
28,9**	14,7;47,0	19,8*	13,4;27,7	67,3	50,2;81,5	4,4**	2,0;8,3	23,3**	10,3;41,6	20,8**	8,9;38,1	7,7**	3,8;13,7	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
8,1**	0,9;27,4	10,8**	4,7;20,3	65,3*	30,1;91,2	45,2	37,4;52,9	22,0**	8,4;42,2	13,6**	4,0;30,6	53,3	42,7;63,9	Oui
91,9	72,6;99,1	89,2	79,7;95,3	34,7**	8,8;69,9	54,8	47,1;62,6	78,0	57,8;91,6	86,4	69,4;96,0	46,7	36,1;57,3	Non
														Lieu de la chirurgie[p, r]
31,1**	14,4;52,5	74,7	63,7;83,7	66,8*	33,2;91,1	72,5	65,1;79,1	65,7	44,1;83,3	64,6	44,9;81,2	64,9	55,8;74,1	Hôpital de la région de résidence
68,9	47,5;85,6	25,3*	16,3;36,3	33,2**	8,9;66,8	27,5	20,9;34,9	34,3**	16,7;55,9	35,4*	18,8;55,1	35,1	25,9;44,2	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
50,9**	23,8;77,6	52,2	36,7;67,4	82,0*	43,4;98,6	49,9	39,9;59,9	17,7**	1,7;54,0	65,6*	38,3;86,9	53,4	36,9;69,4	Oui, tout à fait
17,7**	3,7;44,1	4,5**	0,6;15,1	9,2**	0,1;46,0	10,7**	5,1;19,0	17,1**	1,8;51,6	4,6**	0,1;24,8	2,0**	0,0;11,0	Oui, en partie
31,4**	9,9;61,1	43,3*	28,7;58,8	8,8**	0,1;46,2	39,4	29,5;49,3	65,3*	30,0;91,2	29,8**	10,2;57,2	44,6*	28,7;61,5	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
71,6	48,9;88,4	79,4	68,8;87,6	92,5	65,3;99,8	60,8	53,5;68,1	70,4	47,1;87,8	69,2	49,1;85,2	65,0	53,3;75,5	Oui, tout à fait
11,7**	2,0;32,9	13,7**	6,9;23,4	7,5**	0,2;34,7	13,8*	8,9;20,1	12,0**	2,3;32,3	13,7**	3,3;33,5	8,2**	3,5;15,9	Oui, en partie
16,7**	4,5;38,1	7,0**	2,3;15,5	-	;	25,4	19,0;32,7	17,6**	4,5;40,7	17,0**	5,9;35,2	26,8*	17,4;38,1	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
95,7	78,6;99,9	93,2	85,3;97,6	100,0	;	97,0	92,1;99,3	100,0	;	90,2	74,4;97,9	95,7	89,2;98,8	Oui
4,3**	0,1;21,4	6,8**	2,4;14,7	-	;	3,0**	0,7;7,9	-	;	9,8**	2,1;25,6	4,3**	1,2;10,8	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
91,6	71,3;99,2	88,3	78,5;94,7	100,0	;	88,3	82,6;92,7	92,3	72,9;99,3	86,0	67,2;96,3	89,5	80,5;95,4	Oui, tout à fait
8,4**	0,8;28,7	10,2**	4,3;19,6	-	;	11,1*	6,8;16,7	7,7**	0,7;27,1	14,0**	3,7;32,8	7,0**	2,3;15,5	Oui, en partie
-	;	1,5**	0,0;8,4	-	;	0,6**	0,0;3,3	-	;	-	;	3,5**	0,7;10,0	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	42,2	40,1;44,3	48,3	36,2;60,3
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	57,8	55,7;59,9	51,7	39,7;63,8
Lieu de la chimiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	59,9	53,7;66,0	63,3	45,7;78,7
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	40,1	34,0;46,3	36,7*	21,3;54,3
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	43,3	37,2;49,5	44,3*	27,1;62,5
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	38,7	32,6;44,9	53,3*	34,9;71,1
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	17,9	13,3;23,3	2,4**	0,1;12,7
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	52,5	45,0;60,0	47,2*	27,2;67,9
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	13,1*	8,7;18,7	15,2**	4,6;33,6
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	34,4	27,5;41,3	37,6**	19,2;59,0
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	32,7	27,0;38,3	42,4*	25,5;60,8
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	33,9	27,9;39,9	28,7**	14,1;47,4
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	33,4	27,6;39,3	28,9**	14,8;46,8
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	79,7	74,7;84,7	74,0	56,6;87,2
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	18,7	14,0;24,2	26,0**	12,8;43,4
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	1,6**	0,5;3,8	-	;
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	87,3	82,5;91,1	79,0	60,9;91,3
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	11,7*	8,0;16,4	21,0**	8,7;39,1
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	1,0**	0,1;3,5	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
59,0	41,5;75,0	6,9**	2,8;13,8	92,2	78,6;98,4	57,5	52,2;62,8	30,7*	16,7;47,8	52,3*	35,7;68,5	18,5*	12,0;26,6	Oui
41,0*	25,0;58,5	93,1	86,2;97,2	7,8**	1,6;21,4	42,5	37,2;47,8	69,3	52,2;83,3	47,7*	31,5;64,3	81,5	73,4;88,0	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p]
37,6**	16,8;62,4	80,1**	17,7;99,9	65,7	48,5;80,3	59,2	49,8;68,6	37,8**	9,8;73,7	66,4*	42,5;85,4	66,9*	41,7;86,6	Hôpital de la région de résidence
62,4*	37,6;83,2	19,9**	0,1;82,3	34,3*	19,7;51,5	40,8	31,4;50,2	62,2**	26,3;90,2	33,6**	14,6;57,5	33,1**	13,4;58,3	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
32,6**	12,8;58,4	40,6**	3,0;90,5	44,3*	28,2;61,4	49,9	40,2;59,7	30,3**	6,0;67,6	42,4**	21,1;65,9	26,5**	9,2;51,3	Moins de 30 minutes
28,0**	9,6;54,3	59,4**	9,5;97,0	32,6*	18,1;50,1	34,3	25,0;43,7	30,5**	6,6;66,5	32,8**	13,1;58,2	63,9*	38,7;84,5	De 30 à 60 minutes
39,4**	18,2;63,9	-	;	23,1**	11,0;39,6	15,7*	9,4;24,0	39,2**	11,3;73,6	24,9**	8,6;48,9	9,7**	1,0;32,5	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
28,9**	11,1;53,2	74,2**	11,4;99,8	55,4*	34,6;74,9	44,0	31,3;56,6	90,0	51,4;99,9	73,9*	45,8;92,4	69,6*	37,3;91,9	Oui, tout à fait
20,6**	5,8;45,0	-	;	14,6**	4,2;33,2	13,6**	6,1;25,1	-	;	5,1**	0,1;26,3	16,3**	1,6;50,5	Oui, en partie
50,5*	26,8;74,0	25,8**	0,2;88,6	30,0**	13,5;51,3	42,4*	29,2;55,6	10,0**	0,1;48,6	21,1**	4,5;50,3	14,0**	1,4;44,5	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
48,1*	25,3;71,5	39,5**	2,6;90,5	25,9**	12,5;43,7	21,7*	13,9;31,4	81,8	46,9;97,9	24,1**	7,7;49,1	49,5*	25,8;73,3	Moins de 30 minutes
29,6**	11,7;53,7	40,6**	2,6;91,5	40,4*	23,8;58,8	33,2	23,6;42,9	9,1**	0,3;40,0	55,4*	31,2;77,9	26,5**	8,8;52,5	De 30 à 60 minutes
22,3**	6,5;47,6	19,9**	0,2;78,6	33,7*	19,5;50,3	45,0	35,2;54,9	9,1**	0,1;45,7	20,4**	5,6;45,3	24,0**	8,2;47,8	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
80,5	56,4;94,7	100,0	;	88,0	73,7;96,1	74,7	65,2;82,7	90,9	57,2;99,8	69,1*	44,2;87,8	95,2	75,9;99,9	Oui, tout à fait
14,4**	2,8;37,7	-	;	12,0**	3,9;26,3	22,4*	14,8;31,6	9,1**	0,2;42,8	30,9**	12,2;55,8	4,8**	0,1;24,1	Oui, en partie
5,1**	0,1;26,0	-	;	-	;	2,9**	0,7;8,0	-	;	-	;	-	;	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
80,9	56,8;94,9	100,0	;	87,0	73,1;95,4	85,7	77,4;91,8	100,0	;	92,8	67,4;99,8	100,0	;	Oui, tout à fait
19,1**	5,1;43,2	-	;	9,6**	2,8;22,3	13,2**	7,3;21,4	-	;	7,2**	0,2;32,6	-	;	Oui, en partie
-	;	-	;	3,4**	0,1;16,9	1,1**	0,0;6,2	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	43,2	40,3;46,0	24,1*	14,3;36,5
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	56,8	54,0;59,7	75,9	63,5;85,7
Lieu de la radiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	15,0	11,2;19,5	32,7**	13,0;58,3
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	85,0	80,5;88,8	67,3*	41,7;87,0
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	11,8*	8,0;16,5	11,6**	1,5;35,3
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	49,5	43,6;55,4	48,5*	25,1;72,5
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	38,7	32,9;44,5	39,9**	18,0;65,3
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	54,5	48,0;61,0	61,2*	31,0;86,1
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	22,3	17,1;27,5	16,5**	1,8;49,4
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	23,2	17,6;28,8	22,4**	4,3;54,6
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	80,9	75,6;85,5	52,8*	27,4;77,1
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	12,7*	9,0;17,3	34,7**	14,7;59,7
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	6,3*	3,7;10,0	12,6**	1,5;38,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
32,6*	18,2;49,9	31,4	25,0;37,7	26,8*	14,8;42,0	78,8	72,3;84,5	74,6	55,9;88,4	25,6**	12,4;43,1	18,5*	12,1;26,5	Oui
67,4	50,1;81,8	68,6	62,3;75,0	73,2	58,0;85,2	21,2	15,5;27,7	25,4**	11,6;44,1	74,4	56,9;87,6	81,5	73,5;87,9	Non
														Lieu de la radiothérapie[p]
22,0**	5,3;50,1	14,9**	4,9;32,0	21,1**	4,3;51,2	10,3**	5,6;16,9	16,2**	4,2;37,8	9,1**	0,1;45,7	25,4**	9,8;47,5	Hôpital de la région de résidence
78,0	49,9;94,7	85,1	68,0;95,1	78,9	48,8;95,7	89,7	83,1;94,4	83,8	62,2;95,8	90,9	54,3;99,9	74,6	52,5;90,2	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
22,0**	5,3;50,1	3,7**	0,1;18,3	-	;	11,3*	6,5;18,0	25,0**	9,1;48,2	23,1**	2,3;64,7	8,7**	0,9;29,3	Moins de 30 minutes
40,7**	15,2;70,5	43,2*	25,6;62,2	63,2*	32,4;87,6	52,0	43,9;60,0	48,1*	26,7;70,1	20,9**	2,2;59,8	53,3*	31,3;74,4	De 30 à 60 minutes
37,4**	12,8;68,0	53,1*	34,6;71,0	36,8**	12,4;67,6	36,7	28,9;44,5	26,8**	10,9;48,9	56,0**	20,1;87,7	38,1**	18,1;61,5	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
58,2**	22,3;88,5	67,3	46,5;84,1	49,1**	18,5;80,2	46,9	38,1;55,7	63,8*	35,5;86,4	62,4**	20,2;93,7	66,5*	41,0;86,4	Oui, tout à fait
32,4**	6,9;69,5	14,4**	4,2;32,7	42,9**	14,8;75,0	27,3	19,7;36,0	5,5**	0,1;27,3	23,7**	1,9;68,4	5,0**	0,1;25,4	Oui, en partie
9,4**	0,1;47,0	18,3**	5,5;39,6	7,9**	0,1;40,4	25,9*	18,2;34,8	30,7**	9,8;59,9	13,9**	0,2;60,1	28,5**	10,0;54,7	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
92,1	61,7;99,8	90,6	74,5;98,1	100,0	;	81,4	74,4;87,1	71,8	47,9;89,1	89,6	45,9;99,9	74,8	50,9;91,1	Oui, tout à fait
7,9**	0,2;38,3	9,4**	1,9;25,5	-	;	10,9*	6,3;17,0	19,6**	5,7;42,8	10,4**	0,1;54,1	16,6**	3,8;40,4	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	7,8**	3,9;13,7	8,6**	1,0;28,7	-	;	8,6**	0,9;29,2	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Douleur et malaises ressentis[p, r]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	56,6	52,8;60,3	61,6	47,7;74,2
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	43,4	39,7;47,2	38,4*	25,8;52,3
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	31,1	26,2;36,0	32,9*	18,2;50,5
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	38,4	33,1;43,7	43,7*	27,7;60,8
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	30,5	25,8;35,2	23,4**	10,5;41,3
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	80,4	75,8;84,5	85,1	69,7;94,6
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	15,6	11,9;20,0	14,9**	5,4;30,3
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	4,0**	2,1;6,7	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p, r]
70,3	53,0;84,1	39,1	29,3;48,9	60,2	44,0;74,9	62,2	56,2;68,2	57,4*	37,8;75,5	75,2	55,3;89,5	46,9	35,8;58,0	Oui
29,7**	15,9;47,0	60,9	51,1;70,7	39,8*	25,1;56,0	37,8	31,8;43,8	42,6*	24,5;62,2	24,8**	10,5;44,7	53,1	42,0;64,2	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
37,8**	19,7;58,8	9,2**	1,8;25,3	28,3**	13,1;48,3	25,8*	18,0;34,8	67,5*	40,1;88,2	47,5*	28,2;67,4	33,1*	20,2;48,2	Sévères
31,6**	14,0;54,2	46,9*	29,5;64,9	37,7*	19,8;58,4	40,7	31,8;49,7	25,5**	7,8;52,2	17,8**	6,6;35,3	42,8*	28,0;58,6	Modérés
30,6**	13,5;52,8	43,9*	26,9;61,9	34,0**	16,8;55,0	33,5	24,7;42,4	7,0**	0,1;36,5	34,7**	17,9;54,8	24,1**	12,4;39,4	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
80,9	60,7;93,6	64,8	47,3;79,8	89,7	70,9;98,2	80,5	72,2;87,3	62,9*	34,5;85,9	86,9	67,4;96,9	84,7	71,2;93,5	Oui, tout à fait
14,7**	4,3;33,0	32,6*	18,1;50,1	10,3**	1,8;29,1	15,0*	8,7;23,4	25,1**	6,7;53,9	13,1**	3,1;32,6	6,7**	1,3;18,6	Oui, en partie
4,4**	0,1;22,6	2,6**	0,1;14,0	-	;	4,4**	1,6;9,4	12,0**	1,1;40,0	-	;	8,6**	2,4;20,6	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	91,1	88,1;93,6	87,0	71,8;95,8
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	8,2*	5,8;11,1	13,0**	4,2;28,2
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	0,7**	0,1;2,3	-	;
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	9,8	7,3;12,8	10,7**	4,4;20,7
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	90,2	87,2;92,7	89,3	79,3;95,6
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	76,1	72,7;79,6	75,6	63,2;85,6
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	22,9	19,5;26,3	24,4*	14,4;36,8
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	1,0**	0,3;2,2	-	;
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	62,6	59,1;66,1	55,2	42,0;68,5
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	37,4	33,9;40,9	44,8*	31,5;58,0
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p, r]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	22,7	19,4;26,0	20,4*	11,5;32,1
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	20,7	17,5;24,0	21,1*	12,6;32,0
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	56,6	52,9;60,3	58,5	46,5;70,4
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	75,9	71,8;80,1	75,1	60,4;86,4
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	17,5	14,0;21,5	22,8**	12,0;37,1
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	6,5*	4,2;9,6	2,1**	0,1;11,5
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	61,9	56,6;67,2	60,1	43,5;75,1
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	38,1	32,8;43,4	39,9*	24,9;56,5
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	86,7	84,1;89,3	76,7	63,6;86,9
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	11,7	9,2;14,2	23,3*	13,1;36,4
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	1,6**	0,7;3,1	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
97,1	85,5;99,9	92,0	82,0;97,4	92,8	79,9;98,6	91,0	85,8;94,8	96,8	83,5;99,9	81,5	60,4;94,3	91,2	79,3;97,4	Oui, tout à fait
2,9**	0,1;14,5	6,5**	1,8;15,8	7,2**	1,4;20,1	9,0*	5,2;14,2	3,2**	0,1;16,5	14,5**	3,8;34,2	6,9**	1,5;18,7	Oui, en partie
-	;	1,5**	0,0;8,1	-	;	-	;	-	;	3,9**	0,1;21,8	1,9**	0,0;10,9	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
8,5**	1,8;22,9	6,2**	2,2;13,6	7,8**	2,0;19,2	10,7*	6,3;16,7	19,7**	7,4;38,6	13,7**	4,3;30,0	8,1**	3,4;15,8	Oui
91,5	77,1;98,2	93,8	86,4;97,8	92,2	80,8;98,0	89,3	83,3;93,7	80,3	61,4;92,6	86,3	70,0;95,7	91,9	84,2;96,6	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
85,6	69,7;95,0	76,0	66,1;84,1	75,6	58,7;88,2	78,5	71,9;84,1	82,4	63,3;94,1	60,7	43,9;75,9	73,5	63,1;82,2	Oui, toujours
11,4**	3,2;26,6	22,9*	14,8;32,7	24,4**	11,8;41,3	21,0	15,4;27,5	17,6**	5,9;36,7	39,3*	24,1;56,1	24,0*	15,7;34,1	Oui, la plupart du temps
3,1**	0,1;15,5	1,2**	0,0;6,2	-	;	0,6**	0,0;3,1	-	;	-	;	2,5**	0,3;8,7	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
66,8	48,6;82,0	50,0	40,2;59,9	71,3	55,5;84,0	81,7	75,2;87,2	47,9*	29,1;67,1	60,8	42,9;76,9	47,5	37,3;57,8	Oui
33,2*	18,0;51,4	50,0	40,1;59,8	28,7*	16,0;44,5	18,3*	12,8;24,8	52,1*	32,9;70,9	39,2*	23,1;57,1	52,5	42,2;62,7	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p, r]
24,1**	10,9;42,2	12,0**	6,6;19,5	31,7*	18,0;48,3	37,1	30,2;44,0	14,4**	4,7;31,0	15,4**	5,3;32,0	10,9**	5,3;19,1	Oui
15,4**	5,0;33,1	15,0*	8,5;23,8	16,8**	7,5;30,8	30,3	23,6;37,0	19,3**	7,0;38,3	22,8**	9,9;40,9	13,3**	6,7;22,6	Non, mais il aurait aimé l'être
60,5	41,6;77,3	73,1	63,4;81,4	51,4	35,8;66,8	32,6	26,0;39,1	66,3	47,0;82,3	61,9	43,7;77,9	75,9	65,7;84,3	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
75,5	55,4;89,8	71,8	58,9;82,4	88,7	75,3;96,3	70,3	61,4;78,3	86,0	63,2;97,3	70,5	51,8;85,3	82,0	69,5;91,0	Oui, tout à fait
20,5**	8,0;39,2	14,5**	6,6;26,1	9,1**	2,4;22,1	21,9*	14,9;30,2	14,0**	2,7;36,8	22,9**	10,0;41,2	11,4**	4,7;22,1	Oui, en partie
4,0**	0,1;20,0	13,8**	6,3;25,0	2,2**	0,1;11,9	7,8**	3,7;14,1	-	;	6,5**	0,7;22,5	6,6**	1,6;16,9	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
67,8	47,0;84,5	66,7	49,1;81,4	76,5	56,1;90,6	50,2	40,5;59,9	68,0*	39,3;89,2	66,0*	41,7;85,3	68,9	52,2;82,6	Oui
32,2**	15,5;53,0	33,3*	18,6;50,9	23,5**	9,4;43,9	49,8	40,1;59,5	32,0**	10,8;60,7	34,0**	14,7;58,3	31,1*	17,4;47,8	Non
														Patient traité de manière respectueuse
91,3	75,7;98,3	88,1	79,9;93,7	90,2	77,8;97,0	87,9	82,4;92,2	88,4	70,1;97,5	78,2	60,6;90,6	88,6	80,9;94,1	Oui, toujours
5,7**	0,6;20,0	9,9**	4,8;17,5	9,8**	3,0;22,2	11,5*	7,3;17,0	8,1**	1,0;26,5	21,8**	9,4;39,4	6,9**	2,8;14,0	Oui, la plupart du temps
3,1**	0,1;15,5	2,1**	0,3;7,1	-	;	0,5**	0,0;3,0	3,5**	0,1;18,3	-	;	4,4**	1,2;10,9	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	2,9**	1,6;4,6	1,7**	0,0;9,4
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	3,7*	2,3;5,6	4,5**	1,0;12,4
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	2,2**	1,1;4,0	2,4**	0,0;13,3
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	91,2	88,5;93,5	91,4	80,2;97,4
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	75,9	72,3;79,5	75,4	60,0;87,1
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	19,0	15,7;22,7	21,7**	10,7;36,7
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	5,1*	3,5;7,2	2,9**	0,3;10,5
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	88,8	85,8;91,3	87,5	77,2;94,3
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	9,9	7,5;12,7	11,1**	4,7;21,1
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	1,3**	0,5;2,7	1,5**	0,0;7,8
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p, r]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	69,6	63,8;75,4	72,9	54,2;87,2
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	30,4	24,6;36,2	27,1**	12,8;45,8
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	7,5	5,6;10,0	7,4**	2,2;17,1
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	92,5	90,0;94,4	92,6	82,9;97,8
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	77,0	72,9;81,1	76,1	60,5;87,9
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	11,3	8,4;14,8	10,7**	3,4;23,8
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	11,7	8,9;15,0	13,2**	4,7;27,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
2,5**	0,1;13,3	0,9**	0,0;5,1	5,8**	0,7;19,4	2,7**	0,9;6,2	7,0**	0,7;24,5	-	;	4,0**	1,1;10,0	Oui, souvent
3,8**	0,1;18,9	4,0**	1,1;9,9	3,9**	0,5;13,0	4,5**	1,8;9,1	2,8**	0,1;14,6	5,3**	0,5;19,4	1,2**	0,0;7,0	Oui, parfois
-	;	1,1**	0,0;5,9	2,0**	0,1;10,3	2,8**	0,9;6,4	4,0**	0,1;21,6	2,8**	0,1;14,7	2,4**	0,3;8,5	Oui, une seule fois
93,6	79,3;99,2	94,0	87,3;97,8	88,3	75,0;96,0	90,0	84,4;94,1	86,2	67,0;96,5	91,8	76,9;98,5	92,4	85,1;96,8	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
82,0	66,0;92,7	79,9	70,2;87,5	75,2	60,6;86,6	77,0	70,4;82,7	71,8	52,4;86,7	65,7	47,4;81,1	73,7	62,6;82,9	Oui, toujours
12,1**	3,4;28,1	17,1*	10,1;26,2	15,9**	7,0;29,2	19,0	13,8;25,1	20,8**	8,1;39,6	27,1**	13,3;45,2	19,8*	11,7;30,3	Oui, la plupart du temps
5,9**	0,7;20,2	3,0**	0,6;8,5	8,9**	2,3;21,7	4,0**	1,6;8,2	7,4**	0,9;24,6	7,2**	1,6;19,1	6,5**	2,4;13,6	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
85,2	67,7;95,3	88,4	79,8;94,3	82,0	68,3;91,5	87,6	81,8;92,0	89,7	72,0;98,0	89,9	75,5;97,3	95,9	88,0;99,2	Oui, toujours
12,0**	3,0;29,2	11,6**	5,7;20,2	10,2**	3,4;22,4	11,4*	7,1;16,9	10,3**	2,0;28,0	10,1**	2,7;24,5	4,1**	0,8;12,0	Oui, la plupart du temps
2,8**	0,1;15,0	-	;	7,8**	1,7;20,6	1,1**	0,1;3,9	-	;	-	;	-	;	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p, r]
71,7*	44,9;90,5	79,7	61,4;92,0	94,6	71,6;99,9	50,5	38,5;62,6	77,2*	45,5;95,4	81,4	52,5;96,5	73,4	55,3;87,2	Oui
28,3**	9,5;55,1	20,3**	8,0;38,6	5,4**	0,1;28,4	49,5	37,4;61,5	22,8**	4,6;54,5	18,6**	3,5;47,5	26,6**	12,8;44,7	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
5,7**	0,6;20,2	7,0**	2,8;14,3	6,1**	1,1;17,7	9,6*	5,7;14,9	7,2**	0,7;25,5	12,6**	3,7;28,6	4,4**	1,2;10,9	Oui
94,3	79,8;99,4	93,0	85,7;97,2	93,9	82,3;98,9	90,4	85,1;94,3	92,8	74,5;99,3	87,4	71,4;96,3	95,6	89,1;98,8	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
86,9	66,9;97,0	77,6	64,3;87,8	79,5	60,7;92,1	78,6	71,5;84,7	75,0	49,8;91,9	67,7	47,6;83,9	74,1	61,6;84,3	Oui, tout à fait
13,1**	3,0;33,1	11,8**	4,3;24,2	8,6**	1,6;23,9	11,2*	6,7;17,2	9,1**	1,2;28,7	20,3**	7,5;39,8	8,8**	3,1;18,7	Oui, en partie
-	;	10,6**	3,8;22,2	11,9**	3,3;27,9	10,1*	5,8;16,2	15,9**	3,0;41,5	12,0**	3,3;28,2	17,1**	8,8;28,8	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	80,8	77,2;84,1	76,5	61,9;87,5
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	19,2	15,9;22,8	23,5**	12,5;38,1
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	8,4	6,1;11,2	7,7**	2,4;17,5
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	91,6	88,8;93,9	92,3	82,5;97,6
Médecin spécialiste[p]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	14,8	11,9;18,1	4,7**	1,1;12,8
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	85,2	81,9;88,1	95,3	87,2;98,9
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	30,3	26,9;33,7	32,2*	21,1;45,0
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	69,7	66,3;73,1	67,8	55,0;78,9
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	8,9	6,7;11,6	17,0**	8,4;29,1
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	91,1	88,4;93,3	83,0	70,9;91,6
CLSC[p]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	26,9	22,9;30,9	42,0*	28,9;55,2
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	73,1	69,1;77,1	58,0	44,8;71,1
Urgence d'un hôpital[p]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	28,2	24,5;31,9	34,7*	23,1;47,9
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	71,8	68,1;75,5	65,3	52,1;76,9
Unité de soins d'un hôpital[p, r]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	12,5	9,9;15,6	8,6**	3,1;18,3
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	87,5	84,4;90,1	91,4	81,7;96,9
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	1,8**	0,9;3,2	-	;
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	98,2	96,8;99,1	100,0	;
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	100,0	;	100,0	;
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7				

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p]
88,1	71,9;96,7	74,4	64,2;82,9	90,3	77,0;97,3	83,1	76,7;88,3	89,4	69,9;98,2	81,1	62,7;93,0	76,2	65,9;84,7	Oui
11,9**	3,3;28,1	25,6*	17,1;35,8	9,7**	2,7;23,0	16,9*	11,7;23,3	10,6**	1,8;30,1	18,9**	7,0;37,3	23,8*	15,3;34,1	Non
														Médecin de famille[p]
8,8**	1,6;24,9	6,4**	2,3;13,5	5,3**	0,6;17,9	8,6**	4,8;14,0	13,9**	3,9;31,9	8,5**	1,7;23,1	10,1**	4,3;19,2	Oui
91,2	75,1;98,4	93,6	86,5;97,7	94,7	82,1;99,4	91,4	86,0;95,2	86,1	68,1;96,1	91,5	76,9;98,3	89,9	80,8;95,7	Non
														Médecin spécialiste[p]
15,5**	4,9;33,7	12,5**	6,9;20,3	17,5**	7,6;32,3	15,6*	10,1;22,4	37,2*	19,8;57,6	9,9**	2,8;23,4	15,9*	9,1;25,0	Oui
84,5	66,3;95,1	87,5	79,7;93,1	82,5	67,7;92,4	84,4	77,6;89,9	62,8	42,4;80,2	90,1	76,6;97,2	84,1	75,0;90,9	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
49,2*	30,7;67,8	9,5**	4,4;17,4	40,4*	25,2;57,1	41,9	34,5;49,3	23,6**	9,8;43,3	29,8**	15,2;48,2	19,8*	12,3;29,4	Oui
50,8*	32,2;69,3	90,5	82,6;95,6	59,6	42,9;74,8	58,1	50,7;65,5	76,4	56,7;90,2	70,2	51,8;84,8	80,2	70,6;87,7	Non
														Info-Santé[p]
6,9**	0,8;23,4	5,5**	1,8;12,3	8,4**	2,2;20,5	9,1*	5,3;14,3	3,8**	0,1;19,0	11,0**	3,0;26,1	8,3**	3,4;16,2	Oui
93,1	76,6;99,2	94,5	87,7;98,2	91,6	79,5;97,8	90,9	85,7;94,7	96,2	81,0;99,9	89,0	73,9;97,0	91,7	83,8;96,6	Non
														CLSC[p]
19,2**	7,2;37,8	31,1	22,2;40,1	11,2**	3,8;24,0	27,3	20,2;35,4	21,6**	8,2;41,6	23,9**	10,9;41,8	25,4*	16,0;36,9	Oui
80,8	62,2;92,8	68,9	59,9;77,8	88,8	76,0;96,2	72,7	64,6;79,8	78,4	58,4;91,8	76,1	58,2;89,1	74,6	63,1;84,0	Non
														Urgence d'un hôpital[p]
29,0**	14,9;46,9	16,2*	9,2;25,5	38,1*	23,8;54,2	29,4	22,9;36,7	34,9**	17,9;55,3	38,7*	22,4;57,1	22,3*	13,9;32,8	Oui
71,0	53,1;85,1	83,8	74,5;90,8	61,9	45,8;76,2	70,6	63,3;77,1	65,1	44,7;82,1	61,3	42,9;77,6	77,7	67,2;86,1	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p, r]
9,1**	1,8;24,9	8,2**	3,3;16,2	30,4*	17,4;46,2	18,2*	12,9;24,6	3,3**	0,1;15,6	3,0**	0,1;15,7	8,8**	3,7;17,0	Oui
90,9	75,1;98,2	91,8	83,8;96,7	69,6	53,8;82,6	81,8	75,4;87,1	96,7	84,4;99,9	97,0	84,3;99,9	91,2	83,0;96,3	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
3,2**	0,1;15,6	1,1**	0,0;5,9	4,2**	0,5;14,1	1,7**	0,4;4,8	3,0**	0,1;15,5	-	;	2,3**	0,2;8,3	Oui
96,8	84,4;99,9	98,9	94,1;100,0	95,8	85,9;99,5	98,3	95,2;99,6	97,0	84,5;99,9	100,0	;	97,7	91,7;99,8	Non
														Autre contact
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Oui
														Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	62,1	57,6;66,6	50,2*	33,6;66,9
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	15,9	12,4;20,0	21,7**	10,6;37,0
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	21,9	18,1;25,8	28,0**	13,9;46,2
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	51,0	46,2;55,7	37,3*	22,3;54,3
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	12,6	9,4;16,3	16,0**	6,2;31,5
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	36,4	31,9;41,0	46,7*	31,3;62,6
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	46,0	41,5;50,6	39,9*	25,2;56,1
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	22,8	18,8;26,8	29,0*	16,6;44,3
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	31,2	26,9;35,5	31,1*	17,8;47,1
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	44,1	39,3;48,8	39,2*	24,1;56,0
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	16,9	13,3;21,1	18,9**	8,6;33,5
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	39,0	34,3;43,7	41,9*	27,7;57,2
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	55,7	51,1;60,3	60,0	45,0;73,8
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	17,7	14,3;21,6	23,1**	12,0;37,7
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	26,6	22,6;30,6	16,9**	7,8;30,3
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	56,2	51,5;61,0	57,8	42,2;72,3
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	19,7	16,0;23,9	21,2**	10,0;37,0
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	24,0	20,1;28,0	20,9**	10,2;35,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
69,3	47,1;86,4	55,7	40,4;70,2	80,9	64,8;91,8	69,5	62,6;76,4	65,7*	41,2;85,2	59,4*	38,0;78,5	40,0*	26,6;53,4	Oui, tout à fait
11,8**	2,6;30,4	12,3**	4,6;25,0	15,0**	5,2;31,2	15,3*	10,1;21,7	9,2**	1,3;28,3	14,1**	2,9;36,3	22,4**	11,6;36,7	Oui, en partie
18,9**	6,0;39,8	32,0*	19,1;47,4	4,1**	0,4;14,6	15,2*	10,1;21,6	25,1**	8,3;50,3	26,5**	10,4;49,1	37,6*	24,3;52,4	Non
														La sexualité[p]
65,1	44,6;82,2	75,6	65,2;84,3	56,1	38,4;72,8	43,8	35,7;52,0	50,2**	23,6;76,6	40,3**	19,5;63,9	33,8*	21,5;47,9	Oui, tout à fait
9,2**	2,0;24,2	14,2**	7,5;23,5	8,4**	1,6;23,3	13,7*	8,5;20,4	-	;	3,8**	0,1;21,3	17,2**	7,8;30,9	Oui, en partie
25,7**	10,7;46,5	10,2**	4,6;18,9	35,5*	19,4;54,4	42,5	34,8;50,2	49,8**	23,4;76,4	55,9*	32,7;77,3	49,1	34,5;63,7	Non
														Les émotions[p]
57,7*	35,4;78,0	39,6	28,6;51,3	57,2	40,1;73,2	50,1	42,3;57,9	41,9*	21,9;64,0	49,0*	28,3;70,0	37,5*	24,4;52,0	Oui, tout à fait
8,5**	1,1;27,3	21,1*	12,2;32,5	29,7*	16,1;46,6	23,5	16,9;31,2	23,9**	9,5;44,6	12,8**	3,1;31,4	23,3**	12,7;37,0	Oui, en partie
33,7**	15,3;56,6	39,4	27,8;51,9	13,0**	4,3;28,1	26,4	19,5;34,3	34,3**	15,6;57,3	38,2**	19,0;60,6	39,3*	26,2;53,6	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
50,1*	28,7;71,4	54,8	43,9;65,6	63,9	44,9;80,2	38,6	30,2;47,0	27,5**	8,5;55,3	41,4**	21,2;64,1	38,2*	24,5;53,4	Oui, tout à fait
16,6**	5,1;36,1	20,0*	11,6;31,0	13,9**	4,2;30,7	19,4*	13,0;27,4	11,1**	1,5;34,1	10,2**	1,8;28,8	12,5**	4,4;26,2	Oui, en partie
33,3**	16,1;54,6	25,2*	15,5;37,1	22,2**	9,2;41,1	42,0	33,5;50,5	61,4*	34,7;83,8	48,3*	27,2;69,9	49,3	35,8;62,9	Non
														Les besoins alimentaires[p]
64,1	43,6;81,4	50,5	37,9;63,0	76,9	60,9;88,6	49,5	41,5;57,4	73,9	52,5;89,3	43,9*	25,1;64,0	49,5	36,1;62,9	Oui, tout à fait
12,2**	3,4;28,6	10,0**	3,8;20,4	16,2**	6,6;31,1	23,7	17,3;31,1	3,6**	0,1;18,7	14,5**	4,3;32,6	19,2**	9,9;32,1	Oui, en partie
23,7**	9,8;43,4	39,5*	27,6;52,5	6,9**	1,2;20,5	26,8	20,1;34,4	22,5**	8,5;43,4	41,6*	22,7;62,5	31,2*	18,8;46,0	Non
														Les activités courantes[p]
62,4	42,8;79,4	56,7	44,6;68,8	73,5	55,9;86,9	50,7	42,4;59,0	65,6*	42,2;84,6	47,6*	26,8;69,1	51,7	38,1;65,3	Oui, tout à fait
18,1**	6,5;36,6	19,5*	10,8;31,1	12,1**	3,6;27,4	23,1*	16,3;31,0	9,1**	1,1;29,5	11,1**	2,1;30,4	26,0*	14,7;40,1	Oui, en partie
19,5**	7,6;37,5	23,8*	13,7;36,6	14,5**	5,5;28,8	26,2	19,5;33,8	25,3**	8,8;49,5	41,3**	20,4;64,7	22,4**	12,0;36,1	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	89,0	86,5;91,5	87,0	76,1;94,2
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	10,1	7,8;12,9	13,0**	5,8;23,9
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	0,9**	0,3;2,0	-	;
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	70,4	66,4;74,4	61,2	46,5;74,5
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	23,5	19,8;27,2	32,8*	20,3;47,5
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	3,8*	2,3;5,8	3,5**	0,5;11,5
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	2,3**	1,2;4,2	2,5**	0,1;12,2
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	58,9	54,7;63,1	58,8	43,9;72,6
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	16,5	13,6;19,9	17,5**	8,7;29,9
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	24,5	20,9;28,1	23,7**	12,8;37,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
91,4	75,7;98,4	90,2	82,5;95,3	93,5	81,8;98,7	90,6	85,5;94,4	78,5	58,4;91,9	88,0	72,4;96,5	87,0	78,0;93,4	Oui, tout à fait
8,6**	1,6;24,3	9,8**	4,7;17,5	6,5**	1,3;18,2	8,3*	4,8;13,2	21,5**	8,1;41,6	12,0**	3,5;27,6	9,7**	4,1;18,8	Oui, en partie
-	;	-	;	-	;	1,1**	0,2;3,6	-	;	-	;	3,2**	0,7;9,1	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
75,0	56,4;88,7	72,5	62,2;81,2	76,1	60,6;87,7	70,5	62,7;77,4	69,4	49,2;85,3	63,4	46,0;78,6	72,7	61,6;82,1	Toujours
15,7**	5,1;33,7	21,9*	14,0;31,7	21,8**	10,6;37,3	23,3	17,0;30,6	14,9**	4,1;34,3	29,9**	15,8;47,5	23,1*	14,4;33,8	La plupart du temps
6,0**	0,6;21,2	4,5**	1,2;11,3	2,1**	0,1;11,0	4,7**	2,0;9,2	10,3**	1,9;28,8	-	;	1,1**	0,0;6,0	À l'occasion
3,2**	0,1;17,5	1,1**	0,0;6,5	-	;	1,5**	0,3;4,5	5,4**	0,5;19,9	6,6**	0,9;21,1	3,1**	0,4;10,9	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
54,7*	36,5;72,1	56,5	46,5;66,6	57,7	42,2;72,2	65,9	58,8;73,0	49,3*	29,5;69,2	50,1*	31,3;69,0	57,4	46,1;68,7	Oui, tout à fait
16,1**	5,4;34,0	16,6*	9,4;26,1	20,3**	9,3;35,9	18,7*	13,2;25,2	13,9**	4,1;31,4	19,3**	7,0;38,6	10,3**	4,8;18,8	Oui, en partie
29,1**	14,0;48,6	26,9*	17,9;37,5	22,0**	10,8;37,3	15,4*	10,3;21,8	36,8**	18,7;58,0	30,5**	14,5;50,9	32,3*	22,2;43,7	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	79,3	75,8;82,7	76,0	62,8;86,3
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	12,9	10,3;16,0	19,0**	9,5;32,0
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	7,8*	5,5;10,6	5,1**	1,1;14,0
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	86,0	82,3;89,1	89,5	78,3;96,2
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	10,6	7,9;13,7	10,5**	3,8;21,7
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	3,5**	1,9;5,8	-	;
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	83,6	78,6;87,9	79,7	62,8;91,3
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	11,0*	7,5;15,4	14,7**	5,1;30,7
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	5,4**	3,0;8,9	5,7**	0,7;18,7
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	74,1	69,1;79,1	65,9*	38,5;87,2
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	16,2	12,1;21,0	17,4**	3,9;42,2
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	9,8*	6,6;13,7	16,7**	3,3;42,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
90,7	75,7;97,9	80,4	71,4;87,5	83,1	67,1;93,4	82,2	75,8;87,5	90,0	72,2;98,1	74,2	55,7;88,0	68,0	56,2;78,2	Aucun report
6,2**	0,7;20,9	11,1**	5,7;18,8	6,0**	1,2;17,0	11,4*	7,3;16,8	4,2**	0,1;22,5	16,6**	6,0;33,5	20,6*	12,6;30,7	Un report
3,2**	0,1;15,1	8,6**	4,2;15,1	10,9**	2,9;26,1	6,4**	3,1;11,5	5,8**	0,7;20,0	9,2**	1,8;25,2	11,5**	5,2;21,0	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
95,7	77,9;99,9	85,5	74,8;92,9	94,0	66,4;99,9	90,6	85,1;94,6	73,7	51,1;89,8	71,9	48,8;88,8	79,7	68,8;88,2	Aucun report
4,3**	0,1;22,1	13,3**	6,3;23,6	6,0**	0,1;33,6	7,2**	3,7;12,3	26,3**	10,2;48,9	22,6**	8,3;44,0	9,3**	3,9;17,9	Un report
-	;	1,2**	0,0;7,2	-	;	2,2**	0,7;5,3	-	;	5,5**	0,2;25,5	11,0**	4,6;21,1	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
81,1	57,1;95,0	83,1*	28,7;99,8	85,3	71,9;94,0	82,7	74,0;89,5	100,0	;	77,7	52,2;93,6	90,8	69,2;99,0	Aucun report
18,9**	5,0;42,9	-	;	8,4**	2,2;20,4	14,4*	8,4;22,5	-	;	-	;	4,6**	0,1;24,6	Un report
-	;	16,9**	0,2;71,3	6,3**	1,4;16,9	2,8**	0,6;8,0	-	;	22,3**	6,4;47,8	4,6**	0,1;25,7	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
92,7	60,8;99,9	61,4	41,3;79,0	86,3	55,2;98,8	73,4	65,6;80,2	84,2	62,8;96,0	85,8*	41,5;99,7	70,1	47,2;87,4	Aucun report
7,3**	0,1;39,2	14,9**	4,5;33,0	13,7**	1,2;44,8	19,5*	13,4;26,8	4,1**	0,1;20,8	-	;	21,4**	6,4;45,4	Un report
-	;	23,6**	10,8;41,4	-	;	7,2**	3,5;12,7	11,8**	2,3;31,5	14,2**	0,3;58,5	8,5**	1,1;26,8	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	7,5*	5,3;10,1	8,4**	2,8;18,6
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	9,8	7,5;12,5	12,4**	5,6;22,6
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	82,7	79,2;85,9	79,2	66,9;88,5
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	21,9	18,6;25,3	40,5*	28,2;52,7
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	14,2	11,5;17,4	13,2**	6,3;23,5
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	63,9	59,8;67,9	46,3	32,9;59,8
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	51,5	47,5;55,5	37,9*	25,2;51,8
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	2,9*	1,8;4,6	5,9**	1,6;14,8
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	45,6	41,5;49,6	56,2	43,2;69,2
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	12,5	10,0;14,9	12,3**	5,5;22,7
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	10,0	7,5;12,8	12,7**	5,3;24,3
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	77,6	74,2;80,9	75,0	62,5;85,1
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	8,6	6,5;11,2	7,4**	2,5;16,4
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	6,6*	4,7;8,9	4,6**	0,9;13,2
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	84,8	81,6;87,7	88,0	77,4;94,8
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	32,0	28,3;35,6	48,2	34,8;61,5
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	7,7	5,8;10,0	5,7**	1,8;13,3
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	60,4	56,5;64,2	46,1*	31,9;60,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
5,6**	0,7;18,7	4,3**	1,1;10,7	6,2**	1,2;17,6	10,4*	6,2;16,0	13,4**	3,9;30,2	8,2**	1,7;22,2	3,9**	0,7;11,6	Oui
5,2**	0,7;17,4	6,5**	2,5;13,5	6,4**	1,1;18,8	15,2*	10,4;21,0	9,3**	1,9;25,3	16,3**	5,2;34,8	3,1**	0,6;8,9	Non, mais il aurait souhaité le consulter
89,2	74,5;97,0	89,2	81,2;94,6	87,4	74,0;95,4	74,5	67,4;80,7	77,3	59,2;90,1	75,6	55,7;89,7	93,0	84,7;97,6	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
32,0*	17,7;49,3	8,3**	3,7;15,4	40,2*	26,3;55,4	15,0*	10,2;20,9	38,0*	21,7;56,7	14,2**	4,2;32,0	19,3*	11,9;28,9	Oui
19,6**	7,9;37,2	8,7**	3,8;16,3	7,6**	2,0;18,9	23,8	17,7;30,7	4,0**	0,1;20,6	14,5**	5,0;30,4	8,3**	3,7;15,5	Non, mais il aurait souhaité le consulter
48,4*	31,2;65,9	83,1	74,3;89,8	52,1	36,9;67,0	61,3	54,0;68,5	57,9*	39,1;75,2	71,3	52,6;85,8	72,4	62,5;80,9	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
61,2	42,6;77,6	36,1	27,0;45,1	66,2	50,2;79,8	63,0	56,0;70,0	62,0	41,8;79,5	57,8	40,1;74,1	39,8	29,2;50,3	Oui
2,4**	0,1;12,8	4,1**	1,1;10,0	2,2**	0,0;13,4	3,2**	1,1;6,9	2,7**	0,1;14,6	-	;	1,1**	0,0;6,4	Non, mais il aurait souhaité le consulter
36,4*	20,2;55,2	59,9	50,6;69,2	31,6*	18,1;47,8	33,8	27,0;40,6	35,4**	18,3;55,7	42,2*	25,9;59,9	59,2	48,5;69,8	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
5,0**	0,6;17,1	2,9**	0,6;8,1	10,1**	3,2;22,5	17,4*	12,2;23,6	28,9**	14,1;47,9	23,3**	10,1;41,7	8,0**	3,5;15,2	Oui
10,2**	2,6;25,1	9,5**	4,4;17,3	11,7**	4,2;24,2	11,9*	7,5;17,6	2,7**	0,1;14,3	9,5**	1,9;26,1	6,9**	2,4;15,0	Non, mais il aurait souhaité le consulter
84,8	68,3;94,7	87,6	79,4;93,4	78,3	64,0;88,8	70,7	63,6;77,2	68,4	49,3;83,8	67,2	48,1;82,9	85,0	76,4;91,5	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
14,7**	5,0;30,9	1,1**	0,0;6,1	7,9**	2,1;19,5	11,2*	6,8;16,9	17,2**	6,5;33,9	12,5**	3,4;29,3	6,4**	2,1;14,3	Oui
7,6**	1,5;21,2	7,5**	3,0;15,1	6,3**	1,0;19,0	7,2**	3,9;12,0	-	;	11,7**	3,1;27,7	6,0**	2,1;13,0	Non, mais il aurait souhaité le consulter
77,6	60,8;89,7	91,4	83,4;96,4	85,8	71,8;94,5	81,6	74,8;87,3	82,8	66,1;93,5	75,8	58,3;88,7	87,7	78,8;93,8	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
24,8**	11,4;43,1	24,4*	16,3;34,1	33,5*	20,2;49,1	33,1	26,1;40,1	17,8**	6,8;34,9	37,5*	21,3;56,0	30,8*	21,2;40,4	Oui
7,9**	1,6;21,8	7,1**	2,8;14,4	3,9**	0,4;13,5	10,0*	6,1;15,3	19,5**	7,2;38,5	9,4**	2,0;24,9	3,0**	0,6;8,8	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
67,3	49,0;82,4	68,5	59,3;77,6	62,6	46,6;76,8	56,9	49,5;64,2	62,7	43,0;79,7	53,2*	35,5;70,3	66,2	56,4;76,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	10,7	8,3;13,0	7,8**	2,5;17,5
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	14,8	12,0;18,0	16,0**	8,2;27,0
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	74,5	71,1;77,9	76,2	63,7;86,0
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	10,5	8,1;12,9	7,9**	2,5;17,8
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	10,7	8,2;13,6	9,1**	3,4;18,8
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	78,8	75,5;82,1	83,0	71,5;91,2
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	12,0	9,5;15,0	8,8**	3,3;18,2
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	14,1	11,3;17,3	11,1**	5,2;19,9
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	73,9	70,3;77,5	80,1	68,8;88,7
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	13,3	10,9;15,7	9,0**	3,3;18,8
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	6,2*	4,3;8,5	2,8**	0,3;10,2
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	80,5	77,6;83,4	88,2	77,4;95,0
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	7,1	5,2;9,4	6,0**	1,6;15,0
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	13,9	11,2;16,7	10,3**	4,2;19,9
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	79,0	75,8;82,2	83,8	72,2;91,9
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	10,2	7,9;13,0	17,8**	9,5;29,2
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	4,9*	3,2;7,0	4,4**	0,8;12,8
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	84,9	81,7;87,8	77,8	65,7;87,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
14,9**	5,0;31,7	2,0**	0,2;7,4	19,3**	9,4;33,2	14,2*	9,6;20,1	12,9**	3,3;31,0	18,7**	7,6;35,4	5,6**	2,1;11,9	Oui
15,7**	5,9;31,3	14,9*	8,6;23,4	10,4**	3,5;22,6	20,1	14,6;26,6	6,1**	0,8;20,2	10,6**	2,6;26,4	11,3**	5,5;20,1	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
69,3	51,3;83,8	83,1	74,4;89,7	70,3	54,8;83,0	65,7	59,1;72,2	80,9	63,3;92,5	70,6	52,7;84,8	83,1	73,7;90,1	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
11,0**	3,1;25,7	4,1**	1,1;10,2	4,1**	0,4;15,0	19,3	14,0;25,7	11,4**	3,2;26,8	-	;	10,0**	4,7;17,9	Oui
19,8**	7,9;37,7	10,2**	5,0;18,1	5,6**	1,1;15,8	10,8*	6,5;16,5	18,8**	6,4;38,6	17,6**	6,3;35,5	6,6**	2,8;12,9	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
69,2	50,3;84,4	85,7	76,9;92,0	90,3	78,2;97,0	69,9	63,4;76,4	69,8	49,5;85,7	82,4	64,5;93,7	83,4	74,7;90,1	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
16,9**	6,3;33,8	5,6**	2,3;11,2	10,3**	3,3;22,9	18,6*	12,8;25,6	12,4**	3,6;28,3	13,4**	3,9;30,5	7,8**	2,9;16,4	Oui
14,5**	5,0;30,3	12,7**	6,8;21,0	9,0**	2,1;23,1	19,8*	14,1;26,5	12,4**	3,2;29,8	22,6**	9,6;41,2	7,5**	3,0;15,1	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
68,6	50,2;83,5	81,7	73,4;88,2	80,7	65,7;91,1	61,6	53,9;69,2	75,2	57,3;88,5	64,0	45,4;80,0	84,7	75,0;91,7	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
12,8**	4,0;28,5	4,6**	1,5;10,5	5,7**	1,2;16,0	25,3	19,4;31,3	21,7**	9,2;39,8	15,8**	5,6;32,2	4,5**	1,5;10,3	Oui
2,4**	0,1;12,6	7,1**	2,8;14,3	4,0**	0,5;13,2	6,8**	3,6;11,6	14,1**	3,8;32,9	5,5**	0,7;18,8	6,6**	2,3;14,4	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
84,8	69,5;94,3	88,3	80,1;94,0	90,3	78,7;96,8	67,8	61,5;74,2	64,2	45,1;80,4	78,7	61,4;90,8	88,9	80,6;94,5	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
10,9**	3,1;25,5	3,2**	0,7;9,2	5,7**	1,2;16,0	9,1*	5,3;14,3	9,5**	2,0;25,1	11,5**	3,1;27,2	5,2**	1,4;12,8	Oui
16,2**	6,1;32,3	9,1**	4,3;16,4	15,2**	5,8;30,1	21,4	15,9;26,9	16,1**	5,2;34,5	11,0**	3,1;25,8	7,2**	2,9;14,5	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
72,9	55,4;86,4	87,6	79,7;93,3	79,1	64,2;89,9	69,5	62,9;76,0	74,4	55,5;88,4	77,5	60,8;89,6	87,6	78,5;93,8	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
13,6**	4,3;29,7	3,2**	0,7;9,3	19,9**	9,5;34,4	9,0*	5,1;14,4	3,9**	0,1;18,8	21,7**	9,4;39,2	6,3**	2,5;12,7	Oui
10,9**	3,1;25,4	5,3**	1,8;11,7	2,0**	0,1;10,6	4,9**	2,1;9,6	7,3**	0,8;24,6	6,1**	0,6;21,3	2,9**	0,5;8,8	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
75,5	57,5;88,7	91,5	84,2;96,1	78,1	62,9;89,2	86,1	79,5;91,2	88,8	71,0;97,6	72,2	54,4;86,0	90,9	83,6;95,6	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p, r]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	8,6	6,5;11,1	10,4**	4,2;20,5
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	91,4	88,9;93,5	89,6	79,5;95,8
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	23,5**	12,6;37,7	18,0**	0,2;72,1
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	76,5	62,3;87,4	82,0*	27,9;99,8
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	28,7*	17,1;42,8	33,6**	2,7;82,9
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	71,3	57,2;82,9	66,4**	17,1;97,3
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	27,4*	15,7;41,9	32,5**	2,9;80,8
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	72,6	58,1;84,3	67,5**	19,2;97,1
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	5,7**	1,3;15,0	14,3**	0,1;68,1
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	94,3	85,0;98,7	85,7*	31,9;99,9
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	48,3	34,5;62,1	51,6**	9,4;92,0
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	51,7	37,9;65,5	48,4**	8,0;90,6
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	8,4**	2,3;20,2	18,0**	0,2;72,1
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	91,6	79,8;97,7	82,0*	27,9;99,8
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	37,0*	23,1;52,7	47,9**	7,8;90,3
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	63,0	47,3;76,9	52,1**	9,7;92,2
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	47,4*	32,5;62,7	63,9**	15,6;96,5
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	52,6	37,3;67,5	36,1**	3,5;84,4
Services d'hébergement ou d'hôtellerie													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	18,9**	9,3;32,4	32,5**	2,9;80,8
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	81,1	67,6;90,7	67,5**	19,2;97,1
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	11,0**	4,5;21,6	29,8**	1,8;80,6
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	89,0	78,4;95,5	70,2**	19,4;98,2
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	4,5**	0,6;14,6	-	;
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	95,5	85,4;99,4	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p, r]
19,3**	7,5;37,1	1,0**	0,0;6,0	5,6**	1,2;15,7	16,0*	11,0;22,1	-	;	5,0**	0,6;17,1	4,4**	1,2;11,1	Oui
80,7	62,9;92,5	99,0	94,0;100,0	94,4	84,3;98,8	84,0	77,9;89,0	100,0	;	95,0	82,9;99,4	95,6	88,9;98,8	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
18,5**	0,3;70,5	-	;	66,6**	5,9;99,7	27,3**	12,4;47,0	-	;	-	;	-	;	Oui
81,5*	29,5;99,7	100,0	;	33,4**	0,3;94,1	72,7	53,0;87,6	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Nutritionniste ou diététiste
32,8**	3,6;78,9	-	;	33,3**	0,2;95,3	30,1**	14,7;49,8	-	;	100,0	;	-	;	Oui
67,2**	21,1;96,4	100,0	;	66,7**	4,7;99,8	69,9	50,2;85,3	-	;	-	;	100,0	;	Non
														Psychologue
18,5**	0,3;70,5	100,0	;	33,3**	0,2;95,3	31,0**	15,4;50,6	-	;	-	;	-	;	Oui
81,5*	29,5;99,7	-	;	66,7**	4,7;99,8	69,0	49,4;84,6	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Travailleur social
-	;	-	;	-	;	3,5**	0,1;17,6	-	;	-	;	19,7**	0,0;86,0	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	96,5	82,4;99,9	-	;	100,0	;	80,3**	14,0;100,0	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
47,1**	8,0;89,3	-	;	33,4**	0,3;94,1	47,1*	28,3;66,5	-	;	100,0	;	61,0**	6,0;98,8	Oui
52,9**	10,7;92,0	100,0	;	66,6**	5,9;99,7	52,9*	33,5;71,7	-	;	-	;	39,0**	1,2;94,0	Non
														Médicaments
-	;	-	;	-	;	-	;	-	;	100,0	;	41,7**	1,4;95,1	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	-	;	-	;	58,3**	4,9;98,6	Non
														Services de transport
34,4**	3,3;82,3	-	;	33,3**	0,2;95,3	37,5**	19,0;59,2	-	;	100,0	;	22,0**	0,1;87,7	Oui
65,6**	17,7;96,7	100,0	;	66,7**	4,7;99,8	62,5*	40,8;81,0	-	;	-	;	78,0**	12,3;99,9	Non
														Services d'aide à domicile
81,6*	28,5;99,7	-	;	66,6**	5,9;99,7	38,7*	20,4;59,6	-	;	-	;	41,7**	1,4;95,1	Oui
18,4**	0,3;71,5	100,0	;	33,4**	0,3;94,1	61,3*	40,4;79,6	-	;	100,0	;	58,3**	4,9;98,6	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie
14,3**	0,2;63,2	-	;	-	;	23,7**	9,3;44,4	-	;	-	;	-	;	Oui
85,7*	36,8;99,8	100,0	;	100,0	;	76,3	55,6;90,7	-	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Soins infirmiers à domicile
14,3**	0,2;63,2	-	;	-	;	6,9**	0,9;22,4	-	;	-	;	17,0**	0,0;85,3	Oui
85,7*	36,8;99,8	100,0	;	100,0	;	93,1	77,6;99,1	-	;	100,0	;	83,0**	14,7;100,0	Non
														Autres services ou ressources
18,4**	0,3;71,5	-	;	-	;	4,0**	0,1;20,5	-	;	-	;	-	;	Oui
81,6*	28,5;99,7	100,0	;	100,0	;	96,0	79,5;99,9	-	;	100,0	;	100,0	;	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	98,2	96,5;99,2	97,7	87,0;100,0
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	1,8**	0,8;3,5	2,3**	0,0;13,0
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	48,5	44,5;52,5	34,6*	23,2;47,6
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	7,2	5,4;9,5	16,4**	8,1;28,2
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	26,5	22,9;30,1	25,6*	14,7;39,2
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	17,8	14,7;21,2	23,4*	13,0;36,9
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	43,3	39,2;47,5	27,4*	17,2;39,7
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	13,1	10,3;16,2	27,2*	16,0;40,9
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	25,5	22,0;29,0	28,3*	17,2;41,9
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	18,1	14,8;21,7	17,1**	7,8;30,6
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	4,0*	2,4;6,2	6,4**	1,5;16,5
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	5,7*	3,9;8,0	1,7**	0,0;9,7
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	19,5	16,3;23,0	24,4*	14,6;36,4
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	12,1	9,6;15,1	18,7**	9,5;31,5
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	49,0	44,9;53,2	44,4*	30,9;58,0
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	9,6	7,4;12,2	4,4**	0,8;13,1
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	0,5**	0,1;1,4	-	;
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	7,1*	5,0;9,7	14,4**	6,4;26,3
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	92,4	89,8;94,5	85,6	73,7;93,6
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	90,3	87,6;92,6	83,8	72,1;92,1
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	8,6	6,4;11,3	14,5**	6,5;26,4
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	1,1**	0,4;2,3	1,7**	0,0;9,2

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
94,3	81,5;99,2	100,0	;	100,0	;	98,5	95,5;99,7	100,0	;	100,0	;	95,6	87,3;99,2	Oui
5,7**	0,8;18,5	-	;	-	;	1,5**	0,3;4,5	-	;	-	;	4,4**	0,8;12,7	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
63,0	43,9;79,6	48,7	38,6;58,9	79,3	64,9;89,7	49,1	41,9;56,3	27,8**	13,8;45,8	44,3*	27,8;61,8	44,9	33,2;56,7	Médecin spécialiste du cancer
-	;	1,1**	0,0;5,9	1,9**	0,0;11,2	11,8*	7,6;17,1	2,9**	0,1;14,3	8,2**	1,8;21,6	4,9**	1,3;12,5	Médecin de famille
24,7**	10,6;44,2	37,1	27,3;46,8	5,9**	0,7;20,2	18,4*	12,9;24,9	47,7*	29,1;66,8	22,5**	9,9;40,4	37,2*	26,0;49,4	Autre médecin spécialiste
12,3**	3,3;29,1	13,1**	6,8;22,1	12,8**	4,8;25,9	20,8	15,1;27,4	21,6**	9,1;39,7	25,0**	11,9;42,5	13,0**	6,6;22,1	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
59,3*	40,0;76,7	36,4	27,0;45,8	75,2	60,6;86,6	47,3	40,3;54,4	20,4**	8,3;38,2	31,8*	17,2;49,6	44,0	33,0;55,1	Médecin spécialiste du cancer
10,7**	2,3;27,9	10,8**	5,4;18,9	7,4**	2,1;17,6	17,9*	12,3;24,7	-	;	11,7**	3,0;28,4	6,0**	1,9;13,7	Médecin de famille
24,2**	10,7;42,9	42,1	32,5;51,8	7,4**	1,4;20,8	13,1*	8,6;18,8	45,8*	27,6;64,9	25,5**	12,0;43,6	32,1*	21,9;43,7	Autre médecin spécialiste
5,8**	0,7;19,8	10,7**	5,1;19,0	10,0**	3,2;22,1	21,7	15,7;28,6	33,9**	17,5;53,7	31,0**	16,3;49,0	17,8*	10,0;28,2	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
7,0**	0,8;23,8	1,1**	0,0;5,8	-	;	7,3**	3,5;13,3	-	;	2,5**	0,0;14,4	2,5**	0,3;9,0	Au besoin
10,5**	2,2;27,9	3,1**	0,6;8,7	16,1**	7,0;29,8	4,2**	1,7;8,3	2,7**	0,1;14,4	14,7**	5,4;29,9	4,1**	1,1;10,4	À tous les mois
20,2**	8,3;37,8	15,6*	9,1;24,3	30,7*	17,9;46,0	10,8*	6,4;16,7	15,1**	5,0;32,2	16,7**	6,5;32,7	31,1*	20,8;42,9	À tous les 2 ou 3 mois
12,8**	3,6;29,5	7,7**	3,2;15,0	19,3**	9,4;33,2	9,3*	5,2;15,0	5,7**	0,5;21,5	19,3**	7,8;36,4	12,2**	6,3;20,8	À tous les 4 mois
44,1*	25,8;63,7	64,0	54,3;73,7	32,0*	18,7;47,7	54,0	46,1;61,9	57,0*	38,1;74,5	42,5*	26,0;60,4	40,1	29,9;50,2	À tous les 6 mois
5,3**	0,7;17,5	8,6**	3,6;16,5	2,0**	0,0;10,9	14,5*	9,8;20,2	19,5**	7,1;38,5	4,3**	0,2;20,0	10,0**	4,4;18,7	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	-	;	-	;	0,6**	0,0;2,9	-	;	3,1**	0,1;17,1	0,9**	0,0;4,6	Trop long
6,2**	0,8;20,3	7,7**	3,1;15,5	1,9**	0,0;10,6	9,1*	5,4;14,1	6,9**	0,7;24,5	-	;	4,1**	1,1;10,4	Trop court
93,8	79,7;99,2	92,3	84,5;96,9	98,1	89,4;100,0	90,3	85,2;94,1	93,1	75,5;99,3	96,9	82,9;99,9	95,1	88,7;98,4	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
93,4	78,4;99,1	95,7	89,7;98,8	96,3	87,0;99,6	85,2	79,2;90,0	85,7	67,5;95,9	100,0	;	92,2	84,7;96,7	Tout à fait capable
6,6**	0,9;21,6	3,3**	0,7;9,1	1,8**	0,1;9,5	14,2*	9,4;20,2	11,1**	2,4;28,9	-	;	6,8**	2,6;14,2	En partie capable
-	;	1,0**	0,0;5,4	1,8**	0,0;10,1	0,6**	0,0;3,2	3,2**	0,1;17,0	-	;	1,0**	0,0;5,3	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	57,6	53,4;61,8	55,8	42,6;69,1
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	15,7	12,7;19,1	15,8**	6,9;29,1
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	26,7	22,8;30,6	28,4*	17,1;42,2
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	46,2	37,9;54,6	38,0**	13,9;67,5
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	53,8	45,4;62,1	62,0*	32,5;86,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p]
45,9*	27,9;64,8	61,9	51,7;72,1	69,1	54,1;81,7	51,9	44,3;59,6	62,4	43,1;79,3	42,5*	24,5;62,1	64,8	53,0;75,5	Oui, tout à fait
22,4**	9,8;40,2	10,4**	4,9;18,7	9,6**	3,3;20,7	23,0	17,1;29,8	5,3**	0,5;19,4	13,7**	4,4;29,7	14,1**	7,1;24,0	oui, en partie
31,7**	16,0;51,1	27,7*	18,4;38,6	21,2**	10,9;35,2	25,1	18,5;32,7	32,3**	15,9;52,6	43,8*	25,4;63,6	21,1*	12,3;32,4	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
57,7**	23,3;87,2	20,1**	3,7;50,6	51,2**	22,2;79,6	55,6	40,7;69,8	36,6**	10,3;70,6	72,1*	35,6;94,7	28,8**	8,5;58,2	Oui
42,3**	12,8;76,7	79,9	49,4;96,3	48,8**	20,4;77,8	44,4*	30,2;59,3	63,4*	29,4;89,7	27,9**	5,3;64,4	71,2*	41,8;91,5	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	27,3	23,8;30,8	20,5*	11,8;31,9
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	46,2	42,4;50,1	51,1	38,4;63,8
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	26,4	22,9;30,0	28,4*	17,6;41,3
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	28,1	24,6;31,7	23,0*	13,7;34,7
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	39,5	35,5;43,5	27,7*	16,5;41,5
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	32,4	28,7;36,1	49,3	36,4;62,1
Modification de l'alimentation[p]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	44,9	41,0;48,8	56,8	44,6;69,0
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	25,9	22,4;29,4	14,0**	6,3;25,6
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	29,2	25,6;32,7	29,2*	18,1;42,4
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	15,4	12,7;18,0	6,0**	1,6;14,7
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	8,9	6,6;11,6	8,8**	2,5;21,0
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	75,8	72,3;79,2	85,2	72,7;93,5
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	0,9**	0,3;2,2	-	;
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	2,1**	1,1;3,8	1,6**	0,0;8,6
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	97,0	95,0;98,3	98,4	91,4;100,0
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	9,6	7,3;12,4	15,8**	8,0;27,0
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	11,7	9,2;14,7	11,7**	4,6;23,4
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	78,7	75,5;81,9	72,4	58,4;83,8
Gestion du stress[p]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	37,9	34,2;41,6	32,1*	21,2;44,5
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	23,6	20,1;27,0	21,9*	12,2;34,5
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	38,5	34,7;42,3	46,0	33,6;58,4

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p]
34,1*	18,9;52,2	17,2*	9,9;26,8	37,5*	23,1;53,8	34,2	27,7;40,8	39,4*	21,9;59,2	22,8**	10,1;40,5	20,8*	13,6;29,6	Oui
42,5*	25,6;60,8	56,5	46,2;66,7	33,7*	20,4;49,2	39,6	32,5;46,7	33,4**	17,3;53,0	65,5	47,2;80,9	49,1	38,7;59,4	Non
23,4**	10,7;40,8	26,4*	17,7;36,6	28,8*	16,4;44,0	26,2	19,6;33,7	27,2**	12,6;46,5	11,8**	3,2;27,9	30,1*	20,9;39,4	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
41,3*	23,6;60,7	22,0*	14,1;31,8	30,8*	17,7;46,6	28,4	22,1;35,5	19,7**	8,0;37,1	18,6**	7,5;35,4	36,3	26,8;45,9	Oui
35,9*	20,4;53,9	46,9	36,9;56,9	41,1*	27,6;54,6	39,8	33,0;46,7	39,5*	22,1;59,2	47,5*	31,4;64,1	37,4	27,7;47,1	Non
22,8**	10,4;40,2	31,1*	21,7;40,5	28,1*	16,5;42,4	31,7	25,0;38,5	40,8*	23,2;60,3	33,9*	19,2;51,3	26,3*	17,3;37,0	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p]
60,7	42,6;76,9	34,0	24,5;43,5	48,1*	32,3;64,1	48,8	41,8;55,7	35,9*	20,2;54,1	30,6**	15,7;49,3	42,4	33,0;51,8	Oui
18,9**	7,6;35,8	39,3	29,1;49,4	26,4**	14,0;42,2	18,0	13,0;24,0	27,1**	13,6;44,6	44,2*	27,4;62,0	29,2	21,1;38,5	Non
20,4**	8,4;38,2	26,7*	18,1;37,0	25,6*	14,0;40,3	33,2	26,5;39,9	37,1*	21,4;55,0	25,2**	12,2;42,6	28,4*	19,9;38,2	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
16,4**	6,1;32,9	10,1**	4,9;17,8	14,4**	6,5;26,4	14,6*	10,0;20,2	16,9**	6,7;32,8	41,5*	24,5;60,1	18,1*	10,9;27,4	Oui
22,0**	9,4;40,1	5,8**	2,2;12,0	3,7**	0,4;12,8	7,8**	4,3;12,7	-	;	13,0**	4,4;27,6	12,7**	6,8;21,0	Non
61,5	42,8;78,0	84,1	75,8;90,4	81,9	68,6;91,3	77,7	71,1;83,3	83,1	67,2;93,3	45,5*	28,1;63,8	69,2	59,7;78,7	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
2,4**	0,1;12,6	-	;	-	;	1,1**	0,1;4,0	-	;	4,2**	0,1;21,0	1,1**	0,0;5,9	Oui
3,1**	0,1;15,2	1,0**	0,0;5,3	2,0**	0,1;10,5	1,3**	0,1;4,9	2,8**	0,1;14,4	3,2**	0,1;16,4	4,0**	1,1;9,7	Non
94,6	81,8;99,3	99,0	94,7;100,0	98,0	89,5;99,9	97,6	93,6;99,4	97,2	85,6;99,9	92,6	75,7;99,1	94,9	88,8;98,3	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
4,8**	0,6;15,9	11,5**	5,6;20,1	8,7**	2,6;20,3	8,1**	4,4;13,4	14,1**	4,8;29,8	5,6**	0,6;19,5	8,3**	3,8;15,4	Oui
6,1**	0,7;20,7	18,4*	11,2;27,6	11,0**	3,5;24,3	6,4**	3,2;11,3	8,8**	2,0;22,8	19,5**	8,6;35,4	14,5**	8,0;23,5	Non
89,1	74,3;97,0	70,1	59,5;79,4	80,3	66,1;90,5	85,5	79,5;90,3	77,1	59,8;89,6	74,9	58,7;87,2	77,1	67,2;85,3	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p]
42,2*	25,0;60,9	22,0*	14,4;31,3	46,1	32,6;59,5	48,5	41,5;55,5	56,5*	37,7;74,0	28,8**	14,2;47,5	31,7*	22,2;41,2	Oui
28,4**	14,1;46,9	32,1	23,1;41,0	13,9**	5,8;26,7	18,9*	13,3;25,8	18,4**	7,1;35,8	30,9**	15,2;50,6	26,4*	17,9;36,3	Non
29,4**	15,2;47,3	45,9	36,1;55,7	40,0*	25,5;56,0	32,6	25,7;39,4	25,1**	11,3;44,0	40,3*	23,8;58,6	42,0	32,0;52,0	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	46,1	42,2;50,0	30,0*	19,6;42,0
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	14,8	12,1;17,5	16,6**	8,2;28,5
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	39,1	35,2;43,1	53,4	40,5;66,3
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	0,8**	0,3;1,7	-	;
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	99,2	98,3;99,7	100,0	;
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	0,7**	0,3;1,7	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	99,3	98,3;99,7	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]
53,6*	35,2;71,3	24,0*	16,2;33,2	48,5*	33,5;63,8	57,5	50,5;64,5	56,4*	38,5;73,3	55,9*	37,9;72,8	47,9	38,3;57,4	Oui
8,5**	1,9;22,2	32,5	23,1;42,0	13,2**	4,9;26,9	2,6**	0,9;6,0	19,9**	8,0;37,6	5,0**	0,5;17,4	21,3*	14,0;30,4	Non
37,9*	21,9;56,1	43,5	34,0;53,0	38,3*	24,5;53,6	39,9	32,9;46,9	23,7**	10,0;43,1	39,2*	23,3;57,0	30,8	22,0;39,6	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
2,4**	0,1;12,8	-	;	1,8**	0,0;10,3	1,7**	0,4;4,8	-	;	-	;	-	;	Oui
97,6	87,2;99,9	100,0	;	98,2	89,7;100,0	98,3	95,2;99,6	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autre
2,4**	0,1;12,1	-	;	1,8**	0,0;9,8	1,6**	0,3;4,5	-	;	-	;	-	;	Oui
97,6	87,9;99,9	100,0	;	98,2	90,2;100,0	98,4	95,5;99,7	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	47,5	39,8;55,2	49,9*	29,1;70,7
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	52,5	44,8;60,2	50,1*	29,3;70,9
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	81,6	76,6;86,0	90,2	73,4;98,0
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	18,4	14,0;23,4	9,8**	2,0;26,6
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	47,2	38,4;56,1	57,1**	22,5;87,2
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	52,8	43,9;61,6	42,9**	12,8;77,5
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	26,5*	18,6;35,6	41,4**	11,1;77,6
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	73,5	64,4;81,4	58,6**	22,4;88,9
Groupe d'entraide ou association de patients[r]													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	12,6*	7,8;18,9	45,0**	19,3;72,8
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	87,4	81,1;92,2	55,0*	27,2;80,7
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	51,3	44,8;57,7	60,2*	34,7;82,2
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	48,7	42,3;55,2	39,8**	17,8;65,3
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	60,3	53,6;66,9	56,6*	34,3;77,0
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	39,7	33,1;46,4	43,4*	23,0;65,7

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région																				
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres								
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)							
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients						
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]						
46,4**	13,5;82,0	31,8**	13,1;56,1	52,8**	18,5;85,2	44,0*	30,0;58,8	32,7**	9,2;65,3	51,6**	15,0;86,9	68,7	46,0;86,3	Oui						
53,6**	18,0;86,5	68,2*	43,9;86,9	47,2**	14,8;81,5	56,0	41,2;70,0	67,3*	34,7;90,8	48,4**	13,1;85,0	31,3**	13,7;54,0	Non						
														Soutien de la famille ou des amis						
78,8	55,6;93,4	80,0	64,5;90,9	83,5	62,3;95,6	80,0	71,0;87,2	69,6*	40,3;90,4	85,9	62,0;97,5	84,6	66,4;95,2	Oui						
21,2**	6,6;44,4	20,0**	9,1;35,5	16,5**	4,4;37,7	20,0*	12,8;29,0	30,4**	9,6;59,7	14,1**	2,5;38,0	15,4**	4,8;33,6	Non						
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics						
36,8**	13,0;66,6	55,6*	26,3;82,2	49,1**	8,3;91,0	49,1*	33,8;64,6	43,3**	4,8;89,8	42,1**	9,7;80,7	41,6**	17,5;69,1	Oui						
63,2*	33,4;87,0	44,4**	17,8;73,7	50,9**	9,0;91,7	50,9	35,4;66,2	56,7**	10,2;95,2	57,9**	19,3;90,3	58,4*	30,9;82,5	Non						
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique						
24,4**	6,8;52,1	32,1**	9,1;64,4	34,1**	2,7;83,6	26,1**	13,3;42,8	32,4**	2,6;81,7	15,2**	1,6;46,6	17,2**	1,8;51,8	Oui						
75,6	47,9;93,2	67,9*	35,6;90,9	65,9**	16,4;97,3	73,9	57,2;86,7	67,6**	18,3;97,4	84,8	53,4;98,4	82,8	48,2;98,2	Non						
														Groupe d'entraide ou association de patients[r]						
15,8**	2,4;44,0	4,9**	0,1;25,6	12,6**	0,2;56,9	11,5**	4,7;22,4	-	;	6,8**	0,1;34,0	6,7**	0,2;30,2	Oui						
84,2	56,0;97,6	95,1	74,4;99,9	87,4	43,1;99,8	88,5	77,6;95,3	100,0	;	93,2	66,0;99,9	93,3	69,8;99,8	Non						
														Exemple de l'entourage[p]						
45,4*	25,9;66,0	57,4*	37,6;75,5	57,3**	26,4;84,5	56,7	46,6;66,7	38,5**	13,7;68,7	33,4**	12,4;60,7	44,2*	25,6;64,0	Oui						
54,6*	34,0;74,1	42,6*	24,5;62,4	42,7**	15,5;73,6	43,3	33,3;53,4	61,5*	31,3;86,3	66,6*	39,3;87,6	55,8*	36,0;74,4	Non						
														Prière ou soutien spirituel[p]						
56,6*	34,1;77,2	45,0*	26,3;64,8	58,2*	34,0;79,9	67,2	55,5;77,5	36,9**	12,4;67,9	86,1	53,2;98,9	62,8	43,4;79,6	Oui						
43,4*	22,8;65,9	55,0*	35,2;73,7	41,8**	20,1;66,0	32,8*	22,5;44,5	63,1*	32,1;87,6	13,9**	1,1;46,8	37,2*	20,4;56,6	Non						

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24
Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Laurentides et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,4	8,7;14,5
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	0,6**	0,2;1,7	-	;
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	2,7*	1,5;4,3	1,6**	0,0;8,3
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	12,0	9,5;15,0	14,8**	6,6;27,0
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	33,3	29,2;37,3	43,0	30,6;55,4
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	51,4	47,0;55,7	40,7	28,8;52,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région															
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres			
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)		
5,7*	4,1;7,8	16,0	13,6;18,4	8,2	6,2;10,7	28,2	25,5;30,8	5,4*	3,9;7,4	6,3*	4,4;8,5	18,8	15,7;21,9	Ensemble des patients	
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic	
2,4**	0,1;12,8	-	;	-	;	0,5**	0,0;3,0	-	;	-	;	1,9**	0,2;6,7	Mauvaise	
5,6**	0,6;19,2	1,9**	0,2;6,4	-	;	3,2**	1,2;6,9	3,4**	0,0;20,7	2,5**	0,1;13,3	3,3**	0,7;9,2	Passable	
17,4**	6,6;34,3	14,6*	8,5;22,9	6,0**	1,3;16,4	11,1*	6,9;16,7	13,5**	3,6;31,7	15,6**	5,3;32,6	8,8**	3,5;17,5	Bonne	
24,6**	10,7;43,9	32,6*	23,0;42,2	26,7**	14,0;42,9	32,5	25,5;39,4	48,2*	30,3;66,5	39,4*	24,3;56,1	28,3*	19,7;38,3	Très bonne	
49,9*	32,2;67,7	50,9	40,6;61,2	67,3	50,9;81,1	52,7	45,3;60,0	34,8*	18,9;53,8	42,5*	26,5;59,7	57,7	47,5;68,0	Excellente	

Région 16

MONTÉRÉGIE

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 1
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province	Région	
	%	%	Intervalle de confiance (95 %)
Sexe			
Hommes	46,1	47,4	46,4 ; 48,4
Femmes	53,9	52,6	51,6 ; 53,6
Âge			
18 à 49 ans	18,9	19,6	19,1 ; 20,2
50 à 59 ans	24,9	24,6	22,6 ; 26,6
60 à 69 ans	29,8	32,3	29,5 ; 35,2
70 ans et plus	26,5	23,4	21,4 ; 25,5
Principale langue parlée à la maison			
Français	86,4	89,9	87,9 ; 91,9
Anglais	10,6	8,7	6,9 ; 10,8
Autres	3,0	1,4**	0,7 ; 2,5
Scolarité			
Moins qu'un diplôme d'études secondaires	27,1	27,8	24,9 ; 30,8
Diplôme d'études secondaires	24,7	26,6	23,7 ; 29,5
Diplôme d'études postsecondaires	27,6	26,2	23,4 ; 29,1
Diplôme d'études universitaires	20,6	19,4	17,0 ; 21,7
Occupation principale			
En emploi	29,3	30,2	27,8 ; 32,7
Étudiant	1,7	2,1*	1,3 ; 3,3
Retraité	55,8	55,4	53,0 ; 57,8
À la maison	7,2	7,2	5,6 ; 9,0
Prestataire d'assurance-emploi / aide sociale	2,4	1,5**	0,8 ; 2,6
Congé de maternité / autres	3,6	3,5*	2,4 ; 4,9
Situation familiale			
Vit seul	24,1	21,0	18,3 ; 23,7
Vit en couple, sans enfants à la maison	52,3	55,7	52,6 ; 58,8
Vit en couple, avec enfants à la maison	15,1	14,8	12,7 ; 16,9
Vit seul, avec enfants à la maison	3,8	3,9*	2,8 ; 5,3
Autres	4,8	4,6*	3,2 ; 6,3
Situation économique perçue			
À l'aise financièrement	18,8	18,1	15,6 ; 20,6
Revenu suffisant	61,4	63,3	60,0 ; 66,6
S'estime pauvre ou très pauvre	19,7	18,6	15,9 ; 21,3
Indice de défavorisation matérielle			
1 - très favorisé	21,8	24,7	21,8 ; 27,6
2	21,1	25,9	23,0 ; 28,7
3	20,1	22,7	19,9 ; 25,4
4	19,4	19,2	16,5 ; 21,9
5 - très défavorisé	17,6	7,6	5,9 ; 9,6

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

2. CARACTÉRISTIQUES DE SANTÉ DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 2
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et le sexe, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province			Région					
	Ensemble province	Homme	Femme	Ensemble région		Homme		Femme	
	%			%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Siège du cancer[p, r]									
Colorectal	11,8	15,0	9,1	11,8	9,8 ; 13,9	15,5	12,3 ; 19,2	8,5*	6,2 ; 11,4
Génital féminin	5,5	...	10,2	5,1	3,8 ; 6,9	...	;	9,8	7,1 ; 13,1
Prostate	15,9	34,4	...	17,0	15,2 ; 18,8	35,8	32,0 ; 39,6	...	;
Hématopoïétique	8,0	9,7	6,6	6,6	5,2 ; 8,3	7,5*	5,3 ; 10,3	5,8*	4,0 ; 8,1
Sein	26,5	0,4**	48,8	27,1	24,9 ; 29,4	0,7**	0,1 ; 1,9	51,1	47,0 ; 55,2
ORL (Tête et cou)	6,3	6,5	6,2	5,8	4,5 ; 7,4	5,8*	3,8 ; 8,5	5,8*	4,1 ; 8,0
Broncho-pulmonaire	5,7	6,3	5,2	5,5	4,1 ; 7,2	5,1*	3,2 ; 7,7	5,8*	4,0 ; 8,1
Autres cancers	20,3	27,7	14,0	20,9	18,3 ; 23,6	29,5	25,3 ; 33,7	13,2	10,3 ; 16,5
Historique de la maladie[p]									
Premier cancer	85,3	86,1	84,6	86,0	83,7 ; 88,3	86,4	82,6 ; 89,7	85,7	82,2 ; 88,7
Récidive	7,4	7,5	7,3	8,0	6,3 ; 10,0	8,9*	6,2 ; 12,3	7,2*	5,0 ; 9,9
Deuxième cancer	7,3	6,4	8,1	6,0	4,5 ; 7,8	4,7*	2,8 ; 7,3	7,2*	4,9 ; 10,1
Stade de traitement au moment de l'enquête[p, r]									
Sous traitement	12,0	13,9	10,3	12,5	10,3 ; 14,6	13,5	10,4 ; 17,1	11,5	8,8 ; 14,8
Sans traitement avec médication	19,9	5,6	32,0	19,6	17,2 ; 21,9	4,1*	2,4 ; 6,6	33,3	29,1 ; 37,5
Sans traitement sans médication	68,1	80,4	57,6	68,0	65,0 ; 71,0	82,4	78,2 ; 86,0	55,1	50,8 ; 59,5
Médecin de famille durant les traitements[p]									
Oui	41,2	43,4	39,3	39,7	36,5 ; 42,8	40,7	36,1 ; 45,3	38,7	34,5 ; 43,0
Non	58,8	56,6	60,7	60,3	57,2 ; 63,5	59,3	54,7 ; 63,9	61,3	57,0 ; 65,5
Médecin de famille au moment de l'enquête									
Oui	91,7	91,5	92,0	90,2	88,1 ; 92,1	91,0	87,9 ; 93,6	89,5	86,6 ; 92,0
Non	8,3	8,5	8,0	9,8	7,9 ; 11,9	9,0*	6,4 ; 12,1	10,5	8,0 ; 13,4
Perception de l'état de santé[p]									
Excellent	11,5	13,0	10,3	11,8	9,7 ; 13,9	12,5	9,6 ; 16,0	11,1	8,2 ; 14,5
Très bon	29,2	29,3	29,1	30,6	27,4 ; 33,7	30,0	25,6 ; 34,3	31,1	26,9 ; 35,2
Bon	34,9	34,2	35,5	34,8	31,5 ; 38,1	36,7	31,9 ; 41,5	33,1	29,0 ; 37,3
Moyen	18,8	17,8	19,6	18,5	16,0 ; 21,1	17,4	13,8 ; 21,6	19,5	16,2 ; 23,2
Mauvais	5,6	5,7	5,5	4,3	3,2 ; 5,8	3,4*	2,0 ; 5,4	5,2*	3,5 ; 7,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Tableau 3
Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques de santé et l'âge, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province				
	Ensemble province	18 à 49 ans	50 à 59 ans	60 à 69 ans	70 ans et plus
	%				
Siège du cancer[p, r]					
Colorectal	11,8	4,5	10,4	12,6	17,5
Génital féminin	5,5	6,2	6,8	4,6	4,8
Prostate	15,9	1,0**	14,4	24,9	17,8
Hématopoïétique	8,0	14,0	7,7	7,2	5,0
Sein	26,5	37,3	30,8	22,1	19,5
ORL (Tête et cou)	6,3	11,0	7,1	5,3	3,5
Broncho-pulmonaire	5,7	2,5*	5,8	7,0	6,4
Autres cancers	20,3	23,6	17,0	16,3	25,5
Historique de la maladie[p]					
Premier cancer	85,3	90,0	85,6	85,1	81,9
Récidive	7,4	7,0	8,4	7,5	6,5
Deuxième cancer	7,3	3,1	6,0	7,4	11,6
Stade de traitement au moment de l'enquête[p]					
Sous traitement	12,0	10,4	12,1	12,5	12,5
Sans traitement avec médication	19,9	25,9	20,6	17,8	17,3
Sans traitement sans médication	68,1	63,8	67,3	69,7	70,2
Médecin de famille durant les traitements[p, r]					
Oui	41,2	31,6	39,6	44,9	45,4
Non	58,8	68,4	60,4	55,1	54,6
Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]					
Oui	91,7	82,8	90,2	94,6	96,4
Non	8,3	17,2	9,8	5,4	3,6
Perception de l'état de santé[p]					
Excellent	11,5	12,4	10,5	11,0	12,5
Très bon	29,2	28,3	31,4	30,4	26,3
Bon	34,9	34,4	32,6	36,0	36,0
Moyen	18,8	17,5	18,7	17,8	20,9
Mauvais	5,6	7,4	6,8	4,8	4,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et l'âge est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le sexe est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région										
Ensemble région		18 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 ans et plus		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
										Siège du cancer[p, r]
11,8	9,8 ; 13,9	5,3**	2,6 ; 9,6	11,0*	7,5 ; 15,4	14,5	10,7 ; 18,8	14,6*	9,9 ; 20,6	Colorectal
5,1	3,8 ; 6,9	4,5**	2,1 ; 8,3	7,5*	4,6 ; 11,6	4,8**	2,6 ; 8,0	3,7**	1,3 ; 8,2	Génital féminin
17,0	15,2 ; 18,8	0,4**	0,0 ; 2,3	15,2	11,3 ; 19,7	26,8	22,4 ; 31,3	19,4	14,8 ; 24,7	Prostate
6,6	5,2 ; 8,3	12,6*	8,5 ; 17,7	6,9*	4,1 ; 10,6	5,2*	3,0 ; 8,3	3,4**	1,4 ; 6,8	Hématopoïétique
27,1	24,9 ; 29,4	37,3	32,0 ; 42,5	29,2	24,1 ; 34,3	20,8	16,7 ; 24,8	25,1	19,6 ; 30,7	Sein
5,8	4,5 ; 7,4	7,5*	4,4 ; 12,0	8,4*	5,2 ; 12,7	5,0*	2,9 ; 8,0	2,7**	0,9 ; 6,0	ORL (Tête et cou)
5,5	4,1 ; 7,2	2,9**	1,1 ; 6,1	7,1*	4,2 ; 11,1	6,1*	3,8 ; 9,3	5,1**	2,2 ; 9,9	Broncho-pulmonaire
20,9	18,3 ; 23,6	29,6	24,2 ; 35,0	14,7*	10,5 ; 19,9	16,9	12,7 ; 21,7	25,9	19,8 ; 32,8	Autres cancers
										Historique de la maladie[p]
86,0	83,7 ; 88,3	88,2	82,4 ; 92,5	85,9	80,5 ; 90,2	86,9	82,4 ; 90,5	83,2	77,0 ; 88,4	Premier cancer
8,0	6,3 ; 10,0	8,8*	5,0 ; 14,2	10,3*	6,7 ; 15,0	6,5*	3,8 ; 10,1	7,0**	3,7 ; 11,8	Récidive
6,0	4,5 ; 7,8	3,0**	1,0 ; 6,7	3,9**	1,8 ; 7,2	6,7*	4,2 ; 10,0	9,8*	5,8 ; 15,2	Deuxième cancer
										Stade de traitement au moment de l'enquête[p]
12,5	10,3 ; 14,6	9,2*	5,6 ; 14,1	13,3*	9,3 ; 18,3	11,6*	8,2 ; 15,7	15,5*	10,3 ; 21,8	Sous traitement
19,6	17,2 ; 21,9	22,6	17,5 ; 27,8	20,0	15,3 ; 24,8	16,0	12,0 ; 20,7	21,2	15,6 ; 27,8	Sans traitement avec médication
68,0	65,0 ; 71,0	68,1	62,3 ; 74,0	66,6	60,7 ; 72,5	72,4	67,3 ; 77,5	63,3	56,0 ; 70,6	Sans traitement sans médication
										Médecin de famille durant les traitements[p, r]
39,7	36,5 ; 42,8	27,8	21,2 ; 35,1	37,0	30,9 ; 43,1	46,1	40,5 ; 51,6	43,8	36,0 ; 51,7	Oui
60,3	57,2 ; 63,5	72,2	64,9 ; 78,8	63,0	56,9 ; 69,1	53,9	48,4 ; 59,5	56,2	48,3 ; 64,0	Non
										Médecin de famille au moment de l'enquête[p, r]
90,2	88,1 ; 92,1	82,1	75,6 ; 87,5	87,3	82,3 ; 91,3	93,5	90,2 ; 96,0	95,6	90,8 ; 98,3	Oui
9,8	7,9 ; 11,9	17,9*	12,5 ; 24,4	12,7*	8,7 ; 17,7	6,5*	4,0 ; 9,8	4,4**	1,7 ; 9,2	Non
										Perception de l'état de santé[p]
11,8	9,7 ; 13,9	12,5*	8,2 ; 17,9	8,8*	5,6 ; 13,1	11,4*	8,2 ; 15,4	14,7*	9,8 ; 20,9	Excellent
30,6	27,4 ; 33,7	31,7	25,1 ; 38,4	33,2	27,3 ; 39,1	31,6	26,0 ; 37,3	25,3	19,1 ; 32,4	Très bon
34,8	31,5 ; 38,1	34,7	27,9 ; 41,4	33,6	27,5 ; 39,6	35,2	29,5 ; 40,8	35,8	28,6 ; 43,1	Bon
18,5	16,0 ; 21,1	15,4*	10,5 ; 21,4	18,5	13,8 ; 23,9	17,8	13,6 ; 22,8	22,1	16,2 ; 29,1	Moyen
4,3	3,2 ; 5,8	5,8**	3,1 ; 9,8	5,9**	3,3 ; 9,8	3,9**	2,0 ; 6,8	2,0**	0,6 ; 4,8	Mauvais

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.1 AVANT LES TRAITEMENTS

Tableau 4

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'investigation et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Présence de symptômes[p, r]													
Oui	50,0	59,5	62,8	15,1	63,4	53,3	56,3	29,9	62,6	49,1	46,0;52,2	53,5	43,7;63,2
Non	50,0	40,5	37,2	84,9	36,6	46,7	43,7	70,1	37,4	50,9	47,8;54,0	46,5	36,8;56,3
Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]													
2 semaines et moins	40,0	35,4	32,2	29,2*	38,7	48,0	30,3	40,9	40,6	37,4	32,0;42,7	38,1*	22,8;55,3
Plus de 2 semaines à 1 mois	19,9	13,8	19,7*	16,7*	27,1	20,1	24,6	18,9*	19,6	21,3	16,8;25,9	16,9**	7,2;31,4
Plus d'un mois à 3 mois	19,5	23,9	20,8	21,3*	17,5	16,4	22,9	28,7*	18,7	20,2	16,0;24,4	19,7**	9,1;34,9
Plus de 3 mois	20,5	26,9	27,3	32,7	16,7	15,5	22,3	11,4**	21,1	21,1	16,5;25,6	25,3**	12,9;41,5
Investigation en l'absence de symptômes[3, p]													
Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)	40,7	44,4	30,6	56,5	39,6	19,2	40,6	56,8	40,5	41,8	37,3;46,2	40,7*	26,3;56,4
Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer	15,7	18,5	7,0**	22,3	26,2	6,8	16,1*	14,5	15,5	14,3	11,1;17,9	15,6**	6,3;30,1
Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste	16,7	12,0	50,2	15,7	15,7*	7,8	28,6	10,1*	27,1	15,5	12,3;19,3	10,3**	3,5;22,0
Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]	15,1	-	-	-	-	58,7	0,6**	1,0**	1,4**	15,7	12,8;18,6	-	;
Autres façons	11,8	25,1	12,2*	5,5	18,4*	7,6	14,0*	17,6	15,6	12,7	9,7;16,1	33,4*	20,7;48,2
Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]													
2 semaines et moins	50,1	57,2	48,7	27,5	62,5	58,6	39,4	58,4	49,8	50,5	46,1;54,9	47,7	35,7;59,7
Plus de 2 semaines à 1 mois	24,2	19,1	29,7	32,2	17,7	22,9	24,7	21,7	24,5	24,0	20,3;27,7	19,9**	10,9;31,8
Plus d'un mois à 3 mois	17,8	13,4	17,9	32,2	13,4	12,6	25,5	14,2*	15,9	18,0	14,8;21,5	16,2**	7,9;28,1
Plus de 3 mois	7,8	10,3	3,7**	8,1	6,5*	5,8	10,4*	5,7**	9,8	7,5*	5,4;10,1	16,3**	8,3;27,5
Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]													
Oui, tout à fait	83,8	83,6	79,4	89,2	77,1	86,6	80,4	81,2	81,6	83,7	81,2;86,1	87,3	79,1;93,1
Oui, en partie	11,4	11,5	14,6	8,3	17,5	10,1	13,5	13,6	10,9	10,6	8,6;12,6	7,0**	3,0;13,5
Non	4,8	4,9*	6,0*	2,5*	5,5*	3,3	6,1*	5,1*	7,5	5,7	4,3;7,5	5,7**	1,9;12,5
Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p, r]													
Oui	13,5	5,2*	13,6	17,1	10,9	17,5	15,4	9,5*	11,8	20,8	18,1;23,5	8,8**	4,0;16,2
Non	86,5	94,8	86,4	82,9	89,1	82,5	84,6	90,5	88,2	79,2	76,5;81,9	91,2	83,8;96,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Seules les personnes ayant ressenti des symptômes sont considérées.
3. Seules les personnes n'ayant pas ressenti des symptômes sont considérées.
4. PQDCS : Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Présence de symptômes[p, r]
71,9	56,1;84,5	15,1*	9,7;21,9	66,9	54,1;78,1	52,4	46,5;58,2	62,2	48,0;75,0	22,5**	11,7;36,8	62,0	54,7;69,3	Oui
28,1*	15,5;43,9	84,9	78,1;90,3	33,1*	21,9;45,9	47,6	41,8;53,5	37,8*	25,0;52,0	77,5	63,2;88,3	38,0	30,7;45,3	Non
														Délai entre l'apparition des symptômes et la consultation d'un médecin généraliste[2, p]
25,6**	9,6;48,4	30,9**	8,2;63,6	28,9**	12,7;50,3	48,7	39,3;58,1	17,5**	6,4;35,1	40,5**	11,2;76,0	36,4*	24,5;49,7	2 semaines et moins
18,5**	5,8;39,4	26,2**	7,0;55,9	28,4**	12,6;49,3	17,0*	10,5;25,3	37,5*	20,7;56,7	20,3**	2,1;58,8	21,6*	12,2;33,8	Plus de 2 semaines à 1 mois
26,9**	10,5;49,9	18,5**	2,9;49,5	10,2**	1,8;28,7	17,1*	11,1;24,8	19,5**	7,1;38,7	39,2**	10,8;74,5	24,3*	14,8;36,2	Plus d'un mois à 3 mois
29,0**	13,3;49,5	24,4**	5,9;54,4	32,5**	16,3;52,5	17,2*	10,9;25,2	25,5**	11,3;45,0	-	;	17,6**	9,3;29,1	Plus de 3 mois
														Investigation en l'absence de symptômes[3, p]
49,8**	19,9;79,9	59,6	51,7;67,6	47,5**	23,7;72,2	20,5*	14,0;28,4	44,8**	21,8;69,6	44,5*	28,0;61,8	39,9*	28,0;52,7	Examen de routine ou visite chez le médecin généraliste (ou de famille)
8,5**	0,3;36,6	21,2*	15,0;28,6	9,4**	1,0;31,6	6,7**	2,8;13,0	15,1**	3,0;39,1	16,2**	6,1;32,1	14,6**	7,0;25,5	Examen de routine ou visite chez le médecin spécialiste du cancer
29,7**	7,9;61,5	14,4*	9,1;21,3	20,9**	5,7;46,0	5,3**	2,2;10,5	19,9**	5,6;43,7	13,0**	3,8;29,7	33,9*	21,7;48,0	Examen de routine ou visite chez un autre médecin spécialiste
-	;	-	;	-	;	59,2	50,5;67,8	-	;	2,8**	0,1;14,4	1,3**	0,0;7,3	Mammographie dans le cadre du PQDCS[4]
12,0**	0,3;51,4	4,8**	1,8;9,9	22,3**	6,1;48,6	8,4**	3,7;15,8	20,3**	5,6;44,7	23,6**	10,5;41,8	10,3**	4,3;20,0	Autres façons
														Délai d'attente entre la consultation d'un médecin généraliste et celle d'un médecin spécialiste[p]
38,9*	22,3;57,6	29,4*	19,7;40,7	58,3	40,5;74,7	61,6	53,5;69,8	32,9*	19,6;48,5	58,4*	36,3;78,3	61,0	51,1;70,8	2 semaines et moins
24,9**	11,4;43,2	34,3	24,9;43,7	14,1**	5,2;28,4	22,0*	15,0;30,3	31,8*	17,9;48,4	25,5**	9,0;49,6	20,6*	13,3;29,7	Plus de 2 semaines à 1 mois
36,2*	19,3;56,0	31,9*	22,2;41,7	18,5**	7,3;35,4	11,8*	6,8;18,6	23,1**	11,7;38,2	3,9**	0,1;20,4	11,3**	5,7;19,4	Plus d'un mois à 3 mois
-	;	4,4**	1,1;11,0	9,2**	2,0;24,3	4,6**	1,7;9,6	12,3**	4,1;26,5	12,2**	2,4;32,4	7,1**	2,8;14,5	Plus de 3 mois
														Patient a reçu des explications compréhensibles sur les raisons de passer des tests et examens diagnostiques[p]
79,1	64,1;89,9	91,6	85,6;95,6	71,2	57,3;82,7	86,1	81,6;89,8	78,8	65,7;88,7	74,6	60,0;86,0	80,4	72,6;86,9	Oui, tout à fait
14,5**	5,9;28,1	6,6**	3,1;12,1	20,9**	10,9;34,3	10,5*	7,2;14,6	11,6**	4,5;23,3	19,2**	8,9;34,0	9,3**	5,1;15,1	Oui, en partie
6,4**	1,4;17,3	1,8**	0,4;5,2	7,9**	2,3;18,6	3,4**	1,6;6,5	9,6**	3,4;20,2	6,2**	1,2;17,5	10,3**	5,7;16,7	Non
														Patient a payé afin d'avoir accès plus rapidement à des tests et examens diagnostiques[p, r]
19,0**	8,4;34,4	29,1	21,8;37,3	16,4**	7,8;28,9	25,2	19,7;30,7	22,0**	11,7;35,5	9,8**	3,3;21,4	19,5*	13,8;26,2	Oui
81,0	65,6;91,6	70,9	62,7;78,2	83,6	71,1;92,2	74,8	69,3;80,3	78,0	64,5;88,3	90,2	78,6;96,7	80,5	73,8;86,2	Non

Tableau 5

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]													
Médecin de famille	16,7	11,3	8,8*	16,5	14,3	27,8	5,9*	21,2	10,8	16,4	14,1;18,7	9,1**	4,4;16,4
Médecin spécialiste du cancer	27,7	21,3	16,5	40,2	45,6	22,9	24,7	28,4	24,4	27,1	24,3;29,9	18,5*	11,5;27,4
Chirurgien	25,2	44,5	8,7*	11,6	18,3	34,7	25,4	15,1	22,0	26,5	23,6;29,3	41,8	32,1;51,5
Autre médecin spécialiste	26,1	17,7	61,2	29,6	17,7	8,0	42,7	31,4	39,2	26,2	23,3;29,0	25,7*	17,8;35,0
Autre médecin non spécifié	3,0	4,1*	3,9**	2,0*	2,5**	3,6	1,2**	3,3**	2,7*	2,6*	1,6;3,9	3,1**	0,6;8,7
Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)	0,8	0,6**	0,3**	0,1**	0,8**	1,9*	0,2**	0,5**	0,2**	0,8**	0,4;1,6	0,9**	0,0;4,9
Autre (personnel administratif, proches, etc.)	0,6*	0,6**	0,7**	0,1**	0,9**	0,9*	0,1**	0,1**	0,7**	0,4**	0,1;1,1	0,9**	0,0;4,9
Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]													
En personne	90,8	96,6	87,7	95,7	92,1	83,2	90,4	94,4	93,1	91,8	89,8;93,5	94,6	88,4;98,0
Autre	9,2	3,4*	12,3	4,3	7,9*	16,8	9,6	5,6*	6,9	8,2	6,5;10,2	5,4**	2,0;11,6
Professionnel suffisamment à l'écoute[p]													
Oui	93,1	95,2	91,1	95,3	89,5	94,3	90,6	90,5	92,1	91,4	89,4;93,2	97,0	91,7;99,3
Non	6,9	4,8*	8,9*	4,7	10,5	5,7	9,4*	9,5*	7,9	8,6	6,8;10,6	3,0**	0,7;8,3
Professionnel a consacré assez de temps[p]													
Oui	91,0	92,5	90,2	92,8	87,9	92,7	86,8	88,5	90,1	88,3	86,2;90,5	92,8	85,7;97,0
Non	9,0	7,5	9,8	7,2	12,1	7,3	13,2	11,5	9,9	11,7	9,5;13,8	7,2**	3,0;14,3
Professionnel a répondu aux questions[p]													
Oui	93,7	94,6	92,4	95,7	90,8	94,6	90,8	92,0	93,2	92,5	90,5;94,2	94,6	87,6;98,3
Non	6,3	5,4*	7,6*	4,3	9,2	5,4	9,2*	8,0*	6,8	7,5	5,8;9,5	5,4**	1,7;12,4
Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]													
Oui	61,4	54,3	56,1	75,8	66,0	70,7	50,5	56,3	46,5	59,7	56,5;62,9	50,4	41,1;59,8
Non	38,6	45,7	43,9	24,2	34,0	29,3	49,5	43,7	53,5	40,3	37,1;43,5	49,6	40,2;58,9
Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]													
Oui	63,1	62,2	63,3	52,2	71,0	72,9	67,1	65,1	54,7	65,9	62,9;68,9	66,2	57,2;75,2
Non	36,9	37,8	36,7	47,8	29,0	27,1	32,9	34,9	45,3	34,1	31,1;37,1	33,8	24,8;42,8
Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]													
Oui	60,8	60,1	57,5	46,9	69,0	75,6	47,9	63,8	46,5	63,9	60,1;67,6	75,2	63,8;84,5
Non	39,2	39,9	42,5	53,1	31,0	24,4	52,1	36,2	53,5	36,1	32,4;39,9	24,8*	15,5;36,2
Contact pour du soutien pratique[3, p, r]													
Oui	70,7	71,7	71,7	64,4	81,0	78,0	70,4	77,8	59,3	70,3	67,3;73,3	79,1	70,1;86,4
Non	29,3	28,3	28,3	35,6	19,0	22,0	29,6	22,2	40,7	29,7	26,7;32,7	20,9*	13,6;29,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici la mise en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pouvant aider à apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.
3 . On entend ici la mise en contact avec un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Personne ayant fait l'annonce du diagnostic[p]
10,4**	3,1;23,9	10,9*	6,7;16,6	14,5**	6,8;25,8	28,6	23,0;34,2	7,1**	1,8;17,8	17,5**	8,2;31,0	13,5*	8,7;19,6	Médecin de famille
16,9**	7,5;30,9	45,4	37,9;53,0	51,1	38,1;64,0	19,8	15,0;25,5	28,6*	17,1;42,6	23,0*	12,7;36,4	21,9	15,9;29,1	Médecin spécialiste du cancer
13,5**	4,4;29,0	11,2*	6,8;17,1	12,1**	5,2;22,8	38,9	32,9;45,0	27,6*	16,5;41,1	23,4**	12,0;38,7	22,5	16,5;29,4	Chirurgien
57,0	40,9;72,1	30,0	23,0;37,7	17,3**	8,5;30,0	7,6*	4,7;11,5	36,7*	24,4;50,4	30,4*	18,1;45,2	38,4	30,7;46,1	Autre médecin spécialiste
-	;	1,8**	0,3;5,4	3,3**	0,4;11,7	2,7**	1,1;5,4	-	;	5,7**	1,2;15,8	3,1**	0,9;7,8	Autre médecin non spécifié
-	;	0,6**	0,0;3,4	1,7**	0,0;9,0	1,9**	0,6;4,2	-	;	-	;	-	;	Autre professionnel de la santé (infirmière/technicienne)
2,1**	0,0;11,8	-	;	-	;	0,4**	0,0;2,4	-	;	-	;	0,5**	0,0;2,8	Autre (personnel administratif, proches, etc.)
														Façon d'annoncer le diagnostic[p, r]
93,5	81,5;98,7	97,7	94,2;99,4	86,3	74,9;93,8	85,9	81,1;89,9	94,4	84,8;98,8	96,2	87,1;99,5	92,6	87,2;96,2	En personne
6,5**	1,3;18,5	2,3**	0,6;5,8	13,7**	6,2;25,1	14,1*	10,1;18,9	5,6**	1,2;15,2	3,8**	0,5;12,9	7,4**	3,8;12,8	Autre
														Professionnel suffisamment à l'écoute[p]
89,4	76,7;96,5	93,7	88,5;97,0	84,4	71,6;93,0	91,7	87,9;94,6	92,5	82,6;97,7	87,7	75,1;95,4	89,3	83,6;93,6	Oui
10,6**	3,5;23,3	6,3**	3,0;11,5	15,6**	7,0;28,4	8,3*	5,4;12,1	7,5**	2,3;17,4	12,3**	4,6;24,9	10,7*	6,4;16,4	Non
														Professionnel a consacré assez de temps[p]
90,2	76,3;97,4	88,5	82,0;93,3	85,3	73,5;93,2	88,8	84,4;92,4	87,4	75,2;95,0	84,5	70,8;93,5	86,8	80,7;91,5	Oui
9,8**	2,6;23,7	11,5*	6,7;18,0	14,7**	6,8;26,5	11,2*	7,6;15,6	12,6**	5,0;24,8	15,5**	6,5;29,2	13,2*	8,5;19,3	Non
														Professionnel a répondu aux questions[p]
93,4	81,8;98,6	95,7	91,2;98,3	91,8	80,4;97,6	92,6	88,9;95,3	89,2	78,4;95,8	93,4	82,3;98,6	89,4	83,2;93,9	Oui
6,6**	1,4;18,2	4,3**	1,7;8,8	8,2**	2,4;19,6	7,4*	4,7;11,1	10,8**	4,2;21,6	6,6**	1,4;17,7	10,6*	6,1;16,8	Non
														Information écrite sur la maladie et son traitement reçue[p, r]
61,5	46,0;75,4	82,4	75,7;87,9	53,6	38,9;67,8	63,9	57,7;70,0	41,9*	28,5;55,2	53,3	37,9;68,2	49,5	42,0;57,0	Oui
38,5*	24,6;54,0	17,6*	12,1;24,3	46,4*	32,2;61,1	36,1	30,0;42,3	58,1	44,8;71,5	46,7*	31,8;62,1	50,5	43,0;58,0	Non
														Besoin d'aide pour apaiser ses craintes, ses peurs et son anxiété[p, r]
59,7	44,4;73,8	49,3	41,2;57,4	77,7	64,8;87,7	76,9	71,3;82,5	65,5	50,4;78,6	70,4	54,9;83,2	62,0	54,5;69,4	Oui
40,3*	26,2;55,6	50,7	42,6;58,8	22,3*	12,3;35,2	23,1	17,5;28,7	34,5*	21,4;49,6	29,6*	16,8;45,1	38,0	30,6;45,5	Non
														Contact pour du soutien émotionnel[2, p, r]
69,7	48,5;86,1	49,4	38,0;60,7	66,9	49,7;81,4	76,4	69,7;82,2	48,2*	31,6;65,1	66,3	48,4;81,3	47,7	38,2;57,2	Oui
30,3**	13,9;51,5	50,6	39,3;62,0	33,1*	18,6;50,3	23,6	17,8;30,3	51,8*	34,9;68,4	33,7*	18,7;51,6	52,3	42,8;61,8	Non
														Contact pour du soutien pratique[3, p, r]
75,9	61,2;87,2	63,0	55,5;70,4	74,8	60,5;86,0	78,7	73,5;84,0	65,1	51,0;77,5	82,5	67,1;92,7	55,3	47,2;63,5	Oui
24,1**	12,8;38,8	37,0	29,6;44,5	25,2*	14,0;39,5	21,3	16,0;26,5	34,9*	22,5;49,0	17,5**	7,3;32,9	44,7	36,5;52,8	Non

Tableau 6

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé ou avec des organismes pour du soutien émotionnel[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]													
Oui	12,0	6,4*	10,5*	9,9	14,6	19,4	9,3*	6,7*	6,5	10,0	7,8;12,6	8,0**	3,0;16,6
Non	88,0	93,6	89,5	90,1	85,4	80,6	90,7	93,3	93,5	90,0	87,4;92,2	92,0	83,4;97,0
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	37,7	39,1	39,6	23,1	47,6	49,9	28,4	36,8	24,4	44,5	40,5;48,5	58,0	46,7;69,3
Non	62,3	60,9	60,4	76,9	52,4	50,1	71,6	63,2	75,6	55,5	51,5;59,5	42,0	30,7;53,3
Psychologue[p]													
Oui	7,7	3,8*	4,9**	2,5**	13,9	11,7	4,1**	7,5*	6,1	8,6	6,6;11,0	8,1**	2,8;17,5
Non	92,3	96,2	95,1	97,5	86,1	88,3	95,9	92,5	93,9	91,4	89,0;93,4	91,9	82,5;97,2
Travailleur social[p, r]													
Oui	5,9	3,4*	7,9*	1,7**	10,4*	7,6	5,9*	7,7*	4,4*	3,7*	2,3;5,6	1,3**	0,0;6,7
Non	94,1	96,6	92,1	98,3	89,6	92,4	94,1	92,3	95,6	96,3	94,4;97,7	98,7	93,3;100,0
Médecin[p, r]													
Oui	8,9	11,8	8,5*	11,7	6,4*	5,9	9,0*	11,7*	10,5	9,4	7,2;12,1	12,5**	6,1;22,0
Non	91,1	88,2	91,5	88,3	93,6	94,1	91,0	88,3	89,5	90,6	87,9;92,8	87,5	78,0;93,9
Autre professionnel de la santé[r]													
Oui	3,4	4,2*	2,5**	2,0**	3,1**	3,6	3,7**	4,9**	3,3*	2,8**	1,6;4,7	5,0**	0,9;14,7
Non	96,6	95,8	97,5	98,0	96,9	96,4	96,3	95,1	96,7	97,2	95,3;98,4	95,0	85,3;99,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Par soutien émotionnel, on entend le soutien pour apaiser les craintes, les peurs et l'anxiété du patient.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Groupe d'entraide ou organisme communautaire[p, r]
3,0**	0,1;16,0	4,6**	1,1;12,1	10,3**	3,1;23,6	16,8*	11,6;23,1	10,1**	2,6;24,9	5,6**	0,7;18,3	6,6**	2,8;12,7	Oui
97,0	84,0;99,9	95,4	87,9;98,9	89,7	76,4;96,9	83,2	76,9;88,4	89,9	75,1;97,4	94,4	81,7;99,3	93,4	87,3;97,2	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
64,1	42,7;82,0	21,4*	13,1;31,9	56,9	39,3;73,2	54,0	47,1;60,8	29,4**	15,8;46,3	53,6*	35,7;70,9	28,6*	20,0;38,5	Oui
35,9**	18,0;57,3	78,6	68,1;86,9	43,1*	26,8;60,7	46,0	39,2;52,9	70,6	53,7;84,2	46,4*	29,1;64,3	71,4	61,5;80,0	Non
														Psychologue[p]
3,5**	0,1;17,6	4,7**	1,3;11,6	11,8**	3,8;25,8	11,5*	7,4;16,8	7,3**	1,3;21,2	10,7**	3,0;25,1	6,5**	2,7;13,0	Oui
96,5	82,4;99,9	95,3	88,4;98,7	88,2	74,2;96,2	88,5	83,2;92,6	92,7	78,8;98,7	89,3	74,9;97,0	93,5	87,0;97,3	Non
														Travailleur social[p, r]
9,1**	1,1;29,2	1,0**	0,0;5,7	9,8**	3,1;21,8	3,1**	1,1;6,6	2,6**	0,1;13,6	10,3**	2,1;27,7	2,7**	0,5;8,0	Oui
90,9	70,8;98,9	99,0	94,3;100,0	90,2	78,2;96,9	96,9	93,4;98,9	97,4	86,4;99,9	89,7	72,3;97,9	97,3	92,0;99,5	Non
														Médecin[p, r]
3,5**	0,1;17,6	21,6*	13,3;32,0	5,9**	1,1;16,9	5,6**	2,9;9,6	8,2**	1,7;22,3	5,7**	0,7;19,2	10,1**	5,0;17,7	Oui
96,5	82,4;99,9	78,4	68,0;86,7	94,1	83,1;98,9	94,4	90,4;97,1	91,8	77,7;98,3	94,3	80,8;99,3	89,9	82,3;95,0	Non
														Autre professionnel de la santé[r]
-	;	2,6**	0,3;9,5	-	;	1,9**	0,5;4,7	5,7**	0,6;20,0	2,5**	0,1;13,2	4,3**	1,2;10,7	Oui
100,0	;	97,4	90,5;99,7	100,0	;	98,1	95,3;99,5	94,3	80,0;99,4	97,5	86,8;99,9	95,7	89,3;98,8	Non

Tableau 7

Proportion des patients[1] mis en contact avec des professionnels de la santé pour du soutien pratique[2] après l'annonce du diagnostic selon le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	24,5	26,9	25,7	9,9	35,9	36,3	24,5	28,3	13,0	31,2	28,2;34,1	41,5	32,2;50,7
Non	75,5	73,1	74,3	90,1	64,1	63,7	75,5	71,7	87,0	68,8	65,9;71,8	58,5	49,3;67,8
Médecin spécialiste du cancer[p, r]													
Oui	41,9	42,4	41,9	42,6	60,2	46,7	37,3	43,6	28,3	41,6	38,4;44,9	44,8	35,2;54,4
Non	58,1	57,6	58,1	57,4	39,8	53,3	62,7	56,4	71,7	58,4	55,1;61,6	55,2	45,6;64,8
Médecin de famille[p]													
Oui	15,6	18,5	13,5	13,6	14,9	17,8	11,7	22,4	13,0	12,7	10,4;14,9	15,1*	8,9;23,2
Non	84,4	81,5	86,5	86,4	85,1	82,2	88,3	77,6	87,0	87,3	85,1;89,6	84,9	76,8;91,1
Autre médecin spécialiste[p]													
Oui	14,0	14,0	10,5*	13,9	3,9*	10,9	22,9	15,5	20,0	13,1	10,8;15,4	17,9*	10,9;26,9
Non	86,0	86,0	89,5	86,1	96,1	89,1	77,1	84,5	80,0	86,9	84,6;89,2	82,1	73,1;89,1
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	3,5	2,6*	3,5**	1,1**	5,9*	4,7	4,9*	3,7**	2,8*	3,3*	2,2;4,6	2,6**	0,5;7,5
Non	96,5	97,4	96,5	98,9	94,1	95,3	95,1	96,3	97,2	96,7	95,4;97,8	97,4	92,5;99,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici un professionnel de la santé qui, tout au long de la maladie, pouvait évaluer les ressources et les besoins du patient, informer celui-ci et le soutenir si nécessaire.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
35,6*	21,8;51,5	8,9*	5,1;14,0	49,9	36,7;63,0	45,7	39,4;51,9	26,5*	15,7;39,8	39,4*	25,5;54,6	16,4*	11,3;22,6	Oui
64,4	48,5;78,2	91,1	86,0;94,9	50,1	37,0;63,3	54,3	48,1;60,6	73,5	60,2;84,3	60,6	45,4;74,5	83,6	77,4;88,7	Non
														Médecin spécialiste du cancer[p, r]
37,5*	23,0;53,9	44,8	37,4;52,2	57,8	44,9;70,6	44,2	37,9;50,6	42,3*	28,8;55,7	52,4	37,4;67,0	26,6	19,8;34,3	Oui
62,5	46,1;77,0	55,2	47,8;62,6	42,2*	29,4;55,1	55,8	49,4;62,1	57,7	44,3;71,2	47,6*	33,0;62,6	73,4	65,7;80,2	Non
														Médecin de famille[p]
16,2**	6,3;31,9	10,3*	6,0;16,3	13,0**	5,7;24,3	13,0*	9,1;17,9	12,5**	5,2;24,1	18,3**	8,2;32,9	10,3*	5,9;16,4	Oui
83,8	68,1;93,7	89,7	83,7;94,0	87,0	75,7;94,3	87,0	82,1;90,9	87,5	75,9;94,8	81,7	67,1;91,8	89,7	83,6;94,1	Non
														Autre médecin spécialiste[p]
13,2**	4,8;26,9	12,8*	7,8;19,4	-	;	9,3*	6,1;13,4	14,1**	5,9;26,8	16,7**	6,9;31,7	18,4*	12,7;25,4	Oui
86,8	73,1;95,2	87,2	80,6;92,2	100,0	;	90,7	86,6;93,9	85,9	73,2;94,1	83,3	68,3;93,1	81,6	74,6;87,3	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
6,1**	1,2;17,7	1,9**	0,4;5,4	7,9**	2,2;19,1	2,9**	1,3;5,7	4,8**	1,0;13,6	5,8**	1,3;15,6	1,9**	0,5;5,0	Oui
93,9	82,3;98,8	98,1	94,6;99,6	92,1	80,9;97,8	97,1	94,3;98,7	95,2	86,4;99,0	94,2	84,4;98,7	98,1	95,0;99,5	Non

Tableau 8

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours au moment de la planification des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Patient informé des différentes étapes du traitement[p]													
Oui, tout à fait	81,5	81,3	80,0	86,2	80,2	83,3	80,1	79,7	77,4	81,7	79,3;84,1	83,3	74,4;90,0
Oui, en partie	12,8	13,1	15,2	9,7	16,1	12,4	16,0	13,2	12,7	12,8	10,6;14,9	12,7**	6,9;20,9
Non	5,7	5,6*	4,7*	4,1*	3,7*	4,3	4,0*	7,1*	9,9	5,5	4,1;7,3	4,0**	1,0;10,4
Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui, tout à fait	71,9	74,0	68,8	79,2	66,6	73,2	66,7	74,2	67,3	71,6	68,7;74,5	76,7	67,5;84,3
Oui, en partie	15,7	14,8	17,4	12,0	18,1	17,3	16,7	15,3	15,5	16,1	13,8;18,3	15,1*	9,0;23,2
Non	12,4	11,2	13,8	8,8	15,3	9,6	16,6	10,4	17,3	12,3	10,2;14,4	8,2**	3,5;15,9
Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]													
Oui	79,5	86,4	80,1	79,8	83,2	74,6	76,1	85,1	77,8	82,8	79,6;85,8	87,7	77,9;94,2
Non, il ne voulait pas	13,1	9,0	10,5*	13,3	11,5	15,8	13,1*	10,2*	14,9	11,8	9,2;14,8	9,8**	4,0;19,2
Non, mais il aurait aimé	7,4	4,6*	9,4*	6,8*	5,3*	9,6	10,7*	4,8**	7,3	5,3*	3,5;7,8	2,5**	0,3;9,0
Situation familiale ou mode de vie pris en compte													
Oui, tout à fait	57,6	59,3	59,3	60,7	58,9	57,0	55,1	59,2	54,1	57,6	54,0;61,2	60,5	48,9;71,3
Oui, en partie	15,0	16,0	13,5*	13,5	17,8	15,2	16,1	15,6	13,9	15,1	12,5;17,7	17,9*	10,3;28,1
Non	27,4	24,7	27,2	25,7	23,4	27,9	28,8	25,2	32,0	27,3	24,0;30,6	21,5*	12,7;32,8
Soutien administratif[2] reçu[p]													
Oui, une infirmière pivot en oncologie	33,4	34,2	29,9	31,3	42,7	39,5	34,7	36,0	22,6	33,4	30,3;36,5	36,9	27,3;46,5
Oui, un autre professionnel de la santé	13,8	12,9	15,2	13,4	10,2	14,0	11,5	16,7	15,4	14,9	12,5;17,2	11,0**	5,9;18,2
Oui, un membre du personnel administratif	22,8	18,3	24,7	21,7	29,6	22,6	22,5	22,7	23,4	22,9	20,0;25,8	15,9*	9,2;24,8
Oui, un médecin	8,2	9,6	5,7*	9,6	5,5*	6,1	9,9	7,6*	10,5	7,7	5,9;9,8	13,2**	7,2;21,5
Non	21,7	25,0	24,5	23,9	12,0	17,7	21,5	17,0	28,1	21,1	18,5;23,8	23,0*	15,1;32,5
Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui, tout à fait	70,1	71,7	62,8	76,7	64,1	65,2	71,8	73,4	74,0	72,1	67,0;77,3	77,7	58,4;91,0
Oui, en partie	16,4	15,4*	21,2*	17,2	16,6*	18,2	12,6*	17,5*	12,7	16,4	12,1;21,4	15,0**	4,2;34,2
Non	13,6	12,9*	16,0*	6,2*	19,3*	16,6	15,6*	9,2**	13,3	11,5*	8,2;15,4	7,3**	0,9;23,8
Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]													
Oui	23,0	15,7	22,1	27,3	23,2	31,3	13,7	24,6	15,4	26,4	23,6;29,2	20,1*	13,0;29,0
Non	77,0	84,3	77,9	72,7	76,8	68,7	86,3	75,4	84,6	73,6	70,8;76,4	79,9	71,0;87,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. On entend ici l'organisation des rendez-vous ou le transfert du dossier par un professionnel ou un membre du personnel de la santé.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Patient informé des différentes étapes du traitement[p]
83,4	69,1;92,9	88,6	82,6;93,1	72,0	58,7;83,0	81,3	75,8;86,0	75,7	63,4;85,5	83,6	68,4;93,4	79,9	72,8;85,8	Oui, tout à fait
12,5**	4,6;25,6	7,6**	3,9;13,1	20,8**	11,3;33,5	13,5*	9,5;18,6	19,1**	10,1;31,3	7,9**	2,0;19,6	12,9*	8,2;19,0	Oui, en partie
4,1**	0,5;14,4	3,8**	1,5;7,9	7,2**	1,9;18,0	5,2**	2,6;9,1	5,2**	1,1;14,3	8,6**	2,1;21,5	7,2**	3,8;12,3	Non
														Patient impliqué dans les décisions concernant les traitements[p]
61,7	45,9;75,9	79,6	72,6;85,5	62,7	49,0;75,0	70,3	64,4;76,1	64,7	50,8;76,9	73,9	57,9;86,3	70,6	63,3;77,3	Oui, tout à fait
29,8*	16,7;45,8	8,9**	4,8;14,8	15,0**	7,5;25,7	20,0	14,9;25,1	16,4**	7,7;28,9	17,3**	7,4;32,0	14,0*	9,2;20,0	Oui, en partie
8,5**	2,4;20,4	11,5*	7,1;17,4	22,4*	12,3;35,5	9,7*	6,5;13,9	18,9**	10,0;31,1	8,8**	2,3;22,0	15,4*	10,2;22,0	Non
														Proches impliqués dans les décisions concernant les traitements[p]
87,1	70,0;96,4	86,6	77,4;93,0	83,1	68,2;93,0	78,9	71,2;85,3	86,5	71,7;95,4	89,5	72,3;97,8	76,7	66,5;85,0	Oui
6,3**	0,6;22,5	10,0**	4,6;18,2	11,9**	3,8;26,1	14,4*	8,9;21,6	5,8**	0,6;20,0	7,9**	1,0;25,1	16,3*	9,3;25,7	Non, il ne voulait pas
6,7**	0,8;22,0	3,4**	0,7;9,8	5,0**	0,6;17,4	6,7**	3,2;12,1	7,7**	1,7;20,4	2,6**	0,0;14,8	7,0**	2,6;14,9	Non, mais il aurait aimé
														Situation familiale ou mode de vie pris en compte
56,9	38,8;73,7	62,9	54,2;71,7	54,2	38,2;69,5	57,0	50,2;63,8	67,9	51,7;81,5	53,8*	35,9;71,0	50,8	41,3;60,2	Oui, tout à fait
16,0**	5,1;34,2	16,5*	10,3;24,4	19,5**	8,2;36,1	14,3*	9,8;19,8	9,6**	2,8;22,4	17,5**	6,4;34,9	12,4**	6,6;20,7	Oui, en partie
27,2**	13,3;45,2	20,6*	13,3;29,7	26,3*	14,4;41,5	28,7	22,7;34,8	22,5**	10,8;38,5	28,7**	14,3;47,3	36,9	27,6;46,2	Non
														Soutien administratif[2] reçu[p]
36,4*	22,9;51,6	25,4	19,0;32,6	39,2*	26,6;52,9	38,1	32,1;44,1	37,7*	25,2;51,6	45,2*	30,7;60,3	25,1	18,5;32,7	Oui, une infirmière pivot en oncologie
14,5**	5,5;28,9	16,8*	11,1;23,9	20,5**	10,5;34,1	14,4	10,4;19,2	14,5**	6,4;26,7	14,1**	5,7;27,2	14,6*	9,6;20,8	Oui, un autre professionnel de la santé
20,4**	9,9;34,9	24,3	17,9;31,7	22,5*	12,6;35,5	23,4	18,0;28,9	19,6**	10,2;32,5	27,5*	15,2;42,8	25,6	19,0;33,2	Oui, un membre du personnel administratif
2,2**	0,0;12,4	11,1*	6,9;16,7	8,0**	2,4;18,4	6,0**	3,3;9,9	9,7**	3,1;21,6	2,1**	0,1;11,2	6,1**	2,9;11,0	Oui, un médecin
26,5**	14,0;42,6	22,5	16,5;29,4	9,8**	3,6;20,4	18,1	13,4;23,6	18,5**	9,3;31,2	11,1**	3,9;23,5	28,6	21,9;36,1	Non
														Patient à l'aise de discuter d'approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
72,8*	45,0;91,6	75,3	61,5;86,2	67,7	44,7;85,7	66,8	57,2;76,4	73,5*	44,3;92,7	84,2	50,8;98,5	73,9	59,8;85,2	Oui, tout à fait
17,1**	3,0;45,0	21,2**	11,3;34,5	14,8**	3,8;34,8	16,4*	9,2;26,0	12,2**	1,4;38,3	8,2**	0,1;41,6	15,7**	7,3;28,0	Oui, en partie
10,1**	1,0;34,3	3,4**	0,4;12,3	17,6**	4,8;39,6	16,8*	10,1;25,6	14,3**	1,9;42,1	7,6**	0,2;37,0	10,4**	3,7;21,8	Non
														Proposition reçue pour participer à un projet de recherche[p, r]
12,6**	4,7;25,7	29,5	22,8;37,0	21,4**	11,3;35,0	36,6	31,1;42,1	14,1**	6,2;26,1	31,6*	18,1;47,9	21,3*	15,1;28,6	Oui
87,4	74,3;95,3	70,5	63,0;77,2	78,6	65,0;88,7	63,4	57,9;68,9	85,9	73,9;93,8	68,4	52,1;81,9	78,7	71,4;84,9	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.2 PENDANT LES TRAITEMENTS

Tableau 9

Proportion des patients[1] ayant subi une chirurgie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Patient a subi une chirurgie[p, r]													
Oui	81,7	96,0	87,1	63,3	31,7	94,9	78,6	71,1	92,9	79,7	77,5;81,9	94,8	89,1;98,0
Non	18,3	4,0*	12,9	36,7	68,3	5,1	21,4	28,9	7,1	20,3	18,1;22,5	5,2**	2,0;10,9
Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]													
Oui	37,0	4,7*	9,3*	11,3	55,2	62,4	21,5	7,3*	49,6	36,6	33,0;40,2	3,7**	0,7;11,1
Non	63,0	95,3	90,7	88,7	44,8	37,6	78,5	92,7	50,4	63,4	59,8;67,0	96,3	88,9;99,3
Lieu de la chirurgie[p, r]													
Hôpital de la région de résidence	83,0	89,1	77,9	80,9	84,0	86,5	83,2	68,2	80,0	77,2	74,2;80,2	85,2	76,9;91,4
Hôpital d'une autre région	17,0	10,9	22,1	19,1	16,0*	13,5	16,8	31,8	20,0	22,8	19,8;25,8	14,8*	8,6;23,1
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	54,1	56,8	55,9	53,3	59,5	53,7	50,5	54,9	53,1	50,2	44,7;55,6	55,0	39,4;69,9
Oui, en partie	9,1	6,9*	11,7*	11,1*	6,8**	8,7	11,2*	6,4**	9,8	12,7	9,3;16,8	9,5**	2,6;22,5
Non	36,8	36,3	32,5	35,6	33,7*	37,6	38,3	38,7	37,1	37,2	31,9;42,4	35,5*	21,8;51,3
Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]													
Oui, tout à fait	64,2	64,1	59,3	76,6	60,5	63,3	74,3	63,4	58,1	61,8	58,3;65,3	63,9	54,2;73,7
Oui, en partie	15,6	15,9	17,0	14,8	17,3*	15,6	14,0	19,4	15,1	15,5	12,7;18,3	12,1**	5,9;21,2
Non	20,2	20,0	23,6	8,6	22,2*	21,2	11,7	17,2	26,8	22,7	19,7;25,7	24,0*	15,6;34,0
Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]													
Oui	95,7	98,4	96,6	95,8	90,9	95,2	97,3	94,8	94,7	96,5	94,9;97,7	99,1	95,3;100,0
Non	4,3	1,6**	3,4**	4,2*	9,1**	4,8	2,7**	5,2**	5,3	3,5*	2,3;5,1	0,9**	0,0;4,7
Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie													
Oui, tout à fait	86,6	88,0	86,7	87,4	79,3	85,9	87,3	88,2	86,6	86,1	83,5;88,8	88,1	79,7;94,0
Oui, en partie	12,0	11,1	11,3*	11,4	18,5*	12,8	11,1*	10,7*	11,7	12,4	9,9;14,9	10,7**	5,1;19,1
Non	1,4	0,9**	2,1**	1,2**	2,2**	1,3*	1,5**	1,1**	1,7*	1,5**	0,6;2,8	1,1**	0,0;6,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Patient a subi une chirurgie[p, r]
83,8	70,0;92,9	62,1	56,0;68,2	22,6*	12,8;35,2	92,4	88,3;95,4	68,8	56,0;79,8	65,0	50,4;77,8	93,0	87,5;96,7	Oui
16,2**	7,1;30,0	37,9	31,8;44,0	77,4	64,8;87,2	7,6*	4,6;11,7	31,2*	20,2;44,0	35,0*	22,2;49,6	7,0**	3,3;12,5	Non
														Patient a subi une chirurgie d'un jour[p, r]
-	;	12,7**	6,5;21,7	48,9**	18,6;79,8	57,7	50,9;64,4	21,4**	9,3;38,8	10,4**	2,4;26,5	54,0	46,2;61,9	Oui
100,0	;	87,3	78,3;93,5	51,1**	20,2;81,4	42,3	35,6;49,1	78,6	61,2;90,7	89,6	73,5;97,6	46,0	38,1;53,8	Non
														Lieu de la chirurgie[p, r]
69,2	52,5;82,9	82,4	72,7;89,7	66,6*	33,9;90,5	82,2	76,8;86,7	69,6	52,5;83,4	51,4*	32,7;69,8	72,1	64,4;79,0	Hôpital de la région de résidence
30,8*	17,1;47,5	17,6*	10,3;27,3	33,4**	9,5;66,1	17,8	13,3;23,2	30,4*	16,6;47,5	48,6*	30,2;67,3	27,9	21,0;35,6	Hôpital d'une autre région
														Problèmes de déplacement pris en compte
47,4**	21,2;74,7	50,6*	33,5;67,6	82,4*	22,3;99,9	50,2	41,2;59,2	45,1**	21,4;70,6	46,6**	20,7;73,8	47,4	36,0;58,8	Oui, tout à fait
29,4**	8,4;60,0	15,0**	5,8;29,6	-	;	10,9**	5,6;18,7	20,4**	5,0;46,9	-	;	14,1**	6,9;24,5	Oui, en partie
23,2**	6,0;51,2	34,4*	19,9;51,3	17,6**	0,1;77,7	38,9	30,0;47,7	34,5**	14,2;60,2	53,4*	26,2;79,3	38,6*	27,1;51,0	Non
														Information reçue sur les risques et les effets secondaires liés à la chirurgie[p]
51,2*	34,6;67,7	72,2	61,4;81,5	49,7**	17,1;82,6	58,7	52,3;65,1	71,3	54,6;84,6	63,7*	41,4;82,4	60,1	52,9;67,2	Oui, tout à fait
15,3**	4,9;32,9	17,8*	10,3;27,6	15,7**	1,2;51,7	16,4*	11,8;21,9	20,5**	9,1;36,8	16,8**	4,0;40,2	13,9*	8,7;20,8	Oui, en partie
33,5*	18,8;50,9	10,0**	4,3;19,0	34,6**	8,9;69,6	24,9	19,5;30,4	8,2**	1,8;21,8	19,5**	6,5;40,1	26,0	19,6;33,2	Non
														Information reçue sur les résultats de la chirurgie[p]
100,0	;	97,8	92,4;99,7	82,5	46,8;98,3	95,5	92,0;97,8	100,0	;	96,9	82,5;99,9	94,8	89,9;97,8	Oui
-	;	2,2**	0,3;7,6	17,5**	1,7;53,2	4,5**	2,2;8,0	-	;	3,1**	0,1;17,5	5,2**	2,2;10,1	Non
														Explications compréhensibles reçues sur les résultats de la chirurgie
84,1	69,0;93,7	86,6	76,7;93,5	89,4	51,6;99,8	84,7	79,4;89,1	85,8	70,6;95,0	86,2	68,4;96,1	86,9	80,1;92,0	Oui, tout à fait
13,3**	4,5;28,4	13,4**	6,5;23,3	10,6**	0,2;48,4	13,1*	9,0;18,1	14,2**	5,0;29,4	10,4**	2,2;27,6	11,9*	7,3;18,2	Oui, en partie
2,6**	0,1;13,5	-	;	-	;	2,2**	0,7;5,5	-	;	3,4**	0,1;17,1	1,2**	0,0;5,9	Non

Tableau 10

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de chimiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]													
Oui	40,6	54,8	40,7	2,9*	91,9	53,9	23,8	58,0	24,7	41,6	39,5;43,7	61,4	52,8;70,1
Non	59,4	45,2	59,3	97,1	8,1	46,1	76,2	42,0	75,3	58,4	56,3;60,5	38,6	29,9;47,2
Lieu de la chimiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	82,5	84,4	75,0	70,6	81,5	85,5	67,1	86,3	78,2	75,0	70,5;79,5	80,8	69,3;89,5
Hôpital d'une autre région	17,5	15,6	25,0	29,4**	18,5	14,5	32,9	13,7*	21,8	25,0	20,5;29,5	19,2**	10,5;30,7
Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie													
Moins de 30 minutes	56,4	56,4	53,3	36,2**	56,1	58,4	48,6	59,4	53,5	52,0	46,7;57,3	58,9	47,3;70,4
De 30 à 60 minutes	34,1	35,9	33,4	54,0*	33,4	34,1	39,3	29,6	33,5	38,5	33,2;43,8	34,7*	23,6;47,1
Plus de 60 minutes	9,5	7,7	13,4*	9,8**	10,5	7,5	12,2*	11,0*	13,0	9,5*	6,5;13,3	6,4**	1,9;15,4
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	50,8	47,8	42,7	72,2*	50,5	51,2	68,1	48,8	52,0	52,4	45,8;59,0	44,7*	29,5;60,7
Oui, en partie	13,2	15,1	16,9*	14,5**	15,0	12,0	10,4**	14,6*	9,2**	10,4*	6,6;15,4	12,0**	4,2;25,2
Non	36,0	37,1	40,4	13,3**	34,5	36,8	21,5*	36,6	38,8	37,2	30,6;43,8	43,3*	27,4;60,2
Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	43,8	46,4	46,6	30,3**	40,6	39,1	75,6	42,1	51,2	41,5	35,9;47,0	43,2	31,1;55,4
De 30 à 60 minutes	32,9	34,1	31,9	30,7**	37,1	31,8	20,9*	34,2	31,6	31,2	26,4;36,1	32,0*	20,9;45,0
Plus de 60 minutes	23,3	19,5	21,5	38,9**	22,3	29,1	3,5**	23,7	17,2	27,3	22,8;31,9	24,7*	15,0;36,8
Installations adéquates													
Oui, tout à fait	81,0	82,5	82,7	92,9	81,7	78,2	82,7	81,9	84,2	86,4	82,4;89,7	92,4	82,8;97,6
Oui, en partie	16,4	16,0	15,0*	7,1**	14,3	19,0	16,7*	17,1	12,4*	11,5	8,5;15,1	7,6**	2,4;17,2
Non	2,6	1,5**	2,3**	-	4,0*	2,9*	0,6**	1,0**	3,4**	2,2**	1,0;4,2	-	;
Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]													
Oui, tout à fait	86,1	86,4	82,1	98,0	83,1	90,1	91,7	82,3	80,2	86,4	82,5;89,7	88,9	77,0;96,0
Oui, en partie	10,9	11,1	13,0*	-	14,1	8,5	4,8**	14,7*	11,7*	9,9*	7,1;13,4	11,1**	4,0;23,0
Non	3,0	2,5**	4,9**	2,0**	2,8**	1,4**	3,6**	3,0**	8,1*	3,7**	1,9;6,5	-	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de chimiothérapie[p, r]
45,8*	31,5;60,6	2,6**	0,8;6,5	90,9	80,9;96,7	54,4	49,6;59,2	28,3*	17,3;41,4	68,1	53,3;80,7	25,4	19,6;31,2	Oui
54,2	39,4;68,5	97,4	93,5;99,2	9,1**	3,3;19,1	45,6	40,8;50,4	71,7	58,6;82,7	31,9*	19,3;46,7	74,6	68,8;80,4	Non
														Lieu de la chimiothérapie[p]
59,7*	34,5;81,6	49,0**	3,7;95,8	64,9	49,9;77,9	80,0	72,3;86,4	51,2**	24,1;77,8	86,3	69,2;95,9	72,8	55,5;86,2	Hôpital de la région de résidence
40,3**	18,4;65,5	51,0**	4,2;96,3	35,1*	22,1;50,1	20,0*	13,6;27,7	48,8**	22,2;75,9	13,7**	4,1;30,8	27,2**	13,8;44,5	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de chimiothérapie
42,6**	21,8;65,5	-	;	41,9*	27,6;57,3	52,9	44,5;61,3	33,0**	9,5;65,2	62,6	44,3;78,6	58,6	41,0;74,7	Moins de 30 minutes
47,6*	25,0;71,0	77,4**	11,9;99,9	46,3*	32,0;61,1	39,0	30,6;47,5	61,1*	30,3;86,4	31,8**	16,8;50,1	24,0**	11,5;41,0	De 30 à 60 minutes
9,8**	1,1;31,5	22,6**	0,1;88,1	11,8**	4,5;23,8	8,1**	3,9;14,4	6,0**	0,1;32,3	5,6**	0,6;19,8	17,4**	7,1;33,1	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
37,8**	11,3;71,2	77,1**	12,9;99,9	51,5*	32,8;69,9	50,0	39,4;60,7	81,9	47,6;97,9	51,9*	30,6;72,8	62,9*	40,0;82,2	Oui, tout à fait
27,2**	4,7;64,5	-	;	9,2**	2,0;24,4	8,6**	3,5;17,1	8,0**	0,1;39,7	15,8**	4,4;36,0	3,8**	0,1;20,2	Oui, en partie
35,0**	10,1;68,1	22,9**	0,1;87,1	39,3*	22,4;58,3	41,3	30,5;52,2	10,1**	0,2;46,5	32,2**	15,0;54,0	33,3**	15,1;56,1	Non
														Délai d'attente entre le rendez-vous et le traitement de chimiothérapie[p]
52,9*	30,3;74,6	-	;	43,7*	28,7;59,5	35,0	26,6;43,5	67,8*	37,5;89,9	34,7*	19,2;53,0	50,2*	32,4;68,0	Moins de 30 minutes
29,6**	12,4;52,6	45,5**	2,5;95,4	21,4**	10,9;35,5	33,1	25,2;40,9	25,8**	6,2;57,0	32,8**	17,2;51,8	35,8*	20,6;53,5	De 30 à 60 minutes
17,5**	4,8;39,5	54,5**	4,6;97,5	35,0*	21,6;50,3	31,9	24,2;39,6	6,5**	0,2;28,9	32,5*	18,5;49,1	14,0**	4,3;30,8	Plus de 60 minutes
														Installations adéquates
87,3	65,3;97,7	73,9**	15,5;99,5	91,6	79,6;97,7	85,0	78,6;90,1	94,0	67,7;99,9	78,1	61,4;90,1	80,3	64,0;91,5	Oui, tout à fait
12,7**	2,3;34,7	26,1**	0,5;84,5	3,5**	0,5;12,0	12,3*	7,7;18,3	6,0**	0,1;32,3	19,0**	7,7;36,0	17,4**	6,9;33,6	Oui, en partie
-	;	-	;	4,9**	0,6;16,8	2,7**	0,7;6,7	-	;	2,8**	0,1;15,1	2,2**	0,1;12,0	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la chimiothérapie[p]
87,3	64,4;97,9	100,0	;	75,4	60,5;86,9	90,3	84,4;94,6	94,4	72,3;99,9	88,6	72,8;97,0	77,9	60,2;90,4	Oui, tout à fait
8,3**	0,7;29,4	-	;	21,7**	11,0;36,2	6,9**	3,4;12,2	-	;	8,6**	1,8;22,9	10,0**	2,5;24,8	Oui, en partie
4,4**	0,1;21,9	-	;	2,8**	0,1;15,1	2,8**	0,8;7,0	5,6**	0,1;27,7	2,8**	0,1;15,7	12,1**	3,1;29,3	Non

Tableau 11

Proportion des patients[1] ayant subi des traitements de radiothérapie selon certaines caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]													
Oui	47,7	25,9	35,1	51,3	33,7	80,3	70,7	34,0	20,7	48,7	46,5;50,8	28,0	20,6;36,5
Non	52,3	74,1	64,9	48,7	66,3	19,7	29,3	66,0	79,3	51,3	49,2;53,5	72,0	63,5;79,4
Lieu de la radiothérapie[p]													
Hôpital de la région de résidence	59,8	61,2	61,2	57,7	60,8	57,7	69,0	57,8	63,4	32,6	28,3;37,0	41,0*	23,1;60,9
Hôpital d'une autre région	40,2	38,8	38,8	42,3	39,2	42,3	31,0	42,2	36,6	67,4	63,0;71,7	59,0*	39,1;76,9
Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]													
Moins de 30 minutes	34,9	33,3	39,9	31,1	36,1	33,4	43,7	30,9	40,0	21,8	17,8;25,8	18,8**	7,4;36,1
De 30 à 60 minutes	45,2	47,2	47,3	45,5	46,0	46,2	40,1	47,9	40,2	55,4	50,8;60,0	52,2*	32,5;71,4
Plus de 60 minutes	20,0	19,4	12,7*	23,4	17,8	20,4	16,2	21,1*	19,8	22,8	19,2;26,3	29,0**	13,5;49,1
Problèmes de déplacement pris en compte													
Oui, tout à fait	56,6	56,0	59,3	61,6	59,1	53,8	56,8	55,4	58,6	55,3	50,1;60,5	48,0*	28,9;67,6
Oui, en partie	15,5	15,2*	17,9*	15,8	17,2*	15,3	14,2*	20,2*	12,9*	20,2	16,0;24,4	21,6**	7,9;42,3
Non	27,9	28,8	22,8*	22,6	23,6*	30,9	29,0	24,4*	28,5	24,5	20,0;29,0	30,3**	14,3;50,9
Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie													
Oui, tout à fait	77,7	78,6	73,2	78,4	78,9	78,0	80,0	75,0	74,5	76,9	72,9;80,9	86,6	69,6;96,1
Oui, en partie	14,9	15,6*	14,3*	16,3	14,7*	13,9	15,6	18,0*	15,0	16,2	12,8;20,1	10,2**	2,1;27,2
Non	7,4	5,8**	12,5*	5,4*	6,5**	8,1	4,3**	7,0**	10,5*	6,9*	4,6;10,0	3,2**	0,1;16,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Patient a subi des traitements de radiothérapie[p, r]
38,6*	24,7;53,9	53,6	47,6;59,6	34,0*	21,9;47,8	79,9	74,9;85,0	73,1	58,6;84,8	42,2*	27,5;57,9	17,8	13,0;23,5	Oui
61,4	46,1;75,3	46,4	40,4;52,4	66,0	52,2;78,1	20,1	15,0;25,1	26,9*	15,2;41,4	57,8	42,1;72,5	82,2	76,5;87,0	Non
														Lieu de la radiothérapie[p]
30,5**	11,4;56,3	25,1*	16,7;35,2	33,7**	14,2;58,5	30,7	24,2;37,2	45,5*	29,5;62,1	30,9**	13,7;53,2	41,4*	23,3;61,3	Hôpital de la région de résidence
69,5*	43,7;88,6	74,9	64,8;83,3	66,3*	41,5;85,8	69,3	62,8;75,8	54,5	37,9;70,5	69,1	46,8;86,3	58,6*	38,7;76,7	Hôpital d'une autre région
														Délai pour se rendre au lieu du traitement de radiothérapie[p]
23,5**	6,7;50,2	17,0*	9,5;27,1	29,7**	10,1;57,1	22,3	16,7;28,8	27,4**	14,1;44,4	14,3**	2,7;37,9	25,5**	11,6;44,4	Moins de 30 minutes
69,8*	43,7;89,0	59,2	48,8;69,6	56,3*	29,8;80,4	52,1	45,4;58,8	55,8	38,9;71,8	67,2*	43,2;86,0	52,2*	32,1;71,8	De 30 à 60 minutes
6,6**	0,2;30,6	23,8*	14,9;34,7	14,0**	2,6;37,2	25,6	20,0;31,3	16,8**	6,8;32,1	18,5**	4,9;42,1	22,3**	8,1;43,7	Plus de 60 minutes
														Problèmes de déplacement pris en compte
54,7*	26,2;81,0	68,6	56,4;79,1	54,8**	24,7;82,5	51,3	43,7;58,9	69,0	47,4;85,9	47,4*	24,1;71,5	46,2*	26,2;67,1	Oui, tout à fait
22,4**	4,4;54,2	18,7*	10,5;29,6	25,3**	5,1;59,1	17,4*	12,1;23,8	11,7**	2,3;31,2	36,6**	15,9;61,8	33,0**	15,6;54,8	Oui, en partie
22,9**	4,5;55,2	12,7**	6,1;22,6	19,9**	3,3;52,0	31,3	24,3;38,3	19,3**	7,0;38,4	16,0**	3,3;40,5	20,8**	7,2;41,9	Non
														Information reçue sur les effets secondaires liés à la radiothérapie
66,2*	41,9;85,5	82,5	72,8;89,9	73,2	46,4;91,4	74,7	68,1;80,6	80,6	64,6;91,5	77,5	54,3;92,6	71,0	50,4;86,8	Oui, tout à fait
22,2**	6,6;47,1	17,5*	10,1;27,2	26,8**	8,6;53,6	14,7*	10,3;20,1	14,5**	5,1;30,1	18,0**	4,9;40,9	18,4**	6,4;37,6	Oui, en partie
11,6**	1,7;34,7	-	;	-	;	10,6*	6,4;16,1	4,9**	0,7;16,1	4,5**	0,1;24,5	10,5**	2,1;28,5	Non

Tableau 12

Proportion des patients[1] ayant ressenti de la douleur et des malaises pendant la période des traitements selon le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Douleur et malaises ressentis[p, r]													
Oui	57,9	65,7	67,9	34,8	74,0	62,9	61,7	69,0	51,0	57,5	54,5;60,6	73,2	63,0;81,9
Non	42,1	34,3	32,1	65,2	26,0	37,1	38,3	31,0	49,0	42,5	39,4;45,5	26,8*	18,1;37,0
Intensité de la douleur et des malaises[p]													
Sévères	27,4	31,4	22,9	19,4	30,2	24,3	35,6	34,9	28,0	28,5	24,3;32,6	35,2*	23,8;48,0
Modérés	41,2	43,5	51,0	38,9	39,9	42,4	34,9	37,0	39,9	40,5	36,0;45,1	47,5	35,6;59,4
Légers	31,4	25,2	26,1	41,8	29,9	33,3	29,5	28,1	32,2	31,0	26,8;35,2	17,3**	9,3;28,1
Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises													
Oui, tout à fait	80,2	80,9	82,1	79,5	83,8	81,6	77,7	82,1	75,2	85,0	81,6;88,0	84,1	72,5;92,3
Oui, en partie	15,5	15,7	14,4	17,3	13,8	14,5	16,2	13,9*	18,1	11,1	8,5;14,2	13,3**	5,7;25,0
Non	4,2	3,4*	3,4**	3,2**	2,4**	3,9	6,1**	4,1**	6,6*	3,9*	2,4;6,0	2,6**	0,3;8,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Douleur et malaises ressentis[p, r]
72,9	56,2;86,0	29,4	22,2;37,5	78,6	66,4;88,0	61,1	55,5;66,7	62,2	48,2;74,9	73,3	58,0;85,5	51,0	43,4;58,6	Oui
27,1**	14,0;43,8	70,6	62,5;77,8	21,4*	12,0;33,6	38,9	33,3;44,5	37,8*	25,1;51,8	26,7*	14,5;42,0	49,0	41,4;56,6	Non
														Intensité de la douleur et des malaises[p]
23,1**	9,1;43,4	18,6**	8,7;32,8	42,4*	28,3;57,5	24,1	17,7;31,4	36,5*	21,1;54,3	23,9**	11,2;41,1	28,5*	18,7;40,2	Sévères
40,7*	23,1;60,2	43,5*	28,4;59,5	30,9*	18,5;45,7	38,8	30,8;46,9	28,9**	14,5;47,4	51,8*	34,1;69,3	41,3	30,5;52,1	Modérés
36,3*	19,7;55,6	37,9*	23,1;54,5	26,7**	14,5;42,2	37,1	29,2;44,9	34,5*	19,1;52,8	24,3**	11,4;41,8	30,2*	20,2;40,2	Légers
														Soutien du professionnel pour soulager la douleur et les malaises
85,0	68,7;94,8	88,0	75,1;95,7	83,2	69,0;92,7	85,7	79,1;90,8	86,0	70,3;95,3	84,7	66,7;95,2	83,7	73,4;91,2	Oui, tout à fait
12,3**	3,5;28,5	7,7**	2,0;19,1	12,6**	4,6;25,8	12,4*	7,6;18,8	5,2**	0,7;17,3	7,1**	0,8;23,7	11,4**	5,4;20,4	Oui, en partie
2,8**	0,1;14,8	4,2**	0,4;15,9	4,2**	0,6;13,9	1,9**	0,4;5,4	8,8**	1,9;23,2	8,2**	1,7;22,2	5,0**	1,1;13,6	Non

Tableau 13

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]													
Oui, tout à fait	88,3	90,6	85,8	86,1	90,2	88,9	88,6	84,7	88,2	87,6	85,1;90,2	89,5	79,3;95,7
Oui, en partie	9,0	7,7*	9,9*	9,2	9,0*	9,2	9,3*	11,4*	7,8	9,2	7,1;11,7	10,5**	4,3;20,7
Non	2,7	1,7**	4,3**	4,7*	0,8**	1,9*	2,1**	3,9**	4,0*	3,2*	1,9;4,8	-	;
Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]													
Oui	10,5	11,9	11,7	7,5	12,6	9,9	14,5	11,4	10,0	10,3	8,3;12,3	11,6**	6,2;19,3
Non	89,5	88,1	88,3	92,5	87,4	90,1	85,5	88,6	90,0	89,7	87,7;91,7	88,4	80,7;93,8
Réponses compréhensibles aux questions du patient													
Oui, toujours	71,9	73,7	69,6	76,0	67,9	71,8	71,5	68,1	71,2	72,2	69,2;75,2	73,9	64,4;82,0
Oui, la plupart du temps	26,4	25,0	29,3	22,2	30,1	27,1	26,8	29,3	26,1	26,1	23,2;29,0	25,1*	17,0;34,6
Non	1,7	1,3**	1,0**	1,8**	2,1**	1,1*	1,7**	2,5**	2,7*	1,7**	0,9;2,9	1,0**	0,0;5,4
Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]													
Oui	61,7	61,6	59,7	58,1	74,0	81,3	47,0	61,8	38,2	59,7	56,6;62,8	56,4	45,9;67,0
Non	38,3	38,4	40,3	41,9	26,0	18,7	53,0	38,2	61,8	40,3	37,2;43,4	43,6	33,0;54,1
Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]													
Oui	22,9	23,1	21,4	13,1	33,6	34,1	18,5	20,3	13,6	22,2	19,7;24,7	25,2*	17,3;34,6
Non, mais il aurait aimé l'être	17,4	14,7	12,6	14,7	20,3	21,1	18,3	21,8	14,5	17,5	14,9;20,1	19,4*	12,2;28,5
Non et il n'avait pas besoin de cette information	59,8	62,2	66,0	72,3	46,1	44,8	63,3	57,9	71,9	60,3	57,1;63,5	55,4	45,3;65,4
Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]													
Oui, tout à fait	74,7	80,2	70,4	77,0	69,3	73,8	76,4	73,8	73,8	74,4	71,1;77,7	81,7	72,1;89,1
Oui, en partie	19,2	16,1	25,1	16,3	24,0	19,7	15,2	22,9	19,3	19,9	16,9;22,9	12,7**	6,8;21,1
Non	6,1	3,7*	4,5**	6,7	6,8*	6,5	8,4*	3,3**	6,9	5,7*	4,1;7,8	5,5**	1,8;12,6
Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]													
Oui	62,6	67,7	66,8	61,1	65,6	57,4	61,8	65,7	64,5	64,1	60,0;68,1	70,0	57,0;81,1
Non	37,4	32,3	33,2	38,9	34,4	42,6	38,2	34,3	35,5	35,9	31,9;40,0	30,0*	18,9;43,0
Patient traité de manière respectueuse													
Oui, toujours	87,3	85,3	85,0	91,3	87,3	87,5	85,8	85,7	86,4	87,3	85,0;89,6	88,2	80,0;93,9
Oui, la plupart du temps	11,8	14,3	14,2	7,6	12,1	11,9	13,5	13,2	12,1	12,3	10,1;14,6	11,8**	6,1;20,0
Non	0,9	0,4**	0,8**	1,1**	0,6**	0,6**	0,7**	1,1**	1,5*	0,3**	0,1;1,0	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Patient clairement informé de l'utilité des médicaments[p]
73,9	53,4;88,9	85,6	76,9;92,0	85,4	72,5;93,9	91,2	86,9;94,5	89,5	75,2;97,1	80,3	64,2;91,4	88,2	79,8;94,0	Oui, tout à fait
19,7**	6,7;40,2	9,3**	4,4;16,8	11,9**	4,5;23,9	7,4*	4,4;11,7	7,3**	1,5;20,0	12,7**	4,0;28,0	7,0**	2,6;14,6	Oui, en partie
6,4**	0,6;22,5	5,1**	1,6;11,8	2,7**	0,1;14,4	1,3**	0,3;3,6	3,2**	0,1;16,7	7,0**	1,6;18,7	4,8**	1,5;11,2	Non
														Patient a reçu des renseignements sur son état de santé ou les traitements portant à confusion ou contradictoires[2, p]
6,7**	1,4;18,2	4,2**	1,6;8,9	16,9**	8,4;28,9	12,3*	8,5;16,9	9,3**	3,1;20,3	21,0**	10,4;35,5	8,1**	4,3;13,6	Oui
93,3	81,8;98,6	95,8	91,1;98,4	83,1	71,1;91,6	87,7	83,1;91,5	90,7	79,7;96,9	79,0	64,5;89,6	91,9	86,4;95,7	Non
														Réponses compréhensibles aux questions du patient
64,9	48,8;78,9	78,4	71,4;84,4	72,6	59,1;83,6	69,1	63,2;75,0	80,5	67,7;89,9	54,8	41,1;68,6	74,5	66,2;81,6	Oui, toujours
35,1*	21,1;51,2	18,9*	13,3;25,7	25,8*	15,4;38,6	29,3	23,4;35,2	17,8**	9,0;30,2	45,2*	31,4;58,9	23,3*	16,5;31,3	Oui, la plupart du temps
-	;	2,7**	0,6;7,4	1,7**	0,0;8,8	1,6**	0,4;4,2	1,7**	0,0;9,3	-	;	2,2**	0,4;6,6	Non
														Patient informé de l'existence de ressources communautaires ou groupes d'entraide[p, r]
61,1	44,9;75,8	55,5	47,4;63,6	65,2	51,0;77,6	79,5	74,6;84,5	48,1	34,6;61,6	67,8	51,3;81,5	37,8	30,7;45,0	Oui
38,9*	24,2;55,1	44,5	36,4;52,6	34,8*	22,4;49,0	20,5	15,5;25,4	51,9	38,4;65,4	32,2*	18,5;48,7	62,2	55,0;69,3	Non
														Patient renseigné sur l'aide financière disponible[p]
17,9**	7,7;33,0	13,3*	8,3;19,8	30,1*	18,6;43,8	33,3	27,7;38,8	19,6**	9,9;33,0	19,0**	9,2;32,8	13,1*	8,7;18,7	Oui
6,2**	1,2;17,4	15,3*	10,2;21,8	16,7**	8,1;29,0	20,1	15,1;25,0	20,9**	11,0;34,1	25,3*	13,9;39,9	14,9*	9,8;21,3	Non, mais il aurait aimé l'être
75,9	60,1;87,8	71,4	63,8;78,2	53,1	40,7;65,6	46,7	40,8;52,5	59,5	46,5;72,6	55,7	42,6;68,7	72,0	64,6;78,6	Non et il n'avait pas besoin de cette information
														Les proches pouvaient facilement parler à un professionnel[p]
74,0	52,5;89,4	73,6	64,7;81,3	57,4	41,4;72,4	70,9	63,5;77,5	83,6	69,2;93,2	67,0	48,8;82,1	81,0	72,6;87,7	Oui, tout à fait
19,2**	6,3;40,0	20,7*	13,6;29,3	31,9*	18,8;47,4	22,2	16,3;29,0	11,6**	3,9;25,0	33,0*	17,9;51,2	15,2*	9,5;22,4	Oui, en partie
6,8**	0,7;24,0	5,7**	2,3;11,5	10,7**	3,4;23,7	7,0**	3,8;11,4	4,7**	0,5;16,5	-	;	3,9**	1,2;9,2	Non
														Professionnels ont évalué la capacité des proches à aider dans les activités quotidiennes[p]
73,1	53,5;87,8	67,3	55,7;77,6	56,8	40,0;72,6	58,4	50,9;66,0	60,0	42,5;75,8	62,5	43,8;78,8	68,4	57,0;78,4	Oui
26,9**	12,2;46,5	32,7*	22,4;44,3	43,2*	27,4;60,0	41,6	34,0;49,1	40,0*	24,2;57,5	37,5*	21,2;56,2	31,6*	21,6;43,0	Non
														Patient traité de manière respectueuse
87,5	73,7;95,7	91,9	86,1;95,8	83,7	71,3;92,2	85,0	80,0;89,2	84,1	72,7;92,1	87,0	71,3;96,0	88,3	82,2;92,9	Oui, toujours
12,5**	4,3;26,3	7,4**	3,7;13,1	16,3**	7,8;28,7	14,1*	10,1;19,1	15,9**	7,9;27,3	13,0**	4,0;28,7	11,7*	7,1;17,8	Oui, la plupart du temps
-	;	0,7**	0,0;3,5	-	;	0,8**	0,1;3,0	-	;	-	;	-	;	Non

Tableau 13 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon l'information et le soutien reçus et d'autres caractéristiques associées à leur parcours pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là													
Oui, souvent	2,2	2,2*	1,3**	2,0*	3,7*	1,6*	1,8**	2,3**	2,7*	2,0*	1,2;3,3	2,1**	0,2;7,7
Oui, parfois	6,1	6,9	5,0*	5,6	6,7*	5,6	5,7*	7,3*	6,4	4,7	3,4;6,3	3,8**	1,1;9,5
Oui, une seule fois	2,1	1,7**	2,8**	1,3**	3,3*	2,3	3,2**	1,7**	1,8*	2,1*	1,2;3,3	2,0**	0,3;6,6
Non, jamais	89,7	89,2	90,9	91,1	86,4	90,5	89,3	88,6	89,0	91,2	89,2;92,9	92,1	85,2;96,5
Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]													
Oui, toujours	74,4	68,7	71,5	82,4	69,6	76,2	73,4	69,7	73,5	77,0	74,2;79,9	80,2	70,6;87,8
Oui, la plupart du temps	19,7	25,2	22,9	11,9	24,3	19,7	20,9	23,6	18,3	17,3	14,7;20,0	15,7*	8,9;24,8
Non	5,9	6,1*	5,6*	5,7	6,1*	4,1	5,7*	6,8*	8,1	5,7	4,1;7,5	4,1**	1,1;10,1
Respect de l'intimité du patient[p]													
Oui, toujours	87,9	87,6	85,9	91,1	83,9	86,5	89,6	87,5	89,2	87,6	85,3;89,8	89,8	81,2;95,4
Oui, la plupart du temps	10,6	10,7	12,8	8,2	12,6	11,9	9,0*	10,3*	9,7	10,8	8,6;12,9	8,4**	3,3;16,9
Non	1,5	1,6**	1,3**	0,7**	3,4*	1,6*	1,4**	2,2**	1,2**	1,7**	0,9;2,9	1,8**	0,3;6,2
Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]													
Oui	67,0	77,1	66,6	69,2	71,7	57,3	64,9	64,5	69,9	64,0	58,9;69,2	69,7	56,6;80,8
Non	33,0	22,9	33,4	30,8	28,3	42,7	35,1	35,5	30,1	36,0	30,8;41,1	30,3*	19,2;43,4
Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]													
Oui	5,3	5,4*	3,5**	3,8	8,4	5,5	6,2*	7,6*	4,4	5,3	3,9;7,0	7,4**	3,0;14,6
Non	94,7	94,6	96,5	96,2	91,6	94,5	93,8	92,4	95,6	94,7	93,0;96,1	92,6	85,4;97,0
Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]													
Oui, tout à fait	73,2	72,6	74,7	70,2	76,1	75,1	70,1	75,9	71,0	71,6	67,7;75,4	70,7	59,6;80,2
Oui, en partie	10,4	10,2	12,5*	6,9	13,2	10,2	11,6*	10,7*	10,8	10,8	8,4;13,1	10,6**	5,0;19,1
Non	16,5	17,2	12,8*	22,9	10,7*	14,6	18,3	13,4*	18,2	17,7	14,7;21,0	18,7*	11,0;28,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Les modalités « Quelques fois », « La plupart du temps » et « Toujours » de la question originale sont regroupées dans la catégorie « Oui » et la modalité « Jamais » devient « Non ».

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Professionnel a discuté du cas du patient comme si ce dernier n'était pas là
-	;	1,8**	0,4;5,2	3,5**	0,5;11,7	1,6**	0,4;3,9	-	;	5,4**	0,6;18,6	2,4**	0,5;7,0	Oui, souvent
2,1**	0,0;12,0	5,2**	2,4;9,6	5,1**	1,2;13,6	7,5*	4,6;11,5	-	;	5,7**	1,0;16,6	2,4**	0,6;6,0	Oui, parfois
8,3**	1,5;23,3	1,3**	0,1;4,7	4,6**	0,9;13,1	1,9**	0,6;4,1	-	;	-	;	2,0**	0,4;5,9	Oui, une seule fois
89,6	73,9;97,5	91,7	86,5;95,3	86,8	76,2;93,9	89,1	84,8;92,5	100,0	;	89,0	75,1;96,6	93,2	87,8;96,8	Non, jamais
														Les renseignements concernant les soins ou l'état de santé du patient ont été transmis de manière privée[p]
76,6	60,1;88,8	82,9	76,1;88,4	79,1	66,1;88,8	72,9	67,0;78,8	77,8	64,5;88,0	69,3	54,1;81,9	77,2	69,4;83,7	Oui, toujours
23,4**	11,2;39,9	9,2**	5,0;15,1	14,5**	6,5;26,6	22,9	17,2;28,6	16,9**	8,2;29,3	23,0**	12,0;37,6	15,4*	9,7;22,8	Oui, la plupart du temps
-	;	7,9**	4,2;13,4	6,4**	1,5;16,8	4,2**	2,0;7,7	5,3**	1,0;15,0	7,7**	1,4;21,9	7,4**	3,8;12,8	Non
														Respect de l'intimité du patient[p]
86,7	71,2;95,7	92,6	86,9;96,4	90,0	79,2;96,4	81,8	76,6;86,3	90,4	78,0;97,1	76,8	61,8;88,1	91,3	85,8;95,2	Oui, toujours
13,3**	4,3;28,8	7,4**	3,6;13,1	8,3**	2,6;18,8	14,7	10,7;19,6	7,8**	1,9;19,8	19,9**	9,5;34,4	8,1**	4,4;13,5	Oui, la plupart du temps
-	;	-	;	1,7**	0,0;9,2	3,4**	1,4;6,9	1,8**	0,0;10,0	3,3**	0,1;17,5	0,6**	0,0;3,3	Non
														Professionnels se sont assurés de la disponibilité des ressources et équipements nécessaires pour les activités quotidiennes[p]
64,7*	36,1;87,2	69,0	53,5;81,9	66,2*	42,3;85,3	54,9	44,3;65,5	74,3	49,3;91,3	57,0*	33,3;78,6	66,0	51,7;78,4	Oui
35,3**	12,8;63,9	31,0*	18,1;46,5	33,8**	14,7;57,7	45,1	34,5;55,7	25,7**	8,7;50,7	43,0**	21,4;66,7	34,0*	21,6;48,3	Non
														Résultats d'examens ou de tests ont déjà été perdus ou égarés[p]
2,0**	0,0;10,5	1,2**	0,1;4,6	6,0**	1,6;14,8	7,6*	4,6;11,7	5,8**	1,2;16,2	11,2**	3,4;25,4	3,4**	1,2;7,4	Oui
98,0	89,5;100,0	98,8	95,4;99,9	94,0	85,2;98,4	92,4	88,3;95,4	94,2	83,8;98,8	88,8	74,6;96,6	96,6	92,6;98,8	Non
														Professionnels ou personnel ont fait des démarches dans d'autres établissements de santé (prise de rendez-vous, transfert du dossier, etc.)[p]
60,2*	39,9;78,2	62,4	52,1;72,7	74,4	59,7;85,8	76,6	69,6;82,7	74,4	55,1;88,6	78,6	62,6;90,1	69,3	60,0;78,7	Oui, tout à fait
29,2**	13,3;50,0	3,2**	0,7;8,6	12,6**	4,8;25,2	10,4*	6,6;15,4	8,6**	2,0;22,2	9,6**	2,3;24,4	13,3**	6,9;22,3	Oui, en partie
10,6**	2,2;27,9	34,5*	24,2;44,7	13,1**	5,0;26,2	13,0*	8,3;19,1	17,0**	5,7;35,7	11,7**	3,9;25,2	17,4*	10,4;26,6	Non

Tableau 14

Proportion des patients[1] informés des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine pendant la période des traitements selon le type de ressource et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p, r]													
Oui	81,7	85,9	83,3	77,6	93,2	84,2	72,8	85,9	75,1	82,6	80,0;85,2	92,0	84,1;96,7
Non	18,3	14,1	16,7	22,4	6,8*	15,8	27,2	14,1	24,9	17,4	14,8;20,0	8,0**	3,3;15,9
Médecin de famille[p]													
Oui	9,0	10,2	11,0*	11,2	5,3*	7,8	7,8*	11,8	8,9	9,0	7,1;11,1	6,2**	2,3;13,3
Non	91,0	89,8	89,0	88,8	94,7	92,2	92,2	88,2	91,1	91,0	88,9;92,9	93,8	86,7;97,7
Médecin spécialiste[p]													
Oui	16,8	13,6	16,7	18,6	24,9	15,6	21,7	13,4	14,6	16,1	13,5;18,7	20,4*	12,5;30,4
Non	83,2	86,4	83,3	81,4	75,1	84,4	78,3	86,6	85,4	83,9	81,3;86,5	79,6	69,6;87,5
Infirmière pivot en oncologie[p, r]													
Oui	29,4	29,4	37,0	18,8	45,3	37,5	26,6	35,6	17,0	34,1	31,0;37,2	40,7	30,8;50,6
Non	70,6	70,6	63,0	81,2	54,7	62,5	73,4	64,4	83,0	65,9	62,8;69,0	59,3	49,4;69,2
Info-Santé[p]													
Oui	6,8	9,2	4,2*	5,2	4,9*	8,3	5,8*	8,0*	6,2	5,9	4,3;7,8	5,8**	1,6;14,2
Non	93,2	90,8	95,8	94,8	95,1	91,7	94,2	92,0	93,8	94,1	92,2;95,7	94,2	85,8;98,4
CLSC[p]													
Oui	20,1	28,0	13,8	23,4	14,2	19,4	13,8	17,8	20,7	19,5	16,7;22,3	32,2*	22,6;41,7
Non	79,9	72,0	86,2	76,6	85,8	80,6	86,2	82,2	79,3	80,5	77,7;83,3	67,8	58,3;77,4
Urgence d'un hôpital[p]													
Oui	28,9	35,8	29,2	20,3	44,0	29,1	21,8	34,7	25,7	29,7	26,7;32,7	36,3	26,6;45,9
Non	71,1	64,2	70,8	79,7	56,0	70,9	78,2	65,3	74,3	70,3	67,3;73,3	63,7	54,1;73,4
Unité de soins d'un hôpital[p]													
Oui	11,7	11,0	11,1	7,9	18,5	13,3	12,0	11,8	10,1	11,0	9,0;12,9	11,6**	6,1;19,3
Non	88,3	89,0	88,9	92,1	81,5	86,7	88,0	88,2	89,9	89,0	87,1;91,0	88,4	80,7;93,9
Autre professionnel de la santé[p]													
Oui	1,8	0,9**	1,9**	0,4**	3,0**	2,7	1,5**	1,4**	1,6**	1,1**	0,5;2,1	-	;
Non	98,2	99,1	98,1	99,6	97,0	97,3	98,5	98,6	98,4	98,9	97,9;99,5	100,0	;
Autre contact													
Oui	0,5*	0,6**	0,1**	0,3**	0,6**	0,8**	0,4**	0,3**	0,3**	0,5**	0,1;1,2	-	;
Non	99,5	99,4	99,9	99,7	99,4	99,2	99,6	99,7	99,7	99,5	98,8;99,9	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Patient informé des ressources à contacter le soir, la nuit et la fin de semaine[p, r]
90,1	77,0;97,1	83,6	76,6;89,2	91,3	80,3;97,2	83,2	77,7;87,8	67,7	53,9;79,6	87,4	74,1;95,4	73,9	66,4;80,6	Oui
9,9**	2,9;23,0	16,4*	10,8;23,4	8,7**	2,8;19,7	16,8	12,2;22,3	32,3*	20,4;46,1	12,6**	4,6;25,9	26,1	19,4;33,6	Non
														Médecin de famille[p]
18,7**	7,7;35,1	15,0*	9,6;22,0	1,4**	0,0;7,4	8,4*	5,1;13,0	3,9**	0,5;13,1	11,1**	3,3;25,3	7,5**	4,0;12,5	Oui
81,3	64,9;92,3	85,0	78,0;90,4	98,6	92,6;100,0	91,6	87,0;94,9	96,1	86,9;99,5	88,9	74,7;96,7	92,5	87,5;96,0	Non
														Médecin spécialiste[p]
18,9**	8,3;34,4	23,5	17,2;30,8	20,0**	10,8;32,4	10,3*	6,5;15,3	13,5**	5,4;26,4	13,2**	5,3;25,6	14,9*	9,6;21,7	Oui
81,1	65,6;91,7	76,5	69,2;82,8	80,0	67,6;89,2	89,7	84,7;93,5	86,5	73,6;94,6	86,8	74,4;94,7	85,1	78,3;90,4	Non
														Infirmière pivot en oncologie[p, r]
47,5*	31,7;63,7	23,6	17,3;30,9	60,8	47,2;73,4	40,0	33,7;46,3	22,0**	11,5;35,9	46,0*	31,7;60,8	19,1*	13,2;26,2	Oui
52,5	36,3;68,3	76,4	69,1;82,7	39,2*	26,6;52,8	60,0	53,7;66,3	78,0	64,1;88,5	54,0	39,2;68,3	80,9	73,8;86,8	Non
														Info-Santé[p]
2,1**	0,1;11,1	4,7**	1,9;9,6	9,1**	2,8;20,6	7,7*	4,4;12,2	3,9**	0,5;13,2	1,8**	0,0;9,8	6,0**	2,9;10,8	Oui
97,9	88,9;99,9	95,3	90,4;98,1	90,9	79,4;97,2	92,3	87,8;95,6	96,1	86,8;99,5	98,2	90,2;100,0	94,0	89,2;97,1	Non
														CLSC[p]
20,2**	9,1;36,2	18,0*	12,0;25,3	21,3**	11,3;34,5	17,5	12,8;23,0	10,6**	4,2;21,1	24,4**	12,8;39,5	16,8*	11,3;23,7	Oui
79,8	63,8;90,9	82,0	74,7;88,0	78,7	65,5;88,7	82,5	77,0;87,2	89,4	78,9;95,8	75,6	60,5;87,2	83,2	76,3;88,7	Non
														Urgence d'un hôpital[p]
30,7*	17,4;46,8	23,0*	16,4;30,7	37,3*	25,7;50,1	31,5	25,6;37,3	26,9*	15,8;40,6	29,0*	17,3;43,1	27,2	20,7;34,5	Oui
69,3	53,2;82,6	77,0	69,3;83,6	62,7	49,9;74,3	68,5	62,7;74,4	73,1	59,4;84,2	71,0	56,9;82,7	72,8	65,5;79,3	Non
														Unité de soins d'un hôpital[p]
6,8**	1,3;19,5	7,7**	4,1;13,0	19,2**	10,0;31,8	12,4	9,0;16,6	5,5**	1,1;15,7	17,4**	8,4;30,3	9,3*	5,3;14,8	Oui
93,2	80,5;98,7	92,3	87,0;95,9	80,8	68,2;90,0	87,6	83,4;91,0	94,5	84,3;98,9	82,6	69,7;91,6	90,7	85,2;94,7	Non
														Autre professionnel de la santé[p]
2,2**	0,1;11,8	1,2**	0,1;4,3	1,6**	0,0;8,6	0,8**	0,1;2,8	-	;	-	;	2,1**	0,4;6,0	Oui
97,8	88,2;99,9	98,8	95,7;99,9	98,4	91,4;100,0	99,2	97,2;99,9	100,0	;	100,0	;	97,9	94,0;99,6	Non
														Autre contact
-	;	-	;	-	;	0,4**	0,0;2,3	1,9**	0,0;10,4	-	;	1,2**	0,1;4,1	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	99,6	97,7;100,0	98,1	89,6;100,0	100,0	;	98,8	95,9;99,9	Non

Tableau 15

Proportion des patients[1] ayant reçu de l'information utile sur les changements possibles pendant la période des traitements selon le type de changement et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
L'apparence physique[p]													
Oui, tout à fait	65,6	63,2	67,9	56,1	75,1	71,7	64,5	65,9	56,7	66,7	63,1;70,3	65,1	52,6;76,3
Oui, en partie	14,5	16,0	14,0*	12,8	13,9	14,9	16,5	14,1	13,7	16,0	13,1;18,8	18,7**	9,7;31,2
Non	19,9	20,8	18,2	31,1	11,0	13,4	19,0	20,0	29,6	17,3	14,5;20,2	16,1**	8,2;27,2
La sexualité[p]													
Oui, tout à fait	50,5	44,8	53,0	75,4	49,0	43,5	37,9	39,8	40,4	50,4	46,6;54,2	47,1	35,8;58,5
Oui, en partie	14,4	13,6	17,5	16,7	16,1	14,9	9,1*	8,8*	12,7	15,2	12,4;18,3	15,6**	8,0;26,3
Non	35,1	41,6	29,5	7,9	34,9	41,6	53,0	51,5	46,9	34,4	30,9;38,0	37,3*	26,1;49,5
Les émotions[p]													
Oui, tout à fait	45,6	44,1	43,5	47,5	46,2	50,4	45,5	45,5	36,5	46,1	42,6;49,6	48,5	37,4;59,6
Oui, en partie	20,7	22,0	19,0	18,7	28,4	22,1	21,6	19,6	15,4	20,7	17,7;23,7	19,9*	11,6;30,7
Non	33,8	34,0	37,5	33,7	25,4	27,5	32,9	34,9	48,2	33,2	29,7;36,7	31,6*	21,1;43,6
La relation de couple et la vie familiale[p]													
Oui, tout à fait	43,3	42,6	41,4	57,0	41,7	41,7	38,8	41,6	34,3	45,0	41,2;48,8	50,3	38,9;61,8
Oui, en partie	16,7	14,4	17,2	17,4	22,5	18,1	14,5*	14,7*	13,0	16,5	13,5;19,9	14,6**	7,8;24,0
Non	40,0	42,9	41,4	25,6	35,8	40,3	46,7	43,6	52,7	38,4	34,5;42,4	35,1*	23,8;47,7
Les besoins alimentaires[p]													
Oui, tout à fait	57,5	65,9	55,2	54,0	66,9	53,5	71,2	58,8	49,4	57,9	54,1;61,6	67,4	58,0;76,9
Oui, en partie	17,8	20,4	19,3	14,6	20,1	20,3	11,5	17,3	15,3	16,5	13,7;19,2	21,7*	13,7;31,5
Non	24,7	13,8	25,6	31,3	13,0	26,2	17,3	23,9	35,3	25,7	22,6;28,8	10,9**	5,3;19,2
Les activités courantes[p]													
Oui, tout à fait	56,4	58,7	53,2	59,6	59,8	56,6	59,7	53,1	51,0	56,6	52,9;60,3	57,2	46,6;67,7
Oui, en partie	20,0	19,1	24,2	15,8	21,6	22,3	19,6	21,2	18,2	20,0	17,0;22,9	19,1*	11,1;29,7
Non	23,6	22,2	22,6	24,6	18,7	21,1	20,7	25,7	30,8	23,4	20,3;26,6	23,7*	15,1;34,2

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														L'apparence physique[p]
71,8	52,3;86,7	50,6	39,8;61,4	69,3	54,5;81,7	70,5	64,3;76,7	79,9	64,5;90,7	66,7	49,7;81,0	66,4	56,7;76,1	Oui, tout à fait
9,9**	2,1;26,4	20,8*	12,5;31,4	13,5**	5,7;25,6	16,9*	12,1;22,5	10,1**	3,0;23,2	14,8**	5,3;30,4	13,9*	7,9;22,1	Oui, en partie
18,2**	6,4;37,2	28,6*	19,0;39,8	17,2**	7,9;30,8	12,7*	8,3;18,3	10,1**	2,8;23,8	18,5**	7,8;34,6	19,7*	12,2;29,1	Non
														La sexualité[p]
57,8	40,2;74,1	78,4	70,8;84,8	33,5*	20,6;48,5	39,5	32,3;46,7	41,3*	23,0;61,5	39,6*	24,0;57,0	42,4	31,6;53,1	Oui, tout à fait
13,7**	4,4;29,7	16,9*	11,3;23,7	17,9**	8,4;31,6	18,0*	12,2;25,2	10,6**	2,5;26,8	9,4**	2,5;22,7	10,3**	4,5;19,2	Oui, en partie
28,5**	14,6;46,2	4,7**	1,9;9,6	48,6	33,8;63,5	42,5	35,0;49,9	48,2*	29,8;66,9	51,0*	34,1;67,8	47,4	36,4;58,3	Non
														Les émotions[p]
45,7*	29,3;62,9	48,1	39,1;57,1	44,2*	29,5;59,6	48,9	42,1;55,6	49,3*	33,3;65,5	51,0*	34,6;67,2	35,1	26,1;44,1	Oui, tout à fait
15,1**	5,8;29,9	18,5*	12,1;26,4	29,1*	17,0;43,8	22,8	17,1;28,5	26,0**	13,2;42,9	20,5**	9,1;36,7	16,2*	9,6;24,8	Oui, en partie
39,2*	23,3;57,0	33,4	24,6;42,1	26,7*	15,0;41,4	28,4	22,2;35,2	24,6**	12,3;41,0	28,6**	15,4;45,1	48,7	39,0;58,4	Non
														La relation de couple et la vie familiale[p]
42,2*	24,9;61,0	55,0	45,9;64,0	35,8*	20,8;53,1	41,2	34,0;48,4	46,8*	29,6;64,6	46,2*	29,7;63,3	38,9	28,3;49,5	Oui, tout à fait
19,5**	6,8;39,5	17,0*	10,7;25,0	23,2**	11,9;38,3	18,1*	12,6;24,7	12,0**	3,2;28,8	17,1**	6,6;33,5	11,5**	5,3;20,8	Oui, en partie
38,3*	21,3;57,7	28,0*	19,7;37,7	41,1*	25,4;58,1	40,7	33,6;47,8	41,1*	24,2;59,7	36,7*	21,9;53,6	49,6	38,3;60,9	Non
														Les besoins alimentaires[p]
60,5	43,2;76,1	52,0	42,2;61,8	61,7	46,5;75,5	52,7	46,0;59,4	78,9	63,8;89,8	63,4	46,4;78,3	51,3	42,0;60,5	Oui, tout à fait
17,8**	6,8;35,0	10,2**	5,4;17,0	24,5**	13,2;39,2	19,1	14,0;25,0	10,3**	3,4;22,3	13,3**	4,2;29,3	13,0**	7,1;21,3	Oui, en partie
21,6**	9,5;39,0	37,8	28,6;47,1	13,7**	5,3;27,2	28,2	22,2;34,2	10,8**	3,4;24,1	23,3**	10,7;40,6	35,7	26,6;44,9	Non
														Les activités courantes[p]
51,3*	33,7;68,7	61,1	52,0;70,2	60,6	43,4;76,0	58,9	52,2;65,6	61,7	46,0;75,8	54,2*	34,3;73,1	47,3	37,6;57,0	Oui, tout à fait
20,1**	8,1;37,8	17,6*	11,0;26,0	17,0**	7,1;32,0	22,0	16,3;27,7	17,0**	7,4;31,2	22,1**	9,0;41,1	21,2*	14,3;29,6	Oui, en partie
28,6**	14,4;46,8	21,2*	14,0;30,0	22,4**	10,9;38,1	19,1*	13,6;25,7	21,3**	10,1;36,9	23,7**	9,7;43,8	31,5	22,6;40,4	Non

Tableau 16

Répartition des patients[1] selon leur perception des services professionnels reçus pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent													
Oui, tout à fait	89,9	90,2	88,7	92,1	89,7	91,3	89,1	88,2	87,2	89,9	87,9;91,9	93,3	86,9;97,2
Oui, en partie	8,6	8,5	9,7*	6,7	7,8	7,7	9,1*	10,5*	10,5	8,5	6,7;10,6	6,7**	2,8;13,1
Non	1,5	1,3**	1,6**	1,2**	2,6**	1,0**	1,8**	1,3**	2,3*	1,6**	0,9;2,7	-	;
Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]													
Toujours	70,1	70,1	68,5	75,5	66,8	68,6	69,8	68,7	70,0	73,8	70,9;76,7	81,7	73,0;88,6
La plupart du temps	24,2	24,2	26,5	19,0	27,3	26,3	24,3	27,1	22,9	21,2	18,6;23,9	13,7*	8,0;21,4
À l'occasion	3,7	3,6*	3,2**	3,1*	4,7*	3,9	3,1**	1,6**	4,3	3,3*	2,2;4,7	2,5**	0,5;7,4
Jamais	2,0	2,1**	1,8**	2,4*	1,3**	1,1*	2,8**	2,6**	2,9*	1,7**	0,9;2,9	2,1**	0,2;7,6
Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]													
Oui, tout à fait	61,7	61,7	59,4	67,9	50,6	62,9	54,1	61,9	62,3	59,3	56,0;62,7	58,7	48,8;68,7
Oui, en partie	16,2	18,2	17,3	14,3	17,5	16,2	17,4	21,8	13,6	14,5	12,1;16,9	17,5*	10,5;26,6
Non	22,2	20,1	23,3	17,8	31,9	20,9	28,4	16,4	24,2	26,2	23,2;29,3	23,7*	15,3;34,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Professionnel était suffisamment renseigné sur les traitements qui existent
93,1	81,2;98,6	93,0	87,6;96,5	83,5	71,3;92,1	89,2	84,7;92,8	94,3	84,6;98,7	78,2	62,1;89,7	89,6	83,7;93,9	Oui, tout à fait
4,6**	0,6;15,2	5,8**	2,6;10,9	8,1**	2,2;19,9	10,0*	6,6;14,4	5,7**	1,3;15,4	20,0**	9,0;35,7	8,6**	4,7;14,1	Oui, en partie
2,3**	0,0;12,5	1,2**	0,1;4,7	8,3**	2,7;18,7	0,8**	0,1;2,6	-	;	1,8**	0,1;9,6	1,8**	0,3;5,5	Non
														Professionnel était au courant de l'histoire médicale du patient[p]
70,7	54,3;83,9	78,9	71,5;85,2	72,4	58,5;83,7	69,2	63,2;75,1	84,8	72,6;93,1	65,3	49,4;79,0	71,7	63,8;78,7	Toujours
29,3*	16,1;45,7	17,4*	11,8;24,2	25,9*	14,7;40,0	25,5	19,7;31,4	13,3**	5,6;25,3	30,9*	17,4;47,4	19,1*	13,2;26,3	La plupart du temps
-	;	2,5**	0,5;7,2	1,7**	0,0;8,9	4,9**	2,7;8,2	-	;	1,8**	0,1;9,1	4,7**	1,9;9,3	À l'occasion
-	;	1,2**	0,2;4,3	-	;	0,4**	0,0;2,3	1,9**	0,0;10,2	2,1**	0,0;11,6	4,5**	1,8;9,3	Jamais
														Médecin de famille était suffisamment informé des résultats des examens et traitements[p]
50,1*	33,3;66,9	59,2	51,1;67,4	51,0	37,4;64,5	62,4	56,2;68,6	50,7	35,7;65,7	53,9*	36,5;70,6	64,0	56,0;72,1	Oui, tout à fait
21,4**	9,4;38,6	13,6*	8,7;19,9	9,7**	3,0;21,8	15,1*	10,9;20,2	13,4**	5,1;26,9	22,6**	10,7;38,9	10,6*	6,1;16,9	Oui, en partie
28,5**	14,6;46,2	27,2	20,1;35,3	39,3*	26,2;53,7	22,4	17,2;27,7	35,9*	21,6;52,3	23,5**	10,6;41,5	25,3	18,7;33,0	Non

Tableau 17

Répartition des patients[1] selon le report de rendez-vous pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]													
Aucun report	81,8	84,7	82,0	77,9	79,3	83,8	85,2	79,1	81,2	83,7	81,2;86,2	88,6	81,2;93,8
Un report	10,2	7,2	11,5	11,6	11,3	9,5	8,6*	12,6	10,9	9,3	7,5;11,4	3,9**	1,1;9,4
Plus d´un report	8,0	8,1	6,6*	10,5	9,5	6,7	6,3*	8,3*	8,0	7,0	5,4;8,9	7,6**	3,6;13,7
Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]													
Aucun report	88,1	88,2	92,5	82,2	92,1	90,8	86,5	82,2	87,4	88,8	86,4;91,2	89,5	80,9;95,1
Un report	9,5	9,7	5,9*	14,0	4,7**	8,0	11,5	14,5*	9,1	9,6	7,4;12,1	7,0**	2,9;13,9
Plus d´un report	2,4	2,1**	1,6**	3,8*	3,2**	1,2*	2,0**	3,4**	3,5*	1,6**	0,8;2,8	3,5**	0,8;9,7
Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie													
Aucun report	82,6	81,4	74,2	83,9	79,9	84,6	86,7	83,5	84,1	86,2	82,5;89,3	81,3	69,3;90,2
Un report	10,1	9,1	13,6*	7,6**	11,8	10,4	6,7**	7,0*	9,6*	7,2*	4,9;10,2	10,0**	4,2;19,5
Plus d´un report	7,4	9,5	12,2*	8,5**	8,4	5,1	6,6**	9,5*	6,3*	6,6*	4,3;9,6	8,6**	3,0;18,8
Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]													
Aucun report	69,2	64,6	65,2	52,2	78,4	72,4	79,3	73,2	71,7	70,9	66,6;75,2	64,7	46,0;80,7
Un report	16,6	19,9	19,7*	20,6	13,4*	16,3	11,8*	15,8*	15,1	13,7	10,6;17,3	16,5**	5,7;34,1
Plus d´un report	14,2	15,5*	15,2*	27,2	8,2*	11,4	8,9*	11,0**	13,3*	15,4	12,2;19,1	18,7**	7,0;36,8

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Report de rendez-vous lors des tests et examens diagnostiques[p]
87,0	74,0;95,0	78,4	71,4;84,4	87,7	77,0;94,6	84,8	79,6;89,2	83,9	70,1;93,0	77,7	63,1;88,6	83,5	76,6;89,0	Aucun report
8,9**	2,6;20,9	9,0**	4,9;14,7	12,3**	5,4;23,0	7,8*	4,8;11,8	11,8**	4,1;24,9	18,7**	8,7;33,0	10,5*	6,2;16,3	Un report
4,1**	0,5;14,3	12,6*	7,8;19,0	-	;	7,4*	4,4;11,5	4,3**	0,6;14,2	3,6**	0,4;12,8	6,1**	3,0;10,8	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors de la chirurgie[p]
87,1	71,2;96,0	81,5	71,8;89,0	91,1	56,4;99,9	92,6	88,4;95,7	86,2	70,3;95,5	80,6	62,0;92,7	89,8	83,9;94,0	Aucun report
10,4**	2,8;25,0	18,5*	11,0;28,2	8,9**	0,1;43,6	7,4*	4,3;11,6	11,3**	2,9;27,6	16,3**	5,4;34,2	7,4**	3,7;13,0	Un report
2,6**	0,1;14,1	-	;	-	;	-	;	2,4**	0,1;12,1	3,1**	0,1;16,8	2,8**	1,0;6,2	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de chimiothérapie
72,7	49,2;89,5	77,1**	12,9;99,9	85,7	73,6;93,7	87,8	81,3;92,7	94,0	72,9;99,8	83,9	68,6;93,7	94,2	83,2;98,9	Aucun report
8,6**	0,9;29,2	-	;	8,7**	2,7;19,9	7,2**	3,7;12,6	6,0**	0,2;27,1	5,0**	0,6;17,4	3,8**	0,4;13,3	Un report
18,7**	5,2;41,8	22,9**	0,1;87,1	5,6**	1,1;15,6	4,9**	2,0;10,0	-	;	11,0**	3,1;25,7	2,0**	0,0;11,6	Plus d´un report
														Report de rendez-vous lors des traitements de radiothérapie[p]
66,6*	40,4;87,0	56,4	46,0;66,9	87,2	65,2;97,7	73,2	67,2;79,3	85,9	70,7;95,1	70,1	47,8;87,0	72,6	52,6;87,6	Aucun report
23,1**	6,2;50,4	11,3**	5,5;19,9	3,9**	0,1;20,5	14,3*	9,8;19,8	11,6**	3,7;25,4	16,8**	4,6;38,1	14,9**	4,7;32,4	Un report
10,3**	1,0;34,6	32,2*	22,2;42,2	8,9**	0,8;31,0	12,5*	8,2;17,9	2,5**	0,0;13,8	13,1**	2,6;34,8	12,5**	2,7;32,1	Plus d´un report

Tableau 18

Répartition des patients[1] selon la consultation de professionnels et l'utilisation de services pendant la période des traitements et selon le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	9,7	7,3	6,0*	6,0	10,6	12,7	9,2*	14,2	9,6	8,7	6,9;10,8	8,1**	3,4;15,6
Non, mais il aurait souhaité le consulter	7,8	8,7	4,9*	6,0	8,6	11,3	6,9*	9,1*	4,4	7,5	5,8;9,6	7,8**	3,4;15,0
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,4	83,9	89,0	87,9	80,8	76,1	83,9	76,7	86,0	83,7	81,2;86,3	84,1	74,9;91,0
Nutritionniste ou diététiste[p]													
Oui	30,9	53,2	35,4	21,8	46,8	19,8	47,7	40,6	23,8	34,3	31,1;37,4	61,6	51,7;71,5
Non, mais il aurait souhaité le consulter	11,3	9,2	10,5	7,3	10,1	17,5	11,8*	9,6*	8,0	9,8	8,0;11,9	7,6**	3,4;14,2
Non et il ne souhaitait pas le consulter	57,9	37,7	54,1	70,9	43,1	62,7	40,5	49,8	68,2	55,9	52,7;59,2	30,8*	20,9;40,7
Pharmacien[p]													
Oui	51,8	55,0	55,0	33,7	76,1	57,6	54,1	62,5	41,3	52,3	49,1;55,5	62,1	52,1;72,1
Non, mais il aurait souhaité le consulter	3,2	3,7*	3,2**	3,4*	2,5**	3,9	3,6**	2,2**	2,4*	2,5*	1,6;3,9	1,0**	0,0;5,8
Non et il ne souhaitait pas le consulter	45,0	41,3	41,9	62,9	21,4	38,5	42,3	35,3	56,3	45,2	42,0;48,3	36,8	27,0;46,7
Psychologue[p]													
Oui	12,1	9,2	9,3*	4,2	18,2	18,8	11,0	14,3	8,9	12,3	10,2;14,4	12,2**	6,6;20,1
Non, mais il aurait souhaité le consulter	9,0	8,5	10,4*	7,4	10,3	10,8	8,5*	9,4*	7,2	8,1	6,5;10,0	7,8**	3,4;14,8
Non et il ne souhaitait pas le consulter	78,8	82,3	80,4	88,4	71,5	70,3	80,4	76,3	83,8	79,6	77,0;82,2	80,0	70,8;87,4
Travailleur social[p]													
Oui	11,8	12,8	11,3*	4,3*	19,2	13,8	11,3	17,4	10,1	9,9	7,9;12,2	9,0**	4,1;16,7
Non, mais il aurait souhaité le consulter	5,9	6,9	6,1*	5,2	6,4*	7,0	4,1**	7,0*	4,6	4,2*	3,0;5,8	6,7**	2,9;12,9
Non et il ne souhaitait pas le consulter	82,2	80,3	82,6	90,4	74,4	79,2	84,7	75,7	85,3	85,8	83,4;88,3	84,3	76,2;90,6
Soins infirmiers à domicile[p]													
Oui	33,7	48,8	28,1	29,4	30,1	37,6	19,0	35,9	29,9	28,2	25,3;31,0	53,2	43,1;63,3
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	6,0	4,5*	6,6*	4,4	5,0*	7,6	9,3*	6,0*	5,0	6,7	5,1;8,5	4,8**	1,5;11,4
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	60,4	46,7	65,3	66,2	64,9	54,9	71,7	58,0	65,0	65,2	62,1;68,3	41,9	31,8;52,1

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
6,2**	0,7;21,4	8,6**	4,7;14,2	9,2**	2,8;21,2	9,4*	6,0;13,9	11,3**	4,1;23,6	8,3**	1,7;22,7	8,1**	4,5;13,2	Oui
6,2**	1,2;17,5	8,2**	4,3;14,1	8,6**	2,8;19,3	11,3*	7,3;16,4	1,7**	0,1;8,4	12,5**	4,5;25,8	2,2**	0,6;5,5	Non, mais il aurait souhaité le consulter
87,6	72,3;96,2	83,1	76,0;88,8	82,1	69,3;91,2	79,3	74,0;84,5	87,0	74,7;94,8	79,2	63,1;90,5	89,7	84,2;93,8	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Nutritionniste ou diététiste[p]
42,9*	27,9;59,0	24,9	18,6;32,2	45,5	32,3;58,7	24,3	19,4;29,1	55,2	42,2;68,2	53,0	37,9;67,7	23,3	17,4;30,2	Oui
11,0**	3,6;24,0	8,9**	4,7;14,9	14,3**	6,2;26,5	15,4	11,2;20,5	4,2**	0,5;14,1	9,8**	2,7;23,1	4,0**	1,7;7,9	Non, mais il aurait souhaité le consulter
46,1*	30,2;62,6	66,2	58,8;73,5	40,2*	27,4;53,0	60,3	54,5;66,0	40,6*	27,7;53,5	37,2*	24,1;51,8	72,7	65,6;79,0	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Pharmacien[p]
62,4	46,7;76,4	32,8	25,7;39,8	76,4	63,1;86,8	59,4	53,5;65,4	57,4	41,9;71,9	58,2	44,8;71,6	39,7	31,9;47,4	Oui
2,3**	0,1;12,2	5,5**	2,4;10,5	6,1**	1,1;17,4	2,2**	0,8;4,9	1,8**	0,0;10,2	4,2**	0,5;14,4	-	;	Non, mais il aurait souhaité le consulter
35,3*	21,5;51,2	61,7	54,8;68,7	17,5**	9,2;29,0	38,3	32,5;44,2	40,9*	26,8;56,1	37,7*	24,5;52,2	60,3	52,6;68,1	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Psychologue[p]
2,3**	0,1;11,7	4,4**	1,8;8,8	21,7**	11,7;35,1	20,2	15,4;25,1	12,8**	5,4;24,3	10,0**	2,9;22,9	7,8*	4,4;12,5	Oui
8,2**	2,3;19,7	7,5**	3,8;13,2	9,6**	3,5;20,2	9,6*	6,4;13,6	3,8**	0,4;13,8	8,2**	1,9;21,3	7,6**	4,1;12,7	Non, mais il aurait souhaité le consulter
89,5	77,0;96,6	88,1	82,0;92,7	68,7	54,6;80,6	70,2	64,6;75,8	83,5	70,9;92,2	81,9	66,0;92,5	84,6	78,7;89,4	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Travailleur social[p]
17,3**	7,0;33,1	3,2**	1,0;7,7	15,9**	7,2;29,0	11,6*	7,9;16,1	12,2**	5,0;23,6	16,7**	7,6;29,9	7,7**	4,2;12,8	Oui
2,1**	0,0;11,4	3,5**	1,2;7,8	2,0**	0,0;10,7	4,6**	2,2;8,3	4,1**	0,5;14,0	6,2**	1,1;18,1	3,9**	1,4;8,2	Non, mais il aurait souhaité le consulter
80,7	64,8;91,6	93,3	87,8;96,9	82,1	68,9;91,4	83,9	78,4;88,4	83,7	71,6;92,2	77,2	62,5;88,2	88,4	82,2;93,1	Non et il ne souhaitait pas le consulter
														Soins infirmiers à domicile[p]
27,9*	15,2;43,8	12,8*	7,7;19,6	29,8*	18,2;43,8	27,3	22,0;32,6	20,1**	10,5;33,0	39,3*	24,4;55,8	26,8	20,2;34,4	Oui
2,1**	0,0;11,8	4,6**	1,9;9,4	6,0**	1,3;16,4	11,0*	7,5;15,3	3,5**	0,4;12,4	4,0**	0,4;15,3	6,6**	3,5;11,1	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
70,1	53,9;83,2	82,6	75,3;88,5	64,2	50,6;76,3	61,8	56,0;67,5	76,4	63,0;86,8	56,7	40,3;72,0	66,6	59,4;73,9	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service

Tableau 19

Répartition des patients[1] selon l'utilisation de divers types de ressources ou services pendant la période des traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	11,5	9,0	12,7	3,3*	15,5	18,6	9,9	9,4*	8,6	13,5	11,2;15,9	7,5**	3,4;13,9
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	12,1	11,6	13,7	8,1	14,8	15,9	10,9	14,0	8,5	10,2	8,2;12,1	12,2**	6,7;20,0
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	76,5	79,4	73,6	88,6	69,7	65,4	79,2	76,6	82,8	76,3	73,5;79,0	80,3	71,2;87,6
Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]													
Oui	9,7	7,0	11,1*	4,8	9,5	17,7	7,8*	7,6*	5,1	9,7	7,8;11,8	9,5**	4,6;16,9
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	9,3	9,0	8,1*	7,4	12,5	9,5	11,5	11,3	8,6	9,9	8,0;11,9	6,7**	2,9;13,0
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	81,0	84,0	80,8	87,9	77,9	72,9	80,8	81,0	86,3	80,5	77,9;83,0	83,8	75,1;90,4
Services de transport[p]													
Oui	11,2	10,1	13,3	7,0	12,4	14,2	12,0	13,3	9,0	10,9	8,8;12,9	8,4**	3,9;15,4
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	13,2	11,9	12,0	11,6	14,6	16,0	13,7	16,4	10,1	13,0	10,8;15,2	8,5**	3,9;15,5
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	75,7	78,0	74,7	81,4	73,0	69,8	74,4	70,3	80,9	76,2	73,5;78,9	83,1	74,7;89,6
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]													
Oui	10,2	6,9	10,0	9,5	6,4	15,6	10,0	12,8	6,3	10,5	8,5;12,4	5,7**	2,1;12,0
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	3,8	4,6*	3,2**	3,7*	4,0*	3,5	3,8*	4,6*	3,4*	3,5*	2,3;5,1	1,9**	0,3;6,3
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	86,1	88,4	86,9	86,9	89,6	80,9	86,2	82,7	90,3	86,0	83,7;88,4	92,5	85,4;96,8
Services d'aide à domicile[p]													
Oui	7,2	9,5	10,2*	3,3*	8,2	7,7	3,0*	11,3	7,2	5,2*	3,7;7,0	3,8**	1,2;9,1
Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service	12,5	10,7	15,6	6,2	14,8	17,7	14,3	15,4	8,3	12,1	9,8;14,3	9,1**	4,1;16,9
Non et il n'avait pas besoin de ce type de service	80,3	79,7	74,2	90,6	77,0	74,6	82,6	73,2	84,5	82,7	80,2;85,2	87,0	78,9;92,9
Soutien spirituel[p]													
Oui	10,2	15,8	12,7	5,8	13,8	9,5	6,6*	11,1	10,1	8,4	6,6;10,6	15,3*	8,9;23,8
Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource	5,2	6,2*	6,6*	4,2	4,9*	5,7	6,9*	6,7*	3,7	4,8	3,5;6,4	5,2**	1,6;12,1
Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource	84,5	78,0	80,8	89,9	81,3	84,8	86,5	82,2	86,2	86,8	84,4;89,1	79,5	70,5;86,9

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
17,5**	7,8;31,9	5,1**	2,2;9,8	21,3**	11,7;34,1	18,4	14,0;23,4	14,9**	6,9;26,8	10,8**	3,6;23,4	14,3*	9,2;20,8	Oui
11,9**	3,6;27,0	9,7*	5,5;15,6	11,9**	4,9;23,2	13,7*	9,6;18,7	7,5**	2,1;18,2	13,9**	5,9;26,3	3,6**	1,5;7,4	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
70,5	54,8;83,3	85,2	78,5;90,5	66,7	53,2;78,5	68,0	62,5;73,5	77,5	64,6;87,5	75,2	60,3;86,7	82,1	75,4;87,5	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Groupe d'entraide ou de soutien ou association de patients[p]
8,1**	1,7;21,9	3,8**	1,4;8,2	14,6**	6,8;26,3	16,0	11,8;21,0	10,4**	3,7;21,7	7,8**	2,1;19,1	5,3**	2,5;9,8	Oui
4,1**	0,4;14,5	6,0**	2,8;10,9	10,0**	3,7;20,6	15,1	11,1;20,0	9,3**	2,9;20,9	13,7**	5,5;26,8	8,4**	4,7;13,6	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
87,8	73,7;96,0	90,2	84,3;94,4	75,4	62,8;85,4	68,9	63,0;74,7	80,4	67,0;90,1	78,4	63,7;89,3	86,3	80,0;91,2	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource
														Services de transport[p]
15,0**	5,3;30,9	7,1**	3,8;11,7	8,9**	3,3;18,5	16,0*	11,5;21,4	16,1**	7,9;27,8	7,7**	2,1;18,6	7,6**	3,9;13,0	Oui
8,3**	2,3;20,0	13,0*	7,8;19,9	13,4**	5,6;25,7	16,8	12,4;22,0	16,1**	7,6;28,5	15,3**	7,1;27,4	10,0*	6,0;15,4	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
76,7	59,9;89,0	80,0	72,8;86,0	77,7	65,0;87,5	67,2	61,5;73,0	67,8	54,1;79,6	77,0	63,6;87,3	82,4	75,9;87,8	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[p]
10,9**	2,9;26,3	9,5*	5,6;14,9	5,9**	1,5;14,8	17,0	12,4;22,4	12,3**	5,0;23,8	11,3**	4,1;23,4	6,2**	3,2;10,6	Oui
2,1**	0,0;12,0	3,1**	1,0;7,2	4,2**	0,5;14,8	3,7**	1,6;7,0	3,2**	0,4;11,1	4,1**	0,5;14,1	4,4**	1,5;9,8	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
87,0	71,3;96,0	87,4	81,5;91,9	89,9	78,9;96,3	79,4	74,1;84,6	84,5	73,0;92,5	84,6	71,4;93,3	89,4	83,3;93,8	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Services d'aide à domicile[p]
7,8**	1,7;20,9	3,2**	1,1;7,4	5,0**	1,0;14,4	7,3*	4,2;11,7	-	;	5,8**	1,2;15,9	5,5**	2,6;10,2	Oui
8,9**	2,5;21,4	1,9**	0,4;5,5	19,3**	9,7;32,5	18,7	14,1;24,1	15,5**	7,1;27,8	21,3**	10,6;36,1	8,4**	4,6;13,8	Non, mais il aurait souhaité recevoir ce type de service
83,3	68,7;92,9	94,9	90,2;97,8	75,7	62,4;86,1	74,0	68,6;79,4	84,5	72,2;92,9	72,8	57,6;84,9	86,1	79,8;91,0	Non et il n'avait pas besoin de ce type de service
														Soutien spirituel[p]
14,9**	5,4;30,3	3,3**	1,1;7,5	5,1**	0,9;14,9	10,5*	6,9;15,0	7,3**	2,0;17,8	11,4**	4,4;22,9	5,1**	2,1;10,1	Oui
9,6**	2,7;22,5	3,3**	1,1;7,3	5,3**	1,0;15,0	3,9**	1,7;7,5	9,3**	3,0;20,7	5,7**	1,1;15,9	4,1**	1,7;8,2	Non, mais il aurait souhaité utiliser ce type de ressource
75,5	59,6;87,6	93,4	88,4;96,7	89,6	78,3;96,3	85,6	80,4;89,9	83,4	70,9;92,1	82,9	70,8;91,5	90,8	84,9;94,9	Non et il ne souhaitait pas utiliser ce type de ressource

Tableau 20

Proportion des patients[1] ayant renoncé à consulter des professionnels ou à utiliser divers types de ressources ou services en raison des coûts pendant la période des traitements selon le type de service et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p, r]													
Oui	6,2	5,5*	6,0*	2,7*	7,3*	10,0	6,4*	7,1*	3,8	6,6	5,1;8,4	6,9**	2,9;13,7
Non	93,8	94,5	94,0	97,3	92,7	90,0	93,6	92,9	96,2	93,4	91,6;94,9	93,1	86,3;97,1
Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]													
Oui	20,8	9,5**	5,6**	32,4**	20,0**	24,6	4,3**	43,1**	14,6**	21,9*	12,2;34,6	13,3**	0,2;59,6
Non	79,2	90,5	94,4	67,6	80,0	75,4	95,7	56,9*	85,4	78,1	65,4;87,8	86,7*	40,4;99,8
Nutritionniste ou diététiste													
Oui	17,0	13,2**	7,3**	2,1**	7,7**	23,5	22,7**	25,8**	9,9**	11,8**	4,6;23,5	24,7**	1,7;71,4
Non	83,0	86,8	92,7	97,9	92,3	76,5	77,3	74,2	90,1	88,2	76,5;95,4	75,3*	28,6;98,3
Psychologue													
Oui	24,4	17,3**	22,9**	20,4**	33,0*	26,7	29,5**	28,1**	13,1**	18,7**	9,5;31,4	25,6**	1,8;72,9
Non	75,6	82,7	77,1	79,6	67,0	73,3	70,5	71,9	86,9	81,3	68,6;90,5	74,4*	27,1;98,2
Travailleur social													
Oui	9,8*	1,6**	-	10,7**	7,8**	9,8*	13,8**	24,5**	12,8**	15,7**	7,3;28,0	-	;
Non	90,2	98,4	100,0	89,3	92,2	90,2	86,2	75,5	87,2	84,3	72,0;92,7	100,0	;
Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]													
Oui	38,0	25,0**	47,9*	16,5**	42,4*	44,9	14,6**	46,9*	36,2*	37,2*	24,5;51,3	51,7**	11,5;90,2
Non	62,0	75,0	52,1*	83,5	57,6	55,1	85,4	53,1*	63,8	62,8	48,7;75,5	48,3**	9,8;88,5
Médicaments													
Oui	12,5	6,8**	3,6**	19,0**	16,8**	7,9**	20,8**	16,9**	24,1**	5,6**	1,1;15,8	-	;
Non	87,5	93,2	96,4	81,0	83,2	92,1	79,2	83,1	75,9	94,4	84,2;98,9	100,0	;
Services de transport													
Oui	37,8	35,8*	35,3**	30,9**	40,1*	35,5	48,4*	42,2*	43,2*	43,5*	30,3;56,6	38,4**	5,6;82,6
Non	62,2	64,2	64,7*	69,1	59,9	64,5	51,6*	57,8*	56,8	56,5	43,4;69,7	61,6**	17,4;94,4
Services d'aide à domicile													
Oui	45,0	52,7*	60,2*	3,4**	53,4*	47,0	35,9**	47,5*	45,3*	49,3	36,5;62,1	60,0**	18,4;92,6
Non	55,0	47,3*	39,8**	96,6	46,6*	53,0	64,1	52,5*	54,7	50,7	37,9;63,5	40,0**	7,4;81,6
Services d'hébergement ou d'hôtellerie[r]													
Oui	10,1	11,6**	15,8**	11,2**	16,4**	8,2*	-	16,0**	9,9**	9,6**	3,4;20,5	13,3**	0,2;59,6
Non	89,9	88,4	84,2	88,8	83,6	91,8	100,0	84,0	90,1	90,4	79,5;96,6	86,7*	40,4;99,8
Soins infirmiers à domicile													
Oui	12,7	15,4**	4,7**	4,3**	13,0**	14,5*	13,6**	13,4**	11,3**	17,2**	7,6;31,5	26,8**	2,4;72,2
Non	87,3	84,6	95,3	95,7	87,0	85,5	86,4	86,6	88,7	82,8	68,5;92,4	73,2*	27,8;97,6
Autres services ou ressources													
Oui	4,3**	13,2**	4,1**	4,8**	1,1**	2,5**	4,9**	2,2**	6,0**	4,0**	0,4;14,9	-	;
Non	95,7	86,8	95,9	95,2	98,9	97,5	95,1	97,8	94,0	96,0	85,1;99,6	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Renonciation à la consultation de professionnels ou à l'utilisation de ressources ou services en raison des coûts[p, r]
1,9**	0,0;10,7	1,9**	0,4;5,5	8,6**	2,8;19,3	12,3*	8,5;17,2	6,5**	1,7;16,2	7,3**	1,9;18,4	3,2**	1,2;6,9	Oui
98,1	89,3;100,0	98,1	94,5;99,6	91,4	80,7;97,2	87,7	82,8;91,5	93,5	83,8;98,3	92,7	81,6;98,1	96,8	93,1;98,8	Non
														Ergothérapeute ou physiothérapeute[p]
-	;	34,1**	0,3;95,3	-	;	29,8**	14,3;49,7	32,2**	0,2;94,7	34,3**	0,4;94,2	-	;	Oui
100,0	;	65,9**	4,7;99,7	100,0	;	70,2	50,3;85,7	67,8**	5,3;99,8	65,7**	5,8;99,6	100,0	;	Non
														Nutritionniste ou diététiste
-	;	-	;	-	;	13,5**	3,5;32,3	-	;	32,8**	0,4;93,3	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	86,5	67,7;96,5	100,0	;	67,2**	6,7;99,6	100,0	;	Non
														Psychologue
-	;	31,8**	0,2;94,2	32,3**	1,7;85,0	16,6**	5,6;34,7	-	;	-	;	21,3**	0,2;80,4	Oui
100,0	;	68,2**	5,8;99,8	67,7**	15,0;98,3	83,4	65,3;94,4	100,0	;	100,0	;	78,7**	19,6;99,8	Non
														Travailleur social
-	;	31,8**	0,2;94,2	-	;	13,3**	3,4;31,7	-	;	67,2**	6,7;99,6	40,4**	4,3;87,8	Oui
100,0	;	68,2**	5,8;99,8	100,0	;	86,7	68,3;96,6	100,0	;	32,8**	0,4;93,3	59,6**	12,2;95,7	Non
														Approches complémentaires, parallèles et alternatives[p]
100,0	;	-	;	18,6**	0,2;73,7	42,9*	24,1;63,3	32,2**	0,1;95,4	34,3**	0,4;94,2	19,7**	0,2;78,1	Oui
-	;	100,0	;	81,4*	26,3;99,8	57,1*	36,7;75,9	67,8**	4,6;99,9	65,7**	5,8;99,6	80,3**	21,9;99,8	Non
														Médicaments
-	;	-	;	21,5**	0,3;78,7	3,3**	0,1;18,6	-	;	-	;	19,7**	0,2;78,1	Oui
100,0	;	100,0	;	78,5**	21,3;99,7	96,7	81,4;99,9	100,0	;	100,0	;	80,3**	21,9;99,8	Non
														Services de transport
100,0	;	31,8**	0,2;94,2	67,7**	15,0;98,3	36,6*	19,8;56,2	100,0	;	67,1**	5,4;99,8	18,0**	0,2;73,1	Oui
-	;	68,2**	5,8;99,8	32,3**	1,7;85,0	63,4	43,8;80,2	-	;	32,9**	0,2;94,6	82,0*	26,9;99,8	Non
														Services d'aide à domicile
100,0	;	-	;	64,8**	13,3;97,7	49,5*	28,7;70,5	64,3**	5,1;99,5	67,1**	5,4;99,8	19,7**	0,2;78,1	Oui
-	;	100,0	;	35,2**	2,3;86,7	50,5*	29,5;71,3	35,7**	0,5;94,9	32,9**	0,2;94,6	80,3**	21,9;99,8	Non
														Services d'hébergement ou d'hôtellerie[r]
100,0	;	31,8**	0,2;94,2	30,0**	1,1;85,1	3,1**	0,1;15,9	-	;	-	;	-	;	Oui
-	;	68,2**	5,8;99,8	70,0**	14,9;98,9	96,9	84,1;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Soins infirmiers à domicile
-	;	-	;	30,0**	1,1;85,1	14,2**	3,0;36,3	-	;	32,8**	0,4;93,3	19,7**	0,2;78,1	Oui
100,0	;	100,0	;	70,0**	14,9;98,9	85,8	63,7;97,0	100,0	;	67,2**	6,7;99,6	80,3**	21,9;99,8	Non
														Autres services ou ressources
-	;	34,1**	0,4;94,4	-	;	-	;	-	;	-	;	21,9**	0,2;82,2	Oui
100,0	;	65,9**	5,6;99,6	100,0	;	100,0	;	100,0	;	100,0	;	78,1**	17,8;99,8	Non

3. PARCOURS DES PERSONNES VISÉES PAR L'ENQUÊTE DANS LE CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES

3.3 APRÈS LES TRAITEMENTS

Tableau 21

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Suivi médical du patient établi[p]													
Oui	98,0	96,4	98,7	98,7	98,7	98,5	98,5	98,9	96,8	99,0	98,0;99,6	97,6	91,7;99,7
Non	2,0	3,6*	1,3**	1,3**	1,3**	1,5*	1,5**	1,1**	3,2*	1,0**	0,4;2,0	2,4**	0,3;8,3
Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]													
Médecin spécialiste du cancer	52,6	48,8	50,5	55,3	87,2	55,1	38,6	49,3	40,7	54,5	51,1;57,8	53,2	43,2;63,2
Médecin de famille	6,5	10,7	3,9**	3,7	2,9*	8,7	3,6*	7,3*	6,4	4,9*	3,5;6,7	8,3**	3,5;16,1
Autre médecin spécialiste	25,5	25,1	29,6	27,3	1,5**	16,4	39,7	23,2	41,6	28,6	25,6;31,6	22,3*	14,4;31,9
Autre médecin[2]	15,4	15,4	16,0	13,6	8,4	19,7	18,2	20,1	11,3	12,0	9,9;14,1	16,1*	9,4;25,1
Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Médecin spécialiste du cancer	44,3	39,2	44,9	46,2	79,0	45,5	31,5	37,5	35,5	46,5	43,2;49,8	44,0	34,2;53,8
Médecin de famille	15,3	22,4	10,2*	12,9	8,2	18,1	9,5	17,7	14,8	11,2	9,0;13,5	16,0*	9,1;25,3
Autre médecin spécialiste	23,3	23,4	27,1	25,9	1,3**	15,1	38,2	22,4	36,0	26,6	23,8;29,5	23,5*	15,7;32,9
Autre médecin[2]	17,1	14,9	17,9	15,0	11,5	21,2	20,8	22,3	13,7	15,7	13,3;18,0	16,5*	9,9;25,0
Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]													
Au besoin	5,5	7,5	4,2**	4,7	2,5**	5,3	3,4*	5,1*	7,5	3,6*	2,4;5,2	5,0**	1,6;11,3
À tous les mois	4,8	6,2	5,3*	1,5*	11,1	3,5	2,6**	11,3	4,9	3,8*	2,7;5,3	6,4**	2,4;13,3
À tous les 2 ou 3 mois	18,0	20,8	14,8	12,2	29,6	13,3	20,0	22,6	21,9	19,2	16,5;22,0	22,3*	14,4;32,1
À tous les 4 mois	12,9	13,4	14,8	10,6	19,4	13,1	12,8	14,5	10,8	12,3	10,0;14,6	12,3**	6,5;20,7
À tous les 6 mois	48,5	44,7	51,4	56,7	34,7	54,7	47,3	42,6	41,9	50,8	47,3;54,4	47,6	37,5;57,8
Plus de 6 mois	10,3	7,4	9,5*	14,3	2,8**	10,1	13,9	4,0**	13,1	10,3	8,2;12,3	6,3**	2,3;13,3
Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical													
Trop long	0,7*	0,9**	1,0**	0,2**	0,8**	0,6**	0,9**	0,9**	0,9**	0,7**	0,3;1,6	1,0**	0,0;5,6
Trop court	7,4	7,5	5,4*	7,4	7,3*	7,8	8,4*	5,7*	7,5	8,6	6,8;10,8	6,0**	2,2;12,9
Adéquat	91,9	91,6	93,6	92,3	91,9	91,6	90,6	93,3	91,7	90,7	88,4;92,6	93,0	85,9;97,2
Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]													
Tout à fait capable	88,9	87,7	90,0	92,7	88,9	85,6	88,2	88,1	90,8	88,1	85,9;90,4	87,4	78,6;93,4
En partie capable	9,9	11,5	8,5*	6,4	10,3	12,8	10,2*	10,6*	7,7	10,7	8,6;12,9	12,6**	6,6;21,4
Incapable	1,3	0,8**	1,6**	0,8**	0,8**	1,6*	1,6**	1,2**	1,6*	1,1**	0,5;2,2	-	;

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Suivi médical du patient établi[p]
100,0	;	100,0	;	100,0	;	99,5	97,2;100,0	97,9	89,1;99,9	100,0	;	98,0	94,4;99,6	Oui
-	;	-	;	-	;	0,5**	0,0;2,8	2,1**	0,1;10,9	-	;	2,0**	0,4;5,6	Non
														Médecin principalement responsable du suivi médical fait dans les 12 mois suivant le dernier traitement[p]
46,6*	31,3;62,4	57,9	50,1;65,7	94,6	85,4;98,8	57,7	51,0;64,4	43,2*	30,0;56,4	52,9	37,8;67,6	40,6	32,5;48,8	Médecin spécialiste du cancer
8,1**	1,8;21,4	2,2**	0,5;6,0	-	;	7,2**	3,9;12,0	3,7**	0,5;12,6	2,1**	0,0;11,4	4,0**	1,4;8,8	Médecin de famille
28,6*	15,8;44,4	31,1	23,6;38,7	1,8**	0,0;9,6	20,4	15,3;25,5	40,9*	28,0;53,8	31,4*	18,5;46,8	45,3	37,2;53,4	Autre médecin spécialiste
16,7**	6,7;32,0	8,8**	4,7;14,7	3,6**	0,5;11,7	14,7*	10,4;19,8	12,2**	5,0;23,5	13,6**	4,7;28,5	10,1*	5,8;15,9	Autre médecin[2]
														Médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
40,1*	25,3;56,2	49,7	41,8;57,6	81,0	68,3;90,3	46,3	39,9;52,8	35,6*	23,5;49,2	37,2*	24,3;51,7	41,4	33,4;49,5	Médecin spécialiste du cancer
11,9**	3,2;28,1	10,0*	5,7;15,8	9,9**	3,5;20,9	13,1*	8,7;18,6	7,4**	1,9;18,5	8,0**	2,1;20,0	9,2**	5,0;15,3	Médecin de famille
32,7*	18,4;49,8	27,9	20,8;36,0	-	;	20,8	16,0;25,5	35,8*	23,5;49,6	32,2*	19,2;47,6	38,6	30,8;46,4	Autre médecin spécialiste
15,4**	6,2;29,7	12,4*	7,6;18,7	9,1**	3,0;20,0	19,8	15,1;25,3	21,2**	11,3;34,4	22,5**	11,1;37,9	10,8*	6,5;16,6	Autre médecin[2]
														Fréquence de consultation du médecin principalement responsable du suivi médical au moment de l'enquête[p]
2,3**	0,0;12,6	4,1**	1,3;9,3	3,1**	0,4;10,6	3,8**	1,8;7,1	1,9**	0,0;11,3	2,0**	0,0;10,7	3,5**	1,1;8,3	Au besoin
-	;	0,7**	0,0;3,7	6,7**	1,9;16,0	4,6**	2,2;8,2	-	;	13,3**	5,6;25,3	2,4**	0,6;6,1	À tous les mois
12,4**	4,3;26,2	15,3*	9,9;22,2	38,4*	25,1;53,2	13,8*	9,7;18,8	17,8**	8,8;30,5	21,7**	11,1;36,0	23,8	17,2;31,5	À tous les 2 ou 3 mois
20,3**	8,5;37,7	10,2*	6,0;16,0	17,6**	8,4;30,8	12,1*	8,0;17,2	12,5**	5,1;24,2	7,5**	2,0;18,4	11,9*	7,1;18,4	À tous les 4 mois
56,4	40,0;71,9	56,7	48,5;64,9	30,2*	18,6;44,1	54,5	48,1;60,8	49,2	34,7;63,8	48,1*	33,2;63,2	49,1	40,6;57,5	À tous les 6 mois
8,6**	2,2;21,3	13,0*	8,3;19,1	3,9**	0,5;13,3	11,3*	7,6;16,0	18,7**	9,4;31,4	7,4**	1,5;20,2	9,4**	4,9;16,0	Plus de 6 mois
														Perception du patient à l'égard du temps consacré par le médecin au suivi médical
-	;	-	;	-	;	1,3**	0,3;3,6	-	;	-	;	1,3**	0,1;4,9	Trop long
2,3**	0,1;12,3	8,8**	4,8;14,4	4,7**	0,9;13,5	8,8*	5,3;13,6	9,6**	3,0;21,6	13,3**	5,3;26,2	11,0**	6,0;18,0	Trop court
97,7	87,7;99,9	91,2	85,6;95,2	95,3	86,5;99,1	89,9	84,8;93,7	90,4	78,4;97,0	86,7	73,8;94,7	87,7	80,5;93,0	Adéquat
														Perception du patient à l'égard de la capacité du médecin à détecter une récidive[p]
87,9	74,6;95,7	92,5	86,7;96,3	94,2	84,2;98,8	83,3	77,8;87,9	92,2	80,8;97,9	83,2	68,6;92,9	89,4	83,2;93,9	Tout à fait capable
12,1**	4,3;25,4	7,5**	3,7;13,3	5,8**	1,2;15,8	14,9*	10,4;20,4	5,9**	1,1;16,8	16,8**	7,1;31,4	7,8**	4,0;13,6	En partie capable
-	;	-	;	-	;	1,8**	0,5;4,6	1,9**	0,1;9,4	-	;	2,8**	0,8;6,9	Incapable

Tableau 21 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon certaines caractéristiques associées à leur parcours après les traitements et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p, r]													
Oui, tout à fait	54,4	53,6	46,8	59,1	61,0	51,4	49,1	47,7	58,5	53,1	49,6;56,5	50,9	41,1;60,6
oui, en partie	18,0	21,5	23,2	16,0	18,5	19,2	19,5	19,2	13,3	19,1	16,6;21,7	28,4*	19,7;38,4
Non	27,6	24,9	30,0	24,9	20,5	29,4	31,4	33,1	28,2	27,8	24,7;30,8	20,8*	12,9;30,7
Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]													
Oui	47,8	47,6	49,1	34,0	51,4	55,0	41,2	45,8	41,4	44,2	37,4;50,9	54,6*	31,5;76,3
Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien	52,2	52,4	50,9	66,0	48,6	45,0	58,8	54,2	58,6	55,8	49,1;62,6	45,4*	23,7;68,5

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.
2. Dans ces cas, la spécialité du médecin n'a pas été précisée par les patients ou il y avait plus d'un médecin responsable du suivi médical.
3. Soutien reçu d'un professionnel de la santé et/ou d'un groupe d'entraide.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008.*

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Médecin responsable du suivi a expliqué les symptômes à surveiller[p, r]
36,8*	22,2;53,5	61,3	53,3;69,3	55,4	41,9;68,9	53,4	47,0;59,9	51,6	37,0;66,1	36,9*	23,3;52,3	55,1	47,4;62,9	Oui, tout à fait
29,9**	15,9;47,2	16,7*	11,2;23,5	26,9*	15,8;40,6	17,5	13,2;22,6	18,0**	8,3;32,0	20,7**	10,4;34,8	12,8*	8,1;18,9	oui, en partie
33,3*	19,2;49,9	22,0*	15,7;29,5	17,7**	8,9;29,9	29,0	23,0;35,0	30,4*	18,2;45,1	42,3*	27,5;58,2	32,0	24,5;39,5	Non
														Soutien psychologique reçu[3] à la fin des traitements dans le but d'améliorer la qualité de vie[p]
55,2**	19,7;87,0	29,8**	11,2;55,1	45,3**	21,3;71,0	52,9	41,9;63,9	29,1**	5,4;66,8	42,0**	13,6;75,1	23,7**	9,2;44,7	Oui
44,8**	13,0;80,3	70,2*	44,9;88,8	54,7*	29,0;78,7	47,1	36,1;58,1	70,9*	33,2;94,6	58,0**	24,9;86,4	76,3	55,3;90,8	Non, il aurait aimé bénéficier d'un tel soutien

4. CHANGEMENTS DES HABITUDES DE VIE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 22
Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Sport ou activité physique[p]													
Oui	23,5	22,8	27,4	16,6	25,4	30,9	20,2	24,9	18,4	24,0	21,3;26,7	24,1*	16,5;33,1
Non	47,9	47,8	46,7	48,0	46,4	43,9	53,8	56,6	49,8	46,0	42,6;49,4	38,7	29,5;47,9
Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques	28,6	29,3	25,9	35,4	28,2	25,2	26,0	18,5	31,8	30,1	27,2;32,9	37,3	28,4;46,1
Perte de poids[p]													
Oui	26,0	26,0	33,2	22,0	28,1	27,3	29,8	24,8	23,7	27,7	24,7;30,6	29,9	21,3;39,5
Non	40,9	39,2	37,0	44,8	38,2	40,5	35,0	43,4	42,7	38,6	35,3;41,9	35,6	26,0;45,3
Il n'avait pas de poids à perdre	33,1	34,8	29,8	33,3	33,6	32,2	35,2	31,8	33,6	33,7	30,5;36,9	34,5	25,0;44,0
Modification de l'alimentation[p, r]													
Oui	42,7	53,5	50,8	32,3	46,9	44,6	47,7	34,3	38,8	44,4	41,3;47,5	49,6	40,3;58,9
Non	28,0	21,6	22,5	35,5	26,0	24,2	24,3	36,7	31,9	25,1	22,2;27,9	21,4*	13,8;30,8
Il n'avait pas à modifier son alimentation	29,3	24,8	26,7	32,3	27,2	31,2	28,0	29,1	29,3	30,5	27,6;33,5	29,0*	20,1;39,3
Réduction de la consommation de tabac[p]													
Oui	14,5	10,1	9,4*	8,4	12,4	13,7	20,7	42,2	15,3	14,5	12,3;16,7	7,6**	3,6;14,0
Non	8,1	5,2	8,0*	8,5	9,3	7,7	5,5*	6,1*	11,0	6,4	5,0;8,1	3,2**	0,7;9,1
Il ne fumait pas	77,4	84,7	82,5	83,1	78,3	78,6	73,7	51,7	73,7	79,1	76,5;81,6	89,2	82,1;94,2
Réduction de la consommation de drogues													
Oui	1,2	0,7**	0,9**	0,4**	3,0**	0,7**	2,0**	2,3**	1,7*	0,7**	0,3;1,4	-	;
Non	2,6	1,7**	2,1**	1,9*	2,9**	2,2*	3,0**	2,5**	4,2	1,8**	1,0;2,9	1,0**	0,0;5,4
Il ne prenait pas de drogue	96,2	97,5	97,0	97,8	94,0	97,1	94,9	95,2	94,1	97,6	96,3;98,5	99,0	94,6;100,0
Réduction de la consommation d'alcool[p]													
Oui	8,5	8,6	5,9*	9,9	8,9	6,0	11,8	10,6	9,6	8,1	6,5;9,9	6,5**	2,7;12,6
Non	10,9	9,6	6,6*	15,4	12,0	8,0	10,6	12,0	12,4	10,6	8,4;12,7	8,9**	4,2;16,1
Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération	80,6	81,8	87,5	74,7	79,1	86,0	77,6	77,4	78,0	81,4	78,8;83,9	84,6	76,2;91,0
Gestion du stress[p, r]													
Oui	35,3	32,3	43,8	21,5	44,3	44,0	34,8	38,0	29,8	35,6	32,6;38,7	36,2	26,7;45,8
Non	25,7	26,0	23,0	27,4	21,6	24,1	29,4	25,4	27,6	25,5	22,5;28,6	27,3*	19,1;36,9
Il savait gérer son stress	39,0	41,8	33,2	51,1	34,1	31,9	35,7	36,6	42,6	38,8	35,7;42,0	36,4	27,0;45,8

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Sport ou activité physique[p]
26,7**	14,0;43,1	18,6*	12,9;25,4	20,4**	10,6;33,6	31,4	25,6;37,3	23,2**	12,4;37,4	28,3*	16,7;42,6	18,1*	12,7;24,6	Oui
45,3*	29,6;61,6	46,3	38,6;53,9	44,4*	31,1;57,6	42,3	35,8;48,8	51,2	37,7;64,6	54,4	40,6;68,1	51,8	43,9;59,8	Non
28,0*	15,3;44,1	35,2	28,1;42,2	35,3*	23,6;48,4	26,3	20,8;31,7	25,6*	14,8;39,1	17,3**	7,5;31,8	30,1	22,9;37,2	Il faisait suffisamment de sport ou d'activités physiques
														Perte de poids[p]
37,3*	23,8;52,4	22,9	16,6;30,2	27,1*	16,2;40,5	32,4	26,4;38,4	26,5*	15,2;40,8	17,4**	8,1;30,7	25,0	18,1;32,9	Oui
29,9*	17,7;44,5	45,5	37,6;53,3	31,2*	19,0;45,6	36,0	29,5;42,5	39,5*	26,1;54,2	42,5*	28,2;57,8	41,3	33,3;49,3	Non
32,9*	20,0;47,9	31,6	24,4;38,9	41,8*	28,4;55,1	31,6	25,8;37,4	33,9*	21,2;48,6	40,1*	25,3;56,3	33,7	26,4;41,1	Il n'avait pas de poids à perdre
														Modification de l'alimentation[p, r]
62,8	47,3;76,7	36,5	29,6;43,3	45,8*	32,3;59,4	47,6	41,3;53,9	54,6	41,4;67,7	40,2*	26,2;55,5	36,9	29,9;43,8	Oui
21,4**	10,4;36,5	32,5	25,3;39,7	20,0**	9,9;34,1	19,6	14,7;25,3	18,8**	9,1;32,4	38,7*	24,9;54,0	29,0	22,5;36,3	Non
15,8**	6,8;29,3	31,0	23,9;38,2	34,1*	21,4;48,8	32,8	27,2;38,4	26,7*	15,4;40,7	21,1**	10,3;35,8	34,1	26,8;41,4	Il n'avait pas à modifier son alimentation
														Réduction de la consommation de tabac[p]
10,2**	3,2;22,7	9,6*	5,7;14,8	8,1**	2,4;18,7	12,4*	8,7;17,0	30,6*	19,1;44,1	41,0*	27,4;54,5	17,0*	11,8;23,3	Oui
7,9**	2,1;19,2	6,8**	3,4;11,9	11,3**	4,3;23,1	6,8*	4,2;10,2	-	;	3,8**	0,5;13,0	7,9*	4,6;12,5	Non
82,0	67,9;91,7	83,6	77,4;88,7	80,6	67,2;90,3	80,8	75,7;85,2	69,4	55,9;80,9	55,3	40,4;69,5	75,1	68,3;81,2	Il ne fumait pas
														Réduction de la consommation de drogues
-	;	-	;	1,6**	0,0;8,5	0,5**	0,0;2,2	-	;	2,1**	0,1;11,1	1,6**	0,3;4,6	Oui
-	;	2,5**	0,6;6,6	1,9**	0,0;10,3	1,1**	0,2;3,3	1,9**	0,0;11,1	2,0**	0,0;11,2	2,7**	0,7;6,8	Non
100,0	;	97,5	93,4;99,4	96,5	87,8;99,6	98,4	96,1;99,6	98,1	88,9;100,0	96,0	85,5;99,6	95,7	91,2;98,3	Il ne prenait pas de drogue
														Réduction de la consommation d'alcool[p]
10,0**	3,5;21,2	13,3*	8,2;19,8	3,2**	0,4;11,4	5,9*	3,5;9,3	7,1**	1,9;17,6	11,7**	4,2;24,3	7,9*	4,6;12,4	Oui
7,3**	1,5;19,8	11,0*	6,6;16,9	21,7**	11,7;34,9	5,3**	2,7;9,4	13,4**	5,4;26,1	14,6**	5,8;28,4	13,4*	8,5;19,7	Non
82,8	68,9;92,2	75,7	67,7;82,6	75,1	61,9;85,7	88,8	84,0;92,5	79,6	66,2;89,4	73,7	59,4;85,1	78,7	72,0;84,5	Il ne buvait pas d'alcool ou il buvait avec modération
														Gestion du stress[p, r]
49,3*	32,6;66,2	22,6*	16,2;30,1	46,2	33,3;59,1	41,3	35,3;47,2	38,8*	26,5;52,3	36,3*	23,3;51,0	30,6	24,0;37,2	Oui
20,4**	9,5;35,6	27,4	19,9;35,9	21,2**	11,6;33,9	25,1	19,6;30,6	29,8*	18,4;43,4	28,9*	16,4;44,2	24,4	17,9;31,7	Non
30,3**	16,2;47,7	50,0	42,1;58,0	32,6*	20,2;47,0	33,6	27,9;39,4	31,4*	19,5;45,3	34,8*	21,0;50,8	45,0	37,4;52,7	Il savait gérer son stress

Tableau 22 *(suite)*

Répartition des patients[1] selon les changements apportés ou non dans leurs habitudes de vie liées à la santé et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]													
Oui	40,0	34,5	33,1	27,2	44,8	48,1	40,8	43,3	41,5	39,4	36,4;42,5	34,3	25,1;43,5
Non	17,1	17,1	13,7	30,5	13,1	8,4	24,1	16,3	18,7	16,7	14,4;19,1	18,0*	11,0;27,1
Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement	42,9	48,4	53,2	42,3	42,1	43,5	35,0	40,5	39,9	43,8	40,6;47,0	47,6	37,6;57,6
Plus de repos[p]													
Oui	1,0	1,0**	2,4**	0,3**	1,4**	1,3*	0,9**	0,2**	0,6**	1,0**	0,5;1,9	2,6**	0,5;7,4
Non	99,0	99,0	97,6	99,7	98,6	98,7	99,1	99,8	99,4	99,0	98,1;99,5	97,4	92,6;99,5
Autre													
Oui	0,3*	0,2**	0,2**	0,1**	0,6**	0,5**	0,2**	-	0,2**	0,2**	0,0;0,8	-	;
Non	99,7	99,8	99,8	99,9	99,4	99,5	99,8	100,0	99,8	99,8	99,2;100,0	100,0	;

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

r Pour la région, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
														Réduction de l'exposition aux rayons du soleil[p]
30,7*	18,0;45,9	30,6	23,4;37,9	46,2	33,0;59,5	44,2	38,1;50,3	39,5*	26,2;54,0	40,5*	26,8;55,4	43,0	35,5;50,5	Oui
12,3**	4,7;24,7	24,4	18,1;31,6	10,4**	3,8;21,5	10,1*	6,6;14,6	25,6*	14,2;40,0	28,9*	16,1;44,6	15,9*	10,9;22,1	Non
57,0	41,4;71,7	45,0	37,2;52,7	43,4*	30,5;56,2	45,7	39,5;51,9	34,9*	23,3;48,0	30,6*	17,9;45,9	41,1	33,4;48,7	Il ne prenait pas de soleil ou il se protégeait adéquatement
														Plus de repos[p]
2,1**	0,0;11,3	0,7**	0,0;3,7	1,6**	0,0;9,7	1,5**	0,4;3,7	-	;	-	;	-	;	Oui
97,9	88,7;100,0	99,3	96,3;100,0	98,4	90,3;100,0	98,5	96,3;99,6	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non
														Autre
-	;	-	;	-	;	0,7**	0,1;2,8	-	;	-	;	-	;	Oui
100,0	;	100,0	;	100,0	;	99,3	97,2;99,9	100,0	;	100,0	;	100,0	;	Non

Tableau 23

Répartition des patients[1] selon les éléments ayant contribué ou non aux changements dans leurs habitudes liées à la santé et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Soutien d'un professionnel de la santé[p]													
Oui	51,8	59,5	48,2	51,6	54,7	47,8	46,7	59,0	52,6	49,2	42,8;55,7	60,8	41,4;78,0
Non	48,2	40,5	51,8	48,4	45,3	52,2	53,3	41,0	47,4	50,8	44,3;57,2	39,2*	22,0;58,6
Soutien de la famille ou des amis													
Oui	80,3	83,7	85,4	79,0	84,6	80,1	72,3	83,0	77,3	78,5	74,4;82,7	80,1	65,0;90,7
Non	19,7	16,3	14,6*	21,0	15,4	19,9	27,7	17,0*	22,7	21,5	17,3;25,6	19,9**	9,3;35,0
Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics													
Oui	50,5	54,3	53,0	47,9	48,1	53,3	48,0	53,8	45,5	50,7	43,3;58,2	54,4*	26,9;80,1
Non	49,5	45,7	47,0	52,1	51,9	46,7	52,0	46,2	54,5	49,3	41,8;56,7	45,6**	19,9;73,1
Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique													
Oui	26,3	29,7	22,5*	27,7	20,3*	26,1	23,0*	27,8*	28,8	23,3	16,9;30,9	18,6**	3,8;46,4
Non	73,7	70,3	77,5	72,3	79,7	73,9	77,0	72,2	71,2	76,7	69,1;83,1	81,4	53,6;96,2
Groupe d'entraide ou association de patients													
Oui	17,2	20,8	13,6*	13,8*	21,7*	20,2	12,8*	16,9*	13,2	18,0	13,2;23,6	13,3**	2,4;36,1
Non	82,8	79,2	86,4	86,2	78,3	79,8	87,2	83,1	86,8	82,0	76,4;86,8	86,7	63,9;97,6
Exemple de l'entourage[p]													
Oui	51,2	55,0	53,1	44,3	60,8	52,5	47,3	45,9	48,9	50,4	44,6;56,2	41,0*	23,2;60,6
Non	48,8	45,0	46,9	55,7	39,2	47,5	52,7	54,1	51,1	49,6	43,8;55,4	59,0*	39,4;76,8
Prière ou soutien spirituel[p]													
Oui	64,1	69,9	68,4	53,2	65,4	66,8	53,8	71,4	61,6	57,8	52,7;63,0	50,1*	33,0;67,2
Non	35,9	30,1	31,6	46,8	34,6	33,2	46,2	28,6	38,4	42,2	37,0;47,3	49,9*	32,8;67,0

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

p Pour l'ensemble du Québec, le test du khi-deux entre cette variable et le siège du cancer est significatif au seuil de 5 %.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Soutien d'un professionnel de la santé[p]
56,8*	27,2;83,2	49,2*	29,8;68,9	50,4*	25,8;74,9	43,7	32,1;55,2	48,2**	19,1;78,2	55,2*	28,2;80,1	43,7*	25,6;63,1	Oui
43,2**	16,8;72,8	50,8*	31,1;70,2	49,6*	25,1;74,2	56,3	44,8;67,9	51,8**	21,8;80,9	44,8**	19,9;71,8	56,3*	36,9;74,4	Non
														Soutien de la famille ou des amis
90,7	67,1;99,2	85,1	73,6;93,0	84,1	62,9;95,8	77,2	68,9;84,2	82,7	63,5;94,4	72,9	50,9;88,9	69,9	57,4;80,6	Oui
9,3**	0,8;32,9	14,9**	7,0;26,4	15,9**	4,2;37,1	22,8*	15,8;31,1	17,3**	5,6;36,5	27,1**	11,1;49,1	30,1*	19,4;42,6	Non
														Entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les lieux publics
57,8**	10,4;95,6	50,1*	28,0;72,2	53,1**	15,6;88,1	46,9*	31,5;62,7	60,8*	29,4;86,7	59,6*	34,9;81,1	45,8*	29,4;62,9	Oui
42,2**	4,4;89,6	49,9*	27,8;72,0	46,9**	11,9;84,4	53,1	37,3;68,5	39,2**	13,3;70,6	40,4**	18,9;65,1	54,2*	37,1;70,6	Non
														Programme ou politique à l'école ou au travail favorisant la bonne forme physique
-	;	25,5**	8,1;51,4	13,4**	0,2;59,8	23,5**	12,7;37,6	33,3**	8,9;67,1	18,3**	3,4;47,0	29,4**	14,7;48,1	Oui
100,0	;	74,5	48,6;91,9	86,6*	40,2;99,8	76,5	62,4;87,3	66,7*	32,9;91,1	81,7	53,0;96,6	70,6	51,9;85,3	Non
														Groupe d'entraide ou association de patients
7,0**	0,2;32,7	17,0**	5,7;35,6	32,2**	10,4;61,9	24,0*	14,8;35,3	28,5**	8,8;56,9	9,6**	1,0;32,3	10,5**	3,5;22,7	Oui
93,0	67,3;99,8	83,0	64,4;94,3	67,8*	38,1;89,6	76,0	64,7;85,2	71,5*	43,1;91,2	90,4	67,7;99,0	89,5	77,3;96,5	Non
														Exemple de l'entourage[p]
59,3*	32,8;82,4	47,8*	32,6;63,3	58,2*	35,6;78,6	53,1	43,6;62,7	66,3*	40,2;86,6	43,7*	22,5;66,8	44,5	31,9;57,1	Oui
40,7**	17,6;67,2	52,2	36,7;67,4	41,8**	21,4;64,4	46,9	37,3;56,4	33,7**	13,4;59,8	56,3*	33,2;77,5	55,5	42,9;68,1	Non
														Prière ou soutien spirituel[p]
74,6	50,4;91,1	49,9	35,4;64,4	63,9*	39,5;83,9	64,6	55,6;73,6	50,5*	28,4;72,4	47,0*	25,6;69,3	56,0	43,4;68,5	Oui
25,4**	8,9;49,6	50,1	35,6;64,6	36,1**	16,1;60,5	35,4	26,4;44,4	49,5*	27,6;71,6	53,0*	30,7;74,4	44,0	31,5;56,6	Non

5. SATISFACTION GLOBALE DE LA POPULATION VISÉE

Tableau 24

Répartition des patients[1] selon la satisfaction globale à l'égard des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic et le siège du cancer, Montérégie et ensemble du Québec, 2008

	Province									Région			
	Ensemble province	Colorectal	Génital féminin	Prostate	Hémato-poïétique	Sein	Tête et cou (ORL)	Broncho-pulmonaire	Autres	Ensemble région		Colorectal	
	%									%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)
Ensemble des patients		11,8	5,5	15,9	8,0	26,5	6,3	5,7	20,3			11,8	9,8;13,9
Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic													
Mauvaise	0,5*	0,2**	0,8**	0,5**	0,6**	0,4**	0,3**	0,7**	0,9**	0,4**	0,1;1,1	0,9**	0,0;4,7
Passable	2,1	2,0**	2,1**	2,0*	1,1**	2,1*	2,6**	1,5**	2,8*	1,5**	0,8;2,6	0,9**	0,0;4,9
Bonne	11,3	11,8	12,6	11,0	10,0	10,9	14,0	12,9	10,7	10,2	8,1;12,2	8,5**	4,0;15,6
Très bonne	35,0	36,7	34,0	33,3	34,7	37,2	32,0	35,6	33,6	35,8	32,7;39,0	38,1	28,9;47,2
Excellente	51,1	49,3	50,5	53,3	53,6	49,5	51,1	49,3	52,1	52,0	48,7;55,4	51,6	41,9;61,3

1. Par patient, on entend les personnes de 18 ans et plus résidant au Québec et ayant reçu au moins un des trois traitements visés par l'enquête (chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie incluant la curiethérapie) entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006.

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*.

Région														
Génital féminin		Prostate		Hématopoïétique		Sein		Tête et cou (ORL)		Broncho-pulmonaire		Autres		
%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	%	Intervalle de confiance (95 %)	
5,1	3,8;6,9	17,0	15,2;18,8	6,6	5,2;8,3	27,1	24,9;29,4	5,8	4,5;7,4	5,5	4,1;7,2	20,9	18,3;23,6	Ensemble des patients
														Qualité perçue des soins reçus depuis l'annonce du diagnostic
-	;	0,7**	0,0;3,4	1,8**	0,0;9,4	-	;	-	;	1,9**	0,0;10,4	-	;	Mauvaise
-	;	1,4**	0,2;5,0	2,0**	0,1;10,1	1,9**	0,7;4,1	-	;	-	;	2,6**	0,7;6,7	Passable
13,5**	5,0;27,3	6,4**	3,1;11,6	5,7**	1,0;16,7	12,8*	8,9;17,6	10,5**	3,9;21,5	11,3**	3,7;24,7	10,9*	6,2;17,3	Bonne
37,2*	23,1;53,0	33,3	25,8;40,8	44,0	31,5;56,5	36,0	30,2;41,8	27,8*	16,5;41,7	40,5*	26,3;55,9	34,5	27,3;41,8	Très bonne
49,3*	33,7;65,0	58,2	50,4;66,1	46,6	33,6;59,6	49,3	43,0;55,6	61,7	47,8;74,3	46,4*	31,4;61,8	52,0	43,9;60,2	Excellente

Des statistiques sur le Québec d'hier et d'aujourd'hui pour le Québec de demain

Ce recueil statistique comporte les données régionales de l'*Enquête québécoise sur la qualité des services de lutte contre le cancer, 2008*, mise sur pied en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce document présente, en fonction de chacune des 16 régions sociosanitaires, des tableaux qui dressent un portrait de l'expérience concrète des personnes de 18 ans et plus, résidant au Québec et ayant reçu, entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2006, au moins un des trois principaux traitements contre le cancer : la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie (incluant la curiethérapie). Cette publication comprend également des données sur les caractéristiques sociodémographiques et de santé de la population visée, le parcours de ces personnes au moment du dépistage, de l'investigation, du diagnostic, du traitement et du suivi médical, des changements apportés à leurs habitudes de vie et leur satisfaction globale à l'égard des soins et des services reçus.

Institut de la statistique Québec