SELECTION DES PLANTS
POUR LA REGENERESCENCE
DES PLANTATIONS:

Au moment de la floraison, choisir et marquer les plants dont les hampes de fleurs sont très nombreuses. Supprimer ces fleurs et laisser développer sur chaque plant un nombre déterminé de stolons - 8 à 10. Prendre la récolte sur les autres plants et les arracher ensuite. Ces plants seront plantés à part l'année suivante et le même travail se continuera plusieurs années.

RECOLTE: Surveiller la cueillette attentivement. Eliminer les fraises mal formées, trop mûres ou pas assez, ne jamais laisser les fruits récoltés exposés au soleil, bien emplir les casseaux, faire la vente aussitôt que possible après la récolte, séparer chaque variété.

G. Billault,

Chef, Section culture maraîchère.

GB/LD.

Montréal, le 22 avril 1941.

OFF
A38H6
A14/B5
1941.
5

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE - SERVICE DE L'HORTICULTURE

152 est, rue Notre-Dame

CULTURE DU FRAISIER

VARIETES CULTIVEES: Sénateur Dunlap, Premier de Kellof, Beauté de Pearson, William Belt.

VARIETES A L'ESSAI: Clary Bell, Robert McKenzie, Dick.

SOL: Toute terre saine, pas trop forte et ayant une bonne réserve d'humidité. Sable noir, terre jaune fertile, terre graveleuse, terre sableuse. Exposition sud pour récolte de primeur, exposition nord pour récolte tardive.

ENGRAIS: Fumier décomposé employé à des cultures sarclées une année ou deux à l'avance. Fumier décomposé, 15 tonnes à l'arpent, enfoui à l'automne précédant la plantation. Nitrate de soude au printemps pour stimuler les plantations qui manquent de vigueur. 4-8-6 après la récolte, 600 à 800 livres à l'arpent.

CHOIX DU PLANT: Les choisir sur une plantation productive et vigoureuse. Eliminer les plants faibles ou ceux qui portent des marques de dégénérescence. Ne choisir que des plants d'un an bien racinés.

PLANTATION: Autant que possible aussitôt l'arrachage du plant ou à sa réception. Couper l'extrémité des racines en les laissant à 4 pouces de longueur. Espacer les rangs de 3½ pds et planter à tous les 12 pouces sur le rang. Bien étendre les racines et tasser fortement la terre dessus. Enterrer le plant jusqu'au collet. La plantation doit suivre la préparation du terrain.

SOINS DE CULTURE: Eliminer, 4 à 5 semaines après la plantation, les plants mal repris. Diriger les premiers courants pour remplacer ces plants. Tenir les plantations absolument propres. Supprimer les nouveaux courants à partir du 10 septembre.

PROTECTION: A l'automne voir à l'égouttement du sol par de bonnes rigoles. En décembre couvrir les plantations avec de la paille bien propre, environ 2 pouces suffisent; ou mieux avec des tiges d'asperges.

AU PRINTEMPS: Découvrir les plantations du 10 au 15 avril pour les récoltes de primeurs; attendre les premiers jours de mai, là où les gelées sont à craindre au moment de la floraison. Avant la floraison, passer le sarcleur entre les rangs et ajouter ensuite un bon paillis de 3 à 4 pouces, pour la protection des fruits et pour la propreté du travail au moment de la cueillette.

Bookkeeper