

La consommation d'alcool et de drogues

chez les élèves du secondaire en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Principaux résultats de
l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire
(EQSJS 2016-2017)

Direction de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Gaspésie

Québec 

Rédaction du rapport et analyse des données

Nathalie Dubé, responsable régionale de la surveillance de l'état de santé de la population

Révision du contenu

Ariane Courville, médecin-conseil

Révision linguistique et orthographique

Suzanne Labbé, agente administrative

Référence suggérée

Dubé, Nathalie. *La consommation d'alcool et de drogues chez les élèves du secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine – Principaux résultats de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire*, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 29 pages. (2019d)

Production et diffusion

Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
144, boulevard Gaspé
Gaspé (Québec) G4X 1A9

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019
Bibliothèque et Archives Canada, 2019
ISBN : 978-2-550-83636-0 (version PDF)

Table des matières

Introduction	5
La consommation d'alcool.....	7
La consommation de drogues.....	10
La consommation problématique d'alcool ou de drogues.....	12
Conclusion	15
Annexe 1	
La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes du secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine selon le cycle et la langue d'enseignement, 2016-2017	17
Annexe 2	
La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes du secondaire dans les territoires locaux, 2010-2011 et 2016-2017	19
Références	29

Introduction

L'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 (EQSJS) est une vaste enquête menée au cours de l'année scolaire 2016-2017 auprès de plus de 62 000 élèves du secondaire dans 16 régions sociosanitaires du Québec, dont la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine (seules les régions des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nunavik n'ont pas été couvertes par l'enquête provinciale). Cette enquête, à laquelle ont collaboré le réseau scolaire ainsi que les directions de santé publique, a été réalisée par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Une première édition de l'enquête a été menée en 2010-2011. Pour l'édition 2016-2017 en Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, 2 852 élèves de la 1^{re} à la 5^e secondaire inscrits au secteur des jeunes, répartis dans 17 des 21 écoles francophones et anglophones, ont participé à cette enquête (tableau 1).

Tableau 1

Nombre de participants selon le territoire local de résidence, EQSJS 2016-2017

RLS de résidence	Nombre de répondants
Baie-des-Chaleurs	1 069
Rocher-Percé	449
Côte-de-Gaspé	610
Haute-Gaspésie	311
Îles-de-la-Madeleine	413
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine	2 852

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2016-2017.

Les objectifs et le contenu de l'enquête

Les objectifs de l'EQSJS 2016-2017 sont de dresser le portrait de la santé et du bien-être des élèves du secondaire, en portant une attention particulière à leurs habitudes de vie et à leur santé physique, mentale et psychosociale, et d'évaluer le chemin parcouru depuis la première édition de l'enquête en 2010-2011.

La collecte de données

La collecte de données s'est effectuée entre novembre 2016 et mai 2017 durant les périodes de classe. Les élèves étaient invités à répondre à un questionnaire informatisé sur des tablettes fournies par l'ISQ. Le temps nécessaire pour remplir le questionnaire a été en moyenne de 30 minutes. Précisons que les questionnaires étaient anonymes et que toute la collecte s'est faite selon les règles strictes de confidentialité et de sécurité.

Pour en connaître davantage sur la méthodologie de l'EQSJS, veuillez consulter le document intitulé [L'Enquête sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017 – La méthodologie en bref](#) (Dubé, 2019).

Le contenu du présent fascicule

Ce fascicule se concentre sur les résultats relatifs à la consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes du secondaire en faisant état de la situation régionale en 2016-2017, en examinant l'évolution des indicateurs de la consommation de ces produits depuis 2010-2011, en comparant les résultats régionaux à ceux du reste du Québec et en présentant quelques-unes des caractéristiques associées à la consommation chez les jeunes. D'autres fascicules sur les résultats de l'EQSJS sont déjà produits et disponibles sur notre site [Statistiques régionales](#) ou le seront dans les prochaines semaines, notamment sur les thèmes suivants :

- Les habitudes de vie et le poids corporel des jeunes
- La santé mentale
- La violence entre jeunes et les conduites rebelles et délinquantes
- L'environnement social des jeunes

Cela dit, nous débutons le présent fascicule en présentant les résultats sur la consommation d'alcool et poursuivons avec ceux sur la consommation de drogues, puis terminons par la consommation problématique de ces produits chez les jeunes. Nous concluons en résumant l'essentiel des résultats sur la consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes.

Quelques indications pour lire le fascicule

Au début de chaque thème, sous la rubrique **En 2016-2017**, des liens hypertextes ont été créés pour chaque indicateur afin d'accéder au rapport provincial publié par l'ISQ et ainsi connaître la façon selon laquelle chacun d'eux a été mesuré dans le cadre de l'EQSJS 2016-2017.

Dans les tableaux et l'annexe 2, sous la colonne **Évolution**, nous présentons le résultat de la comparaison entre la donnée régionale de 2016-2017 et celle de 2010-2011. Si le résultat obtenu en 2016-2017 est significativement mieux que celui qui prévalait en 2010-2011 (au seuil de 0,05), nous indiquons **Gain**. Si au contraire, le résultat de 2016-2017 est moins bon que celui de 2010-2011, nous indiquons **Perte**.

Enfin, sous la colonne **QÎM vs Québec** dans les tableaux, nous présentons le résultat de la comparaison entre la donnée régionale et la donnée du reste du Québec en 2016-2017. Si le résultat de la région est meilleur que celui du reste du Québec (au seuil de 0,05), nous indiquons **En faveur** (en faveur de la région). Si au contraire le résultat régional est moins bon, nous écrivons alors **Défaveur** (en défaveur de la région).

La consommation d'alcool

En 2016-2017

- 67 % des élèves du secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont **consommé de l'alcool** au cours des 12 derniers mois.
- 16 % ont une **fréquence élevée de consommation d'alcool**, c'est-à-dire qu'ils ont pris de l'alcool toutes les semaines au cours des 12 derniers mois.
- 50 % ont eu au moins une fois une **consommation excessive d'alcool** au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire qu'ils ont pris 5 verres ou plus en une même occasion. Pour 70 % d'entre eux, c'est 8 verres ou plus qu'ils ont pris en une même occasion.
- 8,6 % ont eu une **consommation excessive d'alcool 11 fois ou plus** au cours des 12 derniers mois.
- 18 % des élèves de 13 ans et plus ont pris une **première consommation d'alcool avant d'avoir 13 ans**.

Évolution depuis 2010-2011 en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Précisons d'abord que la proportion des jeunes qui s'initient à l'alcool est en baisse dans la région et au Québec, la proportion à avoir consommé ce produit au cours de leur vie ayant diminué de 75 % à 70 % depuis 2010-2011 en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de 63 % à 55 % au Québec (résultats non présentés). Cette moindre popularité de l'alcool auprès des jeunes au cours des dernières années s'est traduite par des gains pour presque tous les indicateurs de la consommation d'alcool mesurés dans l'EQSJS, et ce, dans la région comme au Québec. En effet, comme on peut le lire au tableau 2, la proportion de jeunes gaspésiens et madelinots ayant consommé de l'alcool sur une période de 12 mois a diminué de 73 % à 67 % entre 2010-2011 et 2016-2017. De même, la proportion de jeunes buvant de l'alcool toutes les semaines a chuté de 20 % à 16 % entre les deux enquêtes, la proportion ayant pris 5 consommations ou plus en une même occasion au moins une fois au cours des 12 derniers mois a baissé de 53 % à 50 % et la proportion des jeunes de 13 ans et plus ayant bu de l'alcool avant d'avoir 13 ans a diminué de 27 % à 18 % (tableau 2). Ces constats régionaux ont été observés chez les garçons et chez les filles, sauf pour ce qui est de la consommation excessive d'alcool qui n'a diminué que chez les garçons (résultats non présentés). Cela dit, le seul indicateur ayant échappé à cette baisse dans la région est celui de la consommation excessive d'alcool au moins 11 fois au cours de l'année précédant l'enquête. Au Québec toutefois, la proportion de jeunes ayant bu avec excès à cette fréquence a diminué de 6,4 % à 4,2 % entre les deux enquêtes (résultats non présentés).

Comparativement au Québec en 2016-2017

Comme c'était le cas en 2010-2011, les jeunes du secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine obtiennent de moins bons résultats que les autres jeunes du Québec eu égard à tous les indicateurs de la consommation d'alcool. Ils sont proportionnellement plus nombreux, en 2016-2017, à consommer de l'alcool, à en consommer toutes les semaines et de manière excessive et s'initient aussi plus jeunes que les québécois à ce produit (tableau 2). Ajoutons que parmi les jeunes de la région ayant consommé avec excès au moins une fois au cours d'une période de 12 mois, 70 % ont pris 8 verres ou plus en une même occasion (66 % au Québec). Rapporté à tous les jeunes, c'est 35 % des jeunes gaspésiens et madelinots qui ont pris 8 consommations d'alcool ou plus en une même occasion au cours de l'année précédant l'enquête, une proportion supérieure à celle des jeunes québécois (23 %) (résultats non présentés).

Caractéristiques associées à la consommation d'alcool

Bien qu'en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la proportion de buveurs d'alcool ne varie pas selon le sexe, les **garçons** sont nettement plus enclins que les filles à boire toutes les semaines (21 % contre 11 %), à boire de manière excessive 11 fois ou plus durant une année (11 % contre 5,8 %) et à s'initier avant 13 ans à la consommation d'alcool (24 % contre 13 %) (tableau 2). Les **élèves du 2^e cycle** et les **francophones** sont aussi les groupes où on retrouve les plus fortes proportions de buveurs, de buveurs réguliers (c'est-à-dire consommant toutes les semaines) et de buveurs excessifs ([annexe 1](#)). Enfin, on peut lire au tableau 2 que même s'ils ne sont pas plus nombreux, en proportion, que les jeunes de la Gaspésie à boire de l'alcool, les jeunes des **Îles-de-la-Madeleine** sont plus susceptibles de boire toutes les semaines (20 % contre 15 %) et de boire de manière excessive 11 fois ou plus sur une période 12 mois (12 % contre 8,0 %) (tableau 2). De leur côté, les jeunes de **La Côte-de-Gaspé** s'initient plus précocement à l'alcool que les autres jeunes de la région : 22 % des jeunes de 13 ans et plus sur ce territoire local ont bu un premier verre d'alcool avant d'avoir 13 ans alors que cette proportion est de 18 % ailleurs dans la région.

Tableau 2

La consommation d'alcool	Gaspésie-Îles		Évolution	Québec	Gaspésie-Îles Gars vs Filles	Gaspésie-Îles		Baie-des- Chaleurs	Rocher- Percé	Côte-de- Gaspé	Haute- Gaspésie	Îles
	2010- 2011	2016- 2017				Gars	Filles					
BUVEUR D'ALCOOL¹												
Ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois ³	72,5 ²	67,4	Gain	52,6	Défaveur	67,2	67,6	63,9-	69,6	70,2	73,1+	64,9
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION												
Ont consommé de l'alcool toutes les semaines au cours des 12 derniers mois	19,7	15,9	Gain	11,2	Défaveur	20,5+	11,1	13,7-	13,2	17,4	18,6	20,1+
CONSOMMATION EXCESSIVE												
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins une fois</u> au cours des 12 derniers mois	52,5	50,2	Gain	34,3	Défaveur	51,3	49,0	46,6-	55,8+	51,3	53,3	48,6
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins 11 fois</u> au cours des 12 derniers mois	9,3	8,6	NS	4,2	Défaveur	11,4+	5,8	8,1	6,1*	7,6	11,0*	12,2+
ÂGE D'INITIATION¹												
Ont pris de l'alcool avant d'avoir 13 ans	26,5	18,4	Gain	13,1	Défaveur	23,8+	12,7	16,2-	15,9	22,1+	21,1	19,3

¹ La question précise à l'élève de ne pas tenir compte des fois où il a seulement goûté.

² Cette valeur en 2010-2011 n'est pas la donnée officielle de l'édition de l'EQSJS 2010-2011, mais plutôt la donnée standardisée ou comparable. Cet indicateur étant affecté par la période de collecte, l'écart significatif entre la donnée officielle de 2010-2011 et celle de 2016-2017 a été confirmé avec les données comparables. La présentation des données comparables permet d'apprécier l'écart entre les deux enquêtes. Pour plus de détails sur les problèmes de comparabilité de certains indicateurs entre les deux enquêtes et entre les territoires et sur les méthodes utilisées pour rendre comparables les résultats, consulter [Dubé \(2019\)](#).

³ Étant donné que cet indicateur est affecté par la période de collecte, l'écart significatif entre la donnée de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et celle du reste Québec a été confirmé avec les données comparables de même que les écarts significatifs entre les données locales et le reste de la région. Mais toutes les données présentées pour 2016-2017 sont les données officielles, lesquelles ne sont pas comparables entre elles.

NS : Écart entre la valeur de 2010-2011 et celle de 2016-2017 NON SIGNIFICATIF au seuil de 0,05.

+ ou - Valeur des garçons significativement supérieure ou inférieure à celle des filles OU valeur du territoire local significativement supérieure ou inférieure à celle du reste de la région au seuil de 0,05.

*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2010-2011 et 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

La consommation de drogues

En 2016-2017

25 % des élèves du secondaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois.

24 % ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois.

9,0 % ont eu une fréquence élevée de consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire qu'ils en ont consommé toutes les semaines.

4,4 % des élèves de 13 ans et plus ont consommé de la drogue avant 13 ans.

Évolution depuis 2010-2011 en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

De la même manière que nous l'avons observé pour l'alcool, les jeunes sont moins susceptibles en 2016-2017 de s'être déjà initiés aux drogues qu'ils ne l'étaient en 2010-2011. La proportion de jeunes ayant déjà pris de la drogue au cours de leur vie est en effet passée de 31 % à 27 % en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et de 27 % à 21 % au Québec (résultats non présentés). Ici encore, cette baisse de popularité de la drogue chez les jeunes s'est traduite par des gains pour tous les indicateurs en lien avec la consommation de ce produit. C'est ainsi qu'entre 2010-2011 et 2016-2017, nous avons assisté à une baisse de la proportion de jeunes consommant de la drogue (29 % à 25 %), notamment le cannabis (29 % à 24 %), ainsi qu'à une baisse de la fréquence de consommation de cannabis, la proportion de jeunes en prenant toutes les semaines ayant chuté de 12 % à 9,0 % entre les deux enquêtes. Parallèlement à ces résultats des plus positifs, la proportion de jeunes de 13 ans et plus ayant pris de la drogue avant d'avoir 13 ans est passée de 7,4 % en 2010-2011 à 4,4 % en 2016-2017 (tableau 3). Ces gains ont profité aux garçons et aux filles, mais de manière plus importante chez ces dernières.

Comparativement au Québec en 2016-2017

En dépit des gains que nous avons faits, la consommation de drogues demeure encore plus fréquente chez les jeunes de la région que chez les autres jeunes du Québec. Toutes proportions gardées, la région compte davantage de jeunes consommateurs de drogues qu'ailleurs au Québec (25 % contre 20 %), particulièrement pour les drogues les plus populaires chez les jeunes, soit le cannabis (24 % contre 18 %) (tableau 3), la cocaïne (4,2 % contre 2,4 %), les amphétamines et méthamphétamines (3,5 % contre 2,5 %) et les hallucinogènes psychédéliques (3,5 % contre 2,7 %) (résultats non présentés). Bien que leur consommation soit moins répandue, les hallucinogènes dissociatifs et les dérivés synthétiques de cathinone sont aussi davantage consommés par les jeunes de la région avec des pourcentages respectifs de 1,7 % et 1,6 % contre 0,9 % dans les deux cas ailleurs au Québec. Précisons que 4,2 % des jeunes gaspésiens et madelinots ont pris des extraits de concentrés de THC au cours des 12 mois précédant l'enquête, une proportion ne se différenciant pas de celle du Québec (3,8 %).

(résultats non présentés). Par ailleurs, comme on peut le lire au tableau 3, non seulement la proportion de jeunes faisant usage de cannabis est plus élevée dans la région qu'ailleurs au Québec, la proportion à en consommer toutes les semaines est aussi supérieure (9,0 % contre 6,2 % au Québec). Enfin, même si peu de jeunes expérimentent les drogues avant 13 ans, il reste que la proportion à le faire est plus élevée en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine que dans le reste du Québec (4,4 % contre 2,8 %) (tableau 3).

Caractéristiques associées à la consommation de drogues

Comme c'est le cas pour la consommation d'alcool, c'est chez les **garçons**, les **élèves de 2^e cycle** et les **francophones** qu'on retrouve les plus fortes proportions de consommateurs de drogues, notamment de cannabis. Les garçons et les élèves de 2^e cycle sont aussi plus enclins que les filles et les élèves de 1^{er} cycle à faire usage de cannabis toutes les semaines et à prendre de la drogue pour la première fois avant d'avoir 13 ans (tableau 3 et [annexe 1](#)). Pour ce qui est des territoires locaux, aucun ne se démarque franchement des autres eu égard à la consommation de drogues.

Tableau 3

La consommation de drogues	Gaspésie-Îles 2010- 2011	2016- 2017	Évolution	Québec 2016- 2017	GM vs Québec	Gaspésie-Îles Gars	2016- 2017	2017	Gaspésie-Îles Gars	Filles	Baie-des- Chaleurs	Rocher- Percé	Côte-de- Gaspé	Haute- Gaspésie	Îles
CONSOMMATEUR DE DROGUES															
Ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois	29,3	25,2	Gain	20,0	Défaveur	28,1+	22,2		25,2	21,8	25,9	25,8	27,8		
CONSOMMATEUR DE CANNABIS															
Ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	28,8	24,0	Gain	18,2	Défaveur	26,4+	21,5		23,9	21,0	25,0	23,1	27,0		
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION DE CANNABIS															
Ont consommé du cannabis toutes les semaines au cours des 12 derniers mois	12,4	9,0	Gain	6,2	Défaveur	9,1+	7,1		9,0	8,7*	9,8	5,9*	11,6		
ÂGE D'INITIATION															
Ont pris de la drogue avant d'avoir 13 ans	7,4	4,4	Gain	2,8	Défaveur	6,5+	2,2*		4,9*	2,6**	3,9*	6,3*	4,2*		

+ Valeur des garçons significativement supérieure à celle des filles au seuil de 0,05.

*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

**CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2010-2011 et 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

La consommation problématique d'alcool ou de drogues

En 2016-2017

4,1 % des élèves du secondaire en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine présentent, sous toutes réserves, un **problème de consommation en émergence** et pour qui une intervention de première ligne est souhaitable (feu jaune à l'indice DEP-ADO).

4,1 % présentent, sous toutes réserves, un **problème important de consommation** et pour qui une intervention spécialisée est suggérée (feu rouge à l'indice DEP-ADO).

13 % des jeunes consommateurs d'alcool ou de drogues ont eu au moins une **conséquence négative** associée à leur consommation au cours des 12 derniers mois.

Évolution depuis 2010-2011 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Sans surprise compte tenu des gains que nous avons faits eu égard à la consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes, la proportion de jeunes en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine à avoir un feu jaune ou un feu rouge a diminué depuis 2010-2011, comme c'est aussi le cas au Québec. Dans la région, la proportion à présenter, sous toutes réserves, un problème de consommation en émergence (feu jaune) a chuté de 6,7 % à 4,1 % entre 2010-2011 et 2016-2017 et la proportion à avoir un problème important de consommation (feu rouge) de 5,2 % à 4,1 % (tableau 4). Si les filles ont vu la valeur de ces deux indicateurs diminuer entre les deux enquêtes, les garçons ont seulement connu une baisse à l'indicateur du feu jaune; les résultats ne montrant aucune différence significative au feu rouge.

Comparativement au Québec en 2016-2017

Encore en 2016-2017, les proportions de jeunes ayant un feu jaune ou un feu rouge à l'indice DEP-ADO sont supérieures dans la région qu'ailleurs au Québec (tableau 4). Toutefois, la proportion des jeunes consommateurs¹ déclarant avoir eu au moins une conséquence négative associée à leur consommation est plus faible dans la région que dans le reste du Québec (13 % contre 16 %). Et peu importe les conséquences, leur prévalence est toujours moindre chez les jeunes consommateurs de la région que chez ceux du Québec ou sinon du même ordre de grandeur :

- Effets négatifs sur les relations avec les amis (5,5 % contre 6,4 % des jeunes consommateurs au Québec)
- Difficultés psychologiques (5,3 % contre 7,0 %)
- Gestes délinquants commis (4,7 % contre 6,4 %)
- Effets négatifs sur les relations avec la famille (4,1 % contre 5,3 %)
- Difficultés à l'école (3,1 % contre 5,3 %) (résultats non présentés)

¹ En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, on compte **68 % de jeunes consommateurs d'alcool ou de drogues** au cours des 12 mois précédant l'EQSJS 2016-2017 (54 % au Québec). Plus précisément, 43 % des jeunes ont bu seulement de l'alcool (34 % au Québec), 1,0 %* n'ont pris que de la drogue (1,8 % au Québec) et 24 % ont pris à la fois de l'alcool et de la drogue (nommés aussi des polyconsommateurs) (18 % au Québec). À l'inverse, 32 % des jeunes gaspésiens et madelinots sont abstinents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas consommé ces produits au cours des 12 mois précédant l'EQSJS (46 % au Québec).

Caractéristiques associées à la consommation problématique d'alcool ou de drogues

En raison notamment de leur plus forte propension à consommer fréquemment et de manière excessive que les filles, les **garçons** sont proportionnellement plus nombreux que celles-ci à présenter un problème important de consommation (5,8 % contre 2,4 %) et cette même tendance, bien que non significative, est observée pour les problèmes de consommation en émergence (4,8 % contre 3,4 %) (tableau 4). Malgré cela, la proportion des consommateurs masculins à avoir eu une conséquence négative associée à leur consommation au cours des 12 mois précédant l'enquête n'est pas plus élevée que celle des consommatrices (14 % contre 12 %). Les **élèves du 2^e cycle** sont aussi clairement plus enclins que ceux du 1^{er} cycle à présenter un problème important de consommation d'alcool ou de drogues (5,6 % contre 2,0 %) et même un problème émergent pour lequel une intervention de première ligne est souhaitable (6,4 % contre 0,9 %) ([annexe 1](#)). Et pour ce qui les concerne, ils rapportent aussi en plus forte proportion avoir eu une conséquence négative à cause de leur consommation que les élèves du 1^{er} cycle (14 % contre 9,5 %). La consommation problématique d'alcool ou de drogues ne varie toutefois pas de manière significative selon la langue, ni selon le territoire local de résidence des élèves (tableau 4 et [annexe 1](#)).

Tableau 4

La consommation problématique d'alcool ou de drogues	Gaspésie-Îles		Évolution	Québec		Gaspésie-Îles		Baie-des-Chaleurs	Rocher-Percé	Côte-de-Gaspé	Haute-Gaspésie	Îles
	2010-2011	2016-2017		2016-2017	G1M vs G1M Québec	Gars	Filles					
INDICE DEP-ADO												
Ont un feu jaune ou rouge	11,9	8,2	Gain	6,2	Défaveur	10,6+	5,7	8,9	6,6*	7,2	7,6*	10,5
Ont un feu jaune (problèmes de consommation en émergence et pour qui une intervention est souhaitable)	6,7	4,1	Gain	3,3	Défaveur	4,8	3,4	4,7	2,9**	3,6*	3,7**	5,0*
Ont un feu rouge (problèmes évidents de consommation et pour qui une intervention est nécessaire)	5,2	4,1	Gain	2,9	Défaveur	5,8+	2,4*	4,1*	3,7*	3,6*	3,9**	5,5*
CONSÉQUENCE NÉGATIVE ASSOCIÉE À LA CONSOMMATION												
Consommateurs ayant eu au moins une conséquence négative au cours des 12 derniers mois	ND	12,9	NA	15,6	En faveur	14,4	11,5	14,2	10,1*	10,3	16,1	14,2

+ Valeur des garçons significativement supérieure à celle des filles au seuil de 0,05.

NA : On ne peut évaluer l'évolution, NON APPLICABLE.

ND : Donnée NON DISPONIBLE.

*Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

**CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Conclusion

L’objectif de ce document était de faire état des principaux résultats sur la consommation d’alcool et de drogues chez les jeunes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine issus de l’EQSJS 2016-2017.

Au chapitre de l’évolution des différents indicateurs, il faut d’abord préciser que les données ne reposent que sur deux périodes, soit 2010-2011 et 2016-2017. Cette perspective historique limitée invite donc à la prudence dans l’interprétation des données. Cela dit, les résultats révèlent des gains importants au chapitre de la consommation d’alcool et de drogues depuis 2010-2011 chez les jeunes de la région (tableau 5). En effet, les six dernières années ont été marquées par une baisse des proportions de buveurs d’alcool et de consommateurs de drogues, notamment de cannabis, et par une diminution de la fréquence de consommation de ces produits. Également, la proportion de jeunes ayant consommé ces produits pour la première fois avant d’avoir 13 ans est en chute. Pour ce qui est de l’alcool, les jeunes sont aussi un peu moins enclins à s’enivrer, la proportion ayant pris 5 consommations ou plus en une même occasion ayant diminué de 53 % à 50 % entre les deux enquêtes. Enfin, ces résultats se sont accompagnés d’une diminution de la proportion de jeunes présentant des problèmes, importants ou en émergence, en lien avec leur consommation (tableau 5).

En dépit de ces résultats des plus encourageants, les jeunes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine continuent, en 2016-2017, d’enregistrer des résultats moins favorables que ceux des jeunes québécois pour tous les indicateurs de la consommation d’alcool et de drogues mesurés dans l’EQSJS (tableau 6). Une exception seulement pour ce qui est de la proportion de jeunes ayant eu une conséquence négative associée à leur consommation, laquelle est inférieure chez les consommateurs de la région. Mais il reste que, toutes proportions gardées, davantage de jeunes dans la région qu’au Québec consomment de l’alcool et des drogues, qu’ils en consomment plus fréquemment et plus précocement que les jeunes québécois, et que la consommation excessive d’alcool est aussi plus souvent rencontrée chez les jeunes gaspésiens et madelinots que chez les jeunes québécois. Bien que ce dernier indicateur ne soit pas une mesure objective de l’intoxication, puisqu’il ne tient pas compte de variables physiques et qu’on ne connaît pas le temps

écoulé entre les consommations (Traoré, 2018), on doit très certainement se questionner sur le fort pourcentage de jeunes dans la région ayant une consommation excessive d’alcool, lequel s’élève à 50 % de tous les jeunes et à 8,6 % si on retient ceux ayant eu ce comportement au moins 11 fois sur une année.

Tableau 5

Indicateurs pour lesquels la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a fait des gains ou connu des pertes entre 2010-2011 et 2016-2017

Gains	Pertes
Consommation d’alcool et de drogues, notamment de cannabis	
Fréquence de consommation d’alcool et de drogues	
Consommation excessive d’alcool	
Âge d’initiation à l’alcool et aux drogues	
Indice DEP-ADO	

Ces résultats suggèrent l’importance de poursuivre nos efforts pour réduire la consommation d’alcool et de drogues chez les jeunes, notamment la consommation régulière et abusive, tout en continuant à soutenir les jeunes qui vivent des difficultés en lien avec leur consommation. À ce sujet, Tessier et April (2016), dans leur revue des interventions efficaces pour prévenir la consommation excessive d’alcool chez les adolescents et les jeunes adultes, arrivent notamment aux constats suivants :

« Les programmes de prévention auraient tous avantage à être déployés avant que les jeunes n’aient adopté une pratique de consommation d’alcool dite «régulière», ce qui permettrait d’intervenir au début de la trajectoire de consommation qui peut mener à la consommation excessive. [...] Les programmes de

prévention menés auprès de la famille sont efficaces pour retarder l'âge d'initiation, diminuer la fréquence de consommation et prévenir la consommation problématique d'alcool. » (Tessier et April, 2017, page 1)

À cet égard, les filles ne doivent certes pas être oubliées, mais une attention particulière doit être portée aux garçons en raison de leur plus forte propension à consommer précocement, fréquemment et de manière excessive.

Tableau 6

Indicateurs pour lesquels la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine obtient des résultats défavorables par rapport au reste du Québec, 2016-2017

En faveur de la région	En défaveur
	Consommation d'alcool et de drogues, notamment de cannabis
	Fréquence de consommation d'alcool et de drogues
	Consommation excessive d'alcool
	Âge d'initiation à l'alcool et aux drogues
	Indice DEP-ADO

Note : Pour les conséquences de la consommation, les analyses n'ont pas permis de faire ressortir de différence significative entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le reste du Québec.

Pour terminer, nous espérons que ce bref portrait de la consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine saura enrichir les connaissances et les réflexions des intervenants qui se préoccupent de la santé et du bien-être des jeunes et contribuer à ce que nos jeunes soient toujours plus heureux et en santé.

Annexe 1

La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine selon le cycle et la langue d'enseignement, 2016-2017

La consommation d'alcool	1 ^{er} cycle	2 ^e cycle	Français	Anglais
BUVEUR D'ALCOOL¹				
Ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois	44,2–	84,2	68,8+	45,4
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION				
Ont consommé de l'alcool toutes les semaines au cours des 12 derniers mois	6,5–	22,6	16,4+	8,1
CONSOMMATION EXCESSIVE				
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins une fois</u> au cours des 12 derniers mois	25,3–	68,2	51,3+	32,6
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins 11 fois</u> au cours des 12 derniers mois	1,7**–	13,6	9,0	2,8**
ÂGE D'INITIATION¹				
Ont pris de l'alcool avant d'avoir 13 ans	19,6	17,8	18,4	19,4*
La consommation de drogues	1 ^{er} cycle	2 ^e cycle	Français	Anglais
CONSOMMATEUR DE DROGUES				
Ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois	9,4–	36,6	25,6+	18,5*
CONSOMMATEUR DE CANNABIS				
Ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	7,4–	36,0	24,4+	16,8*
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION DE CANNABIS				
Ont consommé du cannabis toutes les semaines au cours des 12 derniers mois	2,8*–	13,6	9,1	9,4*
ÂGE D'INITIATION				
Ont pris de la drogue avant d'avoir 13 ans	3,0*–	5,2	X	X

¹ La question précise à l'élève de ne pas tenir compte des fois où il a seulement goûté.

+ ou – Valeur des élèves du 1^{er} cycle (1^e et 2^e secondaire) significativement supérieure ou inférieure à celle des élèves du 2^e cycle (3^e, 4^e et 5^e secondaire) OU valeur des francophones significativement supérieure ou inférieure à celle des anglophones au seuil de 0,05.

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

**CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

X Donnée reposant sur moins de 5 élèves chez les anglophones. La donnée des anglophones doit rester confidentielle et par conséquent celle des francophones également.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

(suite) La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine selon le cycle et la langue d'enseignement, 2016-2017

La consommation problématique d'alcool ou de drogues	1^{er} cycle	2^e cycle	Français	Anglais
INDICE DEP-ADO				
Ont un feu jaune ou rouge	2,9*–	12,0	8,5	4,2*
<i>Ont un feu jaune (problèmes de consommation en émergence et pour qui une intervention est souhaitable)</i>	0,9**–	6,4	X	X
<i>Ont un feu rouge (problèmes évidents de consommation et pour qui une intervention est nécessaire)</i>	2,0*–	5,6	X	X
CONSÉQUENCE NÉGATIVE ASSOCIÉE À LA CONSOMMATION				
Consommateurs ayant eu au moins une conséquence négative au cours des 12 derniers mois	9,5–	14,3	12,9	14,0**

– Valeur des élèves du 1^{er} cycle (1^e et 2^e secondaire) significativement inférieure à celle des élèves du 2^e cycle (3^e, 4^e et 5^e secondaire).

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

**CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

X Donnée reposant sur moins de 5 élèves chez les anglophones. La donnée des anglophones doit rester confidentielle et par conséquent celle des francophones également.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Annexe 2

La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes du secondaire dans les territoires locaux, 2010-2011 et 2016-2017

La Baie-des-Chaleurs

La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes de la Baie-des-Chaleurs, 2010-2011 et 2016-2017

La consommation d'alcool	2010-2011	2016-2017	Évolution
BUVEUR D'ALCOOL¹			
Ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois	68,1 ²	63,9	NS
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION			
Ont consommé de l'alcool toutes les semaines au cours des 12 derniers mois	20,3	13,7	Gain
CONSOMMATION EXCESSIVE			
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins une fois</u> au cours des 12 derniers mois	54,1	46,6	Gain
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins 11 fois</u> au cours des 12 derniers mois	8,6	8,1	NS
ÂGE D'INITIATION¹			
Ont pris de l'alcool avant d'avoir 13 ans	28,4	16,2	Gain
La consommation de drogues	2010-2011	2016-2017	Évolution
CONSOMMATEUR DE DROGUES			
Ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois	32,6	25,2	Gain
CONSOMMATEUR DE CANNABIS			
Ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	32,2	23,9	Gain
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION DE CANNABIS			
Ont consommé du cannabis toutes les semaines au cours des 12 derniers mois	14,3	9,0	Gain
ÂGE D'INITIATION			
Ont pris de la drogue avant d'avoir 13 ans	9,5	4,9*	Gain

¹ La question précise à l'élève de ne pas tenir compte des fois où il a seulement goûté.

² Cette valeur en 2010-2011 n'est pas la donnée officielle de l'édition de l'EQSJS 2010-2011, mais plutôt la donnée standardisée ou comparable. Cet indicateur étant affecté par la période de collecte, l'écart significatif entre la donnée officielle de 2010-2011 et celle de 2016-2017 a été confirmé avec les données comparables. La présentation des données comparables permet d'apprécier l'écart entre les deux enquêtes.

NS : Écart entre la valeur de 2010-2011 et celle de 2016-2017 NON SIGNIFICATIF au seuil de 0,05.

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

(suite) La Baie-des-Chaleurs

La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes de la Baie-des-Chaleurs, 2010-2011 et 2016-2017

La consommation problématique d'alcool ou de drogues	2010-2011	2016-2017	Évolution
INDICE DEP-ADO			
Ont un feu jaune ou rouge	12,9	8,9	Gain
<i>Ont un feu jaune (problèmes de consommation en émergence et pour qui une intervention est souhaitable)</i>	7,9	4,7	Gain
<i>Ont un feu rouge (problèmes évidents de consommation et pour qui une intervention est nécessaire)</i>	5,0	4,1*	NS
CONSÉQUENCE NÉGATIVE ASSOCIÉE À LA CONSOMMATION			
Consommateurs ayant eu au moins une conséquence négative au cours des 12 derniers mois	ND	14,2	NA

NA : On ne peut évaluer l'évolution, NON APPLICABLE.

ND : Donnée NON DISPONIBLE.

NS : Écart entre la valeur de 2010-2011 et celle de 2016-2017 NON SIGNIFICATIF au seuil de 0,05.

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2010-2011 et 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes de Rocher-Percé, 2010-2011 et 2016-2017

La consommation d'alcool		2010-2011	2016-2017	Évolution
BUVEUR D'ALCOOL¹		Cet indicateur est affecté par la période de collecte de données. Pour le Rocher-Percé, l'écart entre la répartition de l'échantillon selon la période de collecte est trop grand entre les deux éditions de l'enquête, si bien que l'ISQ ne recommande pas de comparer la donnée de 2016-2017 à celle de 2010-2011 pour ce territoire.		
Ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION				
Ont consommé de l'alcool toutes les semaines au cours des 12 derniers mois		14,6	13,2	NS
CONSOMMATION EXCESSIVE				
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins une fois</u> au cours des 12 derniers mois		44,1	55,8	Perte
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins 11 fois</u> au cours des 12 derniers mois		6,2*	6,1*	NS
ÂGE D'INITIATION¹				
Ont pris de l'alcool avant d'avoir 13 ans		21,3	15,9	Gain
La consommation de drogues		2010-2011	2016-2017	Évolution
CONSOMMATEUR DE DROGUES				
Ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois		23,1	21,8	NS
CONSOMMATEUR DE CANNABIS				
Ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois		22,4	21,0	NS
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION DE CANNABIS				
Ont consommé du cannabis toutes les semaines au cours des 12 derniers mois		9,1	8,7	NS
ÂGE D'INITIATION				
Ont pris de la drogue avant d'avoir 13 ans		6,3*	2,6**	Gain

¹ La question précise à l'élève de ne pas tenir compte des fois où il a seulement goûté.

NS : Écart entre la valeur de 2010-2011 et celle de 2016-2017 NON SIGNIFICATIF au seuil de 0,05.

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

**CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

(suite) Le Rocher-Percé

La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes de Rocher-Percé, 2010-2011 et 2016-2017

La consommation problématique d'alcool ou de drogues	2010-2011	2016-2017	Évolution
INDICE DEP-ADO			
Ont un feu jaune ou rouge	8,5	6,6*	NS
<i>Ont un feu jaune (problèmes de consommation en émergence et pour qui une intervention est souhaitable)</i>	5,4*	2,9**	NS
<i>Ont un feu rouge (problèmes évidents de consommation et pour qui une intervention est nécessaire)</i>	3,1*	3,7*	NS
CONSÉQUENCE NÉGATIVE ASSOCIÉE À LA CONSOMMATION			
Consommateurs ayant eu au moins une conséquence négative au cours des 12 derniers mois	ND	10,1*	NA

NA : On ne peut évaluer l'évolution, NON APPLICABLE.

ND : Donnée NON DISPONIBLE.

NS : Écart entre la valeur de 2010-2011 et celle de 2016-2017 NON SIGNIFICATIF au seuil de 0,05.

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

**CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2010-2011 et 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

La Côte-de-Gaspé

La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes de La Côte-de-Gaspé, 2010-2011 et 2016-2017

La consommation d'alcool		2010-2011	2016-2017	Évolution
BUVEUR D'ALCOOL¹		Cet indicateur est affecté par la période de collecte de données. Pour La Côte-de-Gaspé, l'écart entre la répartition de l'échantillon selon la période de collecte est trop grand entre les deux éditions de l'enquête, si bien que l'ISQ ne recommande pas de comparer la donnée de 2016-2017 à celle de 2010-2011 pour ce territoire.		
Ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois				
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION				
Ont consommé de l'alcool toutes les semaines au cours des 12 derniers mois		19,2	17,4	NS
CONSOMMATION EXCESSIVE				
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins une fois</u> au cours des 12 derniers mois		50,6	51,3	NS
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins 11 fois</u> au cours des 12 derniers mois		7,7	7,6	NS
ÂGE D'INITIATION¹				
Ont pris de l'alcool avant d'avoir 13 ans		25,3	22,1	NS
La consommation de drogues		2010-2011	2016-2017	Évolution
CONSOMMATEUR DE DROGUES				
Ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois		26,1	25,9	NS
CONSOMMATEUR DE CANNABIS				
Ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois		25,1	25,0	NS
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION DE CANNABIS				
Ont consommé du cannabis toutes les semaines au cours des 12 derniers mois		10,2	9,8	NS
ÂGE D'INITIATION				
Ont pris de la drogue avant d'avoir 13 ans		5,8*	3,9*	NS

¹ La question précise à l'élève de ne pas tenir compte des fois où il a seulement goûté.

NS : Écart entre la valeur de 2010-2011 et celle de 2016-2017 NON SIGNIFICATIF au seuil de 0,05.

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

(suite) La Côte-de-Gaspé

La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes de La Côte-de-Gaspé, 2010-2011 et 2016-2017

La consommation problématique d'alcool ou de drogues	2010-2011	2016-2017	Évolution
INDICE DEP-ADO			
Ont un feu jaune ou rouge	11,0	7,2	Gain
<i>Ont un feu jaune (problèmes de consommation en émergence et pour qui une intervention est souhaitable)</i>	5,3*	3,6*	NS
<i>Ont un feu rouge (problèmes évidents de consommation et pour qui une intervention est nécessaire)</i>	5,7	3,6*	NS
CONSÉQUENCE NÉGATIVE ASSOCIÉE À LA CONSOMMATION			
Consommateurs ayant eu au moins une conséquence négative au cours des 12 derniers mois	ND	10,3	NA

NA : On ne peut évaluer l'évolution, NON APPLICABLE.

ND : Donnée NON DISPONIBLE.

NS : Écart entre la valeur de 2010-2011 et celle de 2016-2017 NON SIGNIFICATIF au seuil de 0,05.

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2010-2011 et 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes de La Haute-Gaspésie, 2010-2011 et 2016-2017

La consommation d'alcool	2010-2011	2016-2017	Évolution
BUVEUR D'ALCOOL¹			
Ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois	72,1 ²	73,1	NS
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION			
Ont consommé de l'alcool toutes les semaines au cours des 12 derniers mois	18,1	18,6	NS
CONSOMMATION EXCESSIVE			
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins une fois</u> au cours des 12 derniers mois	53,1	53,3	NS
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins 11 fois</u> au cours des 12 derniers mois	7,9*	11,0*	NS
ÂGE D'INITIATION¹			
Ont pris de l'alcool avant d'avoir 13 ans	28,7	21,1	Gain
La consommation de drogues	2010-2011	2016-2017	Évolution
CONSOMMATEUR DE DROGUES			
Ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois	29,0	25,8	NS
CONSOMMATEUR DE CANNABIS			
Ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	28,8	23,1	NS
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION DE CANNABIS			
Ont consommé du cannabis toutes les semaines au cours des 12 derniers mois	10,9*	5,9*	Gain
ÂGE D'INITIATION			
Ont pris de la drogue avant d'avoir 13 ans	8,8*	6,3*	NS

¹ La question précise à l'élève de ne pas tenir compte des fois où il a seulement goûté.

² Cette valeur en 2010-2011 n'est pas la donnée officielle de l'édition de l'EQSJS 2010-2011, mais plutôt la donnée standardisée ou comparable. Cet indicateur étant affecté par la période de collecte, l'écart significatif entre la donnée officielle de 2010-2011 et celle de 2016-2017 a été confirmé avec les données comparables. La présentation des données comparables permet d'apprécier l'écart entre les deux enquêtes.

NS : Écart entre la valeur de 2010-2011 et celle de 2016-2017 NON SIGNIFICATIF au seuil de 0,05.

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

(suite) La Haute-Gaspésie

La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes de La Haute-Gaspésie, 2010-2011 et 2016-2017

La consommation problématique d'alcool ou de drogues	2010-2011	2016-2017	Évolution
INDICE DEP-ADO			
Ont un feu jaune ou rouge	10,7	7,6*	NS
<i>Ont un feu jaune (problèmes de consommation en émergence et pour qui une intervention est souhaitable)</i>	5,3*	3,7**	NS
<i>Ont un feu rouge (problèmes évidents de consommation et pour qui une intervention est nécessaire)</i>	5,4*	3,9**	NS
CONSÉQUENCE NÉGATIVE ASSOCIÉE À LA CONSOMMATION			
Consommateurs ayant eu au moins une conséquence négative au cours des 12 derniers mois	ND	16,1	NA

NA : On ne peut évaluer l'évolution, NON APPLICABLE.

ND : Donnée NON DISPONIBLE.

NS : Écart entre la valeur de 2010-2011 et celle de 2016-2017 NON SIGNIFICATIF au seuil de 0,05.

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

**CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2010-2011 et 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Les Îles-de-la-Madeleine

La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes des Îles-de-la-Madeleine, 2010-2011 et 2016-2017

La consommation d'alcool	2010-2011	2016-2017	Évolution
BUVEUR D'ALCOOL¹			
Ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois	74,1 ²	64,9	Gain
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION			
Ont consommé de l'alcool toutes les semaines au cours des 12 derniers mois	26,3	20,1	Gain
CONSOMMATION EXCESSIVE			
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins une fois</u> au cours des 12 derniers mois	60,3	48,6	Gain
Ont pris 5 consommations ou plus en une même occasion <u>au moins 11 fois</u> au cours des 12 derniers mois	18,2	12,2	Gain
ÂGE D'INITIATION¹			
Ont pris de l'alcool avant d'avoir 13 ans	27,4	19,3	Gain
La consommation de drogues	2010-2011	2016-2017	Évolution
CONSOMMATEUR DE DROGUES			
Ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois	32,6	27,8	NS
CONSOMMATEUR DE CANNABIS			
Ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois	32,4	27,0	NS
FRÉQUENCE ÉLEVÉE DE CONSOMMATION DE CANNABIS			
Ont consommé du cannabis toutes les semaines au cours des 12 derniers mois	15,8	11,6	NS
ÂGE D'INITIATION			
Ont pris de la drogue avant d'avoir 13 ans	4,3*	4,2*	NS

¹ La question précise à l'élève de ne pas tenir compte des fois où il a seulement goûté.

² Cette valeur en 2010-2011 n'est pas la donnée officielle de l'édition de l'EQSJS 2010-2011, mais plutôt la donnée standardisée ou comparable. Cet indicateur étant affecté par la période de collecte, l'écart significatif entre la donnée officielle de 2010-2011 et celle de 2016-2017 a été confirmé avec les données comparables. La présentation des données comparables permet d'apprécier l'écart entre les deux enquêtes.

NS : Écart entre la valeur de 2010-2011 et celle de 2016-2017 NON SIGNIFICATIF au seuil de 0,05.

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

(suite) Les Îles-de-la-Madeleine

La consommation d'alcool et de drogues chez les jeunes des Îles-de-la-Madeleine, 2010-2011 et 2016-2017

La consommation problématique d'alcool ou de drogues	2010-2011	2016-2017	Évolution
INDICE DEP-ADO			
Ont un feu jaune ou rouge	15,9	10,5	Gain
<i>Ont un feu jaune (problèmes de consommation en émergence et pour qui une intervention est souhaitable)</i>	8,4	5,0*	Gain
<i>Ont un feu rouge (problèmes évidents de consommation et pour qui une intervention est nécessaire)</i>	7,4*	5,5*	NS
CONSÉQUENCE NÉGATIVE ASSOCIÉE À LA CONSOMMATION			
Consommateurs ayant eu au moins une conséquence négative au cours des 12 derniers mois	ND	14,2	NA

NA : On ne peut évaluer l'évolution, NON APPLICABLE.

ND : Donnée NON DISPONIBLE.

NS : Écart entre la valeur de 2010-2011 et celle de 2016-2017 NON SIGNIFICATIF au seuil de 0,05.

*CV entre 15 et 25 %, donnée à interpréter avec prudence.

Source : Institut de la statistique du Québec, EQSJS 2010-2011 et 2016-2017, données extraites du portail de l'Infocentre de santé publique par la DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Références

TESSIER, Sébastien et Nicole APRIL. *La consommation excessive d'alcool chez les jeunes Québécois : interventions efficaces de prévention*, Institut national de santé publique du Québec, gouvernement du Québec, 53 pages. (2017)

TRAORÉ, Issouf. « Consommation d'alcool et de drogues », dans *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2016-2017*. Résultats de la deuxième édition. La santé physique et les habitudes de vie des jeunes, Québec, Institut de la statistique du Québec, Tome 3, p. 219-261. (2018)



*Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Gaspésie*

Québec

