

NOUVELLES ESPÈCES DANS LANAUDIÈRE
depuis la fondation de la SOL, mars 1983

Premières mentions



SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE
DE LANAUDIÈRE

Réalisation	Luc Foisy et Marcel Harnois
Montage	Luc Foisy
Photographies des espèces	Michèle Amyot, Pierre Bannon, Jean-Guy Boisvert, Guy Brunelle (aquarelles), Samuel Denault, Bertrand Dumont, Claude Gagnon, René Gagnon, Yves Gauthier, Marcel Harnois, Véronique Huez, Daniel Jauvin, Claude Mailloux, Pierre Martin, Daniel Murphy, Benoit Piquette, Richard Prévost et Alain Sylvain.
Collaboration	Bernard Dugas

Citation du livre

Foisy, L. et M. Harnois. (2020). *NOUVELLES ESPÈCES DANS LANAUDIÈRE depuis la fondation de la SOL, mars 1983. PREMIÈRES MENTIONS*. Société d'ornithologie de Lanaudière, 26 pages.

Photo de la page couverture

Fou de Bassan, © Michèle Amyot

ISBN 978-2-9805066-6-6

© 2020 Société d'ornithologie de Lanaudière, C.P. 339, Joliette (Québec) J6E 3Z6

INTRODUCTION

Par sa situation géographique au nord de la portion fluviale du Saint-Laurent, lequel longe le territoire sur une distance de 60 km, la région de Lanaudière offre des habitats recherchés par nombre d'espèces qualifiées de visiteurs exceptionnels : Pélican d'Amérique, Avocette d'Amérique, Oie cendrée, etc.

La fondation de la SOL, le 31 mars 1983, a marqué le début d'une envolée remarquable au niveau des observations d'oiseaux dans la région de Lanaudière. À mesure que le nombre des observateurs progressait, on notait, au cours des premières années, une augmentation du nombre des mentions des espèces et, parmi ces dernières, quelques unes représentaient de nouvelles espèces dans Lanaudière.


Période	Nombre d'observateurs	Nombre d'espèces observées
Du 30 mars 1983 au 21 octobre 1983	52	185
Du 22 octobre 1983 à mars 1985	63	197
De mars 1985 à mars 1989 (moyenne annuelle)	108	207

Parfois, la première mention d'une espèce dans Lanaudière constitue un premier indice d'une éventuelle présence permanente dans la région. La décision que prend une espèce de s'établir peut être due à des facteurs tels les changements climatiques, l'agrandissement de l'aire de répartition de l'espèce vers le nord, les modifications d'habitats, ... L'Urubu à tête rouge, la Grue du Canada et le Dindon sauvage en sont des exemples typiques.

Toutefois, une première mention est souvent le résultat de visites inattendues d'espèces dont la présence est imprévisible en toutes saisons. Du 1^{er} avril 1983 au 31 octobre 2021, tous ces déplacements de l'avifaune ont permis de noter la présence de 58 nouvelles espèces dans la région. La très grande majorité est constituée essentiellement de *visiteurs* (53), parfois exotiques, mais quelques unes (5) ont adopté notre région et y sont aujourd'hui régulièrement observées.


On trouvera dans les pages qui suivent la photo de chaque nouvelle espèce, le nombre d'individus présents, la date, le lieu et la zone géographique de Lanaudière où chacun de ces oiseaux a été observé.

QUELQUES MUNICIPALITÉS DE LANAUDIÈRE ET ZONES GÉOGRAPHIQUES




NOUVELLES ESPÈCES DANS LANAUDIÈRE
depuis la fondation de la SOL, mars 1983

PREMIÈRES MENTIONS




Bernache nonette. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 9 décembre 1983 à Repentigny. Entre le 9 décembre 1983 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 2 mentions.




Tourterelle rieuse. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement d'individus d'*origine indéterminée* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 27 avril 1984 à Berthier. Entre le 27 avril 1984 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 15 mentions.


- En 1984 : (AOS) *Streptopelia risoria* (Ringed Turtle-Dove)
- Depuis 2006 : (AOS) *Streptopelia roseogrisea* (African Colared-Dove)




Pélican d'Amérique. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 1^{er} septembre 1985 à Repentigny. Entre le 1^{er} septembre 1985 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 17 mentions.




Tyrannulet de l'Ouest. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudivière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 16 juin 1986 à la Tourbière de Saint-Thomas. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudivière.




Colin de Virginie. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudivière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 15 juillet 1986 à Repentigny. Entre le 15 juillet 1986 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 6 mentions.




Chardonneret élégant. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement d'individus d'*origine indéterminée* dont la présence dans Lanaudivière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 21 décembre 1986 à Repentigny. Entre le 21 décembre 1986 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 10 mentions.



Cygne tuberculé. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière est imprévisible en toutes saisons. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 4 avril 1987 à Saint-Barthélemy. Entre le 4 avril 1987 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 62 mentions.




Plongeon catmarin. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (2 individus) le 24 mai 1987 à l'île Dupas. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.




Chouette épervière. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement d'*hivernants* dont la présence est prévisible trois saisons (automne, hiver et printemps) dans Lanaudière et imprévisible à l'été. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 29 décembre 1987 à Saint-Norbert. Entre le 29 décembre 1987 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 232 mentions.


NOTE : une Chouette épervière nourrissant un jeune a été photographiée à Sainte-Béatrix à la fin juillet 1992 (QuébecOiseaux 4(3):29)




Labbe à longue queue. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 1^{er} juin 1988 au lac Villiers. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.




Troglodyte de Caroline. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement d'*hivernants* dont la présence est prévisible trois saisons (automne, hiver et printemps) dans Lanaudière et imprévisible à l'été. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 1^{er} juillet 1989 à Mascouche. Entre le 1^{er} juillet 1989 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 82 mentions. Un couple a passé l'hiver 2005-2006 aux mangeoires de Gérard Santiago à Repentigny. Il a niché dans une haie de cèdre et un Troglodyte de Caroline juvénile a pu être photographié à compter du 24 mai 2006.




Moucherolle à ventre rouge. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 9 septembre 1990 à Saint-Gabriel-de-Brandon. Entre le 9 septembre 1990 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 3 mentions.



Grand Cormoran. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 14 septembre 1990 à Berthierville. Entre le 14 septembre 1990 et le 31 mars 2018, l’espèce a fait l’objet de 3 mentions.



Bécassin à long bec. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (3 individus) le 29 septembre 1991 à l’île Dupas. Entre le 29 septembre 1991 et le 31 mars 2018, l’espèce a fait l’objet de 28 mentions.




Tyran à longue queue. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 25 avril 1992 à Mascouche. Entre le 25 avril 1992 et le 31 mars 2018, l’espèce a fait l’objet de 6 mentions.



© Claude Mailloux


© Claude Mailloux 2009



Perdrix choukar. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement d'individus d'*origine indéterminée* dont la présence dans Lanaudivère reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 17 août 1992 à Saint-Norbert. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudivère.




© Michèle Amyot




Eider à duvet. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudivère reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 24 avril 1993 à la Commune de Berthier. Entre le 24 avril 1993 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 2 mentions.




© Yves Gauthier




Paruline hochequeue. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudivère reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (un mâle chanteur vu et entendu par R. Ouellet, technicien de la faune) le 12 mai 1993 à Saint-Ignace-de-Loyola. M. Ouellet la mentionne à nouveau, le 18 mai, au même endroit. Ce fut la seule visite de cette espèce dans Lanaudivère. La mention est inscrite à la page 1181 de la première édition de *l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional*.




Dendrocygne à ventre noir. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (10 individus) le 6 juin 1993 à la Commune de Berthier. Entre le 6 juin 1993 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 23 mentions.




Quiscal de Brewer, Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 18 octobre 1993 à Mascouche. Entre le 18 octobre 1993 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 3 mentions.




Goéland brun. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement d'*hivernants* dont la présence dans Lanaudière reste prévisible trois saisons (automne, hiver et printemps) et imprévisible à l'été. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 8 mai 1994 à la Commune de Berthier. Entre le 8 mai 1994 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 70 mentions.




Gobemouche gris-bleu. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 13 mai 1994 à Saint-Jacques. Entre le 13 mai 1994 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 6 mentions.




Pélican brun. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individus) le 30 septembre 1994 à Repentigny. Entre le 30 septembre 1994 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 4 mentions.




Pie d'Amérique. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Un individu a été observé aux mangeoires à Lavaltrie de la mi-mars à la mi-avril 1995. Ce fut la seule visite de cette espèce dans Lanaudière.




Fou de Bassan. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 22 octobre 1995 à Lavaltrie. Entre le 22 octobre 1995 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 3 mentions.




Mésange bicolore. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 30 décembre 1995 à Saint-Cuthbert. Entre le 30 décembre 1995 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 23 mentions.





Tétras à queue fine. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 19 mai 1996 à Saint-Donat. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.




Oie cendrée. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement d'individus d'*origine indéterminée* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 28 mai 1996 à l'île Bourdon Repentigny. Entre le 28 mai 1996 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 7 mentions.




Colibri roux. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Un individu mâle a été noté à Mandeville de la mi-septembre au 18 octobre 1996. Ce fut la seule visite de cette espèce dans Lanaudière.




Ibis à face blanche. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 13 mai 1997 à Mandeville. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.




Ouette d'Égypte. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement d'individus d'*origine indéterminée* dont la présence dans Lanau dière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 1^{er} octobre 1997 à Terrebonne. Entre le 1^{er} octobre 1997 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 6 mentions.




Bruant à joues marron. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanau dière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 10 décembre 1997 à Saint-Paul et a fait l'objet d'une seconde mention le même jour. Ce fut la seule visite de cette espèce dans Lanau dière.




Oie de Ross, Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanau dière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (2 individus) le 11 avril 1998 à la Halte migratoire de Saint-Barthélemy. Entre le 11 avril 1998 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 54 mentions




Cygne chanteur. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement d’individus d’*origine indéterminée* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 2 mai 1999 à la Halte migratoire de Saint-Barthélemy. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.




Paruline des prés. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 22 octobre 2000 à Saint-Roch-de-L’Achigan. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.




Grive à collier, Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 9 février 2001 à Saint-Ambroise et l’espèce a fait l’objet de six autres mentions, la même année. Ce furent les seules mentions de cette espèce dans Lanaudière.




Avocette d'Amérique. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de visiteurs dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 4 mai 2001 à la Halte migratoire de Saint-Barthélemy et a fait l'objet d'une seconde mention le lendemain. Ce fut la seule visite de cette espèce dans Lanaudière.




Bécasseau cocorli. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de visiteurs dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 24 mai 2003 au phare de l'Île Dupas et a fait l'objet de trois autres mentions. Ce fut la seule visite de cette espèce dans Lanaudière.




Labbe parasite. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de visiteurs dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 14 septembre 2003 au lac Saint-Pierre. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.




Paruline à capuchon. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 9 juin 2004 à Saint-Damien. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.




Bernache de Hutchins. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence dans Lanaudière est prévisible lors de deux saisons, au printemps et à l'automne et imprévisible à l'été et à l'hiver. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 29 septembre 2004 à Terrebonne. Entre le 29 septembre 2004 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 38 mentions.




Dindon sauvage. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *résidents* ou d'individus d'*origine indéterminée* dont la présence dans Lanaudière est prévisible en toutes saisons. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 23 février 2006 à Lavaltrie. Entre le 23 février 2006 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 77 mentions.



Moucherolle vert. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 23 juin 2006 à Saint-Jacques. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.




Bihoreau violacé. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 26 avril 2008 à Repentigny. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.



Fuligule morillon. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 27 avril 2008 à la Halte migratoire de Saint-Barthélemy. Ce fut la seule visite de cette espèce dans Lanaudière qui a été mentionnée par deux équipes d’observateurs.




© Alain Sylvain



Pluvier siffleur. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 27 mai 2008 à la Halte migratoire de Saint-Barthélemy. Ce fut la seule visite de cette espèce dans Lanaudière qui, le 27 mai, a été mentionnée à deux reprises.




© Marcel Hamois




Tourterelle à ailes blanches. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 13 juin 2008 à Saint-Thomas. Ce fut la seule visite de cette espèce dans Lanaudière qui, entre le 13 et le 15 juin 2008, a été mentionnée à trois reprises.




© René Gagnon




Urubu noir. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 15 juillet 2010 à Sainte-Élisabeth. Entre le 15 juillet 2010 et le 31 mars 2018, l’espèce a fait l’objet de 5 mentions.




Bruant de Nelson. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière est imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 1^{er} août 2009 à l'île aux Cochons. Entre le 1^{er} août 2009 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 2 mentions dans la banque ÉPOQ, mais elle est notée aussi à quelques reprises dans les rapports SOS-POP.




Bruant à face noire. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 8 mai 2010 à Saint-Donat. Entre le 8 mai 2010 et le 31 mars 2018, l'espèce a fait l'objet de 88 mentions, dont 87 pour un individu qui a séjourné dans la région Terrebonne/Lachenaie entre le 20 décembre 2015 et le 17 avril 2016.




Tadorne de belon. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement d'individus d'*origine indéterminée* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 14 mai 2010 à Joliette. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.




Vanneau huppé. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Un individu a fait l’objet de 41 mentions entre le 25 et le 29 mai 2013 sur le rang du Fleuve à Saint-Barthélemy. Ce fut la seule visite de cette espèce dans Lanaudière.




Bruant à couronne dorée. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 2 novembre 2014 à Saint-Donat. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.




Oie à bec court. Cette espèce est aujourd’hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 12 avril 2015 à Berthierville. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.




Naucner à queue fourchue. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 9 septembre 2017 à Saint-Lin-Laurentides. Ce fut la seule mention de cette espèce dans Lanaudière.



Mouette de Franklin. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 3 mai 2020 à Mandeville par plusieurs observateurs dont Véronique Huez qui a pris la photo ci-contre. Ce fut la seule visite de cette espèce dans Lanaudière.



Mouette de Sabine. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible. Elle a été notée pour la première fois (1 individu) le 9 septembre 2020 au *Sentier des Étangs* à Saint-Donat par Pierre André. Ce fut la seule visite de cette espèce dans Lanaudière.



Buse de Swainson. Cette espèce est aujourd'hui constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence dans Lanaudière reste imprévisible.

Dans la seconde édition du livre *À la découverte des oiseaux de Lanaudière*, p. 251, on note: « La seule mention de cette espèce dans Lanaudière date d'avant 1854 » (David, 1996). « Hall mentionne dans son ouvrage un individu en phase de coloration foncée qui aurait apparemment été capturé à Terrebonne, mais ne donne aucun autre détail » (Ouellet, 1974).

Et voilà qu'elle a été notée (1 individu) le 24 septembre 2021 par Jean-Guy Boisvert au *Parc de conservation du Ruisseau de Feu*.

NOUVELLES ESPÈCES DANS LANAUDIÈRE

depuis la fondation de la SOL, mars 1983.

Ce petit recueil recense les 58 nouvelles espèces d'oiseaux qui ont fait leur apparition depuis le jour de la fondation de la SOL, le 31 mars 1983, jusqu'au 31 octobre 2021.

La très grande majorité de ces espèces est constituée essentiellement de *visiteurs* (53), parfois exotiques, mais quelques unes (5) ont adopté notre région et y sont aujourd'hui régulièrement observées.



SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE
DE LANAUDIÈRE

