



**SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE  
DE LANAUDIÈRE**

# Présence des oiseaux dans Lanaudière



## **Recherche et réalisation**

Luc Foisy

## **Conseillers ornithologiques**

Marcel Harnois et Bernard Dugas

## **Citation du livre**

Foisy, L. (2020). *Présence des oiseaux dans Lanaudière*. Société d'ornithologie de Lanaudière, vi + 22 pages.

## **Photo de la page couverture**

*Halte migratoire*, © Marcel Harnois

ISBN 978-2-9805066-5-9

© 2020 Société d'ornithologie de Lanaudière

C.P. 339, Joliette (Québec) J6E 3Z6

Dépôt légal - Bibliothèques et Archives nationales du Québec, 2020

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2020

## Les statuts des oiseaux dans Lanaudière

Lorsqu'on observe un oiseau dans Lanaudière, on peut lui rattacher un « statut » qui est lié à son type de présence dans la région, aux saisons où on peut l'observer. Ces statuts se rapportent aux six situations suivantes :

- *Nicheur résidant* : l'oiseau niche dans Lanaudière et y réside à l'année. On peut donc l'observer tout au long de l'année. Sa présence est prévisible en toutes saisons : au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver.
- *Nicheur migrateur* : l'oiseau niche dans Lanaudière, mais il quitte pour le sud lors de sa migration d'automne et revient lors de sa migration printanière. On peut donc l'observer au printemps après son retour, à l'été et à l'automne avant qu'il reparte. Sa présence est prévisible trois saisons : au printemps, à l'été et à l'automne.
- *Migrateur de passage* : l'oiseau ne niche pas dans Lanaudière. Il fait halte dans notre région lors de son passage entre son aire de nidification et son aire d'hivernage, toutes deux en dehors de Lanaudière. Sa présence est prévisible deux saisons : au printemps et à l'automne.
- *Hivernant* : l'oiseau ne niche pas dans Lanaudière. Il n'y vient que pour l'hiver : il arrive généralement tard à l'automne, passe l'hiver et retourne tôt au printemps. Sa présence est donc prévisible trois saisons : tard à l'automne, à l'hiver et tôt au printemps.

- *Visiteur* : l'oiseau ne vient dans Lanaudière qu'accidentellement, entraîné hors de l'aire qu'il occupe habituellement par suite de divers phénomènes de dispersion : erratisme, déplacements hors des voies habituelles de migration, dispersion pré-nuptiale ou post-nuptiale, incursions soudaines. On peut l'observer en toutes saisons, mais sa présence est totalement imprévisible.
- *Origine indéterminée* (ou *origine captive* ou *visiteur exotique*) : l'oiseau est relâché dans la nature ou échappé accidentellement de captivité, non acclimaté, mais a peut-être niché à une ou plusieurs reprises au Québec. On peut l'observer en toutes saisons, mais sa présence est totalement imprévisible.

### **Constance d'observation saisonnière**

La constance d'observation saisonnière d'une espèce s'exprime mathématiquement en pourcentage de feuillets d'observation qui portent mention de l'espèce concernée par rapport au nombre total de feuillets traités pour la saison.

La constance d'observation printanière est notée COP. La constance d'observation estivale est notée COE. La constance d'observation automnale est notée COA. La constance d'observation hivernale est notée COH.

## Classes saisonnières des espèces

Selon la valeur de la constance d'observation saisonnière, une espèce se situe, pour la saison donnée, dans l'une des sept classes définies au tableau ci-dessous.

---

31 % ≤	Assidue	
15 % ≤	Commune	< 31 %
7 % ≤	Fréquente	< 15 %
3 % ≤	Occasionnelle	< 7 %
1 % ≤	Rare	< 3 %
0 % <	Inusitée	< 1 %
	Exceptionnelle	0 %

---

Les pages suivantes donnent les classes saisonnières de 335 des 336 espèces d'oiseaux notées dans Lanaudière avant le 1<sup>er</sup> janvier 2020 (la Tourte voyageuse, éteinte, est exclue de la liste). Parmi ces espèces, il y en a sept qui sont "exotiques" (oiseaux non acclimatés, relâchés dans la nature ou échappés accidentellement de captivité). Elles sont clairement identifiées.

La classe de chaque espèce est attribuée d'après les données provenant de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes comportant 553 192 mentions et enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018.

Les espèces sont classées selon l'ordre taxonomique avec indication de la famille.

## Espèces nicheuses de Lanaudière

Le statut *espèce nicheuse de Lanaudière* est attribué à toute espèce dont au moins un couple a réussi une nidification à l'intérieur des limites de notre région avant le 1<sup>er</sup> janvier 2020. Les espèces nicheuses de Lanaudière sont identifiées **en bleu** dans les pages qui suivent.

## Type de présence dans Lanaudière

On peut regrouper les espèces selon leur type de présence dans Lanaudière, selon les saisons\* où leur présence est prévisible. Ainsi, on a les espèces dont la présence est ...

- prévisible en toutes saisons : printemps, été, automne et hiver (PÉAH) : 58 espèces;
- prévisible trois saisons : printemps, été et automne; imprévisible à l'hiver (PÉA) : 116 espèces;
- prévisible trois saisons : automne, hiver et printemps; imprévisible à l'été (AHP) : 20 espèces;
- prévisible deux saisons : printemps et automne; imprévisible à l'été et à l'hiver (PA) : 39 espèces;
- imprévisible en toutes saisons (IMP) : 102 espèces (dont 7 exotiques)

Dans les pages suivantes, la colonne "Type" indique notre meilleure estimation du type de présence de l'espèce dans Lanaudière au 1<sup>er</sup> janvier 2020.

---

\* En ornithologie, les saisons sont réparties ainsi:

- Printemps : du 1<sup>er</sup> mars au 31 mai
- Été : du 1<sup>er</sup> juin au 31 juillet
- Automne : du 1<sup>er</sup> août au 30 novembre
- Hiver : du 1<sup>er</sup> décembre au 28 (ou 29) février de l'année qui suit

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *ANATIDAE*

1	Dendrocygne à ventre noir	IMP	E	I	E	E
2	Oie des neiges	PA	F	R	I	I
3	Oie de Ross	IMP	I	E	I	E
4	Oie cendrée	IMP	I	I	E	I
5	Oie rieuse	IMP	I	E	I	I
6	Oie à bec court	IMP	I	E	E	E
7	Bernache cravant	PA	I	I	I	E
8	Bernache nonette	IMP	E	E	I	I
9	Bernache de Hutchins	PA	I	E	I	I
10	Bernache du Canada	PÉAH	A	F	C	O
11	Cygne tuberculé	IMP	I	I	I	E
12	Cygne siffleur	PA	I	I	I	E
13	Cygne chanteur	IMP	I	E	E	E
14	Cygne noir (exotique)	IMP	E	E	E	E
15	Ouette d'Égypte (exotique)	IMP	E	E	I	E
16	Tadorne de Belon (exotique)	IMP	I	E	E	E
17	Canard branchu	PÉA	O	O	O	I
18	Sarcelle à ailes bleues	PÉA	R	R	R	E
19	Sarcelle cannelle	IMP	I	E	E	E
20	Canard souchet	PÉA	F	O	R	I
21	Canard chipeau	PÉA	O	O	R	1

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	PÉAH	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : ANATIDAE (suite)

22	Canard siffleur	IMP	I	I	I	I
23	Canard d'Amérique	PÉA	F	O	R	I
24	Canard colvert	PÉAH	A	C	C	O
25	Canard noir	PÉAH	F	F	F	O
26	Canard pilet	PÉA	F	R	R	I
27	Sarcelle d'hiver	PÉA	F	R	O	I
28	Fuligule à dos blanc	IMP	I	E	I	I
29	Fuligule à tête rouge	PÉA	R	I	I	E
30	Fuligule à collier	PÉA	F	R	O	I
31	Fuligule morillon	IMP	I	E	E	E
32	Fuligule milouinan	PA	R	I	I	I
33	Petit Fuligule	PA	R	I	R	I
34	Eider à tête grise	IMP	E	E	I	E
35	Eider à duvet	IMP	I	E	E	E
36	Arlequin plongeur	IMP	E	E	I	I
37	Macreuse à front blanc	PA	I	E	I	E
38	Macreuse à ailes blanches	PA	I	I	I	I
39	Macreuse à bec jaune	PA	I	E	I	I
40	Harelde kakawi	PA	I	E	I	E
41	Petit Garrot	PA	O	I	R	I

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	PÉAH	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *ANATIDAE* (suite)

42	Garrot à œil d'or	PÉA	O	O	O	I
43	Garrot d'Islande	IMP	I	I	I	E
44	Harle couronné	PÉAH	O	R	O	I
45	Grand Harle	PÉAH	F	O	F	O
46	Harle huppé	PA	I	I	I	I
47	Érismature rousse	PA	I	I	I	E

Famille *ODONTOPHARIDAE*

48	Colin de Virginie (exotique)	IMP	E	I	I	E
----	------------------------------	-----	---	---	---	---

Famille : *PHASIANIDAE*

49	Perdrix choukar (exotique)	IMP	I	I	I	I
50	Perdrix grise	PÉAH	I	I	I	R
51	Faisan de Colchide	IMP	I	E	I	I
52	Gélinotte huppée	PÉAH	O	O	O	O
53	Tétras du Canada	PÉAH	I	I	I	I
54	Tétras à queue fine	IMP	I	E	E	E
55	Dindon sauvage	PÉAH	I	I	I	I

Famille : *PODICEPIDAE*

56	Grèbe à bec bigarré	PÉA	O	O	R	E
57	Grèbe esclavon	PA	I	I	I	E
58	Grèbe jougris	PA	I	I	R	I

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *COLUMBIDAE*

59	Pigeon biset	PÉAH	C	F	F	C
60	Tourterelle rieuse (exotique)	IMP	I	I	I	I
61	Tourterelle à ailes blanches	IMP	E	I	E	E
62	Tourterelle triste	PÉAH	A	A	A	A

Famille : *CUCULIDAE*

63	Coulicou à bec jaune	IMP	E	I	I	E
64	Coulicou à bec noir	PÉA	I	R	I	E

Famille : *CAPRIMULGIDAE*

65	Engoulevent d'Amérique	PÉA	I	R	I	E
66	Engoulevent bois-pourri	PÉA	I	R	I	E

Famille : *APODIDAE*

67	Martinet ramoneur	PÉA	R	F	R	E
----	-------------------	-----	---	---	---	---

Famille : *TROCHILIDAE*

68	Colibri à gorge rubis	PÉA	O	C	F	E
69	Colibri roux	IMP	E	E	I	E

Famille : *RALLIDAE*

70	Râle jaune	IMP	E	E	E	E
71	Râle de Virginie	PÉA	I	R	I	E
72	Marouette de Caroline	PÉA	I	R	I	E
73	Gallinule d'Amérique	PÉA	R	R	R	E

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *RALLIDAE* (suite)

74	Foulque d'Amérique	PÉA	I	I	I	E
----	--------------------	-----	---	---	---	---

Famille : *GRUIDAE*

75	Grue du Canada	PÉA	I	I	I	E
----	----------------	-----	---	---	---	---

Famille : *RECURVIROSTRIDAE*

76	Avocette d'Amérique	IMP	I	E	E	E
----	---------------------	-----	---	---	---	---

Famille : *CHARADRIIDAE*

77	Vanneau huppé	IMP	I	E	E	E
78	Pluvier argenté	PA	I	I	I	E
79	Pluvier bronzé	PA	I	E	I	E
80	Pluvier kildir	PÉA	C	C	O	I
81	Pluvier semipalmé	PA	I	I	I	E
82	Pluvier siffleur	IMP	I	E	E	E

Famille : *SCOLOPACIDAE*

83	Maubèche des champs	PÉA	I	R	I	E
84	Courlis corlieu	IMP	I	E	E	E
85	Barge hudsonienne	PA	I	E	I	E
86	Barge marbrée	IMP	I	I	E	E
87	Tournepierrière à collier	PA	I	I	E	E
88	Bécasseau maubèche	PA	I	I	I	E
89	Combattant varié	IMP	I	I	I	E

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *SCOLOPACIDAE* (suite)

90	Bécasseau à échasses	PA	I	I	I	E
91	Bécasseau cocorli	IMP	I	E	E	E
92	Bécasseau sanderling	PA	I	E	I	E
93	Bécasseau variable	PA	I	I	I	E
94	Bécasseau violet	IMP	E	E	E	E
95	Bécasseau de Baird	IMP	E	E	I	E
96	Bécasseau minuscule	PA	R	I	R	E
97	Bécasseau à croupion blanc	PA	I	I	I	E
98	Bécasseau roussâtre	IMP	E	I	I	E
99	Bécasseau à poitrine cendrée	PA	I	I	R	E
100	Bécasseau semipalmé	PA	I	I	R	E
101	Bécasseau d'Alaska	IMP	E	E	I	E
102	Bécassin roux	PA	I	I	I	E
103	Bécassin à long bec	IMP	I	E	I	E
104	Bécasse d'Amérique	PÉA	R	I	I	I
105	Bécassine de Wilson	PÉA	O	O	R	I
106	Chevalier grivelé	PÉA	O	F	O	E
107	Chevalier solitaire	PÉA	R	I	R	E
108	Petit Chevalier	PA	R	R	O	E
109	Chevalier semipalmé	IMP	I	I	I	E
110	Grand Chevalier	PA	O	R	I	E

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *SCOLOPACIDAE* (suite)

111	Phalarope de Wilson	IMP	I	I	I	E
112	Phalarope à bec étroit	PA	I	E	I	E

Famille : *STERCORARIRIDAE*

113	Labbe parasite	IMP	E	E	I	E
114	Labbe à longue queue	IMP	E	I	E	E

Famille : *ALCIDAE*

115	Guillemot de Brünnich	IMP	E	E	I	E
116	Guillemot à miroir	IMP	E	E	E	E
117	Macareux moine	IMP	E	E	E	E

Famille : *LARIDAE*

118	Mouette tridactyle	IMP	E	E	I	E
119	Mouette de Bonaparte	PA	I	I	I	E
120	Mouette pygmée	IMP	I	I	I	E
121	Goéland à bec cerclé	PÉAH	A	A	C	O
122	Goéland argenté	PÉAH	O	O	O	O
123	Goéland arctique	AHP	I	E	I	R
124	Goéland brun	AHP	I	I	I	I
125	Goéland bourgmestre	AHP	I	E	I	R
126	Goéland marin	AHP	O	R	O	F
127	Sterne caspienne	PÉA	I	I	I	E

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *LARIDAE* (suite)

128	Guiffette noire	PÉA	I	R	I	E
129	Sterne pierregarin	PÉA	R	O	I	E

Famille : *GRAVIDAE*

130	Plongeon catmarin	IMP	I	E	E	E
131	Plongeon huard	PÉA	O	F	F	I

Famille : *FREGATIDAE*

132	Frégate superbe	IMP	E	E	E	E
-----	-----------------	-----	---	---	---	---

Famille : *SULIDAE*

133	Fou de Bassan	IMP	E	E	I	E
-----	---------------	-----	---	---	---	---

Famille : *PHALACROCORACIDAE*

134	Cormoran à aigrettes	PÉA	O	O	O	I
135	Grand Cormoran	IMP	I	E	I	E

Famille : *PELECANIIDAE*

136	Pélican d'Amérique	IMP	I	I	I	E
137	Pélican brun	IMP	E	E	I	E

Famille : *ARDEIDAE*

138	Butor d'Amérique	PÉA	O	O	R	E
139	Petit Blongios	PÉA	I	I	I	E
140	Grand Héron	PÉA	C	C	C	R
141	Grande Aigrette	PÉA	R	O	O	I

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *ARDEIDAE* (suite)

142	Aigrette neigeuse	IMP	I	I	E	E
143	Aigrette bleue	IMP	E	I	I	E
144	Aigrette tricolore	IMP	E	E	E	E
145	Héron garde-bœufs	IMP	I	I	I	E
146	Héron vert	PÉA	I	R	R	E
147	Bihoreau gris	PÉA	R	O	R	E
148	Bihoreau violacé	IMP	I	E	E	E

Famille : *THRESKIORNITHIDAE*

149	Ibis blanc	IMP	E	E	E	E
150	Ibis falcinelle	IMP	I	I	E	E
151	Ibis à face blanche	IMP	I	E	E	E

Famille : *CATHARTIDAE*

152	Urubu noir	IMP	I	I	I	E
153	Urubu à tête rouge	PÉA	F	C	C	I

Famille : *PANDIONIDAE*

154	Balbuzard pêcheur	PÉA	O	O	O	I
-----	-------------------	-----	---	---	---	---

Famille : *ACCIPITRIDAE*

155	Naucler à queue fourchue	IMP	E	E	I	E
156	Aigle royal	AHP	I	I	R	I
157	Busard des marais	PÉAH	F	O	O	I

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : ACCIPITRIDAE (suite)

158	Épervier brun	PÉAH	R	R	O	R
159	Épervier de Cooper	PÉAH	R	I	R	R
160	Autour des palombes	PÉAH	I	I	R	I
161	Pygargue à tête blanche	PÉAH	O	O	O	R
162	Buse à épaulettes	PÉA	O	R	R	I
163	Petite Buse	PÉA	O	F	O	I
164	Buse de Swainson	IMP	E	E	E	E
165	Buse à queue rousse	PÉAH	F	O	F	F
166	Buse pattue	AHP	F	I	O	F

Famille : TYTONIDAE

167	Effraie des clochers	IMP	E	E	E	E
-----	----------------------	-----	---	---	---	---

Famille : STRIGIDAE

168	Petit-duc maculé	PÉAH	I	I	I	I
169	Grand-duc d'Amérique	PÉAH	R	I	I	R
170	Harfang des neiges	AHP	R	I	R	C
171	Chouette épervière	AHP	I	I	I	R
172	Chouette rayée	PÉAH	I	I	I	I
173	Chouette lapone	AHP	I	E	I	R
174	Hibou moyen-duc	PÉAH	I	I	I	I
175	Hibou des marais	PÉAH	I	I	I	I
176	Nyctale de Tengmalm	AHP	I	E	I	E

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *STRIGIDAE* (suite)

177	Petite Nyctale	PÉAH	I	I	I	I
-----	----------------	------	---	---	---	---

Famille : *ALCEDINIDAE*

178	Martin-pêcheur d'Amérique	PÉA	F	C	F	I
-----	---------------------------	-----	---	---	---	---

Famille : *PICIDAE*

179	Pic à tête rouge	IMP	I	I	E	I
180	Pic à ventre roux	IMP	I	I	I	I
181	Pic maculé	PÉA	F	F	O	I
182	Pic à dos rayé	IMP	I	I	I	I
183	Pic à dos noir	PÉAH	I	I	I	I
184	Pic mineur	PÉAH	C	C	C	C
185	Pic chevelu	PÉAH	C	C	C	C
186	Pic flamboyant	PÉA	C	A	F	I
187	Grand Pic	PÉAH	F	O	O	O

Famille : *FALCONIDAE*

188	Crécerelle d'Amérique	PÉAH	F	O	O	R
189	Faucon émerillon	PÉAH	O	O	O	R
190	Faucon gerfaut	AHP	I	E	I	I
191	Faucon pèlerin	PÉAH	R	R	R	I

Famille : *TYRANNIDAE*

192	Tyrann huppé	PÉA	O	F	I	E
-----	--------------	-----	---	---	---	---

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *TYRANNIDAE* (suite)

193	Tyran de l'Ouest	IMP	I	E	I	I
194	Tyran tritri	PÉA	O	V	R	E
195	Tyran à longue queue	IMP	I	I	E	E
196	Moucherolle à côtés olive	PÉA	I	I	I	E
197	Pioui de l'Est	PÉA	R	F	R	E
198	Moucherolle à ventre jaune	PÉA	I	I	I	E
199	Moucherolle vert	IMP	E	I	E	E
200	Moucherolle des aulnes	PÉA	R	F	I	E
201	Moucherolle des saules	PÉA	I	R	I	E
202	Moucherolle tchébec	PÉA	O	F	I	E
203	Moucherolle phébi	PÉA	F	F	O	E
204	Moucherolle à ventre roux	IMP	I	E	I	E

Famille : *LANIIDAE*

205	Pie-grièche migratrice	IMP	I	I	I	I
206	Pie-grièche boréale	AHP	R	I	R	O

Famille : *VIREONIDAE*

207	Viréo à gorge jaune	IMP	I	E	I	E
208	Viréo à tête bleue	PÉA	R	O	R	E
209	Viréo de Philadelphie	PÉA	I	R	I	E
210	Viréo mélodieux	PÉA	O	F	I	E
211	Viréo aux yeux rouges	PÉA	O	A	O	E

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *CORVIDAE*

212	Mésangeai du Canada	PÉAH	R	R	R	R
213	Geai bleu	PÉAH	A	A	A	A
214	Pie d'Amérique	IMP	I	E	E	E
215	Corneille d'Amérique	PÉAH	A	A	A	A
216	Grand Corbeau	PÉAH	F	F	C	F

Famille : *ALAUDIDAE*

217	Alouette des champs	I	E	E	E	E
218	Alouette hausse-col	PÉAH	O	R	R	O

Famille : *HIRUNDINIDAE*

219	Hirondelle de rivage	PÉA	R	O	I	E
220	Hirondelle bicolor	PÉA	C	C	O	E
221	Hirondelle à ailes hérissées	PÉA	I	R	I	E
222	Hirondelle noire	PÉA	I	R	I	E
223	Hirondelle rustique	PÉA	F	C	R	E
224	Hirondelle à front blanc	PÉA	R	R	I	E

Famille : *PARIDAE*

225	Mésange à tête noire	PÉAH	A	A	A	A
226	Mésange à tête brune	PÉAH	I	R	R	I
227	Mésange bicolor	IMP	E	E	I	I

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *SITTIDAE*

228	Sittelle à poitrine rousse	PÉAH	C	C	C	C
229	Sittelle à poitrine blanche	PÉAH	C	F	C	C

Famille : *CERTHIIDAE*

230	Grimpereau brun	PÉAH	O	R	O	R
-----	-----------------	------	---	---	---	---

Famille : *TROGLODYTIDAE*

231	Troglodyte familier	PÉA	I	R	I	E
232	Troglodyte des forêts	PÉA	O	F	R	I
233	Troglodyte à bec court	IMP	I	I	E	E
234	Troglodyte des marais	PÉA	I	R	I	E
235	Troglodyte de Caroline	AHP	I	I	I	I

Famille : *POLIOPTILIDAE*

236	Gobemoucheron gris-bleu	IMP	I	E	I	E
-----	-------------------------	-----	---	---	---	---

Famille : *REGULIDAE*

237	Roitelet à couronne dorée	PÉAH	O	O	O	R
238	Roitelet à couronne rubis	PÉA	F	O	O	I

Famille : *TURDIDAE*

239	Merlebleu de l'Est	PÉA	R	O	R	I
240	Grive fauve	PÉA	O	C	I	E
241	Grive à joues grises	PA	I	I	I	E
242	Grive de Bicknell	PÉA	I	I	E	E

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *TURDIDAE* (suite)

243	Grive à dos olive	PÉA	R	F	I	E
244	Grive solitaire	PÉA	F	C	R	I
245	Grive des bois	PÉA	R	R	I	E
246	Merle d'Amérique	PÉAH	A	A	C	R
247	Grive à collier	IMP	I	E	I	I

Famille : *MIMIDAE*

248	Moqueur chat	PÉA	R	F	R	I
249	Moqueur roux	PÉA	T	O	I	I
250	Moqueur polyglotte	PÉA	I	R	I	I

Famille : *STURNIDAE*

251	Étourneau sansonnet	PÉAH	A	A	C	C
-----	---------------------	------	---	---	---	---

Famille : *BOMBYCILLIDAE*

252	Jaseur boréal	AHP	R	I	I	R
253	Jaseur d'Amérique	PÉA	R	A	F	I

Famille : *PASSERIDAE*

254	Moineau domestique	PÉAH	C	C	C	C
-----	--------------------	------	---	---	---	---

Famille : *MOTOCILLIDAE*

255	Pipit d'Amérique	PA	I	I	R	I
-----	------------------	----	---	---	---	---

Famille : *FRINGILLIDAE*

256	Gros-bec errant	PÉAH	O	O	O	O
-----	-----------------	------	---	---	---	---

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *FRINGILLIDAE* (suite)

257	Durbec des sapins	AHP	R	I	R	F
258	Roselin familier	PÉAH	F	O	F	F
259	Roselin pourpré	PÉAH	F	C	F	O
260	Sizerin flammé	AHP	F	I	R	C
261	Sizerin blanchâtre	AHP	R	E	I	R
262	Bec-croisé des sapins	PÉAH	I	I	I	I
263	Bec-croisé bifascié	PÉAH	I	I	R	R
264	Chardonneret élégant (exotique)	IMP	I	I	E	I
265	Tarin des pins	PÉAH	F	O	O	O
266	Chardonneret jaune	PÉAH	A	A	A	C

Famille : *CALCARIIDAE*

267	Plectrophane lapon	AHP	I	E	I	I
268	Plectrophane des neiges	AHP	O	E	O	F

Famille : *PASSERELLIDAE*

269	Bruant à joues marron	IMP	E	E	E	I
270	Bruant noir et blanc	IMP	I	E	E	E
271	Bruant familier	PÉA	C	A	F	I
272	Bruant des plaines	PÉA	I	I	I	E
273	Bruant des champs	PÉA	I	I	I	I
274	Bruant fauve	PA	O	I	R	I

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *PASSERELLIDAE* (suite)

275	Bruant hudsonien	AHP	F	I	O	C
276	<i>Junco ardoisé</i>	PÉAH	C	O	C	C
277	Bruant à couronne blanche	PA	F	I	O	I
278	Bruant à couronne dorée	IMP	E	E	I	E
279	Bruant à face noire	IMP	I	E	E	I
280	<i>Bruant à gorge blanche</i>	PÉA	C	A	C	R
281	<i>Bruant vespéral</i>	PÉA	R	O	I	E
282	Bruant de Nelson	IMP	E	I	I	E
283	<i>Bruant des prés</i>	PÉA	O	F	R	I
284	<i>Bruant chanteur</i>	PÉAH	A	A	C	R
285	<i>Bruant de Lincoln</i>	PÉA	I	I	I	E
286	<i>Bruant des marais</i>	PÉA	O	C	R	I
287	Tohi à flancs roux	IMP	I	I	I	I

Famille : *ICTERIDAE*

288	Carouge à tête jaune	IMP	I	E	I	E
289	<i>Goglu des prés</i>	PÉA	O	F	I	E
290	<i>Sturnelle des prés</i>	PÉA	O	O	I	I
291	Oriole des vergers	IMP	I	I	E	E
292	<i>Oriole de Baltimore</i>	PÉA	O	F	I	I
293	<i>Carouge à épaulettes</i>	PÉAH	A	A	F	R
294	<i>Vacher à tête brune</i>	PÉAH	C	F	R	R

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *ICTERIDAE* (suite)

295	Quiscale rouilleux	PÉA	R	R	R	I
296	Quiscale de Brewer	IMP	E	E	I	E
297	Quiscale bronzé	PÉA	A	A	F	I

Famille : *PARULIDAE*

298	Paruline couronnée	PÉA	F	C	R	I
299	Paruline hochequeue	IMP	I	E	E	E
300	Paruline des ruisseaux	PÉA	R	O	I	E
301	Paruline à ailes dorées	IMP	I	E	E	E
302	Paruline noir et blanc	PÉA	O	F	R	E
303	Paruline orangée	IMP	E	E	I	E
304	Paruline obscure	PÉA	R	R	I	E
305	Paruline verdâtre	PA	I	E	I	E
306	Paruline à joues grises	PÉA	O	F	O	E
307	Paruline à gorge grise	IMP	I	I	I	E
308	Paruline triste	PÉA	R	F	I	E
309	Paruline masquée	PÉA	F	C	O	E
310	Paruline à capuchon	IMP	E	I	E	E
311	Paruline flamboyante	PÉA	O	F	R	E
312	Paruline tigrée	PÉA	R	I	I	E
313	Paruline azurée	IMP	E	E	E	E

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *PARULIDAE* (suite)

314	Paruline à collier	PÉA	R	F	R	E
315	Paruline à tête cendrée	PÉA	O	F	O	E
316	Paruline à poitrine baie	PÉA	R	R	I	E
317	Paruline à gorge orangée	PÉA	R	F	R	E
318	Paruline jaune	PÉA	F	C	R	E
319	Paruline à flancs marron	PÉA	O	C	R	E
320	Paruline rayée	PA	R	R	I	I
321	Paruline bleue	PÉA	O	F	R	E
322	Paruline à couronne rousse	PÉA	I	I	I	E
323	Paruline des pins	PÉA	R	R	I	E
324	Paruline à croupion jaune	PÉA	F	F	F	I
325	Paruline à gorge jaune	IMP	E	E	I	E
326	Paruline des prés	IMP	E	E	I	E
327	Paruline à gorge noire	PÉA	O	F	O	E
328	Paruline du Canada	PÉA	R	O	I	E
329	Paruline à calotte noire	PÉA	I	I	I	E

Famille : *CARDINALIDAE*

330	Piranga écarlate	PÉA	R	R	I	E
331	Cardinal rouge	PÉAH	F	F	F	F
332	Cardinal à poitrine rose	PÉA	I	F	R	E

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel

*Classes saisonnières des oiseaux de Lanaudière, selon l'ordre taxonomique des espèces, d'après les données des feuillets d'observations enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018*

No	Nom	Type	P	É	A	H
----	-----	------	---	---	---	---

Famille : *CARDINALIDAE* (suite)

333	Guiraca bleu	IMP	I	E	E	E
334	Passerin indigo	PÉA	R	F	I	E
335	Dickcissel d'Amérique	IMP	I	E	I	E

A = Assidu; C = Commun; F = Fréquent; O = Occasionnel;  
R = Rare; I = Inusité; E = exceptionnel



Ce petit fascicule donne, au 1<sup>er</sup> janvier 2020, notre meilleure estimation du portrait changeant de la présence des oiseaux dans Lanaudière.

On y retrouve 335 des 336 espèces d'oiseaux notées dans Lanaudière avant le 1<sup>er</sup> janvier 2020, espèces exotiques comprises (la Tourte voyageuse, éteinte, est exclue de la liste).

Pour chaque espèce, on indique le nom français (AOU) selon la liste de l'*American Ornithological Society* (AOS) au 1<sup>er</sup> décembre 2019, le "type de présence" et la "classe" pour chaque saison.

Ce portrait est le résultat de l'analyse des données provenant de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes comportant 553 192 mentions et enregistrés entre le 1<sup>er</sup> avril 1983 et le 31 mars 2018.

Les espèces sont classées selon l'ordre taxonomique (AOU) avec indication de la famille et on distingue les *espèces nicheuses de Lanaudière* des autres espèces.



**SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE  
DE LANAUDIÈRE**