



Bulletin d'information destiné aux Services de garde à l'enfance de Lanaudière

ÉDITION SPÉCIALE POUR LES PARENTS

Mise à jour
Juin 2010

Respecter le calendrier de vaccination, c'est important !

Chers parents,

Nous sommes fiers de vous présenter cette édition spéciale du bulletin **L'Express Garderie** consacrée à la **vaccination et au respect du calendrier**. Au cours des dernières années, plusieurs vaccins ont été ajoutés au calendrier régulier de vaccination des enfants du Québec. Les tableaux qui suivent vous aideront à vous y retrouver.

Les âges prévus pour l'administration des vaccins sont décidés en fonction de la prévalence des maladies et l'efficacité des vaccins selon l'âge. **Il n'est jamais trop tard pour recevoir un vaccin, mais le retarder expose l'enfant aux risques de contracter une maladie évitable par la vaccination.**

Une recherche effectuée par l'Institut National de Santé Publique du Québec (enquête sur la couverture vaccinale des enfants québécois en 2008), a permis de constater qu'il y a des retards dans l'administration de certains vaccins. Il est important que les vaccins soient administrés selon le calendrier recommandé afin de protéger vos enfants contre ces maladies au moment où ils sont le plus à risque de les contracter. Il est indiqué dans cette étude que le refus de la pratique d'injections multiples lors d'une même visite explique en partie ce retard. À tort, cette pratique fait peur, alors **qu'il est prouvé que plusieurs vaccins administrés en même temps ne causent pas plus d'effets indésirables**. De plus, cela permet de diminuer le nombre de rendez-vous et d'occasion pour l'enfant d'avoir peur.

Notre corps a l'habitude de lutter chaque jour contre des centaines voire des milliers de microbes qui nous entourent. Les vaccins ne représentent qu'une infime partie du défi que le système immunitaire doit relever. Les vaccins renforcent le système immunitaire.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux offre gratuitement **la vaccination contre l'influenza saisonnière**, à tous les enfants âgés de 6 à 23 mois ainsi qu'aux personnes qui vivent et prennent soin d'enfants de moins de deux ans. Idéalement, chaque année, avant la période des fêtes, toutes personnes éligibles devraient recevoir son vaccin contre l'influenza saisonnière. Cette période entraîne son lot de baisers, de poignées de main, et augmente le risque de transmission d'infections.

Pour être efficace, un programme de vaccination exige la coopération de tous. Plus il y aura d'enfants et d'adultes vaccinés, moins les microbes circuleront dans la population.

Vous avez des questions face à la vaccination? N'hésitez pas à communiquer avec votre CLSC ou INFO-SANTÉ. Vous pouvez également consulter les ressources suivantes :

Le document régional « Prends bien soin de moi...Vaccine-moi »

<http://www.agencelanaudiere.qc.ca> (documentation / publication / vaccination)

Protocole d'immunisation du Québec :

<http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/santpub/immunisa.nsf/liste?OpenView>

Soins de nos enfants : L'immunisation

www.soinsdenosenfants.cps.ca/immunisation/PCPV.htm

Mythes et réalités à propos de l'immunisation :

www.immunize.cpha.ca/francais/consumrf/consresf/mythsf/mythf.pdf



Calendrier régulier de vaccination des enfants du Québec

Mise à jour : juin 2010

Âge recommandé	Maladies visées par le vaccin donné	Nombre d'injections
2 mois	Diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, haemophilus influenzae type b	1
	Pneumocoque	1
4 mois	Diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, haemophilus influenzae type b	1
	Pneumocoque	1
6 mois	Diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, haemophilus influenzae type b	1
	Influenza (grippe)	2 (à 1 mois d'intervalle)
12 mois	Rougeole, rubéole, oreillons + varicelle	1
	Méningocoque de sérogruppe C	1
	Pneumocoque	1
18 mois	Diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, haemophilus influenzae type b	1
	Rougeole, rubéole, oreillons	1
4 à 6 ans	Diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite	1
4^e année du primaire	Hépatite B + A	2 (sur une période de 6 mois)
	VPH (uniquement les filles)	2 (sur une période de 6 mois)
14 à 16 ans	Diphtérie, coqueluche, tétanos	1 (rappel aux 10 ans) Diphtérie, tétanos
3^e année du secondaire	VPH (uniquement les filles)	3



Informations sur les maladies évitables par la vaccination et les vaccins associés Mise à jour : juin 2010

Nom de la maladie	Symptômes de la maladie	Complications de la maladie	Vaccin associé et effets indésirables	Calendrier vaccinal
DIPHTÉRIE	Maux de gorge sévères, forte fièvre, atteinte de l'état général.	Lésions nerveuses, paralysie, insuffisance cardiaque, problèmes respiratoires. Décès dans 5 à 10 % des cas.	PENTACEL ou PÉDIACEL *(DcaT-POLIO-HIB) : De 10 à 49% auront une rougeur et une douleur locale. Une fièvre à >39,5 chez 9 % des nourrissons.	2 – 4 – 6 - 18mois Entre 4-6 ans en pré - scolaire. Le vaccin utilisé se nomme QUADRACEL Celui-ci ne contient plus la composante HIB.
COQUELUCHE	Violentes quintes de toux, difficulté à respirer.	Pneumonie, lésions cérébrales, convulsions. Décès dans 0,4 % des cas chez des bébés.	PENTACEL *	
TÉTANOS	Spasmes musculaires violents, difficulté à avaler, convulsions.	Décès dans 10 % à 30 % des cas.	PENTACEL *	
POLIO	Fièvre, nausées et vomissements, malaises généraux, paralysie des bras et des jambes.	Problèmes respiratoires, paralysie permanente, hospitalisation dans 50 % . Décès chez 5 % des cas hospitalisés.	PENTACEL *	
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B	Méningite, épiglottite, pneumonie, arthrite, cellulite.	Surdit�, retard mental. Décès chez 5 % des cas d'épiglottite et de méningite.	PENTACEL *	

*** PENTACEL ou PÉDIACEL est un vaccin 5- dans-1 : une seule injection sera faite à votre enfant. Ce vaccin prot ge à la fois contre la dipht rie (D), la coqueluche (Ca), le t tanos (T), la poliomy lite (P) et les infections à haemophilus influenzae de type B (HIB). Vous pourriez retrouver dans le carnet de vaccination de votre enfant le synonyme suivant (DcaTP HIB).**


Nom de la maladie	Sympt�mes de la maladie	Complications de la maladie	Vaccin associ� et effets ind�sirables	Calendrier vaccinal
PNEUMOCOQUE	M�ningite, infection du sang. Pneumonie, otite.	Surdit�, dommages permanents au cerveau. D�c�s dans 2 % des cas de m�ningite ou d'infection du sang chez les enfants de moins de 13 ans.	SYNFLORIX ou PREVNAR Une rougeur et une douleur locale chez un tiers des enfants vaccin�s.	2 – 4 - 12 mois
VARICELLE	Fi�vre, v�sicules sur la peau et d�mangeaisons.	Infection grave de la peau (bact�rie mangeuse de chair), otite.	PRIORIX T�TRA ⁽¹⁾ Une douleur et une rougeur locale chez 10 à 49 % des vaccin�s. Fi�vre �lev�e chez <10% des enfants vaccin�s, 9 à 10 jours apr�s la vaccination. Sympt�mes g�n�raux (irritabilit�, perte d'app�tit, fatigue, malaise, diarrh�e) chez 10 à 49% des vaccin�s. �ruption varicelliforme chez 1-5% des enfants vaccin�s.	12 mois
M�NINGOCOQUE	Forte fi�vre, maux de t�te s�v�res, naus�es et vomissements, atteinte de l'�tat g�n�ral, rougeurs sur la peau.	Dommages permanents au cerveau, amputation des mains ou des pieds chez 10-15 % des cas. D�c�s chez 10-15 % des cas.	MENJUGATE ou MENINGITEC ou NEISVAC-C Une douleur et rougeur locale chez 10 à 49 % des enfants vaccin�s.	12 mois
ROUGEOLE	Rougeurs sur la peau, toux, fi�vre, yeux rouges, atteinte de l'�tat g�n�ral.	Otite, pneumonie, convulsions, dommages permanents au cerveau (1/1000 cas) D�c�s pour 1 cas sur 3000.	PRIORIX ⁽²⁾ PRIORIX T�TRA ⁽¹⁾	12 - 18 mois. ⁽³⁾
RUB�OLE	Rougeurs sur la peau, enflure des ganglions.	Pendant la grossesse elle peut entra�ner : des malformations cardiaques, de la surdit�, une perte de vision, un retard mental et le d�c�s du f�tus.	PRIORIX ⁽²⁾ PRIORIX T�TRA ⁽¹⁾	
OREILLONS	Fi�vre, enflure des glandes salivaires.	M�ningite : 10 à 30 % des cas Infection des testicules : pr�s de 20 % Infection des ovaires : environ 5%	PRIORIX ⁽²⁾ PRIORIX T�TRA ⁽¹⁾	

(1) **PRIORIX T TRA:** ce vaccin prot ge à la fois contre la rougeole, la rub ole, les oreillons et la varicelle.

(2) **PRIORIX:** ce vaccin prot ge à la fois contre la rougeole, rub ole et les oreillons.

(3) Si l'enfant a re u le PRIORIX T TRA à 12 mois, une seule dose de PRIORIX sera administr e à 18 mois.





Pour plus d'informations, cette brochure est disponible dans votre CLSC et à la Direction de Santé publique et d'évaluation de Lanaudière.

Direction de Santé publique et d'évaluation
Équipe des maladies infectieuses
245, Curé-Majeau
Joliette, Qc J6E 8S8
450-759-1157 ou 1-800-668-9229
Poste 4459

