

Mon vet de poche



Dre Myriam Lortie-Watkins, DMV 

Dr Olivier Faubert, DMV 

Droits d'auteur © 2025 Mon vet de poche
Myriam Lortie-Watkins, Olivier Faubert

Ce document est protégé par les lois sur le droit d'auteur. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche, ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) sans l'autorisation écrite préalable des auteurs.

Ce guide est destiné à un **usage personnel uniquement**. Merci de ne pas le distribuer, le transmettre ou le partager sans autorisation. Chaque achat soutient directement deux vétérinaires québécois indépendants et passionnés qui souhaitent rendre l'information vétérinaire accessible à tous.

Pour toute demande d'utilisation ou de diffusion, merci de contacter les auteurs à l'adresse **monvetdepoche@gmail.com**.

ISBN: 978-2-9823490-0-1

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2025

Sommaire

01

Présentation

02

Conseils généraux

03

Petits bobos fréquents

04

Intoxications

05

Check-lists utiles

06

Bobos en vrac

Cet e-book est interactif !
Cliquez sur le titre pour aller
directement à la page
associée



Faire équipe avec son vet 13
 La pyramide gagnante 14
 Osez demander ! 15
 Utilité des tests médicaux 16
 Comment partir votre bébé du bon pied 17
 Les assurances 20
 Règles du vétérinaire 22
 Les vaccins du chien 23
 Les vaccins du chat 24
 Réactions vaccinales 25
 Règle du 3-2-1 26
 Les parasites 27
 Les anti-parasitaires 29
 Mon animal a une tique ! 31
 La stérilisation 33
 Jouet sécuritaire 37
 Comment prendre soin de votre animal adulte 38
 Comment prendre soin de votre animal âgé (gériatrique) 39
 Âge de mon animal en « humain » 40
 Mon vieil animal ralentit 41
 Dire au revoir 42
 L'euthanasie 44
 Le deuil animal 46
 J'ai trouvé un chat errant 47
 Mes chats se détestent 48
 Fréquence de ... 49
 Avoir une portée à la maison 50
 Pourquoi mon vet insiste-t-il pour ... 53
 Doit-on chicaner son animal si ... 55
 Qu'est-ce que ça veut dire si ... 56
 Guide de la laisse parfaite 57
 Décoder le langage animal 58
 Changement de comportement 59
 La fièvre 60

Nourritures

Chiots - chatons 34
 Gastro-intestinale 94
 Urinaire 104
 Senior 39
 Articulaire 129
 Hypoallergénique 115
 Dentaire 156
 Perte de poids 131
 Sans grains 36
 Crue 35
 Diètes maison 36



Donner un ancien médicament 61
 Arrêter un médicament 62
 Médicaments en pharmacie 64
 Précautions d'été et d'hiver 65
 Précautions des Fêtes 67
 Animal et jeunes enfants 68
 Les griffes de chats 69
 Voyager avec son animal 70
 Mettre son animal en pension 71
 La nourriture de table 72
 Mettre son animal au régime 73
 Changement alimentaire 74
 Les dangers d'Internet 75
 Les médecines alternatives 77
 Les spécialistes 78

Rhinotrachéite du chat 82
Toux de chenil du chien 83
Brachycéphales 84

SYSTÈME DIGESTIF — 85

Diarrhée 86
Les remèdes contre la diarrhée 87
Diarrhée chronique 88
Constipation 89
Les boules de poils 90
Vomissements 91
Anorexie 95
Mon chien mange ses selles 96

SYSTÈME CARDIO-RESPIRATOIRE — 97

Reverse sneezing 98
Toux 99
Les souffles cardiaques 100

SYSTÈME URINAIRE — 101

Problèmes urinaires 102
Guide des litières 105
Mon animal boit et urine plus 106

SYSTÈME CUTANÉ — 107

Blessures cutanées
superficielles 108
Acné (féline) 109
Plaies de chirurgie 110
Complications chirurgicales 111
Masses 112
Ça pique ! 113
Comprendre les allergies 114
Piqûres d'insecte 118
Griffe cassée 119
Griffe coupée trop court 120
Les glandes anales 122

SYSTÈME**MUSCULO-SQUELETTIQUE — 123**

Boiterie 124

Mon chiot boite 125

Dysplasie de la hanche 125

Luxation de rotules 126

Arthrose 127

Trucs lors d'arthrose 128

Mon animal prend du poids 130

Mon animal perd du poids 132

COMPORTEMENT — 133

Animal n'aime pas la voiture 134

Animal anxieux 135

Mythes sur l'anxiété 136

La protection de ressources 138

Mon vétérinaire veut sédaté

mon animal 139

Muselière 140

Mon chat déteste son

transporteur 141

Mon chat m'attaque 142

SYSTÈME NEUROLOGIQUE — 143

Convulsions 144

Manifestations neurologiques 145

Hernies discales 146

LES 5 SENS — 147

Problèmes oculaires 148

Soins dentaires 153

Détartrage et extractions

dentaires 154

Les oreilles 159

Les otites 160

Othématome 161

- Chocolat 165
- Marijuana 167
- Donner du CBD à son animal 168
- Médicaments pour humains 169
- Plantes 170
- Huiles essentielles 171
- Autres intoxications 172
- Faire vomir son chien 173
- Faire vomir son chat 174

- Qualité de vie de mon animal 43
- Trousse d'urgence à avoir en tout temps 177
- Liste pour mon chat en mon absence 178
- Liste pour mon chien en mon absence 179
- Centres d'urgences 180
- Mon premier rendez-vous vétérinaire 181
- Mes prochains rendez-vous 182
- Check-list pour ne rien oublier 183
- Autres ressources 184

Pages 186 à 188

Présentation

Mon vet de poche



Bonjour!

Je m'appelle Myriam, et j'ai gradué de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal en 2020. Je pratique dans le domaine des petits animaux, c'est-à-dire les chats et les chiens.

J'ai mis ensemble deux de mes passions : l'amour des animaux et l'écriture, pour concocter ce petit e-book tout simple. J'espère que vous y trouverez quelques conseils pratiques et surtout, beaucoup de réconfort.

Sincèrement,
Myriam



Dr Olivier Faubert, diplômé de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal en 2020, est un vétérinaire ambitieux qui ne cherche qu'à se dépasser. Entrepreneur dans l'âme, il est propriétaire de son propre service mobile et copropriétaire d'une clinique vétérinaire qu'il dirige avec ses parents.

Il est un passionné de toutes les espèces animales, soignant autant les chats, les chiens, que les animaux exotiques. Il est vétérinaire dans un zoo, où il offre aussi des soins aux animaux de la faune. Avidé d'ajouter une nouvelle corde à son arc, il s'est joint à sa bonne amie, Dre Lortie-Watkins, pour l'épauler dans ce beau projet.

Cet e-book ne se veut en aucun cas un outil diagnostic.

Si votre animal a besoin de soins, **votre vétérinaire demeure le professionnel à consulter**. N'hésitez jamais à appeler votre clinique habituelle pour des conseils.

Cet e-book n'engage aucune responsabilité si votre animal tombe/demeure malade et/ou si sa santé s'aggrave, en suivant les conseils qui y sont présentés.

De plus, seuls les médecins vétérinaires inscrits à l'Ordre des Médecins Vétérinaires du Québec peuvent pratiquer la médecine vétérinaire au Québec. **Ce guide ne se veut en aucun cas un remplacement du médecin vétérinaire** et n'invite pas les citoyens à poser des diagnostics.

Cet e-book représente nos propres expériences et recommandations en tant que vétérinaires. Les vétérinaires du Québec peuvent avoir des recommandations différentes et toutes aussi pertinentes.

Cet e-book se veut simplement un outil supplémentaire pour rendre la médecine vétérinaire au Québec un peu plus accessible.

Sincèrement,
Myriam & Olivier



Conseils généraux



*Votre instinct se trompe rarement.
Si quelque chose vous inquiète,
n'hésitez pas à consulter
votre vétérinaire.*



Faire équipe avec son vétérinaire

La médecine vétérinaire est un monde bien spécial. Elle combine la médecine de haut niveau, à la fine pointe de la technologie, demande une formation rigoureuse et continue, et au grand désarroi de tous les professionnels, est payante. Inévitablement, lorsque vous consultez un médecin vétérinaire, la question des coûts devra être abordée. Votre vétérinaire fait partie de **votre équipe; il est votre allié, votre conseiller**. Jamais il ne prendra de décisions pour vous ni ne vous obligera à faire quoi que ce soit.

Votre vétérinaire a le devoir de vous offrir le meilleur


Le médecin vétérinaire tentera d'aider votre animal au meilleur de ses connaissances, des outils et des ressources dont il dispose, et bien évidemment, de votre budget. Il vous présentera toujours les meilleures options de diagnostic ou de traitements, en premier. Cependant, sachez que tous les vétérinaires sont débrouillards et habitués de devoir trouver des plans B, C, D, E.

Soyez honnête avec votre vétérinaire

Trouver et garder sur le long terme un vétérinaire en qui vous avez **confiance** vous sera très bénéfique. Soyez honnête avec lui quant à votre budget et à vos attentes. Les jugements n'ont pas leur place dans une salle de consultation. Le vétérinaire a comme objectif d'aider votre animal.

Qui sont les vétérinaires ?

Une bonne majorité d'entre eux sont des individus sensibles et perfectionnistes, amoureux des animaux. Ils ne vont pas dans ce métier pour faire du profit et ne cherchent pas à utiliser vos émotions et votre vulnérabilité. Si vous ne vous sentez pas en confiance avec un vétérinaire, c'est correct, on ne peut pas se sentir à l'aise avec tout le monde. Cherchez et vous trouverez.



êtes l'expert de :

- votre animal
- ses habitudes de vie
- ses changements de comportement
- son apparence physique normale
- ce qui ne va pas

est l'expert des :

- notions médicales
- maladies
- symptômes
- tests à faire
- traitements à essayer

Votre point commun :
le bien-être de
votre animal


Votre vétérinaire est votre **conseiller**.
Ensemble, vous faites partie de la même **équipe** pour aider
votre animal à se sentir à son meilleur.

Osez demander

Vous sortez de votre rendez-vous et n'êtes tout d'un coup plus certain d'avoir compris pourquoi votre animal doit prendre un traitement ? Ou alors, vous ne comprenez pas tout à fait de quoi souffre votre animal ? Votre vétérinaire peut parfois aller un peu vite; son cerveau fonctionne toujours à toute vitesse, mais vous pouvez lui rappeler de prendre son temps !

Demandez-lui des explications si vous ne comprenez pas...

- Le diagnostic de votre animal, de quoi il souffre
- À quoi sert un test diagnostic
- À quoi sert le ou les traitements
- Dans quel ordre ou à quel moment donner les traitements
- Le pronostic



N'hésitez pas à lui demander...

- De vous écrire les informations sur une feuille et/ou vous envoyer un courriel récapitulatif
- De vous écrire un plan de traitement avec un horaire pour les médicaments
- Quels symptômes sont à surveiller à la maison
- De vous transcrire les résultats des tests effectués

N'hésitez pas à verbaliser...

- Votre budget
- Vos attentes
- Vos inquiétudes
- Si vous n'êtes pas satisfait du plan (avant de quitter la salle de consultation!)



À quoi ça sert...

PRISE DE SANG GÉNÉRALE

- Hématologie (globules rouges, globules blancs, plaquettes)
- Biochimie (paramètres des reins, foie, électrolytes, thyroïde).
- Permet d'identifier plusieurs problèmes de santé, comme insuffisance rénale, problème hépatique, anémie, diabète, etc.

PRISE DE SANG SPÉCIFIQUE

- Pour identifier par exemple, des maladies transmises par les tiques et des maladies félines (sida, leucémie) et canines (parvovirus, vers du coeur)
- Pour diagnostiquer des maladies spécifiques

ANALYSE D'URINE

- Aussi appelée urologie
- Pour identifier une infection urinaire, la présence de cristaux urinaires, des cellules anormales dans l'urine
- Pour voir la densité urinaire et la présence de protéines - lors de problèmes rénaux
- Pour voir la présence de sucre ou cétones dans l'urine (diabète)

RADIOGRAPHIES

- Pour identifier un problème osseux (arthrose, fracture, hernies discales, etc.)
- Pour identifier des calculs rénaux ou vésicaux
- Pour observer le degré d'un blocage urinaire ou intestinal
- Pour voir la présence de masses ou de métastases
- Pour évaluer la forme et la grosseur du cœur
- Pour évaluer la forme et la grosseur des organes internes
- Pour observer les poumons (pneumonie, asthme, etc.)
- Pour voir des foetus et l'utérus
- Il faut au minimum 2 vues pour voir les structures en 3D.

ÉCHOGRAPHIE

- Pour observer les organes en 3D
- Pour prélever de l'urine dans la vessie
- Pour confirmer la présence de liquide libre, de masse ou de foetus

Comment partir votre bébé du bon pied

Ah ! les joies d'accueillir un bébé à la maison ! C'est excitant bien sûr et, si nous faisons attention à quelques éléments, nous mettons toutes les chances de notre côté pour que notre nouveau compagnon vive sa meilleure vie.

Bons plans

- Allez chez le **vétérinaire** une semaine après l'adoption de votre nouveau compagnon, ou avant si vous pensez que votre animal a un problème de santé.
- Faites administrer les **vaccins** nécessaires au mode de vie de votre ami et n'oubliez pas les **rappels** pour une protection complète. Plusieurs vaccins nécessiteront des rappels durant la première année de vie de votre animal.
- Donnez les **vermifuges** recommandés pour éliminer les parasites intestinaux et les **anti-parasitaires** complets si votre animal va dehors.
- Inscrivez votre chien à une **maternelle** et/ou **socialisez-le** avec d'autres animaux et humains, une fois qu'il a les vaccins nécessaires.
- Désensibilisez toutes les **manipulations** qui pourraient être utiles dans sa vie : touchez les pattes, coupez les griffes, touchez la gueule, brossez les dents, touchez et nettoyez les oreilles, etc.
- Prévoyez la **stérilisation** de votre animal à un âge adéquat - votre vétérinaire pourra vous aider à identifier le bon moment - et si d'autres interventions pourraient être faites au même moment.
- Pour certains chiens, prévoyez l'**agrandissement des narines et la correction du palais mou** pour améliorer leur capacité respiratoire et ainsi leur qualité de vie. Pour les chiens actifs et de grandes races, notamment, une **gastropexie**, opération de l'estomac qui consiste à éviter des problèmes de santé graves comme la torsion gastrique, pourrait être nécessaire.
- Prévoyez faire des **radiographies des hanches** lorsque votre chiot est jeune pour dépister rapidement la dysplasie des hanches.

Comment partir votre bébé du bon pied

- Donnez-lui de la **nourriture adaptée** à son âge : pour chatons ou chiots (de grandes races au besoin) pour qu'il ait tous les nutriments nécessaires à sa bonne croissance. Nourrissez-le 3 fois par jour si c'est une petite race.
- Validez avec votre vétérinaire les quantités administrées et prévoyez d'un plan d'action pour garder votre animal à son **poids santé** dès son plus jeune âge.
- Évitez les sports avec forts impacts répétés durant la croissance.
- Débutez l'**activité physique** légère à modérée (marche, jogging léger) pour favoriser une bonne musculature.

Non, il n'est pas vrai qu'il faut empêcher votre bébé chien de monter et descendre les escaliers pour protéger ses articulations ! Cela le rendra simplement anxieux d'utiliser les escaliers...

- Identifiez et **agissez précocement** si vous pensez que votre animal a des problèmes de comportements et/ou de l'anxiété. Faites affaire avec des **éducateurs canins/félins** et obtenez de la médication de votre vétérinaire au besoin.
- Renseignez-vous sur les **assurances** pour animaux et souscrivez-y. Faites-le quand votre animal est jeune et qu'il n'a aucun problème de santé connu. Ceci vous permettra d'avoir l'esprit tranquille lorsque votre animal aura besoin de soins.



TOP 5

*Des bonnes habitudes pour
garder son animal en santé*

1. Choisir une nourriture de qualité



2. Développer une bonne hygiène dentaire



3. Faire de l'activité physique quotidienne



4. Favoriser un poids santé



5. Aller à l'examen annuel vétérinaire



Les assurances animales

Demandez-le à votre vétérinaire, les gens qui ont souscrit à une assurance animale pour leur animal de compagnie sont généralement beaucoup moins stressés lors de leurs rendez-vous. Les gens ayant une assurance animale ont tendance à :

- Venir **consulter plus rapidement**, ce qui favorise une prise en charge rapide et, ainsi, une diminution de l'aggravation du problème de santé.
- **Accepter les tests diagnostics**, ce qui permet de trouver plus rapidement le problème dont souffre l'animal
- Accepter les **traitements** plus facilement
- **Accepter les chirurgies**, ce qui peut sauver la vie de l'animal et/ou alors améliorer grandement sa qualité de vie
- Avoir recours à la **médecine alternative** plus facilement (physiothérapie, acupuncture, ostéopathie, etc.)
- Faire des **traitements de prévention** plus souvent (par exemple, les détartrages sous anesthésie générale).

Exemples de prix :

Chirurgie abdominale d'urgence : 3000-6500\$

Chirurgie orthopédique : 5000\$

Rendez-vous d'urgence : 250\$

Échographie spécialisée : 550-900\$

Radiographies de l'animal : 250\$

Traitements maladie cardiaque : 300\$/mois

Hospitalisation 1 semaine : 3000\$ et plus

Exemples d'assureurs

Petline

(Costco, Pets + Us, Petsecure)

Trupanion

Le meilleur moment pour souscrire à une assurance est à la suite du premier rendez-vous vétérinaire, lorsque votre animal est bébé. Toutefois, il n'est jamais trop tard pour acheter une assurance animale. Discutez-en avec votre vétérinaire !

Assurances animales

TRUCS DE PRO

COMPAREZ

Explorez et comparez les différentes assurances qui sont disponibles sur le marché.

FAITES PLUSIEURS SOUMISSIONS

Faites une soumission pour votre animal comme s'il avait :

- 1 an;
- 5 ans;
- 10 ans.

Vous verrez comment diffèrent les prix des différents assureurs selon l'âge de votre animal et ce que vous risquez de payer plus tard.

AUTRES SERVICES

Explorez les autres services qui sont compris dans les différents forfaits : médecine alternative (comme l'acupuncture, l'ostéopathie), l'euthanasie, l'incinération, le choix d'urne, les frais dentaires, les examens préventifs annuels, les vaccins, etc.

Règles d'or du vétérinaire

Plusieurs obligations dictent les vétérinaires dans leur métier et dans les décisions qu'ils prennent et il est important de comprendre ce que l'Ordre des médecins vétérinaires exige de ses membres.

- Un examen annuel est requis pour pouvoir prescrire toute médication. En effet, les renouvellements de médication auxquels vous avez droit se terminent après un an. Même si votre animal prend une médication pour un problème chronique, le vétérinaire doit refaire un examen annuel pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication pour continuer la médication.
- Un examen complet de l'animal est demandé à chaque nouveau problème, car celui-ci pourrait être accompagné d'autres symptômes que seul l'examen peut dévoiler.
- Il est important de comprendre que tout acte est à la discrétion du vétérinaire. Ces actes comprennent les procédures médicales, les prescriptions et même l'euthanasie. Donc, personne ne peut obliger un vétérinaire à accomplir un acte, quelle que soit la situation, ce dernier ne doit se fier qu'à son jugement.
- Les renouvellements de prescriptions sont aussi un acte pour lequel les vétérinaires utilisent leur jugement pour les guider. Ils peuvent donc choisir de renouveler le médicament seulement deux fois, ou ils peuvent renouveler pour l'année. À noter qu'aucun renouvellement ne peut dépasser 1 an et que les narcotiques, qui sont des médicaments contrôlés, ne peuvent pas avoir de renouvellements : le vétérinaire peut, par contre, prescrire une certaine quantité et émettre des fractionnements mensuels.
- Le dossier médical n'est pas une propriété du vétérinaire ou de la clinique où il travaille, mais bien la propriété du client. Aucun vétérinaire ne peut refuser à un client l'accès au dossier de son animal.
- Si vous pensez être lésés lors d'une visite au vétérinaire, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) est là pour vous guider dans ces situations parfois frustrantes ou difficiles à comprendre. Rappelons-nous toutefois que la majorité des frustrations provient d'une mauvaise communication et/ou compréhension. Téléphonez à votre vétérinaire pour discuter avec lui et - vous verrez - votre problème risque de se régler la plupart du temps !

Les vaccins canins

Il existe plusieurs vaccins disponibles pour nos animaux de compagnie. Il peut parfois être difficile de savoir si votre animal a besoin de tous les vaccins ou seulement de quelques-uns. En voici quelques-uns concernant les chiens.

Vaccin	Recommandé	Détails
De base (Distemper, Adénovirus, Parvovirus +/- parainfluenza)	Dès 8 semaines de vie	Le Parvovirus et le Distemper sont des maladies pouvant être mortelles chez les chiots.
Rage	Dès 12 semaines de vie	Bien que rare au Québec, cette maladie est mortelle et peut se transmettre aux humains. Il y a de plus en plus de cas.
Leptospirose	Dès 12 semaines de vie, pour les chiots qui aiment jouer dehors, boire dans les cours d'eau, avoir le nez dans le gazon, aller au parc à chiens, aller au chalet, etc.	Bactérie que l'on trouve dans l'urine des mammifères sauvages et qui se retrouve dans le sol et principalement les cours d'eau. Peut endommager les reins et le foie et peut se transmettre à l'humain.
Bordetella	Dès 8 semaines de vie, pour les chiots qui auront des contacts avec d'autres chiens (obligatoire pour les chenils)	Bordetella est un des pathogènes pouvant causer la toux de chenil. Le vaccin permet de réduire grandement les symptômes lorsqu'un chien contracte la maladie.
Lyme	Pour les chiens à risques de rencontrer des tiques (chalet, marches en montagnes et en forêt, cours avec des haies de cèdres, etc.)	La meilleure protection contre les tiques demeure la prévention parasitaire mensuelle, mais la vaccination peut donner une protection supplémentaire aux chiens très à risque.



Discutez avec votre vétérinaire du mode de vie de votre animal et n'hésitez pas à communiquer vos inquiétudes par rapport à la vaccination, si vous en avez.

Les vaccins félins

Il existe plusieurs vaccins disponibles pour nos animaux de compagnie. Il peut parfois être difficile de savoir si votre animal a besoin de tous les vaccins ou seulement de quelques-uns. En voici quelques-uns concernant les chats.

Vaccin	Recommandé	Détails
De base (Rhinotrachéite féline, Calicivirus, Panleucopénie)	Dès 8 semaines de vie	La rhinotrachéite féline est une maladie chronique. La vaccination peut les protéger ou, du moins, réduire la sévérité de la maladie.
Rage	Dès 12 semaines de vie, surtout pour les chats qui vont dehors.	Bien que rare au Québec, cette maladie a un taux de mortalité de 100% et peut se transmettre aux humains. Il y a de plus en plus de cas.
Leucémie féline	Dès 12 semaines de vie, pour les chats qui vont dehors ou qui risquent d'avoir un contact avec un chat atteint de la maladie. Les chats de moins de 2 ans sont plus à risque de développer la maladie que les chats adultes.	La leucémie féline est un virus dont le pronostic peut varier, mais qui une fois la maladie déclenchée a un pauvre pronostic.



Discutez avec votre vétérinaire du mode de vie de votre animal et n'hésitez pas à communiquer vos inquiétudes par rapport à la vaccination, si vous en avez.

Réactions vaccinales

Comme chez les humains, les animaux peuvent ressentir certains effets secondaires après avoir reçu un ou des vaccins. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire.

Réactions normales et fréquentes

- Sensibilité de la zone de vaccination
- Petite bosse, enflure à la zone de vaccination
- Boiterie légère, durant moins de 24h
- Fatigue pour 24h
- Baisse de l'appétit pour 24h



Réactions normales, moins fréquentes

- 1 ou 2 vomissements
- Diarrhées
- Fatigue intense de plus de 24h

Appelez votre vétérinaire pour l'informer. Des précautions pourront être prises lors des prochains vaccins.

Réactions anormales

RARES

- Plusieurs vomissements
- Anorexie
- Animal amorphe
- Convulsions
- Choc anaphylactique

Appelez immédiatement votre vétérinaire pour assistance. Retournez en clinique pour que votre animal reçoive des soins de support. Si votre clinique est fermée, consultez un centre d'urgence.

Conseil : attendez 15 minutes chez votre vétérinaire

Au cas où il y aurait une réaction allergique (appelée anaphylaxie) au vaccin. Habituellement, le visage gonfle et il peut y avoir difficulté respiratoire. Votre vétérinaire a tout ce qu'il faut pour réagir rapidement.

Règle du 3-2-1

À la suite d'un vaccin, une petite bosse peut apparaître. Consultez votre médecin vétérinaire si :

3

La bosse demeure présente **3** mois après la vaccination

2

La bosse fait plus de **2** cm de largeur

1

La bosse continue de grossir **1** mois après la vaccination

Ceci est une réaction vaccinale anormale. Un échantillon de la masse sera prélevé et envoyé au laboratoire pour identifier sa nature.




Les parasites

Ah ! les parasites, ces petites bestioles indésirables qui peuvent compliquer la vie de votre animal ! N'hésitez pas à discuter du mode de vie de votre animal avec votre vétérinaire pour identifier le meilleur anti-parasitaire.

Règles d'or

Les bébés devraient recevoir des **vermifuges** - des traitements contre les parasites internes (les vers) - à plusieurs reprises jusqu'à l'âge de 6 mois.



Tous les animaux ayant accès à l'extérieur (même les chats qui se promènent seulement sur votre balcon !) devraient recevoir un **anti-parasitaire** contre les parasites externes, entre autres les puces et les tiques. Avec le réchauffement climatique, ces parasites sont présents de plus en plus longtemps et parfois même pendant les mois d'hiver.

Les tiques du Québec peuvent transmettre la **maladie de Lyme**, l'Erlichiose et l'Anaplasmose. La meilleure protection contre ces maladies demeure la protection parasitaire mensuelle.

Les chiens sont particulièrement sensibles aux **vers du cœur**, une maladie transmise par les moustiques lors des mois chauds.

Les animaux qui chassent et qui mangent beaucoup de choses au sol devraient recevoir des anti-parasitaires complets, comprenant un vermifuge mensuel.

Les chiens qui mangent de la **nourriture crue** devraient recevoir un vermifuge mensuel.

Il existe des anti-parasitaires sous forme de comprimés à avaler ou topiques à appliquer sur la peau. Il en existe uniquement contre les parasites externes et d'autres plus complets, avec vermifuge contre les parasites internes. Certains, contre les parasites externes, sont en vente libre.



ATTENTION

Certains produits en vente libre contiennent de la **perméthrine**, un produit **extrêmement toxique** pour le chat et qui peut causer leur **décès**.



Lisez toujours la liste des ingrédients, ainsi que les contre-indications avant d'utiliser un produit. Sachez aussi que si vous utilisez la perméthrine sur votre chien, tout contact avec votre chat peut être extrêmement dangereux.

Demandez conseil à votre vétérinaire avant d'utiliser n'importe quel produit sur vos animaux.

Les anti-parasitaires

Maintenant : « Comment choisir l'anti-parasitaire adapté pour mon animal ? »
Votre vétérinaire pourra vous aider à y voir plus clair en vous posant quelques questions. Voici des exemples:

*Est-ce que votre chien prend des marches
et aime passer du temps dehors ?*

Si oui, votre chien bénéficierait d'un anti-parasitaire complet mensuel pendant la saison estivale, qui le protège contre les parasites externes, internes et les vers du cœur.

Est-ce que votre chat va dehors librement ?

Si oui, votre chat bénéficierait d'un anti-parasitaire complet mensuel, qui le protège contre les parasites externes et internes (qu'il peut attraper lors de la chasse).

*Est-ce que votre chat est un chat de maison
qui ne va jamais dehors ?*

Si oui, votre chat bénéficierait d'une coprologie annuelle (une à deux fois par année) pour identifier et éliminer de potentiels parasites internes. Toutefois, la protection contre les parasites externes n'est pas essentielle dans ce cas-ci.

Dans tous les cas, votre médecin vétérinaire choisira le produit le plus adapté pour les habitudes de vie de votre animal, tout en prenant en compte l'état de santé de votre ami.

ATTENTION

Les chiens et les chat qui **chassent** - c'est-à-dire qui attrapent et mordent dans les animaux de la faune - devraient recevoir un anti-parasitaire mensuel **complet**.



Certains parasites qu'ils sont à risque d'attraper peuvent être **dangereux pour eux** et peuvent être des **zoonoses** (pouvant se transmettre aux humains!)



Les animaux qui mangent de la **nourriture crue** sur une base régulière devraient aussi recevoir un **anti-parasitaire** mensuel complet.



Discutez avec votre vétérinaire des habitudes de vie de votre animal pour obtenir la meilleure protection pour toute la famille.

Mon animal a une tique !

Vous remarquez une tique accrochée et bien engorgée dans la peau de votre animal. Quoi faire maintenant ? Comment savoir si votre animal a pu attraper une maladie transmise par les tiques ?

La retirer sécuritairement et rapidement

Il existe des pinces spécialisées pour attraper la tique à sa base et la retirer en la tournant sur elle-même pour plusieurs tours. Ceci est le meilleur moyen, car il permet de retirer la tique dans son entièreté. En effet, il faut faire attention, en tirant sur la tique, de ne surtout pas la briser en deux et de laisser sa tête dans la peau.

- **Ne pas tirer** sur la tique d'un coup : cela risquerait de la briser en deux.
- **Ne pas écraser** la tique : cela pourrait envoyer son contenu et les maladies, le cas échéant, dans l'animal.
- **Ne pas brûler** la tique : vous risqueriez de brûler la peau de votre animal.

La faire identifier

Si vous êtes inquiet, vous pouvez amener la tique chez votre vétérinaire, pour que celui-ci l'envoie au laboratoire pour identification : c'est seulement la tique *Ixodes scapularis* qui peut transmettre la maladie de Lyme. Si la tique est *Ixodes scapularis*, le laboratoire pourrait aussi vérifier si elle était porteuse de maladies. À savoir que ces tests devront être faits à vos frais.

Dépister les maladies

Environ 6 semaines après la morsure de tique, vous pouvez emmener votre animal chez votre vétérinaire pour que celui-ci prenne un peu de sang et fasse un test spécialisé pour identifier certaines maladies transmises par les tiques. Il faut habituellement que la tique soit accrochée à l'animal pour 24 à 48h pour transmettre des maladies.



ATTENTION



Les produits naturels, les huiles essentielles et les colliers à ultra-sons ne sont pas des antiparasitaires fiables.

Demandez conseil à votre vétérinaire.



La stérilisation

La stérilisation consiste à rendre votre mâle ou femelle stérile (qui ne peut plus se reproduire). Pour le moment, il y a plus d'avantages que d'inconvénients à faire stériliser votre animal de compagnie.

Pour les mâles

Pour les mâles, la castration consiste à retirer les 2 testicules qui se trouvent dans le scrotum. La technique diffère un peu pour les chats et les chiens, mais le résultat est le même.

Pour les chiens, il est recommandé d'attendre la fin de la croissance. Plus le chien est de grande race, plus ceci est important.

Avantages:

- Diminution de l'agressivité, des risques de fugue et des comportements inappropriés associés à la testostérone
- Diminution du marquage chez les chats (odeur très désagréable !)
- Disparition des risques de cancers testiculaires
- Diminution des problèmes associés à la prostate

Pour les femelles

Pour les femelles, différentes techniques peuvent être utilisées, principalement l'ovario-hystérectomie (retrait des ovaires et le corps de l'utérus) et l'ovariectomie (retrait des ovaires).

Avantages:

- Disparition des risques de pyomètre (infection de l'utérus)
- Diminution des risques de cancers mammaires, utérins et ovariens.

Petites races de chiens :

vers 6 mois

Grandes races de chiens :

entre 12 et 18 mois

Chats :

vers 5-6 mois

Petites races de chiennes :

vers 6 mois

Grandes races de chiennes :

entre 1^{ère} et 2^e chaleur

Chattes :

vers 5-6 mois


Pourquoi mon vétérinaire me recommande-t-il une nourriture pour chiots ou chatons ?

Tout simplement parce que ces nourritures contiennent tous les nutriments dont votre bébé a besoin pour sa croissance. Elles contiennent aussi la bonne quantité de calcium, essentiel pour le bon développement des os. Il existe d'ailleurs des nourritures pour chiots grandes races, spécialement conçues pour ces très grands bébés.

Et la nourriture « Tout âge/tout stade » dans tout ça ?

Il faut savoir que ce type de nourriture est adapté pour la catégorie d'animal qui a les plus grands besoins métaboliques. Elle est donc adaptée pour les chiennes et chattes gestantes (enceintes). Elles sont par le fait même extrêmement caloriques.

En étant des nourritures « tout stade », elles sont simplement « correctes » pour tous les stades de vie. Elles ne sont toutefois pas idéales !



Pourquoi mon vétérinaire me met-il en garde contre certaines nourritures ?

Votre vétérinaire doit suivre son code de déontologie, qui stipule qu'il doit vous présenter ce qui a été étudié et prouvé pour causer des bienfaits à votre animal. C'est donc en se basant sur les faits scientifiques que votre vétérinaire vous fera ses recommandations. Par la suite, vous pourrez faire des choix éclairés !

La nourriture crue

Cet e-book n'a pas comme objectif de décourager l'alimentation que vous avez choisie pour votre animal, mais de vous présenter le point de vue de plusieurs vétérinaires. La nourriture crue est généralement **déconseillée** pour deux raisons :

— SANTÉ PUBLIQUE

La nourriture crue sous toutes ses formes peut contenir des bactéries (*Salmonella*, *Campylobacter*, *Clostridium*) et des parasites qui peuvent être un danger pour la santé de votre animal et celle des humains autour. Un animal qui mange du cru ne devrait pas avoir de contacts rapprochés avec les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes immunosupprimées. Des cas de Salmonelles multi-résistantes dont l'origine était la nourriture crue pour animaux de compagnie ont été recensés au Canada dans les dernières années.

— FRACTURES DENTAIRES ET CORPS ÉTRANGERS

Lorsque le cru est sous forme de viande crue avec des os, des fractures au niveau des dents peuvent survenir. Ces mêmes os peuvent aussi causer du tort au niveau du tractus digestif (rester coincé, déchirure de l'œsophage, etc.)


La nourriture sans grains

Il n'existe pas de preuves scientifiques comme quoi la nourriture sans grains peut causer des problèmes de santé aux animaux. Toutefois, un **risque** de développement de maladie cardiaque a été soulevé dans les dernières années. Effectivement, de plus en plus d'animaux qui n'étaient pas prédisposés à développer des maladies cardiaques ont été diagnostiqués avec ces maladies. Il a été démontré que plusieurs de ces animaux mangeaient du sans grains.

La mode du sans grains vient à la base du concept que les chiens et les chats, dans leur état naturel, ne mangeraient pas de grains (blé, orge, maïs, etc). Les grains dans les croquettes sont essentielles pour leur mise en forme, mais comportent aussi des nutriments importants. Les nourritures sans grains, afin de remplacer les grains, vont plutôt utiliser des patates douces ou des pois chiches, notamment : nous ne sommes pas convaincus que les chiens et les chats, dans leur état naturel, mangeraient cela non plus ! C'est donc un *pensez-y bien* si vous désirez prendre ce risque.

Les diètes maison

Rien de mal à décider de cuisiner pour votre ami poilu. Toutefois, il faut que la nourriture offerte réponde à tous ses besoins nutritionnels : le nombre de calories, les sucres, les protéines, les lipides, les acides gras, les différentes vitamines, etc. Si la diète maison est celle que vous choisissez, discutez avec votre vétérinaire - et parfois un vétérinaire spécialiste en nutrition - pour ne rien oublier.



Comment choisir un jouet sécuritaire ?

Il existe tellement de jouets pour animaux de compagnie : beaucoup d'entre eux sont très attrayants visuellement, mais rappelez-vous toutefois que l'apparence physique du jouet n'a aucun intérêt pour votre animal. Ce qu'il faut, c'est que le jouet soit **utile** et **sécuritaire** !

Chiens

Optez pour des jouets robustes, par exemple ceux en caoutchouc (Kong). Ceux-ci peuvent souvent être remplis par des gâteries ou de la conserve (pour occuper votre animal longtemps).




Attention aux jouets trop petits que vos chiens pourraient avaler tout rond, aux balles qui pourraient se loger et se coincer dans la gorge, et aux os et objets trop durs qui pourraient causer des lésions aux dents.

Si votre animal préfère des cordes ou des toutous, assurez-vous qu'il n'est pas en mesure de les détruire et de les avaler.

Chats

Les meilleurs jouets sont souvent les plus simples : donnez à votre chat une boîte en carton vide. La majorité des chats adore le carton !

Attention aux jouets trop petits qui pourraient être avalés tout rond, ainsi qu'aux jouets avec des petites parties détachables (pensons aux yeux des petites souris). Enfin, ne laissez jamais votre chat en présence d'une corde sans surveillance, par exemple les bâtons avec une corde pour que votre chat chasse, pour éviter son ingestion.



Prendre soin de votre animal adulte

Bons plans


- Offrez à votre animal un **examen vétérinaire annuel**, même s'il n'a pas besoin de vaccins. Ceci permettra au vétérinaire d'identifier de nouvelles pathologies, par exemple un souffle cardiaque, des cataractes ou une luxation des genoux, qui pourraient finir par poser problème. Il vaut mieux agir plus rapidement que trop tard.
- N'oubliez pas les **vaccins** dont votre animal a besoin selon son mode de vie. Essayez d'éviter d'être en retard pour les rappels.
- Donnez la **prévention parasitaire** si votre animal est à risque.
- Pour votre chien, effectuez annuellement (ou aux 2 ans) le **bilan sanguin** servant à identifier les maladies transmises par les tiques et les vers du cœur. Ces maladies sont traitables quand on les prend à temps. On l'appelle communément le Snap 4dx.
- Offrez à votre animal de la **nourriture de bonne qualité**. Un animal en santé peut effectivement manger n'importe quelle nourriture sans problème, mais les nourritures de qualité permettent de **prévenir** certains problèmes de santé. De plus, si votre animal ne souffre d'aucune maladie, la nourriture dentaire est fortement recommandée pour limiter l'accumulation de tartre.
- Offrez à votre animal des **détartrages** sous anesthésie dès que de la gingivite apparaît pour éviter de devoir extraire des dents plus tard.
- N'attendez pas pour prendre rendez-vous si vous observez quelque chose de différent chez votre animal.
- Gardez votre animal à son **poids santé**. S'il devient en embonpoint, faites-lui perdre du poids avant qu'il ne devienne vieux. Le poids santé permet de ralentir l'apparition de l'arthrose et diminue les risques de plusieurs maladies comme le diabète.
- Faites lui faire de l'**activité physique** régulièrement.

Prendre soin de votre animal gériatrique

Bons plans

- Offrez à votre animal un **examen vétérinaire aux 6 à 12 mois**, même s'il n'a pas besoin de vaccins. Ceci permettra au vétérinaire d'identifier de nouvelles pathologies, par exemple un souffle cardiaque, des cataractes ou une luxation des genoux, qui pourraient finir par poser problème. Il vaut mieux agir rapidement que trop tard.
- Planifiez un **bilan sanguin annuel** (ou aux 2 ans) dès que votre animal est considéré gériatrique (âgé). De nombreuses pathologies débutantes peuvent être observées via les bilans sanguins avant même que les premiers symptômes physiques n'apparaissent.
- Offrez à votre animal de la **nourriture de qualité** pour animaux âgés : les nourritures Gériatriques, Senior, Rénales et Cardiaques sont habituellement de bons choix. Elles contiennent des protéines de haute qualité et sont notamment faibles en sel.
- Ajoutez des **suppléments** pour aider les articulations de votre vieil ami.
- Restez à l'affût pour tout signe d'inconfort : intolérance à l'exercice, bouge moins, mange moins, ne saute plus, ne monte/descend plus les escaliers/meubles/comptoirs, reste couché, boiterie, etc. Il existe de nombreux **médicaments pouvant aider la douleur** chez nos animaux âgés.
- Faites un **suivi du poids** de votre animal. Consultez votre vétérinaire s'il prend ou perd du poids inexplicablement.
- Restez à l'affût de **perte de qualité de vie** chez votre animal.

Quel âge a mon animal en « âge humain » ?



ÂGE RÉEL EN ANNÉES	1/2	1	2	3	5	7	9	11	13	15
CHATS	6	18	24	28	36	44	52	60	68	76
PETIT CHIEN	10	20	28	32	40	48	56	64	72	80
MOYEN CHIEN	6	18	27	33	45	57	69	80	90	102
GRAND CHIEN	5	16	22	31	49	67	85	105	120	----



Animal gériatrique

Plus les chiens sont de grandes races, plus leur vieillissement est exponentiel.
Effectivement, les petites races de chiens ont une plus longue espérance de vie que les grandes races.

Ce tableau est évidemment à prendre à la légère, mais donne une idée globale du vieillissement de nos animaux.

Les animaux gériatriques se méritent une prise de sang annuelle pour vérifier que tout est beau. Effectivement, de nombreux problèmes de santé peuvent être détectés rapidement à la prise de sang, avant même que des symptômes ne soient visibles chez votre animal.



Mon vieil animal ralentit...

Lorsque notre animal vieillit, nous observons parfois un ralentissement au niveau de ses activités : il prend des marches de moins en moins longues, se lève moins pour jouer, dort plus en général, mange moins, saute moins, etc. Est-ce que cela est dû au vieillissement normal ?

Causes possibles

— De la douleur

La grande majorité des animaux de compagnie vont développer de l'arthrose en vieillissant. Dans de nombreux cas, ils ne vont pas boiter, mais les signes seront beaucoup plus subtils. Souvent, les animaux seront simplement plus calmes.

Une autre cause de douleur chronique fréquente est la douleur buccale. Les plus vieux animaux peuvent avoir tellement de tartre et de gingivite que leurs dents branlent, suite à une perte d'attache de la dent. Ce type de douleur rend nécessairement les animaux plus amorphes et ils peuvent parfois moins manger.

— Une maladie sous-jacente

De nombreuses maladies peuvent rendre nos animaux plus calmes et moins tolérants à l'exercice. Pensons notamment aux maladies cardiaques, maladies rénales, etc.



Si votre animal semble plus au ralenti qu'avant, prenez un rendez-vous avec votre vétérinaire. Plus souvent qu'autrement, un problème de santé expliquera ce ralentissement.

Comment savoir s'il est temps de dire au revoir

Il est évident que, lorsqu'on accueille un animal chez soi, il risque de quitter ce monde avant nous. Ce n'est pas pour autant que prendre cette décision est facile. En médecine vétérinaire, nous avons toutefois la chance de pouvoir dire au revoir à notre ami d'une **façon calme et paisible**.



Quand ?

En règle générale, les vétérinaires s'entendent pour accepter de procéder à l'euthanasie si :

- L'animal a une **maladie** débilitante ou qu'il est en fin de vie
- L'animal n'a plus de **qualité** de vie

A-t-il encore sa qualité de vie ?

La réponse à cette question demeure subjective. Votre animal peut avoir une diminution de sa qualité de vie s'il :

- Souffre (ex : douleur liée à l'arthrose, un cancer, etc.)
- Ne veut plus manger
- Ne veut plus se lever (par exemple, pour vous accueillir)
- N'a plus envie de prendre ses marches, de jouer, de faire ce qui le rend habituellement heureux
- Ne vient plus vous coller ou vous voir
- Se cache
- A une maladie débilitante, est en soins palliatifs et on ne veut pas attendre que son état se détériore (ex : cancer, maladie rénale sévère, maladie cardiaque, etc.)

*Il vaut mieux dire au revoir une semaine
trop tôt qu'un jour trop tard.*

MON ANIMAL A-T-IL ENCORE UNE BELLE QUALITÉ DE VIE ?

	OUI	NON
Mon animal a une maladie incurable	☐	☐
Mon animal a une maladie reconnue pour causer de la douleur	☐	☐
Mon animal se lève rarement, dort la majorité du temps	☐	☐
Mon animal mange très peu	☐	☐
Mon animal se cache souvent	☐	☐
Mon animal ne tolère plus que je le touche/ flatte comme avant	☐	☐
Mon animal a changé de comportement	☐	☐
Mon animal semble plus souvent irritable	☐	☐
Mon animal ne se toilette plus	☐	☐
Mon animal a plus de mauvaises journées que de bonnes	☐	☐
Mon animal a plusieurs médicaments qui ne sont pas faciles à donner	☐	☐
Ma propre qualité de vie a diminué par rapport aux soins que je dois donner	☐	☐

Si vous avez répondu « oui » à plusieurs de ces questions, il est temps d'avoir une conversation concernant la qualité de vie de votre animal avec votre vétérinaire. La majorité du temps, toutefois, vous aurez une intuition, concernant le moment où il est temps de dire au revoir à votre animal.

Les étapes de l'euthanasie

Une fois que la décision de dire au revoir à votre animal est prise, l'équipe vétérinaire fera tout en son possible pour que ce moment soit paisible pour votre animal et vous. Vous avez le droit d'être présent durant toutes les étapes, ou d'être absent.

Sédation

La majorité du temps, le médecin vétérinaire administrera à votre animal une sédation, qui contient un fort calmant et un puissant anti-douleur. Agissant en quelques minutes, il enlèvera tout inconfort et douleur à votre animal pour lui permettre de se reposer pleinement. Il s'endormira, **comme lorsqu'il s'endort pour la nuit.**

Injection pour arrêter le cœur

Lorsque votre animal sera endormi et que vous serez prêt, le vétérinaire procèdera à l'injection d'un produit pour stopper les battements cardiaques. Cette étape prend habituellement quelques secondes. Parfois, il placera au préalable un cathéter intraveineux pour avoir un accès sûr à la veine. **Votre animal ne ressent rien à cette étape.**

Disposition du corps

Une fois que vos adieux seront terminés, l'équipe vétérinaire disposera du corps de façon respectueuse jusqu'à ce que la compagnie de crémation vienne chercher votre animal. La crémation sera faite et, si désiré, les cendres ou des souvenirs vous reviendront.



Réactions normales lors de l'euthanasie :

- Yeux qui restent ouverts
- Spasmes musculaires ou vocaux
- Tension dans les membres
- Dernier souffle ou respiration audible
- Animal qui urine ou défèque



Merci

« L'euthanasie est la
dernière preuve d'un
amour absolu. »

Avec amour,
ton ami



Le deuil animalier

Le deuil d'un animal de compagnie peut être tout aussi réel et écrasant que le deuil d'un être humain qui nous était cher. Les animaux font intégralement partie de la famille et sont un membre à part entière. Beaucoup de nos souvenirs sont marqués par leur présence. Ainsi, leur absence peut laisser une sensation de vide insurmontable.

Le deuil comprend plusieurs étapes. Chaque personne vit son deuil différemment et toutes les façons de le faire sont bonnes. Il est normal de ne pas vivre toutes les étapes, de les vivre dans le désordre, de revenir en arrière, de rester plus longtemps dans certaines phases, etc.

LE CHOC : que notre animal nous ait quitté subitement ou qu'il se soit éteint tranquillement au fil des semaines, la mort d'un animal est toujours un choc. Nous pouvons avoir l'impression de ne plus être fonctionnel dans notre vie de tous les jours.

LE DÉNI : la perte de notre animal peut nous sembler dure à croire, irréelle.

LA COLÈRE/LA CULPABILITÉ : on peut être tenté de chercher un coupable : le vétérinaire qui n'a pas su sauver notre compagnon, l'autre chat avec qui votre coco s'est bagarré, nous-mêmes, etc. On peut s'en vouloir d'avoir procédé à l'euthanasie.

LA TRISTESSE : il est très difficile de penser à notre animal sans ressentir de la peine. Voir ses anciens jouets, lit, toutous, nous font souffrir. Regarder les photos de lui nous fait sentir peiné. Il est normal de pleurer.

L'ACCEPTATION : la douleur ne disparaît parfois jamais, mais elle est supportable. Nous pouvons continuer à faire nos activités sans trop y penser. Les souvenirs laissent maintenant place à de la nostalgie et de la paix, plutôt qu'à de la tristesse.

Si vous pensez avoir besoin de plus de soutien à la suite de la perte de votre animal, n'hésitez pas à le verbaliser à votre équipe vétérinaire. Il existe de nombreuses ressources pour vous aider à passer au travers de cette épreuve.

J'ai trouvé un chat errant

Parfois il est impossible de résister à la binette du chaton errant qui vient vous visiter fréquemment sur votre perron, ou alors de celui qui se cache sous votre voiture l'hiver. Que faire si vous trouvez un chat errant ?

1

On emmène le chat dans un refuge ou une clinique vétérinaire pour vérifier s'il possède une micropuce. S'il en possède une, cela nous permettra de contacter sa famille.

2

Si on décide de le garder, on l'isole des autres animaux de la maison. Il pourrait être porteur de parasites internes ou externes, ou encore de maladies virales.

3

Si le chat semble en santé, on l'amène chez le vétérinaire après 7 jours pour son premier examen. Il pourra alors recevoir ses vaccins et ses anti-parasitaires. Des tests pourront aussi être effectués pour vérifier la présence de certaines maladies. Si le chat semble avoir besoin de soins à son arrivée chez vous, allez-y immédiatement.

4

On attend encore selon les consignes du vétérinaire pour le mettre en contact avec nos autres animaux. On le fait de façon graduelle. Plusieurs techniques existent pour rendre la cohabitation la plus harmonieuse possible. Par exemple, laissez-les se sentir au travers d'une porte ou d'une barrière pour commencer.

Mes chats se détestent

Comme cela peut être frustrant quand nos amis félins ne s'entendent pas bien du premier coup ! Voici quelques faux pas à éviter.

Mes chats se battent

Des chats qui jouent peuvent ressembler à des chats qui se battent. En règle générale, des chats qui jouent vont échanger leur rôle lors de la poursuite. La première fois, le chat A sera la souris, puis ce sera au tour du chat B par la suite. Il ne faut pas tolérer que les chats se blessent et se causent des blessures.

- On ne laisse pas des chats qui se battent le faire jusqu'au bout : il faut les séparer.
- On ne lance pas un objet au sol près des chats qui se battent pour leur faire peur et détourner leur attention de la bataille. Là est justement le problème: cela va leur faire peur et peut donc aggraver le problème.
- On les sépare de façon sécuritaire le temps de trouver de l'aide.

Il est faux de croire que séparer 2 chats qui se battent va simplement repousser le problème à plus tard.
Il faut les séparer !

Un de mes chat bloque l'accès

Un chat qui se tient en haut des escaliers ou dans un cadre de porte peut empêcher l'autre chat de circuler librement. Assurez-vous que vos chats aient plusieurs litières dans plusieurs endroits différents, tout comme la nourriture.

Il existe plusieurs ressources, ainsi que des éducateurs félins et des vétérinaires spécialisés en comportement pour vous aider. Il existe aussi des produits naturels pour aider à la cohabitation, tels que le Feliway.

À quelle fréquence...


Laver les dents ?

- Une fois par jour ! Si on veut agir efficacement sur le tartre, c'est tous les jours que nous devrions brosser les dents.



Nettoyer les oreilles ?

- Cela dépend de votre animal !
- Si votre animal ne fait pas de sécrétions d'oreilles (cire) et ne fait pas d'otite, vous n'êtes pas obligé de nettoyer les oreilles.
- Si votre animal fait beaucoup de cire d'oreilles, nettoyez-les une première fois puis voyez en combien de temps elles reviennent. Cela pourra vous indiquer la fréquence de nettoyage idéale.
- Si votre animal fait des otites, votre vétérinaire pourra vous aider.




Nettoyer les sécrétions d'yeux ?

- Une fois par jour si besoin, en retirant les écoulements et les taches laissés sous les yeux.



Donner un bain ?

- Cela dépend du mode de vie de votre animal : s'il n'est jamais sale, il n'a pas besoin de bain.
- S'il a des problèmes de peau, votre vétérinaire vous aidera à identifier la fréquence des bains à donner et quels produits utiliser.
- Trop de bains peut irriter la peau !




Avoir une portée à la maison

Bien sûr, avoir des chiots ou des chatons peut être une expérience enrichissante et géniale, mais il faut connaître certaines bases pour assurer une mise-bas optimale. **C'est aussi beaucoup de travail !**

Notions de base

Durée de la gestation d'une chienne : **61-65** jours

Durée de la gestation d'une chatte : **63-65** jours



Maman en santé

La maman devrait :

- Avoir un examen vétérinaire
- Passer une radiographie pour identifier le nombre de bébés et vérifier qu'ils vont bien passer dans le canal pelvien
- Recevoir un vermifuge
- Manger de la nourriture pour chatons (riches en nutriments et calories) jusqu'à ce qu'elle ait terminé d'allaiter.

Signes que la mise-bas approche

- Quelques jours avant, la maman peut vomir, uriner plus fréquemment, avoir de la diarrhée.
- Du lait peut couler des mamelles
- 24 heures avant, elle peut avoir une perte d'appétit, sembler fatiguée
- Elle peut chercher l'affection de ses propriétaires ou au contraire, se cacher et vouloir être seule. Elle peut devenir très agitée.
- Vous pouvez commencer à voir des contractions abdominales.
- Si vous suivez la température corporelle, il y aura une chute de température quelques heures avant l'accouchement.

Mise-bas

Quelques jours avant, préparez un « petit nid » pour votre maman, où elle pourra mettre bas en étant tranquille.

Étapes normales de la mise-bas

PHASE 1 : Phase préparatoire

- la maman s'agite, fait les 100 pas
- dure de 5 à 12 heures, parfois 24h
- pertes claires, bouchon muqueux

N'intervenez pas, sauf si urgence.
En cas de doute, téléphonez à
votre vétérinaire.

PHASE 2 : Expulsion des chiots et chatons

- la maman va lécher ce qui entoure les chiots/chatons
- 20 minutes à 1h entre l'expulsion de chaque chiot/chaton est normal
- ils sortent habituellement la tête première

PHASE 3 : Expulsion des placentas

- peut sortir quelques minutes après chaque bébé ou à la toute fin.
- la maman mange souvent le placenta et c'est normal

Ce qui est normal lors de la mise-bas

- Liquide vert foncé qui s'écoule de la vulve
- Écoulements vulvaires rouges-bruns pouvant persister jusqu'à 6 semaines après la mise-bas.

... Et ce qui ne l'est pas

- Contractions abdominales sans apparition d'un bébé depuis plus d'une heure
- Plus de 2h sans contraction alors qu'il reste des bébés
- Rétention placentaire : si le nombre de placentas n'égale pas le nombre de bébés
- Si un bébé est présenté par les fesses et est coincé
- Une maman qui ne prend pas en charge ses bébés
- Une maman qui ne retire par le placenta du bébé (vous pouvez l'aider délicatement)

Quoi faire...

Si la maman ne peut s'occuper d'un bébé qui est resté dans son enveloppe ?

- Lavez-vous les mains.
- Retirez délicatement les membranes en les déchirant avec vos doigts
- Attachez une ficelle sur le cordon ombilical près du bébé, puis un autre nœud quelques centimètres plus loin.
- Coupez le cordon ombilical entre les 2 nœuds.
- Frottez le bébé vigoureusement jusqu'à ce qu'il aboie ou miaule.
- Retirez le nœud restant sur le cordon ombilical dans quelques heures.

Si la maman ne s'occupe pas des bébés ?

- Administrez du lait au goutte à goutte, puis au biberon toutes les **1 à 2 heures**, même la nuit (lait maternisé pour chiens ou chats).
- Laissez-les se reposer. Ils dorment beaucoup, mais se mettent à ramper en criant lorsqu'ils ont faim.
- Gardez les bébés au chaud, parfois il faut une lampe infra-rouge.
- Stimulez les urines et défécations en massant la région uro-génitale après chaque repas.
- Surveillez pour éviter l'écrasement des bébés par la maman.



Contactez votre vétérinaire pour recevoir de l'aide et des conseils. Si la maman abandonne un seul bébé, il se pourrait que celui-ci soit malade.

Ce qui est anormal après la mise-bas


- Une maman qui ne s'occupe pas de ses bébés une heure après la mise-bas. Vous devrez prendre le relais.
- Une mère abattue, anorexique
- Des écoulements vulvaires malodorants et purulents dans les semaines suivant la mise-bas : **consultez immédiatement votre vétérinaire.**

Pourquoi mon vet insiste-t-il sur...

La prise de sang annuelle ?

De nombreuses maladies peuvent subtilement débiter, sans que des symptômes physiques ne soient visibles.

Par exemple, les chats ont souvent les reins qui se fatiguent en vieillissant, sans que l'on s'en aperçoive vraiment. Lorsque des symptômes surviennent, la maladie est quelque fois déjà bien avancée. De nombreux problèmes de santé ne peuvent être complètement prévenus, mais nous pouvons certainement tenter de ralentir leur progression. La prise de sang annuelle permet de vérifier que tous les organes de votre amour continuent de bien fonctionner.



Le snap 4dx annuel (pour les chiens) ?

Le snap 4dx est une prise de sang qui permet d'identifier si votre animal est porteur de certaines maladies transmises par les tiques (maladie de Lyme, Anaplasmose et Ehrlichiose) ainsi que les vers du cœur. Même si vous donnez parfaitement la prévention parasitaire, aucun produit n'est efficace à 100%. Ces maladies passent elles aussi souvent inaperçues et peuvent avoir des conséquences sérieuses.

Lorsqu'elles sont identifiées, elles peuvent aussi être traitées par un traitement complètement différent de la prévention mensuelle. Cette prise de sang est particulièrement recommandée pour les chiens qui ne reçoivent pas de prévention parasitaire et/ou chez qui l'on a trouvé une tique.

Le snap Fiv/Felv (pour les chats) ?

Le FIV est le virus du sida félin. C'est une maladie du système immunitaire, qui devient moins efficace. Bien que les chats atteints puissent avoir une espérance de vie normale, ils risquent de tomber malades plus souvent, d'avoir besoin de soins plus agressifs et dans certains cas, de développer des problèmes de santé plus importants (maladies buccales, cancers, etc). Ce virus se transmet par contact lors de morsures.

Le FeLV est le virus de la leucémie féline. Les chats atteints peuvent demeurer porteurs très longtemps, voire toute leur vie, sans développer la maladie. Pour les moins chanceux, lorsqu'elle se déclare, le pronostic est souvent pauvre et l'espérance de vie ainsi que la qualité de vie sont diminuées. Ce virus se transmet par contacts rapprochés entre chats atteints.

La prise de sang permet d'identifier les animaux porteurs de ces maladies et, ainsi, de protéger vos autres animaux de la maison (par exemple, lorsque vous faites entrer un chat errant) et/ou savoir à quoi s'en tenir pour leur avenir. D'ailleurs, il est recommandé de ne pas mettre un chat errant en contact avec vos chats de maison avant que cette prise de sang ne soit faite.

Une nourriture spécialisée ?

Il existe une quantité infinie de nourritures pour les animaux de compagnie : croquettes, humides, cuites, crues, avec ou sans grains, etc. Un animal en santé peut manger n'importe quelle de ces nourritures sans trop de conséquences, mais de nombreuses nourritures vendues en cliniques vétérinaires permettent de **prévenir** plusieurs problèmes de santé, tels que les problèmes dentaires, les calculs urinaires et éventuellement, les blocages urinaires, l'obésité, les problèmes articulaires, la dégradation de problèmes rénaux, etc. Investir dans une bonne nourriture vous permettra probablement de garder votre animal en santé plus longtemps.

Doit-on gronder son animal s'il...

Grogne ?

NON ! Les grognements sont une façon pour votre animal de communiquer son mécontentement ou sa peur. Si vous le grondez lorsqu'il grogne, il finira tout simplement par sauter cette étape et aller à la suivante, c'est-à-dire mordre sans avertissement.

Fait ses besoins à l'intérieur ?

NON ! La propreté est un apprentissage. Si vous grondez votre animal lorsqu'il fait ses besoins dans la maison ou à un endroit inapproprié, il sera encore plus stressé. De plus, il faut lui montrer ce que vous attendez de lui (par exemple, l'amener dehors). Il ne peut pas deviner ce que vous attendez de lui.

A fait un mauvais coup en notre absence ?

NON ! Ça ne sert à rien de gronder votre animal et lui mettre le nez dans son dégât par après. Il ne se rappellera plus avoir fait le mauvais coup et risque de devenir très anxieux.

Fait de la protection de ressources ?

NON ! La protection de ressources (le bol de nourriture, les os, les jouets) est causée par de la peur et du stress et non pas par de la dominance, qui n'existe d'ailleurs pas chez les animaux. Retirer l'objet de la protection ne fera qu'accroître la peur.

Si mon animal détruit tout en mon absence ?

NON ! Les humains ont tendance à croire que leur animal de compagnie peut détruire leur divan par vengeance. C'est tout à fait faux, votre animal fait peut-être de l'anxiété de séparation.

Qu'est-ce que ça veut dire si...

Mon chien bâille sans cesse ?

Non, ça ne veut pas nécessairement dire que votre ami est fatigué. Le bâillement excessif représente l'anxiété et le stress. Si votre chien bâille frénétiquement, cela signifie qu'il n'est pas à l'aise et qu'il a besoin d'espace.

Mon animal se lèche les babines ?

Non, ça ne veut probablement pas dire que votre animal a faim, mais plutôt qu'il a la nausée ou qu'il est anxieux.

Mon chien branle de la queue ?

Cela peut évidemment vouloir dire que votre chien est content, mais il faut regarder les autres parties de son corps. S'il a les oreilles basses et/ou la tête basse, la queue qui branle peut représenter un animal stressé.

Mon chat me montre son ventre ?

Cela peut sans aucun doute signifier que votre ami félin vous fait confiance, mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas nécessairement une invitation pour lui gratter le bedon !

Mon animal chasse les mouches ou fixe le plafond ?

Ah non ! Ce n'est pas un nouveau passe-temps ! Votre animal pourrait avoir des reflux gastriques ou la nausée.



Mon chien fait la pose de la prière ?

Bien que lorsqu'on pratique le yoga, cette position s'appelle chien tête en bas, un chien qui a les fesses dans les airs et le menton au sol, alors qu'il n'est pas en train de jouer, peut indiquer une douleur abdominale importante.

GUIDE DE LA LAISSE PARFAITE

**selon nous!*



N'est pas trop longue (environ 1 ou 2 mètres) - pour garder un contrôle sur votre chien.

L'entraînement à la marche sera facilité avec une laisse courte et solide (et des gâteries !)



N'est pas rétractable ! Ces laisses sont généralement moins solides et offrent peu de contrôle.

Des accidents peuvent vite arriver avec une laisse très longue et mince !



N'est pas associée à un choker, mais peut être accrochée à un licou, un harnais ou une muselière.

Les choker sont des outils punitifs. Les harnais, les licous (les halti) et les muselières sont sans douleur.

Décoder le langage animal



Voici quelques signes pouvant être observés lorsque votre animal démontre qu'il est **stressé ou inconfortable** :

Visage

Yeux :

- Pupilles dilatées
- Sourcils froncés
- Regarde de côté - blanc des yeux visible

Bouche :

- Bâillements exagérés
- Léchage des babines
- Salivation excessive
- Action d'avaler sans cesse

Oreilles :

- Oreilles vers l'arrière, écrasées sur la tête

Corps

- Est tendu
- A le dos courbé
- A le poil hérissé
- Halètements excessifs
- Tremblements
- Queue qui fouette l'air
- Garde la queue entre les jambes
- Tête baissée

Comportements

- Évite le contact visuel
- Tourne la tête dans la direction opposée
- Se cache
- Se sauve
- Aboie
- Grogne
- Attaque - même sa famille

Mon animal a changé de comportement...

Depuis quelques jours, votre animal a des comportements différents. Même si ces comportements sont subtils et que vous n'y prêtez pas tout de suite attention, vous devriez peut-être. Parfois, un animal qui change de comportement peut être un animal qui a besoin d'une consultation vétérinaire.

Exemples de changement de comportement

- Se cache subitement, surtout si dans des lieux inusités
- Vocalise plus qu'avant et/ou la nuit
- Ne veut plus monter ou descendre les escaliers ou un meuble
- Ne veut plus jouer comme avant, ne veut plus prendre de marches
- Ne veut plus manger sa nourriture
- Urine ou fait des selles dans la maison
- Se met à manger des objets qu'il ne mangeait pas avant
- Prend des positions qui sont inhabituelles pour lui
- Est plus réactif, voire devient agressif.



Causes possibles

Un animal qui change de comportement peut cacher une maladie sous-jacente. Il peut ressentir les changements et ne sait pas comment y réagir.

Il pourrait aussi ressentir de la douleur, par exemple de l'arthrose, dans les hanches ou le dos, et changer ses habitudes de vie pour minimiser la douleur.

Le vétérinaire pourra déceler des indices importants lors de son examen physique et pourra proposer des tests pour trouver ce qui se passe avec votre coco.

Est-ce que mon animal fait de la *fièvre* si...

Il a le nez chaud ?

La température du nez (ou des oreilles) ne peut malheureusement pas nous indiquer si notre animal fait de la fièvre. Le nez peut être chaud ou froid.

Son corps est chaud ?

De nombreuses raisons peuvent faire varier la température corporelle au toucher d'un animal. La température que l'on ressent sur nos mains en touchant notre animal ne peut malheureusement pas nous dire s'il fait de la fièvre.

Il a le nez sec ?

Dans le même ordre d'idées, le nez d'un animal peut être humide ou sec sans que cela n'ait quelconque lien avec son état de santé.

Il est amorphe et/ou ne mange plus ?

OUI ! C'est possible ! Un animal fiévreux sera plus amorphe qu'à son habitude. Certains animaux vont rester couchés et iront même jusqu'à ne plus manger.



- Températures rectales normales -

Chez les chiens et les chats, une température rectale est considérée normale si elle se situe entre **37.5 et 39.2°C**.

Pour prendre la température rectale, utilisez un thermomètre pour humains avec embout mou. Mettez de la vaseline sur l'embout et introduisez-le dans l'anus sur environ 1 cm.

Est-ce que je peux donner un ancien médicament à mon animal (sans demander à mon vétérinaire) ?

La réponse courte : Non !

Avant de donner quoi que ce soit à votre animal, il est fortement recommandé de demander à votre vétérinaire en premier.



La réponse longue : Pourquoi, non ?

Dans certains cas, des médicaments prescrits ultérieurement pourraient causer du tort à votre animal. Voici quelques exemples :

- Les gouttes pour les yeux qui contiennent des corticostéroïdes pourraient aggraver certaines conditions oculaires, comme des ulcères cornéens.
- Les gouttes pour les oreilles utilisées sans avoir pris un échantillon des sécrétions pourraient augmenter la résistance bactérienne, menant à des otites plus difficiles à traiter ou encore, ne pas traiter le bon pathogène, rendant l'otite plus longue et plus douloureuse pour votre animal.
- Les anti-inflammatoires donnés à un animal ayant développé une condition rénale pourraient accélérer et aggraver le problème.
- Certains médicaments sont contre-indiqués lorsqu'ils sont utilisés ensemble et pourraient causer de sérieux problèmes de santé.
- La dose peut avoir changé si le poids et/ou la condition de santé générale de votre animal a évolué. Ainsi, il se pourrait que vous donniez une dose non appropriée.
- Si le médicament est expiré, il peut être moins efficace.

Un simple coup de fil et votre vétérinaire vous dira rapidement si le médicament est sécuritaire.

Est-ce que je peux arrêter de donner un médicament ?

Votre animal doit prendre des médicaments pour quelques jours ? Pour plus longtemps ? Vous avez l'impression qu'il va déjà beaucoup mieux et aimeriez l'arrêter. Avant toute chose :

téléphonez à votre vétérinaire !

Antibiotiques

- Allez toujours **jusqu'à la fin du traitement** même si votre animal ne semble plus en avoir besoin.
- Ne pas traiter pour toute la période peut induire un retour de l'infection et/ou provoquer une résistance bactérienne. Les prochaines infections seront plus difficiles à traiter.

Corticostéroïdes

- Si votre animal a trop d'effets secondaires et que vous désirez l'arrêter, il faut faire un **sevrage progressif** : il peut être dangereux d'arrêter ce médicament d'un coup. Appelez votre vétérinaire pour qu'il vous aide à faire le sevrage sécuritairement.

Les autres

- Cela dépend !
- Certains médicaments **ne peuvent être arrêtés d'un coup** : anticonvulsivants, antidépresseurs, etc.
- Certains médicaments peuvent être donnés au besoin : anti-inflammatoires, anti-douleurs.

Lorsqu'un médicament est prescrit à votre animal, vérifiez tout de suite avec l'équipe si vous pouvez le stopper ou non avant la fin du traitement. Si vous ne vous en rappelez plus, téléphonez !

*Est-ce que je peux acheter un médicament
en ligne ?*


ATTENTION



Certains médicaments peuvent être vendus en ligne avec un nom **extrêmement similaire** ou alors simplement avec une topographie différente.



Certains médicaments vendus en ligne peuvent avoir le même nom que l'original, mais **pas le même ingrédient actif**.



Le saviez-vous ?

Votre vétérinaire est dans l'obligation de vous recommander les médicaments homologués pour votre animal.

**Votre vétérinaire régulier demeure votre meilleur conseiller
concernant les médicaments de votre animal.**



Est-ce que je peux acheter un médicament à ma pharmacie humaine ?

Bien sûr ! Pour ce faire, vous n'avez qu'à demander une prescription externe à votre vétérinaire. Cependant, vous aurez à payer des frais de prescription, comme pour les médecins humains.




Votre vétérinaire a l'obligation de suivre le code de déontologie de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ). Ce code stipule que **les vétérinaires doivent vous recommander en premier lieu les médicaments qui sont homologués** pour les animaux - c'est-à-dire, qui ont été testés et étudiés sur les animaux. Ceci implique que votre vétérinaire doit vous recommander la molécule faite pour les animaux, même si la même molécule existe en médecine humaine.



Si vous choisissez d'utiliser une molécule humaine, sachez que même si la molécule est identique, plusieurs autres éléments peuvent faire en sorte que la réponse thérapeutique ne sera pas identique. Un animal peut donc ne pas répondre de la même façon au médicament humain et vétérinaire. De plus, il faut faire attention à certaines composantes qui pourraient être toxiques pour les animaux.

Précautions d'été



Coups de chaleur

Les animaux peuvent facilement faire des coups de chaleur lorsqu'il fait gros soleil et très humide. Les chiens brachycéphales sont particulièrement à risque. Prévoyez de l'eau, ainsi que des périodes d'ombres/de climatisation lors des journées chaudes. Évitez les moments les plus chauds de la journée, soit entre 11h et 14h.

Brûlures


En règle générale : si le sol est trop chaud pour vos mains, il est trop chaud pour les coussinets des pattes de votre ami poilu! De plus, certains animaux avec moins de poils peuvent développer des coups de soleil.

Noyades

Les animaux sont eux aussi à risque de noyade s'ils tombent dans une piscine et qu'ils n'ont aucun moyen d'en sortir.

Parasites

Les parasites externes comme les tiques et les puces sont particulièrement actifs l'été. De plus, les parasites internes ainsi que les vers du coeur (transmis par les moustiques) sont aussi présents.



Chaleur en voiture

L'été, l'intérieur d'une voiture devient rapidement un vrai fourneau et ce, en quelques minutes seulement! Ne laissez pas votre animal seul dans une voiture, même si les fenêtres sont ouvertes et même si ce n'est que pour quelques minutes.

Précautions d'hiver



Engelures

Les animaux qui restent dehors pour de longues périodes, principalement les chats, sont à risque d'avoir des engelures (oreilles, pattes, peau). Si vous remarquez une partie du corps qui semble très rouge, blanche ou encore noire au retour de votre ami, contactez votre vétérinaire.

Sel

Le sel appliqué sur les trottoirs et les rues peut être difficile pour les petits coussinets de nos amis. N'hésitez pas à lui mettre des bottes et/ou à appliquer des produits hydratants approuvés pour les coussinets secs.

Décorations de Noël

Faites attention aux animaux qui ont tendance à manger n'importe quoi ! Certaines plantes de Noël, les ficelles, les rubans et les épinettes de sapin peuvent être dangereux pour votre animal.

Parasites

Certains parasites externes comme les tiques demeurent vivantes même en dessous de 0 degré. Les chats qui chassent sont aussi constamment à risque de contracter des parasites internes.



Glace

La glace peut occasionner tous types de blessures : une blessure tendineuse ou musculaire après avoir glissé, une griffe cassée, etc. Si votre animal boite en revenant d'une marche, laissez-le se reposer et consultez s'il n'y a pas rapidement d'amélioration.

Précautions des Fêtes

Halloween

Attention aux ingestions de bonbons et de chocolat. Les chats peuvent se sauver dehors lorsque les portes s'ouvrent. Les chiens peuvent avoir peur des étrangers déguisés. Il vaut mieux laisser les chiens anxieux à la maison !

Noël

Les chats et les chiens peuvent avaler des décorations (guirlandes, ficelles, etc). Cela fait partie des corps étrangers les plus fréquemment retirés !

St-Valentin

Attention aux intoxications au chocolat !

Pâques

Les chiens peuvent manger du chocolat. Les chats peuvent être tentés de goûter aux fleurs de Lys, qui sont très toxiques.

St-Jean

Les animaux peuvent s'intoxiquer avec de la marijuana et de l'alcool. Les feux d'artifices peuvent rendre certains animaux extrêmement anxieux.

Animal et jeunes enfants

Pourquoi on ne doit pas laisser son animal (chien ou chat) avec un bébé ou jeune enfant sans surveillance **constante**.

1

Les bébés sont une belle source de chaleur pour votre animal qui a froid l'hiver. Votre animal ne devrait jamais avoir la possibilité d'aller se coucher avec (lire : sur) votre bébé ou jeune enfant.

2

Les bébés et jeunes enfants ne respectent pas la propriété des autres. Dans le cas d'un animal, il est fréquent qu'un enfant touche aux bols, à la nourriture, aux jouets et aux os des chiens et des chats. Un animal qui n'apprécie pas cela pourrait réagir en mordant.



3

La majorité des jeunes enfants ne sont pas délicats. Même s'ils ne veulent pas faire de mal, ils ne sont pas toujours doux et certains animaux plus sensibles pourraient mal réagir. Par exemple, pensons aux mains dans le visage, aux poils et à la queue tirés, aux pattes poussées, etc. Les animaux âgés avec douleur chronique seront particulièrement sensibles.

4

Les enfants ne comprennent pas le langage corporel des animaux avant un certain âge. Un animal qui ne veut pas être dérangé pourra donc envoyer des signaux qui ne seront pas compris par l'enfant et il pourrait alors mordre pour se faire comprendre.

Les griffes de chats

Depuis février 2024, le dégriffage pour raisons non médicales est **interdit** au Québec. Contrairement à nos ongles, les griffes font entièrement partie de la troisième phalange (os) des doigts et des orteils des animaux. Retirer leurs griffes consiste donc à les amputer d'un os, à chaque extrémité. Nous savons maintenant que cette procédure n'est pas sans conséquences pour l'animal et que certains chats ont encore des séquelles de cette opération. Heureusement, il existe plusieurs façons de gérer les griffes de nos amis les félins !

Alternatives

- Coupez les griffes **plus fréquemment** pour qu'elles soient moins pointues
- Si votre chat les tolère, optez pour des **couvre-griffes** : il pourra continuer de faire ses griffes, sans conséquences. Ils sont généralement faciles à mettre en place et durent quelques semaines. Ils existent en différents formats et en différentes couleurs. Votre clinique vétérinaire peut aussi les installer pour vous.
- Offrez un **arbre à chats et/ou un grattoir** pour que votre chat y fasse ses griffes.
- Il existe des **phéromones** pour aider votre chat à identifier où faire ses griffes.
- Il existe différentes stratégies pour décourager votre chat de faire ses griffes sur vos meubles (papier collant double-face, papier d'aluminium, etc.), bref le but étant de rendre la surface désagréable.

L'arbre à chats parfait

- Est **suffisamment grand** pour que le chat puisse s'y étirer de tout son long.
- Est placé au centre d'une pièce, devant une **fenêtre**, là où le chat passe le plus clair de son temps.
- Est placé près du divan où le chat fait ses griffes pour le **rediriger**.

Voyager avec son animal

Il peut être tellement excitant de voyager avec son animal de compagnie. Mais pour éviter les mauvaises surprises, soyez prêts et ayez tous les documents nécessaires !

Aux États-Unis en voiture



Recommandations :

- Vaccin de Rage à jour
- Micropuce (obligatoire)

N'hésitez pas à demander un calmant pour votre animal pour la voiture ou l'avion. Le but est de relaxer votre coco pour la durée du trajet.

En avion



- Faites poser une micropuce puis après, faites le vaccin de rage. Si votre animal a déjà reçu son vaccin de la rage, mais qu'il n'a pas de micropuce, votre vétérinaire devra le micropucer, puis donner le vaccin à nouveau.
- Vérifiez avec votre compagnie aérienne les règlements à respecter pour amener votre animal avec vous.
- Consultez le site internet de l'**ACIA**, qui pourra vous indiquer les documents, vaccins, produits antiparasitaires et tests sanguins obligatoires vers votre destination.

Quelques exemples

- Plusieurs pays requièrent le vaccin de rage à jour, une micropuce, un produit antiparasitaire ainsi que des documents de santé remplis par un vétérinaire **un certain nombre de jours avant le départ**.
- Certains pays demandent une preuve d'anticorps rabiques (pour la rage). Ce test sanguin peut nécessiter plusieurs semaines d'attente avant d'avoir le résultat.
- Certains pays demandent qu'un vétérinaire de l'ACIA contre-signe les papiers de votre vétérinaire. Il faut prendre un rendez-vous.

Mettre son animal en pension

Voici quelques conseils pour que votre voyage sans votre animal se passe à merveille:

- **Visitez** les différentes pensions : allez observer où et comment se passera le séjour de votre compagnon. Selon vos besoins, différents endroits pourraient vous convenir ou, à l'inverse, ne pas vous convenir : par exemple, les animaux seront-ils dans des cages individuelles ? Quelle est la grosseur de ces cages ? Est-ce des chambres ? Les animaux sont-ils tous ensemble ? Etc.
- Demandez vos **obligations** avant la pension : la majorité des chenils demanderont à ce que votre animal soit à jour dans certains de ses vaccins. Pour éviter toute mauvaise surprise, renseignez-vous auprès de l'endroit choisi et mettez les vaccins de votre animal à jour, si besoin.
- Certains endroits demanderont obligatoirement un vermifuge ou un produit anti-parasitaire complet.
- Si votre animal prend de la médication et/ou une nourriture spécialisée, assurez-vous que l'endroit choisi puisse les lui administrer sans problème.
- Si votre animal est généralement anxieux et/ou n'aime pas les autres animaux : vérifiez auprès de la pension si c'est un endroit qui **convient** à votre animal. Y a-t-il des éducateurs qui se spécialisent avec les animaux anxieux ? Y a-t-il des endroits où les animaux anxieux ont leur propre espace ?
- Demandez à votre vétérinaire s'il a des pensions à vous recommander personnellement.
- Si votre animal est trop anxieux, sachez qu'il existe de nombreux services où des personnes peuvent garder votre animal chez elles ou alors aller à votre domicile quotidiennement.


La nourriture de table

La majorité des animaux seront bien évidemment intéressés par ce que nous mangeons. Ça sent bon, toute la famille est ensemble pour partager un repas, pourquoi pitou ou minou ne pourrait-il pas participer ?

Pourquoi vaudrait-il mieux éviter ?

Donner de la nourriture de table à votre compagnon pourrait :

- Augmenter la quantité de tartre dentaire
- Augmenter les risques de développer de l'embonpoint ou de l'obésité
- Augmenter les problèmes de comportement parfois difficiles à éliminer, tels qu'un animal quêteur, voleur de nourriture, jappeur, etc.
- Augmenter les risques de développer une pancréatite.



Pour un chien, un petit morceau de fromage équivaut à 1 Big Mac, tandis que pour le chat, cela équivaut à 2 Big Macs. La canne de thon équivaut à 1 Big Mac et demi.

L'idéal serait donc de ne jamais commencer à donner de la nourriture de table...

... Évidemment, nous sommes réalistes ! Comment résister aux yeux piteux de pitou ? Si vous donnez déjà de la nourriture de table, quelques conseils :

- Assurez-vous que ce que vous donnez ne soit pas toxique
- Évitez les épices, le gras, le sucre, le sel, le poivre, l'ail, les oignons
- Au lieu de la nourriture, mettez sur la table des croquettes ou gâteries pour chien et lui donner cela. Souvent, votre chien sera tout aussi content, tant qu'il partage ce moment avec vous !
- Optez pour des fruits et légumes peu caloriques (céleris, poivrons, concombres, melon d'eau, etc.)
- Réduisez la portion totale quotidienne au niveau des croquettes si vous savez que vous donnerez de la nourriture de table.

Mettre son animal au régime

Votre vétérinaire vous a annoncé que votre coco est grassouillet, voire obèse ? Ou alors, vous avez peut-être remarqué qu'il est plus gros qu'avant et aimeriez lui faire perdre du poids ? Maintenir un poids santé est une excellente idée !



Pourquoi ?

Les animaux en surpoids sont à risque de développer des maladies, par exemple le diabète. Aussi, il est reconnu que la très grande majorité des animaux auront de l'arthrose en vieillissant. Plus ils sont gros, plus l'arthrose apparaîtra tôt et sera sévère. Pour favoriser une meilleure qualité de vie le plus longtemps possible, un poids sain est essentiel. Si votre animal souffre de conditions musculo-squelettiques (luxation des genoux, dysplasie du coude ou des hanches, etc.), il bénéficiera aussi d'avoir un poids adéquat. Les chats obèses sont plus à risque de faire des blocages urinaires, du diabète, de la constipation, par exemples.

Règles d'or


- Pesez votre animal au début de la diète, puis aux 2 semaines.
- Nourriture : vous pouvez tout simplement diminuer les portions habituelles d'environ 10-25% ou optez pour une nourriture spécialisée pour la perte de poids. Votre vétérinaire pourra vous aider à calculer les calories nécessaires à votre animal. Les nourritures spécialisées aident habituellement les animaux à ne pas avoir l'impression de mourir de faim.
- Coupez la nourriture de table. Si c'est impossible, favorisez de donner des croquettes de nourriture ou alors des aliments faibles en calories (céleri, concombres, etc.)
- Sport : augmentez graduellement la durée et/ou la fréquence des activités physiques.
- Nous désirons une perte de poids **lente et graduelle**. Une perte de poids trop rapide peut être dangereuse.

Changement alimentaire

Vous désirez changer l'alimentation de votre chien ou de votre chat ? Aucun problème ! Toutefois, voici des règles d'or pour faire une transition alimentaire sans tracas.

Transition sur plusieurs jours

Une transition sur plusieurs jours est fortement recommandée, pour permettre au système digestif de votre animal de s'y habituer. Une transition trop rapide pourrait causer des douleurs abdominales, des diarrhées et plus rarement, des vomissements.



JOURS 1-4

75% de l'ancienne
nourriture

+

25% de la nouvelle

JOURS 5-8

50% de l'ancienne
nourriture

+

50% de la nouvelle

JOURS 9-12

25% de l'ancienne
nourriture

+

75% de la nouvelle

L'ajout de probiotiques peut favoriser la transition alimentaire sans apparition de diarrhées.



Puis, passez à 100% sur la nouvelle nourriture. À chaque étape, surveillez pour des selles molles ou des diarrhées. Si votre animal en souffre, ralentissez la transition. Les chats sont habituellement plus sensibles et peuvent prendre jusqu'à 14 jours de transition alimentaire.

Les dangers d'Internet

Tout le monde est tenté ici et là d'ouvrir son ordinateur et d'aller faire une recherche rapide concernant les symptômes de son animal. On le fait même parfois pour nous-mêmes ! Voici pourquoi ce n'est pas recommandé :

MAUVAIS DIAGNOSTIC

Sur Internet, tout le monde peut s'inventer docteur. Pour poser un diagnostic précis, le vétérinaire doit faire un examen physique et parfois des examens complémentaires (bilans sanguins, radiographies). Poser un diagnostic en se basant uniquement sur les symptômes peut être extrêmement risqué. Vous risquez 1) de traiter la mauvaise chose, 2) de causer du tort, et parfois 3) de vous inquiéter pour rien (avec un diagnostic de cancer, par exemple !) Pendant ce temps, l'état de santé de votre animal peut se détériorer grandement et rapidement.


MAUVAIS TRAITEMENTS

Bien que l'intention soit toujours bonne, essayer de traiter sans l'aide de votre vétérinaire peut faire du tort à votre animal : le traitement essayé pourrait ne rien faire, ou pire encore, empirer l'état de votre animal. De plus, il faut s'assurer que le traitement proposé soit adapté à votre animal et qu'il ne soit pas dangereux. Par exemple, certains médicaments pour humains ne devraient jamais être utilisés chez votre animal.

DES PEURS INUTILES

Il est possible de lire toutes sortes d'histoires d'horreur sur Internet, telles que « mon chien a pris tel traitement et est mort ! » Ceci peut vous mener à éviter de consulter votre vétérinaire et/ou à refuser un traitement qui pourrait être bénéfique pour votre animal. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à les communiquer à votre vétérinaire.

ATTENTION



N'importe qui en ligne peut se faire passer pour un médecin ou un vétérinaire.

Aucun médecin vétérinaire ne posera de diagnostic en ligne (sauf si télé médecine).

N'importe qui ayant eu une mauvaise expérience avec un traitement peut inciter les autres à avoir peur de l'utiliser.

Votre vétérinaire régulier demeure votre meilleur conseiller concernant votre animal.

Les médecines alternatives

Saviez-vous qu'il existe de nombreux types de médecine alternative en médecine vétérinaire ? Elles sont généralement utilisées pour compléter la médecine traditionnelle. En voici quelques exemples.



Acupuncture

Certains médecins vétérinaires ont fait des études de plus en acupuncture animale, leur permettant d'offrir ce service. L'acupuncture utilise des aiguilles pour stimuler certains points spécifiques du corps. Elle peut être utilisée dans le cas de douleurs aiguës, ou encore chroniques. Le tout se fait habituellement dans un espace calme.

Ostéopathie

L'ostéopathie est un type de thérapie qui utilise les mains et qui travaille sur les muscles, les fascias et même les organes, par de petits mouvements. Elle peut elle aussi, être utilisée pour aider les animaux ayant des inconforts aigus ou chroniques,.

Physiothérapie

Certains vétérinaires ou technicien.nes en santé animale peuvent effectuer de la physiothérapie avec les animaux. Que ce soit après une chirurgie orthopédique, une accident ou une blessure grave, votre animal travaillera à rebâtir sa force, retrouver sa souplesse et ses fonctions normales en toute sécurité.

Massothérapie, herbologie, laser thérapeutique, etc.

Toutes ces choses sont disponibles pour aider vos animaux de compagnie à se sentir au meilleur de leur forme! Demandez à votre vétérinaire si une thérapie alternative est pertinente pour votre animal!

Les médecins spécialistes

Votre vétérinaire de quartier est un vétérinaire généraliste : voyez-le comme votre omnipraticien. Il peut faire de la médecine préventive, des chirurgies générales comme des stérilisations et parfois un peu plus complexes, diagnostiquer et traiter les maladies qui affectent souvent les animaux.

Mais parfois, le médecin vétérinaire, tout comme en médecine humaine, a besoin de l'aide de ses collègues spécialistes. Les médecins spécialistes ont continué leur formation après avoir obtenu leur doctorat en médecine vétérinaire pour devenir expert dans un domaine particulier. Il existe autant de spécialistes que de problèmes de santé.



Exemples de médecins spécialistes

- **Chirurgie** : chirurgies orthopédiques, cardiaques, abdominales risquées, nécessitant des techniques spécialisées, etc.
- **Oncologie** : accompagne les animaux souffrant de cancers
- **Médecine interne** : diagnostique et traite les animaux souffrant de maladies plus rares, qui ont plusieurs maladies à la fois, qui ne répondent pas bien aux traitements habituels, etc.
- **Cardiologie** : pour les animaux qui sont identifiés par leur médecin vétérinaire avec un souffle ou une arythmie cardiaque.
- **Dermatologie** : aide les animaux qui souffrent de problèmes cutanés qui ne répondent pas aux traitements habituels, qui souffrent d'allergies, etc.
- **Comportement** : accompagne les animaux qui souffrent de problèmes de comportement (anxiété, agressivité, etc.)
- **Imagerie** : accompagne votre médecin vétérinaire dans l'obtention d'un diagnostic à la suite d'une prise de radiographies, pour performer des échographies, etc.
- **Neurologie** : diagnostique et traite les animaux qui démontrent des problèmes neurologiques, comme l'épilepsie, des hernies discales, etc.
- **Ophtalmologie** : aide les animaux ayant des problèmes oculaires graves.
- **Anesthésiologie - dentisterie - pathologie - urgentologie - reproduction - nutrition - reproduction - ...**

Quand devriez-vous consulter un spécialiste ?

Il peut arriver que votre vétérinaire régulier vous recommande de consulter un confrère ou une consœur spécialiste. Votre vétérinaire a le devoir de vous recommander les meilleurs soins possibles pour votre animal. Ainsi, si votre vétérinaire sent que le cas de votre animal nécessite l'avis d'un expert, il vous recommandera ce type de consultation, tout comme les médecins humains généralistes nous envoient souvent consulter en spécialité.




Pourquoi est-ce plus dispendieux ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi une consultation avec un vétérinaire spécialiste coûte plus cher qu'une consultation avec votre vétérinaire général. En voici quelques exemples:

- Les spécialistes ont étudié plus longtemps et obtenu une certification de plus : ils méritent amplement d'être payés pour leur expertise. Ils sont les **experts** dans leur domaine de pratique.
- Ils sont généralement peu nombreux à pratiquer dans leur domaine.
- Beaucoup de spécialistes travaillent dans des centres d'urgences. Ces hôpitaux sont habituellement ouverts 24/7 et nécessitent donc du personnel disponible en tout temps, ainsi que des machines de haute qualité (radiographies, échographie, IRM, CT-Scan, etc).
- Beaucoup de spécialistes ont besoin d'utiliser du matériel spécialisé et à la fine pointe de la technologie : comme tout médecin vétérinaire, les spécialistes doivent aussi rentabiliser leur équipement.



Les petits bobos fréquents



Ce n'est pas toujours facile de savoir si un problème de santé est une urgence médicale ou s'il peut attendre.

Les pages suivantes représentent les petits bobos les plus fréquemment observés par les propriétaires d'animaux, des solutions rapides à essayer, mais aussi quand il faut consulter rapidement un vétérinaire.

et quand consulter...

ATTENTION

Si votre animal a un problème de santé, n'attendez pas le rendez-vous annuel ou le rendez-vous de vaccins de votre animal.

Prenez rendez-vous rapidement pour éviter que son état de santé ne s'aggrave.

Mon chat a la rhino

Qu'est-ce que c'est ?

La rhinotrachéite féline est une maladie virale super contagieuse des chats, pouvant être causée par plusieurs agents.

Transmission

Par les sécrétions contaminées et les contacts directs entre chats.

Symptômes

C'est en fait **une grosse grippe de chats** ! Elle peut causer des éternuements, des écoulements nasaux, des écoulements oculaires, parfois des ulcères cornéens et/ou un état général un peu moins bon que d'habitude. Dure habituellement de 10 à 14 jours.

Essayez...

- Larmes artificielles pour les yeux
- Compresses fraîches sur les yeux qui coulent beaucoup
- Faites des flush nasaux si le chat est très congestionné
- Privilégiez la nourriture en conserve facile à avaler (mal de gorge possible)
- Essayez les suppléments de **Lysine**.
- Attendez 7-10 jours avant de mettre un nouveau chat en contact avec vos autres chats



Bon à savoir

Les chats demeurent porteurs chroniques de la maladie, qui peut se déclarer lors de tout stress physique (problème de santé) ou mental (anxiété, changement de routine, etc.)

Le vaccin de base protège contre cette maladie ou en diminue les signes cliniques.



Consultez si...

- Les écoulements nasaux ou oculaires sont purulents
- Votre chat garde un ou les deux yeux fermés.
- Votre chat tousse
- Votre chat a du mal à respirer
- Baisse importante de l'état général (anorexie, vomissements, léthargie)
- Votre chat a des ulcères dans la bouche
- Votre chat fait de la fièvre

Mon chien a la toux de chenil

Qu'est-ce que c'est ?

La toux de chenil (ou trachéo-bronchite infectieuse canine) est une maladie respiratoire qui touche la trachée et les bronches des chiens.

Transmission

Par les sécrétions contaminées et les contacts directs entre chiens.

Symptômes

C'est en fait une **grosse grippe de chiens** ! Elle peut causer des éternuements, des écoulements nasaux ainsi que de la toux. On peut observer une baisse de l'état général de l'animal, une perte d'appétit et de la fatigue. Dure habituellement de 7 à 10 jours.

Essayez...

- Privilégiez la nourriture en conserve facile à avaler (certains chiens ont mal à la gorge)
- Évitez de mettre votre chien en contact avec tout autre chien, puisque la maladie est hautement contagieuse jusqu'à 3 mois
- Permettez à l'animal de se reposer



Bon à savoir

Plusieurs pathogènes peuvent être responsables de la toux de chenil. Le vaccin contre *Bordetella* peut diminuer les risques de l'attraper, mais surtout de développer certaines complications comme les pneumonies bactériennes. La majorité des chenils oblige que votre chien soit vacciné.

Consultez si...

- La toux est très intense, vous réveille la nuit
- Difficulté à respirer
- Baisse importante de l'état général (animal amorphe, qui ne mange plus, qui fait de la fièvre)
- Sécrétions nasales purulentes

Les animaux brachycéphales

Un animal est brachycéphale lorsque son museau est écrasé. De nombreuses races sont caractéristiques de la brachycéphalie : les pugs (carlin), les bouledogues français et anglais, les persans, etc.



Le syndrome brachycéphale du chien

Est une combinaison d'éléments :

- **Le palais mou trop long** : il est à l'origine des ronflements de ces animaux. Il peut être raccourci chirurgicalement pour permettre à ces animaux de mieux respirer.
- **La sténose des narines** : leurs narines peuvent être minuscules et laisser uniquement passer un mince filet d'air. Les narines peuvent aussi être agrandies chirurgicalement.
- **Les saccules laryngées éversées** : du tissu près des cordes vocales peut entrer légèrement dans la trachée lors de l'inspiration, rendant cette dernière difficile.

Problèmes possibles

Certains chiens ayant un syndrome brachycéphale peuvent souffrir :

- D'intolérance à la chaleur et à l'humidité – principalement l'été
- D'intolérance à l'exercice – ont du mal à se ventiler lors d'excitation
- De pneumonie par aspiration lors de vomissements/régurgitations
- De collapse de la trachée

N'hésitez pas à en discuter avec votre vétérinaire si la correction chirurgicale des narines et du palais mou vous intéresse. Cela améliore grandement la qualité de vie de votre animal en rendant la respiration plus facile.

Systeme digestif

La diarrhée

La diarrhée se caractérise par des selles liquides allant de la consistance de crème glacée molle à de l'eau, plusieurs fois par jour. Les animaux peuvent avoir du mal à se retenir, ce qu'on appelle des diarrhées d'urgence.

Recettes secrètes

- Faites bouillir du steak haché extra maigre et du riz blanc. Donnez **3 portions de riz pour 2 portions de viande**. L'animal peut boire l'eau du riz.
- Donnez plusieurs petits repas fréquents durant 1 ou 2 journées, au lieu de nourrir votre animal matin et soir.
- Ajoutez des probiotiques à la nourriture. Il en existe en pâte et en poudre, entre autres.
- Offrez de l'eau à volonté à l'animal.
- Allez acheter de la nourriture gastro-intestinale, riche en fibres et facile à digérer. La nourriture en conserve contient beaucoup d'eau, ce qui permet une meilleure hydratation.
- Ne faites pas de jeûne.

Consultez si

Votre animal **vomit**
Votre animal **ne mange plus**
Vous voyez du **sang frais**
Les **selles sont noires**
Perdure **plus de 5 jours**
Votre animal a
moins de 6 mois

Les remèdes miracles pour la diarrhée

Chez les humains, il peut arriver que l'on mange quelque chose qu'on ne tolère pas et que, par la suite, nous ayons de la diarrhée. La majorité des animaux de compagnie n'auront pas ce problème, puisqu'ils mangent leurs croquettes adaptées - à moins bien sûr de donner de la nourriture de table ou d'avoir un animal qui mange tout ce qu'il trouve !

Si vous donnez une nourriture différente qu'à son habitude et que votre animal a de la diarrhée, ne lui donnez plus cet aliment. Il ne le tolère probablement/peut-être pas.

Si la diarrhée est aigüe, une **nourriture riche en fibre et des probiotiques** aideront habituellement à régler le problème. Voici d'autres remèdes dont nous entendons souvent parler :

- Médicaments anti-diarrhées (comme l'Imodium) : pas recommandés pour les animaux de compagnie.
- Purée de citrouille : peut être efficace, mais à de très grandes quantités... des quantités qui ne sont parfois pas réalistes selon le poids de votre animal !
- Antibiotiques contre la diarrhée : ils ne sont plus recommandés d'emblée, pouvant majoritairement causer plus de tort que de bien. Dans certains cas toutefois, votre vétérinaire pourra vous les prescrire.
- Fibres : un ajout de fibres peut être une bonne idée pour aider les selles à redevenir formées. Demandez à votre vétérinaire pour des conseils.

Le temps est le meilleur allié pour votre animal. Les diarrhées aiguës de courte durée ne sont généralement pas dangereuses.



Et si la diarrhée perdure...

Dans certains cas, la diarrhée ne s'atténuera pas et deviendra alors chronique. Votre vétérinaire pourra vous proposer certains tests pour tenter d'en trouver la cause. Voici quelques exemples de tests.

Analyse de selles

Une analyse de selles permettra de vérifier s'il s'y trouve des parasites ou des bactéries qui causent les diarrhées. Il en existe plusieurs ; votre vétérinaire pourra vous conseiller sur celle qui est le plus pertinent dans le cas de votre animal.

Radiographies abdominales

Les radiographies abdominales sont souvent une première étape pour observer la grosseur et l'emplacement des organes internes.

Prise de sang

La prise de sang générale ne pourra souvent pas identifier la cause, mais pourrait donner des indices précieux et guider votre vétérinaire vers les étapes diagnostiques suivantes.

Échographie abdominale

Souvent performée par un vétérinaire spécialiste, l'échographie abdominale permet de voir les organes en 3D et d'en inspecter les moindres recoins.

Essai alimentaire

Si votre vétérinaire suspecte une intolérance ou une allergie alimentaires causant les diarrhées, il pourra discuter avec vous des nourritures adaptées.

La constipation

La constipation se produit lorsqu'un animal a du mal à déféquer. Les selles peuvent être sèches, en petites boules. Parfois, un animal n'ira pas faire ses besoins aussi souvent que d'habitude.

Plusieurs causes peuvent expliquer la constipation, votre vétérinaire pourra vous proposer des tests pour mieux en comprendre la source.

Trucs à essayer

- Achetez de la nourriture en conserve, facile à digérer.
- Ajoutez de l'eau dans les croquettes pour augmenter la consommation d'eau.
- Stimulez la prise d'eau avec une fontaine, par exemple.
- Si la constipation revient fréquemment, ajoutez des probiotiques et des fibres à la nourriture.
- Donnez un peu de pâte laxative/vaseline à l'animal.

Attention !

Un **chat bloqué**, c'est-à-dire qui n'arrive plus à uriner, pourra avoir l'air d'un chat constipé. Le blocage urinaire est toutefois une **urgence médicale**. Si vous n'êtes pas certain, il vaut mieux passer par votre vétérinaire qui fera une palpation de la vessie.

Consultez si

Votre animal n'a pas déféqué depuis **plusieurs jours**;
Semble **amorphe**;
Cesse de manger;
Vocalise en déféquant

Les boules de poils

Votre chat a tendance à vomir du poil ? Cela peut arriver à l'occasion sans que ce ne soit inquiétant. Voici quelques conseils pour diminuer l'incidence des boules de poils et quand il vaudrait mieux consulter.

Trucs à essayer

- Brossez votre chat quotidiennement - même les chats au poil court. En débarrassant les poils morts avec un peigne, vous empêcherez votre chat de les avaler lorsqu'il se toilette.
- Donnez de la pâte laxative ou de la vaseline pour aider les poils déjà avalés à passer plus facilement dans le tractus digestif.
- Faites raser votre chat quand le poil est trop long. S'il continue de vomir sans les boules de poils, alors un bilan médical est recommandé.



Attention !

Il est **anormal pour un chat de vomir souvent**. S'il vomit constamment des boules de poils, c'est peut-être qu'il vomit (maladie, problème de santé) et que des boules de poils s'y trouvent. À ce moment-là, un bilan médical est de mise !

Consultez si

Votre chat vomit régulièrement des boules de poils ou si la fréquence augmente.

Vomissements

Les vomissements sont toujours préoccupants. Voici quelques règles d'or à connaître les concernant. Sachez que vous pouvez tenter d'aider votre animal, mais si les vomissements persistent, n'attendez pas.

Causes possibles des vomissements

- Un chien peut vomir lorsqu'il mange quelque chose d'inadéquat. Un seul vomissement est rarement dangereux.
- Les animaux ont tendance à manger du gazon/ de l'herbe/ de la neige. S'ils vomissent souvent par la suite, il faut consulter.
- Il n'est jamais normal pour un chat de vomir, en dehors de l'occasionnelle boule de poils.
- Des vomissements peuvent survenir lors d'une maladie gastro-intestinale (gastrite, pancréatite) ou d'une maladie touchant un autre organe (maladie rénale, maladie hépatique, maladie de la thyroïde, cancer, etc.)
- Les vomissements peuvent être causés par des problèmes gastro-intestinaux légers (gastrite, jeûne trop long, indiscretion alimentaire) à graves (torsion d'estomac, corps étranger causant un blocage, etc.)
- Un animal peut manger un objet qui peut se retrouver bloqué dans le système digestif (voir ci-contre). Ceci est une **urgence**.

Exemples d'objets pouvant causer une obstruction

Os, bouts de tissus, masques, sacs, ficelles, cordes, élastiques, toutous, jouets, bouts de vêtements, boules de poils

Vomissements

QUAND CONSULTER ?

Mon animal a des vomissements rapprochés (plusieurs vomissements de suite)

Mon animal fait des efforts de vomissements, mais rien ne sort.

Mon animal ne garde rien : il vomit rapidement après avoir mangé ou bu de l'eau

Mon animal a avalé un objet, un jouet, un bout de tissus ou une grande quantité de nourriture, et maintenant il vomit.

Mon animal ne mange plus et/ou est amorphe depuis plus de 24 heures

Mon animal ne produit plus de selles

Si une ficelle sort par l'anus de votre animal, **ne tirez pas**.
Allez rapidement chez votre vétérinaire.

Les ficelles font partie des corps étrangers les plus souvent impliqués chez les félins. Elles peuvent causer de graves dommages !

Quoi faire en cas de vomissements

- Retirez la nourriture habituelle de votre animal. Achetez de la nourriture en conserve, facile à digérer qui se trouve dans toutes les cliniques vétérinaire et animaleries. Offrez une petite portion à votre animal et voir s'il la garde. Si oui, continuez de nourrir votre animal en plusieurs petits repas.
- Ne prolongez pas le jeûne pour plus de 8h.
Si votre animal ne garde pas même les petits repas et/ou l'eau, consultez votre vétérinaire rapidement.
- Certains animaux ont l'estomac sensible et auront besoin de manger de la nourriture spécialisée gastro-intestinale. Ces nourritures sont bien équilibrées et peuvent être données sur le long terme.
- Si votre animal a des vomissements chroniques, consultez votre médecin vétérinaire. Plusieurs causes peuvent être en jeu et peuvent se traiter.
- Consultez rapidement si votre animal cesse de s'alimenter, si les selles deviennent diarrhéiques ou s'il y a absence de selles. Ceci peut parfois être un signe de blocage intestinal. Mieux vaut consulter !

Si vous soupçonnez votre animal d'avoir avalé quelque chose qui aura du mal à passer et risque de bloquer son tractus digestif :

- Contactez immédiatement votre vétérinaire
- Si vous êtes dans l'impossibilité de consulter, essayez de donner de la vaseline à votre animal, à même la cuillère ou en sandwich entre des gâteries, pour lubrifier l'objet et l'aider à traverser le système digestif.
- Faites des petites marches pour stimuler le système digestif


Pourquoi mon vétérinaire me recommande une nourriture spécialisée à la suite d'un problème digestif ?

Si le problème digestif de votre animal est aigu, votre vétérinaire priorisera une alimentation dite « gastro-intestinale » pour quelques jours, le temps que le problème soit résolu. Cette nourriture est facile à digérer, donc permettra à son système de récupérer.

Ce type de nourriture en conserve est particulièrement recommandée, car il contient beaucoup d'eau, favorisant l'hydratation. En effet, les animaux qui vomissent ou ont la diarrhée perdent plus de liquide menant à la déshydratation. Lorsque le problème est résolu, un retour graduel à la nourriture initiale peut être effectué.

Pour les animaux ayant un problème gastro-intestinal plus chronique, une nourriture spécialisée peut aussi être essayée. Certains problèmes chroniques ont effectivement besoin d'une nourriture spéciale : les inflammations chroniques, les allergies alimentaires, les pancréatites à répétition, les problèmes de constipation, etc. Il existe autant de nourritures que de problèmes. Laissez votre vétérinaire vous recommander celle qui correspond le mieux aux besoins de votre animal.

Mon animal ne mange pas



Le premier 12-24h

Essayez de stimuler votre animal avec de la nourriture adaptée pour lui : pas trop grasse, pas salée, pas sucrée. Vous pouvez tenter d'acheter de la nourriture en conserve faite pour les animaux qui ont perdu l'appétit. L'idéal demeure de contacter votre vétérinaire.

*Si le jeûne dure plus de 24h ou
s'il est accompagné de d'autres symptômes*

N'attendez pas pour consulter votre vétérinaire.

L'anorexie prolongée peut rapidement devenir dommageable pour la santé de votre animal. Elle peut aussi cacher quelque chose de plus sérieux.

N'attendez pas 24h si :

- Votre animal a moins de 16 semaines
- Votre animal est gériatrique
- Votre animal a une maladie chronique



Mon chien mange ses

Ah ! que c'est désagréable lorsque notre chien mange ses excréments, ou ce qui est gracieusement appelé de la « coprophagie ».

Rassurez-vous tout de suite, la grande majorité du temps, **cette action n'est pas grave, ni dangereuse.**

On ne comprend pas toujours le phénomène. Certaines espèces animales feront de la coprophagie sans que cela ne soit un problème. L'on pense qu'il peut subsister une odeur de la nourriture dans les selles, ce qui pousse certains chiens à les manger...

Habituellement, ce sont les chiots qui font ce comportement et il passera avec l'âge. Certes, si les chiens continuent à le faire une fois adulte, une investigation médicale est recommandée, mais le phénomène est souvent comportemental.

Trucs à essayer

- Il existe des poudres servant à rendre les selles dégoûtantes, pour désintéresser le chien. Il est difficile de dire si ces produits sont vraiment efficaces, mais il vaut la peine de les essayer.
- Renforcement positif : félicitez votre animal s'il ne touche pas à ses selles.
- Ramassez les selles le plus souvent possible.
- Ne grondez pas votre animal s'il fait des selles à l'intérieur. En effet, il pourrait associer une punition à « faire une selle », qu'il soit dehors, sur un Pipi Pad ou à l'intérieur, et ainsi voudra cacher ses excréments en les mangeant.

Systeme cardio- respiratoire

Reverse sneezing



Comme son nom l'indique, « l'éternuement inversé » se produit lorsqu'un animal aspire l'air au lieu de le faire sortir par ses narines. Ce phénomène, bien que paniquant les premières fois, est **sans danger** pour votre compagnon.

Causes

Va se produire lorsque l'animal a quelque chose qui le chatouille/l'agace au niveau de ses narines, l'intérieur de son nez, son palais ou sa gorge, tel que

- De la poussière
- Des allergènes
- Des poils
- Une brindille d'herbe
- Des sécrétions nasales lors d'un rhume
- Une petite masse ou un polype
- Des parasites dans le nez



Lorsqu'il se produit, le *reverse sneezing* peut ressembler à un animal qui s'étouffe.

Peut aussi survenir lorsque

- Votre animal est excité
- Vous tirez trop fort sur la laisse
- Votre animal mange ou boit trop rapidement

De nombreuses vidéos de *reverse sneezing* se trouvent sur Internet. Si vous n'êtes pas certain, montrez une vidéo de votre animal à votre équipe vétérinaire.

Les chiens brachycéphales (avec le nez écrasé) y sont plus propices.

Trucs pour l'arrêter

Le *reverse sneezing* s'arrête habituellement de lui-même en quelques secondes, parfois au bout d'une minute. Cependant, vous pouvez essayer de l'arrêter plus rapidement en **bouchant les narines** ou en **ouvrant la gueule**.

Consultez si votre animal le fait plus qu'avant et/ou sans arrêt.


La toux

La toux peut être difficile à reconnaître chez nos animaux. Elle peut parfois ressembler à un animal qui s'étouffe ou qui fait des efforts de vomissements. Si vous n'êtes pas certain, filmez votre animal et envoyez la vidéo à votre équipe vétérinaire.

Faut-il consulter ?

Si c'est un **chien** qui tousse, la toux peut être causée par un virus respiratoire. La majorité du temps, elle passera par elle-même en quelques jours, mais n'hésitez pas à consulter si vous observez :

- difficultés respiratoires
- toux la nuit qui empêche de dormir
- sécrétions purulentes des yeux ou du nez
- chien amorphe et/ou qui ne mange plus
- animal essoufflé, plus fatigué que d'habitude
- animal âgé
- la toux survient lorsque votre animal s'excite ou prend une marche



Essayez de remarquer quand la toux survient.

Si c'est un **chat** qui tousse, cela peut aussi être causé par un virus respiratoire ou une irritation des voies respiratoires. Consultez si :

- difficultés respiratoires, lèvres ou gencives bleutées
- respiration la bouche ouverte
- sécrétions purulentes du nez ou des yeux
- toux chronique qui devient de plus en plus fréquente
- animal âgé

Le saviez-vous ?

Les chats peuvent faire de l'asthme et tousser. Tout ce qui irrite les voies respiratoires pourra augmenter la toux (parfum, chandelle, poussière, etc.)

Les chiens peuvent tousser lorsqu'ils développent une maladie cardiaque, c'est pourquoi il vaut mieux consulter si la toux perdure ou s'accompagne d'autres symptômes. Les chiens peuvent aussi souffrir de collapse trachéal.

Les souffles cardiaques

Qu'est-ce que c'est ?

Le souffle cardiaque est un bruit que nous entendons à l'auscultation cardiaque qui peut être causé par l'éjection anormale du sang d'une chambre cardiaque à une autre. Le souffle cardiaque est donc un signe clinique qui peut accompagner divers problèmes cardiaques, allant d'un souffle physiologique, normal et sans conséquence pour la santé, à une multitude de problèmes cardiaques.

Votre vétérinaire identifiera un grade du souffle cardiaque allant de 1 à 6. La sévérité de la maladie n'est pas toujours reliée. La meilleure chose à faire si votre animal développe un souffle cardiaque est de consulter un cardiologue qui fera une échographie du cœur et pourra poser un diagnostic précis.

Les conséquences d'une maladie cardiaque non prise en charge sont les suivantes :

- Risque d'insuffisance cardiaque menant à des signes respiratoires à cause de l'œdème pulmonaire - eau sur (dans) les poumons
- Risques d'embolies à cause de la formation de caillots sanguins
- Risques d'hypertension ou d'hypotension pouvant affecter divers organes
- Risques de syncopes (pertes de conscience)
- Risques de décès ou de mort subite



Et si mon chiot ou chaton a un souffle cardiaque ?

Il arrive parfois que des souffles légers soient audibles au premier examen de l'animal et se résorbent par la suite, ce que l'on nomme un souffle juvénile. Par contre, si le souffle est de grade plus élevé, votre vétérinaire pourrait chaudement vous recommander d'aller consulter en cardiologie pour s'assurer que votre nouvel ami n'a aucune malformation cardiaque pouvant nuire à sa santé.

Systeme urinaire

Problèmes urinaires

Soyons clairs, quelque changement que ce soit au niveau urinaire mérite l'attention médicale de votre vétérinaire. Dans la très grande majorité du temps, une cause médicale est présente.

Signes

Si vous êtes témoin d'un ou de plusieurs de ces signes, consultez votre vétérinaire :


- Augmentation du nombre d'urines (souvent plus petites)
- Augmentation de la grosseur des urines
- Changement de couleur de l'urine
- Présence de caillots de sang dans l'urine
- Urine qui sent extrêmement fort
- Augmentation en parallèle de la boisson
- Goutte à goutte d'urine
- Animal qui urine sous lui en dormant
- Animal qui fait de l'incontinence urinaire
- Urines dans des endroits inappropriés ou inhabituels, par exemple en dehors de la litière, sur les tapis, coussins, lits, etc.



Consultez *immédiatement* si :

- Animal qui vocalise en urinant
- Chat mâle qui fait plusieurs va-et-vient dans la litière
- Animal qui n'arrive pas à uriner

Ces signes sont compatibles avec un blocage urinaire, condition qui nécessite une attention médicale **urgente**. Un « animal bloqué » peut décéder si rien n'est fait pour l'aider.



Problèmes urinaires


Causes possibles

Dans la majorité des cas, une cause médicale sera soupçonnée :

- infection dans la vessie
- présence de cristaux ou sable urinaire dans la vessie
- présence de calculs (pierres) urinaires
- infection rénale (aussi appelée pyélonéphrite)
- masse dans le système urinaire
- cystite de stress (aussi appelée cystite idiopathique) - chats
- incontinence urinaire
- douleur, arthrose
- comportemental

Blocage urinaire

Les blocages urinaires touchent majoritairement les chats mâles. Ils surviennent lorsque quelque chose, par exemple des calculs urinaires, se loge dans l'urètre, petit tube par lequel s'écoule l'urine de la vessie au pénis. À ce moment, l'urine ne peut plus évacuer la vessie, qui gonfle énormément. Les blocages urinaires sont une urgence médicale. Plus le temps passe, plus les dommages peuvent être nombreux et irréversibles : problèmes cardiaques dus à des déséquilibres électrolytiques, rupture de la vessie, insuffisance rénale irréversible, etc. Sans aucun soin, l'animal décède habituellement en quelques heures.



Attention : tout animal mâle qui semble forcer dans sa litière ou à l'extérieur devrait être amené rapidement au vétérinaire. Les chats bloqués peuvent avoir l'air « constipés » : on pense souvent à tort que ce sont les selles qui ne sortent pas.

Problèmes urinaires

Pourquoi mon vétérinaire me recommande-t-il de la nourriture spécialisée après un problème urinaire ?

La nourriture dite urinaire, est spécialisée pour

- Aider à régler les problèmes urinaires présents
- Prévenir leur apparition future

Par exemple, la nourriture urinaire est spécialement conçue pour faire fondre les calculs de struvites et prévenir la formation des calculs de struvites et d'oxalates. De plus, elles contiennent des anti-inflammatoires naturels. Enfin, elles favorisent une miction plus fréquente et ainsi, empêche les urines de trop se concentrer dans la vessie.

Certaines nourritures urinaires sont spécialisées. Par exemple, certaines sont spécialement conçues pour les chats stressés. Certaines autres sont hypoallergéniques, pour les animaux allergiques et qui ont des problèmes urinaires fréquents.



GUIDE DE LA LITIÈRE PARFAITE



Avoir une litière de plus
que le nombre de chats
dans la maison
(si vous avez 2 chats, il
vous faut 3 litières).

Les litières ne devraient
pas se situer dans un coin
sombre de la maison au
sous-sol, mais là où elles
sont facilement
accessibles. Elles
devraient être situées sur
l'étage où votre chat se
trouve la plupart du
temps.

Les litières devraient être
placées dans des endroits
différents de la maison
(pièces, étages) afin qu'un
chat qui se positionne dans le
cadre d'une porte ou dans un
escalier ne bloque pas l'accès
aux autres chats.

Les litières ne devraient pas
être en hauteur ni avoir de
couvercle.
Elles devraient être assez
grandes pour que le chat s'y
retourne facilement.

Chaque jour : devraient être nettoyées des besoins.

Chaque semaine : devraient être vidées et changées de substrat.

Chaque mois : devraient être complètement nettoyées avec du savon.

Mon animal boit et urine plus

Une attention médicale devrait être apportée à tout animal qui boit et urine plus. Voici les cas où il faut absolument consulter votre vétérinaire.

Situation 1 : Mon animal boit plus, donc il urine plus

Plusieurs maladies peuvent faire en sorte que votre animal boive plus. Nous appelons ça la **polydipsie**. Un animal qui a plus soif peut être expliqué pour plusieurs raisons, mais un bilan sanguin devrait être effectué pour éliminer certaines maladies, comme par exemple le diabète ou une maladie rénale. Les femelles non stérilisées devraient rapidement être vues, puisque les infections de l'utérus peuvent augmenter la prise d'eau.



Situation 2 : Mon animal urine plus, donc il boit plus

Le fait d'uriner plus s'appelle la **polyurie**. Elle peut aussi être expliquée par certains problèmes de santé, comme une infection urinaire et des calculs urinaires. Une analyse d'urine, des radiographies et parfois, un bilan sanguin permettra de mettre un doigt sur la cause du problème !



Dans beaucoup de cas, il est très difficile d'établir ce qui est survenu en premier. Les vétérinaires utilisent alors le terme « PUPD », pour désigner un animal qui urine et boit plus. Des tests devront être effectués pour trouver la cause et, ainsi, la traiter adéquatement.

Vous ne devriez surtout pas attendre si la situation s'accompagne de d'autres signes (animal qui mange moins, avec peu d'énergie, avec sang dans l'urine), etc.

Systeme cutané

Blessures cutanées superficielles

Il existe de multiples façons pour un animal de revenir avec une plaie cutanée : s'est coupé avec du verre, s'est accroché sur une branche d'arbre, s'est fait griffer ou mordre par un autre animal...



Quoi faire

- Nettoyez la plaie avec du savon doux sans parfum pour bien visualiser le problème.
- Si vous possédez un rasoir, rasez la plaie en prenant soin de raser sur un bon périmètre. On veut empêcher tout poil de toucher à la plaie.
Attention : les chats ont la peau très mince !
- Si la plaie saigne abondamment, faites un bandage légèrement compressif pour vous donner le temps d'aller chez le vétérinaire.

Conseils pour une guérison efficace

- Utilisez de la chlorhexidine pour nettoyer la plaie, matin et soir, jusqu'à la guérison
- Empêchez votre animal de se lécher : mettez-lui un collier Elizabetain, un bas, une manche, etc. Lécher la plaie peut mener à des infections.
- Utilisez l'**hydrothérapie** : envoyez un jet d'eau tiède à environ 30 cm de distance sur la plaie, 5 à 10 minutes, deux fois par jour. L'eau fait des miracles !



Évitez l'alcool et le peroxyde.

Consultez si

La plaie est **profonde**
Saignements **abondants**
Écoulements **purulents**
Odeur nauséabonde
Enflure autour de la plaie
Boiterie ou inconfort importants

L'acné chez les chiens et les chats, ça existe?

Oui !

Les félins sont plus souvent atteints d'acné que les chiens et celle-ci se manifeste généralement par des points noirs, qui sont en fait des comédons, ou des petits points blancs.

Très souvent, nous observons des points noirs sur le menton et le visage des animaux. Parfois, ces points noirs évoluent et s'infectent, laissant place à des boutons très rouges et avec du pus qui s'en échappe. Les animaux peuvent complètement perdre leur poil au niveau du menton et ressentir un inconfort.

Quoi faire ?

Dès que vous observez des points noirs sur le visage de votre animal, nettoyez-les avec un **savon doux sans parfum** ou avec de la **chlorhexidine**, matin et soir, jusqu'à ce que la peau redevienne saine. Évitez les yeux.

Si vous observez des rougeurs, du pus et/ou une perte de poils, consultez rapidement votre vétérinaire qui pourra prescrire une crème adaptée.

Quelles sont les causes ?

L'acné est un peu mystérieuse. On pense que certains animaux atteints ont des allergies, ce qui rend leur peau plus sensible. Il est généralement recommandé de ne pas utiliser de bols en plastique et de bien les nettoyer pour en éliminer les bactéries : choisissez plutôt des bols en métal, en verre ou en céramique.

Sachez que l'acné tend à être chronique : s'en débarrasser une fois ne veut donc pas dire qu'elle ne reviendra pas !

Plaies de chirurgie

Votre animal a subi une chirurgie (stérilisation, réparation de fracture, opération abdominale pour un corps étranger, etc.) et vous n'êtes pas certain de comment favoriser une guérison maximale ? Voici quelques conseils !

Ce qui est normal

- Une rougeur autour de la plaie
- Une croûte de sang sur la plaie
- Une enflure légère sous et autour de la plaie

Ce qui ne l'est pas

- Des suintements ou du pus qui sort de la plaie
- Un saignement en goutte à goutte ou abondant
- Une odeur nauséabonde
- Une rougeur accompagnée de chaleur autour de la plaie
- Une grosse bosse sous la plaie

Comment favoriser une bonne guérison

- Gardez votre animal au repos **pour 10 à 14 jours** : pas de jeux, pas de grosses marches, pas de sauts. Il existe des calmants si votre animal en a besoin.
- Ne donnez pas de bain ni permettez de baignade.
- Ne touchez pas la plaie et n'arrachez pas les croûtes de sang et les gales.
- S'il faut vraiment nettoyer, utilisez de la chlorhexidine.
- Mettez un collier Elizabetain **en tout temps** à votre animal pour l'empêcher d'aller lécher sa plaie, et ce, même s'il n'aime pas ça : une lichette = un risque d'infection !
- Téléphonez à votre vétérinaire ou envoyez-lui une photo à la moindre hésitation.

Les principales complications à la suite d'une chirurgie

— AU NIVEAU DE LA PLAIE

- Une **infection** de plaie : de la rougeur, une enflure, de la chaleur et du pus/suintement. Appelez votre vétérinaire pour qu'il évalue si l'animal a besoin d'antibiotiques.
- **Ouverture des points de suture** cutanés : certains animaux peuvent faire une réaction inflammatoire aux points de suture. S'ils tombent et que la plaie s'ouvre, contactez votre vétérinaire pour évaluer les options.
- Une grosse **enflure**/hématome peut survenir sous la plaie sans que ce ne soit problématique.

— ÉTAT GÉNÉRAL DE L'ANIMAL

- Votre animal peut **manquer d'énergie et d'appétit** pour 24h
- Certains animaux ne font **pas de selles** dans les 24-48h suivantes
- L'animal peut être en **douleur** : si vous pensez que les antidouleurs prescrits par votre médecin vétérinaire ne sont pas suffisants, n'hésitez pas à le contacter. D'autres molécules existent pour soulager votre coco !

— SAIGNEMENTS INTERNES

Dans de rares cas, principalement lors de la stérilisation de grandes chiennes ou grands chiens, les ligatures peuvent ne pas bien tenir. Ainsi, un saignement interne surviendra. Si vous voyez du **sang couler au goutte à goutte** ou si le ventre de votre animal semble **gonflé**, consultez rapidement.

— BLUE BAG

Chez les chiens mâles, du sang peut s'accumuler à l'**intérieur du scrotum** et causer ce qu'on appelle un « blue bag », dont le terme médical est un hématome scrotal. De la glace, du repos, des anti-douleurs et le temps arrangent habituellement cette condition douloureuse.

— HERNIE/DÉHISCENCE DE PLAIE

Les points de suture internes peuvent, dans de rares cas, ne pas tenir, causant une **ouverture de la paroi abdominale** où peuvent se loger les intestins. Une chirurgie de correction doit être envisagée.

Les masses

Les masses peuvent apparaître à n'importe quel âge. Toute nouvelle masse mérite une première attention vétérinaire. Sinon, voici quelques trucs pour les surveiller.

Les masses que vous risquez de remarquer peuvent être cutanées (c'est-à-dire sur la peau) ou sous-cutanées (sous la peau). Elles peuvent être molles, fermes, plus ou moins grosses, avec évolution lente ou rapide.

Bons plans

Dès que vous observez une nouvelle masse :

- Prenez-la en photo
- Évaluez-la :
 - Quelle est sa *grosseur* ?
 - Quelle est sa *couleur* ?
 - Quelle est sa *fermeté* ?

**Réévaluez la masse
aux 2 semaines environ**



Identification

Votre vétérinaire pourra procéder à certains tests :

— CYTOLOGIE

Votre vétérinaire ira chercher un échantillon de cellules à l'aide d'une petite aiguille pour pouvoir regarder au microscope.

— BIOPSIE

Votre vétérinaire ira chercher un échantillon de tissus (ou la masse entière) qu'il enverra à un pathologiste pour l'identification de la masse. Ce test est beaucoup plus précis.

Consultez si
la masse...

Grossit

Est **noire** ou **rouge**

Change d'**apparence**, de **couleur**, de
fermeté ou de **texture**

Suinte (pus, sang, autre)

Deviens **ulcérée**, à vif

Dérange votre animal


Implique une **mamelle**,
l'**anus** ou la **gueule**

Ça pique !

Il est normal qu'un chien ou un chat se gratte et se lèche de temps en temps. Par contre, le **prurit**, c'est-à-dire la sensation que ça pique, peut devenir un réel problème et être exagéré. Pour le régler, il faut trouver la cause.

Règle générale, on intervient lorsque :

- L'animal se fait des plaies en se grattant, se léchant ou se mordillant
- L'animal se cause une infection de peau
- Vous observez des plaques rouges et/ou des boutons
- Vous remarquez une perte de poils localisée
- L'animal se lèche ou se gratte dès qu'il est au repos
- L'animal arrête de jouer, de manger ou de dormir parce que ça gratte trop
- L'animal est toujours en train de se mordiller les pattes et la couleur du poil est différente (rousse, rouillée, brunâtre, rouge)



Causes des démangeaisons



- Des parasites, des bactéries, des champignons
- Des maladies de peau
- Des allergies alimentaires
- Des allergies environnementales

Traitements

Souvent, il est possible de mettre le doigt sur la cause et donc, de gérer le prurit en éliminant la cause primaire. D'autres fois, des essais thérapeutiques doivent être tentés pour trouver la cause. Il existe toutes sortes de médicaments pour gérer le prurit : des changements alimentaires, des injections, des comprimés, etc. Éliminer le prurit peut prendre du temps, mais il faut persévérer ! Le tout se fera étape par étape.

Comprendre les allergies

Il existe différents types d'allergies chez les animaux :

— ALIMENTAIRE

L'animal réagit à un élément dans sa nourriture, la majorité du temps étant une protéine animale (poulet, porc, bœuf, œuf, produits laitiers, poisson, fruits de mer, etc). Votre animal peut d'ailleurs être allergique à plusieurs éléments.

— ENVIRONNEMENTALE

L'animal réagit à un élément dans son environnement (gazon, pollen, arbres, acariens, poussière, etc.)

— DE CONTACT

L'animal a touché quelque chose auquel il est allergique. Les symptômes les plus fréquemment observés incluent de la rougeur et de l'urticaire. Le retrait de l'allergène règle habituellement le problème.

Symptômes

- Diarrhées, vomissements et/ou une alternance des 2
- Reflux gastriques, nausées
- Animal difficile, qui se « tanne » des différentes nourritures
- Prurit (peau qui pique !)
- Otites à répétition

Les animaux dont la peau pique ne se gratteront pas : ils vont plutôt se lécher intensément et/ou se mordiller. Souvent, vous observerez un manque de poils et, parfois, des rougeurs ou des plaies.

Traitements

Le meilleur moyen de soulager votre animal est de trouver la **cause** de l'allergie : votre vétérinaire pourra vous proposer un plan pour identifier si l'allergie est alimentaire (page suivante). Si l'allergie est environnementale, un test d'allergies intradermique chez un vétérinaire spécialisé en dermatologie pourra vous être proposé. Enfin, il est souvent nécessaire de soulager votre animal si l'allergène n'est pas identifié. Heureusement, il existe de nombreux médicaments dont vous pouvez discuter avec votre vétérinaire.

Pourquoi mon vétérinaire me recommande-t-il une nourriture hypoallergénique ?

Lorsque nous voulons identifier si l'animal a une allergie alimentaire, nous devons faire ce que nous appelons une **diète d'éviction**. Cela consiste à donner à votre animal une nourriture contrôlée et vérifier si les symptômes reliés aux allergies se poursuivent.

Certaines de ces diètes sont spécialement conçues pour que le système immunitaire de l'animal ne reconnaisse pas la protéine animale (hydrolysée) comme étant un ennemi. Certaines autres utilisent des protéines spécifiques qui ne causent habituellement pas de réaction allergique, comme la venaison, le soya, etc.

Règles

- La diète doit être donnée pendant un minimum de 8 semaines complètes pour voir son effet
- **Rien d'autre** ne doit être administré pendant ces deux mois.

Une fois l'allergie alimentaire identifiée, votre animal bénéficiera de rester sur cette nourriture sur le long terme.

ATTENTION

Toutes les nourritures dites « hypoallergéniques » ou contenant une seule protéine animale, vendues ailleurs qu'en cliniques vétérinaires, peuvent en réalité être contaminées. Ainsi, elles pourraient tout de même déclencher une réaction allergique.



La diète d'éviction devrait uniquement être faite avec la nourriture achetée chez votre vétérinaire.



ATTENTION



Actuellement, **aucun** test par la salive ou les poils n'est considéré comme fiable pour confirmer (ou infirmer) une allergie.

Plusieurs de ces tests sont vendus en ligne.

Ne vous laissez pas berner.




Les piqûres d'insectes

Votre animal se fait piquer en jouant avec une abeille ? Ou il revient de l'extérieur avec un gros bouton sur le nez ? Que faire si votre animal s'est fait piquer par un insecte ?

De la réaction allergique au choc anaphylactique

Le plus grand danger suite à une piqûre d'insecte est la réaction allergique. La majorité du temps, elle sera causée par une abeille ou une guêpe. La réaction allergique peut causer des **rougeurs** et de l'**urticaire** (des boutons qui piquent énormément). Cependant, il peut arriver que la réaction **évolue** et devienne un choc anaphylactique, c'est-à-dire une réaction allergique grave. Elle peut rendre la respiration de l'animal difficile et nécessite une consultation vétérinaire d'urgence.



Si votre animal démontre des signes de détresse, rendez-vous rapidement chez votre vétérinaire ou le centre d'urgence le plus proche.

Rougeurs et boutons

Nettoyez les rougeurs et les boutons avec un savon doux sans parfum et de la chlorhexidine, ou encore donnez un bain avec un shampoing doux. Surveillez en tout temps pour vous assurer que la réaction allergique n'évolue pas.

Consultez si

Museau gonfle

Yeux gonflent

Animal **halète**

Animal est **amorphe**

Difficultés respiratoires

Griffe cassée

Que ce soit en ayant joué trop fort dehors, en ayant glissé sur de la glace ou après une bagarre, une griffe cassée fait toujours mal.

Si la griffe lésée ne **touche pas le sol** (par exemple, sur un pouce), l'animal risque de moins souffrir et de guérir plus rapidement.


Si la griffe a été cassée à sa **base**, c'est-à-dire très près de la peau, vous pouvez simplement la nettoyer quotidiennement.

Si la griffe est brisée à sa **moitié**, il est recommandé d'aller voir votre vétérinaire : le traitement nécessite que la griffe soit coupée le plus court possible pour lui permettre de repousser normalement par la suite. Souvent, l'animal sera sédaté pour ce faire.

La solution Dakin

- Faites bouillir 4 tasses d'eau, puis laissez-la refroidir.
- Ajoutez-y 1 cuillère à thé d'eau de Javel 4%
- Trempez le pied de votre animal dans le bain de pieds quelques minutes, deux fois par jour. Cette solution permet de désinfecter la griffe pour qu'elle puisse repousser sans contracter d'infection.

Évitez toujours le visage, les yeux, les oreilles et la bouche.



Consultez si

L'animal **boite**
L'animal semble en **douleur**
Les **vaisseaux sanguins et les nerfs**
sont exposés

Griffe coupée trop court

Vous avez coupé la griffe de votre coco trop court ? Sachez que cela arrive même aux meilleurs ! Rassurez-vous, la griffe de votre animal va arrêter de saigner par elle-même.

Quand la griffe saigne

- Effectuez une **pression** sur la griffe pour arrêter le saignement. Vous pouvez aussi **surélever** la patte.
- Si insuffisant, mettez de la **farine** ou de la fécule de maïs sur le bout de la griffe pour aider à arrêter le saignement.
- Gardez votre animal **couché** et tranquille. S'il s'excite ou bouge, le saignement va recommencer.

Pour éviter de couper trop court

- Il vaut mieux couper quelques millimètres à la fois, plus souvent, que de tenter de couper un gros morceau et de faire saigner votre animal. Coupez seulement le bout pointu.
- Couper plus souvent permet aux vaisseaux sanguins d'éviter de pousser trop loin dans les griffes. Coupez dès que vous entendez les griffes claquer au sol.
- Optez pour un coupe-griffes de style « ciseaux » plutôt que « guillotine », vous aurez une meilleure visibilité.
- N'oubliez pas les petits pouces et les griffes surnuméraires s'il y a lieu.
- Si votre animal déteste la taille de griffes, faites une patte par jour ou étalez la session sur la semaine.
- Si votre animal panique, parlez-en à votre vétérinaire qui pourra prescrire des calmants pour rendre l'activité agréable.
- Essayez de couper les griffes lorsque votre animal est tranquille ou alors distrayez-le avec des gâteries ou des câlins.



ATTENTION

Peu importe le problème cutané, il faut empêcher votre animal de se lécher. La salive contient de nombreuses bactéries, ce qui peut empirer tout problème de peau et même causer des infections.




Les colliers Élizabetain solides sont faits pour empêcher votre animal de se lécher. Même s'ils sont encombrants, il ne faut pas les couper ou les modifier.

Les glandes anales

Saviez-vous que les chiens et les chats, contrairement aux humains, possèdent des glandes anales, qui sont comprises dans deux petits sacs anaux, à la sortie du rectum ? Elles produisent un liquide malodorant qui se vide lorsque les selles sortent par le rectum. On pense que le liquide sert à marquer le territoire.

Les glandes anales sont situées en bas et de chaque côté de l'anus, comme à 5h et 7h sur une horloge.



Parfois, un animal peut être incapable de vider le liquide de ses sacs anaux par lui-même. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu'il a un problème au niveau de son transit intestinal (des diarrhées), de l'obésité ou lorsqu'une petite masse vient boucher la sortie du canal vers le rectum. Plus souvent qu'autrement, toutefois, nous ne savons pas pourquoi ce problème se produit. Il pourrait aussi y avoir une composante génétique. Un animal qui n'arrive plus à vider ses glandes pourra montrer ces signes :

- Fait du **traîneau** - se frotte les fesses au sol
- Se lèche l'**anus** intensément
- Se **retourne** pour se regarder les fesses
- Vide ses glandes à des moments **inappropriés**
- Apparition d'un **trou/bosse/écoulement/rougeur** autour de l'anus

Consultez dès que vous voyez un de ces signes

Si on ne fait rien, une impaction des glandes peut survenir, puis un abcès. Du pus s'accumulera dans le sac anal et éventuellement, une fistule pourrait survenir près de l'anus. Ce problème est très douloureux et nécessite des soins vétérinaires.

Certains animaux auront besoin que l'on vide manuellement leurs glandes de façon régulière.

Systeme musculo- squelettique

Une boiterie

Il existe différents types de boiterie et les causes peuvent être extrêmement nombreuses. La majorité du temps, on ne sait pas vraiment ce qui a causé la boiterie. L'idéal lors de boiterie légère est de mettre votre animal au repos quelques jours. Si la boiterie persiste ou empire, il est temps de consulter.

Quelques exemple de causes et leurs traitements

Cause	Animaux plus fréquemment touchés	Traitement
Blessure musculaire ou tendineuse	Tous Chats et chiens	Repos Anti-inflammatoires
Déchirure d'un ligament	Chiens	Traitement chirurgical Traitement de la douleur
Fracture	Tous Chats et chiens	Traitement chirurgical Plâtre, attelle
Arthrose	Chats et chiens âgés	Traitements de la douleur Protection des articulations

À faire

Mettez l'animal **au repos** jusqu'à ce que la boiterie disparaisse :

- Pas de jeux
- Pas d'escaliers
- Marches pour faire les besoins uniquement
- Ne laissez pas votre chat sortir à l'extérieur

Consultez si

L'animal ne met **aucun poids** sur sa patte

L'animal **pleure** lorsque vous touchez sa patte

L'animal **a moins de 1 an**

La boiterie persiste **plus de 5 jours**

Mon chiot boite (ou a une démarche anormale)

De nombreuses pathologies peuvent affecter un chiot en croissance. Dans certains cas, le problème peut être passager et dans d'autres, la boiterie peut être un signe de quelque chose de plus grave.



Il arrive parfois que les chiots soient trop excités et qu'ils se fassent des blessures musculaires. Un peu de repos et la boiterie rentrera normalement dans l'ordre. Toutefois, il vaut mieux rapidement consulter votre vétérinaire pour éliminer :

- une **fracture** (par exemple, en sautant du lit)
- une **panostéite**, une inflammation des os longs, majoritairement des chiens de grandes races, qui est temporaire mais bien douloureuse.
- la **dysplasie de la hanche**, une malformation génétique touchant l'articulation entre le bassin et le fémur

Dysplasie de la hanche

Est une maladie **entièrement génétique** et douloureuse qui se développe dans les 2 premières années de vie du chien.

Elle consiste en une malformation au niveau de la hanche, qui mène généralement à une boiterie en bas âge puis, une fois adulte, à de l'arthrose secondaire. Différentes chirurgies existent pour aider les animaux atteints. Des radiographies des hanches peuvent permettre de détecter la dysplasie : elles vous seront donc recommandées à certains moments en bas âge, par exemple lors de la stérilisation de votre animal.

Luxation des rotules

Ce problème de santé touche plus souvent les petites races de chiens. Il survient lorsque la rotule (l'os du genou) se déplace hors de son sillon de mouvement habituel. En faisant l'examen annuel, il se peut que votre vétérinaire vous mentionne ce problème, qui est possiblement passé complètement inaperçu !

Symptômes

- Boiterie d'une patte arrière
- Chien qui court en lapin, c'est-à-dire les 2 jambes arrière collées ensemble
- Chien qui se secoue une patte arrière
- Parfois aucun symptôme !



Traitements

Le seul traitement curatif est une **chirurgie** pour aller attacher la rotule en place. Cette chirurgie est habituellement effectuée par un vétérinaire spécialisé en chirurgie et/ou en orthopédie. Autrement, la rotule continuera de bouger.

La luxation peut demeurer stable ou évoluer au fil du temps. Éventuellement, l'animal développe de l'arthrose au niveau de l'articulation atteinte, car il n'est pas normal pour des os de frotter ensemble. L'idéal est de continuer l'activité physique sans impacts à votre animal pour garder ses muscles forts et en santé et d'éviter le surplus de poids.

Grades

- 1** — Le vétérinaire peut déplacer la rotule, qui se replace automatiquement
- 2** — Le vétérinaire peut déplacer la rotule, mais doit la replacer manuellement
- 3** — La rotule est déplacée en tout temps, mais le vétérinaire peut la remettre en place manuellement
- 4** — La rotule est déplacée et le vétérinaire ne peut la replacer

L'arthrose du petit vieux

L'arthrose touche nos animaux vieillissants, à différents degrés. Chez certains animaux, son apparition sera plus rapide que pour d'autres. Dans le même ordre d'idées, la sévérité va aussi être unique à chaque animal.

Les signes

- Ralentissement des activités, animal qui reste couché plus souvent
- Animal qui veut moins jouer
- Animal qui hésite ou refuse de monter et descendre les escaliers ou des meubles
- Chien qui veut faire des marches plus courtes

La boiterie n'est pas le signe le plus souvent observé lors d'arthrose.

Comment prévenir

Bien que l'arthrose finira par survenir, il existe quelques façons de prévenir son apparition précoce et sévère :

- Gardez votre animal à un poids santé toute sa vie
- Donnez des suppléments alimentaires (voir page suivante)
- Choisissez une nourriture de bonne qualité adaptée aux problèmes articulaires lorsque votre animal vieillit
- Gardez votre animal actif avec des activités adaptées à ses articulations vieillissantes
- Agissez sur les problèmes musculo-squelettiques dès le jeune âge de votre animal si lieu est : luxation de genoux, dysplasie de la hanche, etc.

Traitements


Quand l'arthrose est déjà là, on ne peut la faire disparaître. L'examen vétérinaire permettra d'identifier les articulations douloureuses. Le vétérinaire peut traiter la douleur et rendre votre animal confortable : n'hésitez pas à communiquer avec lui à ce sujet pour connaître les modalités de traitements.

Les trucs gagnants lors d'arthrose

Suppléments articulaires

Il existe de nombreux suppléments alimentaires sur le marché pour aider vos animaux atteints d'arthrose, que ce soit pour la prévenir ou pour soulager la douleur. Votre vétérinaire en connaît certainement : n'hésitez pas à lui demander si un supplément est adapté à la santé de votre animal et quelle dose il a besoin. Parmi les plus populaires, notons :

- Oméga-3 et oméga-6
- Collagène de type 2
- Moule verte
- Chondroïtine et glucosamine (avec les autres)



Adaptation de l'environnement

Tout ce qui met une pression sur les parties du corps atteintes d'arthrose de votre animal risque de lui causer de la douleur.

Voici donc quelques adaptations pour faciliter la vie de votre animal vieillissant :

Ajoutez des tapis antidérapants pour l'empêcher de glisser.

Utilisez un harnais plutôt qu'un collier pour répartir la pression.

Soulevez les bols, pour diminuer le besoin de descendre le cou vers le sol.

Ajoutez des marches ou un tabouret pour aider votre animal à aller sur le divan ou le lit.

Ajoutez une pente douce pour monter sur le divan ou le lit. Attention à ce que la pente ne soit pas trop raide, ce qui serait aussi difficile que le saut.

Pourquoi mon vétérinaire me recommande-t-il une nourriture spécialisée à la suite d'un diagnostic d'arthrose ?


Plusieurs nourritures existent sur le marché pour les animaux plus âgés qui souffrent d'arthrose.

Elles contiennent les suppléments naturels mentionnés plus haut (comme l'oméga-3), en bonne quantité.

De plus, certaines de ces nourritures ont aussi une composante de perte de poids, un élément clé de la prise en charge de l'arthrose.

Elles pourront donc aider votre animal à perdre du poids et/ou alors à maintenir un poids santé en toute sécurité.





Mon animal prend du poids

Il est normal que le poids de votre animal fluctue légèrement au fil des saisons. Il est bien reconnu que certains chiens prendront moins de marches l'hiver, et que certains chats ne voudront plus sortir à l'extérieur non plus dès les premières neiges. Toutefois, il est nécessaire de ne pas laisser aller une prise de poids trop longtemps avant d'en investiguer la cause.

Situation 1 : Mon animal mange plus - et donc, il prend du poids.


Un chien ou un chat adulte qui se met à manger plus sans raison apparente - et non pas parce qu'il fait plus de sport, par exemple - devrait aller faire un tour chez le vétérinaire. Certaines maladies comme la maladie de Cushing peuvent augmenter l'appétit de votre ami, ce qu'on appelle la polyphagie. Des bilans sanguins, entre autres, permettront de voir si c'est le cas pour votre compagnon.

Situation 2 : Mon animal prend du poids même s'il ne mange pas plus.

Votre animal peut souffrir d'une maladie qui rend son métabolisme de base plus lent. Par exemple, les chiens adultes et âgés peuvent être atteints d'hypothyroïdie. Dans ce cas-ci, la thyroïde ne fonctionne pas suffisamment, rendant le métabolisme extrêmement lent. La maladie s'accompagne habituellement d'autres signes cliniques, comme la fatigue, l'intolérance à l'exercice, le fait d'avoir froid et un pelage de mauvaise qualité.

Causes non médicales menant à l'obésité

- Manger de la nourriture de table
- Manger une nourriture trop riche en calories ou non adaptée au stade de vie de votre animal
- Ne pas faire assez de sport (marches, jeux, etc.)



Pourquoi mon vétérinaire me recommande-t-il une nourriture pour la perte de poids ?


Tout simplement parce qu'il est plus facile de faire perdre du poids à votre ami poilu avec une nourriture spécialisée pour ce problème. Simplement diminuer les portions de nourriture habituelle peut rendre votre animal affamé. Il pourra alors :

- Devenir irritable
- Vous réveiller la nuit pour manger
- Vous déranger à toute heure du jour pour manger
- Manger des objets, des plantes, etc.
- Faire plus de mauvais coups

La nourriture spécialisée est riche en fibres tout en étant parfaitement équilibrée pour les besoins des chiens et des chats. Elle donne alors l'impression d'être « plein » plus longtemps, ce qu'on appelle la satiété et réduit le besoin de manger. Avec un plan d'exercices physiques, la perte de poids est alors assurée.

Et la nourriture d'animalerie pour perte de poids, c'est bon ?

Les nourritures vendues en animalerie pour perte de poids ne sont pas aussi efficaces. Elles permettent généralement d'empêcher la prise de poids, mais pas d'en faire perdre !



Mon animal perd du poids

Évidemment, si cela survient alors que votre animal fait plus de sport et qu'il semble autre part en bonne santé, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Voici toutefois des situations où il vaudrait mieux consulter votre vétérinaire.

Situation 1 : Mon animal mange plus, mais perd du poids

Cela pourrait indiquer un problème relié au métabolisme de base de votre animal, qui est dans ce cas-ci trop rapide. Les chats âgés peuvent être atteints d'**hyperthyroïdie**, une maladie où la thyroïde fonctionne anormalement et produit trop d'hormones. Ces chats auront alors tendance à perdre du poids même s'ils mangent bien, parfois même plus qu'avant. Ces chats auront beaucoup d'énergie et pour certains d'entre eux, miauleront plus! Un bilan sanguin permet généralement d'identifier ce problème.

Situation 2 : Mon animal mange beaucoup moins et perd du poids

Si votre animal mange de moins en moins et perd du poids, cela pourrait être expliqué par de nombreuses maladies, notamment une maladie rénale avancée, un cancer ou une maladie cardiaque. La plupart du temps, lorsque la perte de poids survient, l'animal mange moins depuis plusieurs semaines.

En général, consultez votre vétérinaire si la perte de poids s'accompagne :

- D'une perte d'appétit, de vomissements ou de diarrhées
- D'une perte d'entrain
- D'un changement de comportement (plus ou moins actif)

Consultez si votre animal :

- Est gériatrique
- Est connu pour avoir un souffle/maladie cardiaque ou rénale.

Médecine du comportement

Mon animal « capote » en voiture

En règle générale, les animaux n'aiment pas les transports en voiture pour 2 raisons principales : le mal des transports, ou encore l'anxiété liée au déplacement.

Le mal des transports

Votre animal a la nausée (oui, ça existe aussi chez nos animaux !)

Signes :

- Se lèche les babines
- Bave plus que d'habitude
- Avale sa salive sans cesse
- Vomit

Créez un environnement relaxant, en éteignant la musique et en fermant les fenêtres.

Essayez également :

- *Adaptil* pour chiens
- *Feliway* pour chats
- *Zylkène*

L'anxiété

Votre animal a tout simplement peur !

Signes :

- Se lèche les babines
- Baille plusieurs fois
- A les oreilles et la queue basses
- Ne cesse de bouger
- Vocalise (aboie ou miaule)
- Urine ou défèque

Vérifiez avec votre vétérinaire pour trouver ces produits naturels calmants. Si ce n'est pas suffisant, n'hésitez pas à demander des médicaments sous prescription pour aider votre animal.



Mon animal est-il anxieux ?

Il n'y a pas que les humains qui peuvent être anxieux, les animaux aussi. L'anxiété est un problème relié aux neurotransmetteurs dans le cerveau. Heureusement, cette condition est traitable. Un examen de santé complet doit être effectué avant de conclure à de l'anxiété.

Signes de l'anxiété généralisée

- Réactions exagérées lorsqu'il voit d'autres animaux, d'autres humains, des voitures, le facteur, etc.
- Jappements ou vocalisations exagérées, qui durent longtemps
- Peur des bruits, du tonnerre, des camions dehors, du vent.
- Réactions qui se produisent dans plusieurs contextes différents (en promenade, à la maison, au parc à chiens, etc.)
- Tend à s'empirer avec l'âge si non traité.
- Protection de ressources
- Attaque d'autres animaux et/ou les humains.

L'anxiété est irrationnelle :
ne grondez pas votre
animal lorsqu'il montre des
signes d'anxiété !

Signes de l'anxiété de séparation

Lorsque laissé **seul** :

- Vocalisations, jappements excessifs, plaintes vocales
- Destruction d'objets
- Défécation et urines inappropriées
- Animal qui se blesse (mange les barreaux de cage, par exemple)
- Animal qui ne dort et/ou ne mange pas, incapable de se reposer

Traitements

- Discutez avec votre vétérinaire des différents types de traitements.
- Il existe des traitements **ponctuels** (comme un calmant quelques heures avant l'événement stressant), mais il existe aussi des traitements **sur le long terme** tels que des anti-dépresseurs qui, couplés avec de la **thérapie comportementale**, permettent de rendre les animaux anxieux moins réactifs, d'apprendre et d'améliorer leur qualité de vie. Des spécialistes vétérinaires en comportement sont aussi disponibles pour vous aider.

Mythes sur l'anxiété

Mon animal se venge

Si vous laissez votre animal seul à la maison et qu'il urine, défèque ou encore, détruit des objets dans la maison, ce n'est pas parce qu'il se venge d'avoir été laissé seul : c'est qu'il souffre peut-être d'anxiété de séparation !

Mon animal ne bouge pas assez

Vous pensez peut-être qu'en augmentant beaucoup l'activité physique de votre animal, il démontrera moins de comportements d'anxiété. Détrompez-vous ! Bien que l'activité physique puisse grandement bénéficier aux animaux, elle n'est pas un traitement contre l'anxiété. Augmenter l'activité physique améliorera surtout sa santé générale.

Il faut punir pour régner

Si votre animal est anxieux, le punir (crier après lui, tirer fort sur la laisse, asperger son visage d'eau, etc.) risque d'aggraver le problème. Au contraire, l'animal anxieux a besoin d'être rassuré. Offrez-lui plutôt des gâteries lorsqu'il a peur pour que son attention soit redirigée.

Mon animal veut me défendre

Votre chien en laisse jappe et grogne, voire montre les dents, après les passants et les autres animaux ? Ce n'est malheureusement pas parce qu'il vous protège. C'est plutôt un mécanisme de défense pour éloigner ce qui l'effraie. Puisqu'il est en laisse, il sait qu'il ne peut pas fuir : le jappement/grognement reste alors sa seule option.

ATTENTION



Les colliers électriques, les *chokers*, les bouteilles pour asperger de l'eau, les colliers à la citronnelle et les colliers à vibrations **ne sont pas** des outils recommandés pour les animaux.


Ces méthodes pourraient, à l'inverse, augmenter l'anxiété de votre animal et les comportements indésirables.

Demandez conseil à votre vétérinaire.

La protection de ressources

La protection de ressources survient lorsqu'un animal, souvent un chien, démontre des signes d'agressivité lorsqu'on tente de lui prendre quelque chose ayant de la valeur à ses yeux. Cela peut être de la nourriture (son bol, ses gâteries, ses os) ou un objet. Certains chiens vont grogner dès que l'on s'approche du ou des objets en question, d'autres iront carrément jusqu'à mordre.

La protection de ressources est une forme d'anxiété : l'animal est terrorisé que l'on lui enlève ce qu'il considère comme précieux.



La protection de ressources n'est pas...

- De la dominance envers un humain ou un autre animal
- De la jalousie
- Un animal qui est difficile ou qui a du caractère
- Corrigée en grondant l'animal ou en le punissant
- Corrigée en retirant à l'animal ce qu'il tente de protéger (en voulant « l'habituer »; à l'inverse, cela peut aggraver le problème)

... Au contraire, elle nécessite...

- De respecter l'animal et ses besoins
- D'adapter l'environnement pour permettre à l'animal d'être tranquille (par exemple, manger séparé des autres, empêcher les jeunes enfants d'avoir accès aux bols, dédier un espace pour l'animal où on ne peut aller, etc.)
- D'être prise en charge rapidement
- Parfois l'aide d'un professionnel (vétérinaire, éducateur) et de médication pour l'anxiété.

Si votre animal fait de la protection de ressources,
n'hésitez pas à en discuter avec votre vétérinaire.

Mon vétérinaire veut sédater mon animal

Votre vétérinaire vous recommande, voire vous oblige à donner une sédation à votre animal avant son arrivée à la clinique ? Vous n'êtes pas certain d'être à l'aise avec l'idée ?

Imaginez un pompier qui entre dans une maison en feu sans son habit protecteur, ou alors un laveur de vitres au 20^e étage d'un bâtiment qui n'est pas attaché : c'est beaucoup trop dangereux ! C'est un peu la même idée lorsque votre vétérinaire vous demande de donner une sédation à votre animal : c'est pour sa protection et celle de son personnel, mais c'est aussi plus que ça !

UN EXAMEN PLUS DOUX

Un animal agressif chez le vétérinaire est, la majorité du temps, un animal apeuré et qui ne sait pas comment gérer ses émotions. En donnant un calmant à votre animal avant son arrivée, il sera généralement plus calme et plus apte à se faire manipuler. Cela permettra aux membres de l'équipe vétérinaire de relâcher leur contention (le tenir moins fort) et diminuera ainsi les risques de blessures pendant l'examen.

UN EXAMEN MOINS STRESSANT

Un animal plus zen donne habituellement un examen moins stressant. Sachez que chaque fois que votre animal est anxieux chez le vétérinaire, sa peur augmente exponentiellement. Il ou elle aura donc encore plus peur à la visite suivante - parfois jusqu'à en avoir une phobie !

UN EXAMEN PLUS COMPLET

Un animal qui se laisse toucher permet au vétérinaire de faire un examen plus complet et en profondeur, permettant alors d'identifier plus de problèmes s'ils sont présents.

La sédation se donne habituellement sous forme de pilule ou de liquide selon un protocole établi par votre vétérinaire. Ces médicaments sont appropriés et sécuritaires pour vos animaux.


Mon vétérinaire veut mettre une muselière à mon chien

La muselière : une alliée, pas une punition

Rassurez-vous, une muselière ne fait pas mal à votre chien : elle l'empêche simplement de prendre une bouchée de l'équipe vétérinaire ! Sachez que si votre vétérinaire recommande l'usage de la muselière, c'est qu'il ou elle détecte des risques pour sa sécurité et celle de son équipe. En effet, par le langage non-verbal, nous pouvons facilement soupçonner un animal qui veut mordre. Les vétérinaires sont conscients que les chiens sont rarement méchants ou agressifs naturellement : cependant, en contexte de clinique vétérinaire, ils ont **peur** !

D'ailleurs, chaque chien devrait être habitué dès son plus jeune âge à porter la muselière. Il en existe toutes sortes et de toutes les couleurs. Certaines permettent à votre animal d'aboyer et de manger malgré le port de la muselière.

Il existe de nombreuses façons d'habituer votre chien à la muselière, par exemple en associant la muselière à des gâteries et/ou à favoriser son port lors de moments paisibles où votre animal ne ressent pas de peur particulière.



À explorer sur Internet :

Bumas

Trust your dog

The muzzle movement

Big snoof dog gear

Mia's muzzles

Je n'arrive pas à mettre mon chat dans son transporteur

Pourquoi ?

- Si vous sortez uniquement le transporteur de votre chat au moment de l'amener chez le vétérinaire, ne soyez pas surpris s'il court se cacher dès que vous le sortez d'un placard !
- Votre chat risque d'associer son transporteur à un événement anxiogène : voiture, visite chez le vétérinaire, vaccination, etc.

Comment y remédier

- Laissez le transporteur ouvert dans l'environnement de votre chat. Il pourra donc aller l'explorer à tout moment. Il comprendra alors que le transporteur n'égale pas forcément une visite chez le vétérinaire.
- Laissez-y une couverture confortable, un jouet que votre chat aime, des gâteries ou de l'herbe à chats. Vous pouvez aussi essayer certains sprays à phéromones au pouvoir calmant.
- N'enfermez pas votre chat à l'intérieur pour l'y habituer : il risque d'avoir encore plus peur la prochaine fois.

Le transporteur parfait



- Est suffisamment **grand** pour que votre chat puisse s'y coucher et se retourner facilement
- Peut s'ouvrir par le **dessus** pour permettre à l'équipe vétérinaire d'aller le chercher sans avoir à y passer les mains, car cela peut donner l'impression à votre chat qu'il est coincé.
- Peut se transporter comme une **boîte** sur vos avant-bras, plutôt que par la poignée, pour donner une meilleure stabilité lors des transports
- Est **confortable** : il en existe des mous, des solides, des sacs à dos ; assurez-vous que votre chat y soit bien !

Mon chat m'attaque

Votre félin vous mord les doigts après une séance de câlins ? Vous attaque les mollets lorsque vous passez près de lui, tel un tigre en chasse ? Ou carrément, vous saute dessus pour vous mordre ? Plusieurs causes - et solutions - sont possibles.

Mon chat ne veut plus d'interactions

Vous étiez en train de flatter minet, mais tout d'un coup, il vous mord les doigts : c'est probablement parce qu'il n'a tout simplement plus envie de se faire toucher. Les chats vont habituellement nous envoyer des **signaux non-verbaux**, mais nous passons souvent à côté. Voici quelques exemples de langage non-verbal pouvant vous informer que minou ne veut plus de câlins :

- Oreilles qui penchent vers l'arrière
- Changement dans la posture, chat qui se raidit
- Chat qui bouge la queue frénétiquement
- Chat qui tente de partir, mais qui est retenu contre son gré



Mon chat s'ennuie

Certains chats vont s'ennuyer ! Effectivement, les chats sont des chasseurs dans l'âme et passer leur journée à la maison est parfois contre leur instinct naturel. Il existe plusieurs façons de stimuler votre chat sans avoir à le laisser aller librement à l'extérieur :

- Enrichissement de l'environnement : ajoutez des tablettes en hauteur et des arbres à chats, achetez des jouets (sécuritaires) ou encore des bols interactifs, etc.
- Passez plus de temps avec lui : tout chat, même le plus paresseux, mérite de passer un 10-15 minutes par jour à jouer et à se défouler avec son propriétaire. Lui apprendre des tours est extrêmement efficace, car la stimulation mentale le fatigue plus que la stimulation physique.
- Créer ou acheter un « catio », un endroit sécuritaire et fermé où les chats peuvent aller dehors. Cela leur permet d'être à l'extérieur, et ce, en sécurité. Certains propriétaires opteront pour un harnais et une laisse.

Systeme neurologique

Convulsions

Vous êtes témoin d'un des problèmes de santé les plus paniquants : des convulsions. Il n'y a malheureusement rien à faire au moment de la crise, à part attendre qu'elle se termine. Votre vétérinaire pourra discuter avec vous des causes possibles.

Avant la crise : l'aura

La période de quelques minutes qui précède habituellement une crise de convulsion s'appelle l'aura :

- Comportement différent
- Semble perdu
- Vocalise inhabituellement

Si vous êtes témoin de l'aura chez un animal dont vous savez souffrant de convulsions, préparez l'environnement. Retirez près de lui tout ce qui pourrait le blesser. Éteignez la musique et les lumières et respectez le silence.

Pendant la crise

- Ne tentez pas de retenir votre animal, vous risquez de vous blesser
- Diminuez le plus possible les stimuli autour de lui.



Même si l'expérience est paniquante, voici ce que vous pouvez faire pendant la crise, qui pourra aider votre vétérinaire : **filmez** votre animal et **chronométrez** la crise.



Après la crise

- Laissez votre animal reprendre ses esprits tranquillement
- L'animal peut sembler perdu pendant plusieurs minutes, voire heures
- Ne le forcez pas à boire ni manger
- Appelez votre vétérinaire ou le centre d'urgences le plus près.

Manifestations neurologiques

Les problèmes neurologiques peuvent prendre plusieurs formes. Parmi les plus communes, pensons aux problèmes qui affectent le cerveau et à ceux qui affectent la moelle épinière, située dans la colonne vertébrale.



L'épilepsie

L'épilepsie existe chez les animaux. Il faut toutefois éliminer les autres causes pouvant causer des convulsions. Une IRM peut être envisagée, dans un centre spécialisé.

Comme chez les humains, les animaux peuvent faire des crises d'épilepsies généralisées (perte de conscience) ou focales. Lors de ces dernières, l'animal peut rester conscient et avoir simplement ce qu'on appelle « un twitch » : une oreille ou un œil qui branle, un tremblement, etc. Si vous observez quelque chose qui vous semble inhabituel, filmez-le et montrez la vidéo à votre vétérinaire.

Si vous observez chez votre animal un seul ou plusieurs des symptômes ci-dessous, consultez **immédiatement**.

La **poussée au mur** survient lorsqu'un animal colle le dessus de sa tête contre une surface dure, souvent un mur, et demeure dans cette position pour une longue période. Ceci peut indiquer un problème neurologique grave. Il est important de consulter votre vétérinaire.

Consultez si

- Pertes de **conscience**
- Incontinence** urinaire/fécale
- Convulsions**
- Membres **rigides**
- Tourne en **rond**
- Tête **penchée** sur le côté
- Traîne** une ou des pattes au sol
- Incapable** de se lever
- Poussée au mur**
- Immobile et hurle**

Hernies discales

Les animaux ne sont pas à l'abri de faire des hernies discales. Cette pathologie touche les disques intervertébraux, les petits coussins qui se situent entre les vertèbres de la colonne vertébrale. Leur travail est, entre autres, d'absorber les chocs.

Races prédisposées

Certaines races de chiens sont prédisposées à faire des hernies discales, dont le teckel, le bouledogue français, le shih tzu, le bichon maltais, le bichon frisé et le beagle, pour ne nommer que ceux-là.

Consultez rapidement :
les hernies discales
sont douloureuses !

Symptômes moteurs

- Boiterie
- Difficulté à se déplacer
- Refus de bouger
- Refus de sauter
- Refus de monter
- Refus de descendre
- Douleur, cris
- Paralyse



Symptômes sensitifs

- Perte de sensation
- Patte qui traîne au sol
- Incontinence urinaire
- Incontinence fécale
- Incapacité d'uriner
- Incapacité de déféquer
- Démarche précaire

Traitements

Votre vétérinaire discutera des traitements possibles. Une chirurgie effectuée par un spécialiste est habituellement curative. Autrement, des anti-douleurs, des antispasmodiques et du repos permettent généralement de gérer la douleur. Des séquelles temporaires et permanentes peuvent être possibles. Il existe aussi des thérapies alternatives qui pourraient soulager votre compagnon. Le pronostic dépendra de la sévérité du problème initial.

Systeme oculaire (les yeux)

Problèmes oculaires

Les conjonctivites sont assez fréquentes chez nos animaux de compagnie. Puisque les yeux sont fragiles, il faut rester à l'affût de complications.

<i>Problème</i>	<i>Quoi faire</i>	<i>Consulter ?</i>
Blanc d'œil (sclère) rouge, paupière légèrement enflée	Compresse froide/ tiède sur l'œil	Surveillez. Consultez si ne s'améliore pas en quelques jours.
Écoulements transparents	Compresse froide/ tiède sur l'œil, larmes artificielles pour soulager les yeux secs	Surveillez. Consultez si les écoulements deviennent purulents/mucoïdes
Écoulements purulents	Essuyez les sécrétions plusieurs fois par jour en attendant le rendez-vous vétérinaire	OUI, rapidement.
Tient son œil fermé / Blépharospasmes (cligne de l'œil + souvent)	Compresse froide/ tiède en attendant le rendez-vous vétérinaire	URGENCE
Un œil plus gros que l'autre / exorbité	URGENCE	URGENCE
Voile sur l'œil, changement de couleur	-----	OUI, rapidement
Pupilles de grosseurs différentes, pupilles dilatées en tout temps	Observez si votre animal semble être encore capable de voir	OUI, rapidement

Certains chiens, dont les races brachycéphales (le nez écrasé), ont les yeux globuleux. Ils ont donc tendance à avoir les yeux secs plus facilement. Il est bénéfique pour ces animaux de leur mettre des larmes artificielles quotidiennement en prévention afin d'éviter les conjonctivites et l'érosion de la cornée.

Petit lexique oculaire

Conjonctivite bactérienne	Inflammation des conjonctives, aussi appelée <i>pink eye</i> . Est une infection causée par des bactéries : un antibiotique et des anti-inflammatoires oculaires réussissent habituellement à la faire partir rapidement.
Ulcère cornéen	Plaie/cratère dans la cornée. Hyper douloureux pour l'animal. Si n'est pas pris en charge rapidement, peut devenir très profond et éventuellement, l'animal peut perdre son œil.
Nictitante	Est la troisième paupière des chiens et des chats. Se situe dans le coin médial (près du nez) des deux yeux. Elle s'ouvre vers l'extérieur de l'œil.
Cherry eye	Lorsque la glande lacrimale située derrière la paupière nictitante fait protusion dans l'œil. Elle va parfois retourner se placer seule ou alors une chirurgie peut la replacer au bon endroit.
Kérato-conjonctivite sèche (KCS)	Maladie principalement rencontrée chez les chiens, lorsque les glandes lacrimales ne produisent plus ou pas assez de larmes. Les animaux ont alors les yeux très secs, pouvant causer d'autres problèmes.
Glaucome	Augmentation de la pression dans les yeux. Est une urgence . Sera traitée avec des gouttes oculaires et un suivi de la pression sur du long terme.
Uvéite	Inflammation de l'uvée (chambre antérieure de l'œil). Plusieurs causes peuvent mener à une uvéite. Elle sera diagnostiquée avec un test spécial appelé « Tyndall » et avec la prise de pression intra-oculaire qui sera diminuée.
Cataracte	Opacification du cristallin. Différents niveaux de cataracte existent, pouvant mener d'une perte de vision à la cécité totale.
Sclérose nucléaire	Est une augmentation de la densité du noyau du cristallin touchant les plus vieux animaux. L'animal demeure généralement visuel. C'est l'équivalent de la presbytie chez les humains vieillissants. Par contre, votre animal n'a pas besoin de lunettes pour lire !

Esthétique oculaire



Problème

Quoi faire

Poils roussis/brunâtres sous les yeux	Nettoyez quotidiennement les poils avec des lingettes spécialisées pour la coloration sous les yeux. Une fois tâchés, il faut parfois faire couper les poils par un professionnel.
Petites croûtes dans le coin des yeux	Ce sont tout simplement des petites crottes d'yeux. Les retirer délicatement tous les jours.
Partie blanche des yeux qui devient brunâtre/rougeâtre	Les races de chiens avec les yeux globuleux (les brachycéphales, les chihuahuas, etc.) ont souvent la sclère, soit la partie blanche de l'œil, qui devient brunâtre ou rougeâtre. Cela est sans conséquence et est plutôt une réaction de défense normale de l'œil, qui est moins lubrifié que la normale.




Attention aux produits utilisés près des yeux : évitez l'alcool et la chlorhexidine. Optez plutôt pour de l'eau et du savon doux sans parfum.

ATTENTION



Il peut être tentant d'utiliser des gouttes oculaires que vous avez déjà à la maison, pour vous ou votre animal, pour soulager votre animal qui coule des yeux ou qui a les yeux rouges.

Certains de ces médicaments peuvent contenir un anti-inflammatoire stéroïdien, qui peut être **dangereux** s'il y a présence d'un ulcère. Autrement, les gouttes pourraient masquer un problème oculaire plus grave qui nécessite une attention médicale. De plus, certains médicaments comme le polysporin peuvent causer une réaction anaphylactique chez les chats.



Les yeux sont précieux, consultez votre vétérinaire avant d'y mettre quoi que ce soit.

Dentition

Soins dentaires

Les dents des animaux sont sujettes à la plaque dentaire, au tartre et à la gingivite, comme les humains ! Des soins fréquents limiteront les problèmes reliés aux dents et diminueront le besoin de devoir faire un détartrage.

Trucs à essayer

- Nettoyez les dents avec une brosse à dents et du dentifrice, une fois par jour. Attention de ne pas prendre du dentifrice pour les humains; doit être sans fluore.
- Nettoyez le côté extérieur des dents en priorité.
- Soulevez la babine de votre animal et glissez-y la brosse à dents pour effectuer le frottement. Pas besoin d'ouvrir la gueule de votre animal.
- Si la bouche est très petite, optez pour une brosse à dents qui s'installe au bout du doigt (plutôt que sur un manche).

Alternatives si le brossage est impossible

- Il existe des lingettes texturées qui miment le brossage des dents.
- Si votre animal ne présente aucun problème de santé, optez pour de la nourriture dentaire. Les croquettes étant plus grosses, l'animal est obligé de les croquer. Leur composition mime le brossage des dents et retire le tartre.
- Il existe des lingettes texturées qui miment le brossage des dents
- Offrez des gâteries spécialisées dans le nettoyage des dents.
- Les additifs pour l'eau de boisson ne font pas de tort, mais ne font pas de miracle non plus : ils ne remplaceront jamais le brossage des dents.

Détartrage et extraction de dents

Lorsqu'il est impossible de brosser les dents, la plaque dentaire se transforme en tartre et s'accumule principalement sous les gencives. Lorsque le tartre y est trop longtemps, les gencives s'enflamment et les dents pourrissent. À ce moment, les dents branlent et tombent. **Ce processus est extrêmement douloureux.**

Détartrage sous anesthésie : quand faut-il le faire ?

- Dès l'apparition de gingivite (ligne rouge au-dessus des dents, indiquant de l'inflammation et donc que le tartre sous les gencives doit être retiré).
- L'âge n'est pas une contre-indication. Si l'animal est en santé, il n'y a pas plus de risques de faire une anesthésie. Un bilan sanguin pourra être fait pour vérifier que tout est beau.
- Les petites races de chiens ont tendance à faire beaucoup de tartre. Ces animaux bénéficieraient d'un détartrage préventif chaque année, comme les humains.
- Des radiographies dentaires sont recommandées à chaque dentisterie pour voir l'état des racines.
- Le faire plus souvent diminue le risque de devoir retirer des dents.

Extraction de dents : quand faut-il le faire ?

- Une dent est mobile
- Les racines sont exposées
- La dent est morte (brune, grise ou noire)
- La gingivite est trop sévère
- Les racines sont pourries ou qu'il y a maladie buccale
- Votre animal a un abcès dans la joue et/ou sous la dent
- Votre animal saigne du nez (trou entre la racine d'une dent et le nez)



Pour diminuer l'accumulation de tartre :

- Évitez la nourriture de table
- Évitez de donner uniquement de la nourriture en conserve, si possible

Le saviez-vous ?

Les chiens et les chats ne font pas de caries.

Les chiens adultes possèdent 42 dents, tandis que les chats adultes en possèdent 30.



Les animaux peuvent très bien vivre s'ils n'ont plus aucune dent. Ils peuvent d'ailleurs continuer de manger des croquettes, en les avalant tout rond ou en les mâchant avec leurs gencives. L'ajout d'eau peut être utile pour les ramollir.

Il est rare qu'un animal arrête complètement de manger parce qu'il a mal aux dents, et ce, peu importe la gravité de la maladie buccale. Généralement, une anorexie complète mérite une investigation médicale poussée pour trouver une autre cause. D'ailleurs, cela permettra de vérifier que votre animal ne souffre pas d'un autre problème de santé avant de procéder à l'anesthésie générale pour effectuer la dentisterie.


Les chats sont propices à faire de la résorption dentaire, une maladie très douloureuse qui implique la destruction de la dent. Elle se présente souvent comme une tache rouge sur la dent. Le seul moyen de gérer cette maladie est de retirer les dents atteintes sous anesthésie générale. Ils peuvent aussi souffrir de stomatite, une inflammation sévère de la gencive qui nécessite le retrait de toutes les dents atteintes.

Pourquoi mon vétérinaire me recommande-t-il une nourriture dentaire ?

Les nourritures dentaires sont spécialement faites pour mimer le brossage des dents. Elles ont une formulation spéciale qui fonctionne ainsi :

- Les croquettes sont plus grandes que les croquettes « normales ». Leur grosseur oblige donc les chats et les chiens à les croquer, sans pouvoir les avaler tout rond. Si votre animal est de petite race, ne vous inquiétez pas : il existe des nourritures dentaires « petites races ».
- Lorsque la dent entre dans la croquette puis en sort, la matrice de la croquette cause une friction sur le tartre pour le faire décoller des dents.

Il est aussi possible de ne donner que quelques croquettes dentaires par jour pour qu'elles fassent leur effet (au moins 10 par jour). Cette nourriture peut donc servir de gâterie ou de petit repas d'appoint.



ATTENTION



Certaines personnes peuvent vous proposer un détartrage sans anesthésie générale (alors que votre animal est réveillé). Ce faisant, seul le tartre visible sur les dents sera retiré, mais pas celui sous les gencives.



Ceci est **illégal** - seuls les médecins vétérinaires peuvent pratiquer l'acte de faire un détartrage - et peut même être néfaste pour la santé buccale de votre animal.

En cas de doute, contactez votre vétérinaire.



Systeme auditif

Les oreilles

Elles peuvent être petites, longues, droites, pendantes, poilues... Il existe une multitude d'oreilles différentes chez nos amis les animaux.

Nettoyage

- Tirez l'oreille vers le haut pour bien visualiser l'entrée du canal.
- Appliquez plusieurs gouttes d'un produit nettoyant destiné au nettoyage des oreilles des animaux.
- Mettez-en jusqu'à ce que ça déborde.
- Massez la base de l'oreille.
- Laissez l'animal se secouer. Attention aux sécrétions qui vont sortir. Essuyez les saletés avec une lingette.

Chez les chiens et les chats, le tympan ne se trouve pas directement à l'entrée du canal : il y a en fait deux canaux, qui forment un L. Les sécrétions peuvent donc se retrouver très loin et il est très difficile de les atteindre avec un tissu ou un Q-Tip, c'est pourquoi il faut mettre beaucoup de produit nettoyant.

Fréquence

La fréquence de nettoyage dépend de votre animal. Certains animaux ont pratiquement besoin d'aucun nettoyage alors que d'autres en auront besoin plus fréquemment. Si votre animal ne fait pas beaucoup de cérumen et jamais d'otite, nettoyer les oreilles n'est pas une nécessité. Par contre, s'il a tendance à faire des otites régulièrement, un nettoyage plus fréquent sera pertinent.



Conseils

- N'entrez pas de Q-Tip dans les oreilles : ça ne va que repousser la cire plus loin et peut causer un bouchon. Vous pourriez endommager le tympan.
- Utilisez uniquement des produits qui sont strictement destinés aux animaux.
- N'utilisez pas de médicaments antibiotiques par vous-même.

Les otites


Symptômes

- Animal qui se secoue la tête
- Animal qui se gratte les oreilles ou le visage
- Animal qui a des plaies près ou dans les oreilles
- Animal qui n'a plus de poils autour des oreilles
- Rougeur du pavillon des oreilles
- Plus de sécrétions que d'habitude ou de couleur différente
- Odeur nauséabonde dans les oreilles
- Liquide qui s'écoule de l'oreille, sang dans l'oreille
- Animal qui a une tête penchée d'un côté
- Animal qui a une oreille penchée ou plus basse que l'autre
- Animal plus amorphe, qui mange moins (douleur)

Pourquoi consulter ?

Vous avez chez vous des gouttes pour les oreilles que votre vétérinaire vous a fournies la dernière fois ? Cela peut être tentant de les utiliser, mais voici pourquoi vous devriez consulter votre vétérinaire à chaque nouvelle otite :

- Pour identifier le pathogène responsable (bactéries, levures, mites, etc.) L'identification au microscope permettra de s'assurer du bon traitement.
- Un mauvais traitement peut causer une résistance et donc une otite plus difficile à traiter.
- Débuter un traitement peut fausser les résultats de tests qui pourraient être pertinents.
- Pour identifier une cause sous-jacente expliquant les otites répétitives.




Othématome

Un othématome se caractérise par une oreille qui devient **très grosse, gonflée et molle**. Elle survient lorsque des vaisseaux sanguins qui se trouvent dans l'oreille se rompent et que le sang s'accumule entre les deux parois du pavillon de l'oreille. Il survient plus souvent chez les chiens et peut toucher toutes les races. Cependant, les chiens aux oreilles longues et tombantes sont un peu plus à risque.

Causes habituelles

- Un traumatisme sur l'oreille
- Un animal qui se secoue la tête
- Un animal qui se gratte l'oreille



Généralement, votre vétérinaire vérifiera si une otite se cache dans l'oreille atteinte, si votre chien souffre d'allergies ou si votre animal a des parasites.

Traitements

Habituellement, il faut vider le sang qui se trouve entre les 2 parois de l'oreille, et l'empêcher de revenir. Pour ce faire, votre vétérinaire pourra vous proposer plusieurs traitements possibles, tels que :


- Vider l'oreille en y faisant un petit trou
- Y placer une canule et la laisser en place pour quelques jours
- Aller en chirurgie pour réparer l'oreille (lors des récurrences fréquentes)
- Traiter l'otite sous-jacente, si présente

Un othématome peut se résorber par lui-même, mais la majorité du temps, il faut consulter votre vétérinaire dès l'apparition de la première accumulation de sang. Il occasionne de la douleur et, sans traitement, peut mener à des infections ainsi qu'à des malformations permanentes.

ATTENTION



Si, à la suite d'une consultation pour un problème de santé, votre animal ne va pas mieux ou si son état empire, rappelez rapidement votre vétérinaire.



Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à filmer votre animal et à envoyer la vidéo à votre vétérinaire.

Intoxications



Une rapide recherche sur Internet vous indiquera si ce que votre animal a ingéré est toxique ou non. Voici une liste non exhaustive des intoxications les plus fréquentes.

*En cas de doute, **appelez rapidement votre médecin vétérinaire** en lui indiquant ce que votre animal a mangé, quelle quantité et quand, si vous savez.*

Chocolat

Tous les chiens de moins de 10 livres, ainsi que les chats devraient immédiatement consulter un vétérinaire s'ils ingèrent du chocolat :

- Si votre animal a ingéré le chocolat il y a moins de 30 minutes, allez chez votre vétérinaire pour induire les vomissements.
- En cas de doute sur la dose toxique, téléphonez à votre vétérinaire. Ayez en main si possible la quantité ingérée ainsi que le type de chocolat (au lait, noir, blanc, etc). L'idéal est de connaître le pourcentage de cacao.
- Les premiers signes cliniques incluent vomissements et diarrhées.
- En grande quantité, le cœur peut accélérer, puis des convulsions peuvent survenir.
- En règle générale, le chocolat blanc n'est pas dangereux, sauf si des quantités exorbitantes ont été ingérées ou s'il contient du xylitol.

Toxicité

+ le chocolat contient de la **méthylxanthine**, + il sera **toxique** :

- toxicité ↓
- Chocolat blanc (quasiment aucun)
 - Chocolat au lait
 - Chocolat mi-sucré
 - Chocolat noir
 - Poudre de cacao
 - Fèves de cacao

Signes cliniques

- gravité ↓
- Ne cesse de bouger, fait les 100 pas
 - Hyperexcitabilité, agitation
 - Tremblements
 - Animal qui a très soif
 - Diarrhées
 - Vomissements
 - Cœur qui bat plus vite, arythmies cardiaques
 - Hypertension
 - Respiration rapide
 - Convulsions, coma
 - Mort

Chocolat



SURVEILLEZ



CONSULTEZ



DANGER



= environ 100 grammes

Chocolat au lait

Poids du chien (en livres) Quantité de chocolat (en grammes)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
5												
10												
25												
50												
100												

Chocolat noir

Rappel : 1 kg = approx. 2,2 lb

Poids du chien (en livres) Quantité de chocolat (en grammes)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
5												
10												
25												
50												
100												

En cas de doute, on appelle son vet!

Marijuana

Formes toxiques

Toutes les formes de marijuana sont toxiques pour les animaux :

- Herbe
- Joints
- Cuisinées (brownies, gâteau, etc.)

Signes cliniques

Les signes vont apparaître 1 à 3 heures après l'ingestion. Ils incluent :

- Animal somnolent, léthargique ou à l'inverse, en état d'hyperexcitabilité (réaction à la lumière vive, aux sons forts, etc.)
- Vocalisations, désorientation, marche croche
- Tremblements
- Vomissements
- Hypersalivation
- Pupilles dilatées, rougeur oculaire
- Incontinence urinaire
- Problèmes cardiaques
- Convulsions, coma, mort

Votre vétérinaire peut placer votre animal sous perfusion le temps qu'il ne soit plus sous l'influence de la drogue. Il va garder votre animal au repos, hors de toute stimulation, et agir rapidement au besoin.

Attention !

Dans **tous les cas**, si vous soupçonnez une intoxication à la marijuana, n'hésitez pas à le communiquer à votre vétérinaire. Aucun jugement n'est porté, la priorité des vétérinaires est toujours de soigner l'animal. Un temps précieux peut être perdu à tenter de trouver ce qui se passe.

N'hésitez pas, d'autant plus si la forme contenait d'autres éléments toxiques, par exemple dans des brownies au **chocolat**.

Si vous vous rendez compte que votre animal a ingéré la drogue, amenez-le chez votre vétérinaire pour qu'il soit sous surveillance. Des soins pourront rapidement lui être apportés si des symptômes plus graves surviennent.

Donner du CBD à son animal

Le cannabidiol est l'ingrédient actif du cannabis provenant de la plante de chanvre. Contrairement au THC, autre élément retrouvé dans le cannabis, le CBD n'a pas d'effet hallucinogène.

En médecine humaine, le CBD a de nombreuses indications thérapeutiques potentielles :

- Anti-douleur
 - Anti-inflammatoire
 - Anti-anxiété
 - Anti-convulsivants
- et plusieurs autres...



Toutefois, au Canada, il est **illégal** de donner du CBD aux animaux de compagnie. De plus, il y a très peu d'études ayant démontré l'utilisation utile et sécuritaire du CBD chez les animaux de compagnie. **C'est pourquoi votre médecin vétérinaire ne peut vous prescrire ni vous recommander son utilisation.** Par ailleurs, aucun dosage n'est établi pour son usage avec les chats et les chiens.



Effets secondaires possibles

- Ataxie, difficulté à se déplacer, perte d'équilibre
- Léthargie

Ces signes sont souvent associés à une intoxication.

Médicaments pour humains

La majorité du temps, des médicaments pour humains sont administrés aux animaux avec de bonnes intentions, soit souvent celle de voir son animal plus confortable. Malheureusement, de nombreux médicaments sont toxiques pour nos chats et chiens.

Liste non exhaustive

- Acétaminophène (Tylenol)
- Ibuprofène (Advil, Motrin, Naproxen)
- Calmants et antidépresseurs
- Anxiolytiques
- Médication pour le TDAH
- Décongestionnants (Nyquil, Vicks)
- Multivitamines
- Crèmes pour le psoriasis
- Anticoagulants
- Antihistaminiques
- Pilules contraceptives
- Œstrogènes

Le saviez-vous ?

L'acétaminophène est extrêmement toxique pour les chats, et ce, même en petite quantité. Il a été rapporté que des chats sont décédés après avoir léché les pots contenant du Tylenol. Gardez toujours vos médicaments dans des bouteilles et dans des placards fermés.

Un **appel rapide** à votre vétérinaire devrait être un réflexe avant de donner quelque médicament que ce soit à votre animal. Que ce soit :

- Un médicament pour humain;
- Un médicament appartenant à un autre animal;
- Un médicament appartenant à votre animal, mais qui a été prescrit il y a longtemps.

Le médicament n'est peut-être pas toxique, mais la dose ingérée peut l'être !

Si votre animal ingère un médicament, appelez rapidement votre vétérinaire. Communiquez-lui le nom du médicament ainsi que la dose ingérée, si connue. Il pourra vous indiquer s'il faut faire vomir votre animal, l'hospitaliser, et/ou observer certains symptômes.



Plantes

Avant d'acheter une plante, vous devriez toujours vous renseigner à savoir si elle est toxique ou non pour votre animal.

Exemples de plantes toxiques chez le chat :

- Lys*
- Aloe vera
- Alocasia/Elephant ear plant
- Anthurium/Flamingo plant
- Amaryllis*
- Azalea/Rhododendron
- Begonia
- Crassula/Plante Jade
- Snake plant/Dracaena
- Hortensia
- Poinsettia (la plante de Noël), le Gui
- Devil's Ivy/Lierres du Diable
- Chrysanthème
- Tulipe
- Philodendron
- Monstera

***Toxicité grave. Consultez immédiatement**

Conseils

- Mettez vos plantes en hauteur
- Offrez de l'herbe à chats, que vous faites pousser, pour détourner vos chats de vos plantes
- Achetez des fausses plantes

Exemples de plantes sécuritaires pour le chat :

- Orchidée
- Hibiscus
- Violette africaine
- Palmiers
- Plante Polka Dot
- Prayer Plant/Calathea
- Spider plant/Chlorophytum comosum



Même lorsque la plante n'est pas toxique en elle-même, l'ingestion de n'importe quelle partie peut causer des vomissements, de la douleur abdominale et des diarrhées.

Le site **ASPCA, toxic and non-toxic plants** répertorie une liste des plantes toxiques et celles sécuritaires

Huiles essentielles

En règle générale, une huile essentielle ne devrait jamais être administrée par la bouche (incluant dans la nourriture ou l'eau de boisson), ni appliquée sur la peau ou le poil.



Utilisez un diffuseur pour vos huiles. L'essentiel est de permettre en tout temps à votre animal de quitter la pièce s'il en ressent le besoin.

Toujours bien diluer l'huile essentielle avant d'en faire la diffusion. Observez votre animal attentivement les premières fois que vous utilisez une huile. Cessez immédiatement sa diffusion si vous observez :

- Agitation
- Ptyalisme - animal qui salive intensément
- Éternuements, écoulements nasaux
- Léthargie soudaine, faiblesse
- Anorexie
- Vomissements ou diarrhées
- Convulsions



Huiles essentielles déconseillées

- Eucalyptus, menthe
- Lime
- Ylang Ylang
- Tea Tree
- Bergamot
- Orange
- Lavande *et bien d'autres !*




À la maison, j'utilise des huiles essentielles en diffuseur. Je m'assure de les utiliser dans une pièce bien aérée et de permettre à mes chats de quitter la pièce. Je surveille mes chats les premières minutes d'utilisation pour m'assurer que tout va bien.

Autres intoxications communes

Si votre animal a **ingéré ou même léché les éléments suivants**, contactez immédiatement votre vétérinaire régulier et, au besoin, le centre d'urgence le plus proche :

- Poison à rats (*Attention : connaître la marque ou la génération est essentielle pour déterminer le traitement*)
- Antigél
- Eau de Javel
- Lingettes pour sècheuse (ex: Bounce)
- Pastilles pour cuvettes
- Cigarettes
- Nicotine
- Produits contre les moustiques
- Alcool
- Avocats
- Chocolat (tous types)
- Café
- Raisins (frais et secs)
- Noix de Macadam
- Amandes
- Noix de Pécan
- Oignons
- Xylitol (retrouvé dans plusieurs aliments, comme certains beurres de cacahuètes)



Vous pouvez aussi contacter le centre anti-poison pour animaux de compagnie (en anglais seulement) au **1 888 426 4435**.

psssst ! Si possible, apportez l'emballage à votre vétérinaire !

Faut-il faire vomir son chien ?

Votre coco vient d'avaler tout rond quelque chose qu'il ne devrait pas avoir mangé ? Est-ce que le faire vomir est sécuritaire ?

Si possible, avant tout : *appelez votre vet !*

En règle générale, **il ne faut pas faire vomir** votre chien si :

- C'est un bébé
- Il a des problèmes de santé connus (vérifiez avec votre vétérinaire en premier)
- Il est déjà en train de faire des efforts de vomissements non productifs ou est déjà en train de vomir
- Il tousse ou semble avoir du mal à respirer
- Il s'est intoxiqué il y a plus d'une heure
- Il a avalé quelque chose qui pourrait être dangereux lors de sa remontée dans l'œsophage, tel que :
 - du verre cassé, une lame, une aiguille (coupures)
 - des produits irritants, des produits chimiques (brûlures chimiques et irritations)
- Si vous ne savez pas exactement ce que votre animal a ingéré
- S'il semble plus ou moins conscient

Dans le cas où les vomissements sont contre-indiqués, vous pouvez donner un peu de **vaseline** à votre animal pour tenter de lubrifier le tout.

Recette

- Administrez à votre chien du peroxyde d'hydrogène 3%
- 1 cuillère à soupe pour chaque tranche de 10 livres.
 - Si votre chien fait 25 livres, alors 2.5 cuillères à soupe.
- Effet attendu dans les 15 minutes
- Si votre chien ne vomit pas, vous pouvez donner une 2e dose.
- **Ne pas donner plus de 2 doses.**

Il ne faut surtout pas mettre vos doigts au fond de la gorge de votre chien, ni lui donner du sel pour le faire vomir, car cela peut être très dangereux sans supervision vétérinaire.

Votre vétérinaire a des produits **homologués et plus efficaces** pour faire vomir votre chien, sous supervision. Il pourra aussi lui administrer un antidote pour retirer les nausées par la suite.

Faut-il faire vomir son chat ?

C'est bien possible, dépendamment de ce qu'il a ingéré.

Sachez toutefois qu'il est **très difficile** de faire vomir un chat.


Le peroxyde d'hydrogène utilisé pour les chiens
n'est absolument pas une bonne idée pour les chats.

Si vous craignez pour la santé de votre chat après qu'il ait mangé quelque chose de toxique, *appelez votre vet !*

Votre vétérinaire possède des médicaments adaptés pour tenter de faire vomir votre chat, et ce, en toute sécurité.

Le saviez-vous?

Le terme scientifique pour « vomir » est en fait émèse.



Check-lists utiles





« Le meilleur des
thérapeutes a du poil
et 4 pattes. »



Trousse d'urgence à avoir en tout temps



- **Chlorhexidine** : est un anti-bactérien plus doux que l'alcool et le peroxyde qui a un effet qui dure longtemps après l'avoir appliqué sur la peau. Peut être utilisée pour nettoyer tous types de blessures. Par contre, attention de ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles et la bouche.
- **Thermomètre souple** : si vous soupçonnez que votre animal fasse de la fièvre, avoir un thermomètre vous permettra de vérifier rapidement. Nous recommandons les thermomètres souples, comme ceux pour les bébés, pour éviter de blesser votre animal. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, prenez rendez-vous chez votre vétérinaire.
- **Probiotiques et fibres** : il en existe plusieurs sortes (en pâte, en poudre, sous forme de gâteries, etc). Ils peuvent être utilisés de façon quotidienne, ou alors lorsque votre animal a des selles molles (ou même de la diarrhée). Ils aident à réguler la flore intestinale normale.
- **Nettoyant d'oreilles** : toujours utile si votre animal commence à avoir beaucoup de cire d'oreilles. La cire d'oreilles peut piquer et lorsqu'un animal se gratte, il peut se causer une otite. Vaut mieux prévenir !
- Une ou deux **conserves de nourriture Gastro-intestinale** (peu importe de quelle compagnie) : cette nourriture est recommandée lorsque votre animal a des selles molles ou de la diarrhée. Elle est facile à digérer et aide à reformer les selles. Cela peut être bien utile d'en avoir quelques-unes sous la main s'il n'est pas possible d'aller faire un tour chez le vétérinaire au moment où votre animal va moins bien. Vérifiez toujours les dates de péremption !



Liste pour mon chat en mon absence

Nom : _____ Sexe : F ☐ M ☐

Est-ce qu'il va dehors librement ? Oui ☐ Non ☐

Sa diète habituelle : _____

Horaire de repas : _____

Gâteries : _____

Ses habitudes de vie : _____

Conditions de santé : _____

Médication : _____

Quand ? _____

Médication : _____

Quand ? _____

Si mon chat tombe malade

Son vétérinaire : _____

Adresse : _____

téléphone : _____

J'autorise _____ \$ en soins si je suis injoignable

Pour me rejoindre : _____

Centre d'urgences le plus proche : _____

téléphone : _____



Liste pour mon chien en mon absence

Nom : _____ Sexe : F ☐ M ☐

Horaire des marches : _____

Sa diète habituelle : _____

Horaire de repas : _____

Gâteries : _____

Ses habitudes de vie : _____

Conditions de santé : _____

Médication : _____

Quand ? _____

Médication : _____

Quand ? _____

Si mon chien tombe malade

Son vétérinaire : _____

Adresse : _____

téléphone : _____

J'autorise _____ \$ en soins si je suis injoignable

Pour me rejoindre : _____

Centre d'urgences le plus proche : _____

téléphone : _____

Centres d'urgences

Rive-sud de Montréal

CENTRE VÉTÉRINAIRE DMVET SUD

514 633 8888

1 800 463 8555

1655 Boul. des Promenades, St-Hubert

CENTRE VÉTÉRINAIRE RIVE-SUD

1 866 524 4877

7415 Boul. Taschereau, Brossard

Rive-nord de Montréal

CENTRE VÉTÉRINAIRE LAVAL

1 877 651 2152

4530 A. 440, Laval

CENTRE VÉTÉRINAIRE DMVET BLAINVILLE

514 633 8888

1 800 463 8555

110-20 boul. des Châteaux, Blainville

Bon plan : entrez le
numéro de téléphone
du centre d'urgence le
plus près de chez vous
dans vos contacts. Vous
l'aurez déjà dans votre
téléphone en cas
d'urgence.



Montréal

CENTRE VÉTÉRINAIRE DMVET MTL

514 633 8888

1 800 463 8555

2300, 54e avenue, Montréal

CENTRE VÉTÉRINAIRE MONTRÉAL

1 855 671 2746

1901 Boul. Maisonneuve E, Montréal

Québec

CENTRE VÉTÉRINAIRE DMVET QUÉBEC

514 633 8888

1 800 463 8555

1301 Avenue Jules-Vernes, Québec

CENTRE VÉTÉRINAIRE DAUBIGNY

418 872 5355

3405 Boul. Wilfrid-Hamel, Québec



Mon premier rendez-vous chez le vétérinaire

Santé animale


- Vaccins recommandés selon le mode de vie de mon animal
- Vermifuges et produits contre les parasites recommandés
- Examen de santé complet et trouvaillles
- Discussion sur la stérilisation (âge approprié, technique, etc)
- Problèmes de santé fréquents chez la race de mon animal
- Nourriture recommandée selon l'âge et mode de vie

Démonstrations

- Comment nettoyer les oreilles ? Produits recommandés ?
- Comment brosser les dents ? Produits recommandés ?
- Comment faire la taille de griffes
- Comment appliquer les protèges-griffes des chats

Bien-être animal

- Enrichissements pour les chats
- Litières pour les chats
- Laisses, collier, harnais pour les chiens
- Jouets et gâteries appropriés pour mon animal
- Informations et recommandations sur les assurances animales





Mes rendez-vous suivants

Santé animale

- Tous les vaccins sont-ils à jour ?
- Mon animal a-t-il besoin d'un traitement contre les parasites ?
- Mon animal a-t-il besoin d'un vermifuge ?
- Trouvailles à l'examen physique
- Comment sont les dents et gencives de mon animal ?
- Comment sont les articulations de mon animal ?
- J'aimerais une recommandation alimentaire selon l'âge et le mode de vie de mon animal
- Serait-ce pertinent de faire une prise de sang annuelle ?

Bien-être animal

- Est-ce que mon animal a besoin d'un détartrage ?
- Est-ce que les griffes de mon animal sont trop longues ?
- Est-ce que le poil de mon animal est en santé ?
- Est-ce que les oreilles sont propres ? Devrais-je les nettoyer plus souvent ?
- Est-ce que mon animal semble en douleur ? (arthrose, bouche)
- Y a-t-il des suppléments alimentaires que je pourrais donner ?



Ma check-list de points à ne pas oublier de dire

NUTRITION

Nourriture de mon animal (marque, sorte) _____

Quantité (le plus exact possible) _____

Horaire des repas AM _____ PM _____ À volonté ☐

Gâteries _____

Nourriture de table Oui ☐ Non ☐ Précisez : _____

HABITUDES DE VIE

Fréquence du brossage des dents _____

Fréquence de taille de griffes _____

Fréquence du nettoyage des oreilles _____

Fréquence des bains _____

Nombre de marches par jour _____

Durée des marches _____

Parcs à chiens ? Oui ☐ Non ☐

Socialisation avec d'autres animaux ? Oui ☐ Non ☐

Chat qui va dehors ? Oui ☐ Non ☐

Libre ? Oui ☐ Non ☐ En harnais ? Oui ☐ Non ☐

SANTÉ

Vomissements ? Oui ☐ Non ☐ Fréquence _____

Nourriture non-digérée ? Oui ☐ Non ☐ Bile ? Oui ☐ Non ☐

Consistance des selles ? Formées ☐ Molles ☐ Liquides ☐

Appétit ? Normal ☐ Plus qu'avant ☐ Moins qu'avant ☐

Anorexie ? Oui ☐ Non ☐ Depuis quand ? _____

Prise d'eau ? Normale ☐ Plus qu'avant ☐ Moins qu'avant ☐

Énergie ? Normale ☐ Plus qu'avant ☐ Moins qu'avant ☐

Se gratte souvent ? Oui ☐ Non ☐

Fréquence _____ Où ? _____

Est-ce qu'il se gratte les oreilles ? Oui ☐ Non ☐

Gauche ☐ Droite ☐

Autres ressources

Éduchateur

Pépité d'or d'informations sur le comportement du chat. Trouvez-y des conseils et trucs à essayer, ainsi que des formations.

<https://educhateur.com/>



*Fear Free Happy Homes**

Informations et trucs pour rendre votre environnement “fear free”, c’est-à-dire sans stress pour vos animaux. Trouvez-y aussi des trucs pour rendre votre visites vétérinaires moins stressantes !

<https://www.fearfreehappyhomes.com/>

*en anglais seulement pour le moment

Animal poison control – ASPCA

Nombreuses informations sur les intoxications fréquentes: les plantes, les produits ménagers. En ligne et au téléphone.

Site web: <https://www.asPCA.org/pet-care/animal-poison-control>

Téléphone: 888 426 4435



@monvetdepoehe

En vrac



*Dans tous les cas, si vous avez le moindre doute,
un coup de fil rapide à votre vétérinaire vous dira
rapidement si votre animal doit être vu
ou si cela peut attendre.*



YEUX

Œil fermé	URGENCE
Écoulements purulents	Consultez
Écoulements transparents	Surveillez
Œil plus gros que l'autre	URGENCE
Saignements	URGENCE
Œil rouge	Consultez

GUEULE

Dent qui tombe	Consultez
Dent qui branle	Consultez
Dent fracturée	Consultez
Mauvaise haleine	Consultez
Ulcère sur les lèvres	Consultez
Rougeur de gencives	Consultez
Saignement de gencives	Consultez
Masse dans la gueule	Consultez
Museau enflé	URGENCE

NEZ

Écoulements purulents	Consultez
Écoulements transparents	Surveillez
Saignements de nez	URGENCE
Masse/Déformation du nez	Consultez
Éternuements	Surveillez

OREILLES

Sales/qui puent	Consultez
Se secoue la tête	Consultez
Se gratte les oreilles	Consultez
Oreille penchée	Consultez

PEAU

Plaie superficielle	Surveillez
Masse	Consultez
Masse qui saigne	Consultez
Masse changeant d'apparence	Consultez
Pellicules	Surveillez
Grattage/Mordillage/Léchage	Consultez
Hot spot/Infection/Pus	Consultez
Morsures	URGENCE
Plaques/Boutons	Consultez
Perte de poils	Consultez

En vrac

PATTES

Griffe cassée	Consultez
Griffe coupée trop court	Surveillez
Boiterie avec appui	Surveillez
Boiterie de plus de 5 jours	Consultez
Boiterie sans appui	URGENCE
Boiterie on/off	Consultez

URINE

Avec sang	Consultez
En dehors de la litière	Consultez
Avec douleur/vocalisation	URGENCE
Goutte à goutte (chat mâle)	URGENCE
+/- fréquent que d'habitude	Consultez
+/- quantité que d'habitude	Consultez
Écoulements purulents	Consultez

VOMISSEMENTS

1 seule fois	Surveillez
Avec sang	URGENCE
Plusieurs fois en quelques heures	URGENCE
Efforts de vomissements	URGENCE
Depuis quelques jours	Consultez
Des boules de poils	Consultez

SELLES / ANUS

1 diarrhée	Surveillez
Avec sang frais	Consultez
Noires	Consultez
Avec mucus	Surveillez
Blanches	Consultez
Absence de selles	Consultez
Constipation	URGENCE
Masse près de l'anus	Consultez
Abcès/Infection près de l'anus	Consultez
Anus sorti (prolapse)	URGENCE

CHANGEMENT DE COMPORTEMENT

Reste plus tranquille	Consultez
Se cache	Consultez
Ne peut se lever	URGENCE
Tombe sur le côté	URGENCE
Fait des convulsions	URGENCE
Amorphe/Léthargique	Consultez
Femelle fertile amorphe	URGENCE
Ne monte/descend plus les escaliers	Consultez
Tourne en rond	URGENCE
Tête penchée	URGENCE
Pousse la tête au mur	URGENCE
Semble perdu	Consultez
Vocalise plus	Consultez

APPÉTIT

Diminué quelques jours	Consultez
Anorexie complète	URGENCE
Augmenté	Consultez

RESPIRATION

Toux jeune chien	Surveillez
Toux vieux chien	Consultez
Détresse respiratoire	URGENCE
Toux chat	Consultez
Éternuements	Surveillez
Respiration abdominale	URGENCE
Lèvres/Langue bleues	URGENCE
Respiration rapide au repos	Consultez
Chat respirant gueule ouverte ..	URGENCE



AUTRE

Perte de conscience	URGENCE
Perte de poids	Consultez
Prise de poids	Consultez
Perte musculaire	Consultez
Ingestion de médicaments pour humains	URGENCE
Ingestion de chocolat	URGENCE
Ingestion de drogues	URGENCE

Vous ne trouvez pas
de réponse ici ?
Appelez votre vétérinaire !



Merci à Sarah Lortie-Watkins, qui a repassé cet e-book maintes et maintes fois, pour le rendre parfait; sans fautes et avec le design le plus « ça coche » possible!

Merci à Cloé, Tanya & Valérie - vous vous reconnaitrez sans doute - de m'avoir encouragée dès les premières écritures. C'est en partie grâce à vous que je n'ai pas abandonné, et ce, à plusieurs reprises.

Cet e-book est entièrement rédigé depuis nos cerveaux surchauffés !
Aucun ChatGPT de ce monde n'a pris part à sa réalisation.

Myriam

Questions ? Commentaires ?
monvetdepoehe@gmail.com

