

# Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011

Christine Garand  
Geneviève Marquis  
Josée Payette

Service de surveillance, recherche et évaluation  
Direction de santé publique

Novembre 2012

## Lanaudière et ses territoires de RLS



### Volet 1

Quelques indicateurs sur la  
santé physique et les  
habitudes de vie des jeunes  
du secondaire

### Conception et traitement des données

Christine Garand, Geneviève Marquis et Josée Payette  
Techniciennes en recherche psychosociale

### Comité de lecture

Patrick Bellehumeur, Élisabeth Cadieux, Abdoul Aziz Gbaya, André Guillemette et Louise Lemire

### Sous la coordination de

Élisabeth Cadieux

### Conception graphique et mise en page

Maryse Richard

### On peut se procurer un exemplaire de ce document en communiquant avec :

Direction de santé publique  
Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière  
245, rue du Curé-Majeau, Joliette (Québec) J6E 8S8  
Téléphone : 450 759-1157 ou sans frais 1 800 668-9229, poste 4294

### Pour toute information supplémentaire relative à ce document, veuillez contacter :

Le 450 759-1157 ou sans frais le 1 800 668-9229  
Christine Garand, poste 4417 ou christine\_garand@ssss.gouv.qc.ca  
Geneviève Marquis, poste 4311 ou genevieve\_marquis@ssss.gouv.qc.ca  
Josée Payette, poste 4244 ou josee\_payette@ssss.gouv.qc.ca

### La version PDF de ce document est disponible sur le site Web de l'Agence au :

[www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia](http://www.agencelanaudiere.qc.ca/sylia) sous l'onglet *Nos publications*

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée. Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

GARAND, Christine, Geneviève MARQUIS et Josée PAYETTE. *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011, Lanaudière et ses territoires de RLS, Volet 1 : Quelques indicateurs sur la santé physique et les habitudes de vie des jeunes du secondaire*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique, Service de surveillance recherche et évaluation, novembre 2012, 76 pages.

### © Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, 2012

Source du visuel de la page couverture : © Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 2010-2011*

Dépôt légal

Quatrième trimestre

ISBN : 978-2-89669-131-9 (Version imprimée)  
978-2-89669-130-2 (version PDF)

Bibliothèque et Archives Canada

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

# TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos.....	5
▶ <b>Caractéristiques des élèves du secondaire.....</b>	<b>9</b>
▶ <b>Activité physique de loisir et de transport.....</b>	<b>15</b>
Actifs dans les activités physiques de loisir et de transport.....	16
Sédentaires dans les activités physiques de loisir et de transport.....	17
▶ <b>Comportements sexuels.....</b>	<b>19</b>
Relation sexuelle consensuelle.....	20
Âge d'initiation aux relations sexuelles.....	21
Nombre de partenaires.....	22
Utilisation du condom.....	23
▶ <b>Conséquences de la consommation d'alcool ou de drogues.....</b>	<b>25</b>
Conséquence négative associée à la consommation d'alcool ou de drogues.....	26
Présence de problèmes évidents de consommation d'alcool ou de drogues (indice DEP-ADO).....	27
▶ <b>Consommation d'alcool.....</b>	<b>29</b>
Consommation d'alcool.....	30
Épisode de consommation régulière d'alcool.....	32
Consommation excessive d'alcool en une même occasion.....	33
Âge d'initiation à la consommation d'alcool.....	34
▶ <b>Consommation de drogues.....</b>	<b>35</b>
Consommation de drogues.....	36
Épisode de consommation régulière de drogues.....	38
Âge d'initiation à la consommation de drogues.....	39
▶ <b>État de santé.....</b>	<b>41</b>
Perception de sa santé.....	42
▶ <b>Expérience de travail.....</b>	<b>43</b>
Occupation d'un emploi.....	44
Blessures au travail dans l'emploi principal.....	45
Consignes ou entraînement reçus sur la sécurité ou les dangers au travail.....	46
▶ <b>Habitudes alimentaires.....</b>	<b>47</b>
Consommation de fruits et de légumes.....	48
Consommation de produits laitiers.....	49
Consommation d'eau.....	50
Consommation de boissons sucrées, de grignotines ou de sucreries.....	51
Consommation de malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte.....	52
Prise du déjeuner.....	53
Diagnostic d'allergies alimentaires.....	54

▶ Poids, apparence corporelle et actions à l'égard du poids.....	55
Évaluation de son apparence.....	56
Évaluation de son poids.....	57
Surplus de poids.....	58
Actions à l'égard du poids.....	59
Diminution du sucre ou du gras.....	60
Recours à des produits, services et moyens amaigrissants (PSMA).....	61
▶ Santé buccodentaire.....	63
Brossage des dents.....	64
Utilisation de la soie dentaire.....	65
▶ Santé respiratoire.....	67
Crises d'asthme.....	68
Sifflements dans la poitrine.....	69
▶ Tabagisme.....	71
Usage de la cigarette.....	72
Âge d'initiation à la cigarette.....	73
Quantité de cigarettes fumées par jour.....	74
Références bibliographiques.....	75

## AVANT-PROPOS

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) a réalisé, en 2010-2011, une enquête d'envergure auprès des jeunes fréquentant les écoles secondaires à l'échelle du Québec.

Cette première édition de l'*Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire* (EQSJS) vise précisément à combler des besoins d'information prioritaires sur l'état de santé et de bien-être des jeunes du secondaire et sur ses déterminants à partir d'une sélection d'indicateurs peu ou mal couverts par les enquêtes existantes.

Reprise tous les cinq ans, l'EQSJS permettra de suivre, dans le temps, les indicateurs de santé retenus. En fonction de l'ampleur des phénomènes et de leurs conséquences sur les jeunes, les résultats de cette enquête devraient être mis à profit afin d'éclairer la prise de décision liée au processus de planification sociosanitaire en permettant, d'une part, d'établir des parallèles entre les résultats obtenus et les actions sur le terrain et, d'autre part, de réfléchir sur ces actions.

### Objectifs et thèmes étudiés

L'objectif général de l'EQSJS 2010-2011 consiste à dresser un portrait de santé des jeunes fréquentant les écoles secondaires du Québec. L'enquête vise à recueillir l'information sur leur état de santé physique, mentale et psychosociale, ainsi que sur leurs habitudes de vie.

Les indicateurs retenus sont rattachés aux grandes thématiques suivantes :

#### **Volet 1 : Santé physique et habitudes de vie**

- ▶ Activité physique de loisir et de transport
- ▶ Comportements sexuels
- ▶ Consommation d'alcool et de drogues
- ▶ Expérience de travail
- ▶ Habitudes alimentaires
- ▶ Perception de l'état de santé
- ▶ Poids et apparence corporelle
- ▶ Santé buccodentaire
- ▶ Santé respiratoire
- ▶ Tabagisme

#### **Volet 2 : Santé mentale et psychosociale**

- ▶ Caractéristiques du groupe de pairs
- ▶ Environnement familial
- ▶ Environnement scolaire
- ▶ Estime de soi, résilience et compétences sociales
- ▶ Problèmes d'adaptation sociale
- ▶ Santé mentale

## Quelques aspects méthodologiques

La population visée par l'EQSJS 2010-2011 porte sur une population de quelque 430 000 élèves de la 1<sup>re</sup> à la 5<sup>e</sup> année du secondaire, inscrits au secteur des jeunes, dans les écoles québécoises publiques et privées, francophones et anglophones, à l'automne 2010. Sont toutefois exclus les élèves qui fréquentent les centres de formation professionnelle, les écoles situées dans les régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, les écoles de langue d'enseignement autochtone, les écoles gouvernementales hors réseau et celles composées d'au moins 30 % d'élèves handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. L'ISQ estime que la population visée par l'EQSJS couvre environ 98 % de l'ensemble des élèves québécois inscrits au secondaire au secteur des jeunes (Pica et autres, 2012, p. 30).

Le questionnaire de l'enquête a été rempli par 63 196 élèves répartis dans seize régions sociosanitaires du Québec entre le 2 novembre 2010 et le 17 mai 2011. La presque totalité des élèves répondants (95 %) a rempli un questionnaire auto-administré à l'aide d'un miniportable (auto-interview assistée par ordinateur).

Dans Lanaudière, ce sont 4 500 élèves présents dans 180 classes des 28 écoles sélectionnées qui ont accepté de répondre au questionnaire pour un taux de réponse pondéré de 91 %. L'échantillon lanaudois de répondants représente environ 16 % des 27 419 élèves de la population visée.

## À propos de la représentativité de Lanaudière

Tout comme pour l'*Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*, la Direction de santé publique de Lanaudière s'est prévaluée de la possibilité d'accroître la taille de l'échantillon lanaudois afin d'obtenir des estimations fiables à l'échelle des réseaux locaux de services (RLS) de son territoire.

Pour le RLS de Lanaudière-Nord<sup>1</sup>, le nombre d'élèves est de 2 166 pour un taux de réponse pondéré de 87 %. Quant au RLS de Lanaudière-Sud<sup>2</sup>, ce sont 2 334 élèves qui ont participé pour un taux de réponse pondéré de 93 %.

## Présentation de données à l'échelle locale

Ce document, sous forme de recueil statistique, expose les premiers résultats de l'EQSJS 2010-2011 pour les deux territoires de RLS tout en y présentant les données régionales et provinciales. Il présente des données fiables sur les jeunes qui fréquentent les écoles secondaires lanaudoises<sup>3</sup>. Il vise à fournir un aperçu des résultats et à illustrer le potentiel d'analyse des données de cette enquête.

---

<sup>1</sup> Comprend les territoires des MRC d'Autray, Joliette, Matawinie et Montcalm.

<sup>2</sup> Comprend les territoires des MRC Les Moulins et L'Assomption.

<sup>3</sup> Les données se rapportent au territoire de l'école fréquentée par le jeune et non à son territoire de résidence.

Celui-ci couvre 41 indicateurs touchant la santé physique et les habitudes de vie, thèmes abordés dans le volet 1 de l'EQSJS 2010-2011. Ils ont été croisés selon le sexe et le niveau scolaire de l'élève. Des tests ont été effectués sur l'ensemble des données présentées. Une ou des couleurs ont été appliquées à un pourcentage lorsqu'un ou des tests font ressortir une différence significative selon le sexe, le niveau scolaire ou entre territoires. Pour ce dernier niveau d'analyse, les territoires de RLS ont été comparés entre eux et Lanaudière avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière).

## Limites des résultats

Malgré la rigueur employée par l'ISQ pour réaliser une collecte de données la plus exhaustive possible et exempte de biais, les données présentées dans ce document comportent quelques limites. Elles peuvent être entachées par un biais de mémoire engendrant, selon le cas, une sous ou une sur-déclaration. Le phénomène de la désirabilité sociale peut aussi avoir mené à une sous ou une sur-déclaration, difficilement quantifiable, de certains comportements (ISQ et INSPQ, 2012).

## Comparabilité des résultats

Il importe de noter qu'il peut être hasardeux de comparer les résultats de l'EQSJS avec ceux d'enquêtes antérieures menées par l'ISQ ou Statistique Canada (Pica et autres, 2012). Toute tentative de comparaison devra prendre en compte les caractéristiques méthodologiques respectives des enquêtes (mode d'échantillonnage, mode de collecte de données, formulation des questions, etc.). L'absence ou la présence d'écarts entre les données de l'EQSJS et celles d'une autre enquête pourrait résulter de différences méthodologiques plutôt que d'un changement au sein de la population visée (ISQ et INSPQ, 2012).

## Utilité de l'outil

Nous souhaitons vivement que toutes les personnes qui gravitent auprès des jeunes, et de leurs milieux de vie, puissent profiter de ces données inédites. Grâce aux informations contenues dans ce document, et dans les publications thématiques à venir, ils pourront être mieux informés sur l'état de santé des jeunes du secondaire, cibler les problématiques préoccupantes ou en émergence, et mieux comprendre l'importance des déterminants qui influencent leur état de santé.

Les bénéfices envisageables à moyen et long terme rapporteront autant au milieu de la santé qu'à celui de l'éducation.

Le Service de surveillance, recherche et évaluation

Pour en savoir davantage sur chaque indicateur, le lecteur est invité à consulter le *Système Lanaudois d'Information et d'Analyse* (SYLIA) sur le site Web de l'Agence au [www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA](http://www.agencelanaudiere.qc.ca/syLIA) sous l'onglet *Statistiques*. Il y trouvera une fiche qui présente une description détaillée de chaque indicateur.



CARACTÉRISTIQUES  
DES ÉLÈVES  
DU SECONDAIRE

# Caractéristiques des élèves

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Répartition des élèves du secondaire selon certaines caractéristiques sociodémographiques et scolaires, territoires de RLS lanadois, 2010-2011 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	%	Population estimée <sup>1</sup>	%
<b>Sexe</b>				
Garçons	5 700	51,0	8 100	49,9
Filles	5 500	49,0	8 100	50,1
<b>Âge</b>				
12 ans ou moins	1 300	11,3	1 800	10,8
13 ans	2 000	18,0	3 400	20,7
14 ans	2 100	19,0	3 700	22,6
15 ans	2 200	19,7	3 100	18,8
16 ans	2 200	19,6	3 200	19,9
17 ans ou plus	1 400	12,3	1 200	7,1
<b>Niveau scolaire</b>				
1 <sup>re</sup> secondaire	2 500	22,2	3 000	18,4
2 <sup>e</sup> secondaire	2 400	21,7	3 900	24,1
3 <sup>e</sup> secondaire	2 700	23,9	3 500	21,5
4 <sup>e</sup> secondaire	2 000	17,6	3 100	19,2
5 <sup>e</sup> secondaire	1 600	14,7	2 700	16,7
<b>Niveau scolaire (cycles)</b>				
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	4 900	43,8	6 900	42,5
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	6 300	56,2	9 300	57,5
<b>Type de parcours scolaire</b>				
Formation générale	9 600	85,5	15 100	93,2
Autres types de parcours	1 600	14,5	1 100	6,8
<b>Situation familiale</b>				
Biparentale <sup>2</sup>	6 200	55,5	9 800	60,2
Reconstituée <sup>3</sup>	1 900	16,7	2 100	12,8
Monoparentale <sup>4</sup>	1 600	14,1	2 000	12,5
Garde partagée <sup>5</sup>	1 200	10,5	2 100	13,2
Autres <sup>6</sup>	400	3,2	200	1,3 *

La somme des pourcentages peut ne pas totaliser 100 % en raison des arrondis.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

<sup>1</sup> Population estimée arrondie à la centaine.

<sup>2</sup> L'élève vit avec ses deux parents (biologiques ou adoptifs).

<sup>3</sup> L'élève vit avec l'un de ses parents et le conjoint ou la conjointe de ce parent.

<sup>4</sup> L'élève vit avec un seul parent.

<sup>5</sup> L'élève vit la moitié du temps chez l'un de ses parents et l'autre moitié, chez l'autre parent.

<sup>6</sup> L'élève vit d'autres situations : famille ou foyer d'accueil, colocation, tutorat, seul, etc.

Source : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, 2012. Fichier masqué contre l'identification involontaire (FMII), *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011*.

### Répartition des élèves du secondaire selon certaines caractéristiques socioéconomiques, territoires de RLS Lanaudois, 2010-2011 (n et %)

	RLS de Lanaudière-Nord		RLS de Lanaudière-Sud	
	Population estimée <sup>1</sup>	%	Population estimée <sup>1</sup>	%
<b>Plus haut niveau de scolarité des parents</b>				
Inférieur au diplôme d'études secondaires	1 200	11,9	900	6,2
Diplôme d'études secondaires	2 400	23,1	2 600	17,3
Études collégiales	3 400	32,7	4 700	31,7
Études universitaires	3 300	32,4	6 700	44,8
<b>Statut d'emploi des parents</b>				
Deux parents en emploi <sup>2</sup>	7 000	69,3	12 000	78,9
Un seul parent en emploi	2 600	26,2	2 800	18,6
Aucun parent en emploi	500	4,6	400	2,4 *
<b>Perception de sa situation financière <sup>3</sup></b>				
Plus à l'aise	3 100	28,0	4 700	29,1
Aussi à l'aise	6 600	59,3	9 600	59,4
Moins à l'aise	1 400	12,7	1 900	11,5
<b>Indice de défavorisation matérielle et sociale</b>				
Quartile 1 (très favorisé)	3 400	33,7	5 500	38,5
Quartile 2 et 3	4 000	39,1	5 500	38,7
Quartile 4 (très défavorisé)	2 800	27,3	3 300	22,8

La somme des pourcentages peut ne pas totaliser 100 % en raison des arrondis.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

<sup>1</sup> Population estimée arrondie à la centaine.

<sup>2</sup> Lorsque l'élève ne connaît ou ne voit qu'un seul de ses parents, le statut d'emploi de ce parent unique est classé dans la catégorie "Deux parents en emploi".

<sup>3</sup> Il s'agit de la perception par l'élève de sa situation financière et de celle de sa famille par rapport à la moyenne des élèves de sa classe.

Source : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, 2012. Fichier masqué contre l'identification involontaire (FMII), *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011*.

# Caractéristiques des élèves

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Répartition des élèves du secondaire selon certaines caractéristiques sociodémographiques et scolaires, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (n et %)

	Lanaudière		Le Québec	
	Population estimée <sup>1</sup>	%	Population estimée <sup>1</sup>	%
<b>Sexe</b>				
Garçons	13 800	50,3	218 400	50,7
Filles	13 600	49,7	212 700	49,3
<b>Âge</b>				
12 ans ou moins	3 000	11,0	49 400	11,5
13 ans	5 400	19,6	77 600	18,0
14 ans	5 800	21,2	88 300	20,5
15 ans	5 300	19,2	86 700	20,1
16 ans	5 400	19,8	87 600	20,3
17 ans ou plus	2 500	9,3	41 500	9,6
<b>Niveau scolaire</b>				
1 <sup>re</sup> secondaire	5 500	19,9	86 200	20,0
2 <sup>e</sup> secondaire	6 300	23,1	90 200	20,9
3 <sup>e</sup> secondaire	6 200	22,5	96 200	22,3
4 <sup>e</sup> secondaire	5 100	18,5	83 100	19,3
5 <sup>e</sup> secondaire	4 400	15,9	75 500	17,5
<b>Niveau scolaire (cycles)</b>				
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	11 800	43,0	176 400	40,9
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	15 600	57,0	254 700	59,1
<b>Type de parcours scolaire</b>				
Formation générale	24 700	90,1	401 800	93,2
Autres types de parcours	2 700	9,9	29 300	6,8
<b>Situation familiale</b>				
Biparentale <sup>2</sup>	16 000	58,3	266 300	61,8
Reconstituée <sup>3</sup>	4 000	14,4	48 900	11,3
Monoparentale <sup>4</sup>	3 600	13,1	61 200	14,2
Garde partagée <sup>5</sup>	3 300	12,1	47 500	11,0
Autres <sup>6</sup>	600	2,1	6 800	1,6

La somme des pourcentages peut ne pas totaliser 100 % en raison des arrondis.

<sup>1</sup> Population estimée arrondie à la centaine.

<sup>2</sup> L'élève vit avec ses deux parents (biologiques ou adoptifs).

<sup>3</sup> L'élève vit avec l'un de ses parents et le conjoint ou la conjointe de ce parent.

<sup>4</sup> L'élève vit avec un seul parent.

<sup>5</sup> L'élève vit la moitié du temps chez l'un de ses parents et l'autre moitié, chez l'autre parent.

<sup>6</sup> L'élève vit d'autres situations : famille ou foyer d'accueil, colocation, tutorat, seul, etc.

Source : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, 2012. Fichier masqué contre l'identification involontaire (FMII), Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011.

**Répartition des élèves du secondaire selon certaines caractéristiques socioéconomiques, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (n et %)**

	Lanaudière		Le Québec	
	Population estimée <sup>1</sup>	%	Population estimée <sup>1</sup>	%
<b>Plus haut niveau de scolarité des parents</b>				
Inférieur au diplôme d'études secondaires	2 100	8,5	26 400	6,7
Diplôme d'études secondaires	5 000	19,7	60 300	15,4
Études collégiales	8 100	32,1	109 100	27,9
Études universitaires	10 000	39,8	195 900	50,0
<b>Statut d'emploi des parents</b>				
Deux parents en emploi <sup>2</sup>	19 000	75,1	298 900	75,6
Un seul parent en emploi	5 500	21,6	82 400	20,8
Aucun parent en emploi	800	3,3	14 200	3,6
<b>Perception de sa situation financière <sup>3</sup></b>				
Plus à l'aise	7 800	28,7	124 400	29,4
Aussi à l'aise	16 100	59,4	253 200	59,9
Moins à l'aise	3 300	12,0	45 400	10,7
<b>Indice de défavorisation matérielle et sociale</b>				
Quintile 1 (très favorisé) (quartile 1 pour Lanaudière)	9 200	37,6	100 300	27,4
Quintile 2			83 600	22,8
Quintile 3 (quartiles 2 et 3 pour Lanaudière)	9 000	36,7	68 200	18,6
Quintile 4			63 000	17,2
Quintile 5 (très défavorisé) (quartile 4 pour Lanaudière)	6 300	25,7	51 100	14,0

La somme des pourcentages peut ne pas totaliser 100 % en raison des arrondis.

<sup>1</sup> Population estimée arrondie à la centaine.

<sup>2</sup> Lorsque l'élève ne connaît ou ne voit qu'un seul de ses parents, le statut d'emploi de ce parent unique est classé dans la catégorie "Deux parents en emploi".

<sup>3</sup> Il s'agit de la perception par l'élève de sa situation financière et de celle de sa famille par rapport à la moyenne des élèves de sa classe.

Source : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, 2012. Fichier masqué contre l'identification involontaire (FMI), *Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011*.



ACTIVITÉ PHYSIQUE  
DE LOISIR ET DE TRANSPORT


# Activité physique de loisir et de transport

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire actifs<sup>3</sup> dans les activités physiques de loisir et de transport<sup>4</sup> durant l'année scolaire selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	25,0	27,7	26,6	29,8
Garçons	33,2	34,2	33,8	36,6
Filles	16,4	21,4	19,4	22,8
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	27,1	27,2
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	24,5	29,6
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	24,5	28,8
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	27,8	32,2
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	30,7	31,4
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	27,1	24,7	25,7	28,4
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	23,4	30,0	27,3	30,7

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

<sup>3</sup> Ce niveau correspond à un volume équivalant à au moins 7 heures par semaine (moyenne de une heure par jour et plus) d'activité physique d'intensité modérée à élevée.

<sup>4</sup> Sont exclues les activités physiques pratiquées durant le cours d'éducation physique.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.


# Activité physique de loisir et de transport

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire sédentaires<sup>3</sup> dans les activités physiques de loisir et de transport<sup>4</sup> durant l'année scolaire selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	27,7	24,5	25,8	23,9
Garçons	23,9	22,7	23,2	20,8
Filles	31,7	26,2	28,4	27,1
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	24,4	25,1
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	28,1	24,5
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	25,2	24,0
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	25,9	22,7
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	24,9	23,1
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	27,5	25,5	26,4	24,8
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	27,8	23,7	25,4	23,3

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

<sup>3</sup> Ce niveau correspond à une pratique inférieure à une fois par semaine (aucune activité ou activité irrégulière). Une pratique inférieure à 10 minutes dans une journée type est aussi intégrée à cette catégorie.

<sup>4</sup> Sont exclues les activités pratiquées durant le cours d'éducation physique.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.



COMPORTEMENTS SEXUELS





# Comportements sexuels

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle<sup>3</sup> consensuelle au cours de leur vie selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	45,0	39,2	41,6	37,1
Garçons	39,2	35,8	37,2	35,9
Filles	51,4	42,4	46,0	38,2
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	26,5	25,2
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	32,9	29,0
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	47,4	40,2
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	59,0	51,5
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	28,6	24,6	26,5	25,2
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	49,3	42,0	44,9	39,4

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

<sup>3</sup> Il s'agit de relations sexuelles de type oral, vaginal ou anal.




Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

**Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu une première relation sexuelle<sup>2</sup> consensuelle avant l'âge de 14 ans selon le sexe, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)**

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	12,7	10,4	11,3	9,8
Garçons	10,9	10,9	10,9	10,6
Filles	14,7	9,9	11,8	8,8

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il s'agit de relations sexuelles de type oral, vaginal ou anal.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

# Comportements sexuels

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu des relations sexuelles vaginales consensuelles avec trois partenaires ou plus à vie pour ce type de relation selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	34,9	27,4	30,8	29,5
Garçons	32,7	26,2	29,2	30,4
Filles	36,8	28,3	32,0	28,7
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	33,3	29,8
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	33,6	29,1
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	27,3	27,2
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	31,0	31,7
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	41,9	23,6 **	33,3	28,9
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	33,8	27,8	30,4	29,6

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.



Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

**Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle vaginale consensuelle selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)**

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	66,0	66,6	66,3	68,2
Garçons	74,5	74,5	74,5	74,9
Filles	58,9	60,6	58,9	61,9
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	83,3	83,2
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	70,7	73,1
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	65,7	66,9
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	58,1	61,6
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	80,8	np	83,3	83,2
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	63,7	64,2	64,1	66,4

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

np : Donnée non présentée en raison du petit nombre de répondants.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.



CONSÉQUENCES DE LA  
CONSOMMATION  
D'ALCOOL OU DE DROGUES




# Conséquences de la consommation d'alcool ou de drogues

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins une conséquence négative associée à leur consommation d'alcool ou de drogues au cours des douze derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	15,5	15,9	15,7	14,6
Garçons	16,1	16,1	16,1	14,9
Filles	14,9	15,6	15,3	14,2
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	3,6 *	4,1
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	12,3	11,5
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	19,6	16,0
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	19,2	19,7
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	26,2	22,6
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	9,7	7,3 *	8,3	7,9
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	20,0	22,2	21,3	19,2

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.




# Conséquences de la consommation d'alcool ou de drogues

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire présentant des problèmes évidents de consommation d'alcool ou de drogues et pour qui une intervention spécialisée est suggérée (indice DEP-ADO feu rouge) selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	5,9	5,5	5,7	5,1
Garçons	6,2	5,8 *	6,0	5,5
Filles	5,6 *	5,1	5,3	4,8
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	0,8 **	1,1
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	4,3 *	4,1
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	7,1 *	6,2
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	6,1 *	7,0
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	11,3	7,5
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	3,5 *	2,1 **	2,7 *	2,6
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	7,8	8,0 *	7,9	6,8

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.



CONSOMMATION  
D'ALCOOL





# Consommation d'alcool

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours de leur vie selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	68,7	63,7	65,7	62,6
Garçons	70,4	63,1	66,1	63,6
Filles	66,8	64,4	65,4	61,7
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	27,0	28,9
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	55,0	52,1
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	75,6	69,5
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	86,3	79,3
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	91,9	86,7
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	46,9	38,6	42,0	40,8
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	85,7	82,3	83,6	77,8

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.





Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

### Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de l'alcool au cours des douze derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	65,7	61,4	63,2	59,7
Garçons	67,1	60,6	63,3	60,3
Filles	64,2	62,3	63,1	59,1
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	23,4	25,8
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	51,3	48,6
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	73,7	66,3
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	84,2	76,7
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	90,8	84,6
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	42,9	35,2	38,4	37,4
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	83,4	80,8	81,9	75,1

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
 Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
 Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.





# Consommation d'alcool

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins un épisode de consommation régulière<sup>3</sup> d'alcool au cours de leur vie selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	13,5	10,0	11,4	11,5
Garçons	16,2	11,7	13,5	13,4
Filles	10,7	8,4	9,3	9,6
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	2,9 *	3,0
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	6,5	7,4
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	11,9	10,8
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	13,5	15,6
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	26,2	22,7
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	7,2	3,2 **	4,8	5,3
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	18,4	15,1	16,4	15,9

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

<sup>3</sup> Avoir consommé de l'alcool au moins une fois par semaine pendant au moins un mois.





Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

### Proportion des élèves du secondaire ayant pris cinq consommations ou plus d'alcool en une même occasion au cours des douze derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	47,4	41,9	44,1	41,1
Garçons	49,3	40,1	43,9	41,9
Filles	45,5	43,6	44,4	40,2
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	10,3	11,9
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	27,6	28,5
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	52,0	44,2
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	66,0	57,3
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	74,0	67,6
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	23,7	16,7	19,6	20,4
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	66,0	60,5	62,7	55,4

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
 Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
 Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.



# Consommation d'alcool

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant consommé de l'alcool pour la première fois avant l'âge de 13 ans selon le sexe, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	24,4	20,2	21,9	21,4
Garçons	27,5	22,5	24,6	24,0
Filles	21,2	17,9	19,2	18,7

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

CONSOMMATION  
DE DROGUES




# Consommation de drogues

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours de leur vie selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	31,5	26,7	28,6	27,1
Garçons	31,9	26,1	28,5	27,9
Filles	31,0	27,3	28,8	26,4
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	4,8 *	5,8
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	16,9	17,6
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	33,9	29,9
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	42,2	38,5
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	52,4	46,9
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	14,6 *	8,9 *	11,3	11,8
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	44,6	39,8	41,7	37,7

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.




Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

### Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours des douze derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	29,2	25,4	26,9	25,7
Garçons	29,9	25,0	27,0	26,5
Filles	28,5	25,7	26,9	24,8
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	4,2 *	5,4
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	16,4 *	16,8
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	32,2	28,7
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	39,7	36,5
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	48,2	43,7
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	14,0 *	8,5 *	10,8	11,2
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	41,1	37,8	39,1	35,7

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.




# Consommation de drogues

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire ayant eu au moins un épisode de consommation régulière<sup>3</sup> de drogues au cours de leur vie selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	12,9	12,0	12,4	11,7
Garçons	13,6	12,5	12,9	13,0
Filles	12,1	11,6	11,8	10,4
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	2,1 **	2,3
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	8,1 *	8,2
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	14,0 *	13,4
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	16,9	16,2
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	23,7	19,6
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	6,7 *	4,4 **	5,3 *	5,3
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	17,7	17,6	17,7	16,1

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

<sup>3</sup> Avoir consommé de la drogue au moins une fois par semaine pendant au moins un mois.




Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

### Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant consommé de la drogue pour la première fois avant l'âge de 13 ans selon le sexe, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	8,4	4,0 *	5,7	4,9
Garçons	9,3	4,1 *	6,3	5,8
Filles	7,3 *	3,9 *	5,2	4,0

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.




ÉTAT DE SANTÉ

### Proportion des élèves du secondaire ne se percevant pas en bonne santé selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	4,1 *	4,4	4,3	4,3
Garçons	2,9 *	3,8 *	3,4 *	3,7
Filles	5,3 *	5,1	5,2	5,0
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	2,1 **	3,8
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	5,3 *	4,3
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	4,4 *	4,2
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	4,7 *	4,6
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	5,1	4,7
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	3,8 **	3,8 *	3,8 *	4,1
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	4,3 *	4,9	4,7	4,5

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.





Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

## EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

### Proportion des élèves du secondaire occupant un emploi durant l'année scolaire selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	46,1	36,4	40,4	42,8
Garçons	44,7	32,4	37,5	39,5
Filles	47,5	40,4	43,3	46,1
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	34,9	37,9
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	37,8	39,0
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	38,4	39,5
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	41,5	44,3
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	52,4	55,2
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	42,7	32,0	36,5	38,5
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	48,7	39,7	43,3	45,7

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux de scolarité à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.




Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

**Proportion des élèves du secondaire qui ont été blessés ou qui ont failli être blessés au travail dans leur emploi principal selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)**

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	32,6	27,2	29,7	30,5
Garçons	37,0	34,1	35,6	38,4
Filles	28,2	21,5	24,6	23,5
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	21,8	22,7
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	25,0	24,9
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	27,9	28,1
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	35,9	34,2
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	37,6	40,2
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	26,8	20,5	23,6	23,8
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	36,4	31,3	33,7	34,4

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux de scolarité à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.


Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

### Proportion des élèves du secondaire occupant un emploi qui ont reçu des consignes ou un entraînement sur la sécurité ou les dangers avant de commencer leur travail selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	59,0	59,7	59,4	59,9
Garçons	57,9	55,0	56,4	57,4
Filles	60,1	63,6	62,0	62,2
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	61,2	61,0
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	54,7	59,1
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	62,3	60,4
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	59,9	60,2
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	59,4	59,3
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	59,1	56,1	57,6	60,0
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	59,0	61,9	60,6	59,9

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

HABITUDES ALIMENTAIRES



# Habitudes alimentaires

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

**Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal<sup>3</sup> de portions de fruits et légumes recommandé quotidiennement par le Guide alimentaire canadien selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)**

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	30,1	32,3	31,4	32,9
Garçons	29,9	32,1	31,2	32,7
Filles	30,3	32,4	31,5	33,0
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	40,5	44,3
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	33,7	36,2
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	29,4	29,1
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	26,7	28,1
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	24,9	26,0
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	34,1	38,8	36,8	40,2
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	27,0	27,5	27,3	27,8

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux de scolarité à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

- <sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.
- <sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.
- <sup>3</sup> Il est recommandé que les jeunes de 9 à 13 ans (filles et garçons) consomment au moins 6 portions de fruits et légumes par jour et que les jeunes de 14 à 18 ans en consomment au moins 7 portions par jour pour les filles et 8 portions par jour pour les garçons.


Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

### Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal<sup>3</sup> de portions de produits laitiers recommandé quotidiennement par le Guide alimentaire canadien selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	47,6	47,9	47,8	48,1
Garçons	50,8	51,9	51,5	53,6
Filles	44,2	44,0	44,1	42,4
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	51,0	49,7
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	45,5	49,0
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	47,8	47,9
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	46,8	47,1
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	48,1	46,4
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	49,7	46,8	48,0	49,3
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	45,9	48,7	47,6	47,2

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

<sup>3</sup> Au moins trois portions par jour.

Source :


Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

### Proportion des élèves du secondaire consommant au moins un verre d'eau par jour selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	92,2	93,7	93,1	93,6
Garçons	93,8	94,9	94,4	95,0
Filles	90,5	92,6	91,7	92,0
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	93,9	94,5
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	94,0	93,3
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	91,0	92,7
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	91,3	94,2
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	96,0	93,1
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	94,0	93,9	93,9	93,9
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	90,8	93,6	92,5	93,3

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.





Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

### Proportion des élèves du secondaire consommant quotidiennement au moins une boisson sucrée, des grignotines ou des sucreries selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	39,5	32,2	35,2	30,7
Garçons	41,5	36,5	38,5	34,8
Filles	37,5	27,9	31,8	26,5
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	37,7	30,5
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	33,1	33,8
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	39,3	31,0
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	34,2	31,2
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	30,3	26,0
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	39,7	32,1	35,2	32,2
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	39,4	32,3	35,1	29,6

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux de scolarité à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.


Source :


Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

### Proportion des élèves du secondaire ayant consommé deux fois ou plus de la malbouffe dans un restaurant ou un casse-croûte le midi, au cours de la dernière semaine d'école, selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et Le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	22,2	15,5	18,2	20,2
Garçons	25,6	20,1	22,3	23,7
Filles	18,6 *	10,9	14,0	16,6
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	17,0	20,3
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	18,0	20,6
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	22,3	21,0
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	14,9	19,9
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	18,0	18,8
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	19,3	16,3	17,5	20,5
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	24,4	14,9	18,7	20,0

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.


Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

### Proportion des élèves du secondaire ayant mangé ou bu tous les jours le matin avant de commencer leur cours, au cours de la dernière semaine d'école, selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	58,0	60,7	59,6	59,7
Garçons	58,8	63,4	61,5	62,8
Filles	57,1	57,9	57,6	56,6
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	62,5	60,4
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	59,1	57,8
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	57,0	58,5
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	58,4	60,2
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	61,7	62,2
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	57,8	62,7	60,7	59,1
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	58,1	59,2	58,7	60,2

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.



# Habitudes alimentaires

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire ayant déclaré avoir reçu un diagnostic d'allergies alimentaires selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	7,2	8,5	8,0	7,7
Garçons	5,6	6,9	6,4	6,6
Filles	8,8	10,1	9,6	8,9
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	7,7	7,7
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	6,4	7,8
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	9,0	7,7
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	8,6	8,3
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	8,5	7,1
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	7,0	7,0	7,0	7,7
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	7,3	9,7	8,7	7,7

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

POIDS,  
APPARENCE CORPORELLE  
ET ACTIONS À L'ÉGARD  
DU POIDS




# Poids, apparence corporelle et actions à l'égard du poids

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire satisfaits de leur apparence corporelle selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	53,2	52,3	52,7	51,4
Garçons	53,4	53,2	53,3	51,5
Filles	53,0	51,4	52,0	51,3
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	56,3	55,9
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	47,2	51,2
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	57,8	52,2
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	53,5	49,8
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	47,8	47,3
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	50,7	51,9	51,4	53,5
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	55,1	52,6	53,6	50,0

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

# Poids, apparence corporelle et actions à l'égard du poids

Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

## Proportion des élèves du secondaire s'évaluant avec un poids insuffisant selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	14,1	14,7	14,5	15,4
Garçons	8,6 *	10,0 *	9,4	10,9
Filles	19,9	19,5	19,6	19,9
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	17,6	19,7
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	15,7 *	15,9
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	13,0	15,2
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	13,4	13,4
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	12,1 *	12,1
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	17,0	16,3 *	16,6	17,8
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	11,9	13,6	12,9	13,7

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

- Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.


# Poids, apparence corporelle et actions à l'égard du poids

## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire présentant un surplus de poids (embonpoint + obésité) selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	21,0	20,2	20,5	21,0
Garçons	24,0	23,3	23,6	25,2
Filles	17,9	17,2	17,5	16,6
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	19,7	20,4
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	24,6	21,8
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	19,4	21,3
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	17,8	19,9
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	20,8	21,5
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	21,0	23,4	22,3	21,2
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	21,0	18,1	19,3	20,9

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.


# Poids, apparence corporelle et actions à l'égard du poids

Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

## Proportion des élèves du secondaire essayant de perdre du poids selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	23,4	24,1	23,8	24,9
Garçons	14,9	16,1	15,6	17,8
Filles	32,2	31,9	32,0	32,2
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	22,7	22,8
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	27,0	26,1
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	20,0	23,9
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	25,7	26,3
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	23,6	25,6
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	23,9	25,7	25,0	24,5
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	22,9	22,8	22,9	25,2

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

# Poids, apparence corporelle et actions à l'égard du poids


## Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

### Proportion des élèves du secondaire ayant diminué le sucre ou le gras au cours des six derniers mois dans le but de perdre du poids ou de le maintenir selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	55,4	56,7	56,2	57,7
Garçons	39,4	41,9	40,9	44,8
Filles	72,0	71,4	71,7	70,9
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	55,6	57,4
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	54,2	57,0
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	52,2	57,7
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	62,1	58,0
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	58,5	58,6
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	55,2	54,6	54,8	57,2
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	55,6	58,3	57,2	58,1

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

# Poids, apparence corporelle et actions à l'égard du poids

Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011

## Proportion des élèves du secondaire ayant eu recours à des produits, services et moyens amaigrissant (PSMA) au cours des six derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	71,8	70,3	70,9	72,5
Garçons	71,2	71,1	71,1	73,0
Filles	72,4	69,6	70,7	72,1
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>re</sup> secondaire	nd	nd	70,7	70,8
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	68,6	72,2
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	68,5	73,6
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	75,1	74,2
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	72,9	71,8
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	72,6	67,4	69,6	71,5
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	71,1	72,4	71,9	73,2

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.





SANTÉ BUCCODENTAIRE

### Proportion des élèves du secondaire se brossant les dents au moins deux fois par jour selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	76,4	76,5	76,5	77,8
Garçons	69,4	65,0	66,8	70,6
Filles	83,7	88,0	86,3	85,0
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	74,1	77,1
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	77,9	77,6
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	77,6	78,8
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	77,7	78,6
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	74,3	76,5
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	78,8	74,3	76,2	77,3
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	74,6	78,2	76,7	78,0

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.




Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

**Proportion des élèves du secondaire utilisant la soie dentaire tous les jours selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)**

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	26,7	22,4	24,2	24,2
Garçons	26,4	20,9	23,2	22,1
Filles	26,9	24,0	25,1	26,4
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	28,4	30,0
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	26,0	27,0
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	26,0	25,0
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	20,6	20,2
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	17,8	17,8
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	29,3	25,6	27,1	28,4
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	24,6	20,1	21,9	21,3

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.





SANTÉ RESPIRATOIRE

### Proportion des élèves du secondaire ayant eu des crises d'asthme au cours de leur vie selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	19,2	19,3	19,3	18,2
Garçons	16,9	17,5	17,3	17,5
Filles	21,6	21,0	21,3	18,9
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	18,5	16,9
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	18,2 *	18,9
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	18,3	19,1
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	21,9	18,8
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	20,1	17,0
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	17,5	18,9	18,3	17,9
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	20,6	19,6	20,0	18,4

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.


Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

**Proportion des élèves du secondaire ayant eu des sifflements dans la poitrine à un moment quelconque au cours des douze derniers mois selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)**

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	18,3	19,6	19,1	18,3
Garçons	14,2	17,1	16,0	15,9
Filles	22,6	22,1	22,3	20,9
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	14,9	16,4
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	19,3	17,4
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	21,3	18,8
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	18,7	19,8
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	21,4	19,5
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	17,7	17,0 *	17,3	16,9
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	18,9	21,6	20,5	19,3

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.






TABAGISME

### Proportion de fumeurs actuels<sup>3</sup> de cigarettes chez les élèves du secondaire selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	10,0	7,9	8,7	6,9
Garçons	8,0 *	6,6 *	7,2	7,0
Filles	12,0 *	9,1	10,3	6,8
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>er</sup> secondaire	nd	nd	1,8 **	1,8
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	6,8 *	5,0
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	12,8 *	8,4
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	10,0	9,3
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	12,9	10,5
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>er</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	5,3 **	4,0 *	4,5 *	3,4
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	13,6 *	10,7	11,9	9,3

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres niveaux scolaires à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

<sup>3</sup> Fumeurs quotidiens ou occasionnels.



Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

**Proportion des élèves du secondaire de 13 ans et plus ayant fumé une première cigarette avant l'âge de 13 ans selon le sexe, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)**

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	13,2	9,9	11,2	8,1
Garçons	12,4	10,0	11,0	8,2
Filles	14,2	9,8	11,5	8,0

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

<sup>1</sup> Les résultats des tests statistiques sont basés sur la proportion ajustée selon la structure par âge (12 ans et moins, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'EQSJS 2010-2011 de l'ensemble du Québec.


Source :


Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.  
 Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.  
 Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

### Proportion des élèves du secondaire ayant fumé plus de dix cigarettes en moyenne par jour au cours des 30 derniers jours, parmi les fumeurs quotidiens, selon le sexe et le niveau scolaire, territoires de RLS, Lanaudière et le Québec, 2010-2011 (%)

	RLS de Lanaudière-Nord	RLS de Lanaudière-Sud	Lanaudière	Le Québec
	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>	Proportion brute <sup>1</sup>
Total	49,7	34,2 *	42,1	26,4
Garçons	52,9 *	44,0 *	48,3	28,5
Filles	47,7	26,9 **	37,9	24,4
	Proportion brute	Proportion brute	Proportion brute <sup>2</sup>	Proportion brute <sup>2</sup>
1 <sup>re</sup> secondaire	nd	nd	60,9	26,4
2 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	34,4 **	25,1
3 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	48,2	31,7
4 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	46,2 *	27,4
5 <sup>e</sup> secondaire	nd	nd	28,9 **	19,2
1 <sup>er</sup> cycle (1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> secondaire)	43,3 *	37,4 **	40,8 *	25,5
2 <sup>e</sup> cycle (3 <sup>e</sup> , 4 <sup>e</sup> et 5 <sup>e</sup> secondaire)	51,9	33,5 *	42,4	26,7

Note : Les proportions de la région de Lanaudière ont été comparées avec le reste du Québec (le Québec moins Lanaudière). Toutefois, cette analyse n'a pas été effectuée pour les territoires de RLS.

 Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire de RLS, au seuil de 5 %.

 Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

\* Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

\*\* Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

nd : Donnée non disponible.

<sup>1</sup> Les tests statistiques ont été effectués sur les données brutes. Les résultats entre les proportions brutes doivent être interprétés avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

<sup>2</sup> Il peut y avoir des différences significatives entre certains niveaux scolaires. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres niveaux scolaires sont identifiées. Cette note ne s'applique pas aux cycles scolaires.

Source :

Fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS) 2010-2011, INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.

Rapport de l'onglet Plan commun de surveillance produit par l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, octobre 2012.

Mise à jour de l'indicateur le 1<sup>er</sup> octobre 2012.

## RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ), en collaboration avec l'INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ). *Guide spécifique des aspects méthodologiques des données d'enquêtes sociosanitaires du Plan commun de surveillance – Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011*, Québec, Gouvernement du Québec, 2012, 100 p.

PICA, Lucille, Issouf TRAORÉ, Francine BERNÈCHE, Patrick LAPRISE, Linda CAZALE, Hélène CAMIRAND, Mikaël BERTHELOT, Nathalie PLANTE et autres. *L'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011. Le visage des jeunes d'aujourd'hui : leur santé physique et leurs habitudes de vie, Tome 1*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 2012, 256 p.

**Agence de la santé  
et des services sociaux  
de Lanaudière**

Québec 