

Photos :

La reproduction des photos, à des fins publiques mais non commerciales, provient de documents officiels publiés par le Gouvernement du Canada sur son site Environnement Canada. Cette reproduction n'a pas été faite en association avec le gouvernement du Canada ni avec l'appui de celui-ci.

Informations :

Les descriptions proviennent du Nouveau Guide Peterson, Roger Tory Peterson, Éditions Broquet, 2003.

Publié par :

LES BOUTS DE PAPIER DE LA HAUTE-GASPÉSIE

48B, 3^e avenue Ouest

Sainte-Anne-des-Monts (Québec)

G4V 3T2

Tél. : 418-763-0001

Courriel : commentaires@bphg.ca

Sainte-Anne-des-Monts, mai 2011

ISBN 978-2-9810942-6-1 (version imprimée)

ISBN 978-2-9810942-7-8 (version PDF)

Dépôt légal – Bibliothèque et archives Canada, 2011

Dépôt légal – Bibliothèque et archives nationales Québec, 2011

Disponible sur Internet : <http://www.bphg.ca/doc/carnetpetitbois.pdf>

La reproduction du présent document, en tout ou en partie, est autorisée à la condition d'en mentionner la source et de ne pas l'utiliser à des fins commerciales.

Nous tenons à remercier la Ville de Sainte-Anne-des-Monts pour leur soutien financier dans le cadre du programme d'aide financière aux organismes communautaires, culturels, sportifs ou de loisirs.

Nous tenons également à remercier très sincèrement messieurs Maurice Daudelin et Pierre Ledoux de l'Association amicale d'ornithologie de la Haute-Gaspésie pour leur accompagnement technique.



CRÉDITS	2	Grive à joues grises	37	Pic à dos noir	73
REMERCIEMENTS	3	Grive des bois	38	Pic chevelu	74
INDEX	4	Grive fauve	39	Pic mineur	75
BIBLIOGRAPHIE	93	Grive solitaire	40	Pigeon biset	76
Autour des palombes	5	Gros-bec errant	41	Quiscale bronzé	77
Bec-croisé bi-fascié	6	Harle couronné	42	Roitelet à couronne dorée	78
Bec-croisé des sapins	7	Harle huppé	43	Roitelet à couronne rubis	79
Bruant à couronne blanche	8	Jaseur d'Amérique	44	Roselin familier	80
Bruant à gorge blanche	9	Jaseur boréal	45	Roselin pourpré	81
Bruant chanteur	10	Junco ardoisé	46	Sarcelle d'hiver	82
Bruant des marais	11	Martin-Pêcheur d'Amérique	47	Sittelle à poitrine blanche	83
Bruant hudsonien	12	Merle d'Amérique	48	Sittelle à poitrine rousse	84
Bruant des neiges	13	Mésangeai du Canada	49	Sizerin blanchâtre	85
Bruant familier	14	Mésange à tête brune	50	Sizerin flammé	86
Bruant lapon	15	Mésange à tête noire	51	Tarin des pins	87
Butor d'Amérique	16	Mésange bicolore	52	Tourterelle triste	88
Canard branchu	17	Moineau domestique	53	Vacher à tête brune	89
Canard colvert	18	Moqueur chat	54	Viréo aux yeux rouges	90
Canard noir	19	Moqueur roux	55	Viréo de Philadelphie	91
Cardinal à poitrine rose	20	Moucherolle phébi	56	Viréo mélodieux	92
Carouge à épaulettes	21	Moucherolle tchébec	57		
Chardonneret jaune	22	Paruline à calotte noire	58		
Chevalier grivelé	23	Paruline à croupion jaune	59		
Cornille d'Amérique	24	Paruline à flancs marron	60		
Durbec des sapins	25	Paruline à poitrine baie	61		
Épervier brun	26	Paruline bleue	62		
Étourneau sansonnet	27	Paruline des pins	63		
Garrot à œil d'or	28	Paruline des ruisseaux	64		
Geai bleu	29	Paruline flamboyante	65		
Gélinotte huppée	30	Paruline jaune	66		
Grand corbeau	31	Paruline masquée	67		
Grand harle	32	Paruline noir et blanc	68		
Grand héron	33	Paruline rayée	69		
Grand pic	34	Paruline tigrée	70		
Grimpereau brun	35	Paruline triste	71		
Grive à dos olive	36	Petit garrot	72		

Les mangeoires sont
déplacées au gré des
saisons.

Ouvrez l'œil tout au long
du sentier !



Classification

- Éperviers - Sous-famille des Accipitrinés
- Latin - Accipiter gentilis
- Anglais - Northern Goshawk
- Été - Hiver

Description physique

Gros rapace robuste à queue longue, ailes arrondies et secondaires bien développées. Souvent les sous-caudales blanches sont gonflées et débordent vers les côtés de la queue.

Calotte et joue noirâtres, épais sourcil blanc. Dessous gris pâle, finement barré; dos plus clair et plus gris que chez les autres éperviers.

Habitat

Forêts boréales et mixtes, lisières. Irruptions périodiques en automne et en hiver vers le sud.

Longueur

50 / 65 cm



Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinals – Familles des Cardinalidés
- Latin – *Loxia leucoptera*
- Anglais – White-winged Crossbill
- Été - Hiver

Description physique

Noter les barres alaires et les mandibules croisées. Mâle : rose terne; ailes noires traversées par deux larges barres blanches; queue noire. Femelle : gris olive, à croupion jaunâtre et possède deux larges barres alaires blanches.

Habitat

Conifères

Longueur

15 / 17 cm



Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinals – Familles des Cardinalidés
- Latin – *Loxia curvirostra*
- Anglais – Red Crossbill
- Été - Hiver

Description physique

Noter les mandibules croisées. De la taille du moineau mais paraît plus corpulent; tête massive, queue courte. Mâle : rouge sombre, le croupion plus vif; ailes et queue noirâtres. Femelle : gris olive terne; croupion et dessous jaunâtres.

Habitat

Conifères

Longueur

13 /16 cm



Description physique

La poitrine gris clair et la calotte bouffante, rayée de noir et blanc. Bec rosé. Jeune : plus brun; tête rayée de brun-roux terne et de chamois clair, bec rosâtre.

Habitat

Buissons de forêt boréale; broussailles, orées des bois, fourrés, bords de route.

Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinaux : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – *Zonotrichia leucophrys*
- Anglais – White-crowned Sparrow
- Été

Longueur

16 / 19 cm



Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinaux : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – *Zonotrichia albicollis*
- Anglais – White-throated Sparrow
- Été

Description physique

Un bruant à poitrine grise, à gorge blanche et à tache jaune entre le bec et l'œil. Bec grisâtre. Plumage d'hiver : plus terne; raies sombres de la tête en tons variés de noir, de brun et de chamois. Les jeunes ont la poitrine plus ou moins rayée.

Habitat

Fourrés, strates inférieures des forêts de conifères et des bois mixtes; fréquente les postes d'alimentation, où il préfère demeurer au sol.

Longueur

16 / 18 cm



Description physique

Noter les raies fortes de la poitrine qui se concentrent en une tache sombre au centre. Queue longue.

Habitat

Fourrés, broussailles, marais, bords de route, jardins.

Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinaux : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – *Melospiza melodia*
- Anglais – Song Sparrow
- Été

Longueur

13 /16 cm



Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinaux : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – *Melospiza georgiana*
- Anglais – Swamp Sparrow
- Été

Description physique

Un bruant brun-roux plutôt robuste et foncé, à poitrine gris terne, gorge blanche bien délimitée, calotte roussâtre, face et nuque grises. En plumage d'hiver, calotte plus terne et joues plus brunes. Le jeune est faiblement rayé; calotte à peine roussâtre ou pas du tout.

Habitat

Marais d'eau douce avec touffes d'herbes, buissons ou quenouilles; marais de carex; terrains humides, herbeux ou buissonneux.

Longueur

13 / 14 cm



Description physique

Remarquer le point noir à la poitrine et la calotte brun-rouge unie. La mandibule supérieure est foncée, l'autre est jaune; il a deux barres alaires blanches.

Habitat

Buissons de l'Arctique, fourrés de saules; en hiver, haies, bords de route, terrains vagues, marais; fréquente les mangeoires.

Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinaux : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – *Spizella arborea*
- Anglais – American Tree Sparrow
- Été

Longueur

15 / 16 cm



Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinaux : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – *Plectrophenax nivalis*
- Anglais – Snow Bunting
- Hiver

Description physique

Aucun autre passereau n'a autant de blanc. En hiver, certains individus peuvent avoir l'air assez bruns, mais en vol, leurs taches alaires blanches qui clignotent les caractérisent.

Habitat

Toundra (été); steppes, champs, dunes, rivages.

Longueur

15 / 18 cm



Description physique

En plumage nuptial : un petit bruant à poitrine grise et à calotte roux vif; ligne noire en travers de l'œil et sourcil blanc. En plumage d'hiver : plus brun; calotte et sourcil plus ternes et croupion gris. Jeune : plus brun; raie légère à la calotte et croupion gris.

Habitat

Bois clairs, conifères, vergers, parcs, jardins.

Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinaux : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – *Spizella passerina*
- Anglais – Chipping Sparrow
- Été

Longueur

13 cm



Description physique

Mâle en plumage nuptial : face noire entourée de blanc, col marron. Mâle en plumage d'hiver : les raies noires clairsemées sur les flancs, la nuque et les couvertures sous-alaires marrons et la tache sur la poitrine facilitent l'identification. Femelle en plumage nuptial : ressemble au mâle en hiver.

Habitat

Toundra; en hiver, champs, steppes rivages.

Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinaux : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – *Calcarius lapponicus*
- Anglais – Lapland Longspur
- Hiver

Longueur

16 cm



Description physique

Un héron brun et trappu; de la taille d'un jeune bihoreau, mais d'un brun plus chaud. En vol l'extrémité de l'aile est plus noirâtre et le bec est tenu plus horizontalement.

Habitat

Marais, roselières des lacs. Se perche rarement dans les arbres, contrairement aux bihoreaux.

Classification

- Hérons, Butors, Etc – Famille des Ardéidés
- Latin – *Botaurus lentiginosus*
- Anglais – American Bittern
- Été

Longueur

58 cm



Description physique

Vivement coloré. En vol, le ventre blanc contraste avec la poitrine et les ailes sombres. Noter aussi la longue queue carrée et sombre, le cou court, le bec pointé vers le bas. Mâle : l'étrange motif facial, la huppe tombante et le plumage irisé le distinguent à coup sûr. Femelle : couleurs ternes; noter la tête sombre et huppée ainsi que la tache blanche à l'œil.

Habitat

Marécages boisés, rivières, étangs.

Classification

- Canards barboteurs – Sous-famille des Anatinés
- Latin – Aix sponsa
- Anglais – Wood duck
- Été

Longueur

43 / 51 cm



Classification

- Canards barboteurs - Sous-famille des Anatinés
- Latin – *Anas platyrhynchos*
- Anglais – Mallard
- Été - Hiver

Description physique

Mâle : tête d'un vert luisant, collier blanc. Corps grisâtre, la poitrine marron, la queue blanche; bec jaunâtre, pattes oranges, miroir violet bleu, bordé de blanc.

Femelle : brun moucheté, la queue blanchâtre. Bec orangé, maculé.

Habitat

Marais, champs de céréales, étangs, rivières.

Longueur

50 / 70 cm



Description physique

En vol, un canard très sombre, à l'exception du blanc argenté des sous-alaies. Brun sombre, la tête plus pâle; miroir violet métallique, non bordé de blanc; pattes rouges ou brunes. Sexes semblables; le bec du mâle est plus sombre, plus vert.

Habitat

Marais, étangs, rivières, lacs, estuaires, baies.

Classification

- Canards barboteurs - Sous-famille des Anatinés
- Latin – *Anas rubripes*
- Anglais – American Black Duck
- Été - Hiver

Longueur

53 / 63 cm



Description physique

Mâle : noir et blanc, un grand triangle rouge-rose à la poitrine et le bec fort, ivoire; en vol, le blanc du dessus « clignote » sur fond noir et noter les sous-alaires roses. Femelle : rayée, elle a l'air d'un gros bruant ou d'une femelle du Roselin pourpré; on l'identifie par le gros bec, les larges barres alaires blanches, la calotte rayée, l'épais sourcil blanc et les sous-alaires jaunes.

Habitat

Bois de feuillus, vergers, bosquets, fourrés.

Longueur

18 / 21 cm

Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinals : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – *Pheucticus ludovicianus*
- Anglais – Rose-Breasted Grosbeak
- Été



Classification

- Carouges, Quiscales, Orioles, Etc.
– Famille des Ictéridés
- Latin – *Agelaius phoeniceus*
- Anglais – Red-winged Blackbird
- Été

Description physique

Mâle : noir, à épaulettes rouges, plus voyantes lors de la parade. Le rouge est souvent caché; seul le liséré jaunâtre étant alors visible. Jeune mâle : brun fuligineux, rayé, mais à épaulettes rougeâtres. Femelle et juvénile : souvent pris pour un bruant, mais identifié par le bec très pointu, et le dessous marqué de rayures foncées bien nettes; plusieurs ont aussi la gorge colorée de chamois ou de rosâtre.

Habitat

Niche dans les marais, les marécages broussailleux, les champs de foin; se nourrit également dans les champs cultivés, le long d'étendues d'eau.

Longueur

18 / 24 cm



Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinaux : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – *Carduelis tristis*
- Anglais – American Goldfinch
- Été - Hiver

Description physique

Vol très onduleux. Mâle en plumage nuptial : jaune, à queue, ailes et calottes noires. Femelle en plumage nuptial : jaune olive terne, le dessus plus foncé; ailes noirâtres marquées de barres voyantes. Plumage d'hiver, les deux sexes : très semblables à la femelle en plumage nuptial, mais plus gris.

Habitat

Chardons et terrains vagues, pissenlits sur pelouses, bords de route, bois clairs, orées des bois; postes d'alimentation, particulièrement ceux pourvus de chardon.

Longueur

13 cm



Description physique

Plumage nuptial : noter les taches rondes de la poitrine. En plumage d'hiver : dessous uni, dessus brun et sourcils blancs; la tache sombre bordant une pointe blanche devant l'épaule est un bon indice.

Habitat

Rives des lacs et cours d'eau, marais, rivages.

Classification

- Bécasseaux – Famille des Scolopacidés
- Latin – *Actitis macularia*
- Anglais – Spotted Sandpiper
- Été

Longueur

19 cm



Classification

- Corneilles geais, etc. - Famille des Corvidés
- Latin – *Corvus brachyrhynchos*
- Anglais – American Crow
- Été - Hiver

Description physique

Entièrement noire; reflets violacés en lumière vive. Pattes et bec noirs.

Habitat

Forêts, fermes, champs, bosquets riverains, rivages. S'assemble par milliers en certaines saisons pour dormir. Les populations du Nord sont partiellement migratrices.

Longueur

43 / 53 cm



Description physique

Presque de la taille d'un merle, peu farouche et à queue assez longue. Vol très onduleux. Mâle adulte : rouge-rose terne, ailes sombres marquées de deux barres blanches. Femelle : grise; deux barres alaires blanches, tête et croupion teintés de jaune terne.

Habitat

Forêts de conifères; en hiver, forêts mixtes et arbres fruitiers également.

Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinaux : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – Pinicola enucleator
- Anglais – Pine Grosbeak
- Été - Hiver

Longueur

20 / 25 cm



Description physique

Petit rapace forestier à corps svelte, queue longue et à ailes courtes et arrondies. L'adulte a le dos gris ardoise, la poitrine barrée de roux. La queue fermée est légèrement encochée ou carrée (étalée, elle peut paraître arrondie) et finement bordée de blanc. La tête et le cou sont relativement plus petits que chez l'Épervier de Cooper. Jeune : dessus brun foncé, dessous fortement rayé de brun jusqu'au bas-ventre.

Habitat

Forêts conifériennes et mixtes, bosquets.

Longueur

25 / 35 cm

Classification

- Éperviers – Sous-famille des Accipitrinés
- Latin – *Accipiter striatus*
- Anglais – Sharp-Shinned Hawk
- Été - Hiver



Classification

- Carouges, Quiscales, Orioles, Etc.
 - Famille des Ictéridés
- Latin – *Sturnus vulgaris*
- Anglais – European Starling
- Été - Hiver

Description physique

Un passereau noirâtre à queue courte et à profil de sturnelle, grégaire et bruyant. En plumage nuptial : à reflets violacés et verts, bec jaune. En plumage d'hiver : fortement moucheté; bec foncé, devenant jaune au printemps.

Habitat

Villes, parcs, fermes, bosquets clairs, champs.

Longueur

19 / 21 cm



Description physique

Mâle : gros rond blanc devant l'œil. Paraît blanc, sauf pour le dos noir et la tête ronde à reflets verts foncés. Femelle : grise, un collier blanc et la tête brun foncé; l'aile porte un carré blanc.

Habitat

Lacs forestiers, cours d'eau; l'hiver, estuaires et côtes également.

Classification

- Canards plongeurs – Sous-famille des Ay thynés
- Latin – *Bucephala clangula*
- Anglais – Common Goldeneye
- Été

Longueur

50 cm



Classification

- Corneilles geais, etc. - Famille des Corvidés
- Latin – *Cyanocitta cristata*
- Anglais – Blue Jay
- Été - Hiver

Description physique

Un oiseau bleu, huppé, bruyant et voyant; plus gros que le merle. Ailes et queue marquées de taches blanches voyantes, dessous blanchâtre ou gris terne, collier noir.

Habitat

Bois mixtes, bois et jardins de banlieue, bosquets.

Longueur

28 / 31 cm



Classification

- Gélinottes – Sous-familles des Tétracorninés
- Latin – Bonasa umbellus
- Anglais – Ruffed Grouse
- Été - Hiver

Description physique

Noter que la queue en éventail à large bande noire près du bout. Gallinacé brun-roux ou brun-gris des bois broussailleux qu'on découvre rarement avant son envol bruyant qui fait sursauter. Deux formes existent : oiseaux brun-roux à queue rousse, et oiseaux brun-gris à queue grise. La forme rousse est plus répandue dans le sud de l'aire, la grise dans le nord.

Habitat

Strates basses des forêts décidues et mixtes.

Longueur

40 / 48 cm



Classification

- Corneilles geais, etc. - Famille des Corvidés
- Latin – Corvus corax
- Anglais – Common Raven
- Été - Hiver

Description physique

Noter la queue cunéiforme. Plus gros que la corneille d'amérique et généralement moins grégaire. Comme un rapace; bat des ailes et plane les ailes à plat en alternance.

Habitat

Forêts boréales, montagnes boisées, falaises côtières, toundra.

Longueur

55 / 68 cm



Description physique

La blancheur du mâle et la profil de harle (bec, cou, tête et corps à l'horizontale) caractérisent l'espèce. Mâle : long corps blanchâtre, dos noir, tête vert bouteille. Bec et pattes rouges; poitrine colorée de saumon pâle. Femelle : grise, la tête rousse et huppée; noter la démarcation nette entre le blanc de la poitrine et le roux du cou, et le grand carré blanc à l'aile.

Habitat


Lacs forestiers, étangs, rivières; l'hiver, lacs, rivières, rarement en eau salée.

Classification

- Harles - Sous-famille des Merginés
- Latin – *Mergus merganser*
- Anglais – Common Merganser
- Été

Longueur

55 /68 cm



Classification

- Hérons, Butors – Famille des Ardeidés
- Latin – *Ardea herodias*
- Anglais – Great blue heron
- Été

Description physique


Un grand oiseau gris, souvent appelé grue à tort. Les longues pattes, le long cou, le bec long et pointu, ainsi que le cou replié en vol sont caractéristiques des hérons. La grande taille, la couleur gris-bleu, le blanc de la tête et les longues aigrettes noires caractérisent l'espèce.

Habitat

Marais, marécages, rivages, vasières.

Longueur

105 / 130 cm



Classification

- Pics – Famille des Picidés
- Latin – *Dryocopus pileatus*
- Anglais – Pileated Woodpecker
- Été - Hiver

Description physique

Un pic spectaculaire, grand comme une corneille, à huppe rouge vif. La femelle a le front noirâtre et n'a pas de rouge à la moustache. La grande taille et les battements profonds des ailes, découvrant du blanc dessous, distinguent ce pic en vol.

Habitat

Les grands trous ovales ou oblongs creusés dans les arbres indiquent sa présence. Forêts âgées, de conifères, de feuillus ou mixtes; petit bois.

Longueur

40 / 49 cm



Classification

- Grimpereaux – Famille des Certhiidés
- Latin – *Certhia americana*
- Anglais – Brown Creeper
- Été - Hiver

Description physique

Brun dessus et blanc dessous. Bec fin recourbé, queue raide, servant d'appui lorsqu'il monte le long des arbres, en spirale à partir de la base.

Habitat

Forêts, bosquets, arbres d'ombrage. En hiver, accompagne souvent les mésanges. Place son nid sous un lambeau d'écorce soulevé.

Longueur

13 cm



Description physique

Une grive tacheté qui a le dessus brun-gris uni, sans ton chaud. Anneau péri-oculaire, joues et haut de la poitrine chamois.

Habitat

Forêts d'épinettes; en migration, autres forêts.

Classification

- Grives, Merles – Famille des Turdidés
- Latin – *Catharus ustulatus*
- Anglais – Swainson's Thrush
- Été

Longueur

18 cm



Description physique

Une grive d'un brun-gris terne, joues grisâtres et anneau péri-oculaire moins net.

Habitat

Taïga, arbrisseaux de toundra; en migration, forêts.

Classification

- Grives, Merles – Famille des Turridés
- Latin – *Catharus minimus*
- Anglais – Gray-cheeked Thrush
- Été

Longueur

18 / 20 cm



Description physique

Tête rousse. Plus petite que le merle et plus dodue que les autres grives; se distingue par la rousseur plus intense de la tête et les taches rondes plus grandes et plus nombreuses de la poitrine

Habitat

Surtout les forêts décidues.

Classification

- Grives, Merles – Famille des Turridés
- Latin – *Hylocichla mustelina*
- Anglais – Wood Thrush
- Été

Longueur

20 cm



Classification

- Grives, Merles – Famille des Turdidés
- Latin – *Catharus fuscescens*
- Anglais – Veery
- Été

Description physique

Noter le dessus uni, brun riche ou fauve. Pas d'anneau péri-oculaire net (parfois, anneau blanchâtre terne). C'est la moins tachetée des grives brunes; les taches sont souvent indistinctes.

Habitat

Forêts décidues et fourrés humides.

Longueur

18 / 19 cm



Description physique

Une grive brune, tachetée, à queue rousse.
Perchée, elle a l'habitude de relever la queue et de la rabaisser lentement.

Habitat

Conifères et forêts mixtes; en hiver, bois fourrés, parcs.

Classification

- Grives, Merles – Famille des Turridés
- Latin – *Catharus guttatus*
- Anglais – Hermit Thrush
- Été

Longueur

18 cm



Description physique

Un passereau massif à queue courte, de la taille d'un étourneau; très gros bec conique, blanchâtre ou verdâtre. Vol onduleux. La forme compacte et les grandes taches alaires blanches sont caractéristiques. Mâle : jaune terne, la tête sombre, le sourcil jaune et les ailes noires et blanches. Femelle : chamois grisâtre, avec juste assez de jaune, de noir et de blanc pour être reconnaissable.

Habitat

Forêts de conifères; en hiver, érables (surtout le négundo) arbustes fruitiers, mangeoires.

Longueur

20 cm

Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinals : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – *Coccothraustes vespertina*
- Anglais – Evening Grosbeak
- Été-Hiver



Description physique

Mâle : noter la huppe blanche, parfois déployée en éventail. Poitrine blanche, marquée de deux barres des deux côtés; flancs bruns. Tache blanche à l'aile. Femelle : bec pointu et profil de harle; la petite taille, la couleur sombre de tout le corps (bec et poitrine compris) caractérisent l'espèce. Noter la huppe rousse et lâche.

Habitat

Lacs forestiers, étangs, rivières; l'hiver, estuaires et embouchures de cours d'eau.

Classification

- Harles – Sous-famille des Merginés
- Latin – *Lophodytes cucullatus*
- Anglais – Hooded Merganser
- Été

Longueur

40 / 48 cm



Description physique

Mâle : tête noire, à reflets verts et à huppe voyante; poitrine rouille sombre à la ligne de flottaison, séparée de la tête par un large collier blanc; bec et pattes rouges. Femelle : grise, la tête rousse et huppée; grande tache blanche à l'aile, bec et pattes rouges.

Habitat

Lacs; en hiver, estuaires, eaux côtières.

Classification

- Harles – Sous-famille des Merginés
- Latin – *Mergus serrator*
- Anglais – Red-breasted Merganser
- Été

Longueur

50 / 65 cm



Description physique

Noter la bande jaune (ou parfois rouge orangé) du bout de la queue. Oiseau brun, huppé, au plumage lisse, plus gros qu'un moineau. Les adultes ont des pointes de cire rouge aux rémiges secondaires. Juvénile plus gris, légèrement rayé dessous.

Habitat

Bois clairs, arbres fruitiers, vergers; déplacements irréguliers en hiver.

Classification

- Jaseurs – Famille des Bombycillidés
- Latin – Bombycilla cedrorum
- Anglais – Cedar Waxwing
- Été-Hiver

Longueur

18 cm



Description physique

Semblable au Jaseur d'Amérique; plus grand, plus gris, le dessous dépourvu de jaune; ailes marquées de blanc ou de blanc et jaune. Noter les sous-caudales marrons (blanchâtres chez le Jaseur d'Amérique).

Habitat

Forêts boréales, tourbières; déplacements irréguliers en hiver.

Classification

- Jaseurs – Famille des Bombycillidés
- Latin – Bombycilla garrulus
- Anglais – Bohemian Waxwing
- Été-Hiver

Longueur

20 cm



Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinals : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – Junco hyemalis
- Anglais – Dark-Eyed Junco
- Été

Description physique

Un bruant gris ardoise à ventre blanchâtre, caractérisé par les plumes latérales blanches de la queue bien voyantes à l'envol. Le mâle peut avoir la tête gris foncé ou noirâtre; les femelles et les jeunes sont plus ternes, certains colorés de brun. Le juvénile a la poitrine finement rayée.

Habitat

Conifères et forêts mixtes. En hiver, bois clairs, strates basses des forêts, bords de route, buissons; fréquente aussi les postes d'alimentation, où il préfère se tenir au sol.

Longueur

14 / 16 cm



Description physique

Oiseau à grosse tête et plus gros qu'un merle, bleu grisâtre dessus, avec une épaisse huppe en désordre et une large bande grise à la poitrine. La femelle a une seconde bande pectorale rousse.

Habitat

Cours d'eau, lacs, baies, côtes; niche dans un terrier creusé dans une berge. Se perche souvent sur les fils.

Classification

- Martins-Pêcheurs – Famille des Alcédinidés
- Latin – *Ceryle alcyon*
- Anglais – Belted Kingfisher
- Été

Longueur

33 cm



Description physique

Poitrine rouge brique et dos gris foncé. La tête et la queue sont noirâtres chez le mâle, plus grises chez la femelle. Le jeune a la poitrine grivelée, mais le délavé rouille facilite l'identification.

Habitat


Villes, fermes, pelouses, jardins, forêts; en hiver, arbres porteurs de fruits.

Classification

- Grives, Merles – Famille des Turdidés
- Latin – *Turdus migratorius*
- Anglais – American Robin
- Été

Longueur

23 / 28 cm



Classification

- Corneilles geais, etc. - Famille des Corvidés
- Latin – *Perisoreus canadensis*
- Anglais – Gray Jay
- Été

Description physique

Un gros oiseau gris au plumage duveteux des forêts nordiques; plus gros que le merle; plage noire sur la nuque et front(ou calotte) blanc; on dirait une mésange géante. Les juvéniles sont gris foncés, presque noirâtres; une moustache blanchâtre est leur seul trait distinctif. Souvent très peu farouche.

Habitat

Forêts de sapins et d'épinettes.

Longueur

28 / 33 cm



Classification

- Mésanges – Famille des Paridés
- Latin – *Poecile hudsonica*
- Anglais – Boreal Chickadee
- Été-Hiver

Description physique

Noter le capuchon brun terne, les flancs d'un brun riche. La petite taille, la bavette noire, les joues blanchâtres et le bec minuscule sont caractéristiques des mésanges, mais la couleur générale est brune plutôt que grise.

Habitat

Forêts de conifères

Longueur

13 / 14 cm



Classification

- Mésanges – Famille des Paridés
- Latin – *Parus atricapillus*
- Anglais – Black-capped Chickadee
- Été - Hiver

Description physique

Ce petit acrobate peu farouche se caractérise par des joues blanches encadrées par une bavette et une culotte noires. Du blanc dans les ailes et flancs chamois.

Habitat

Forêts mixtes et décidues; fourrés de saules, bosquets, arbres d'ombrage. Fréquente les mangeoires où elle mange du gras et des graines de tournesol. Souvent peu farouche, curieuse et confiante.

Longueur

12 / 14 cm



Description physique

Petit oiseau gris souris à huppe touffue. Flancs roussâtres.

Habitat

Bois, arbres d'ombrage, bosquets; mangeoires.

Classification

- Mésanges – Famille des Paridés
- Latin – Baeolophus bicolor
- Anglais – Tufted Titmouse
- Été - Hiver

Longueur

15 cm



Description physique

Certains moineaux sont si ternes que les mâles n'ont pas la coloration éclatante de ceux de la campagne, à gorge noire, joues blanches et nuque marron. La femelle et le jeune n'ont pas la gorge noire; ils ont la poitrine unie, sans éclat, et un sourcil terne.

Habitat

Villes, fermes

Classification

- Moineaux – Famille des Passéridés
- Latin – *Passer domesticus*
- Anglais – House Sparrow
- Été - Hiver

Longueur

15 cm



Description physique

Élancé, gris ardoise à calotte noire. Les sous-caudales marrons ne sont pas voyantes. Redresse la queue d'un mouvement enjoué.

Habitat

Broussailles, buissons, jardins de banlieue.

Classification

- Moqueurs – Famille des Mimidés
- Latin – *Dumetella carolinensis*
- Anglais – Gray Catbird
- Été

Longueur

23 cm



Description physique

Dessus roux vif, dessous fortement rayé. Noter les bandes alaires, le bec assez courbé, la queue longue, l'œil jaune.

Habitat

Fourrés, arbustes, buissons épineux.

Classification

- Moqueurs – Famille des Mimidés
- Latin – *Toxostoma rufum*
- Anglais – Brown Thrasher
- Été

Longueur

29 cm



Classification

- Tyrans et Moucherolles – Famille des Tyrannidés
- Latin – Sayornis phoebe
- Anglais – Eastern Pheobe
- Été

Description physique

Un moucherolle brun grisâtre de la taille d'un moineau, sans anneau péri-oculaire ni barres alaires nettes (peut présenter des barres ternes, le jeune surtout). Le bec est tout noir. Le jeune en autonome a le dessous jaunâtre.

Habitat

Bords des cours d'eau et des étangs, ponts, bords de route, fermes

Longueur

16 / 18 cm



Description physique

Plus blanc dessous que les autres Empidonax. Bec court, la mandibule inférieure largement jaunâtre; anneau péri-oculaire bien apparent. Hoche la queue nerveusement.

Habitat

Forêts et petits bois clairs, bosquets de trembles, vergers.

Classification

- Tyrans et Moucherolles – Famille des Tyrannidés
- Latin – *Empidonax minimus*
- Anglais – Least Flycatcher
- Été

Longueur

13 cm



Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
- Latin – *Wilsonia pusilla*
- Anglais – Wilson's Warbler
- Été

Description physique

Petite, jaune doré, toujours en mouvement, l'œil saillant surmonté d'une raie jaune. Mâle : une paruline jaune à béret noir et à queue olive non tachetée. La femelle et le jeune mâle peuvent avoir un semblant de calotte.

Habitat

Fourrés le long des cours d'eau, enchevêtrements humides, buissons bas, saules, aulnes.

Longueur

12 cm



Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
- Latin – *Dendroica coronata*
- Anglais – Yellow-Rumped Warbler
- Été

Description physique

Caractérisé par son croupion jaune et son cri.
Mâle en plumage nuptial : dessus gris-bleu; forte tache noire à la poitrine; tache jaune à la calotte et devant l'aile. Femelle en plumage nuptial : brunâtre; même motif de base. En plumage d'hiver : rayée; dessus brunâtre; dessous blanchâtre, le haut du flanc jaune; croupion jaune.

Habitat

Forêts de conifères et mixtes. En migration et en hiver, divers habitats : bois, fourrés, broussailles, buissons.

Longueur

13 / 15 cm



Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
- Latin – *Dendroica pensylvanica*
- Anglais – Chestnut-sided Warbler
- Été

Description physique

Adulte en plumage nuptial : identifié facilement par la combinaison calotte jaune et flancs marrons. Plumage d'hiver : dessus citron verdâtre, dessous largement blanc, anneau péri-oculaire blanc et mince, deux barres alaires jaunes pâles.

Habitat

Bois en regain, clairières, prés broussailleux.

Longueur

11 / 14 cm



Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
- Latin – *Dendroica castanea*
- Anglais – Bay-breasted Warbler
- Été

Description physique

Mâle en plumage nuptial : sombre; gorge, haut de poitrine et flancs marrons; noter la grande tache chamois pâle sur le cou. Femelle en plumage nuptial : plus pâle, plus délavée. Plumage d'hiver : dessus olive, deux barres alaires blanches, dessous blanc-chamois terne. Elle peut avoir des traces de marron sur les flancs.

Habitat

Forêts de conifères(l'été), autres types de forêts en migration.

Longueur

13 / 15 cm



Description physique

Mâle : couleurs tranchées : dessus bleu, gorge et flancs noirs, poitrine blanche. Femelle : dos brun olive, ligne claire au dessus de l'œil et petit carré blanc à l'aile (pas toujours visible). Le jeune peut ne pas arborer ce carré, mais noter la joue sombre.

Habitat

Étage inférieur des forêts décidues ou mixtes.

Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
 - Latin – *Dendroica caerulescens*
 - Anglais – Black-Throated Blue Warbler
- Été

Longueur

13 / 14 cm



Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
- Latin – Dendroica pinus
- Anglais – Pine Warbler
- Été

Description physique

Aucune autre paruline ayant la poitrine jaune et aucun autre trait voyant n'a les barres alaires blanches. Poitrine très faiblement rayée, dos non rayé, coin de la queue blanc. Femelle plus terne que le mâle.

Habitat

Pinèdes claires.

Longueur

13 / 14 cm



Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
- Latin – *Seiurus noveboracensis*
- Anglais – Northern Waterthrush
- Été

Description physique

Dos brun; sourcil crème, jaune pâle ou chamois; dessous rayé, souvent jaunâtre. Gorge rayée ou tachetée

Habitat

Bois marécageux ou humide, bords des cours d'eau et des lacs; en migration, fourrés humides également.

Longueur

15 cm



Description physique

Mâle : noir, la queue et les ailes marquées d'orange vif. Femelle : brun olive, taches jaunes étincelantes aux ailes et à la queue. Jeune mâle d'un an : comme la femelle mais teinté d'orange.

Habitat

Forêts décidues, bois en regain.

Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
- Latin – *Setophaga ruticilla*
- Anglais – American Redstart
- Été

Longueur

13 cm



Description physique

La paruline la plus jaune. Même les taches de la queue sont jaunes (blanches chez beaucoup d'autres espèces). Le mâle a la poitrine rayée de marron (raies faibles ou absentes chez les femelles).

Habitat

Buissons, lisières des marais et des cours d'eau, prés broussailleux, jardins.

Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
- Latin – Dendroica petechia
- Anglais – Yellow Warbler
- Été

Longueur

13 cm



Description physique

Le mâle a un masque noir et la gorge jaune. Femelle : brun-olive, sans masque noir, la gorge jaune intense et la poitrine jaune-chamois. Le jeune mâle a un masque noir à peine esquissé. La jeune femelle peut avoir le dessous dépourvu de jaune.

Habitat

Marais, fourrés humides.

Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
- Latin – *Geothlypis trichas*
- Anglais – Common Yellowthroat
- Été

Longueur

11 / 14 cm



Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
- Latin – *Mniotilta varia*
- Anglais – Black-and-White Warbler
- Été

Description physique

Rayée longitudinalement de noir et de blanc, elle grimpe sur les troncs et les branches des arbres. Calotte rayée, raies blanches sur le dos. La femelle a le dessous plus blanc.

Habitat

Forêts

Longueur

11 / 14 cm



Description physique

Mâle en plumage nuptial : une paruline grise, rayée, à calotte noire et joues blanches. Femelle en plumage nuptial : moins fortement rayée, sans calotte noire; dessus gris verdâtre, poitrine colorée d'olive. Pattes et doigts visiblement jaunâtres. Plumage d'hiver : dessus olive; dessous jaune verdâtre, légèrement rayé; deux barres alaires, sous-caudales blanches, pattes habituellement jaunâtres pâles ou seulement les doigts.

Habitat

Conifères; en migration, d'autres arbres

Longueur

13 cm

Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
- Latin – *Dendroica striata*
- Anglais – Blackpoll Warbler
- Été



Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
- Latin – *Dendroica tigrina*
- Anglais – Cape May Warbler
- Été

Description physique

Mâle en plumage nuptial : noter les joues marrons. Dessous jaune, rayé de noir; croupion jaune, calotte noire. Mâle en plumage d'hiver et femelle : sans les joues marrons, plus ternes; poitrine souvent blanchâtre, rayée. Noter la tache jaune terne derrière l'oreille.

Habitat

Forêts d'épinettes; en migration, d'autres arbres.

Longueur

13 cm



Description physique

Dessus olive, dessous jaune; capuchon gris couvrant la tête et le cou; le mâle porte une bavette noire à contour irrégulier.

Habitat

Clairières, fourrés (de framboisiers souvent), bois en regain.

Classification

- Parulines – Famille des Parulidés
- Latin – *Oporornis philadelphia*
- Anglais – Mourning Warbler
- Été

Longueur

13 / 14 cm



Description physique

Un petit canard. Mâle : largement blanc, le dos noir; tête ronde à gros bonnet blanc. En vol, grande plaque blanche à l'aile. Femelle : sombre et compacte; joue blanche, petit bec, tache blanche à l'aile.

Habitat

Lacs, étangs, rivières; l'hiver, eau salée aussi.

Classification

- Canards plongeurs – Sous-famille des Aythynés
- Latin – *Bucephala albeola*
- Anglais – Bufflehead
- Été

Longueur

33 / 38 cm



Classification

- Pics – Famille des Picidés
- Latin – Picoides arcticus
- Anglais – Black-Backed Woodpecker
- Été - Hiver

Description physique

Noter le dos tout noir allié aux flancs barrés. Les mâles ont du jaune au sommet de la tête. N'ont que trois doigts.

Habitat

Sapinières et pessières, particulièrement dans les brûlis.

Longueur

23 / 25 cm



Classification

- Pics – Famille des Picidés
- Latin – *Picoides villosus*
- Anglais – Hairy Woodpecker
- Été - Hiver

Description physique

Le dos blanc et le bec fort. Croupion blanc ou barres blanches au dos non tacheté. Tache rouge de la nuque du mâle divisée par une ligne noire. Femelle sans rouge à la nuque.

Habitat

Bosquets riverains, forêts et arbres d'ombrage.

Longueur

24 cm



Classification

- Pics – Famille des Picidés
- Latin – Picoides pubescens
- Anglais – Downy Woodpecker
- Été - Hiver

Description physique

Dos blanc et petit bec. Rectrices latérales tachetées de noir. Rouge à la nuque du mâle formant une tache ininterrompue.

Habitat

Bosquets riverains, forêts, vergers, arbres d'ombrage, petits bois.

Longueur

16 cm



Description physique

Les individus typiques sont gris et ont le croupion blanchâtre, deux barres alaires noires et la queue large à bout sombre.

Habitat

Villes

Classification

- Pigeons, Tourterelles – Famille des Columbides
- Latin – *Columbia livia*
- Anglais – Rock Pigeon
- Été - Hiver

Longueur

33 cm



Classification

- Carouges, Quiscales, Orioles, Etc.
 - Famille des Ictéridés
- Latin – Quiscalus quiscula
- Anglais – Common Grackle
- Été

Description physique

Grand oiseau au plumage noir irisé plus grand que le merle. Le mâle en plumage nuptial a la queue cunéiforme étalée en V. Chez le mâle, la tête a des reflets violets et le dos bronzé ou pourpré terne.

Habitat

Terres cultivées, villes, bosquets, bords des cours d'eau.

Longueur

28 / 34 cm



Classification

- Roitelets – Familles des Regulidés
- Latin – *Regulus satrapa*
- Anglais – Golden-crowned Kinglet
- Été

Description physique

Calotte vive, jaune chez les femelle, orange chez le mâle, bordée de noir, et sourcil blanchâtre. Les roitelets sont de petits oiseaux gris olives. Leurs haussements d'épaule et leurs fortes barres alaires sont caractéristiques.

Habitat

Conifères; en hiver, d'autres arbres aussi.

Longueur

9 cm



Classification

- Roitelets – Familles des Regulidés
- Latin – *Regulus calendula*
- Anglais – Ruby-crowned Kinglet
- Été

Description physique

Oiseau minuscule à queue courte; dessus gris-olive et barres alaires nettes; le mâle a la calotte écarlate (habituellement cachée, hérissée quand il est excité). L'anneau péri-oculaire blanc interrompu fait ressortir l'œil.

Habitat

Bois de conifères; en hiver, autres forêts.

Longueur

10 cm



Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinals : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – *Carpodacus mexicanus*
- Anglais – House Finch
- Hiver

Description physique

Il est plus petit que le roselin pourpré et le mâle est d'un rouge plus orangé. Noter les raies foncées sur les flancs et la poitrine. La femelle, rayée de brun, diffère de la femelle du Roselin pourpré par le bec moins fort et la face sans motif contrasté (sans forte moustache, ni joue foncée).

Habitat

Jardins, parcs, fermes. Visite les postes d'alimentation avec assiduité.

Longueur

13 / 14 cm



Description physique

Mâle : rouge-rose terne, plus intense sur la tête et le croupion; flancs non rayés. Femelle et jeune : fortement rayés de brun comme les bruants. Noter la large raie sombre au menton, la joue foncée, la raie claire derrière l'œil, le bec assez gros et la queue plus encochée que chez le Roselin familier.

Habitat

Bois, bosquets; aux mangeoires également.

Classification

- Gros-becs, Bruants, Cardinaux : Famille des Fringillidés, des Emberizidés et des Cardinalidés.
- Latin – *Carpodacus purpureus*
- Anglais – Purple Finch
- Été-Hiver

Longueur

14 / 15 cm



Description physique

Mâle : noter la ligne longitudinale blanche sur les scapulaires. Contour chamois de l'œillère plus épais.

Habitat

Marais, rivières, baies.

Classification

- Canards Barboteurs – Sous-famille des Anatinés.
- Latin – *Anas crecca carolinensis*
- Anglais – Green-winged Teal
- Hiver

Longueur

35 cm



Description physique

Cette espèce se caractérise par le capuchon noir (gris chez la femelle) et le petit œil saillant au milieu de la face blanche. Les sous-caudales sont marrons.

Habitat

Forêts, petits bois, bosquets, arbres d'ombrage; fréquente les mangeoires.

Classification

- Sittelles – Famille des Sittidés
- Latin – *Sitta carolinensis*
- Anglais – White-breasted Nuthatch
- Été - Hiver

Longueur

13 / 15 cm

Sittelle à poitrine rousse



Classification

- Sittelles – Famille des Sittidés
- Latin – *Sitta canadensis*
- Anglais – Red-breasted Nuthatch
- Été - Hiver

Description physique

Petite sittelle à bandeau noir et à sourcil blanc.
Dessous d'un roux délavé.

Habitat

Forêts de conifères; en hiver, d'autres forêts également.

Longueur

11 cm



Classification

- Gros-Becs, Bruants, Cardinaux – Familles des Fringillidés
- Latin – *Carduelis hornemanni*
- Anglais – Hoary Redpoll
- Été - Hiver

Description physique

Dans les bandes de sizerins, chercher un oiseau givré, au croupion blanchâtre sans rayures et moins rayé dessous. Chez le mâle, le croupion peut être teinté de rose; le bec est plus conique que chez le Sizerin flammé et paraît un peu plus court; les sous-caudales ne sont pas rayées ou juste à peine.

Habitat

Comme celui du Sizerin flammé.

Longueur

13 cm



Classification

- Gros-Becs, Bruants, Cardinaux – Familles des Fringillidés
- Latin – *Carduelis flammea*
- Anglais – Common Redpoll
- Été - Hiver

Description physique

Le front rouge vif. Petit passereau gris-brun et rayé, à menton noir, à raies foncées sur les flancs et à petit bec jaunâtre. Le mâle a la poitrine rosée.

Habitat

Bouleaux, arbrisseaux de la toundra. En hiver, herbes, broussailles, terrains découverts, mangeoires.

Longueur

13 cm



Classification

- Gros-Becs, Bruants, Cardinaux – Familles des Fringillidés
- Latin – *Carduelis pinus*
- Anglais – Pine Siskin
- Hiver

Description physique

Petit passereau foncé, fortement rayé, à queue très encochée et au bec très pointu. Soupçon de jaune aux ailes et à la base de la queue pas toujours visible.

Habitat

Conifères, bois mixtes, aulnes, terrains vagues; postes d'alimentation, particulièrement ceux pourvus de chardon.

Longueur

11 / 13 cm



Classification

- Pigeons, Tourterelles – Famille des Columbides
- Latin – Zenaida macroura
- Anglais – Mourning Dove
- Été-Hiver

Description physique

Brune, plus petite et plus svelte que la pigeon biset. Noter la queue pointue et bordée de blanc.

Habitat

Fermes, villages, bois clairs, broussailles, bords de route, champs.

Longueur

30 cm



Description physique

Un passereau de petite taille, à bec court de moineau. Mâle : noir, à tête brune. Femelle : toute grise, la gorge plus pâle, noter le bec court. Juvénile : plus pâle que la femelle, gris beige, la poitrine faiblement rayée.

Habitat

Fermes, champs, bords de route, orées des bois, bosquets riverains. Ne construit pas de nids mais pond ses œufs dans ceux de nombreux passereaux.

Classification

- Sturnelles, Vachers – Famille des Ictéridés
- Latin – *Molothrus ater*
- Anglais – Brown-Headed Cowbird
- Été

Longueur

18 cm



Description physique

Noter le sourcil blanc bordé de noir et la calotte grise contrastant avec le dos olive. L'iris n'apparaît rouge que de près; il est brun chez les jeunes.

Habitat

Forêts, arbres d'ombrage, bosquets.

Classification

- Viréos – Famille des Viréonidés
- Latin – *Vireo olivaceus*
- Anglais – Red-Eyed Vireo
- Été

Longueur

15 cm



Description physique

Ce viréo sans barres alaires et au dessous coloré de jaune (surtout à la poitrine) ressemble à une paruline. Noter le lore noirâtre (entre l'œil et le bec).

Habitat

Jeunes forêts; peupliers, saules, aulnes.

Classification

- Viréos – Famille des Viréonidés
- Latin – Vireo philadelphicus
- Anglais – Philadelphia Vireo
- Été

Longueur

12 cm



Description physique

Un des trois viréos communs dépourvus de barres alaires. Noter la poitrine blanchâtre et le sourcil clair sans bordures noires.

Habitat

Forêts décidues et mixtes, bosquets de trembles, peupliers, arbres d'ombrage. Souvent près des cours d'eau.


Classification

- Viréos – Famille des Viréonidés
- Latin – Vireo gilvus
- Anglais – Warbling Vireo
- Été

Longueur

13 cm

- Les oiseaux du Québec et de l'est de l'Amérique du Nord, Roger Tory Peterson, Éditions Broquet, 2003
- Environnement Canada – <http://www.ec.gc.ca>
- Association amicale d'ornithologie de la Haute-Gaspésie – www.bphg.ca/oiseau



Fleuve Saint-Laurent

vers l'est



Plage Cartier

Parc Multi-sports

Parc du Petit-Bois

1e Avenue

vers l'ouest



11e Rue

3,2 km

Route Bellevue

Relais du Vieux Moulin

Légende

	Pont suspendu Suspension bridge		Aire de pique-nique Picnic area
	Toilettes Water closet		Tour d'observation Observation tower
	Aire de jeux Playground		Point d'observation Viewpoint
	Restaurant Restaurant		
	Stationnement sentier pédestre Walking trail parking		
	Départ sentier pédestre Walking trail start		
	Relais du Vieux Moulin Vieux Moulin relay		
	Pont Bridge		Sentier pédestre Walking trail
	Route régionale et secondaire Regional and secondary road		

Sentier du Petit-Bois

Échelle app. 1:20 000

Les mangeoires sont déplacées au gré des saisons.
Ouvrez l'œil tout au long du sentier !