

Mortalité par cancer selon le site de la tumeur Bas-Saint-Laurent, 2000 à 2003

Selon les chiffres des années 2000 à 2003, 528 personnes décèdent annuellement du cancer au Bas-Saint-Laurent, soit 294 hommes et 234 femmes. Ces 528 décès correspondent à un taux brut de mortalité supérieur à celui obtenu dans l'ensemble du Québec (258 décès sur 100 000 habitants contre 237). Cette différence s'explique essentiellement par le fait que la population de la région est davantage âgée que celle de la province et que ce type de maladie est plus fréquent à mesure que la population vieillit. En effet, après avoir été ajusté pour tenir compte des différences d'âge, le taux de mortalité par cancer du Bas-Saint-Laurent passe sous celui du Québec (220 contre 237). Les taux ajustés de décès par cancer sont particulièrement bas dans les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Rimouski-Neigette.

Le type de cancer qui cause le plus de décès, tant chez les hommes que chez les femmes, est le cancer du poumon, et ce, avec une moyenne de 154 décès annuellement. Bien que le taux de mortalité ajusté par cancer du poumon de la région soit comparable avec celui du Québec (64,2 contre 68,8 pour 100 000 habitants), dans la MRC de La Mitis il est davantage élevé (87,8), les hommes de cette MRC étant particulièrement touchés par ce type de cancer. En contrepartie, la population de Rivière-du-Loup serait plutôt épargnée (45,2).

Tandis que chez les hommes, après le cancer du poumon, c'est le cancer de la prostate qui cause le plus de décès (31 annuellement), chez les femmes le cancer du sein représente la deuxième cause de mortalité par tumeur (38 décès). Dans les deux cas, les taux ajustés de mortalité obtenus dans la région se comparent à ceux observés dans la province.

Le cancer colorectal est pour sa part responsable de 29 décès par année chez les hommes et 28 chez les femmes. Bien que ce type de cancer constitue une importante cause de décès, il est tout de même à noter que le taux ajusté de mortalité qui lui est associé est plus faible dans la région que dans la province (23,6 sur 100 000 contre 27,4 au Québec), la différence étant davantage manifeste chez les hommes (23,8 c. 29,0).

Les 37 décès par cancer du pancréas enregistrés dans la région correspondent par contre à un taux ajusté de mortalité qui s'avère plus élevé que celui du Québec (15,3 sur 100 000 et à 11,6 au Québec). Les femmes se démarquent particulièrement de leurs homologues québécoises à ce chapitre, elles enregistrent un taux ajusté par cancer du pancréas de 16,6 sur 100 000 contre 11,6 chez l'ensemble des femmes du Québec. Les taux ajustés de mortalité par cancer du pancréas sont particulièrement élevés dans les MRC de Témiscouata, La Matapédia et Rimouski-Neigette.

Le cancer de l'estomac (19 décès en moyenne par année), les lymphomes non hodgkiniens (14 décès) et le cancer de l'œsophage (11 décès) constituent les autres types de cancer qui font le plus de victimes dans la région. Dans les trois cas, aucune différence significative n'est observée entre les taux enregistrés dans la région et ceux au Québec.

Nombre moyen annuel et taux ajusté de mortalité (pour 100 000 habitants) par cancer selon le site de la tumeur, territoire de MRC, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2000 à 2003

Territoire de MRC	Cancer du poumon		Cancer colorectal		Cancer du pancréas		Cancer de l'estomac	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	18	74,8	7	*27,6	5	*18,1 (+)	1	--
Matane	20	70,8	8	*28,6	5	*16,3	3	*8,9
La Mitis	22	87,8 (+)	5	*18,3	4	*16,0	2	--
Rimouski-Neigette	33	58,3	15	*25,6	10	16,8 (+)	5	*9,4
Les Basques	11	79,5	3	*22,2	2	--	1	--
Rivière-du-Loup	17	45,2 (-)	8	*20,5	5	*14,1	3	*7,9
Témiscouata	16	56,8	7	*24,8	5	*18,8 (+)	2	--
Kamouraska	19	64,6	6	*20,1	2	--	2	--
Bas-Saint-Laurent	154	64,2	57	23,6 (-)	37	15,3 (+)	19	7,9
Québec	5092	68,8	2026	27,4	858	11,6	551	7,4

(suite)

Territoire de MRC	Lymphome non Hodgkinien		Cancer de l'œsophage		Ensemble des tumeurs	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	1	--	1	--	56	231,7
Matane	3	*9,9	2	--	69	248,5
La Mitis	1	--	1	--	62	254,0
Rimouski-Neigette	4	*7,1	3	*4,4	122	216,4 (-)
Les Basques	1	--	1	--	32	219,4
Rivière-du-Loup	2	--	1	--	74	195,0 (-)
Témiscouata	2	--	1	--	57	213,5
Kamouraska	1	--	2	--	57	194,0 (-)
Bas-Saint-Laurent	14	5,9	11	4,5	528	220,0 (-)
Québec	519	7,0	270	3,7	17529	237,0


(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 0,05.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

-- Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est pas présentée.

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000 à 2003.

Répartition des décès par cancer selon le site de la tumeur, Bas-Saint-Laurent, 2000-2003



Nombre moyen annuel et taux ajusté de mortalité (pour 100 000 habitants) par cancer selon le site de la tumeur, population de sexe masculin, territoire de MRC, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2000 à 2003

Territoire de MRC	Cancer du poumon		Cancer de la prostate		Cancer colorectal		Cancer du pancréas	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	13	108,0	3	*23,1	4	*31,1	2	--
Matane	15	105,1	3	*22,2	4	*26,4	3	*18,4
La Mitis	16	122,4 (+)	2	--	2	-- (-)	2	--
Rimouski-Neigette	19	68,7 (-)	5	*18,3	7	*23,9	5	*16,7
Les Basques	8	*101,2	2	--	2	--	1	--
Rivière-du-Loup	11	57,5 (-)	7	*34,2	4	*19,2	2	--
Témiscouata	11	78,5	4	*27,3	4	*27,0	3	*19,5
Kamouraska	15	104,3	5	*27,1	4	*25,0	1	--
Bas-Saint-Laurent	106	88,0	31	24,1	29	23,8 (-)	17	13,8
Québec	3193	87,5	797	21,8	1057	29,0	423	11,6

(suite)

Territoire de MRC	Cancer de l'estomac		Lymphome non Hodgkinien		Ensemble des tumeurs	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	1	--	1	--	33	259,6
Matane	2	--	2	--	42	297,4
La Mitis	1	--	1	--	35	272,3
Rimouski-Neigette	3	*9,5	2	--	59	217,1 (-)
Les Basques	1	--	1	--	18	230,4
Rivière-du-Loup	2	--	1	--	39	210,5 (-)
Témiscouata	1	--	1	--	33	234,1
Kamouraska	2	--	1	--	37	245,3
Bas-Saint-Laurent	11	9,3	8	*6,4	294	242,3 (-)
Québec	333	9,1	273	7,5	9370	256,9


(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 0,05.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

-- Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est pas présentée.

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000 à 2003.

Répartition des décès par cancer selon le site de la tumeur, population de sexe masculin, Bas-Saint-Laurent, 2000-2003



Nombre moyen annuel et taux ajusté de mortalité (pour 100 000 habitants) par cancer selon le site de la tumeur, population de sexe féminin, territoire de MRC, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2000 à 2003

Territoire de MRC	Cancer du poumon		Cancer du sein		Cancer colorectal		Cancer du pancréas	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	5	*42,5	4	*32,9	3	*24,1	2	--
Matane	5	*37,5	4	*26,8	4	*30,7	2	--
La Mitis	6	*54,2	4	*33,7	3	*22,9	2	--
Rimouski-Neigette	14	48,2	10	33,9	8	*27,2	5	*17,0
Les Basques	4	*58,4	2	--	2	--	2	--
Rivière-du-Loup	6	*33,2 (-)	7	*35,2	4	*21,7	4	*19,5
Témiscouata	5	*35,5	5	*43,2	3	*22,7	2	--
Kamouraska	4	*26,0 (-)	4	*30,5	2	--	1	--
Bas-Saint-Laurent	48	41,0 (-)	38	32,9	28	23,5	20	16,6 (+)
Québec	1899	50,7	1294	34,5	970	25,9	436	11,6

(suite)

Territoire de MRC	Cancer de l'estomac		Lymphome non Hodgkinien		Ensemble des tumeurs	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	1	--	0	--	23	204,5
Matane	1	--	1	--	27	200,9
La Mitis	1	--	1	--	28	236,2
Rimouski-Neigette	3	*9,3	2	--	63	215,8
Les Basques	0	--	0	--	14	208,7
Rivière-du-Loup	1	--	1	--	35	179,9 (-)
Témiscouata	1	--	1	--	24	193,4
Kamouraska	1	--	1	--	20	144,2 (-)
Bas-Saint-Laurent	8	6,6	7	*5,5	234	198,2 (-)
Québec	218	5,8	246	6,6	8159	217,6


(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 0,05.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

-- Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est pas présentée.

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000 à 2003.

Répartition des décès par cancer selon le site de la tumeur, population de sexe féminin, Bas-Saint-Laurent, 2000-2003



Définitions

Les taux ajustés de mortalité par cancer selon le site de la tumeur présentée dans cette fiche thématique correspondent au rapport, pour les années 2000 à 2003, entre le nombre annuel moyen de décès par cancer selon le site et la population totale enregistrée en 2001. Ces taux sont présentés sur la base de 100 000 personnes.

Les taux sont ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 2001. Cet ajustement des taux permet d'annuler l'influence des différentes structures d'âge entre les territoires et ainsi de pouvoir comparer les résultats obtenus entre eux.

Il est à noter également qu'un test statistique (seuil de 0,05) est effectué afin de vérifier si la différence entre le nombre de décès observé dans une MRC ou dans la région est significativement différent du nombre de décès attendu au regard de la situation en vigueur dans l'ensemble du Québec.

* * * * *

Réalisation

Équipe de surveillance de l'état de santé de la population de l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Traitement des données et rédaction : *Jean-Pierre St-Cyr*

Relecture du document : *Roger Dubé*

Révision grammaticale et mise en pages : *Diane Morin*

Mise à jour : novembre 2006