

ANALYSE DES CAS D'INFECTION GÉNITALE

PAR *CHLAMYDIA TRACHOMATIS*, DE GONORRHÉE
D'HÉPATITE B ET DE SYPHILIS DÉCLARÉS AU QUÉBEC

PAR ANNÉE CIVILE 1995-1999



S A N T É P U B L I Q U E

COLLECTION

*analyses et
surveillance*

17

Québec 

ANALYSE DES CAS D'INFECTION GÉNITALE

PAR *CHLAMYDIA TRACHOMATIS*, DE GONORRHÉE
D'HÉPATITE B ET DE SYPHILIS DÉCLARÉS AU QUÉBEC

PAR ANNÉE CIVILE 1995-1999

RAYMOND PARENT

*Institut national de santé publique du Québec
Centre de recherche, Hôpital du Saint-Sacrement,
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec*

MICHEL ALARY

*Institut national de santé publique du Québec
Centre de recherche, Hôpital du Saint-Sacrement,
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec
Groupe de recherche en épidémiologie, Université Laval*

Octobre 2000

Québec 

Ministère de
la Santé et des
Services sociaux

Centre de coordination
sur le sida

Cette analyse a été financée par le Centre québécois de coordination sur le sida et soutenue par le Laboratoire de santé publique du Québec du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Édition produite par :

La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour obtenir d'autres exemplaires de ce document, faites parvenir votre commande par télécopieur : **(418) 644-4574**

par courriel : **communications@msss.gouv.qc.ca**

ou par la poste : **Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction des communications
1075, chemin Sainte-Foy, 16^e étage
Québec (Québec)
G1S 2M1**

Le présent document est disponible à la section **documentation** du site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'adresse est : **www.msss.gouv.qc.ca**

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec, 2001
Bibliothèque nationale du Canada, 2001
ISBN 2-550-37182-8

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source soit mentionnée.

© Gouvernement du Québec

Remerciements

Nous aimerions remercier :

- toutes les personnes qui se chargent d'alimenter et de gérer le système des maladies à déclaration obligatoire dans chacune des régions sociosanitaires ainsi qu'au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ) ;
- les membres du comité consultatif sur les MTS, qui ont revu et commenté les données ;
- madame Myrto Mondor qui a aidé à la conception, au développement et au développement et à la programmation du cadre d'analyse ;
- la direction du LSPQ ainsi que monsieur Florian Gosselin, madame Louise Ringuette, madame Louiselle Clément et monsieur René Jean, pour nous avoir aidés à monter des fichiers d'analyse valides.

Avant-propos

Le présent rapport expose les données sur les cas d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au Québec au cours des cinq dernières années, soit entre le 1^{er} janvier 1995 et le 31 décembre 1999. Ces données aident à déterminer l'ampleur du problème des maladies transmissibles sexuellement (MTS). La répartition régionale des MTS et l'analyse qui en est faite permettent d'orienter les interventions et de planifier les ressources pour lutter contre les MTS.

Le rapport s'adresse principalement aux responsables régionaux de la lutte contre les MTS, mais aussi à toutes les organisations, associations ou personnes qui assument un mandat à l'intérieur de cette lutte, afin de les aider dans leurs interventions.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux est responsable du programme de surveillance des MTS. Plusieurs partenaires — médecins traitants, laboratoires déclarants et directions régionales de la santé publique — y collaborent. Ces dernières assurent la collecte, la saisie et le transfert des informations.

Un programme de surveillance comprend la collecte, la validation et l'analyse des données ainsi que la diffusion de l'information. La publication de ce document fait donc partie intégrante du programme de surveillance des MTS. Le document sera également accessible dans le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux (www.msss.gouv.qc.ca).

Inventaire des projets de recherche sur les MTS au Québec

Par ailleurs, nous souhaitons ajouter une section au prochain rapport et, pour ce faire, nous avons besoin de votre aide. Nous aimerions en effet être en mesure de dresser l'inventaire des recherches actuellement en cours au Québec, qui s'intéressent aux MTS et à la santé publique.

Si vous menez une telle recherche (ou si vous en avez mené une dans les trois dernières années), nous aimerions la mentionner dans la prochaine édition du rapport sur les MTS. L'inventaire ainsi dressé aiderait à la diffusion de vos résultats de recherche puisque le rapport de surveillance produit chaque année est diffusé auprès de plus de 200 individus et organismes qui s'intéressent de près ou de loin au problème des MTS. Une vue d'ensemble des activités de recherche en cours pourrait également contribuer à une meilleure compréhension du problème.

Nous aimerions donc recevoir de votre part les renseignements suivants :

- le titre de l'étude ;
- la liste des chercheurs et collaborateurs, de même que les coordonnées d'une personne à contacter ;
- un résumé de quelques lignes (maximum dix) présentant les principaux résultats ou l'état d'avancement du projet ;
- les dates du début et de la fin du projet.

Faites parvenir ces renseignements à :

M. Raymond Parent
Institut national de santé publique du Québec
2400, rue d'Estimauville
Beauport (Québec) G1E 7G9
Tél. : (418) 666-7000, poste 218
Courriel : raymond.parent@ssss.gouv.qc.ca

Table des matières

Liste des tableaux et des graphiques	viii
Introduction	1
Faits saillants	3
Notes techniques	5
1 Analyse générale	7
1.1 L'infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i>	8
1.2 La gonorrhée	10
1.3 L'hépatite B	13
1.4 La syphilis	13
1.5 Les grossesses ectopiques	15
2 Discussion	16
2.1 Les limites du système MADO	16
2.2 Les infections génitales par <i>Chlamydia trachomatis</i>	17
2.3 Les gonorrhées	18
Conclusion	19
3 Tableaux et graphiques	T1 - T147
Annexe : Surveillance périodique des MTS, période 10 : du 2 janvier au 7 octobre 2000	

Liste des tableaux et des graphiques

SECTION TEXTE

Tableau 1.	Nombre de cas déclarés par année d'épisode et maladie, Québec, 1995-1999	7
Tableau 2.	Caractéristiques des cas déclarés selon l'âge et le sexe, Québec, 1995-1999	7
Tableau 3.	Origine de la déclaration des cas de MTS inscrits au fichier MADO, Québec, 1995-1999	8
Tableau 4.	Type d'infection par <i>Chlamydia trachomatis</i> , sexe des patients et type de cas déclarés, Québec, 1995-1999	9
Tableau 5.	Évolution de l'infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i> au Québec, 1997-2000	9
Tableau 6.	Évolution de la gonorrhée au Québec, 1997-2000	10
Tableau 7.	Résistance aux antibiotiques rapportée dans les déclarations MADO, Québec, 1995-1999	11
Tableau 8.	Nombre de gonorrhées déclarées chez les hommes selon le site d'infection, Québec, 1995-1999	12
Tableau 9.	Nombre de gonorrhées rectales et pharyngées déclarées chez les hommes et proportion par rapport au nombre total de gonorrhées déclarées, Québec, 1995-1999	12
Tableau 10.	Type de validation des cas d'hépatite B déclarés, Québec, 1995-1999	13
Tableau 11.	Nombre de cas déclarés d'infection syphilitique « ancienne » devenue symptomatique selon le type de syphilis et le sexe, Québec, 1995-1999	14
Tableau 12.	Nombre de cas déclarés d'infection syphilitique « récente » et « ancienne » asymptomatique selon le type de syphilis et le sexe, Québec, 1995-1999	14

SECTION TABLEAUX ET GRAPHIQUES

- Mesures des tendances centrales de l'âge des cas déclarés par sexe et type de maladie, Québec (1999) T1

Infection génitale par *Chlamydia trachomatis*

- Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par sexe, Québec (1990-1999) T2
- Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*, Québec (1991-1999) T3
- Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par sexe (1990-1999) Chacune des régions T4
- Évolution par sexe des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*, Québec (1988-1999) T22
- Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999) .. T23
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999) T24
- Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) T25
- Suite T26
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) T27
- Suite T28
- Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) T29
- Suite T30

-	Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i> chez les femmes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)	T31
-	Suite	T32
-	Nombre de cas déclarés d'infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i> chez les hommes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)	T33
-	Suite	T34
-	Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i> chez les hommes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)	T35
-	Suite	T36
-	Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés d'infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i> chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1996-1999)	T37
-	Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i> chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1996-1999)	T38
-	Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1996-1999) . . .	T39
-	Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i> chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1996-1999)	T40
-	Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i> par groupe d'âge, Québec (1995-1999)	T41
-	Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i> , Québec (1990-1999)	T41
-	Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i> chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1995-1999)	T42
-	Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i> chez les femmes, Québec (1990-1999)	T42

- Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1995-1999) T43
- Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les hommes, Québec (1990-1999) T43

Gonorrhée

- Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999) Québec T44
- Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée, Québec (1991-1999) T45
- Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999) Chacune des régions T46
- Évolution par sexe des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée, Québec (1984-1999) T64
- Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999) T65
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999) ... T66
- Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) T67
- Suite T68
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) T69
- Suite T70
- Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) T71
- Suite T72

-	Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)	T73
-	Suite	T74
-	Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)	T75
-	Suite	T76
-	Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)	T77
-	Suite	T78
-	Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1996-1999)	T79
-	Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1996-1999)	T80
-	Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1996-1999) . . .	T81
-	Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1996-1999)	T82
-	Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée par groupe d'âge, Québec (1995-1999)	T83
-	Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée, Québec (1990-1999)	T83
-	Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1995-1999)	T84
-	Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes, Québec (1990-1999)	T84
-	Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1995-1999)	T85

- Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes, Québec (1990-1999) T85
- Nombre et pourcentage de cas déclarés de gonorrhée causée par un *Neisseria gonorrhoeae* producteur de pénicillinase (NGPP) par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999) .. T86
- suite T87

Hépatite B aiguë

- Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1995-1999), Québec T88
- Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë, Québec (1990-1999) T89
- Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999) Chacune des régions T90
- Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999) T108
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999) . T109
- Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) T110
- Suite T111
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) T112
- Suite T113
- Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) T114
- Suite T115
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région sociosanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) T116
- Suite T117

- Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région
socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) . . . T118
- Suite T119

- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë
chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode
et groupe d'âge, Québec (1995-1999) T120
- Suite T121

- Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés
d'hépatites B chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1996-1999) . . . T122

- Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des
cas déclarés d'hépatites B chez les femmes par groupe d'âge,
Québec (1996-1999) T123

- Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés
d'hépatite B chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1996-1999) . . . T124

- Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés
d'hépatite B chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1996-1999) . . . T125

- Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë
par groupe d'âge, Québec (1995-1999) T126

- Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés
d'hépatite B aiguë, Québec (1991-1998) T126

- Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë
chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1995-1999) T127

- Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés
d'hépatite B aiguë chez les femmes, Québec (1990-1999) T127

- Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë
chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1995-1999) T128

- Évolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés
d'hépatite B aiguë chez les hommes, Québec (1990-1999) T128

Hépatite B chronique

- Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région
socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999) T129
- Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région
socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) . . . T130
- Suite T131
- Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les femmes
par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1995-1999) T132
- Suite T133
- Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les hommes
par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1995-1999) T134
- Suite T135

Hépatite B de type non précisé

- Nombre de cas déclarés d'hépatite B de type non précisé par
région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999) T136

Syphilis récente

- Taux d'incidence des cas déclarés de syphilis récente par sexe
(1990-1999), Québec T137
- Région de Montréal-Centre T138
- Nombre de cas déclarés de syphilis récente par région socio-sanitaire,
année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999) T139
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente
par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999) . T140
- Nombre de cas déclarés de syphilis récente par sexe, année d'épisode
et groupe d'âge, Québec (1995-1999) T141
- Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente
par sexe, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) T141

Syphilis ancienne

- Nombre de cas déclarés de syphilis ancienne par région sociosanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999) T142

Grossesses ectopiques

- Taux d'incidence des grossesses ectopiques par âge (1987-1997), Québec T143
- Nombre de grossesses ectopiques par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1987-1997) T144
- Suite T145
- Taux d'incidence des grossesses ectopiques (par 1 000 grossesses) par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1987-1997) T146
- Suite T147

Annexe : Surveillance périodique des MTS, période 10 : du 2 janvier au 7 octobre 2000 (12 tableaux)

Introduction

Certaines maladies transmissibles sexuellement (MTS) sont répertoriées dans le système québécois des maladies à déclaration obligatoire (MADO). Un système informatisé, implanté en 1989-1990, relie chacune des dix-huit régions sociosanitaires à une plateforme commune d'enregistrement des cas déclarés située au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ). L'agrégation des données dépersonnalisées décrit l'épidémiologie des maladies déclarées au Québec.

Nous traitons des cas d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* et des cas de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis déclarés au cours des cinq dernières années, soit entre le 1^{er} janvier 1995 et le 31 décembre 1999. Le lecteur constatera toutefois que les données présentées en graphique couvrent la période allant du 1^{er} janvier 1990 au 31 décembre 1999. Nous détaillons l'incidence de ces maladies en fonction de l'âge, du sexe et de la région sociosanitaire de résidence des personnes atteintes.

Nous mettons aussi à jour les données d'incidence des grossesses ectopiques présentées en 1998. Comme nous l'expliquions dans le rapport 1993-1997, nous calculons ces taux par rapport au nombre total de grossesses. Le nombre de grossesses est obtenu en ajoutant aux naissances vivantes (fichier des naissances) les mortinaissances (fichier des mortinaissances), les grossesses ectopiques (fichier Med-Écho ; codes CIM-9 : 633.1 à 633.9), les interruptions volontaires de grossesses (fichier de la Régie de l'assurance maladie du Québec – RAMQ, codes d'actes médicaux : 6902, 6908, 6909, 6936, 6948 et 6451) et les fausses couches (fichier généré par la RAMQ, codes d'actes médicaux : 6900 et 6906).

Le fichier de la RAMQ sous-estime légèrement le nombre d'interruptions volontaires de grossesse (IVG). Certaines interventions sont pratiquées par des médecins à salaire travaillant dans quelques hôpitaux et dans des CLSC. En 1994, le fichier de la RAMQ sous-estimait d'environ 6 % le nombre d'IVG pratiquées au Québec (M^{me} Sylvie Montreuil, communication personnelle). L'IVG étant l'issue de grossesse la plus fréquente chez les adolescentes de moins de 18 ans, la sous-estimation est plus importante chez celles-ci, atteignant 19,9 % en 1995. Cette sous-estimation au dénominateur pourrait nous faire surestimer d'environ 10 % le taux de grossesses ectopiques chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans.

Nous joignons au présent rapport les données recueillies en 2000 par la surveillance périodique faite aux quatre semaines. Les données présentées sont celles de la 10^e période (du 2 janvier au 7 octobre 2000). Nous y renvoyons le lecteur quand nous traitons des tendances de l'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* et de la gonorrhée.

Faits saillants

L'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* est la MTS la plus fréquemment déclarée au Québec, avec 35 479 cas rapportés entre 1995 et 1999. L'hépatite B et la gonorrhée suivent avec 7 410 et 2 759 cas respectivement.

Au début des années 1990, l'incidence de l'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* diminuait d'environ 15 % par année. Le rythme de cette baisse a constamment ralenti depuis 1995 et nous observons depuis 1998 une augmentation des taux d'incidence des cas déclarés dans plus de la moitié des régions sociosanitaires du Québec. En 1999, l'augmentation atteint plusieurs groupes d'âge, les hommes autant que les femmes, et se poursuit en 2000 (au 7 octobre).

Il est possible que la disponibilité de techniques diagnostiques plus performantes et moins invasives explique une partie de l'augmentation des taux d'incidence de l'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*. Il est également possible que nous assistions à une réelle accélération de l'épidémie au Québec.

Chez les hommes, le taux d'incidence de la gonorrhée fluctue depuis l'augmentation observée en 1997. Chez les femmes, on note une augmentation du taux d'incidence en 1999, mais celle-ci ne s'est pas poursuivie en 2000 (au 7 octobre).

Le taux d'incidence de l'hépatite B continue de baisser. D'environ 6 par 100 000 qu'il était au début des années 1990, il est d'environ 2 par 100 000 en 1999.

Seulement quatre cas de transmission récente de syphilis ont été déclarés en 1999. Au 7 octobre, aucun n'avait été déclaré en 2000.

Notes techniques

La déclaration anonyme de la gonorrhée et de la syphilis rend difficile la détection des cas déclarés plus d'une fois. Pour les gonorrhées résistantes aux antibiotiques, le personnel du LSPQ fait toutefois certaines vérifications quant aux « doublons démographiques », puisque tous les laboratoires du Québec informent mensuellement le LSPQ du nombre de souches isolées dans le cadre du programme de surveillance du gonocoque résistant aux antibiotiques. On compare ainsi le nombre de déclarations au nombre de souches rapportées par les laboratoires. Ces vérifications ne sont pas faites dans les cas de syphilis. Les doublons dans les déclarations nominales d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* et d'hépatite B peuvent plus facilement être décelés.

Étant donné le faible nombre de cas, nous ne présentons que quelques histogrammes dans le cas des syphilis récentes.

Nous ne calculons pas les taux d'incidence des hépatites B chroniques et des syphilis anciennes. Les taux générés ne seraient que le reflet du rythme de détection des cas.

Les tableaux contiennent les cas pour lesquels la variable d'intérêt n'a pas été catégorisée. Pour faciliter les comparaisons, des taux ont été générés à partir de ces cas. Le dénominateur est toujours ici la population de référence à laquelle peut s'appliquer le numérateur observé. Ce taux s'ajoute aux taux générés pour les cas où la valeur de la variable n'est pas manquante. Exemple : en 1997, 14 cas d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* ont été déclarés au Québec sans que le sexe du patient ne soit précisé, pour un taux de 0,2 par 100 000 si l'on rapporte ce nombre de cas à l'ensemble de la population québécoise.

Nous ne présentons pas les taux d'incidence ajustés dans chaque région à la structure d'âge provinciale. L'exercice fait en 1998 nous avait amenés à conclure que cet ajustement n'avait pas d'effet significatif en dehors des régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James où les taux ajustés étaient inférieurs d'environ 15 % et 30 % respectivement.

PARTIE

1

ANALYSE GÉNÉRALE



1 Analyse générale

Les infections génitales par *Chlamydia trachomatis*, les gonorrhées, les hépatites B et les syphilis sont les MTS à déclaration obligatoire les plus fréquentes. Elles représentaient 39,7 % (9 452/23 797) des cas de MADO déclarés en 1995 et 39,3 % (9 950/25 318) en 1999 (voir les tableaux 1 et 2).

Tableau 1. Nombre de cas déclarés par année d'épisode et maladie, Québec, 1995-1999

	Nombre de cas (pourcentage)				Total
	Infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i>	Gonorrhée	Hépatite B	Syphilis	
1995	7 074 (74,8)	607 (6,4)	1 691 (17,9)	80 (0,9)	9 452 (100)
1996	6 681 (76,1)	479 (5,5)	1 556 (17,7)	63 (0,7)	8 779 (100)
1997	6 466 (75,3)	556 (6,5)	1 508 (17,6)	52 (0,6)	8 582 (100)
1998	7 265 (79,3)	493 (5,4)	1 352 (14,8)	51 (0,6)	9 160 (100)
1999	7 994 (80,4)	624 (6,3)	1 303 (13,1)	29 (0,3)	9 950 (100)
Total	35 479 (77,3)	2 759 (6,0)	7 410 (16,1)	275 (0,6)	45 923 (100)

Tableau 2. Caractéristiques des cas¹ déclarés selon l'âge et le sexe, Québec, 1995-1999

Nombre de cas déclarés pour lesquels l'âge du patient est connu	45 268 (98,6 %)
Nombre de cas déclarés pour lesquels le sexe du patient est connu	45 768 (99,7 %)
Nombre de cas déclarés chez les hommes	15 969 (34,9 %)
Hommes d'âge connu	15 761 (98,7 %)
Nombre de cas déclarés chez les femmes	29 799 (65,1 %)
Femmes d'âge connu	29 449 (98,8 %)
Âge médian (moyen) des cas déclarés chez les femmes ²	21 ans (23,4)
Âge médian (moyen) des cas déclarés chez les hommes ²	28 ans (30,8)

1. Entre 1995 et 1999, 45 923 cas d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis ont été déclarés.

2. La médiane est la mesure de tendance centrale à retenir à cause des valeurs extrêmes observées.

Certaines MTS à déclaration obligatoire sont très peu fréquentes. Il s'agit de la lymphogranulomatose vénérienne (un cas dans la région de Québec en 1996 et un cas au Saguenay—Lac-Saint-Jean en 1997), du chancre mou (un cas à Montréal en 1995 ; un cas dans la région de Québec en 1996), du granulome inguinal (aucun cas entre 1995 et 1999) et de l'herpès néonatal (un cas à Montréal en 1996, un cas en Montérégie en 1998 et deux cas en Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine en 1995 et en 1997).

On trouve au tableau 3 le détail de l'origine des déclarations inscrites au fichier sur les MADO. Dans l'ensemble, 10,5 % des cas sont déclarés par les médecins et 89,5 % par les laboratoires.

Tableau 3. Origine de la déclaration des cas de MTS inscrits au fichier MADO, Québec, 1995-1999

Origine de la déclaration		Nombre (pourcentage) de déclarations				
		Année de déclaration				
		1995	1996	1997	1998	1999
Infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i>	Médecin	1 162 (16,4)	891 (13,3)	500 (7,7)	550 (7,6)	497 (6,2)
	Laboratoire	5 912 (83,6)	5 790 (86,7)	5 966 (92,3)	6 714 (92,4)	7 497 (93,8)
Gonorrhée	Médecin	176 (29,0)	124 (25,9)	61 (11,0)	56 (11,4)	43 (6,9)
	Laboratoire	431 (71,0)	355 (74,1)	495 (89,0)	437 (89,6)	581 (93,1)
Hépatite B	Médecin	135 (8,0)	126 (8,1)	101 (6,7)	81 (6,0)	52 (4,0)
	Laboratoire	1 556 (92,0)	1 430 (91,9)	1 407 (93,3)	1 271 (94,0)	1 251 (96,0)
Syphilis	Médecin	75 (93,8)	58 (92,1)	50 (96,2)	44 (83,3)	26 (89,7)
	Laboratoire	5 (6,2)	5 (7,9)	2 (3,8)	7 (16,7)	3 (10,3)

1.1 L'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*

Le tableau 4 présente le type d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* déclarée et le sexe des personnes atteintes au cours des cinq dernières années. Les tableaux et graphiques T2 à T43 décrivent la distribution de ces cas selon l'année, la région sociosanitaire, le sexe et le groupe d'âge.

Tableau 4. Type d'infection par *Chlamydia trachomatis*¹, sexe des patients et type de cas déclarés, Québec, 1995-1999

Nombre de cas déclarés chez les femmes	26 230 (74,1 %)
Nombre de cas déclarés chez les hommes	9 182 (25,9 %)
Nombre de cas génitaux	35 383 (99,7 %)
Nombre de cas oculaires	70 (0,2 %)
Nombre de cas pulmonaires	26 (0,1 %)

1. Un total de 35 479 cas ont été déclarés entre 1995 et 1999.

Le taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* a augmenté au Québec, comme le montre le tableau 5.

Tableau 5. Évolution de l'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* au Québec, 1997-2000

	Observation	Données
1997	La baisse du taux d'incidence (TI) provincial n'est plus que de 4 % par rapport à 1996. Augmentation des TI dans cinq régions.	1994 par rapport à 1993 : -22 % 1995 par rapport à 1994 : -12 % 1996 par rapport à 1995 : - 6 % 1997 par rapport à 1996 : - 4 %
1998	Maintien de l'augmentation dans les cinq régions et nouvelles augmentations dans neuf autres régions.	Le TI provincial passe de 86,7 par 100 000 PA (personne années) en 1997 à 96,7 en 1998 (une augmentation de 12 % : 20 % chez les hommes et 9 % chez les femmes).
1999	Maintien de l'augmentation dans douze régions.	Le TI provincial passe de 96,7 par 100 000 (personne années) en 1998 à 105,7 en 1999 (une augmentation de 9 % : 7 % chez les hommes et 10 % chez les femmes).
2000	Maintien de l'augmentation du nombre de cas déclarés dans onze régions (au 7 octobre 2000).	L'augmentation par rapport à 1999 du nombre de cas dans l'ensemble du Québec est de 6 %. Elle touche à la fois les femmes et les hommes.

Note – Les données de 2000 sont issues d'activités de surveillance continue. Il s'agit ici des banques MADO ouvertes aux corrections et à la validation des cas.

L'augmentation des taux d'incidence touche plusieurs groupes d'âge (voir les tableaux T37 à T40). En nombre absolu, l'excès de cas observé en 1999 vise particulièrement les femmes de 15 à 24 ans ainsi que les hommes de 20 à 24 ans, soit les groupes d'âge les plus atteints. Les pourcentages d'augmentation les plus élevés sont toutefois chez les femmes et les hommes de 40 à 49 ans (61,5 % et 38,8 % respectivement).

1.2 La gonorrhée

On trouve aux tableaux T44 à T87 la distribution des cas déclarés de gonorrhée par année, sexe, âge et région sociosanitaire de résidence. Le tableau 6 qui suit décrit l'évolution entre 1997 et 2000.

Tableau 6. Évolution de la gonorrhée au Québec, 1997-2000

	Observation	Données
1997	Augmentation des taux d'incidence (TI) dans trois régions.	L'augmentation touche presque exclusivement les hommes de Québec, de Montréal et de la Montérégie. Le TI provincial chez les hommes passe de 8,9 en 1996 à 11,2 par 100 000 PA en 1997 (une augmentation de 25 %).
1998	Baisse des TI partout.	Le TI provincial chez les hommes passe de 11,2 en 1997 à 10,1 par 100 000 PA en 1998 (une baisse de 11 %). Le TI provincial chez les femmes passe de 3,7 en 1997 à 2,9 par 100 000 PA en 1998 (une baisse de 20 %).
1999	Augmentation des taux d'incidence (TI) dans sept régions. Certaines de ces augmentations relèvent de petits nombres de cas.	Le TI provincial chez les hommes passe de 10,1 en 1998 à 13 par 100 000 PA en 1999 (une augmentation de 23 %). Le TI provincial chez les femmes passe de 2,9 en 1998 à 3,6 par 100 000 PA en 1999 (une augmentation de 18 %).
2000	Stabilité du nombre total de cas déclarés (au 7 octobre 2000), sauf à Montréal-Centre. Des augmentations sont aussi observées en Mauricie et Centre-du-Québec, en Outaouais, sur la Côte-Nord, à Laval et au Nunavik, mais on parle ici de trop petits nombres de cas (19 ou moins).	L'augmentation par rapport à 1999 observée dans la région de Montréal-Centre touche particulièrement les hommes. À la fin de la période, 10 263 cas masculins y avaient été déclarés comparativement à 227 et 181 à pareille date en 1999 et 1998.

Note - Les données de 2000 sont issues d'activités de surveillance continue. Il s'agit ici des banques MADO ouvertes aux corrections et à la validation des cas.

Par rapport à 1998, nous observons en 1999 des augmentations du taux d'incidence de la gonorrhée parmi certains groupes d'âge (voir les tableaux T79 à T82). L'excès de cas vise particulièrement les femmes de 15 à 19 ans et les hommes de 20 à 29 ans. Les pourcentages d'augmentation sont les plus élevés chez les femmes de 15 à 19 ans et celles de 30 à 34 ans et parmi les hommes de 15 à 19 ans.

Les tableaux T86 et T87 donnent la distribution des cas causés par des souches productrices de pénicillinase (NGPP). C'est le LSPQ qui, depuis 1987, est responsable de la surveillance des cas de gonorrhée causés par des souches résistantes aux antibiotiques. La concordance entre les souches de NGPP reçues au LSPQ et celles qui sont déclarées dans les banques MADO est vérifiée depuis 1991. Une fois l'antibiorésistance confirmée, le personnel du LSPQ vérifie la conformité de la déclaration correspondante. Le LSPQ émet un rapport annuel intitulé « Surveillance des souches de *Neisseria gonorrhoeae* résistantes aux antibiotiques dans la province de Québec ». Le lecteur intéressé à en savoir plus est invité à consulter ce rapport déposé annuellement au LSPQ. Le nombre de cas a continué de baisser en 1999.

Le tableau 7 trace l'évolution de la résistance aux antibiotiques à partir des résultats de laboratoire qui ont été rapportés à même les déclarations faites aux directions régionales de la santé publique.

Tableau 7. Résistance aux antibiotiques rapportée dans les déclarations MADO, Québec, 1995-1999

	1995	1996	1997	1998	1999
Résistance à la pénicilline ou production de pénicillinase,	17	20	12	13	12
Résistance à la tétracycline	12	13	63 ¹	50	44
Résistance à la tétracycline et production de pénicillinase	1	0	0	0	0
Résistance à la pénicilline et à la tétracycline	11	27	37	32	24 ¹
Résistance à la pénicilline et à la tétracycline et production de pénicillinase	19	22	24	12	19
Sensibilité intermédiaire à la pénicilline ou à la tétracycline ⁽²⁾ , ou aux deux	27	19	49	50	86
Total des cas de gonorrhées déclarés	607	479	556	493	624

1. Une de ces déclarations mentionne aussi une résistance à la spectinomycine.

2. De ces 230 déclarations, 176 rapportaient une sensibilité intermédiaire à la pénicilline et à la tétracycline, 39 à la pénicilline seulement et 15 à la tétracycline seulement.

Aux déclarations de résistance qui précèdent s'ajoutent huit déclarations de résistance à la pénicilline avec une sensibilité modérée à la tétracycline et un cas de production de pénicillinase. On remarque aussi l'apparition de la résistance aux quinolones, onze déclarations (une en 1997 et dix en 1999) concernant des cas résistants à la ciprofloxacine, dont 5 montraient aussi des sensibilités intermédiaires ou des résistances à la pénicilline ou à la tétracycline, ou au deux. On compte aussi deux autres cas pour lesquels une sensibilité intermédiaire à la ciprofloxacine a été rapportée.

Le système MADO permet la déclaration de gonorrhées « génito-urinaires », « oculaires » ou « autres ». La grande majorité de ces dernières (221/258 entre 1995 et 1999) sont déclarées chez des hommes. Les tableaux 8 et 9 qui suivent donnent le détail de la distribution de ces cas déclarés chez les hommes.

Tableau 8. Nombre de gonorrhées déclarées chez les hommes selon le site d'infection, Québec, 1995-1999

Site d'infection	Nombre	Pourcentage des cas
Gonorrhée génitale	1 797	88,8
Gonorrhée oculaire	6	0,3
Gonorrhée « autre »	221	10,9
Rectale	115 ¹	
Pharyngée	86 ²	
Articulaire	1	
Site non précisé	19	
Total	2 024	

1. Quatre de ces individus souffraient simultanément d'une infection pharyngée.

2. Deux de ces individus souffraient simultanément d'une infection rectale.

On constate dans le tableau 9 qu'après la hausse observée en 1997, le nombre de cas de gonorrhée pharyngée a diminué pour revenir au nombre déclaré en 1996, tandis que le nombre de cas de gonorrhée rectale s'est stabilisé aux niveaux observés en 1998 et 1997.

La proportion des gonorrhées « autres » touchant des sites d'infection non précisés était de 26,7 % des cas (8/30) en 1995, de 15 % en 1996, de seulement 1,7 % (1/58) en 1997 et de 7 % en 1998. Le site d'infection a été précisé pour tous les cas en 1999.

Tableau 9. Nombre de gonorrhées rectales et pharyngées déclarées chez les hommes et proportion par rapport au nombre total de gonorrhées déclarées, Québec, 1995-1999

	1995	1996	1997	1998	1999
Proportion des gonorrhées déclarées comme étant « autres »	30/431 7,0 %	40/325 12,3 %	59/410 14,2 %	43/373 11,5 %	49/485 10,1 %
Proportion des gonorrhées « autres » déclarées sans que le site ne soit précisé	8/30 26,7 %	6/40 15,0 %	2/59 1,7 %	3/43 7,0 %	0/49 0,0 %
Proportion des gonorrhées déclarées comme étant rectales	11/431 2,6 %	19/325 5,8 %	32/410 7,8 %	26/373 7,0 %	31/485 6,4 %
Proportion des gonorrhées déclarées comme étant pharyngées	12/431 2,8 %	15/325 4,6 %	28/410 6,8 %	15/373 4,0 %	18/485 3,7 %

Parmi les 201 hommes chez qui une gonorrhée rectale ou pharyngée a été déclarée entre 1995 et 1999, 89 (44,6 %) étaient âgés de 20 à 29 ans et 67 (33,7 %) avaient de 30 à 39 ans. Pour 12 des 201 cas (6 %), une souche productrice de pénicillinase a été déclarée au fichier. La majorité des cas (93 %) sont déclarés à Montréal (187/201 cas). Parmi les 14 autres, 9 (4,5 %) ont été déclarés en Montérégie.

1.3 L'hépatite B

Les tableaux T88 à T136 décrivent la distribution selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge des cas d'hépatite B déclarés. Le tableau 10, quant à lui, détaille le type de validation des cas déclarés. Depuis 1995, la proportion des cas caractérisés en épisodes chroniques et aigus et validés sur la base de signes cliniques (sans résultats de laboratoire à l'appui) a augmenté en 1996, est demeurée stable en 1997 et a augmenté en 1998 et en 1999.

Tableau 10. Type de validation des cas d'hépatite B déclarés, Québec, 1995-1999

	1995	1996	1997	1998	1999
Nombre de cas déclarés	1 691	1 556	1 508	1 352	1 303
Nombre de cas déclarés sur la base de signes « cliniques »	599	607	585	562	619
Nombre de cas déclarés dont le type de validation est connu	1 556	1 377	1 333	1 192	1 149
Pourcentages des cas dont le type de validation est « cliniques » parmi ceux dont le type de validation est connu	38,5	44,1	43,9	47,1	53,9

1.4 La syphilis

Les infections syphilitiques peuvent, au Québec, être déclarées selon neuf catégories différentes. Les signes cliniques de ces infections étant très complexes, il y a un risque d'erreur de classification des cas déclarés. Ces erreurs sont rarement corrigées puisque aucun effort systématique de validation des cas enregistrés n'est fait. Elles ont un effet important, puisque les nombres de cas déclarés sont relativement petits. Il est donc difficile d'interpréter les tendances observées.

Nous avons catégorisé les cas de syphilis déclarés en cas « récents » ou « anciens », selon les définitions suivantes :

- cas récents : infections primaires, secondaires et latentes d'un an ou moins ;
- cas anciens : infections asymptomatiques : latentes de plus d'un an et neurologiques ; infections devenues symptomatiques : symptomatiques tardives, neurologiques et cardiovasculaires.

Les tableaux 11 et 12 présentent les cas de syphilis selon le sexe et le stade de la maladie. Le nombre de cas déclarés de syphilis ancienne devenue symptomatique est relativement peu élevé. Le nombre de cas déclarés sans que le stade de la maladie ne soit précisé est plus grand, avec 31 cas entre 1994 et 1998. La distribution des cas d'infection récente déclarés est présentée aux tableaux T137 à T142, tandis que celle des syphilis anciennes l'est au tableau T142. On remarquera que le nombre annuel de cas d'infections récentes est passé sous la barre des dix cas en 1997, et qu'il n'était que de trois en 1998 et de quatre en 1999. Le 7 octobre 2000, aucun cas n'avait encore été déclaré.

Tableau 11. Nombre de cas déclarés d'infection syphilitique « ancienne » devenue symptomatique selon le type de syphilis et le sexe, Québec, 1995-1999

Type de syphilis	Sexe inconnu	Hommes	Femmes	Total
Cardiovasculaire	0	1	1	2
Neurologique symptomatique	0	10	2	12
Symptomatique tardive	0	1	1	2
Total	0	12	4	16

Tableau 12. Nombre de cas déclarés d'infection syphilitique « récente ¹ » et « ancienne » asymptomatique selon le type de syphilis et le sexe, Québec, 1995-1999

Type de syphilis	Nombre de cas sexe non précisé	Femmes		Hommes		Nombre total de cas
		Nombre de cas	Âge médian	Nombre de cas	Âge médian	
Primaire	0	4 ²	36	11 ³	44	15
Secondaire	0	3	22	9	37	12
Latente (un an ou moins)	0	6	30,5	6	38	12
Latente (> un an)	0	96 ⁴	54	87 ⁵	44	183
Neurologique asymptomatique	0	3	75	10	45,5	13
Total	0	112		123		235

1. Aucun cas congénital.

2. Un cas chez les 20 à 24 ans, deux chez les 35 à 39 ans et un cas chez les 60 ans ou plus.

3. Cinq cas chez les 15 à 39 ans, quatre cas chez les 40-49 ans et deux cas chez les 50 ans ou plus.

4. Dont 15 % des cas chez les 40 à 59 ans et 45 % des cas chez les 60 ans ou plus.

5. Dont 38 % des cas chez les 40 à 59 ans et 31 % des cas chez les 60 ans ou plus.

1.5 Les grossesses ectopiques

Nous avons cette année mis à jour les données sur les grossesses ectopiques, exercice qui n'avait pas été fait l'an dernier. Au moment de la préparation de notre rapport, il était possible de se procurer toutes les données nécessaires jusqu'en 1997.

On constate dans le graphique T143 et les tableaux T144 à T147 que la tendance générale des taux d'incidence est à la baisse, malgré les fluctuations observées chez les femmes âgées de 15 à 19 ans et celles de 40 à 44 ans (chez qui le nombre annuel de cas est relativement petit). La baisse observée est somme toute mineure, le taux d'incidence global étant passé de 12,2 par 1 000 grossesses en 1987 à 11,2 en 1997, une baisse de 8,2 %.

PARTIE

2

DISCUSSION



2 Discussion

2.1 Les limites du système MADO

Au 31 décembre 1999, un total de 121 143 cas d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis avaient été déclarés depuis 1990 dans le système des maladies à déclaration obligatoire. Ce système de surveillance passif a néanmoins ses limites. Chaque année, nous soulignons au lecteur que l'interprétation des tendances qu'on dégage du système MADO doit tenir compte de plusieurs facteurs, dont :

- la disponibilité régionale des nouveaux tests diagnostiques ;
- les activités régionales de prévention et de promotion de la santé ;
- l'évolution des pratiques médicales ;
- l'application des définitions nosologiques ;
- les changements de procédures de saisie, de validation et de nettoyage des données.

La vérification systématique de la validité des cas déclarés et l'évaluation de la sous-déclaration permettraient de mesurer l'ampleur de certains de ces biais potentiels.

Les données d'incidence issues du système MADO n'indiquent pas le rythme réel de la propagation des pathogènes surveillés. L'analyse des données recueillies dans le cadre du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles nous indique en effet qu'entre 1995 et 1999, il y avait chez les femmes et les hommes, respectivement, 2,3 et 4,5 fois plus de cas traités pour un syndrome compatible avec une MTS ou pour une MTS que de cas déclarés dans les banques MADO (M^{me} Céline Poulin, communication personnelle).

Les données de la banque du programme de gratuité des médicaments ont toutefois leurs propres limites. Il s'agit d'une banque de données administratives dans laquelle le diagnostic n'est pas mentionné. De plus, les observations tirées de cette source ne sont représentatives que des personnes qui ont décidé de profiter de ce programme et non de toutes les personnes infectées. Elle nous permet toutefois de confirmer que les taux observés à partir des banques MADO sont d'importantes sous-estimations des taux d'incidence réels.

Comme l'an dernier, nous insistons sur l'évolution récente de l'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* et de la gonorrhée au Québec. En effet, les taux d'incidence des hépatites B continuent de baisser et les programmes de vaccination de la population générale, mais aussi de groupes vulnérables, devraient soutenir cette baisse dans les

années à venir. La transmission de la syphilis est quant à elle demeurée aussi faible qu'en 1998, puisque seulement quatre cas d'infection récente ont été rapportés en 1999.

2.2 Les infections génitales par *Chlamydia trachomatis*

L'augmentation des taux d'incidence de l'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* se poursuit au Québec en 1999 et se maintient pour l'instant en 2000. Cette augmentation est également observée dans l'ensemble du Canada où le nombre de cas déclarés entre janvier et juin 2000 excède de 4 % celui des six premiers mois de 1999¹.

On notait dans un rapport antérieur que la baisse moins marquée observée chez les hommes reflétait probablement mieux l'évolution de la maladie dans la population générale. Le début des activités de surveillance de cette maladie en 1988 s'est fait de concert avec plusieurs activités de dépistage devenues plus accessibles. Cela a mené à la détection initiale d'un mélange de cas incidents, mais aussi prévalents chez les femmes. Celles-ci ont souvent des infections silencieuses qui ne sont détectées qu'au moment de visites médicales faites pour d'autres raisons. Le bassin de ces cas, infectés depuis quelques années, a rapidement diminué à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Cela pouvait expliquer que le rythme de la baisse des taux diminuait à cette époque. Les taux augmentent toutefois depuis 1997.

Nous rencontrons cette année la même difficulté que l'an dernier puisqu'il nous est impossible de savoir s'il faut attribuer les augmentations observées à une réelle accélération de l'épidémie ou plutôt à une meilleure détection des cas grâce à l'implantation des techniques d'amplification génique dans le diagnostic de l'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*. Comme le soulignent Dicker et autres², ces nouvelles techniques se répercutent en effet sur le taux de positivité des résultats de tests de détection, ce qui peut provoquer une augmentation artéfactuelle des taux d'incidence observés. De plus, l'utilisation de tests plus fiables peut modifier les pratiques médicales comme le dépistage et la demande de confirmation d'un diagnostic clinique par un test de laboratoire.

La connaissance du taux de positivité des tests de détection de l'infection par *Chlamydia trachomatis* et par *Neisseria gonorrhoeae* nous permettrait de mieux interpréter les tendances observées. Malheureusement, un projet-pilote visant à déterminer la faisabilité d'une telle surveillance a conclu à la trop grande lourdeur du support informatique que nécessiterait l'exploitation des plateformes informatiques administratives actuellement en place dans les hôpitaux québécois. Les autorités du ministère de la Santé et des Services sociaux envisagent actuellement d'autres solutions pour régler ce problème.

1. www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/bid/dsd/ndmr/pdf/06-2000f.pdf

2. L. W. Dicker et autres, « Impact of switching laboratory tests on reported trends in *Chlamydia trachomatis* infections », *American Journal of Epidemiology*, 2000, n° 151, p. 430-435.

2.3 Les gonorrhées

Après avoir chuté fortement entre 1985 et 1989, le taux d'incidence de la gonorrhée a semblé atteindre une valeur plancher au milieu des années 1990.

Nous émettions l'an dernier l'hypothèse que l'augmentation des taux d'incidence de la gonorrhée observée chez les hommes en 1997 ne soit qu'une fluctuation autour d'un taux par ailleurs stable. Depuis ce temps, les taux d'incidence ont baissé en 1998 pour ensuite augmenter à nouveau en 1999, autant chez les femmes que chez les hommes, tandis que les données préliminaires pour 2000 nous indiquent une stabilisation du nombre de cas qui sont déclarés au même rythme qu' en 1999. Seule exception notable à ce tableau, la région de Montréal-Centre avait déclaré un nombre plus élevé de cas déclarés chez les hommes au 7 octobre 2000 qu'à pareille date en 1999.

L'intensification des activités de surveillance de la gonorrhée au Québec devrait bientôt permettre de mieux comprendre l'épidémiologie de cette MTS. En effet, le Bureau de surveillance épidémiologique est à implanter, en collaboration avec le Centre québécois de coordination sur le sida, un système qui permettra l'analyse des enquêtes épidémiologiques qui seront désormais faites après la déclaration des cas de gonorrhée.

Conclusion

Le taux d'incidence de l'hépatite B aiguë continue de baisser au Québec, ce qui devrait se poursuivre dans les années à venir après la mise en place du programme de vaccination des enfants de quatrième année en 1994-1995. La transmission indigène de la syphilis est pratiquement réduite à zéro, seulement quatre cas ayant été déclarés en 1999 et aucun en 2000, au 7 octobre dernier.

Le taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée continue de fluctuer. Même si l'augmentation observée en 1999 était de l'ordre de 26 %, la hausse ne s'est pas maintenue en 2000. L'augmentation des taux d'incidence des cas d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* demeure toutefois préoccupante. L'augmentation enregistrée en 1998 s'est maintenue en 1999 et se poursuit toujours en 2000. Divers scénarios sont actuellement à l'étude afin de vérifier la possibilité d'implanter un système de surveillance des taux de positivité aux épreuves de laboratoires faites dans le cadre du dépistage de cette infection. Cela nous permettrait de vérifier si les augmentations résultent de l'implantation des nouvelles techniques de dépistage plus performantes et, donc, d'une meilleure détection des cas plutôt que d'une réelle accélération dans la vitesse de transmission de l'infection.

TABLEAUX ET GRAPHIQUES



Mesures des tendances centrales de l'âge des cas déclarés par sexe et type de maladie, Québec (1999)

Infection génitale par <i>Chlamydia trachomatis</i>									
			Gonorrhée	Hépatite B (1)	Hépatite B aiguë	Hépatite B chronique	Syphilis récente (2)	Syphilis ancienne (3)	Total des cas
Femmes									
Nombre de cas (4)		5 780	136	504	51	407	2	5	6 429
Age (années)									
	médian	20	20	35	34	35		66	21
	moyen	21,9	22,0	36,4	34,1	37,1		58,6	23,0
	écart-type	6,0	8,7	15,6	16,2	15,4		26	8,4
	étendue totale	<1-98	13-87	<1-96	<1-74	<1-96		28-90	<1-98
	étendue 1er-99e percentile	14-44	14-42	<1-77	<1-74	1-79		28-90	14-57
Hommes									
Nombre de cas (4)		2 125	482	790	112	556	2	13	3 417
Age (années)									
	médian	24	30,5	40	40	40		57	27
	moyen	26,0	32,1	40,4	39,0	40,7		56,2	30,3
	écart-type	7,7	9,6	14,4	14,4	14,7		19,3	11,8
	étendue totale	<1-66	16-60	<1-90	<1-80	<1-90		21-85	<1-90
	étendue 1er-99e percentile	18-50	15-72	3-76	<1-72	5-76		21-85	14-67
Valeurs-p									
vs moyennes (5)		0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0516	0,0002		0,8548	0,0001
vs médianes (6)		0,0001	0,0001	0,0001	0,0291	0,0001		0,657	0,0001

(1): Total des cas

(2): Syphilis primaire, secondaire et latente de moins d'un an. Les deux hommes infectés avaient 37 et 46 ans et les deux femmes, 36 et 71 ans.

(3): Syphilis latente de plus d'un an et cérébrale asymptomatique.

(4): Nombre de cas pour lesquels les données étaient disponibles pour les calculs.


(5): Test de Student comparant la moyenne d'âge des cas déclarés chez les femmes à celle des cas déclarés chez les hommes.

(6): Test de Wilcoxon comparant la médiane d'âge des cas déclarés chez les femmes à celle des cas déclarés chez les hommes.

INFECTION GÉNITALE PAR CHLAMYDIA TRACHOMATIS



Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe , Québec (1990-1999)




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	11635	3742	40	15417
1991	9822	3459	37	13318
1992	8547	3112	31	11690
1993	7364	2645	5	10014
1994	5840	2074	11	7925

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	5295	1768	11	7074
1996	5018	1654	9	6681
1997	4817	1635	14	6466
1998	5269	1981	14	7264
1999	5831	2144	19	7994

**Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale
par *Chlamydia trachomatis* Québec (1991-1999)**




Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence *

	Femmes	Hommes	Total
1991	-15,6	-7,6	-13,6
1992	-13,0	-10,0	-12,2
1993	-13,8	-15,0	-14,3
1994	-24,4	-26,2	-25,0
1995	-10,1	-15,5	-11,5
1996	-6,0	-7,2	-6,3
1997	-4,7	-1,9	-4,0
1998	8,6	20,2	11,5
1999	9,9	7,4	9,3

*: (taux année courante)-(taux année antérieure)/(taux année antérieure) * 100

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région du Bas-St-Laurent




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	246	97	2	345
1991	273	136	2	411
1992	217	118	2	337
1993	194	104	0	298
1994	139	79	0	218

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	131	74	0	205
1996	98	66	0	164
1997	118	64	0	182
1998	144	101	0	245
1999	95	51	0	146

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région du Saguenay/Lac St-Jean





Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	458	181	2	641
1991	490	149	17	656
1992	436	165	21	622
1993	413	126	2	541
1994	304	109	3	416

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	280	90	3	373
1996	277	83	5	365
1997	195	72	5	272
1998	206	72	3	281
1999	244	84	0	328

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région de Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	1046	418	3	1467
1991	1021	368	1	1390
1992	721	279	1	1001
1993	663	242	0	905
1994	548	201	0	749

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	416	148	0	564
1996	413	159	0	572
1997	472	177	0	649
1998	534	211	0	745
1999	593	223	0	816

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région de la Mauricie/Centre du Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	583	195	0	778
1991	548	204	0	752
1992	491	195	0	686
1993	408	139	0	547
1994	354	144	0	498

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	272	126	0	398
1996	318	95	0	413
1997	254	90	0	344
1998	318	140	2	460
1999	290	105	6	401

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région de l'Estrie





Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	462	206	0	668
1991	467	185	0	652
1992	464	142	0	606
1993	301	107	0	408
1994	216	83	0	299

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	239	73	0	312
1996	235	70	0	305
1997	202	76	0	278
1998	198	98	1	297
1999	230	97	0	327

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région de Montréal centre




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	3590	938	18	4546
1991	2252	873	14	3139
1992	1965	725	2	2692
1993	1642	649	2	2293
1994	1341	464	5	1810

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	1336	441	7	1784
1996	1267	447	4	1718
1997	1344	483	8	1835
1998	1502	576	7	2085
1999	1771	708	12	2491

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région de l'Outaouais




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	600	153	0	753
1991	509	103	0	612
1992	394	110	0	504
1993	414	101	0	515
1994	310	68	0	378

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	270	60	0	330
1996	228	50	0	278
1997	187	50	0	237
1998	223	59	0	282
1999	278	72	0	350

Taux d'incidence des cas déclarés de d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région de l'Abitibi/Témiscamingue




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	501	155	1	657
1991	467	155	0	622
1992	352	111	0	463
1993	341	119	0	460
1994	266	96	0	362

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	208	85	0	293
1996	210	76	0	286
1997	173	48	0	221
1998	147	49	0	196
1999	127	46	0	173

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région de la Côte-Nord




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	397	157	0	554
1991	358	130	0	488
1992	297	110	0	407
1993	260	103	0	363
1994	226	74	0	300

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	225	65	0	290
1996	197	64	0	261
1997	146	68	0	214
1998	173	55	0	228
1999	206	62	0	268

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région Nord-du-Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	52	24	0	76
1991	52	34	0	86
1992	57	20	0	77
1993	48	16	0	64
1994	25	17	0	42

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	28	6	0	34
1996	15	8	0	23
1997	10	3	0	13
1998	12	1	0	13
1999	15	7	0	22

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région de la Gaspésie/Iles de la Madeleine




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	194	48	0	242
1991	178	38	2	218
1992	150	59	0	209
1993	132	63	1	196
1994	79	29	1	109

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	62	18	0	80
1996	60	10	0	70
1997	42	14	0	56
1998	22	9	0	31
1999	20	3	0	23

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région Chaudière/Appalaches




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	389	143	1	533
1991	333	108	1	442
1992	261	94	0	355
1993	220	89	0	309
1994	165	66	0	231

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	116	47	0	163
1996	160	59	0	219
1997	145	69	0	214
1998	172	60	0	232
1999	161	66	0	227

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région de Laval




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	472	211	6	689
1991	375	191	0	566
1992	356	205	0	561
1993	311	162	0	473
1994	199	82	2	283

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	165	72	1	238
1996	132	50	0	182
1997	187	47	0	234
1998	200	84	0	284
1999	212	88	0	300

**Taux d'incidence des cas déclarés de d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région de Lanaudière**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	374	116	1	491
1991	359	137	0	496
1992	342	119	0	461
1993	263	95	0	358
1994	236	89	0	325

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	169	60	0	229
1996	176	63	0	239
1997	221	52	0	273
1998	189	66	0	255
1999	295	107	0	402

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région des Laurentides




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	650	206	0	856
1991	605	184	0	789
1992	493	168	0	661
1993	492	161	0	653
1994	356	139	0	495

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	332	110	0	442
1996	298	86	0	384
1997	273	63	0	336
1998	299	97	0	396
1999	301	100	0	401

Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région de la Montérégie




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	1290	435	5	1730
1991	1161	394	0	1555
1992	1183	416	2	1601
1993	924	300	0	1224
1994	759	282	0	1041

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	738	235	0	973
1996	590	196	0	786
1997	588	183	1	772
1998	651	217	1	869
1999	726	242	1	969

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région Nunavik**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	222	49	1	272
1991	273	62	0	335
1992	283	64	3	350
1993	253	67	0	320
1994	218	49	0	267

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	205	50	0	255
1996	261	65	0	326
1997	193	66	0	259
1998	158	72	0	230
1999	189	77	0	266

**Taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par sexe (1990-1999)
Région Terres Cries/Bale-James**




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	109	10	0	119
1991	101	8	0	109
1992	85	12	0	97
1993	85	2	0	87
1994	99	3	0	102

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	103	8	0	111
1996	83	7	0	90
1997	67	10	0	77
1998	121	14	0	135
1999	78	6	0	84

Evolution par sexe des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*, Québec (1988-1999)



Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région socio-santitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)

Région socio-santitaire	Femmes			Hommes		Manquant	Total
Bas St-Laurent	1995	131	74	0	205		
	1996	98	66	0	164		
	1997	118	64	0	182		
	1998	144	101	0	245		
	1999	95	51	0	146		
Saguenay/ Lac St-Jean	1995	280	90	3	373		
	1996	277	83	5	365		
	1997	195	72	5	272		
	1998	206	72	3	281		
Québec	1999	244	84	0	328		
	1995	416	148	0	564		
	1996	413	159	0	572		
	1997	472	177	0	649		
Mauricie/ Centre du Québec	1998	534	211	0	745		
	1999	593	223	0	816		
	1995	272	126	0	398		
	1996	318	95	0	413		
	1997	254	90	0	344		
Estrie	1998	318	140	2	460		
	1999	290	105	6	401		
	1995	239	73	0	312		
	1996	235	70	0	305		
Montréal centre	1997	202	76	0	278		
	1998	198	98	1	297		
	1999	230	97	0	327		
	1995	1336	441	7	1784		
	1996	1267	447	4	1718		
Outaouais	1997	1344	483	8	1835		
	1998	1502	576	7	2085		
	1999	1771	708	12	2491		
	1995	270	60	0	330		
Abitibi/ Témiscamingue	1996	228	50	0	278		
	1997	187	50	0	237		
	1998	223	59	0	282		
	1999	278	72	0	350		
	1995	208	85	0	293		
Côte-Nord	1996	210	76	0	286		
	1997	173	48	0	221		
	1998	147	49	0	196		
	1999	127	46	0	173		
Nord-du- Québec	1995	225	65	0	290		
	1996	197	64	0	261		
	1997	146	68	0	214		
	1998	173	55	0	228		
	1999	206	62	0	268		
Nord-du- Québec	1995	28	6	0	34		
	1996	15	8	0	23		
	1997	10	3	0	13		
	1998	12	1	0	13		
Nord-du- Québec	1999	15	7	0	22		

Région socio-santitaire	Femmes			Hommes			Manquant	Total
Gaspésie/ Îles de la madeleine	1995	62	18	0	80			
	1996	60	10	0	70			
	1997	42	14	0	56			
	1998	22	9	0	31			
	1999	20	3	0	23			
Chaudière/ Appalaches	1995	116	47	0	163			
	1996	160	59	0	219			
	1997	145	69	0	214			
	1998	172	60	0	232			
	1999	161	66	0	227			
Laval	1995	165	72	1	238			
	1996	132	50	0	182			
	1997	187	47	0	234			
	1998	200	84	0	284			
	1999	212	88	0	300			
Lanaudière	1995	169	60	0	229			
	1996	176	63	0	239			
	1997	221	52	0	273			
	1998	189	66	0	255			
	1999	295	107	0	402			
Laurentides	1995	332	110	0	442			
	1996	298	86	0	384			
	1997	273	63	0	336			
	1998	299	97	0	396			
	1999	301	100	0	401			
Montérégie	1995	738	235	0	973			
	1996	590	196	0	786			
	1997	588	183	1	772			
	1998	651	217	1	869			
	1999	726	242	1	969			
Nunavik	1995	205	50	0	255			
	1996	261	65	0	326			
	1997	193	66	0	259			
	1998	158	72	0	230			
	1999	189	77	0	266			
Terres Cries/ Baie-James	1995	103	8	0	111			
	1996	83	7	0	90			
	1997	67	10	0	77			
	1998	121	14	0	135			
	1999	78	6	0	84			
Province de Québec	1995	5295	1768	11	7074			
	1996	5018	1654	9	6681			
	1997	4817	1635	14	6466			
	1998	5269	1981	14	7264			
	1999	5831	2144	19	7994			

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région socio-santaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)

Région socio-santaire	Femmes			Hommes			Total					
Bas St-Laurent	1995	125,5	73,0	0,0	99,7	Région socio-santaire Gaspésie/ Îles de la madeleine	1995	118,5	34,2	0,0	76,2	
	1996	94,4	65,6	0,0	80,2		1996	115,6	19,2	0,0	67,3	
	1997	114,2	64,1	0,0	89,6		1997	81,6	27,1	0,0	54,3	
	1998	140,1	101,9	0,0	121,4		1998	43,1	17,6	0,0	30,3	
	1999	92,9	51,9	0,0	72,8		1999	39,5	5,9	0,0	22,7	
Saguenay/ Lac St-Jean	1995	192,8	62,0	1,0	128,4		Chaudière/ Appalaches	1995	60,4	24,4	0,0	42,4
	1996	191,4	57,4	1,7	126,1			1996	83,1	30,6	0,0	56,8
	1997	135,2	50,0	1,7	94,4			1997	75,1	35,6	0,0	55,3
	1998	143,4	50,2	1,0	97,9			1998	88,8	30,9	0,0	59,8
	1999	170,6	58,8	0,0	114,8			1999	83,0	33,9	0,0	58,4
Québec	1995	125,4	47,3	0,0	87,5		Laval	1995	95,4	42,5	0,3	69,5
	1996	123,9	50,6	0,0	88,4			1996	75,3	29,1	0,0	52,4
	1997	141,1	56,2	0,0	99,9			1997	105,3	27,0	0,0	66,6
	1998	159,0	66,7	0,0	114,2			1998	111,3	47,7	0,0	79,8
	1999	175,9	70,3	0,0	124,7			1999	116,6	49,5	0,0	83,4
Mauricie/ Centre du Québec	1995	110,5	52,5	0,0	81,8		Lanaudière	1995	89,8	31,3	0,0	60,3
	1996	128,7	39,4	0,0	84,6			1996	91,6	32,1	0,0	61,6
	1997	102,5	37,2	0,0	70,2			1997	112,8	26,0	0,0	68,9
	1998	128,0	57,6	0,4	93,6			1998	94,7	32,3	0,0	63,2
	1999	116,5	43,1	1,2	81,4			1999	145,2	51,4	0,0	97,8
Estrie	1995	167,5	52,8	0,0	111,0		Laurentides	1995	152,7	50,2	0,0	101,3
	1996	163,9	50,4	0,0	108,0			1996	133,9	38,3	0,0	85,9
	1997	140,2	54,5	0,0	98,0			1997	119,9	27,4	0,0	73,4
	1998	136,8	69,9	0,4	104,3			1998	128,5	41,3	0,0	84,7
	1999	158,2	68,9	0,0	114,3			1999	126,7	41,7	0,0	84,0
Montréal centre	1995	139,5	49,7	0,4	96,7		Montréal	1995	111,0	35,7	0,0	73,6
	1996	131,9	50,2	0,2	92,8			1996	87,4	29,4	0,0	58,5
	1997	139,5	54,0	0,4	98,8			1997	85,8	27,0	0,1	56,7
	1998	155,4	64,2	0,4	111,9			1998	93,7	31,6	0,1	62,9
	1999	182,7	78,6	0,6	133,2			1999	103,2	34,8	0,1	69,2
Outaouais	1995	171,8	38,6	0,0	105,5		Nunavik	1995	4517,4	1087,0	0,0	2790,5
	1996	142,6	31,6	0,0	87,4			1996	5532,0	1376,0	0,0	3452,7
	1997	115,0	31,1	0,0	73,3			1997	3946,0	1362,8	0,0	2660,8
	1998	134,9	36,2	0,0	85,9			1998	3130,6	1451,9	0,0	2298,6
	1999	165,6	43,5	0,0	104,9			1999	3637,4	1521,4	0,0	2593,4
Abitibi/ Témiscamingue	1995	269,1	105,0	0,0	185,2		Terres Cries/ Baie-James	1995	2538,2	181,0	0,0	1309,4
	1996	271,0	93,6	0,0	180,2			1996	2068,8	159,2	0,0	1070,2
	1997	222,9	58,9	0,0	138,9			1997	1684,7	228,5	0,0	921,7
	1998	189,0	59,9	0,0	122,9			1998	3078,9	321,5	0,0	1629,6
	1999	163,0	56,1	0,0	108,2			1999	2004,1	138,6	0,0	1021,6
Côte-Nord	1995	442,4	120,4	0,0	276,6		Province de Québec	1995	142,4	48,9	0,1	96,4
	1996	388,7	118,9	0,0	249,7			1996	133,8	45,3	0,1	90,3
	1997	289,2	126,7	0,0	205,5			1997	127,5	44,5	0,2	86,7
	1998	344,0	102,9	0,0	219,8			1998	138,5	53,5	0,2	96,7
	1999	411,4	116,5	0,0	259,4			1999	152,2	57,5	0,3	105,7
Nord-du-Québec	1995	289,6	56,7	0,0	167,9							
	1996	155,9	76,0	0,0	114,2							
	1997	104,5	28,6	0,0	64,9							
	1998	125,9	9,6	0,0	65,1							
	1999	158,1	67,4	0,0	110,7							

Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-51999)

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995 0	0	76	85	28	6	5	4	0	0	1	205
	1996 1	1	54	63	18	12	5	3	3	0	4	164
	1997 0	2	58	83	23	12	2	2	0	0	0	182
	1998 2	0	85	104	28	14	5	7	0	0	0	245
	1999 1	0	50	58	17	10	3	4	0	0	3	146
Saguenay/Lac St-Jean	1995 1	3	133	142	39	25	5	7	2	1	15	373
	1996 1	6	160	121	34	16	8	6	2	0	11	365
	1997 1	0	88	106	39	11	11	5	0	0	11	272
	1998 0	2	88	103	35	25	9	4	2	2	11	281
	1999 0	1	80	143	61	21	61	6	2	0	3	328
Québec	1995 0	4	155	231	94	40	15	13	2	1	9	564
	1996 2	5	154	258	73	38	11	20	6	2	3	572
	1997 1	5	189	269	84	54	18	20	3	4	2	649
	1998 0	5	224	278	120	58	36	15	4	2	3	745
	1999 3	6	235	336	124	54	22	25	6	3	2	816
Mauricie/Centre du Québec	1995 0	4	131	149	44	35	16	17	1	1	0	398
	1996 1	6	136	138	61	28	18	18	3	2	2	413
	1997 1	3	123	130	50	15	11	3	0	1	7	344
	1998 0	5	123	203	72	29	11	8	1	0	8	460
	1999 2	1	117	174	57	15	12	12	3	0	8	401
Estrie	1995 0	1	110	119	41	15	8	8	4	2	4	312
	1996 2	1	90	120	45	20	11	14	2	0	0	305
	1997 1	1	96	106	42	11	17	3	1	0	0	278
	1998 0	1	91	125	42	18	15	5	0	0	0	297
	1999 1	0	96	144	41	19	13	10	3	0	0	327
Montréal centre	1995 6	24	534	629	271	157	60	44	10	2	47	1784
	1996 5	14	469	607	285	155	64	47	12	2	58	1718
	1997 4	20	538	623	295	139	71	57	11	4	73	1835
	1998 1	18	624	762	332	154	82	35	15	2	60	2085
	1999 6	18	719	915	383	203	112	72	13	2	48	2491
Outaouais	1995 1	20	96	125	46	25	20	12	2	0	2	330
	1996 2	3	95	96	43	16	7	6	0	0	10	278
	1997 0	3	70	90	39	14	11	4	1	0	5	237
	1998 2	4	81	97	52	17	10	7	7	0	5	282
	1999 0	2	137	114	60	21	8	5	0	0	3	350
Abitibi/Témiscamingue	1995 3	4	115	78	47	23	9	11	2	1	0	293
	1996 2	1	111	103	25	28	8	5	2	1	0	286
	1997 0	6	100	62	31	11	7	3	1	0	0	221
	1998 0	2	94	60	23	15	1	1	0	0	0	196
	1999 0	4	72	53	22	12	3	3	3	0	1	173
Côte-Nord	1995 4	5	113	83	55	20	6	3	0	1	0	290
	1996 0	5	94	91	33	26	9	2	0	0	1	261
	1997 2	6	79	72	27	14	9	2	1	0	2	214
	1998 1	8	75	76	39	18	6	3	0	1	1	228
	1999 0	7	111	82	32	23	7	6	0	0	0	268
Nord-du Québec	1995 0	0	21	7	0	2	2	1	0	0	1	34
	1996 0	0	6	10	3	3	0	0	1	0	0	23
	1997 0	0	8	1	2	1	1	0	0	0	0	13
	1998 0	0	7	3	0	1	1	1	0	0	0	13
	1999 0	0	7	9	3	0	2	1	0	0	0	22

Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région socio-santitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1995-1999) suite

Région socio-santitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995 0	1	21	28	8	12	6	0	1	1	2	80
	1996 0	1	22	30	5	8	2	1	0	0	1	70
	1997 1	1	19	12	10	3	3	5	0	0	2	56
	1998 0	0	8	9	7	3	1	2	1	0	0	31
	1999 0	1	6	9	4	2	0	1	0	0	0	23
Chaudière/	1995 1	0	44	62	34	11	5	3	2	0	1	163
Appalaches	1996 0	1	67	80	33	21	12	3	0	1	1	219
	1997 0	0	71	73	33	17	12	2	1	0	5	214
	1998 1	2	62	95	35	22	5	5	1	0	4	232
	1999 0	0	70	102	28	9	7	8	1	0	2	227
Laval	1995 3	2	85	86	36	16	4	4	1	0	1	238
	1996 0	2	71	64	20	10	8	5	1	1	0	182
	1997 1	4	99	79	28	9	5	6	2	0	1	234
	1998 0	5	94	105	41	18	11	4	2	3	1	284
	1999 0	6	112	104	35	21	8	11	3	0	0	300
Lanaudière	1995 1	8	81	70	31	12	9	13	2	0	2	229
	1996 0	2	101	83	26	10	10	6	0	0	1	239
	1997 2	1	108	91	23	21	8	9	0	0	10	273
	1998 0	10	101	85	32	11	10	4	1	0	1	255
	1999 0	5	152	144	59	23	9	6	2	0	2	402
Laurentides	1995 2	6	143	156	77	23	26	7	2	0	0	442
	1996 1	6	132	136	47	21	22	5	13	1	0	384
	1997 0	4	120	108	64	13	18	6	3	0	0	336
	1998 0	3	135	144	57	18	23	12	3	1	0	396
	1999 0	7	172	136	53	19	7	6	0	1	0	401
Montréal	1995 2	14	360	356	125	59	22	22	5	2	6	973
	1996 1	9	277	280	110	46	18	31	5	0	9	786
	1997 0	8	288	279	98	45	20	19	10	1	4	772
	1998 0	9	339	329	111	42	20	14	3	1	1	869
	1999 1	11	362	365	128	53	26	18	2	1	2	969
Nunavik	1995 1	2	64	80	53	35	11	5	1	2	1	255
	1996 1	5	90	89	68	42	16	10	4	1	0	326
	1997 0	7	61	77	45	43	15	8	2	1	0	259
	1998 2	8	49	57	43	36	26	7	0	0	2	230
	1999 1	6	67	78	41	32	25	8	5	1	2	266
Terres Cries/ Bate James	1995 0	3	40	43	19	3	0	1	0	0	2	111
	1996 0	4	30	35	13	5	0	1	1	0	1	90
	1997 0	0	29	26	17	3	2	0	0	0	0	77
	1998 0	1	45	45	27	9	1	3	2	0	2	135
	1999 0	1	27	29	18	5	3	1	0	0	0	84
Province de Québec	1995 25	82	2322	2529	1048	519	229	175	37	14	94	7074
	1996 19	72	2159	2404	942	505	229	183	55	11	102	6681
	1997 14	71	2144	2287	950	436	241	154	36	11	122	6466
	1998 9	83	2325	2680	1096	508	273	137	42	12	99	7264
	1999 15	76	2592	2995	1166	542	278	203	43	8	76	7994

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1995 0,0	0,0	482,0	706,3	249,3	37,7	27,1	12,0	0,0	0,0	0,5	99,7
	1996 9,1	3,7	341,3	519,9	166,6	81,1	27,4	8,9	13,4	0,0	2,0	80,2
	1997 0,0	7,7	371,0	678,4	217,9	87,2	11,4	5,8	0,0	0,0	0,0	89,6
	1998 19,9	0,0	561,4	829,9	268,5	111,1	29,4	20,0	0,0	0,0	0,0	121,4
	1999 10,3	0,0	340,5	455,9	164,6	85,7	18,4	11,4	0,0	0,0	1,5	72,8
Saguenay/Lac St-Jean	1995 5,6	7,1	536,1	771,9	224,7	100,2	18,1	15,5	6,7	2,4	5,2	128,4
	1996 5,8	14,7	643,7	636,7	203,2	68,6	29,1	13,1	6,5	0,0	3,8	126,1
	1997 6,0	0,0	358,8	536,3	237,0	51,0	41,0	10,6	0,0	0,0	3,8	94,4
	1998 0,0	5,2	367,6	504,8	212,8	127,0	34,5	8,3	6,0	4,5	3,8	97,9
	1999 0,0	2,7	345,8	679,3	367,6	115,2	44,0	12,2	5,8	0,0	1,0	114,8
Québec	1995 0,0	5,5	364,1	516,8	197,3	71,4	25,7	12,3	2,8	0,9	1,4	87,5
	1996 5,7	7,0	359,8	585,1	157,2	69,9	18,8	18,6	8,0	1,8	0,5	88,4
	1997 2,9	7,0	443,0	608,9	185,6	103,2	31,0	18,3	3,8	3,5	0,3	99,9
	1998 0,0	7,0	534,4	626,0	271,6	116,0	62,6	13,5	4,8	1,7	0,5	114,2
	1999 9,2	8,4	575,0	747,9	285,1	113,1	38,7	22,2	6,9	2,6	0,3	124,7
Mauricie/Centre du Québec	1995 0,0	6,3	370,5	516,1	146,9	88,6	37,1	22,4	1,9	1,1	0,0	81,8
	1996 3,6	9,6	380,2	467,2	210,6	73,7	41,8	23,2	5,5	2,2	0,4	84,6
	1997 3,7	4,9	342,6	427,2	176,6	41,7	25,7	3,8	0,0	1,1	1,4	70,2
	1998 0,0	8,2	347,9	644,1	258,7	85,4	26,1	9,9	1,7	0,0	1,6	93,6
	1999 7,8	1,7	337,5	537,5	204,5	47,0	29,0	14,6	4,8	0,0	1,6	81,4
Estrie	1995 0,0	2,7	531,9	643,8	218,4	66,0	33,6	18,6	13,7	4,1	1,4	111,0
	1996 11,6	2,7	430,0	643,2	246,0	91,2	45,9	31,9	6,5	0,0	0,0	108,0
	1997 5,9	2,7	460,3	553,6	236,0	51,8	71,5	6,7	3,1	0,0	0,0	98,0
	1998 0,0	2,7	443,1	634,0	241,1	89,1	63,3	11,0	0,0	0,0	0,0	104,3
	1999 6,1	0,0	469,8	717,7	239,1	98,1	55,3	21,8	8,4	0,0	0,0	114,3
Montréal centre	1995 5,4	12,7	509,3	491,9	172,2	92,5	38,5	16,5	5,1	0,5	2,5	96,7
	1996 4,6	7,3	442,0	483,1	188,0	93,0	44,3	17,3	5,9	0,5	3,1	92,8
	1997 3,8	10,2	505,7	495,1	202,7	85,2	44,6	20,7	5,3	1,1	3,9	98,8
	1998 1,0	9,0	585,5	599,2	236,1	97,7	51,3	12,5	7,0	0,5	3,2	111,9
	1999 5,9	8,9	676,4	709,4	280,5	133,7	70,0	25,3	5,9	0,5	2,6	133,2
Outaouais	1995 4,4	2,3	472,8	584,5	186,4	81,2	66,1	24,4	6,6	0,0	0,6	105,5
	1996 8,9	6,9	461,1	446,4	178,7	52,6	22,6	11,8	0,0	0,0	3,1	87,4
	1997 0,0	6,8	334,1	413,3	164,8	47,1	35,1	7,6	2,9	0,0	1,5	73,3
	1998 9,2	8,9	381,7	439,8	221,5	59,3	31,5	12,9	19,3	0,0	1,5	85,9
	1999 0,0	4,4	637,4	512,5	254,5	76,4	25,1	8,9	0,0	0,0	0,9	104,9
Abitibi/Témiscamingue	1995 26,3	16,8	924,1	729,4	412,8	156,4	59,9	46,1	14,0	4,8	0,0	185,2
	1996 18,1	4,2	890,8	942,3	227,7	197,5	52,7	20,5	13,3	4,8	0,0	180,2
	1997 0,0	25,8	796,2	559,4	288,5	81,1	46,3	11,9	6,3	0,0	0,0	138,9
	1998 0,0	8,6	757,3	530,3	215,3	117,3	6,7	3,9	0,0	0,0	0,0	122,9
	1999 0,0	17,5	586,7	457,5	206,9	99,4	20,6	11,2	17,3	0,0	0,6	108,2
Côte-Nord	1995 56,6	34,2	1359,0	1090,7	683,1	204,2	62,0	18,0	0,0	8,5	0,0	276,6
	1996 0,0	35,1	1150,0	1186,0	429,4	274,2	92,4	11,9	0,0	0,0	1,0	249,7
	1997 30,4	43,0	990,1	930,4	360,4	153,8	94,6	11,7	8,3	0,0	1,9	205,5
	1998 15,7	58,3	969,9	976,2	530,6	208,6	63,7	17,4	0,0	7,7	1,0	219,8
	1999 0,0	52,0	1482,8	1068,7	433,1	282,1	75,5	34,7	0,0	0,0	0,0	259,4
Nord-du Québec	1995 0,0	0,0	1108,2	465,7	0,0	101,4	102,0	32,5	0,0	0,0	4,9	167,9
	1996 0,0	0,0	317,0	648,9	232,4	165,2	0,0	0,0	49,6	0,0	0,0	114,2
	1997 0,0	0,0	433,8	62,5	158,5	60,5	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9
	1998 0,0	0,0	379,0	181,1	0,0	67,0	53,8	31,0	0,0	0,0	0,0	65,1
	1999 0,0	0,0	396,8	519,9	231,3	0,0	111,0	30,9	0,0	0,0	0,0	110,7

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) suite

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine												
1995	0,0	7,3	276,3	412,9	124,3	140,3	63,7	0,0	8,9	5,4	1,9	76,2
1996	0,0	7,6	294,7	443,7	81,2	99,3	21,3	5,8	0,0	0,0	1,0	67,3
1997	18,2	7,8	259,0	179,9	165,6	39,7	33,0	28,8	0,0	0,0	1,9	54,3
1998	0,0	0,0	112,9	136,7	117,0	43,1	11,3	11,5	7,9	0,0	0,0	30,3
1999	0,0	8,2	88,1	139,6	66,5	30,8	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	22,7
Chaudière/												
1995	4,0	0,0	148,6	251,7	139,9	34,1	14,6	4,9	5,2	0,0	0,3	42,4
Appalaches												
1996	0,0	1,9	223,6	321,6	138,2	67,9	35,0	4,8	0,0	1,6	0,3	56,8
1997	0,0	0,0	238,0	285,4	139,4	57,8	35,4	3,2	2,3	0,0	1,3	55,3
1998	4,4	3,9	210,7	362,2	147,8	79,4	14,9	7,8	2,2	0,0	1,0	59,8
1999	0,0	0,0	243,5	379,0	117,2	34,3	21,2	12,3	2,1	0,0	0,5	58,4
Laval												
1995	13,4	4,5	375,8	385,3	142,8	50,8	12,7	7,6	2,6	0,0	0,3	69,5
1996	0,0	4,5	307,5	289,6	80,8	32,4	24,8	9,3	2,5	1,9	0,0	52,4
1997	4,6	8,8	423,2	354,6	115,8	29,9	15,3	10,9	4,8	0,0	0,3	66,6
1998	0,0	10,8	398,3	463,6	173,0	61,9	33,4	7,0	4,7	5,3	0,3	79,8
1999	0,0	12,8	474,8	451,3	149,8	74,8	24,3	18,7	6,8	0,0	0,0	83,4
Lanaudière												
1995	3,7	14,2	310,3	326,1	123,2	32,3	23,7	21,2	5,2	0,0	0,5	60,3
1996	0,0	3,5	375,5	375,1	104,8	27,5	25,4	9,5	0,0	0,0	0,3	61,6
1997	7,6	1,7	396,7	393,8	93,0	59,4	20,0	13,8	0,0	0,0	2,5	68,9
1998	0,0	16,9	369,2	354,1	129,1	32,4	24,7	5,9	2,1	0,0	0,2	63,2
1999	0,0	8,4	550,7	581,3	236,3	70,4	22,1	8,6	4,1	0,0	0,5	97,8
Laurentides												
1995	6,3	9,8	497,9	608,9	251,7	53,8	61,1	10,2	4,5	0,0	0,0	101,3
1996	3,2	9,6	446,4	519,5	156,3	49,6	49,5	7,0	27,4	1,6	0,0	85,9
1997	0,0	6,2	395,9	399,5	214,0	31,4	39,6	8,1	5,9	0,0	0,0	73,4
1998	0,0	4,5	441,2	514,8	189,9	45,0	49,6	15,6	5,6	1,5	0,0	84,7
1999	0,0	10,4	556,3	473,0	175,4	49,4	14,9	7,5	0,0	1,5	0,0	84,0
Montréal												
1995	2,2	7,8	382,3	416,0	132,9	49,2	18,1	10,3	3,6	1,1	0,5	73,6
1996	1,1	5,0	290,0	322,4	117,9	39,1	14,4	14,3	3,4	0,0	0,7	58,5
1997	0,0	4,4	300,9	314,0	105,8	39,2	15,9	8,6	6,3	0,5	0,3	56,7
1998	0,0	4,9	355,6	361,8	120,0	37,8	15,8	6,2	1,8	0,5	0,1	62,9
1999	1,2	5,9	382,8	392,1	138,5	49,3	20,4	7,8	1,1	0,5	0,1	69,2
Nunavik												
1995	94,1	88,1	7529,4	9378,7	6148,5	4257,9	1760,0	567,5	221,7	432,9	10,9	2790,5
1996	95,7	215,4	10181,0	10194,7	7709,8	5078,6	2305,5	1062,7	867,7	194,6	0,0	3452,7
1997	0,0	298,9	6732,9	8415,3	5184,3	4976,9	2018,3	820,5	386,8	188,3	0,0	2660,8
1998	182,0	345,6	5179,7	6202,4	4694,3	4230,3	3274,6	672,4	0,0	0,0	20,0	2298,6
1999	89,0	260,2	6726,9	8387,1	4442,0	3686,6	3259,5	713,6	798,7	167,8	19,5	2593,4
Terres Cries/												
1995	0,0	163,5	4651,2	4668,8	2339,9	443,1	0,0	130,0	0,0	0,0	23,6	1309,4
Baie James												
1996	0,0	220,8	3654,1	3850,4	1629,1	704,2	0,0	131,2	185,2	0,0	11,9	1070,2
1997	0,0	0,0	3485,6	3002,3	2063,1	432,3	352,7	0,0	0,0	0,0	0,0	921,7
1998	0,0	57,5	5590,1	5590,1	3237,4	1291,2	170,4	365,0	366,3	0,0	24,1	1629,6
1999	0,0	59,0	3413,4	3625,0	2197,8	714,3	497,5	122,9	0,0	0,0	0,0	1021,6
Province de Québec												
1995	5,3	8,8	466,7	527,2	195,8	78,6	34,6	15,4	4,8	1,2	1,3	96,4
1996	4,1	7,7	428,7	499,4	180,6	78,6	34,0	15,8	6,8	0,9	1,4	90,3
1997	3,1	7,6	424,7	467,6	186,3	70,1	35,7	13,0	4,2	0,9	1,6	86,7
1998	2,0	8,8	463,3	537,5	218,3	85,2	40,5	11,3	4,7	1,0	1,3	96,7
1999	3,4	8,1	521,4	589,5	234,4	95,0	41,4	16,4	4,7	0,6	1,0	105,7

Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par région socio-santitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-santitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995 0	0	59	47	15	5	3	2	0	0	0	131
	1996 1	1	37	38	7	7	4	0	1	0	2	98
	1997 0	2	46	50	13	5	2	0	0	0	0	118
	1998 2	0	65	50	13	7	2	5	0	0	0	144
	1999 1	0	40	34	8	3	3	3	0	0	3	95
Saguenay/Lac St-Jean	1995 1	3	115	97	31	15	2	3	1	1	11	280
	1996 0	6	146	85	20	7	5	2	1	0	5	277
	1997 1	0	78	73	21	4	6	3	0	0	9	195
	1998 0	1	75	77	21	13	7	3	1	1	7	206
	1999 0	1	72	113	38	9	6	3	1	0	1	244
Québec	1995 0	4	135	169	56	27	10	10	0	1	4	416
	1996 2	5	129	188	45	18	6	13	3	1	3	413
	1997 1	5	168	189	56	30	8	11	2	1	1	472
	1998 0	4	193	205	74	34	16	4	2	0	2	534
	1999 0	6	203	237	81	35	11	13	4	2	1	593
Mauricie/Centre du Québec	1995 0	4	109	98	26	20	7	7	1	0	0	272
	1996 1	6	120	104	41	17	10	12	3	2	2	318
	1997 0	3	111	92	28	8	4	2	0	1	5	254
	1998 0	5	100	141	46	15	4	2	1	0	4	318
	1999 2	1	99	124	39	10	5	3	2	0	5	290
Estrie	1995 0	1	92	85	31	10	7	5	3	2	3	239
	1996 1	1	87	89	33	9	7	8	0	0	0	235
	1997 0	1	81	75	28	6	8	2	1	0	0	202
	1998 0	1	78	76	20	12	8	3	0	0	0	198
	1999 1	0	83	103	24	6	6	6	1	0	0	230
Montréal centre	1995 2	22	474	497	178	85	25	17	4	0	32	1336
	1996 4	13	412	478	178	80	34	23	6	0	39	1267
	1997 2	20	481	479	179	66	33	29	4	4	47	1344
	1998 1	18	563	563	203	75	24	13	7	2	33	1502
	1999 2	16	647	668	241	87	45	27	4	1	33	1771
Outaouais	1995 1	1	80	100	38	22	16	8	2	0	2	270
	1996 1	3	85	77	29	14	7	3	0	0	9	228
	1997 0	2	65	72	25	10	8	2	0	0	3	187
	1998 2	4	74	80	42	8	5	0	3	0	5	223
	1999 0	1	125	89	39	14	5	2	0	0	3	278
Abitibi/Témiscamingue	1995 1	4	90	54	34	12	7	5	0	1	0	208
	1996 0	1	99	68	15	16	6	4	1	0	0	210
	1997 0	6	84	46	24	7	4	2	0	0	0	173
	1998 0	2	80	43	11	10	1	0	0	0	0	147
	1999 0	4	63	35	13	8	0	1	3	0	0	127
Côte-Nord	1995 3	4	102	59	39	10	5	2	0	1	0	225
	1996 0	5	76	71	23	15	5	1	0	0	1	197
	1997 1	5	64	46	16	7	6	0	0	0	1	146
	1998 0	7	68	52	23	15	5	2	0	0	1	173
	1999 0	7	95	57	20	19	5	3	0	0	0	206
Nord-du Québec	1995 0	0	19	4	0	2	1	1	0	0	1	28
	1996 0	0	6	6	2	1	0	0	0	0	0	15
	1997 0	0	7	3	0	1	1	0	0	0	0	10
	1998 0	0	7	3	0	1	1	0	0	0	0	12
	1999 0	0	7	5	2	0	1	0	0	0	0	15

Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par région socio-santitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) suite

Région socio-santitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine												
1995	0	1	19	23	4	9	2	0	1	1	2	62
1996	0	1	20	27	3	7	1	0	0	0	1	60
1997	0	1	17	10	8	1	2	2	0	0	1	42
1998	0	0	8	5	5	1	0	2	1	0	0	22
1999	0	1	5	8	3	2	0	1	0	0	0	20
Chaudière/ Appalaches												
1995	1	0	35	43	25	6	3	1	1	0	1	116
1996	0	1	61	52	20	14	7	3	0	1	1	160
1997	0	0	62	51	15	7	6	1	0	0	3	145
1998	1	2	54	66	25	15	2	2	1	0	4	172
1999	0	0	59	68	19	5	5	4	0	0	1	161
Laval												
1995	1	2	69	58	22	10	2	0	1	0	0	165
1996	0	2	56	45	14	7	5	2	1	0	0	132
1997	1	3	90	60	18	4	4	5	1	0	1	187
1998	0	4	80	72	22	10	5	2	1	3	1	200
1999	0	6	101	70	20	8	4	2	1	0	0	212
Lanaudière												
1995	0	7	64	44	26	9	7	10	1	0	1	169
1996	0	2	83	55	18	5	9	3	0	0	1	176
1997	1	1	95	67	18	18	5	8	0	0	8	221
1998	0	10	87	57	15	10	6	3	0	0	1	189
1999	0	5	136	99	32	12	8	1	1	0	1	295
Laurentides												
1995	0	6	125	115	53	13	16	2	2	0	0	332
1996	1	6	121	99	30	15	14	3	8	1	0	298
1997	0	4	107	87	50	9	11	3	2	0	0	273
1998	0	2	120	109	42	11	11	3	1	0	0	299
1999	0	7	152	88	34	13	3	4	0	0	0	301
Montréal												
1995	0	14	312	272	75	35	14	9	3	0	4	738
1996	1	9	238	205	74	23	12	19	3	0	6	590
1997	0	8	252	215	55	24	13	12	5	0	4	588
1998	0	8	301	228	73	24	10	4	1	1	1	651
1999	0	11	321	268	79	24	13	6	1	1	2	726
Numavik												
1995	1	1	57	63	46	26	5	2	1	2	1	205
1996	0	5	83	69	48	33	10	9	3	1	0	261
1997	0	7	52	57	33	26	9	7	1	1	0	193
1998	2	8	33	46	31	22	14	1	0	0	1	158
1999	0	6	54	51	31	20	17	4	5	0	1	189
Terres Cries/ Bate James												
1995	0	3	39	42	14	2	0	1	0	0	2	103
1996	0	3	27	33	12	5	0	1	1	0	1	83
1997	0	0	27	22	14	3	1	0	0	0	0	67
1998	0	1	42	41	22	8	0	3	0	2	2	121
1999	0	1	25	27	17	5	2	1	0	0	0	78
Province de Québec												
1995	11	77	1995	1870	713	318	132	85	21	9	64	5295
1996	12	70	1886	1789	612	293	142	106	31	6	71	5018
1997	7	68	1887	1691	602	236	131	89	16	7	83	4817
1998	8	77	2028	1914	688	291	121	52	21	7	62	5269
1999	6	73	2287	2144	740	280	139	84	23	4	51	5831

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-santaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1995 0,0	0,0	771,4	801,8	269,1	62,7	32,3	12,1	0,0	0,0	0,0	125,5
	1996 18,7	7,6	479,2	647,6	131,1	93,8	43,5	0,0	9,0	0,0	1,9	94,4
	1997 0,0	15,6	603,6	845,3	248,7	72,1	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	114,2
	1998 41,0	0,0	868,9	831,1	251,5	111,0	23,2	28,6	0,0	0,0	0,0	140,1
	1999 21,2	0,0	550,4	557,2	154,6	51,5	36,4	17,0	0,0	0,0	2,9	92,9
Saguenay/	1995 11,4	14,4	969,6	1093,8	365,4	122,3	14,7	13,7	6,6	4,3	7,6	192,8
Lac St-Jean	1996 0,0	30,0	1223,9	926,5	247,0	60,9	36,5	8,9	6,4	0,0	3,5	191,4
	1997 12,4	0,0	663,5	772,2	263,6	37,4	45,1	13,1	0,0	0,0	6,2	135,2
	1998 0,0	5,3	649,6	790,7	263,8	133,6	54,2	12,8	6,0	4,0	4,9	143,4
	1999 0,0	5,4	647,0	1130,2	472,5	99,6	48,6	12,5	5,8	0,0	0,7	170,6
Québec	1995 0,0	11,3	644,2	765,8	240,9	98,6	34,5	18,7	0,0	1,5	1,2	125,4
	1996 11,8	14,2	612,1	866,5	197,8	67,7	20,7	23,9	7,7	1,5	0,9	123,9
	1997 6,1	14,3	801,9	867,6	252,2	117,2	27,9	19,9	4,9	1,5	0,3	141,1
	1998 0,0	11,4	939,0	933,6	341,7	138,4	56,7	7,1	4,7	0,0	0,6	159,0
	1999 0,0	17,1	1016,4	1067,6	378,5	149,4	39,4	22,8	9,0	2,9	0,3	175,9
Mauricie/	1995 0,0	13,0	631,2	702,6	179,9	103,2	32,7	18,8	3,8	0,0	0,0	110,5
Centre du Québec	1996 7,4	19,8	689,8	725,0	294,2	91,5	46,7	31,6	10,9	3,8	0,8	128,7
	1997 0,0	10,1	637,3	622,0	205,7	45,5	18,8	5,1	0,0	1,9	2,0	102,5
	1998 0,0	17,1	581,3	922,2	342,3	91,4	19,0	5,0	3,3	0,0	1,6	128,0
	1999 16,0	3,5	584,1	792,0	289,6	64,5	24,5	7,4	6,4	0,0	2,0	116,5
Estrie	1995 0,0	5,5	922,4	926,3	337,5	88,2	59,1	23,5	20,3	7,1	2,1	167,5
	1996 11,9	5,5	863,7	964,9	366,7	82,5	58,5	37,0	0,0	0,0	0,0	163,9
	1997 0,0	5,5	800,2	798,0	317,5	57,2	67,5	9,1	6,1	0,0	0,0	140,2
	1998 0,0	5,6	781,4	790,8	230,8	120,0	67,7	13,4	0,0	0,0	0,0	136,8
	1999 12,7	0,0	829,4	1059,1	280,7	62,6	51,2	26,4	5,6	0,0	0,0	158,2
Montréal centre	1995 3,7	23,9	911,7	780,2	233,2	104,1	32,2	12,4	3,8	0,0	3,3	139,5
	1996 7,6	13,9	782,1	769,1	241,4	99,9	43,1	16,5	5,6	0,0	4,1	131,9
	1997 3,9	21,0	912,4	770,0	253,0	84,1	41,9	20,5	3,6	1,8	4,9	139,5
	1998 2,0	18,6	1063,0	898,4	297,5	98,8	30,4	9,0	6,2	0,9	3,4	155,4
	1999 4,1	16,4	1225,5	1050,1	364,2	118,8	57,2	18,5	3,4	0,4	3,4	182,7
Outaouais	1995 9,0	4,8	800,2	950,5	304,1	142,8	105,4	33,1	13,3	0,0	1,3	171,8
	1996 9,2	14,0	836,2	725,4	238,9	91,7	45,0	12,0	0,0	0,0	5,6	142,6
	1997 0,0	9,2	630,1	667,0	209,3	66,7	51,1	7,7	0,0	0,0	1,8	115,0
	1998 18,9	18,1	704,6	730,4	357,0	54,9	31,6	0,0	16,9	0,0	3,0	134,9
	1999 0,0	4,5	1179,6	800,3	331,0	100,5	31,4	7,2	0,0	0,0	1,8	165,6
Abitibi/	1995 18,0	34,8	1486,4	1046,7	611,0	167,6	97,5	44,2	0,0	9,2	0,0	269,1
Témiscamingue	1996 0,0	8,8	1645,1	1281,8	280,3	233,3	82,0	34,6	13,6	0,0	0,0	271,0
	1997 0,0	53,2	1397,4	857,4	454,9	106,9	54,6	16,8	0,0	0,0	0,0	222,9
	1998 0,0	17,9	1354,3	781,5	212,8	161,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0
	1999 0,0	36,2	1083,2	621,6	253,7	135,6	0,0	7,9	35,8	0,0	0,0	163,0
Côte-Nord	1995 87,8	55,9	2596,1	1634,3	999,0	208,7	108,0	25,1	0,0	16,4	0,0	442,4
	1996 0,0	71,8	1968,9	1963,5	622,1	323,0	107,8	12,4	0,0	0,0	2,0	388,7
	1997 31,3	73,2	1708,0	1261,3	448,7	158,4	131,2	0,0	0,0	0,0	2,0	289,2
	1998 0,0	104,5	1862,0	1424,7	668,6	357,2	110,1	24,2	0,0	0,0	2,0	344,0
	1999 0,0	106,6	2661,1	1602,0	579,4	483,8	111,6	36,2	0,0	0,0	0,0	411,4
Nord-du Québec	1995 0,0	0,0	2130,0	535,5	0,0	213,0	108,1	68,6	0,0	0,0	10,3	289,6
	1996 0,0	0,0	663,0	785,3	322,6	112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,9
	1997 0,0	0,0	777,8	0,0	164,5	124,8	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	104,5
	1998 0,0	0,0	777,8	369,9	0,0	137,2	109,4	0,0	0,0	0,0	0,0	125,9
	1999 0,0	0,0	789,2	598,8	333,3	0,0	112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	158,1

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) suite

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1995 0,0	14,9	523,8	692,1	126,0	209,4	42,8	0,0	18,0	10,1	3,8	118,5
	1996 0,0	15,4	555,4	819,7	98,3	173,4	21,4	0,0	0,0	0,0	1,9	115,6
	1997 0,0	16,0	477,0	304,1	267,6	26,5	44,2	24,0	0,0	0,0	1,9	81,6
	1998 0,0	0,0	234,8	153,6	169,1	28,6	0,0	23,7	16,1	0,0	0,0	43,1
	1999 0,0	16,8	151,7	256,3	99,4	61,6	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	39,5
Chaudière/	1995 8,3	0,0	244,4	365,9	214,5	38,2	18,0	3,3	5,3	0,0	0,5	60,4
Appalaches	1996 0,0	3,9	419,8	436,8	175,2	93,4	41,6	9,8	0,0	2,9	0,5	83,1
	1997 0,0	0,0	430,6	418,1	132,7	49,1	36,0	3,2	0,0	0,0	1,6	75,1
	1998 9,1	8,0	379,8	528,5	221,7	111,9	12,2	6,3	4,5	0,0	2,1	88,8
	1999 0,0	0,0	425,5	532,8	166,3	39,8	30,9	12,5	0,0	0,0	0,5	83,0
Laval	1995 9,2	9,3	628,2	538,6	179,7	65,0	12,7	0,0	5,0	0,0	0,0	95,4
	1996 0,0	9,1	499,7	421,6	116,3	46,7	31,0	7,3	4,9	0,0	0,0	75,3
	1997 9,5	13,5	791,5	556,4	152,8	27,4	24,5	17,9	4,7	0,0	0,6	105,3
	1998 0,0	17,8	697,0	658,5	191,1	71,1	30,4	7,0	4,5	9,4	0,6	111,3
	1999 0,0	26,3	883,4	630,5	175,9	58,8	24,5	6,7	4,4	0,0	0,0	116,6
Lanaudière	1995 0,0	25,7	516,1	421,4	204,4	48,3	37,2	33,5	5,4	0,0	0,5	89,8
	1996 0,0	7,2	649,5	511,8	144,4	27,4	46,4	9,7	0,0	0,0	0,5	91,6
	1997 7,8	3,6	737,7	598,1	145,6	101,3	25,5	25,0	0,0	0,0	4,1	112,8
	1998 0,0	34,9	670,7	490,6	121,8	58,5	30,3	9,1	0,0	0,0	0,5	94,7
	1999 0,0	17,3	1037,8	835,9	256,8	73,2	40,1	2,9	4,2	0,0	0,5	145,2
Laurentides	1995 0,0	19,9	908,2	921,5	348,6	60,5	76,4	5,9	9,2	0,0	0,0	152,7
	1996 6,5	19,5	845,8	779,8	200,2	71,0	63,8	8,6	34,5	3,0	0,0	133,9
	1997 0,0	12,7	728,8	664,3	335,0	43,6	49,2	8,3	8,1	0,0	0,0	119,9
	1998 0,0	6,2	810,6	806,5	281,1	55,5	48,1	8,0	3,8	0,0	0,0	128,5
	1999 0,0	21,2	1020,6	633,5	226,5	68,2	12,9	10,2	0,0	0,0	0,0	126,7
Montréal	1995 0,0	16,0	678,3	652,7	162,5	59,2	23,2	8,5	4,3	0,0	0,6	111,0
	1996 2,3	10,2	511,7	483,7	161,7	39,8	19,4	17,5	4,1	0,0	0,9	87,4
	1997 0,0	9,0	541,0	495,4	121,2	42,5	20,9	10,8	6,4	0,0	0,6	85,8
	1998 0,0	8,9	647,2	513,1	161,5	44,0	16,0	3,5	1,2	0,9	0,1	93,7
	1999 0,0	12,1	696,5	589,5	174,5	45,5	20,8	5,2	1,1	0,9	0,3	103,2
Numavik	1995 197,6	88,0	12925,2	14253,4	10900,5	6190,5	1872,7	490,2	423,7	772,2	22,0	4517,4
	1996 0,0	432,9	18043,5	14806,9	10933,9	8128,1	3246,8	2097,9	1145,0	352,1	0,0	5532,0
	1997 0,0	588,7	11063,8	11850,3	7621,2	6103,3	2639,3	1594,5	339,0	339,0	0,0	3946,0
	1998 374,5	677,4	6693,7	9407,0	6595,7	5459,1	3753,4	209,6	0,0	0,0	19,8	3130,6
	1999 0,0	516,8	10131,3	10119,0	6553,9	4819,3	4632,2	770,7	1529,1	0,0	19,2	3637,4
Terres Cries/ Bate James	1995 0,0	341,3	9443,1	9090,9	4046,2	647,2	0,0	280,1	0,0	0,0	49,3	2538,2
	1996 0,0	341,7	7031,3	7349,7	3314,9	1597,4	0,0	280,9	358,4	0,0	24,9	2068,8
	1997 0,0	0,0	6940,9	5314,0	3713,5	934,6	392,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1684,7
	1998 0,0	122,0	10714,3	10677,1	5714,3	2580,6	0,0	804,3	724,6	0,0	50,9	3078,9
	1999 0,0	123,6	6775,1	7049,6	4438,6	1677,9	696,9	278,6	0,0	0,0	0,0	2004,1
Province de Québec	1995 4,8	17,0	822,6	795,7	272,3	98,3	40,2	15,0	5,4	1,3	1,7	142,4
	1996 5,4	15,4	767,9	760,1	239,8	93,1	42,5	18,3	7,6	0,9	1,9	133,8
	1997 3,2	14,9	767,4	707,5	241,3	77,4	39,3	15,0	3,7	1,0	2,2	127,5
	1998 3,7	16,8	827,9	786,6	280,6	99,8	36,3	8,6	4,7	1,0	1,6	138,5
	1999 2,8	15,9	942,8	866,2	304,3	100,2	42,0	13,6	4,9	0,5	1,3	152,2

Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les hommes par région socio-santitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-santitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent												
1995	0	0	17	38	13	1	2	2	0	0	1	74
1996	0	0	17	25	11	5	1	3	2	0	2	66
1997	0	0	12	33	10	7	0	2	0	0	0	64
1998	0	0	20	54	15	7	3	2	0	0	0	101
1999	0	0	10	24	9	7	0	1	0	0	0	51
Saguenay/Lac St-Jean												
1995	0	0	17	45	8	10	3	4	1	0	2	90
1996	1	0	14	35	14	9	3	4	1	0	2	83
1997	0	0	8	33	17	7	5	2	0	0	0	72
1998	0	1	12	26	14	12	2	1	1	1	2	72
1999	0	0	8	30	23	12	5	3	1	0	2	84
Québec												
1995	0	0	20	62	38	13	5	3	2	0	5	148
1996	0	0	25	70	28	20	5	7	3	1	0	159
1997	0	0	21	80	28	24	10	9	1	3	1	177
1998	0	1	31	73	46	24	20	11	2	2	1	211
1999	3	0	32	99	43	19	11	12	2	1	1	223
Mauricie/Centre du Québec												
1995	0	0	22	51	18	15	9	10	0	1	0	126
1996	0	0	16	34	20	11	8	6	0	0	0	95
1997	1	0	12	38	22	7	7	1	0	0	2	90
1998	0	0	23	60	26	14	7	6	0	0	4	140
1999	0	0	17	48	18	5	7	9	1	0	0	105
Estrie												
1995	0	0	18	34	10	5	1	3	1	0	1	73
1996	1	0	3	31	12	11	4	6	2	0	0	70
1997	1	0	15	31	14	5	9	1	0	0	0	76
1998	0	0	13	48	22	6	7	2	0	0	0	98
1999	0	0	13	41	17	13	7	4	2	0	0	97
Montréal centre												
1995	4	2	59	131	93	72	35	27	6	2	10	441
1996	1	1	57	129	107	74	29	24	6	2	17	447
1997	2	0	56	143	116	73	38	28	7	0	20	483
1998	0	0	61	199	128	79	58	22	8	0	21	576
1999	4	2	66	245	142	116	67	44	9	1	12	708
Outaouais												
1995	0	0	16	25	8	3	4	4	0	0	0	60
1996	1	0	10	19	14	2	0	3	0	0	1	50
1997	0	1	5	18	14	4	3	2	1	0	2	50
1998	0	0	7	17	10	9	5	7	4	0	0	59
1999	0	1	12	25	21	7	3	3	0	0	0	72
Abitibi/Témiscamingue												
1995	2	0	25	24	13	11	2	6	2	0	0	85
1996	2	0	12	35	10	12	2	1	1	1	0	76
1997	0	0	16	16	7	4	3	1	1	0	0	48
1998	0	0	14	17	12	5	0	1	0	0	0	49
1999	0	0	9	18	9	4	3	2	0	0	1	46
Côte-Nord												
1995	1	1	11	24	16	10	1	1	0	0	0	65
1996	0	0	18	20	10	11	4	1	0	0	0	64
1997	1	1	15	26	11	7	3	2	1	0	1	68
1998	1	1	7	24	16	3	1	1	0	1	0	55
1999	0	0	16	25	12	4	2	3	0	0	0	62
Nord-du Québec												
1995	0	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	6
1996	0	0	0	4	1	2	0	0	1	0	0	8
1997	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1999	0	0	0	4	1	0	1	1	0	0	0	7

Nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les hommes par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) suite

Région socio-santaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995 0	0	2	5	4	3	4	0	0	0	0	18
	1996 0	0	2	3	2	1	1	1	0	0	0	10
	1997 1	0	2	2	2	2	1	3	0	0	1	14
	1998 0	0	0	4	2	2	1	0	0	0	0	9
	1999 0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
Chaudière/	1995 0	0	9	19	9	5	2	2	1	0	0	47
Appalaches	1996 0	0	6	28	13	7	5	0	0	0	0	59
	1997 0	0	9	22	18	10	6	1	1	0	2	69
	1998 0	0	8	29	10	7	3	3	0	0	0	60
	1999 0	0	11	34	9	4	2	4	1	0	1	66
Laval	1995 2	0	16	28	14	6	2	3	0	0	1	72
	1996 0	0	15	19	6	3	3	3	0	1	0	50
	1997 0	1	9	19	10	5	1	1	1	0	0	47
	1998 0	1	14	33	19	8	6	2	1	0	0	84
	1999 0	0	11	34	15	13	4	9	2	0	0	88
Lanaudière	1995 1	1	17	26	5	3	2	3	1	0	1	60
	1996 0	0	18	28	8	5	1	3	0	0	0	63
	1997 1	0	13	24	5	3	3	1	0	0	2	52
	1998 0	0	14	28	17	1	4	1	1	0	0	66
	1999 0	0	16	45	27	11	1	5	1	0	1	107
Laurentides	1995 2	0	18	41	24	10	10	5	0	0	0	110
	1996 0	0	11	37	17	6	8	2	5	0	0	86
	1997 0	0	13	21	14	4	7	3	1	0	0	63
	1998 0	1	15	35	15	7	12	9	2	1	0	97
	1999 0	0	20	48	19	6	4	2	0	1	0	100
Montréal	1995 2	0	48	84	50	24	8	13	2	2	2	235
	1996 0	0	39	75	36	23	6	12	2	0	3	196
	1997 0	0	36	63	43	21	7	7	5	1	0	183
	1998 0	1	37	101	38	18	10	10	2	0	0	217
	1999 1	0	40	97	49	29	13	12	1	0	0	242
Nunavik	1995 0	1	7	17	7	9	6	3	0	0	0	50
	1996 1	0	7	20	20	9	6	1	1	0	0	65
	1997 0	0	9	20	12	17	6	1	1	0	0	66
	1998 0	0	16	11	12	14	12	6	0	0	1	72
	1999 1	0	13	27	10	12	8	4	0	1	1	77
Terres Cries/ Bate James	1995 0	0	1	1	5	1	0	0	0	0	0	8
	1996 0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	7
	1997 0	0	2	4	3	0	1	0	0	0	0	10
	1998 0	0	3	4	5	1	1	0	0	0	0	14
	1999 0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	6
Province de Québec	1995 14	5	325	658	335	201	97	89	16	5	23	1768
	1996 7	2	273	614	330	211	86	77	24	5	25	1654
	1997 7	3	254	594	347	200	110	65	20	4	31	1635
	1998 1	6	295	763	407	217	152	85	21	5	29	1981
	1999 9	3	297	847	426	262	139	118	20	4	19	2144


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1995 0,0	0,0	209,4	615,7	229,8	12,6	21,9	11,9	0,0	0,0	1,0	73,0
	1996 0,0	0,0	209,9	400,1	201,3	68,2	11,0	17,6	17,6	0,0	2,0	65,6
	1997 0,0	0,0	149,7	522,2	187,7	102,5	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	64,1
	1998 0,0	0,0	261,1	828,7	285,1	111,3	36,0	11,4	0,0	0,0	0,0	101,9
	1999 0,0	0,0	134,8	362,5	174,7	119,7	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	51,9
Saguenay/Lac St-Jean	1995 0,0	0,0	131,3	472,3	90,1	78,8	21,5	17,3	6,7	0,0	1,4	62,0
	1996 11,3	0,0	108,3	356,0	162,1	76,0	21,7	16,9	6,5	0,0	1,4	57,4
	1997 0,0	0,0	62,6	320,0	200,3	64,3	37,0	8,3	0,0	0,0	0,0	50,0
	1998 0,0	5,1	96,8	243,7	165,0	120,6	15,2	4,1	5,9	5,2	1,4	50,2
	1999 0,0	0,0	66,6	271,4	268,9	130,6	39,5	12,0	5,7	0,0	1,4	58,8
Québec	1995 0,0	0,0	92,5	274,0	155,7	45,3	17,1	5,8	5,7	0,0	1,6	47,3
	1996 0,0	0,0	115,0	312,5	118,2	72,1	17,0	13,2	8,2	2,2	0,0	50,6
	1997 0,0	0,0	96,7	357,3	121,4	89,9	34,0	16,7	2,6	6,6	0,3	56,2
	1998 0,0	2,7	145,1	325,2	204,1	94,4	68,2	20,1	4,9	4,3	0,3	66,7
	1999 18,0	0,0	153,1	435,6	194,7	78,2	38,1	21,6	4,7	2,1	0,3	70,3
Mauricie/Centre du Québec	1995 0,0	0,0	121,6	341,8	116,2	74,4	41,5	25,8	0,0	2,6	0,0	52,5
	1996 0,0	0,0	87,1	223,8	133,1	56,7	36,9	15,2	0,0	0,0	0,0	39,4
	1997 7,2	0,0	64,9	243,0	149,6	38,0	32,4	2,5	0,0	0,0	0,8	37,2
	1998 0,0	0,0	126,7	369,8	180,7	79,7	33,1	14,6	0,0	0,0	1,6	57,6
	1999 0,0	0,0	95,9	287,1	124,9	30,4	33,4	21,5	3,2	0,0	0,0	43,1
Estrie	1995 0,0	0,0	168,1	365,3	104,3	43,8	8,3	13,8	6,9	0,0	0,7	52,8
	1996 11,2	0,0	27,6	328,6	129,1	99,8	33,3	27,0	13,2	0,0	0,0	50,4
	1997 11,5	0,0	139,8	318,0	156,0	46,6	75,5	4,4	0,0	0,0	0,0	54,5
	1998 0,0	0,0	123,2	475,0	251,2	58,8	59,0	8,7	0,0	0,0	0,0	69,9
	1999 0,0	0,0	124,7	396,6	197,7	132,8	59,3	17,3	11,2	0,0	0,0	68,9
Montréal centre	1995 7,0	2,1	111,6	204,2	114,7	81,7	44,8	20,9	6,5	1,4	1,1	49,7
	1996 1,8	1,0	106,7	203,1	137,5	85,5	36,4	18,2	6,3	1,3	1,9	50,2
	1997 3,7	0,0	104,4	224,7	155,1	86,2	47,2	21,0	7,1	0,0	2,2	54,0
	1998 0,0	0,0	113,8	308,5	176,9	96,7	71,6	16,2	7,9	0,0	2,3	64,2
	1999 7,6	1,9	123,4	374,8	201,8	147,7	82,3	31,8	8,6	0,7	1,3	78,6
Outaouais	1995 0,0	0,0	155,2	230,1	65,7	19,5	26,6	16,0	0,0	0,0	0,0	38,6
	1996 8,7	0,0	95,8	174,5	117,4	13,2	0,0	11,6	0,0	0,0	0,6	31,6
	1997 0,0	4,4	47,0	163,9	119,4	27,2	19,2	7,5	5,8	0,0	1,2	31,1
	1998 0,0	0,0	65,3	153,2	85,4	63,8	31,5	25,6	21,6	0,0	0,0	36,2
	1999 0,0	4,3	110,1	224,8	178,1	51,6	18,9	10,6	0,0	0,0	0,0	43,5
Abitibi/Témiscamingue	1995 34,2	0,0	391,3	433,7	223,4	145,7	25,5	47,9	27,2	0,0	0,0	105,0
	1996 35,2	0,0	186,2	622,1	177,7	164,0	25,4	7,8	12,9	10,1	0,0	93,6
	1997 0,0	0,0	244,3	279,8	128,0	57,0	38,6	7,5	12,3	0,0	0,0	58,9
	1998 0,0	0,0	215,2	292,4	217,7	76,1	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	59,9
	1999 0,0	0,0	139,4	302,3	163,3	64,7	40,0	14,2	0,0	0,0	1,2	56,1
Côte-Nord	1995 27,4	13,4	250,8	600,0	385,7	199,9	19,8	11,5	0,0	0,0	0,0	120,4
	1996 0,0	0,0	417,2	493,0	250,7	227,4	78,5	11,4	0,0	0,0	0,0	118,9
	1997 29,5	14,0	354,4	635,4	280,3	149,4	60,8	22,5	15,8	0,0	1,9	126,7
	1998 30,5	14,2	171,5	580,4	409,2	67,7	20,5	11,1	0,0	16,1	0,0	102,9
	1999 0,0	0,0	408,6	607,5	304,9	94,7	41,7	33,3	0,0	0,0	0,0	116,5
Nord-du Québec	1995 0,0	0,0	199,4	396,8	0,0	0,0	96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7
	1996 0,0	0,0	0,0	514,8	149,0	216,2	0,0	0,0	89,5	0,0	0,0	76,0
	1997 0,0	0,0	105,9	123,0	152,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	0,0	0,0	0,0	9,6
	1999 0,0	0,0	0,0	446,4	143,5	0,0	109,2	58,3	0,0	0,0	0,0	67,4

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les hommes par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) suite


Région socio-santaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine												
1995	0,0	0,0	50,3	144,6	122,6	70,5	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2
1996	0,0	0,0	51,8	86,5	64,4	24,9	21,2	11,3	0,0	0,0	0,0	19,2
1997	35,4	0,0	53,0	59,1	65,6	52,9	21,9	33,3	0,0	0,0	1,9	27,1
1998	0,0	0,0	0,0	120,2	66,1	57,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
1999	0,0	0,0	28,4	30,1	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Chaudière/												
1995	0,0	0,0	58,9	147,6	71,1	30,3	11,5	6,4	5,1	0,0	0,0	24,4
Appalaches												
1996	0,0	0,0	38,9	215,9	104,2	43,9	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
1997	0,0	0,0	58,3	164,4	145,5	66,1	34,8	3,1	4,6	0,0	1,0	35,6
1998	0,0	0,0	52,6	211,1	80,6	48,9	17,6	9,2	0,0	0,0	0,0	30,9
1999	0,0	0,0	73,9	240,3	72,2	29,3	11,9	12,1	4,1	0,0	0,5	33,9
Laval												
1995	17,3	0,0	137,5	242,4	107,9	37,2	12,8	11,6	0,0	0,0	0,6	42,5
1996	0,0	0,0	126,2	166,3	47,2	18,9	18,5	11,3	0,0	4,2	0,0	29,1
1997	0,0	4,3	74,9	165,3	80,6	32,3	6,1	3,7	5,0	0,0	0,0	27,0
1998	0,0	4,2	115,5	281,7	155,9	53,3	36,3	7,1	4,8	0,0	0,0	47,7
1999	0,0	0,0	90,5	284,7	125,1	89,9	24,0	31,0	9,4	0,0	0,0	49,5
Lanaudière												
1995	7,1	3,5	124,0	235,9	40,2	16,2	10,4	9,6	5,0	0,0	0,5	31,3
1996	0,0	0,0	127,5	246,1	64,8	27,6	5,0	9,3	0,0	0,0	0,0	32,1
1997	7,4	0,0	90,6	201,6	40,5	17,1	14,8	3,0	0,0	0,0	1,0	26,0
1998	0,0	0,0	97,3	226,1	136,3	5,9	19,4	2,9	4,2	0,0	0,0	32,3
1999	0,0	0,0	110,4	348,1	215,8	67,5	4,8	13,9	4,0	0,0	0,5	51,4
Laurentides												
1995	12,2	0,0	120,4	312,0	156,0	47,0	46,3	14,2	0,0	0,0	0,0	50,2
1996	0,0	0,0	72,1	274,4	112,6	28,3	35,5	5,5	20,6	0,0	0,0	38,3
1997	0,0	0,0	83,2	150,6	93,4	19,2	30,4	7,9	3,9	0,0	0,0	27,4
1998	0,0	3,0	95,0	242,1	99,5	34,8	51,1	22,9	7,3	3,4	0,0	41,3
1999	0,0	0,0	124,8	322,9	124,9	30,9	16,8	4,9	0,0	3,3	0,0	41,7
Montréal												
1995	4,3	0,0	99,6	191,3	104,4	39,4	13,0	12,2	2,8	2,5	0,3	35,7
1996	0,0	0,0	79,6	168,7	75,7	38,4	9,5	11,1	2,7	0,0	0,4	29,4
1997	0,0	0,0	73,3	138,6	91,0	36,0	10,9	6,3	6,3	1,2	0,0	27,0
1998	0,0	1,1	75,8	217,2	80,4	31,8	15,5	8,8	2,4	0,0	0,0	31,6
1999	2,2	0,0	82,5	203,7	103,9	53,0	20,1	10,4	1,1	0,0	0,0	34,8
Nunavik												
1995	0,0	88,3	1711,5	4136,3	1590,9	2238,8	1676,0	634,2	0,0	0,0	0,0	1087,0
1996	186,6	0,0	1650,9	4914,0	4514,7	2137,8	1554,4	195,3	502,5	0,0	0,0	1376,0
1997	0,0	0,0	2064,2	4608,3	2758,6	3881,3	1492,5	186,6	450,5	0,0	0,0	1362,8
1998	0,0	0,0	3532,0	2558,1	2690,6	3125,0	2850,4	1063,8	0,0	0,0	20,2	1451,9
1999	173,3	0,0	2807,8	6338,0	2222,2	2649,0	2000,0	664,5	0,0	406,5	19,8	1521,4
Terres Cries/												
Bate James												
1995	0,0	0,0	223,7	217,9	1073,0	271,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,0
1996	0,0	107,1	686,5	434,8	229,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,2
1997	0,0	0,0	451,5	885,0	671,1	0,0	320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	228,5
1998	0,0	0,0	726,4	950,1	1113,6	258,4	313,5	0,0	0,0	0,0	0,0	321,5
1999	0,0	0,0	473,9	479,6	229,4	0,0	316,5	0,0	0,0	0,0	0,0	138,6
Province de Québec												
1995	5,8	1,1	127,4	268,9	122,5	59,8	29,0	15,6	4,2	1,0	0,6	48,9
1996	3,0	0,4	105,8	249,6	123,9	64,3	25,3	13,2	6,0	1,0	0,7	45,3
1997	3,0	0,6	98,1	237,5	133,2	63,0	32,2	10,9	4,8	0,8	0,8	44,5
1998	0,4	1,2	114,9	298,8	158,4	71,3	44,5	14,0	4,8	0,9	0,8	53,5
1999	4,0	0,6	116,7	325,0	167,5	89,9	40,8	19,1	4,4	0,7	0,5	57,5

Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1996-1999)



Nombre de cas déclarés		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Province de Québec	1995	1995	1870	713	318	132
	1996	1886	1789	612	293	142
	1997	1887	1691	602	236	131
	1998	2028	1914	688	291	121
	1999	2287	2144	740	280	139


**Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale
par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par groupe d'âge,
Québec (1996-1999)**



Taux d'incidence par 100 000

		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Province de Québec	1995	822,6	795,7	272,3	98,3	40,2
	1996	767,9	760,1	239,8	93,1	42,5
	1997	767,4	707,5	241,3	77,4	39,3
	1998	827,9	786,6	280,6	99,8	36,3
	1999	942,8	866,2	304,3	100,2	42,0


**Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes
par groupe d'âge, Québec (1996-1999)**



(NB année courante-NB année antérieure)/NB année antérieure*100

Nombre de cas déclarés		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49
Province de Québec	1995	325	658	335	201	97	89
	1996	273	614	330	211	86	77
	1997	254	594	347	200	110	65
	1998	295	763	407	217	152	85
	1999	297	847	426	262	139	118

**Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale
par *Chlamydia trachomatis* chez les hommes par groupe d'âge,
Québec (1996-1999)**




(TI année courante-TI année antérieure)/TI année antérieure*100


Taux d'incidence par 100 000

		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49
Province de Québec	1995	127,4	268,9	122,5	59,8	29,0	15,6
	1996	105,8	249,6	123,9	64,3	25,3	13,2
	1997	98,1	237,5	133,2	63,0	32,2	10,9
	1998	114,9	298,8	158,4	71,3	44,5	14,0
	1999	116,7	325,0	167,5	89,9	40,8	19,1


Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis*
par groupe d'âge, Québec (1995-1999)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale
par *Chlamydia trachomatis*, Québec (1990-1999)




Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1995-1999)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les femmes, Québec (1990-1999)



Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1995-1999)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'infection génitale par *Chlamydia trachomatis* chez les hommes, Québec (1990-1999)



GONORRHÉE



Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	659	1142	86	1887
1991	410	953	24	1387
1992	304	658	10	972
1993	255	495	5	755
1994	229	515	6	750

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	171	431	5	607
1996	145	325	9	479
1997	139	410	7	556
1998	112	373	8	493
1999	137	485	2	624

Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée (1991-1999), Québec





Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence *

	Femmes	Hommes	Total
1991	-37,8	-16,5	-26,5
1992	-25,9	-31,0	-29,9
1993	-16,1	-24,8	-22,3
1994	-14,4	-2,1	-5,9
1995	-25,9	-17,0	-19,7
1996	-15,9	-25,2	-21,7
1997	-4,9	25,2	15,2
1998	-20,0	-9,7	-12,0
1999	21,5	29,1	25,7

*: (taux année courante)-(taux année antérieure)/(taux année antérieure) * 100

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région du Bas-St-Laurent




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	6	4	0	10
1991	4	8	0	12
1992	1	4	0	5
1993	2	4	0	6
1994	2	4	0	6

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	2	4	0	6
1996	0	0	0	0
1997	0	6	1	7
1998	0	5	0	5
1999	0	5	0	5

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région du Saguenay/Lac St-Jean




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	11	12	0	23
1991	17	13	1	31
1992	1	4	0	5
1993	7	1	1	9
1994	4	8	0	12

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	1	5	0	6
1996	0	6	0	6
1997	0	4	0	4
1998	4	5	0	9
1999	1	4	0	5

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région de Québec





Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	14	52	1	67
1991	17	40	1	58
1992	12	43	0	55
1993	8	26	0	34
1994	7	48	0	55

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	1	26	0	27
1996	4	12	0	16
1997	3	23	0	26
1998	6	23	0	29
1999	19	44	0	63

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région de la Mauricie/Centre du Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	34	23	0	57
1991	16	23	0	39
1992	20	8	1	29
1993	3	9	0	12
1994	11	8	0	19

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	2	6	0	8
1996	1	3	0	4
1997	8	4	0	12
1998	2	6	0	8
1999	2	4	0	6

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région de l'Estrée




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	7	4	0	11
1991	4	9	0	13
1992	1	11	1	13
1993	4	8	0	12
1994	4	8	0	12

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	3	4	0	7
1996	0	3	0	3
1997	1	7	0	8
1998	0	2	0	2
1999	1	5	0	6

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région de Montréal centre





Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	337	789	81	1207
1991	214	638	13	865
1992	137	445	3	585
1993	84	324	1	409
1994	107	325	6	438

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	98	292	5	395
1996	89	209	9	307
1997	66	279	6	351
1998	46	255	7	308
1999	74	305	2	381

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région de l'Outaouais




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	42	29	0	71
1991	12	9	0	21
1992	12	15	0	27
1993	8	14	0	22
1994	5	8	0	13

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	4	5	0	9
1996	5	4	0	9
1997	4	9	0	13
1998	7	6	0	13
1999	6	17	0	23

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région de l'Abitibi/Témiscamingue




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	11	11	0	22
1991	7	11	0	18
1992	5	8	0	13
1993	1	5	0	6
1994	2	3	0	5

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	8	8	0	16
1996	6	8	0	14
1997	3	4	0	7
1998	5	1	0	6
1999	1	0	0	1

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région de la Côte-Nord




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	54	42	0	96
1991	34	26	0	60
1992	11	6	0	17
1993	17	11	0	28
1994	3	3	0	6

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	2	5	0	7
1996	3	6	0	9
1997	4	2	0	6
1998	2	0	0	2
1999	0	0	0	0

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région Nord-du-Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	1	1	0	2
1991	0	2	0	2
1992	1	2	0	3
1993	0	0	0	0
1994	2	0	0	2

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	0	0	0
1996	0	0	0	0
1997	0	0	0	0
1998	0	0	0	0
1999	0	0	0	0

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région de la Gaspésie/Iles de la Madeleine





Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	2	2	0	4
1991	0	2	0	2
1992	0	1	0	1
1993	0	1	0	1
1994	1	0	0	1

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	2	0	2
1996	0	3	0	3
1997	0	1	0	1
1998	0	0	0	0
1999	0	0	0	0

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région Chaudière/Appalaches




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	11	14	0	25
1991	3	7	0	10
1992	2	6	0	8
1993	4	6	0	10
1994	5	11	0	16

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	7	0	7
1996	2	3	0	5
1997	1	2	0	3
1998	0	4	0	4
1999	0	5	0	5

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région de Laval




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	20	16	0	36
1991	12	27	0	39
1992	5	12	1	18
1993	9	10	0	19
1994	4	16	0	20

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	5	12	0	17
1996	3	13	0	16
1997	5	8	0	13
1998	4	13	0	17
1999	2	16	0	18

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région de Lanaudière




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	10	14	1	25
1991	9	9	0	18
1992	9	10	0	19
1993	3	4	0	7
1994	7	10	0	17

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	3	4	0	7
1996	6	3	0	9
1997	1	1	0	2
1998	1	7	0	8
1999	4	11	0	15


Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région des Laurentides



Nombre de cas déclarés			
	Femmes	Hommes	Total
1990	19	16	36
1991	5	14	20
1992	3	9	12
1993	6	7	13
1994	3	8	11

Nombre de cas déclarés			
	Femmes	Hommes	Total
1995	7	7	14
1996	1	7	8
1997	3	5	8
1998	5	8	13
1999	6	14	20

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région de la Montérégie





Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	32	78	2	112
1991	25	77	2	104
1992	24	38	1	63
1993	20	41	0	61
1994	15	35	0	50

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	11	36	0	47
1996	6	42	0	48
1997	19	47	0	66
1998	13	34	1	48
1999	16	50	0	66

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région Nunavik




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	41	35	0	76
1991	27	38	6	71
1992	57	35	3	95
1993	79	24	3	106
1994	37	20	0	57

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	17	6	0	23
1996	15	2	0	17
1997	17	6	0	23
1998	9	2	0	11
1999	4	5	0	9

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1999)
Région Terres Cries/Bale-James




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	7	0	0	7
1991	4	0	0	4
1992	3	1	0	4
1993	0	0	0	0
1994	10	0	0	10

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	7	2	0	9
1996	4	1	0	5
1997	4	2	0	6
1998	8	2	0	10
1999	1	0	0	1

Evolution par sexe des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée
 Québec (1984-1999)



Taux d'incidence par 100 000																	
	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	
Femmes	83,8	85,7	70,1	55,6	35,4	19,9	18,8	11,4	8,4	7,0	6,2	4,6	3,9	3,7	2,9	3,6	
Hommes	128,0	121,8	92,3	70,6	40,0	27,9	33,9	27,3	18,7	13,9	14,4	11,9	8,9	11,2	10,1	13,0	
Total	105,6	103,5	87,5	66,6	40,8	24,6	27,4	19,6	13,6	10,5	13,3	8,3	6,5	7,5	6,6	8,3	

Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-santitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)

Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-santitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)																								
Région socio-santitaire	Femmes			Hommes			Manquant			Total	Région socio-santitaire	Femmes			Hommes			Manquant			Total			
	1995	1996	1997	1998	1999		1995	1996	1997	1998	1999		1995	1996	1997	1998	1999		1995	1996	1997	1998	1999	
Bas St-Laurent	2	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	Gaspésie/ Îles de la Madeleine	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	
	0	0	6	1	7	7	0	1	0	0	0	la Madeleine	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	3	
	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0		0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	
	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saguenay/ Lac St-Jean	1	5	0	0	6	6	5	0	0	6	6	Chaudière/ Appalaches	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	7	
	0	6	0	0	6	6	0	0	0	6	6		2	2	0	3	0	5	0	0	0	3	3	
	0	0	4	0	4	4	0	0	4	4	4		1	2	0	3	0	5	1	2	0	3	5	
	4	5	0	0	9	9	5	0	0	9	9		0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	4	
	1	4	0	0	5	5	4	0	0	5	5		0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	5	
Québec	1	26	0	0	27	27	26	0	0	27	27	Laval	5	5	12	0	17	0	17	0	0	17	17	
	4	12	0	0	16	16	12	0	0	16	16		3	3	13	0	16	0	16	0	0	16	16	
	3	23	0	0	26	26	23	0	0	26	26		5	5	8	0	13	0	13	0	0	13	13	
	6	23	0	0	29	29	6	23	0	29	29		4	4	13	0	17	0	17	0	0	17	17	
	19	44	0	0	63	63	19	44	0	63	63		2	2	16	0	18	0	18	0	0	18	18	
Mauricie/ Centre du Québec	2	6	0	0	8	8	6	0	0	8	8	Lanaudière	3	3	4	0	7	0	7	0	0	7	7	
	1	3	0	0	4	4	3	0	0	4	4		6	6	3	0	9	0	9	0	0	9	9	
	8	4	0	0	12	12	8	4	0	12	12		1	1	0	2	1	2	0	2	0	2	2	
	2	6	0	0	8	8	2	6	0	8	8		1	1	7	0	8	0	8	0	0	8	8	
	2	4	0	0	6	6	2	4	0	6	6		4	4	11	0	15	0	15	0	0	15	15	
Estrie	3	4	0	0	7	7	4	0	0	7	7	Laurentides	7	7	0	14	0	14	0	14	0	0	14	14
	0	3	0	0	3	3	0	0	0	3	3		1	1	7	0	8	0	8	0	0	8	8	
	1	7	0	0	8	8	1	7	0	8	8		3	3	5	0	8	0	8	0	0	8	8	
	0	2	0	0	2	2	0	2	0	2	2		5	5	8	0	13	0	13	0	0	13	13	
	1	5	0	0	6	6	1	5	0	6	6		6	6	14	0	20	0	20	0	0	20	20	
Montréal centre	98	292	5	395	395	292	5	0	0	6	6	Montréal	11	11	36	0	47	0	47	0	0	47	47	
	89	209	9	307	307	209	9	0	0	9	9		6	6	42	0	48	0	48	0	0	48	48	
	66	279	6	351	351	279	6	0	0	6	6		19	19	47	0	66	0	66	0	0	66	66	
	46	255	7	308	308	46	255	7	0	7	7		13	13	34	1	48	1	48	1	0	48	48	
	74	305	2	381	381	74	305	2	0	2	2		16	16	50	0	66	0	66	0	0	66	66	
Outaouais	4	5	0	9	9	4	5	0	0	9	9	Nunavik	17	17	6	0	23	0	23	0	0	23	23	
	5	4	0	9	9	5	4	0	0	9	9		15	15	2	0	17	0	17	0	0	17	17	
	4	9	0	13	13	4	9	0	0	13	13		17	17	6	0	23	0	23	0	0	23	23	
	7	6	0	13	13	7	6	0	0	13	13		9	9	2	0	11	0	11	0	0	11	11	
	6	17	0	23	23	6	17	0	0	23	23		4	4	5	0	9	0	9	0	0	9	9	
Abitibi/ Témiscamingue	8	8	0	16	16	8	8	0	0	16	16	Terres Cries/ Baie-James	7	7	2	0	9	0	9	0	0	9	9	
	6	8	0	14	14	6	8	0	0	14	14		4	4	1	0	5	0	5	0	0	5	5	
	3	4	0	7	7	3	4	0	0	7	7		4	4	2	0	6	0	6	0	0	6	6	
	5	1	0	6	6	5	1	0	0	6	6		8	8	2	0	10	0	10	0	0	10	10	
	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1		1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	
Côte-Nord	2	5	0	7	7	2	5	0	0	7	7	Province de Québec	171	171	431	5	607	5	607	5	0	607	607	
	3	6	0	9	9	3	6	0	0	9	9		145	145	325	9	479	9	479	9	0	479	479	
	4	2	0	6	6	4	2	0	0	6	6		139	139	410	7	556	7	556	7	0	556	556	
	2	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2		112	112	373	8	493	8	493	8	0	493	493	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		137	137	485	2	624	2	624	2	0	624	624	
Nord-du-Québec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		137	137	485	2	624	2	624	2	0	624	624	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		137	137	485	2	624	2	624	2	0	624	624	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		137	137	485	2	624	2	624	2	0	624	624	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		137	137	485	2	624	2	624	2	0	624	624	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		137	137	485	2	624	2	624	2	0	624	624	

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-santitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)

Région socio-santitaire	Femmes		Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1995	1,9	3,9	0,0	2,9
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	6,0	0,5	3,4
	1998	0,0	5,0	0,0	2,5
	1999	0,0	5,1	0,0	2,5
Saguenay/	1995	0,7	3,4	0,0	2,1
Lac St-Jean	1996	0,0	4,1	0,0	2,1
	1997	0,0	2,8	0,0	1,4
	1998	2,8	3,5	0,0	3,1
	1999	0,7	2,8	0,0	1,7
Québec	1995	0,3	8,3	0,0	4,2
	1996	1,2	3,8	0,0	2,5
	1997	0,9	7,3	0,0	4,0
	1998	1,8	7,3	0,0	4,4
	1999	5,6	13,9	0,0	9,6
Mauricie/	1995	0,8	2,5	0,0	1,6
Centre du Québec	1996	0,4	1,2	0,0	0,8
	1997	3,2	1,7	0,0	2,5
	1998	0,8	2,5	0,0	1,6
	1999	0,8	1,6	0,0	1,2
Estrie	1995	2,1	2,9	0,0	2,5
	1996	0,0	2,2	0,0	1,1
	1997	0,7	5,0	0,0	2,8
	1998	0,0	1,4	0,0	0,7
	1999	0,7	3,6	0,0	2,1
Montréal	1995	10,2	32,9	0,3	21,4
centre	1996	9,3	23,5	0,5	16,6
	1997	6,8	31,2	0,3	18,9
	1998	4,8	28,4	0,4	16,5
	1999	7,6	33,9	0,1	20,4
Outaouais	1995	2,5	3,2	0,0	2,9
	1996	3,1	2,5	0,0	2,8
	1997	2,5	5,6	0,0	4,0
	1998	4,2	3,7	0,0	4,0
	1999	3,6	10,3	0,0	6,9
Abitibi/	1995	10,3	9,9	0,0	10,1
Témiscamingue	1996	7,7	9,9	0,0	8,8
	1997	3,9	4,9	0,0	4,4
	1998	6,4	1,2	0,0	3,8
	1999	1,3	0,0	0,0	0,6
Côte-Nord	1995	3,9	9,3	0,0	6,7
	1996	5,9	11,1	0,0	8,6
	1997	7,9	3,7	0,0	5,8
	1998	4,0	0,0	0,0	1,9
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du-Québec	1995	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0

Région socio-santitaire	Femmes		Hommes	Manquant	Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1995	0,0	3,8	0,0	1,9
	1996	0,0	5,8	0,0	2,9
	1997	0,0	1,9	0,0	1,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/	1995	0,0	3,6	0,0	1,8
Appalaches	1996	1,0	1,6	0,0	1,3
	1997	0,5	1,0	0,0	0,8
	1998	0,0	2,1	0,0	1,0
	1999	0,0	2,6	0,0	1,3
Laval	1995	2,9	7,1	0,0	5,0
	1996	1,7	7,6	0,0	4,6
	1997	2,8	4,6	0,0	3,7
	1998	2,2	7,4	0,0	4,8
	1999	1,1	9,0	0,0	5,0
Lanaudière	1995	1,6	2,1	0,0	1,8
	1996	3,1	1,5	0,0	2,3
	1997	0,5	0,5	0,0	0,5
	1998	0,5	3,4	0,0	2,0
	1999	2,0	5,3	0,0	3,6
Laurentides	1995	3,2	3,2	0,0	3,2
	1996	0,4	3,1	0,0	1,8
	1997	1,3	2,2	0,0	1,7
	1998	2,1	3,4	0,0	2,8
	1999	2,5	5,8	0,0	4,2
Montréal	1995	1,7	5,5	0,0	3,6
	1996	0,9	6,3	0,0	3,6
	1997	2,8	6,9	0,0	4,8
	1998	1,9	5,0	0,1	3,5
	1999	2,3	7,2	0,0	4,7
Nunavik	1995	374,6	130,4	0,0	251,7
	1996	317,9	42,3	0,0	180,0
	1997	347,6	123,9	0,0	236,3
	1998	178,3	40,3	0,0	109,9
	1999	77,0	98,8	0,0	87,7
Terres Cries/	1995	172,5	45,3	0,0	106,2
Baie-James	1996	99,7	22,7	0,0	59,5
	1997	100,6	45,7	0,0	71,8
	1998	203,6	45,9	0,0	120,7
	1999	25,7	0,0	0,0	12,2
Province de Québec	1995	4,6	11,9	0,1	8,3
	1996	3,9	8,9	0,1	6,5
	1997	3,7	11,2	0,1	7,5
	1998	2,9	10,1	0,1	6,6
	1999	3,6	13,0	0,0	8,3

Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,

Québec (1995-1999)

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	6
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	2	0	0	0	1	2	0	1	7
	1998	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	5
	1999	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
Saguenay/ Lac St-Jean	1995	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	6
	1996	0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	6
	1997	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	4
	1998	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	9
	1999	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	5
Québec	1995	0	0	0	4	5	9	2	5	1	1	27
	1996	0	0	1	4	4	3	3	0	1	0	16
	1997	0	0	1	2	6	7	4	6	0	0	26
	1998	0	0	5	7	3	2	8	4	0	0	29
	1999	0	0	18	13	8	6	8	6	3	1	63
Mauricie/ Centre du Québec	1995	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	8
	1996	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	4
	1997	0	2	0	5	2	1	0	0	0	0	12
	1998	0	0	0	4	2	1	0	1	0	0	8
	1999	0	0	0	3	0	1	1	1	0	0	6
Estrie	1995	0	0	0	3	0	1	0	2	1	0	7
	1996	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
	1997	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	8
	1998	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	1999	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	6
Montréal centre	1995	1	5	45	77	72	74	42	41	3	24	395
	1996	0	1	39	66	49	46	46	17	2	17	307
	1997	0	3	45	61	54	61	54	43	3	15	351
	1998	0	3	27	45	58	65	45	30	2	19	308
	1999	0	1	50	79	72	58	61	40	5	5	381
Outaouais	1995	0	0	2	1	2	3	1	0	0	0	9
	1996	0	0	1	2	2	2	1	0	1	0	9
	1997	0	0	2	6	2	0	2	0	0	1	13
	1998	0	0	4	4	1	0	1	1	2	0	13
	1999	0	0	2	6	5	2	4	3	1	0	23
Abitibi/ Témiscamingue	1995	0	0	2	5	3	3	3	0	0	0	16
	1996	0	0	2	3	2	3	2	0	1	1	14
	1997	0	0	0	2	1	2	0	0	2	0	7
	1998	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	6
	1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Côte-Nord	1995	0	0	0	2	2	0	1	2	0	0	7
	1996	0	0	4	1	4	0	0	0	0	0	9
	1997	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	6
	1998	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord-du Québec	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1995-1999) suite

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995 0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	1996 0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	1997 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/	1995 0	0	2	1	2	0	0	0	0	1	1	7
Appalaches	1996 0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	5
	1997 0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
	1998 0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4
	1999 0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5
Laval	1995 0	0	1	6	4	3	2	1	0	0	0	17
	1996 0	0	5	1	5	2	0	3	0	0	0	16
	1997 0	0	3	4	1	3	2	0	0	0	0	13
	1998 0	0	2	4	1	3	4	2	1	0	0	17
	1999 0	0	0	1	5	3	3	3	3	0	0	18
Lanaudière	1995 1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	7
	1996 0	0	0	2	4	0	1	2	0	0	0	9
	1997 0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	1998 0	0	0	3	2	1	0	2	0	0	0	8
	1999 0	1	1	3	3	2	3	2	0	0	0	15
Laurentides	1995 0	0	1	3	4	2	3	1	0	0	0	14
	1996 0	0	0	3	3	0	1	0	1	0	0	8
	1997 0	0	2	1	2	2	1	0	0	0	0	8
	1998 0	0	3	5	1	1	1	2	0	0	0	13
	1999 0	1	4	3	4	4	2	1	1	0	0	20
Montréal	1995 0	0	7	9	10	7	4	7	2	0	1	47
	1996 0	1	8	6	4	9	7	11	2	0	0	48
	1997 0	1	15	11	12	7	8	8	4	0	0	66
	1998 0	0	6	14	10	4	6	7	0	1	0	48
	1999 0	0	10	18	9	8	7	11	3	0	0	66
Nunavik	1995 0	0	10	7	1	1	2	1	0	0	1	23
	1996 0	0	2	5	4	2	4	0	0	0	0	17
	1997 0	1	4	7	5	3	1	1	1	0	0	23
	1998 0	1	2	4	3	0	1	0	0	0	0	11
	1999 0	0	2	5	0	2	0	0	0	0	0	9
Terres Cries/ Bate James	1995 0	1	3	3	1	1	0	0	0	0	0	9
	1996 0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	1	5
	1997 0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	6
	1998 1	0	0	6	1	1	0	1	0	0	0	10
	1999 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Province de Québec	1995 2	7	76	127	109	112	62	65	14	6	27	607
	1996 0	3	64	99	83	71	67	49	21	4	18	479
	1997 0	8	82	105	91	88	75	64	23	3	17	556
	1998 1	4	53	105	84	82	70	55	17	3	19	493
	1999 0	4	91	133	108	88	93	74	21	7	5	624

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1995-1999)

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995 0,0	0,0	0,0	16,6	8,9	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	5,7	5,8	4,2	0,0	0,5	3,4
	1998 0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	7,9	5,9	5,7	0,0	0,0	0,0	2,5
	1999 0,0	0,0	6,8	0,0	9,7	0,0	6,1	2,8	0,0	2,5	0,0	2,5
Saguenay/ Lac St-Jean	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	2,1
	1996 0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,3	0,0	6,5	3,2	0,0	0,0	2,1
	1997 0,0	0,0	0,0	5,1	6,1	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	1,4
	1998 0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	7,7	4,2	0,0	0,0	0,0	3,1
	1999 0,0	0,0	4,3	4,8	0,0	0,0	4,0	4,1	0,0	0,0	0,0	1,7
Québec	1995 0,0	0,0	0,0	8,9	10,5	16,1	3,4	4,7	1,4	0,9	0,0	4,2
	1996 0,0	0,0	2,3	9,1	8,6	5,5	5,1	0,0	1,3	0,0	0,0	2,5
	1997 0,0	0,0	2,3	4,5	13,3	13,4	6,9	5,5	0,0	0,0	0,0	4,0
	1998 0,0	0,0	11,9	15,8	6,8	4,0	13,9	3,6	0,0	0,0	0,0	4,4
	1999 0,0	0,0	44,0	28,9	18,4	12,6	14,1	5,3	3,5	0,9	0,0	9,6
Mauricie/ Centre du Québec	1995 0,0	0,0	2,8	6,9	6,7	5,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6
	1996 0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	5,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	1997 0,0	3,3	0,0	16,4	7,1	5,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	1998 0,0	0,0	0,0	12,7	7,2	2,9	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,6
	1999 0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	3,1	2,4	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
Estrie	1995 0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	4,4	0,0	4,6	0,0	2,0	0,0	2,5
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	1,1
	1997 0,0	0,0	14,4	5,2	5,6	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	2,8
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,2	4,3	6,5	0,0	0,0	0,0	2,1
Montréal centre	1995 0,9	2,6	42,9	60,2	45,7	43,6	27,0	15,4	5,6	0,8	1,3	21,4
	1996 0,0	0,5	36,8	52,5	32,3	27,6	29,0	10,7	5,9	0,5	0,9	16,6
	1997 0,0	1,5	42,3	48,5	37,1	37,4	33,9	15,6	5,8	0,8	0,8	18,9
	1998 0,0	1,5	25,3	35,4	41,3	41,2	28,1	10,7	6,5	0,5	1,0	16,5
	1999 0,0	0,5	47,0	61,3	52,7	38,2	38,1	14,1	4,5	1,3	0,3	20,4
Outaouais	1995 0,0	0,0	9,8	4,7	8,1	9,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	1996 0,0	0,0	4,9	9,3	8,3	6,6	3,2	0,0	3,1	0,0	0,0	2,8
	1997 0,0	0,0	9,5	27,6	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,0
	1998 0,0	0,0	18,9	18,1	4,3	0,0	3,2	1,8	5,5	0,0	0,0	4,0
	1999 0,0	0,0	9,3	27,0	21,2	7,3	12,6	5,4	2,6	0,0	0,0	6,9
Abitibi/ Témiscamingue	1995 0,0	0,0	16,1	46,8	26,4	20,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
	1996 0,0	0,0	16,1	27,4	18,2	21,2	13,2	0,0	6,6	4,8	0,0	8,8
	1997 0,0	0,0	18,0	18,0	9,3	14,7	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	4,4
	1998 0,0	0,0	24,2	8,8	9,4	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
	1999 0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Côte-Nord	1995 0,0	0,0	0,0	26,3	24,8	0,0	10,3	12,0	0,0	0,0	0,0	6,7
	1996 0,0	0,0	48,9	13,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
	1997 0,0	7,2	12,5	25,8	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
	1998 0,0	0,0	12,9	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du Québec	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge,
 Québec (1995-1999) suite

Région socio-santaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995 0,0	0,0	0,0	14,7	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1996 0,0	0,0	13,4	14,8	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/	1995 0,0	0,0	6,8	4,1	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,3	1,8
Appalaches	1996 0,0	0,0	0,0	8,0	4,2	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,3
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,2	0,0	0,0	0,0	0,8
	1998 0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	7,2	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,0
	1999 0,0	0,0	3,5	3,7	0,0	3,8	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,3
Laval	1995 0,0	0,0	4,4	26,9	15,9	9,5	6,4	1,9	0,0	0,0	0,0	5,0
	1996 0,0	0,0	21,7	4,5	20,2	6,5	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	4,6
	1997 0,0	0,0	12,8	18,0	4,1	10,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
	1998 0,0	0,0	8,5	17,7	4,2	10,3	12,1	3,5	2,3	0,0	0,0	4,8
	1999 0,0	0,0	0,0	4,3	21,4	10,7	9,1	5,1	6,8	0,0	0,0	5,0
Lanaudière	1995 3,7	1,8	7,7	4,7	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
	1996 0,0	0,0	0,0	9,0	16,1	0,0	2,5	3,2	0,0	0,0	0,0	2,3
	1997 0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998 0,0	0,0	0,0	12,5	8,1	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	2,0
	1999 0,0	1,7	3,6	12,1	12,0	6,1	7,4	2,9	0,0	0,0	0,0	3,6
Laurentides	1995 0,0	0,0	3,5	11,7	13,1	4,7	7,1	1,5	0,0	0,0	0,0	3,2
	1996 0,0	0,0	11,5	10,0	10,0	0,0	2,2	0,0	2,1	0,0	0,0	1,8
	1997 0,0	0,0	6,6	3,7	6,7	4,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
	1998 0,0	0,0	9,8	17,9	3,3	2,5	2,2	2,6	0,0	0,0	0,0	2,8
	1999 0,0	1,5	12,9	10,4	13,2	10,4	4,2	1,3	1,8	0,0	0,0	4,2
Montréal	1995 0,0	0,0	7,4	10,5	10,6	5,8	3,3	3,3	1,4	0,0	0,1	3,6
	1996 0,0	0,6	8,4	6,9	4,3	7,6	5,6	5,1	1,3	0,0	0,0	3,6
	1997 0,0	0,5	15,7	12,4	13,0	6,1	6,3	3,6	2,5	0,0	0,0	4,8
	1998 0,0	0,0	6,3	15,4	10,8	3,6	4,7	3,1	0,0	0,5	0,0	3,5
	1999 0,0	0,0	10,6	19,3	9,7	7,4	5,5	4,8	1,7	0,0	0,0	4,7
Nunavik	1995 0,0	0,0	1176,5	820,6	116,0	121,7	320,0	113,5	0,0	0,0	10,9	251,7
	1996 0,0	0,0	226,2	572,7	453,5	241,8	576,4	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
	1997 0,0	42,7	441,5	765,0	576,0	347,2	134,6	102,6	193,4	0,0	0,0	236,3
	1998 0,0	43,2	211,4	435,3	327,5	0,0	125,9	0,0	0,0	0,0	0,0	109,9
	1999 0,0	0,0	200,8	537,6	0,0	230,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7
Terres Cries/ Bate James	1995 0,0	54,5	348,8	325,7	123,2	147,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,2
	1996 0,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	175,4	0,0	0,0	0,0	11,9	59,5
	1997 0,0	0,0	360,6	230,9	121,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,8
	1998 110,1	0,0	0,0	745,3	119,9	143,5	0,0	121,7	0,0	0,0	0,0	120,7
	1999 0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
Province de Québec	1995 0,4	0,8	15,3	26,5	20,4	17,0	9,4	5,7	1,8	0,5	0,4	8,3
	1996 0,0	0,3	12,7	20,6	15,9	11,0	9,9	4,2	2,6	0,3	0,2	6,5
	1997 0,0	0,9	16,2	21,1	17,8	14,1	11,1	5,4	2,7	0,2	0,2	7,5
	1998 0,2	0,4	10,6	21,1	16,7	13,8	10,4	4,5	1,9	0,2	0,3	6,6
	1999 0,0	0,4	18,3	26,2	21,7	15,4	13,9	6,0	2,3	0,5	0,1	8,3

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-santitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-santitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995 0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saguenay/Lac St-Jean	1995 0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	1999 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Québec	1995 0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1996 0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	4
	1997 0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3
	1998 0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6
	1999 0	0	12	5	1	0	0	1	0	0	0	19
Mauricie/Centre du Québec	1995 0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	1996 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1997 0	2	0	4	1	0	1	0	0	0	0	8
	1998 0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	1999 0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Estrie	1995 0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Montréal centre	1995 1	5	39	26	12	4	7	0	0	0	4	98
	1996 0	1	34	26	9	10	5	2	0	0	2	89
	1997 0	3	31	18	3	4	1	3	3	0	0	66
	1998 0	3	20	10	6	3	2	0	1	0	1	46
	1999 0	1	35	24	5	2	4	1	0	1	1	74
Outaouais	1995 0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4
	1996 0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	5
	1997 0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	4
	1998 0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	0	7
	1999 0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	6
Abitibi/Témiscamingue	1995 0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	8
	1996 0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	6
	1997 0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
	1998 0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	5
	1999 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Côte-Nord	1995 0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	1996 0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	1997 0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4
	1998 0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord-du Québec	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) suite

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/ Appalaches	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	1997 0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laval	1995 0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	5
	1996 0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	1997 0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	5
	1998 0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
	1999 0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Lanaudière	1995 0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	1996 0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	6
	1997 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1998 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1999 0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4
Laurentides	1995 0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	7
	1996 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1997 0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	1998 0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	5
	1999 0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	6
Montréal	1995 0	0	4	0	3	2	2	0	0	0	0	11
	1996 0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	6
	1997 0	1	12	5	1	0	0	0	0	0	0	19
	1998 0	0	3	5	4	0	0	0	0	1	0	13
	1999 0	0	6	5	1	3	0	1	0	0	0	16
Numavik	1995 0	0	7	6	1	1	1	0	0	0	1	17
	1996 0	0	2	5	3	2	3	0	0	0	0	15
	1997 0	1	4	4	4	2	1	0	1	0	0	17
	1998 0	1	2	4	2	0	0	0	0	0	0	9
	1999 0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4
Terres Cries/ Bate James	1995 0	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	7
	1996 0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	4
	1997 0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
	1998 0	0	0	5	1	1	0	1	0	0	0	8
	1999 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Province de Québec	1995 1	7	60	49	23	10	11	5	0	0	5	171
	1996 0	3	47	43	22	14	8	4	1	0	3	145
	1997 0	8	56	41	12	9	4	4	4	0	1	139
	1998 0	4	40	42	14	4	2	2	2	1	1	112
	1999 0	4	61	44	9	6	7	4	0	1	1	137

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995 0,0	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saguenay/Lac St-Jean	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,7
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998 0,0	0,0	0,0	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	1999 0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Québec	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,3
	1996 0,0	0,0	0,0	9,2	4,4	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	1,2
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	3,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,9
	1998 0,0	0,0	14,6	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
	1999 0,0	0,0	60,1	22,5	4,7	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	5,6
Mauricie/Centre du Québec	1995 0,0	0,0	5,8	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	1996 0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	1997 0,0	6,7	0,0	27,0	7,3	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	1998 0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	1999 0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Estrie	1995 0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	2,1
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Montréal centre	1995 1,9	5,4	75,0	40,8	15,7	4,9	9,0	0,0	0,0	0,0	0,4	10,2
	1996 0,0	1,1	64,5	41,8	12,2	12,5	6,3	1,4	0,0	0,0	0,2	9,3
	1997 0,0	3,1	58,8	28,9	4,2	5,1	1,3	2,1	2,7	0,0	0,0	6,8
	1998 0,0	3,1	37,8	16,0	8,8	4,0	2,5	0,0	0,9	0,0	0,1	4,8
	1999 0,0	1,0	66,3	37,7	7,6	2,7	5,1	0,7	0,0	0,4	0,1	7,6
Ottawa	1995 0,0	0,0	20,0	9,5	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	1996 0,0	0,0	9,8	18,8	8,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	1997 0,0	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,5
	1998 0,0	0,0	38,1	9,1	0,0	0,0	0,0	3,7	5,6	0,0	0,0	4,2
	1999 0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
Abitibi/Témiscamingue	1995 0,0	0,0	33,0	38,8	35,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
	1996 0,0	0,0	33,2	18,9	37,4	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
	1997 0,0	0,0	0,0	18,6	19,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
	1998 0,0	0,0	50,8	18,2	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
	1999 0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Côte-Nord	1995 0,0	0,0	0,0	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
	1996 0,0	0,0	51,8	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	1997 0,0	14,6	0,0	54,8	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
	1998 0,0	0,0	27,4	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du Québec	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) suite

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/Appalaches	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laval	1995	0,0	0,0	9,1	18,6	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	1996	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
	1997	0,0	0,0	26,4	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	1998	0,0	0,0	17,4	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Lanaudière	1995	0,0	3,7	8,1	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
	1996	0,0	0,0	0,0	9,3	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	1997	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1999	0,0	3,5	7,6	0,0	0,0	6,1	5,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Laurentides	1995	0,0	0,0	7,3	16,0	6,6	4,7	4,8	0,0	0,0	0,0	3,2
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	1997	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	1998	0,0	0,0	13,5	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	1999	0,0	3,0	26,9	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	2,5
Montréal	1995	0,0	0,0	8,7	0,0	6,5	3,4	3,3	0,0	0,0	0,0	1,7
	1996	0,0	1,1	6,5	2,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	1997	0,0	1,1	25,8	11,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	1998	0,0	0,0	6,5	11,3	8,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	1,9
	1999	0,0	0,0	13,0	11,0	2,2	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
Nunavik	1995	0,0	0,0	1587,3	1357,5	237,0	238,1	374,5	0,0	0,0	22,0	374,6
	1996	0,0	0,0	434,8	1073,0	683,4	492,6	974,0	0,0	0,0	0,0	317,9
	1997	0,0	84,1	851,1	831,6	923,8	469,5	293,3	339,0	0,0	0,0	347,6
	1998	0,0	84,7	405,7	818,0	425,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,3
	1999	0,0	0,0	375,2	396,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0
Terres Cries/Bate James	1995	0,0	113,8	484,3	649,4	289,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,5
	1996	0,0	0,0	0,0	668,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	99,7
	1997	0,0	0,0	771,2	241,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,6
	1998	0,0	0,0	0,0	1302,1	259,7	322,6	268,1	0,0	0,0	0,0	203,6
	1999	0,0	123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7
Province de Québec	1995	0,4	1,5	24,7	20,9	8,8	3,1	3,3	0,0	0,0	0,1	4,6
	1996	0,0	0,7	19,1	18,3	8,6	4,4	2,4	0,2	0,0	0,1	3,9
	1997	0,0	1,8	22,8	17,2	4,8	3,0	1,2	0,7	0,0	0,0	3,7
	1998	0,0	0,9	16,3	17,3	5,7	1,4	0,6	0,4	0,1	0,0	2,9
	1999	0,0	0,9	25,1	17,8	3,7	2,1	2,1	0,0	0,1	0,0	3,6

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1995-1999)

Région socio-santaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995 0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	2	0	0	0	1	2	1	0	0	6
	1998 0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	5
	1999 0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	5
Saguenay/ Lac St-Jean	1995 0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	5
	1996 0	0	1	0	0	1	0	3	1	0	0	6
	1997 0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	4
	1998 0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	5
	1999 0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	4
Québec	1995 0	0	0	4	5	9	2	4	1	1	0	26
	1996 0	0	1	2	3	3	3	0	0	0	0	12
	1997 0	0	1	2	5	6	4	5	0	0	0	23
	1998 0	0	2	4	3	2	8	4	0	0	0	23
	1999 0	0	6	8	7	6	8	5	3	1	0	44
Mauricie/ Centre du Québec	1995 0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	6
	1996 0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3
	1997 0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	4
	1998 0	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	6
	1999 0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	4
Estrie	1995 0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	4
	1996 0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
	1997 0	0	3	0	1	0	0	0	3	0	0	7
	1998 0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	1999 0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	5
Montréal centre	1995 0	0	6	51	58	69	35	41	11	3	18	292
	1996 0	0	5	39	40	36	38	27	12	2	10	209
	1997 0	0	14	42	51	57	52	40	9	2	12	279
	1998 0	0	7	34	52	62	43	30	13	2	12	255
	1999 0	0	14	55	67	56	57	39	10	4	3	305
Outaouais	1995 0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	5
	1996 0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	4
	1997 0	0	2	3	2	0	9	0	0	0	0	9
	1998 0	0	0	3	1	0	1	0	1	0	0	6
	1999 0	0	2	1	5	2	4	2	1	0	0	17
Abitibi/ Témiscamingue	1995 0	0	0	3	1	1	3	0	0	0	0	8
	1996 0	0	0	2	0	2	2	0	1	1	0	8
	1997 0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	4
	1998 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Côte-Nord	1995 0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	5
	1996 0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	6
	1997 0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord-du Québec	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1995-1999) suite

Région socio-santaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995 0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	1996 0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
	1997 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/ Appalaches	1995 0	0	2	1	2	0	0	0	0	1	1	7
	1996 0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3
	1997 0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	1998 0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4
	1999 0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	5
Laval	1995 0	0	0	4	2	3	2	1	0	0	0	12
	1996 0	0	2	1	5	2	0	3	0	0	0	13
	1997 0	0	0	2	1	3	2	0	0	0	0	8
	1998 0	0	0	2	1	3	4	2	1	0	0	13
	1999 0	0	0	1	4	3	2	3	3	0	0	16
Lanaudière	1995 1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	4
	1996 0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3
	1997 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1998 0	0	0	2	2	1	0	2	0	0	0	7
	1999 0	0	0	3	3	1	2	2	0	0	0	11
Laurentides	1995 0	0	0	1	3	1	2	0	0	0	0	7
	1996 0	0	0	3	2	0	1	0	1	0	0	7
	1997 0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	5
	1998 0	0	1	2	1	1	1	2	0	0	0	8
	1999 0	0	0	3	4	4	1	1	1	0	0	14
Montréal	1995 0	0	3	9	7	5	2	7	2	0	1	36
	1996 0	0	5	5	3	9	7	11	2	0	0	42
	1997 0	0	3	6	11	7	8	8	4	0	0	47
	1998 0	0	3	8	6	4	6	7	0	0	0	34
	1999 0	0	4	13	8	5	7	10	3	0	0	50
Nunavik	1995 0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0	6
	1996 0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	1997 0	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	6
	1998 0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	1999 0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	5
Terres Cries/ Baie James	1995 0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	1996 0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1997 0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	1998 1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1995 1	0	16	78	84	101	51	60	14	6	20	431
	1996 0	0	17	55	61	57	56	45	20	4	10	325
	1997 0	0	26	63	79	79	70	60	19	2	12	410
	1998 1	0	13	61	70	78	68	53	15	2	12	373
	1999 0	0	29	89	99	82	86	70	21	6	3	485


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-santitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-santitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	8,4	0,0	0,0	6,0
	1998 0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	15,9	12,0	11,4	0,0	0,0	0,0	5,0
	1999 0,0	0,0	13,5	0,0	19,4	0,0	12,5	5,7	0,0	5,8	0,0	5,1
Saguenay/	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	3,4
Lac St-Jean	1996 0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	8,4	0,0	12,7	6,5	0,0	0,0	4,1
	1997 0,0	0,0	0,0	9,7	11,8	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	2,8
	1998 0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	15,2	8,1	0,0	0,0	0,0	3,5
	1999 0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	7,9	8,0	0,0	0,0	0,0	2,8
Québec	1995 0,0	0,0	0,0	17,7	20,5	31,4	6,8	7,7	2,9	2,3	0,0	8,3
	1996 0,0	0,0	4,6	8,9	12,7	10,8	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
	1997 0,0	0,0	4,6	8,9	21,7	22,5	13,6	9,3	0,0	0,0	0,0	7,3
	1998 0,0	0,0	9,4	17,8	13,3	7,9	27,3	7,3	0,0	0,0	0,0	7,3
	1999 0,0	0,0	28,7	35,2	31,7	24,7	27,7	9,0	7,1	2,1	0,0	13,9
Mauricie/	1995 0,0	0,0	0,0	6,7	12,9	9,9	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	2,5
Centre du Québec	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	1997 0,0	0,0	0,0	6,4	6,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
	1998 0,0	0,0	0,0	12,3	13,9	5,7	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,5
	1999 0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,1	4,8	2,4	0,0	0,0	0,0	1,6
Estrie	1995 0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	2,9
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	2,2
	1997 0,0	0,0	28,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	5,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	8,5	13,0	0,0	0,0	0,0	3,6
Montréal	1995 0,0	0,0	11,3	79,5	71,5	78,3	44,8	31,8	11,8	2,0	2,0	32,9
centre	1996 0,0	0,0	9,4	61,4	51,4	41,6	47,6	20,5	12,6	1,3	1,1	23,5
	1997 0,0	0,0	26,1	66,0	68,2	67,3	64,6	29,9	9,2	1,3	1,3	31,2
	1998 0,0	0,0	13,1	52,7	71,9	75,9	53,1	22,1	12,8	1,3	1,3	28,4
	1999 0,0	0,0	26,2	84,1	95,2	71,3	70,0	28,2	9,6	2,6	0,3	33,9
Outaouais	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	19,5	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	6,6	6,5	0,0	6,2	0,0	0,0	2,5
	1997 0,0	0,0	18,8	27,3	17,1	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
	1998 0,0	0,0	0,0	27,0	8,5	0,0	6,3	0,0	5,4	0,0	0,0	3,7
	1999 0,0	0,0	18,4	9,0	42,4	14,8	25,1	7,1	5,1	0,0	0,0	10,3
Abitibi/	1995 0,0	0,0	0,0	54,2	17,2	13,2	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
Témiscamingue	1996 0,0	0,0	0,0	35,5	0,0	27,3	25,4	0,0	12,9	10,1	0,0	9,9
	1997 0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	14,3	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	4,9
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	0,0	19,8	23,1	0,0	0,0	0,0	9,3
	1996 0,0	0,0	46,4	24,6	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
	1997 0,0	0,0	23,6	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Québec	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) suite

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995 0,0	0,0	0,0	28,9	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
	1996 0,0	0,0	25,9	28,8	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/	1995 0,0	0,0	13,1	7,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,5	3,6
Appalaches	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	3,2	0,0	3,7	0,0	1,6
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998 0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	14,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	2,1
	1999 0,0	0,0	6,7	7,1	0,0	7,3	5,9	3,0	0,0	0,0	0,0	2,6
Laval	1995 0,0	0,0	0,0	34,6	15,4	18,6	12,8	3,9	0,0	0,0	0,0	7,1
	1996 0,0	0,0	16,8	8,8	39,3	12,6	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	7,6
	1997 0,0	0,0	0,0	17,4	8,1	19,4	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
	1998 0,0	0,0	0,0	17,1	8,2	20,0	24,2	7,1	4,8	0,0	0,0	7,4
	1999 0,0	0,0	0,0	8,4	33,4	20,7	12,0	10,3	14,1	0,0	0,0	9,0
Lanaudière	1995 7,1	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	1996 0,0	0,0	0,0	8,8	8,1	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998 0,0	0,0	0,0	16,1	16,0	5,9	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	3,4
	1999 0,0	0,0	0,0	23,2	24,0	6,1	9,7	5,6	0,0	0,0	0,0	5,3
Laurentides	1995 0,0	0,0	0,0	7,6	19,5	4,7	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
	1996 0,0	0,0	0,0	22,2	13,2	0,0	4,4	0,0	4,1	0,0	0,0	3,1
	1997 0,0	0,0	0,0	7,2	13,3	4,8	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	1998 0,0	0,0	6,3	13,8	6,6	5,0	4,3	5,1	0,0	0,0	0,0	3,4
	1999 0,0	0,0	0,0	20,2	26,3	20,6	4,2	2,4	3,5	0,0	0,0	5,8
Montréal	1995 0,0	0,0	6,2	20,5	14,6	8,2	3,3	6,6	2,8	0,0	0,2	5,5
	1996 0,0	0,0	10,2	11,2	6,3	15,0	11,1	10,1	2,7	0,0	0,0	6,3
	1997 0,0	0,0	6,1	13,2	23,3	12,0	12,5	7,2	5,0	0,0	0,0	6,9
	1998 0,0	0,0	6,1	17,2	12,7	7,1	9,3	6,2	0,0	0,0	0,0	5,0
	1999 0,0	0,0	8,3	27,3	17,0	9,1	10,8	8,6	3,4	0,0	0,0	7,2
Nunavik	1995 0,0	0,0	733,5	243,3	0,0	0,0	279,3	211,4	0,0	0,0	0,0	130,4
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	225,7	0,0	259,1	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3
	1997 0,0	0,0	0,0	691,2	229,9	228,3	0,0	186,6	0,0	0,0	0,0	123,9
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	224,2	0,0	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	40,3
	1999 0,0	0,0	0,0	704,2	0,0	441,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8
Terres Cries/	1995 0,0	0,0	223,7	0,0	0,0	271,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,3
Bate James	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,7	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
	1997 0,0	0,0	0,0	221,2	223,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7
	1998 213,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1995 0,4	0,0	6,3	31,9	30,7	30,0	15,3	10,5	3,7	1,2	0,6	11,9
	1996 0,0	0,0	6,6	22,4	22,9	17,4	16,5	7,7	5,0	0,8	0,3	8,9
	1997 0,0	0,0	10,0	25,2	30,3	24,9	20,5	10,1	4,5	0,4	0,3	11,2
	1998 0,4	0,0	5,1	23,9	27,2	25,6	19,9	8,7	3,4	0,4	0,3	10,1
	1999 0,0	0,0	11,4	34,2	38,9	28,1	25,3	11,3	4,6	1,1	0,1	13,0


Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes
par groupe d'âge, Québec (1996-1999)



(NB année courante-NB année antérieure)/NB année antérieure*100

Nombre de cas déclarés		15-19	20-24	25-29	30-34
Province de Québec	1995	60	49	23	10
	1996	47	43	22	14
	1997	56	41	12	9
	1998	40	42	14	4
	1999	61	44	9	6


Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1996-1999)



Taux d'incidence par 100 000


	15-19	20-24	25-29	30-34	
Province	1995	24,7	20,9	8,8	3,1
de Québec	1996	19,1	18,3	8,6	4,4
	1997	22,8	17,2	4,8	3,0
	1998	16,3	17,3	5,7	1,4
	1999	25,1	17,8	3,7	2,1

**Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes
par groupe d'âge, Québec (1996-1999)**



Nombre de cas déclarés		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	Total
Province de Québec	1995	16	78	84	101	51	60	0
	1996	17	55	61	57	56	45	0
	1997	26	63	79	79	70	60	0
	1998	13	61	70	78	68	53	0
	1999	29	89	99	82	86	70	0


Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1996-1999)




(TI année courante-TI année antérieure)/TI année antérieure*100

Taux d'incidence par 100 000		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	Total
Province de Québec	1995	6,3	31,9	30,7	30,0	15,3	10,5	0,0
	1996	6,6	22,4	22,9	17,4	16,5	7,7	0,0
	1997	10,0	25,2	30,3	24,9	20,5	10,1	0,0
	1998	5,1	23,9	27,2	25,6	19,9	8,7	0,0
	1999	11,4	34,2	38,9	28,1	25,3	11,3	0,0


Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée par groupe d'âge,
Québec (1995-1999)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée,
Québec (1990-1999)




Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1995-1999)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes, Québec (1990-1999)



Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1995-1999)



Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes, Québec (1990-1999)



Nombre et pourcentage de cas déclarés de gonorrhée causée par un *Neisseria gonorrhoeae* producteur de pénicillinase (NGPP) ¹ par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995 - 1999)

Région socio-sanitaire		Femmes		Hommes		Manquant		Total	
		Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Bas St-Laurent	1995	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1996	0	-	0	-	0	-	0	-
	1997	0	-	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1998	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1995	0	0,0	1	20,0	0	-	1	16,7
	1996	0	-	1	16,7	0	-	1	16,7
	1997	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	3	60,0	0	-	3	33,3
	1999	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Québec	1995	0	0,0	2	7,7	0	-	2	7,4
	1996	1	25,0	1	8,3	0	-	2	12,5
	1997	0	0,0	2	8,7	0	-	2	7,7
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	1	5,3	2	4,5	0	-	3	4,8
Mauricie/ Centre du Québec	1995	0	0,0	2	33,3	0	-	2	25,0
	1996	0	0,0	1	33,3	0	-	1	25,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Estrie	1995	0	0,0	1	25,0	0	-	1	14,3
	1996	0	-	3	100,0	0	-	3	100,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	-	1	50,0	0	-	1	50,0
	1999	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Montréal centre	1995	6	6,1	13	4,5	0	0,0	19	4,8
	1996	2	2,2	21	10,0	3	33,3	26	8,5
	1997	9	13,6	20	7,2	0	0,0	29	8,3
	1998	2	4,3	15	5,9	0	0,0	17	5,5
	1999	3	4,1	21	6,9	0	0,0	24	6,3
Outaouais	1995	0	0,0	2	40,0	0	-	2	22,2
	1996	1	20,0	1	25,0	0	-	2	22,2
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	1	16,7	0	-	1	7,7
	1999	0	0,0	1	5,9	0	-	1	4,3
Abitibi/ Témiscamingue	1995	1	12,5	1	12,5	0	-	2	12,5
	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	1	25,0	0	-	1	14,3
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	0,0	0	-	0	-	0	0,0
Côte-Nord	1995	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	-	0	-	0	0,0
	1999	0	-	0	-	0	-	0	-
Nord-du- Québec	1995	0	-	0	-	0	-	0	-
	1996	0	-	0	-	0	-	0	-
	1997	0	-	0	-	0	-	0	-
	1998	0	-	0	-	0	-	0	-
	1999	0	-	0	-	0	-	0	-

(1): On inclus ici les cas confirmés de NGPP par le LSPQ ainsi que les cas déclarés comme étant causés par une souche "B-Lactame positive" mais non-confirmée par le LSPQ. Certains doublons ne peuvent pas être éliminés de la banque dépersonnalisée.

-: Aucun cas de gonorrhée déclaré

Nombre et pourcentage de cas déclarés de gonorrhée causée par un *Neisseria gonorrhoeae* producteur de pénicillinase (NGPP) ¹ par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995 - 1999) suite

Région socio-sanitaire		Femmes		Hommes		Manquant		Total	
		Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Gaspésie/ Îles de la Madeleine	1995	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1996	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	-	0	-	0	-	0	-
	1999	0	-	0	-	0	-	0	-
Chaudière/ Appalaches	1995	0	-	1	14,3	0	-	1	14,3
	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	-	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	-	1	20,0	0	-	1	20,0
Laval	1995	0	0,0	3	25,0	0	-	3	17,6
	1996	0	0,0	2	15,4	0	-	2	12,5
	1997	0	0,0	1	12,5	0	-	1	7,7
	1998	0	0,0	1	7,7	0	-	1	5,9
	1999	0	0,0	1	6,3	0	-	1	5,6
Lanaudière	1995	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1996	1	16,7	0	0,0	0	-	1	11,1
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	1	14,3	0	-	1	12,5
	1999	1	25,0	1	9,1	0	-	2	13,3
Laurentides	1995	2	28,6	1	14,3	0	-	3	21,4
	1996	1	100,0	0	0,0	0	-	1	12,5
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Montérégie	1995	0	0,0	2	5,6	0	-	2	4,3
	1996	0	0,0	3	7,1	0	-	3	6,3
	1997	0	0,0	5	10,6	0	-	5	7,6
	1998	1	7,7	1	2,9	0	0,0	2	4,2
	1999	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Kativik	1995	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
Terres Cries/ Baie-James	1995	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1996	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1997	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1998	0	0,0	0	0,0	0	-	0	0,0
	1999	0	0,0	0	-	0	-	0	0,0
Province de Québec	1995	9	5,3	29	6,7	0	0,0	38	6,3
	1996	6	4,1	33	10,2	3	33,3	42	8,8
	1997	9	6,5	29	7,1	0	0,0	38	6,8
	1998	3	2,7	23	6,2	0	0,0	26	5,3
	1999	5	3,6	27	5,6	0	0,0	32	5,1


(1): On inclus ici les cas confirmés de NGPP par le LSPQ ainsi que les cas déclarés comme étant causés par une souche "B-Lactame positive" mais non-confirmée par le LSPQ. Certains doublons ne peuvent pas être éliminés de la banque dépersonnalisée.

-: Aucun cas de gonorrhée déclaré

HÉPATITE B



Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1995-1999)
Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	142	303	0	445
1991	156	266	0	422
1992	143	311	0	454
1993	133	318	0	451
1994	112	232	0	344

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	66	201	0	267
1996	75	197	0	272
1997	72	158	1	231
1998	59	119	0	178
1999	51	112	0	163

**Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aigüe
(1990-1999), Québec**




Pourcentages annuels de variation des taux d'incidence *


	Femmes	Hommes	Total
1991	9,9	-12,2	-5,2
1992	-8,3	16,9	7,6
1993	-7,0	2,3	-0,7
1994	-15,8	-27,0	-23,7
1995	-44,3	-19,2	-27,1
1996	12,7	-2,8	1,1
1997	-4,7	-20,4	-15,7
1998	-18,6	-25,3	-23,5
1999	-14,2	-6,6	-9,1

*: (taux année courante)-(taux année antérieure)/(taux année antérieure) * 100

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région du Bas-St-Laurent




Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région du Saguenay/Lac St-Jean



Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	2	0	0	2
1996	2	3	0	5
1997	0	4	0	4
1998	0	1	0	1
1999	0	3	0	3

Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	3	4	0	7
1991	3	3	0	6
1992	1	2	0	3
1993	4	2	0	6
1994	0	2	0	2

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région de Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	24	59	0	83
1991	29	46	0	75
1992	28	62	0	90
1993	18	63	0	81
1994	9	32	0	41

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	12	30	0	42
1996	12,0	21	0	33
1997	13	28	0	41
1998	5	11	0	16
1999	3	13	0	16

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région de la Mauricie/Centre du Québec





Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	8	14	0	22
1991	3	10	0	13
1992	7	11	0	18
1993	0	10	0	10
1994	3	7	0	10

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	4	21	0	25
1996	6	8	0	14
1997	5	6	0	11
1998	5	6	0	11
1999	1	7	0	8

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région de l'Estrée




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	0	1	0	1
1991	2	5	0	7
1992	7	7	0	14
1993	9	20	0	29
1994	3	5	0	8

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	2	7	0	9
1996	2	4	0	6
1997	1	2	0	3
1998	2	3	0	5
1999	5	4	0	9

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région de Montréal centre




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	47	117	0	164
1991	55	85	0	140
1992	47	127	0	174
1993	49	129	0	178
1994	45	103	0	148

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	24	77	0	101
1996	26	85	0	111
1997	29	56	1	86
1998	26	47	0	73
1999	21	37	0	58

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région de l'Outaouais





Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	3	5	0	8
1991	5	10	0	15
1992	3	11	0	14
1993	2	4	0	6
1994	3	6	0	9

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	4	10	0	14
1996	1	4	0	5
1997	2	2	0	4
1998	1	7	0	8
1999	2	4	0	6

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région de l'Abitibi/Témiscamingue




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	7	5	0	12
1991	7	6	0	13
1992	0	3	0	3
1993	3	3	0	6
1994	0	1	0	1

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	3	0	3
1996	0	0	0	0
1997	0	3	0	3
1998	1	2	0	3
1999	0	0	0	0

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région de la Côte-Nord




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	0	4	0	4
1991	0	4	0	4
1992	2	1	0	3
1993	0	1	0	1
1994	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	0	1	0	1
1996	1	1	0	2
1997	0	0	0	0
1998	0	0	0	0
1999	0	1	0	1



Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région Nord-du-Québec



Nombre de cas déclarés			
	Femmes	Hommes	Total
1990	0	0	0
1991	0	0	0
1992	0	1	1
1993	0	1	1
1994	1	0	1

Nombre de cas déclarés			
	Femmes	Hommes	Total
1995	0	0	0
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	1	0	1
1999	0	0	0



Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région de la Gaspésie/Îles de la Madeleine



Nombre de cas déclarés			
	Femmes	Hommes	Total
1990	0	0	0
1991	0	1	1
1992	0	1	1
1993	0	1	1
1994	0	0	0

Nombre de cas déclarés			
	Femmes	Hommes	Total
1995	0	0	0
1996	0	0	0
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région Chaudière/Appalaches




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	7	12	0	19
1991	7	8	0	15
1992	8	12	0	20
1993	3	5	0	8
1994	6	2	0	8

Nombre de cas déclarés


	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	4	6	0	10
1996	2	6	0	8
1997	3	3	0	6
1998	1	4	0	5
1999	0	2	0	2

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région de Laval




Nombre de cas déclarés					Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total		Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	12	16	0	28	1995	3	11	0	14
1991	14	10	0	24	1996	7	8	0	15
1992	7	13	0	20	1997	3	6	0	9
1993	10	13	0	23	1998	1	4	0	5
1994	6	16	0	22	1999	1	5	0	6

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aigüe par sexe (1990-1999)
Région de Lanaudière



Nombre de cas déclarés					Nombre de cas déclarés				
	Femmes	Hommes	Manquant	Total		Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	1	7	0	8	1995	1	5	0	6
1991	1	8	0	9	1996	1	6	0	7
1992	5	6	0	11	1997	1	8	0	9
1993	6	9	0	15	1998	4	5	0	9
1994	5	4	0	9	1999	3	5	0	8

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région des Laurentides




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	7	13	0	20
1991	5	24	0	29
1992	10	13	0	23
1993	5	11	0	16
1994	10	24	0	34

Nombre de cas déclarés



	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	5	12	0	17
1996	5	6	0	11
1997	2	5	0	7
1998	5	5	0	10
1999	1	2	0	3

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région de la Montérégie



Nombre de cas déclarés			
	Femmes	Hommes	Total
1990	23	43	66
1991	25	44	69
1992	16	40	56
1993	24	45	69
1994	21	28	49
Nombre de cas déclarés			
	Femmes	Hommes	Total
1995	5	18	23
1996	8	36	44
1997	12	34	46
1998	7	20	27
1999	13	28	41


Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région Nunavik



Nombre de cas déclarés			
	Femmes	Hommes	Total
1990	0	0	0
1991	0	0	0
1992	1	0	1
1993	0	0	0
1994	0	0	0

Nombre de cas déclarés			
	Femmes	Hommes	Total
1995	0	0	0
1996	1	0	1
1997	0	0	0
1998	0	0	0
1999	0	0	0

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1999)
Région Terres Cries/Baie-James



Nombre de cas déclarés				Nombre de cas déclarés			
Femmes		Hommes		Femmes		Hommes	
Manquant	Total	Manquant	Total	Manquant	Total	Manquant	Total
1990	0	0	0	1995	0	0	0
1991	0	0	0	1996	0	0	0
1992	0	0	0	1997	0	0	0
1993	0	0	0	1998	0	1	1
1994	0	0	0	1999	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-santitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)									
Région socio-santitaire	Femmes		Hommes		Manquant		Total		
Bas St-Laurent	1995	0	0	0	0	0	0	0	
	1996	1	9	0	0	10	0	0	
	1997	1	1	0	0	2	0	0	
	1998	0	3	0	0	3	0	0	
	1999	1	1	0	0	2	0	0	
Saguenay/ Lac St-Jean	1995	2	0	0	0	2	0	10	
	1996	2	3	0	5	0	8	0	
	1997	0	4	0	4	0	6	0	
	1998	0	1	0	1	0	5	0	
	1999	0	3	0	3	0	2	0	
Québec	1995	12	30	0	42	0	14	0	
	1996	12	21	0	33	0	15	0	
	1997	13	28	0	41	0	9	0	
	1998	5	11	0	16	0	5	0	
	1999	3	13	0	16	0	6	0	
Mauricie/ Centre du Québec	1995	4	21	0	25	0	6	0	
	1996	6	8	0	14	0	7	0	
	1997	5	6	0	11	0	9	0	
	1998	5	6	0	11	0	5	0	
	1999	1	7	0	8	0	3	0	
Estrie	1995	2	7	0	9	0	17	0	
	1996	2	4	0	6	0	11	0	
	1997	1	2	0	3	0	7	0	
	1998	2	3	0	5	0	10	0	
	1999	5	4	0	9	0	3	0	
Montréal centre	1995	24	77	0	101	0	23	0	
	1996	26	85	0	111	0	44	0	
	1997	29	56	1	86	0	46	0	
	1998	26	47	0	73	0	27	0	
	1999	21	37	0	58	0	41	0	
Outaouais	1995	4	10	0	14	0	0	0	
	1996	1	4	0	5	0	1	0	
	1997	2	2	0	4	0	0	0	
	1998	1	7	0	8	0	0	0	
	1999	2	4	0	6	0	0	0	
Abitibi/ Témiscamingue	1995	0	3	0	3	0	0	0	
	1996	0	0	0	0	0	0	0	
	1997	0	3	0	3	0	0	0	
	1998	1	2	0	3	0	1	0	
	1999	0	0	0	0	0	0	0	
Côte-Nord	1995	0	1	0	1	0	201	0	267
	1996	1	1	0	2	0	197	0	272
	1997	0	0	0	0	0	158	1	231
	1998	0	0	0	0	0	119	0	178
	1999	0	1	0	1	0	51	112	0
Nord-du- Québec	1995	0	0	0	0	0	0	0	
	1996	0	0	0	0	0	0	0	
	1997	0	0	0	0	0	0	0	
	1998	1	0	0	1	0	0	0	
	1999	0	0	0	0	0	0	0	

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-santitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)

Région socio-santitaire	Femmes		Hommes		Manquant	Total
Bas St-Laurent	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	1,0	8,9	0,0	0,0	4,9
	1997	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	1998	0,0	3,0	0,0	0,0	1,5
	1999	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Saguenay/Lac St-Jean	1995	1,4	0,0	0,0	0,0	0,7
	1996	1,4	2,1	0,0	0,0	1,7
	1997	0,0	2,8	0,0	0,0	1,4
	1998	0,0	0,7	0,0	0,0	0,3
	1999	0,0	2,1	0,0	0,0	1,0
Québec	1995	3,6	9,6	0,0	0,0	6,5
	1996	3,6	6,7	0,0	0,0	5,1
	1997	3,9	8,9	0,0	0,0	6,3
	1998	1,5	3,5	0,0	0,0	2,5
	1999	0,9	4,1	0,0	0,0	2,4
Mauricie/Centre du Québec	1995	1,6	8,7	0,0	0,0	5,1
	1996	2,4	3,3	0,0	0,0	2,9
	1997	2,0	2,5	0,0	0,0	2,2
	1998	2,0	2,5	0,0	0,0	2,2
	1999	0,4	2,9	0,0	0,0	1,6
Estrie	1995	1,4	5,1	0,0	0,0	3,2
	1996	1,4	2,9	0,0	0,0	2,1
	1997	0,7	1,4	0,0	0,0	1,1
	1998	1,4	2,1	0,0	0,0	1,8
	1999	3,4	2,8	0,0	0,0	3,1
Montréal centre	1995	2,5	8,7	0,0	0,0	5,5
	1996	2,7	9,5	0,0	0,0	6,0
	1997	3,0	6,3	0,1	0,0	4,6
	1998	2,7	5,2	0,0	0,0	3,9
	1999	2,2	4,1	0,0	0,0	3,1
Outaouais	1995	2,5	6,4	0,0	0,0	4,5
	1996	0,6	2,5	0,0	0,0	1,6
	1997	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2
	1998	0,6	4,3	0,0	0,0	2,4
	1999	1,2	2,4	0,0	0,0	1,8
Abitibi/Témiscamingue	1995	0,0	3,7	0,0	0,0	1,9
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	3,7	0,0	0,0	1,9
	1998	1,3	2,4	0,0	0,0	1,9
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1995	0,0	1,9	0,0	0,0	1,0
	1996	2,0	1,9	0,0	0,0	1,9
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	1,9	0,0	0,0	1,0
Nord-du-Québec	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	10,5	0,0	0,0	0,0	5,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Région socio-santitaire	Femmes		Hommes		Manquant	Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/Appalaches	1995	2,1	3,1	0,0	0,0	2,6
	1996	1,0	3,1	0,0	0,0	2,1
	1997	1,6	1,5	0,0	0,0	1,6
	1998	0,5	2,1	0,0	0,0	1,3
	1999	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5
Laval	1995	1,7	6,5	0,0	0,0	4,1
	1996	4,0	4,7	0,0	0,0	4,3
	1997	1,7	3,5	0,0	0,0	2,6
	1998	0,6	2,3	0,0	0,0	1,4
	1999	0,5	2,8	0,0	0,0	1,7
Lanaudière	1995	0,5	2,6	0,0	0,0	1,6
	1996	0,5	3,1	0,0	0,0	1,8
	1997	0,5	4,0	0,0	0,0	2,3
	1998	2,0	2,4	0,0	0,0	2,2
	1999	1,5	2,4	0,0	0,0	1,9
Laurentides	1995	2,3	5,5	0,0	0,0	3,9
	1996	2,2	2,7	0,0	0,0	2,5
	1997	0,9	2,2	0,0	0,0	1,5
	1998	2,1	2,1	0,0	0,0	2,1
	1999	0,4	0,8	0,0	0,0	0,6
Montréal	1995	0,8	2,7	0,0	0,0	1,7
	1996	1,2	5,4	0,0	0,0	3,3
	1997	1,8	5,0	0,0	0,0	3,4
	1998	1,0	2,9	0,0	0,0	2,0
	1999	1,8	4,0	0,0	0,0	2,9
Numavik	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	21,2	0,0	0,0	0,0	10,6
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/Bale-James	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	23,0	0,0	0,0	12,1
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1995	1,8	5,6	0,0	0,0	3,6
	1996	2,0	5,4	0,0	0,0	3,7
	1997	1,9	4,3	0,0	0,0	3,1
	1998	1,6	3,2	0,0	0,0	2,4
	1999	1,3	3,0	0,0	0,0	2,2

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aigüe par région socio-santitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1995-1999)

Région socio-santitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	1	3	1	1	0	3	1	0	0	10
	1997 0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	1998 0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
	1999 0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Saguenay/ Lac St-Jean	1995 0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	1996 0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	5
	1997 0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4
	1998 0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1999 0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
Québec	1995 0	0	2	2	11	9	4	8	4	2	0	42
	1996 0	0	3	4	8	5	1	8	2	2	0	33
	1997 0	0	2	7	8	6	6	8	1	3	0	41
	1998 0	0	0	2	3	0	1	8	1	1	0	16
	1999 0	1	0	2	2	1	1	7	2	0	0	16
Mauricie/ Centre du Québec	1995 0	1	1	2	3	3	5	7	2	1	0	25
	1996 0	0	1	0	2	3	2	3	2	1	0	14
	1997 0	0	0	0	1	0	3	4	1	2	0	11
	1998 1	0	1	0	0	2	3	4	0	0	0	11
	1999 1	0	1	1	0	0	0	4	1	0	0	8
Estrie	1995 0	0	0	0	2	3	1	2	0	1	0	9
	1996 1	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	6
	1997 0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	1998 0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	5
	1999 0	0	1	1	1	1	3	1	1	0	0	9
Montréal centre	1995 1	2	7	14	14	19	12	14	11	7	0	101
	1996 0	1	3	14	15	20	19	14	6	0	0	111
	1997 0	0	3	13	14	16	11	13	9	7	0	86
	1998 0	1	5	13	8	11	4	17	6	8	0	73
	1999 3	1	2	5	2	9	6	19	7	4	0	58
Outaouais	1995 0	0	2	2	1	3	1	4	0	1	0	14
	1996 0	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	5
	1997 0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	4
	1998 0	0	1	0	0	0	1	3	3	0	0	8
	1999 0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	6
Abitibi/ Témiscamingue	1995 0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	1998 0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Côte-Nord	1995 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Nord-du Québec	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1995-1999) suite

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/	1995 0	0	0	1	1	0	2	4	1	1	0	10
Appalaches	1996 0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	0	8
	1997 0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	0	6
	1998 1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	5
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Laval	1995 1	0	0	1	4	2	2	2	1	1	0	14
	1996 0	0	3	3	2	2	1	2	1	1	0	15
	1997 0	0	0	2	2	1	0	2	2	0	0	9
	1998 0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	5
	1999 0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	6
Lanaudière	1995 0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	0	6
	1996 0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	0	7
	1997 0	0	1	2	1	0	0	3	1	1	0	9
	1998 0	0	0	0	1	2	0	3	3	0	0	9
	1999 1	0	1	0	0	0	2	2	1	1	0	8
Laurentides	1995 1	0	2	1	3	1	7	1	0	1	0	17
	1996 0	0	0	0	0	4	1	2	4	0	0	11
	1997 0	0	0	2	0	0	1	2	1	1	0	7
	1998 0	0	1	1	0	2	2	2	1	1	0	10
	1999 0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	3
Montréal	1995 0	0	1	3	1	7	6	4	1	0	0	23
	1996 3	2	3	1	6	3	10	5	5	6	0	44
	1997 4	0	6	2	5	5	6	10	4	6	0	46
	1998 1	0	2	2	5	3	4	1	4	5	0	27
	1999 1	0	5	4	6	6	2	8	7	2	0	41
Nunavik	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/ Baie James	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1995 3	3	20	28	40	47	41	49	21	15	0	267
	1996 4	3	14	29	35	40	40	50	37	20	0	272
	1997 4	0	10	30	37	29	30	45	24	22	0	231
	1998 3	1	12	23	19	22	22	39	21	16	0	178
	1999 6	2	10	14	16	19	18	46	23	9	0	163

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aigüe par région socio-santitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-santitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996 0,0	0,0	6,3	24,8	9,3	6,8	0,0	8,9	4,5	0,0	0,0	4,9
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	4,1	2,5	0,0	1,5
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,9	0,0	0,0	1,0
Saguenay/Lac St-Jean	1995 0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,2	3,2	4,7	0,0	1,7
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	2,1	3,1	2,3	0,0	1,4
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,9	2,2	0,0	1,0
Québec	1995 0,0	0,0	4,7	4,5	23,1	16,1	6,9	7,6	5,5	1,8	0,0	6,5
	1996 0,0	0,0	7,0	9,1	17,2	9,2	1,7	7,4	2,7	1,8	0,0	5,1
	1997 0,0	0,0	4,7	15,8	17,7	11,5	10,3	7,3	1,3	2,7	0,0	6,3
	1998 0,0	0,0	0,0	4,5	6,8	0,0	1,7	7,2	1,2	0,9	0,0	2,5
	1999 0,0	1,4	0,0	4,5	4,6	2,1	1,8	6,2	2,3	0,0	0,0	2,4
Mauricie/Centre du Québec	1995 0,0	1,6	2,8	6,9	10,0	7,6	11,6	9,2	3,8	1,1	0,0	5,1
	1996 0,0	0,0	2,8	0,0	6,9	7,9	4,6	3,9	3,6	1,1	0,0	2,9
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	7,0	5,1	1,7	2,2	0,0	2,2
	1998 3,8	0,0	2,8	0,0	0,0	5,9	7,1	5,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	1999 3,9	0,0	2,9	3,1	0,0	0,0	0,0	4,9	1,6	0,0	0,0	1,6
Estrie	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	13,2	4,2	4,6	0,0	2,0	0,0	3,2
	1996 5,8	0,0	0,0	5,4	0,0	4,6	0,0	4,6	3,3	0,0	0,0	2,1
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	2,2	3,1	0,0	0,0	1,1
	1998 0,0	0,0	4,9	5,1	0,0	4,9	4,2	4,2	2,9	0,0	0,0	1,8
	1999 0,0	0,0	4,9	5,0	5,8	5,2	12,8	2,2	2,8	0,0	0,0	3,1
Montréal centre	1995 0,9	1,1	6,7	10,9	8,9	11,2	7,7	5,3	5,6	1,9	0,0	5,5
	1996 0,0	0,5	2,8	11,1	9,9	11,4	12,6	7,0	6,9	1,6	0,0	6,0
	1997 0,0	0,0	2,8	10,3	9,6	9,8	6,9	4,7	4,3	1,9	0,0	4,6
	1998 0,0	0,5	4,7	10,2	5,7	7,0	2,5	6,1	2,8	2,1	0,0	3,9
	1999 3,0	0,5	1,9	3,9	1,5	5,9	3,7	6,7	3,2	1,1	0,0	3,1
Outaouais	1995 0,0	0,0	9,8	9,4	4,1	9,7	3,3	8,1	0,0	2,5	0,0	4,5
	1996 0,0	0,0	0,0	4,7	4,2	4,0	3,2	3,9	0,0	0,0	0,0	1,6
	1997 0,0	0,0	0,0	4,6	4,2	0,0	3,2	0,0	0,0	2,3	0,0	1,2
	1998 0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	3,2	5,5	8,3	0,0	0,0	2,4
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	3,6	3,1	3,6	0,0	0,0	0,0	1,8
Abitibi/Témiscamingue	1995 0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	1,9
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	0,0	9,0	9,3	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	1,9
	1998 0,0	0,0	0,0	8,8	9,4	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1995 0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	1,9
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Nord-du Québec	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998 0,0	0,0	0,0	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) suite

Région socio-santaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine												
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/												
1995	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0	5,9	6,5	2,6	1,6	0,0	2,6
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	5,8	3,2	4,9	1,6	0,0	2,1
1997	0,0	0,0	3,4	0,0	4,2	0,0	2,9	1,6	4,7	0,0	0,0	1,6
1998	4,4	0,0	3,4	3,8	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,6	0,0	0,5
Laval												
1995	4,5	0,0	0,0	4,5	15,9	6,3	6,4	3,8	2,6	1,9	0,0	4,1
1996	0,0	0,0	13,0	13,6	8,1	6,5	3,1	3,7	2,5	1,9	0,0	4,3
1997	0,0	0,0	0,0	9,0	8,3	3,3	0,0	3,6	4,8	0,0	0,0	2,6
1998	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	6,1	1,8	2,3	0,0	0,0	1,4
1999	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	3,6	6,1	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
Lanaudière												
1995	0,0	0,0	7,7	4,7	0,0	0,0	0,0	3,3	2,6	0,0	0,0	1,6
1996	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	2,7	2,5	1,6	4,9	2,0	0,0	1,8
1997	0,0	0,0	3,7	8,7	4,0	0,0	0,0	4,6	2,3	1,9	0,0	2,3
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	5,9	0,0	4,4	6,4	0,0	0,0	2,2
1999	3,8	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	4,9	2,9	2,0	1,8	0,0	1,9
Laurentides												
1995	3,1	0,0	7,0	3,9	9,8	2,3	16,5	1,5	0,0	1,7	0,0	3,9
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	2,2	2,8	8,4	0,0	0,0	2,5
1997	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	2,2	2,7	2,0	1,6	0,0	1,5
1998	0,0	0,0	3,3	3,6	0,0	5,0	4,3	2,6	1,9	1,5	0,0	2,1
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,6
Montréal												
1995	0,0	0,0	1,1	3,5	1,1	5,8	4,9	1,9	0,7	0,0	0,0	1,7
1996	3,3	1,1	3,1	1,2	6,4	2,5	8,0	2,3	3,4	3,2	0,0	3,3
1997	4,5	0,0	3,1	2,3	6,5	4,4	4,8	4,5	2,5	3,1	0,0	3,4
1998	1,1	0,0	2,1	2,2	5,4	2,7	3,2	0,4	2,4	2,5	0,0	2,0
1999	1,2	0,0	5,3	4,3	6,5	5,6	1,6	3,5	4,0	1,0	0,0	2,9
Nunavik												
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	114,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/ Bate James												
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec												
1995	0,6	0,3	4,0	5,8	7,5	7,1	6,2	4,3	2,7	1,3	0,0	3,6
1996	0,9	0,3	2,8	6,0	6,7	6,2	5,9	4,3	4,6	1,6	0,0	3,7
1997	0,9	0,0	2,0	6,1	7,3	4,7	4,4	3,8	2,8	1,8	0,0	3,1
1998	0,7	0,1	2,4	4,6	3,8	3,7	3,3	3,2	2,4	1,3	0,0	2,4
1999	1,4	0,2	2,0	2,8	3,2	3,3	2,7	3,7	2,5	0,7	0,0	2,2

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-santitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-santitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Saguenay/Lac St-Jean	1995	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
	1996	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Québec	1995	0	0	1	2	2	0	2	2	1	0	12
	1996	0	0	2	2	4	1	1	2	0	0	12
	1997	0	0	2	4	2	1	0	0	0	0	13
	1998	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	5
	1999	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
Mauricie/Centre du Québec	1995	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4
	1996	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	6
	1997	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	5
	1998	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	5
	1999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Estrie	1995	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
	1996	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1998	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	1999	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	5
Montréal centre	1995	0	1	2	5	2	2	5	2	3	0	24
	1996	0	0	0	6	2	1	7	2	3	0	26
	1997	0	0	3	5	4	5	3	2	4	0	29
	1998	0	0	4	8	2	3	5	2	2	0	26
	1999	1	0	2	3	1	1	7	1	1	0	21
Outaouais	1995	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4
	1996	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Abitibi/Témiscamingue	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Côte-Nord	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord-du Québec	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-santitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) suite

Région socio-santitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/	1995 0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	4
Appalaches	1996 0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	1997 0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3
	1998 0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laval	1995 0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
	1996 0	0	2	1	1	1	0	1	0	1	0	7
	1997 0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
	1998 0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1999 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Lanaudière	1995 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1996 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1997 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1998 0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	4
	1999 1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Laurentides	1995 1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	5
	1996 0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	5
	1997 0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
	1998 0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	5
	1999 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Montréal	1995 0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	5
	1996 1	1	2	0	1	0	1	0	0	2	0	8
	1997 4	0	1	0	2	1	1	3	0	0	0	12
	1998 1	0	2	1	1	0	1	0	0	1	0	7
	1999 1	0	3	0	1	2	1	1	3	1	0	13
Nunavik	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/ Bate James	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1995 1	2	6	11	8	9	7	12	5	5	0	66
	1996 2	1	7	10	9	7	12	13	8	6	0	75
	1997 4	0	7	13	11	10	8	10	5	4	0	72
	1998 2	0	8	11	5	7	5	13	3	5	0	59
	1999 3	0	8	5	4	7	4	12	6	2	0	51

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	1,0
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	1,0
Saguenay/Lac St-Jean	1995 0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	6,4	0,0	0,0	1,4
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Québec	1995 0,0	0,0	4,8	9,1	8,6	7,3	0,0	3,7	5,4	1,5	0,0	3,6
	1996 0,0	0,0	9,5	9,2	17,6	3,8	0,0	1,8	5,2	0,0	0,0	3,6
	1997 0,0	0,0	9,5	18,4	9,0	15,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	3,5	0,0	1,5	0,0	1,5
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	1,8	2,2	0,0	0,0	0,9
Mauricie/Centre du Québec	1995 0,0	3,3	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	2,7	0,0	1,9	0,0	1,6
	1996 0,0	0,0	5,7	0,0	7,2	0,0	4,7	5,3	3,6	0,0	0,0	2,4
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	9,4	5,1	0,0	0,0	0,0	2,0
	1998 7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	7,6	0,0	0,0	0,0	2,0
	1999 0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Estrie	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	1,4
	1996 11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,7
	1998 0,0	0,0	10,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	1999 2,0	0,0	10,0	10,3	0,0	0,0	8,5	4,4	5,6	0,0	0,0	3,4
Montréal centre	1995 0,0	1,1	3,8	7,8	2,6	2,4	2,6	3,6	1,9	1,4	0,0	2,5
	1996 0,0	0,0	0,0	9,7	2,7	1,2	8,9	3,6	1,9	1,4	0,0	2,7
	1997 0,0	0,0	5,7	8,0	5,7	6,4	3,8	2,1	1,8	1,8	0,0	3,0
	1998 0,0	0,0	7,6	12,8	2,9	4,0	0,0	3,5	1,8	0,9	0,0	2,7
	1999 2,0	0,0	3,8	4,7	1,5	5,5	1,3	4,8	0,9	0,4	0,0	2,2
Outaouais	1995 0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	13,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	1997 0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	1,2
Abitibi/Témiscamingue	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	2,0
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du Québec	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998 0,0	0,0	0,0	123,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) suite

Région socio-santaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/	1995	0,0	0,0	8,5	8,6	0,0	0,0	3,3	5,3	0,0	0,0	2,1
Appalaches	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	5,0	0,0	0,0	1,0
	1997	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	1,6
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laval	1995	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	6,4	3,8	0,0	0,0	0,0	1,7
	1996	0,0	0,0	17,8	9,4	8,3	0,0	3,7	0,0	3,3	0,0	4,0
	1997	0,0	0,0	0,0	9,3	8,5	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	1,7
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,6
	1999	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Lanaudière	1995	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1997	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	3,0	4,4	0,0	0,0	2,0
	1999	7,9	0,0	7,6	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Laurentides	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Montréal	1995	0,0	0,0	2,2	2,4	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	1996	2,3	1,1	4,3	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,2
	1997	9,3	0,0	2,1	0,0	4,4	1,8	2,7	0,0	0,0	0,0	1,8
	1998	2,4	0,0	4,3	2,3	2,2	1,6	0,0	0,0	0,9	0,0	1,0
	1999	2,4	0,0	6,5	0,0	2,2	1,6	0,9	3,4	0,9	0,0	1,8
Numavik	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	214,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/ Bate James	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1995	0,4	0,4	2,5	4,7	3,1	2,8	2,1	1,3	0,7	0,0	1,8
	1996	0,9	0,2	2,9	4,2	3,5	2,2	3,6	2,0	0,9	0,0	2,0
	1997	1,8	0,0	2,8	5,4	4,4	3,3	2,4	1,2	0,6	0,0	1,9
	1998	0,9	0,0	3,3	4,5	2,0	2,4	1,5	0,7	0,7	0,0	1,6
	1999	1,4	0,0	3,3	2,0	1,6	2,5	1,2	1,3	0,3	0,0	1,3

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	1	3	1	0	2	1	0	0	9
	1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1998	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
	1999	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Saguenay/Lac St-Jean	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3
	1997	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4
	1998	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
Québec	1995	0	0	1	0	9	4	6	2	1	0	30
	1996	0	0	1	2	4	1	7	0	2	0	21
	1997	0	0	0	3	6	2	5	1	3	0	28
	1998	0	0	0	2	1	0	6	1	0	0	11
	1999	0	1	0	2	1	1	6	1	0	0	13
Mauricie/Centre du Québec	1995	0	0	1	2	2	3	5	2	0	0	21
	1996	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	8
	1997	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	6
	1998	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	6
	1999	1	0	0	1	0	0	4	1	0	0	7
Estrie	1995	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	7
	1996	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	4
	1997	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
	1999	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	4
Montréal centre	1995	1	1	5	9	12	17	10	9	4	0	77
	1996	0	1	3	8	13	18	14	12	3	0	85
	1997	0	0	0	8	9	11	10	7	3	0	56
	1998	0	1	1	5	6	8	12	4	6	0	47
	1999	2	1	0	2	1	5	5	6	3	0	37
Outaouais	1995	0	0	1	2	1	1	0	0	1	0	10
	1996	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4
	1997	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
	1998	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	7
	1999	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	4
Abitibi/Témiscamingue	1995	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3
	1998	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Côte-Nord	1995	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Nord-du Québec	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) suite

Région socio-santaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/	1995 0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	0	6
Appalaches	1996 0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	6
	1997 0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3
	1998 1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	4
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
Laval	1995 1	0	0	1	3	2	1	1	1	1	0	11
	1996 0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	0	8
	1997 0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	6
	1998 0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	4
	1999 0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	5
Lanaudière	1995 0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	5
	1996 0	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	6
	1997 0	0	1	1	1	0	0	3	1	1	0	8
	1998 0	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	5
	1999 0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	5
Laurentides	1995 0	0	2	0	2	1	6	0	0	1	0	12
	1996 0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	6
	1997 0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	5
	1998 0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	5
	1999 0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2
Montréal	1995 0	0	0	2	1	5	5	4	1	0	0	18
	1996 2	1	1	1	5	3	9	5	5	4	0	36
	1997 0	0	2	2	4	4	5	7	4	6	0	34
	1998 0	0	1	1	4	3	3	1	4	4	0	20
	1999 0	0	2	4	5	4	1	7	4	1	0	28
Nunavik	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/ Bate James	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1995 2	1	14	17	32	38	34	37	16	10	0	201
	1996 2	2	7	19	26	33	28	37	29	14	0	197
	1997 0	0	3	17	25	19	22	35	18	18	0	158
	1998 1	1	4	12	14	15	17	26	18	11	0	119
	1999 3	2	2	9	12	12	14	34	17	7	0	112


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996 0,0	0,0	12,3	48,0	18,3	13,6	0,0	11,7	8,8	0,0	0,0	8,9
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	8,0	5,9	0,0	3,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	1,0
Saguenay/Lac St-Jean	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	10,6	0,0	2,1
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	4,1	6,2	5,2	0,0	2,8
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	5,7	5,1	0,0	2,1
Québec	1995 0,0	0,0	4,6	0,0	36,9	24,4	13,7	11,5	5,7	2,3	0,0	9,6
	1996 0,0	0,0	4,6	8,9	16,9	14,4	3,4	13,2	0,0	4,5	0,0	6,7
	1997 0,0	0,0	0,0	13,4	26,0	7,5	17,0	14,9	2,6	6,6	0,0	8,9
	1998 0,0	0,0	0,0	8,9	4,4	0,0	3,4	11,0	2,5	0,0	0,0	3,5
	1999 0,0	2,7	0,0	8,8	4,5	4,1	3,5	10,8	2,4	0,0	0,0	4,1
Mauricie/Centre du Québec	1995 0,0	0,0	5,5	13,4	12,9	14,9	23,1	15,5	7,7	0,0	0,0	8,7
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	15,5	4,6	2,5	3,7	2,6	0,0	3,3
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	5,0	3,5	5,2	0,0	2,5
	1998 0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	11,4	9,4	2,4	0,0	0,0	0,0	2,5
	1999 7,6	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	9,6	3,2	0,0	0,0	2,9
Estrie	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	17,5	8,3	4,6	0,0	4,8	0,0	5,1
	1996 0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	9,0	6,6	0,0	0,0	2,9
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	6,2	0,0	0,0	1,4
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	8,4	0,0	5,9	0,0	0,0	2,1
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	10,2	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
Montréal centre	1995 1,8	1,0	9,5	14,0	14,8	19,3	12,8	7,0	9,7	2,7	0,0	8,7
	1996 0,0	1,0	5,6	12,6	16,7	20,8	16,3	10,6	12,6	2,0	0,0	9,5
	1997 0,0	0,0	0,0	12,6	12,0	13,0	9,9	7,5	7,1	2,0	0,0	6,3
	1998 0,0	1,0	1,9	7,8	8,3	9,8	4,9	8,8	3,9	4,0	0,0	5,2
	1999 3,8	1,0	0,0	3,1	1,4	6,4	6,1	8,7	5,7	2,0	0,0	4,1
Outaouais	1995 0,0	0,0	9,7	18,4	8,2	6,5	0,0	16,0	0,0	5,6	0,0	6,4
	1996 0,0	0,0	0,0	9,2	8,4	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	2,5
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	1,2
	1998 0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	16,2	0,0	0,0	4,3
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	6,3	3,5	0,0	0,0	0,0	2,4
Abitibi/Témiscamingue	1995 0,0	0,0	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	3,7
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	0,0	17,5	18,3	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	3,7
	1998 0,0	0,0	0,0	17,2	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1995 0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	1,9
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Nord-du Québec	1995 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999) suite

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	9,6	0,0	3,8	0,0	3,1
Appalaches	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	5,7	6,3	4,9	3,7	0,0	3,1
	1997	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	5,8	3,1	0,0	0,0	0,0	1,5
	1998	8,6	0,0	6,6	7,3	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	3,6	0,0	1,0
Laval	1995	8,6	0,0	0,0	8,7	23,1	6,4	3,9	5,3	4,4	0,0	6,5
	1996	0,0	8,4	17,5	0,0	6,3	6,2	3,8	5,2	0,0	0,0	4,7
	1997	0,0	0,0	8,7	8,1	6,5	0,0	7,3	5,0	0,0	0,0	3,5
	1998	0,0	0,0	8,5	8,5	0,0	12,1	0,0	4,8	0,0	0,0	2,3
	1999	0,0	0,0	0,0	8,3	6,9	12,0	3,4	0,0	0,0	0,0	2,8
Lanaudière	1995	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	5,0	0,0	0,0	2,6
	1996	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	5,0	3,1	9,4	4,3	0,0	3,1
	1997	0,0	7,0	8,4	8,1	0,0	0,0	9,0	4,4	4,1	0,0	4,0
	1998	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	5,8	8,4	0,0	0,0	2,4
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	5,6	4,0	3,9	0,0	2,4
Laurentides	1995	0,0	13,4	0,0	0,0	4,7	27,8	0,0	0,0	3,7	0,0	5,5
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	2,7
	1997	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	4,3	2,6	3,9	3,5	0,0	2,2
	1998	0,0	0,0	6,9	0,0	5,0	4,3	2,5	3,6	0,0	0,0	2,1
	1999	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,8
Montréal	1995	0,0	0,0	4,6	2,1	8,2	8,1	3,8	1,4	0,0	0,0	2,7
	1996	4,3	1,1	2,0	2,2	10,5	14,3	4,6	6,7	4,9	0,0	5,4
	1997	0,0	4,1	4,4	8,5	6,9	7,8	6,3	5,0	7,1	0,0	5,0
	1998	0,0	0,0	2,2	8,5	5,3	4,7	0,9	4,8	4,6	0,0	2,9
	1999	0,0	4,1	8,4	10,6	7,3	1,5	6,0	4,6	1,1	0,0	4,0
Nunavik	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/ Bate James	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	222,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1995	0,8	0,2	5,5	6,9	11,7	10,2	6,5	4,2	2,0	0,0	5,6
	1996	0,8	0,4	2,7	7,7	9,8	8,2	6,4	7,3	2,7	0,0	5,4
	1997	0,0	0,0	1,2	6,8	9,6	6,4	5,9	4,5	3,4	0,0	4,3
	1998	0,4	0,2	1,6	4,7	5,4	5,0	4,3	4,1	2,1	0,0	3,2
	1999	1,3	0,4	0,8	3,5	4,7	4,1	5,5	3,7	1,3	0,0	3,0


Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés d'hépatite B chez les femmes
par groupe d'âge, Québec (1996-1999)



(NB année courante-NB année antérieure)/NB année antérieure*100


Nombre de cas déclarés		20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59
Province de Québec	1995	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0

Pourcentages annuels de variation du taux d'incidence de cas déclarés d'hépatite B chez les femmes
par groupe d'âge, Québec (1996-1999)




Taux d'incidence par 100 000		20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59
Province de Québec	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pourcentages annuels de variation du nombre de cas déclarés d'hépatite B chez les hommes par
groupe d'âge, Québec (1996-1999)



Nombre de cas déclarés		20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59
Province de Québec	1995	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0


Pourcentages annuels de variation du taux d'incidence de cas déclarés d'hépatite B chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1996-1999)




Taux d'incidence par 100 000

		20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59
Province de Québec	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë par groupe d'âge,
Québec (1995-1999)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë,
Québec (1991-1998)





Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par groupe d'âge,
Québec (1995-1999)



Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes,
Québec (1990-1999)





Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-santitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)

Nombre de cas déclarés d'influenza B circulaire par région socio-santitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)															
Région socio-santitaire	Femmes					Hommes					Total				
	1995	1996	1997	1998	1999	1995	1996	1997	1998	1999	1995	1996	1997	1998	1999
Bas St-Laurent	2	2	3	7	3	1	3	7	5	0	3	5	10	8	9
Saguenay/Lac St-Jean	2	3	8	12	2	3	3	8	22	0	3	6	16	22	3
Québec	14	20	25	24	18	48	31	54	48	0	62	51	79	72	78
Mauricie/Centre du Québec	18	13	10	31	27	20	22	20	10	0	38	35	30	41	19
Estrie	7	6	8	8	11	26	10	18	26	0	33	16	21	26	19
Montréal centre	289	280	256	236	260	387	363	340	296	0	677	645	597	532	581
Outaouais	11	6	13	8	16	16	27	17	14	0	27	34	30	22	33
Abitibi/Témiscamingue	5	2	4	1	5	3	3	5	5	0	8	5	9	6	2
Côte-Nord	2	1	3	2	2	0	4	3	3	0	2	5	6	5	3
Nord-du-Québec	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Laurentides	24	23	9	11	5	44	27	23	19	0	68	50	32	30	20
Montérégie	70	51	50	51	49	80	78	74	81	0	150	129	124	132	126
Nunavik	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Terres Cries/Baie-James	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Province de Québec	476	440	430	414	407	673	620	635	569	0	1150	1063	1066	983	963

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-santaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995 2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
	1996 1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	5
	1997 0	0	0	1	0	0	0	3	2	4	0	10
	1998 2	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	8
	1999 1	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	9
Saguenay/Lac St-Jean	1995 2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	5
	1996 1	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	6
	1997 2	0	0	0	2	1	0	3	4	4	0	16
	1998 2	0	0	1	1	0	4	9	2	3	0	22
	1999 0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3
Québec	1995 4	2	2	3	5	9	4	19	10	4	0	62
	1996 1	0	1	3	4	7	6	14	10	5	0	51
	1997 2	1	1	4	7	12	7	24	15	6	0	79
	1998 3	1	2	9	10	6	9	18	9	5	0	72
	1999 0	1	5	10	6	10	10	22	10	4	0	78
Mauricie/Centre du Québec	1995 2	1	0	3	5	3	10	5	7	2	0	38
	1996 1	0	2	3	1	3	3	10	7	5	0	35
	1997 2	0	0	2	4	6	3	6	3	1	0	30
	1998 1	1	0	2	3	2	7	12	6	7	0	41
	1999 1	0	1	1	1	3	2	6	1	3	0	19
Estrie	1995 0	1	0	4	3	4	5	7	8	1	0	33
	1996 0	1	0	1	1	1	3	5	3	1	0	16
	1997 2	0	0	2	2	4	6	3	2	0	0	21
	1998 0	1	2	2	4	2	0	5	8	2	0	26
	1999 0	0	0	3	2	0	2	8	2	2	0	19
Montréal centre	1995 11	22	38	64	93	104	107	133	59	44	2	677
	1996 5	12	30	49	103	102	95	147	60	41	1	645
	1997 5	14	21	65	87	92	81	116	66	49	1	597
	1998 5	15	25	55	83	78	63	109	55	43	1	532
	1999 5	17	22	38	86	100	76	118	63	56	0	581
Outaouais	1995 1	0	1	2	1	5	2	13	2	0	0	27
	1996 1	0	1	3	7	5	4	8	3	1	1	34
	1997 0	2	1	0	1	4	5	7	3	7	0	30
	1998 1	0	0	0	2	6	3	5	3	1	1	22
	1999 2	4	0	0	6	0	6	7	6	2	0	33
Abitibi/Témiscamingue	1995 0	0	1	0	0	0	1	2	2	1	0	8
	1996 2	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5
	1997 1	0	0	0	1	1	0	4	2	0	0	9
	1998 0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	6
	1999 0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Côte-Nord	1995 0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	1996 1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	5
	1997 0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	6
	1998 0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	5
	1999 0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
Nord-du Québec	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1995-1999) suite

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	1997 0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	5
	1998 0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	6
	1999 0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4
Chaudière/ Appalaches	1995 0	0	0	0	0	2	2	13	11	6	0	34
	1996 0	0	1	0	1	1	1	5	3	3	2	17
	1997 1	0	0	4	3	1	2	6	2	3	0	22
	1998 0	0	0	0	1	1	0	6	1	1	0	10
	1999 0	1	2	0	0	0	2	2	5	1	0	13
Laval	1995 0	1	4	1	6	6	5	10	3	3	0	39
	1996 0	1	1	2	4	7	6	13	4	2	0	40
	1997 2	2	2	1	2	3	7	13	8	14	0	54
	1998 1	0	1	4	5	4	4	14	8	3	0	44
	1999 2	0	2	1	5	6	6	9	6	3	0	40
Lanaudière	1995 0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	1996 0	1	1	1	1	4	2	8	3	1	0	22
	1997 0	1	1	0	3	3	4	11	5	1	0	29
	1998 0	0	0	0	0	1	5	6	6	1	0	19
	1999 0	1	0	0	0	0	1	3	7	1	0	13
Laurentides	1995 1	1	2	4	7	13	6	19	10	5	0	68
	1996 3	2	1	0	4	6	9	15	5	5	0	50
	1997 0	0	0	4	6	0	3	10	7	2	0	32
	1998 0	2	0	1	2	6	4	6	6	3	0	30
	1999 0	0	0	1	0	5	3	7	3	1	0	20
Montréal	1995 5	5	11	8	24	13	11	37	24	12	0	150
	1996 4	3	4	4	8	10	16	47	25	8	0	129
	1997 1	3	4	10	7	8	11	53	18	8	1	124
	1998 5	5	6	12	12	11	13	36	20	12	0	132
	1999 2	2	7	8	9	13	12	37	21	15	0	126
Nunavik	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	2	1	0	2	2	0	7
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/ Bate James	1995 0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1995 28	34	59	91	145	160	156	260	137	78	2	1150
	1996 20	20	42	67	137	150	147	276	127	73	4	1063
	1997 20	23	31	94	126	136	130	265	139	100	2	1066
	1998 20	25	37	87	123	122	114	236	133	84	2	983
	1999 13	26	39	62	115	138	122	225	132	91	0	963

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les femmes par région socio-santitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-santitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1996	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1997	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3
	1998	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	1999	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3
Saguenay/Lac St-Jean	1995	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	1996	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
	1997	1	0	0	0	2	0	1	3	1	0	8
	1998	1	0	0	1	0	0	1	3	2	0	10
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Québec	1995	2	1	1	2	1	1	3	2	0	1	14
	1996	1	0	1	2	3	0	3	5	2	0	20
	1997	1	1	1	1	4	3	4	4	2	0	25
	1998	2	0	1	6	6	3	1	2	0	0	24
	1999	0	1	1	5	3	5	7	2	1	0	27
Mauricie/Centre du Québec	1995	1	1	0	3	3	1	4	1	2	0	18
	1996	1	0	2	1	0	0	2	3	2	0	13
	1997	0	0	0	1	0	3	1	5	0	0	10
	1998	1	0	0	1	1	1	5	6	5	0	31
	1999	1	0	1	0	1	2	1	4	0	0	10
Estrie	1995	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	7
	1996	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	6
	1997	2	0	0	0	0	3	1	2	0	0	8
	1998	0	1	1	0	0	0	2	3	1	0	8
	1999	0	0	0	3	1	0	2	0	1	0	8
Montréal centre	1995	7	14	20	34	44	39	47	49	19	0	289
	1996	4	6	16	31	51	46	37	52	13	1	280
	1997	2	8	12	40	41	40	28	39	19	0	256
	1998	4	10	13	29	45	40	24	31	18	1	236
	1999	2	7	12	22	49	46	35	47	20	0	260
Outaouais	1995	1	0	0	2	1	0	1	5	0	0	11
	1996	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0	6
	1997	0	0	1	0	1	2	4	3	1	0	13
	1998	1	0	0	0	1	2	1	3	0	0	8
	1999	2	4	0	0	5	0	2	1	0	0	16
Abitibi/Témiscamingue	1995	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	5
	1996	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
	1997	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	4
	1998	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1999	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Côte-Nord	1995	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	1996	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1997	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
	1998	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	1999	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Nord-du Québec	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1995-1999) suite

Région socio-sanitaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	1998 0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
	1999 0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Chaudière/ Appalaches	1995 0	0	0	0	0	0	1	3	8	5	0	17
	1996 0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0	5
	1997 0	0	0	1	1	1	0	2	1	1	0	7
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
Laval	1995 0	1	3	1	1	2	1	3	1	1	0	14
	1996 0	0	0	1	3	4	5	7	0	0	0	20
	1997 2	1	1	1	1	0	4	5	3	5	0	23
	1998 1	0	1	2	2	1	1	6	2	2	0	18
	1999 2	0	1	0	1	3	2	3	3	2	0	17
Lanaudière	1995 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1996 0	0	0	1	0	2	1	2	1	0	0	7
	1997 0	0	0	0	1	1	1	3	1	0	0	7
	1998 0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	5
	1999 0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Laurentides	1995 0	0	2	2	1	6	0	9	4	0	0	24
	1996 3	2	1	0	1	2	2	8	2	2	0	23
	1997 0	0	0	2	4	0	0	1	2	0	0	9
	1998 0	2	0	1	1	1	1	3	2	0	0	11
	1999 0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	5
Montréal	1995 5	3	6	4	9	7	5	15	12	4	0	70
	1996 1	2	1	2	6	7	6	15	7	4	0	51
	1997 1	2	2	6	4	5	4	18	5	3	0	50
	1998 3	3	2	5	3	4	3	17	6	5	0	51
	1999 0	0	3	3	6	3	6	14	8	6	0	49
Numavik	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/ Bate James	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1995 19	22	33	50	61	59	64	88	48	32	0	476
	1996 15	10	23	38	69	65	56	93	44	26	1	440
	1997 12	12	17	53	61	61	47	84	49	34	0	430
	1998 15	16	18	46	59	54	41	80	49	35	1	414
	1999 8	12	18	33	66	60	50	85	43	32	0	407

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les hommes par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

Région socio-santaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Bas St-laurent	1995 0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1996 0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
	1997 0	0	0	1	0	0	0	3	1	2	0	7
	1998 0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	5
	1999 0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	6
Saguenay/ Lac St-Jean	1995 1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
	1996 0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3
	1997 1	0	0	0	0	1	0	2	1	3	0	8
	1998 1	0	0	0	1	0	3	6	0	1	0	12
	1999 0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Québec	1995 2	1	1	1	4	8	1	17	10	3	0	48
	1996 0	0	0	1	1	7	3	11	5	3	0	31
	1997 1	0	0	3	3	8	4	20	11	4	0	54
	1998 1	1	1	3	4	3	6	17	7	5	0	48
	1999 0	0	4	5	3	5	8	15	8	3	0	51
Mauricie/ Centre du Québec	1995 1	0	0	0	2	2	6	4	5	0	0	20
	1996 0	0	0	2	1	3	1	8	4	3	0	22
	1997 2	0	0	1	4	3	2	4	3	1	0	20
	1998 0	1	0	1	2	1	2	1	0	2	0	10
	1999 0	0	0	1	0	1	1	2	1	3	0	9
Estrie	1995 0	0	0	2	3	2	5	7	6	1	0	26
	1996 0	1	0	1	1	0	3	2	1	1	0	10
	1997 0	0	0	2	2	1	5	1	2	0	0	13
	1998 0	0	1	2	4	2	0	3	5	1	0	18
	1999 0	0	0	0	1	0	1	6	2	1	0	11
Montréal centre	1995 4	8	18	30	49	64	60	84	43	25	2	387
	1996 1	6	14	17	52	55	58	95	28	0	0	363
	1997 3	6	9	25	46	51	53	77	39	30	1	340
	1998 1	5	12	26	38	38	39	78	34	25	0	296
	1999 3	10	10	16	37	54	41	71	43	36	0	321
Outaouais	1995 0	0	1	0	0	5	1	8	1	0	0	16
	1996 0	0	0	3	4	3	4	8	3	1	1	27
	1997 0	2	0	0	2	2	1	4	2	6	0	17
	1998 0	0	0	0	1	4	2	2	3	1	1	14
	1999 0	0	0	0	1	0	4	5	5	2	0	17
Abitibi/ Témiscamingue	1995 0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
	1996 1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
	1997 0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	5
	1998 0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	5
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Côte-Nord	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4
	1997 0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3
	1998 0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3
	1999 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Nord-du Québec	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les hommes par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1995-1999) suite

Région socio-santaire	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Manquant	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996 0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
1997 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
1998 0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Chaudière/ Appalaches	1995 0	0	0	0	0	2	1	10	3	1	0	17
1996 0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	1	2	12
1997 1	0	0	0	3	2	0	2	4	1	2	0	15
1998 0	0	0	0	0	1	1	0	6	1	1	0	10
1999 0	1	2	0	0	0	0	2	2	2	1	0	10
Laval	1995 0	0	1	0	5	4	4	7	2	2	0	25
1996 0	1	1	1	1	1	3	1	6	4	2	0	20
1997 0	1	1	1	0	1	3	3	8	5	9	0	31
1998 0	0	0	0	2	3	3	3	8	6	1	0	26
1999 0	0	0	1	1	4	3	4	6	3	1	0	23
Lanaudière	1995 0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1996 0	1	1	1	0	1	2	1	6	2	1	0	15
1997 0	1	1	1	0	2	2	3	8	4	1	0	22
1998 0	0	0	0	0	0	1	3	6	4	0	0	14
1999 0	1	0	0	0	0	0	0	2	7	1	0	11
Laurentides	1995 1	1	0	2	6	7	6	10	6	5	0	44
1996 0	0	0	0	0	3	4	7	7	3	3	0	27
1997 0	0	0	0	2	2	0	3	9	5	2	0	23
1998 0	0	0	0	0	1	5	3	3	4	3	0	19
1999 0	0	0	0	1	0	4	3	5	2	0	0	15
Montréal	1995 0	2	5	4	15	6	6	22	12	8	0	80
1996 3	1	3	2	2	2	3	10	32	18	4	0	78
1997 0	1	2	4	4	3	3	7	35	13	5	1	74
1998 2	2	4	7	9	9	7	10	19	14	7	0	81
1999 2	2	4	4	5	3	10	6	23	13	9	0	77
Nunavik	1995 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998 0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4
1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/ Bate James	1995 0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
1996 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1998 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1999 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1995 9	12	26	41	84	100	92	172	89	46	2	673
1996 5	10	19	28	28	68	83	91	183	83	47	3	620
1997 8	11	14	41	41	65	74	83	181	90	66	2	635
1998 5	9	19	41	41	64	68	73	156	84	49	1	569
1999 5	14	21	29	29	49	78	72	140	89	59	0	556


Nombre de cas déclarés d'hépatite B de type non-précisé par région socio-santitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)

Région socio-santitaire	Femmes		Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1995	0	0	0	0
	1996	2	1	0	3
	1997	1	3	0	4
	1998	0	1	0	1
	1999	1	2	0	3
Saguenay/ Lac St-Jean	1995	2	7	0	9
	1996	2	4	0	6
	1997	1	4	0	5
	1998	0	0	0	0
	1999	1	0	0	1
Québec	1995	5	12	0	17
	1996	3	7	0	10
	1997	2	1	0	3
	1998	3	5	0	8
	1999	0	1	0	1
Mauricie/ Centre du Québec	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	5	9	0	14
	1999	1	6	0	7
Estrie	1995	1	1	0	2
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
Montréal centre	1995	35	139	5	179
	1996	38	136	3	177
	1997	32	123	18	173
	1998	29	98	19	146
	1999	37	105	5	147
Outaouais	1995	4	9	1	14
	1996	3	8	0	11
	1997	1	5	0	6
	1998	0	11	0	11
	1999	4	4	0	8
Abitibi/ Témiscamingue	1995	2	1	0	3
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	1	0	1
	1999	0	0	0	0
Côte-Nord	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
Nord-du-Québec	1995	0	1	0	1
	1996	0	1	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
Région socio-santitaire Gaspésie/ Îles de la Madeleine	1995	4	6	0	10
	1996	1	0	0	1
	1997	0	6	0	6
	1998	2	2	0	4
	1999	1	0	0	1
Chaudière/ Appalaches	1995	2	3	0	5
	1996	2	3	0	5
	1997	1	3	0	4
	1998	2	1	0	3
	1999	1	3	0	4
Laval	1995	1	0	0	1
	1996	1	1	0	2
	1997	0	2	0	2
	1998	0	1	0	1
	1999	0	0	0	0
Lanaudière	1995	8	22	0	30
	1996	1	1	0	2
	1997	3	2	0	5
	1998	0	1	0	1
	1999	0	0	0	0
Laurentides	1995	0	0	0	0
	1996	0	1	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
Montérégie	1995	1	0	0	1
	1996	0	1	0	1
	1997	0	3	0	3
	1998	0	0	1	1
	1999	0	4	0	4
Nunavik	1995	1	1	0	2
	1996	0	1	0	1
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	0	0	0	0
Terres Cries/ Baie-James	1995	0	0	0	0
	1996	0	0	0	0
	1997	0	0	0	0
	1998	0	0	0	0
	1999	1	0	0	1
Province de Québec	1995	66	202	6	274
	1996	53	165	3	221
	1997	41	152	18	211
	1998	41	130	20	191
	1999	47	125	5	177

SYPHILIS



Taux d'incidence des cas déclarés de syphilis récente par sexe (1990-1999)
Québec




Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	20	40	1	61
1991	20	44	0	64
1992	14	26	0	40
1993	6	12	0	18
1994	4	15	0	19

Nombre de cas déclarés

	Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	5	6	0	11
1996	1	11	0	12
1997	4	5	0	9
1998	1	2	0	3
1999	2	2	0	4

Taux d'incidence des cas déclarés de syphilis récente par sexe (1990-1999)
Région de Montréal centre



Nombre de cas déclarés			
Femmes	Hommes	Manquant	Total
1990	10	1	32
1991	18	0	45
1992	11	0	26
1993	3	5	8
1994	2	5	7

Femmes	Hommes	Manquant	Total
1995	4	0	8
1996	0	0	7
1997	2	0	4
1998	0	0	1
1999	1	0	2

Nombre de cas déclarés de syphilis récente par région socio-santitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)									
Région socio-santitaire	Femmes			Hommes			Total		
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995	1996	1999	1995	1996	1999	1995	1996
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bas St-Laurent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1998	1999	1995	1998	1999	1995	1998	1999	1995
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1999	1995</							

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)

Région socio-sanitaire	Femmes		Hommes		Manquant		Total
Bas St-Laurent	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saguenay/Lac St-Jean	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Québec	1995	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,3
	1996	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3
	1997	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Mauricie/Centre du Québec	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2
	1998	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estrie	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,7	0,0	0,0	0,4	0,4
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montréal centre	1995	0,4	0,5	0,0	0,0	0,4	0,4
	1996	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4	0,4
	1997	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2
	1998	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
	1999	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Outaouais	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abitibi/Témiscamingue	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	1,2	0,0	0,0	0,6	0,6
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord-du-Québec	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Région socio-sanitaire	Femmes		Hommes		Manquant		Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/Appalaches	1995	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,3
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laval	1995	0,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,3
Lanaudière	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	0,5
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Laurentides	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Montréal	1995	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Numavik	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/Bale-James	1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1995	0,1	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1
	1996	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,2
	1997	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
	1998	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	1999	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1

Nombre de cas déclarés de syphilis récente par sexe, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Femmes												
1995	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	5
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1997	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	4
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1999	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Hommes												
1995	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	6
1996	0	0	0	1	0	2	1	3	2	1	1	11
1997	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	0	5
1998	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
1999	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Total												
1995	0	0	0	0	5	1	1	1	2	0	1	11
1996	0	0	0	1	0	2	1	3	3	1	1	12
1997	0	0	0	0	1	1	1	0	4	1	1	9
1998	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
1999	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	4

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par sexe, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1995-1999)

	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Femmes												
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1
Hommes												
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,3	0,0	0,4	0,0	0,2	0,2
1996	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,8	0,3	0,9	0,3	0,3	0,2	0,3
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1
Total												
1995	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
1996	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2
1997	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1
1998	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1999	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1


Nombre de cas déclarés de syphilis ancienne par région socio-santaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)

Nombre de cas déclarés de syphilis primaire par Région socio-santitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1995-1999)														
Région socio-santitaire	Femmes					Hommes					Manquant		Total	
	1995	1996	1997	1998	1999	1995	1996	1997	1998	1999	Femmes	Hommes	Manquant	Total
Bas St-Laurent	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	1	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saguenay/Lac St-Jean	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Québec	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	3
	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	1
	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	3
	1	2	0	0	3	3	0	0	0	0	6	1	0	7
	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2
Mauricie/Centre du Québec	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montréal centre	24	18	17	11	8	42	2	4	0	6	2	3	0	5
	15	17	0	0	32	32	2	3	0	5	2	3	0	5
	10	11	0	21	0	21	2	1	0	3	2	1	0	3
	10	14	0	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	8	0	11	0	11	0	1	0	1	0	1	0	1
Outaouais	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	2	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Abitibi/Témiscamingue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Côte-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	24	0	57
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	23	0	47
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	18	0	34
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	19	0	40
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	0	18
Nord-du-Québec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GROSSESSES ECTOPIQUES



Taux d'incidence des grossesses ectopiques par âge (1987-1997)
Province de Québec



Taux d'incidence des grossesses ectopiques par 1 000 grossesses

	15-19 ans	20-24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	Total
1987	4,7	8,9	11,7	16,2	19,8	23,0	12,2
1988	3,9	8,5	11,9	18,5	25,1	23,5	13,1
1989	5,6	8,1	10,6	16,4	23,5	22,8	12,1
1990	5,2	8,2	10,0	16,9	22,8	19,9	12,1
1991	6,8	10,0	10,8	15,3	23,5	19,1	12,6
1992	5,2	8,4	10,7	15,5	24,0	18,2	12,3
1993	7,6	9,3	11,0	13,7	22,2	15,4	12,2
1994	4,8	7,0	10,7	14,9	24,8	25,4	12,3
1995	4,9	7,5	10,5	14,0	22,0	17,0	11,7
1996	4,2	7,7	10,2	13,5	18,8	22,5	11,1

Nombre de grossesses ectopiques par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1987-199

Région socio-sanitaire	15-19 ans	20-24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	Total
Bas St-Laurent	1987	0	7	16	10	2	35
	1988	0	8	12	10	6	38
	1989	0	3	9	14	7	0
	1990	1	2	5	8	3	0
	1991	0	3	12	15	3	2
	1992	0	2	11	10	5	0
	1993	1	6	5	7	8	0
	1994	0	1	9	13	11	2
	1995	1	3	16	11	7	1
	1996	1	7	7	8	5	3
	1997	0	5	7	9	2	32
	1987	2	16	28	11	6	0
	1988	0	10	29	26	10	1
	1989	2	7	37	18	5	1
	1990	2	11	30	18	8	3
	1991	2	10	27	25	8	0
	1992	1	11	22	15	10	1
	1993	2	17	19	22	10	2
	1994	2	7	16	20	7	3
	1995	2	8	10	22	10	0
	1996	3	7	14	10	4	3
	1997	3	6	15	16	9	3
Lac St-Jean	1987	5	18	35	37	19	1
	1988	6	15	56	41	26	2
	1989	5	13	37	48	29	2
	1990	3	13	37	36	30	2
	1991	6	18	45	44	23	5
	1992	4	29	38	46	28	7
	1993	10	19	40	42	19	1
	1994	2	32	28	39	19	9
	1995	0	13	35	38	30	2
	1996	2	14	35	31	24	1
	1997	6	22	28	41	15	4
	1987	1	14	26	22	10	2
	1988	1	7	29	28	11	0
	1989	2	8	27	27	9	2
	1990	3	14	25	23	15	0
	1991	3	13	18	20	10	7
	1992	3	12	23	19	9	1
	1993	2	12	24	26	19	0
	1994	1	11	23	23	13	2
	1995	4	12	21	27	12	4
	1996	3	12	25	26	9	1
	1997	3	12	19	19	10	3
Mauricie/ Centre du Québec	1987	2	9	15	8	4	3
	1988	1	15	19	15	3	0
	1989	2	10	26	23	11	1
	1990	1	12	25	25	6	1
	1991	5	14	17	21	6	1
	1992	3	7	17	14	10	1
	1993	2	16	17	17	6	2
	1994	2	5	11	23	12	1
	1995	1	4	14	24	12	1
	1996	3	15	14	13	6	3
	1997	0	11	7	15	4	1
	1987	1	14	26	22	10	2
	1988	1	7	29	28	11	0
	1989	2	8	27	27	9	2
	1990	3	14	25	23	15	0
	1991	3	13	18	20	10	7
	1992	3	12	23	19	9	1
	1993	2	12	24	26	19	0
	1994	1	11	23	23	13	2
	1995	4	12	21	27	12	4
	1996	3	12	25	26	9	1
	1997	3	12	19	19	10	3
Estrie	1987	2	9	15	8	4	3
	1988	1	15	19	15	3	0
	1989	2	10	26	23	11	1
	1990	1	12	25	25	6	1
	1991	5	14	17	21	6	1
	1992	3	7	17	14	10	1
	1993	2	16	17	17	6	2
	1994	2	5	11	23	12	1
	1995	1	4	14	24	12	1
	1996	3	15	14	13	6	3
	1997	0	11	7	15	4	1
	1987	1	14	26	22	10	2
	1988	1	7	29	28	11	0
	1989	2	8	27	27	9	2
	1990	3	14	25	23	15	0
	1991	3	13	18	20	10	7
	1992	3	12	23	19	9	1
	1993	2	12	24	26	19	0
	1994	1	11	23	23	13	2
	1995	4	12	21	27	12	4
	1996	3	12	25	26	9	1
	1997	3	12	19	19	10	3
Côte-Nord	1987	3	3	16	10	2	0
	1988	2	2	13	12	3	0
	1989	3	5	19	9	2	0
	1990	2	8	11	8	4	0
	1991	1	10	14	8	4	0
	1992	1	5	8	7	4	0
	1993	3	4	15	12	3	0
	1994	0	2	14	8	11	0
	1995	3	8	8	8	4	1
	1996	5	4	10	10	3	1
	1997	1	3	9	2	4	0
	1987	1	2	0	0	1	0
	1988	0	4	2	1	0	0
	1989	0	1	4	3	0	0
	1990	0	0	4	1	0	0
	1991	0	5	5	1	0	0
	1992	1	2	2	1	4	0
	1993	0	0	1	5	1	0
	1994	0	0	2	3	4	0
	1995	0	0	0	2	1	0
	1996	0	2	0	2	1	0
	1997	0	1	1	4	1	0
Abitibi/ Témiscamingue	1987	0	12	22	12	6	0
	1988	0	11	17	17	3	0
	1989	2	14	12	12	2	0
	1990	2	6	23	16	6	0
	1991	1	16	20	17	3	2
	1992	1	8	18	15	2	0
	1993	4	7	15	10	6	0
	1994	3	7	9	13	6	0
	1995	1	8	11	5	3	2
	1996	3	6	13	15	6	0
	1997	0	4	7	11	9	0
	1987	3	3	16	10	2	0
	1988	2	2	13	12	3	0
	1989	3	5	19	9	2	0
	1990	2	8	11	8	4	0
	1991	1	10	14	8	4	0
	1992	1	5	8	7	4	0
	1993	3	4	15	12	3	0
	1994	0	2	14	8	11	0
	1995	3	8	8	8	4	1
	1996	5	4	10	10	3	1
	1997	1	3	9	2	4	0
Nord-du Québec	1987	1	2	0	0	1	0
	1988	0	4	2	1	0	0
	1989	0	1	4	3	0	0
	1990	0	0	4	1	0	0
	1991	0	5	5	1	0	0
	1992	1	2	2	1	4	0
	1993	0	0	1	5	1	0
	1994	0	0	2	3	4	0
	1995	0	0	0	2	1	0
	1996	0	2	0	2	1	0
	1997	0	1	1	4	1	0
	1987	1	2	0	0	1	0
	1988	0	4	2	1	0	0
	1989	0	1	4	3	0	0
	1990	0	0	4	1	0	0
	1991	0	5	5	1	0	0
	1992	1	2	2	1	4	0
	1993	0	0	1	5	1	0
	1994	0	0	2	3	4	0
	1995	0	0	0	2	1	0
	1996	0	2	0	2	1	0
	1997	0	1	1	4	1	0

Nombre de grossesses ectopiques par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1987-1997) suite

Région socio-santaire	15-19 ans	20-24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1987 0	4	6	2	1	0	13
	1988 3	4	4	7	5	0	23
	1989 0	1	7	6	4	1	19
	1990 0	2	7	9	5	0	23
	1991 0	4	9	6	7	1	27
	1992 2	1	5	10	3	1	22
	1993 0	4	7	5	6	0	22
	1994 1	3	6	14	3	0	27
	1995 0	2	9	7	4	1	23
	1996 0	1	5	3	2	2	13
	1997 0	1	5	2	4	2	14
Chaudière/ Appalaches	1987 0	5	24	20	7	0	56
	1988 0	8	17	20	7	2	54
	1989 2	10	34	16	4	1	67
	1990 0	9	19	27	11	3	69
	1991 1	10	22	22	8	1	64
	1992 3	7	17	24	7	1	59
	1993 1	2	9	18	5	0	35
	1994 2	7	18	18	6	1	52
	1995 2	4	11	10	5	3	35
	1996 1	11	15	16	8	0	51
	1997 2	7	13	17	7	4	50
Laval	1987 2	12	24	29	8	2	77
	1988 1	7	23	27	13	1	72
	1989 5	15	32	23	12	1	88
	1990 1	9	20	20	12	2	64
	1991 8	13	32	35	5	1	94
	1992 4	9	23	28	14	3	81
	1993 5	10	22	29	15	1	82
	1994 3	5	25	26	9	5	73
	1995 4	6	19	32	9	2	72
	1996 0	5	14	20	11	3	53
	1997 3	9	16	19	15	6	68
Lanaudière	1987 0	7	23	20	9	0	59
	1988 3	7	20	27	8	0	65
	1989 1	7	18	21	9	1	57
	1990 4	12	31	27	6	2	82
	1991 2	13	31	35	16	1	98
	1992 1	9	25	27	10	0	72
	1993 7	10	36	17	10	1	81
	1994 2	20	34	20	14	2	92
	1995 2	11	31	24	9	1	78
	1996 5	15	15	17	8	0	60
	1997 2	10	25	26	12	2	77
Laurentides	1987 1	8	22	22	7	2	62
	1988 1	16	34	20	11	0	82
	1989 1	13	26	32	10	1	83
	1990 1	14	29	31	9	1	85
	1991 4	27	34	25	18	3	111
	1992 3	24	32	29	20	1	109
	1993 5	20	49	44	22	2	142
	1994 5	6	34	34	16	5	100
	1995 1	9	23	43	21	0	97
	1996 4	17	21	39	15	3	99
	1997 5	17	22	19	18	7	88
Montréal	1987 6	31	73	54	17	7	188
	1988 2	38	59	60	21	8	188
	1989 9	42	78	67	28	8	232
	1990 8	41	81	90	30	8	258
	1991 9	52	94	83	42	3	283
	1992 6	40	104	91	39	7	287
	1993 11	52	96	73	41	7	280
	1994 11	32	85	88	63	6	285
	1995 11	35	74	86	50	11	267
	1996 6	24	73	82	40	8	233
	1997 13	22	74	66	40	6	221
Nunavik	1987 2	4	6	1	0	0	13
	1988 0	4	3	1	0	1	9
	1989 1	4	1	2	0	1	9
	1990 0	2	3	0	0	0	5
	1991 0	2	2	1	1	0	6
	1992 0	3	3	1	0	0	7
	1993 0	2	2	1	1	0	6
	1994 2	2	1	3	2	0	10
	1995 0	1	2	4	1	0	8
	1996 0	1	5	2	2	0	8
	1997 0	1	0	2	3	0	6
Terres Cries/ Baie James	1987 0	0	0	0	0	0	0
	1988 0	1	1	0	0	1	3
	1989 0	1	2	1	1	0	4
	1990 0	1	0	1	0	0	2
	1991 0	2	0	0	1	0	3
	1992 0	3	0	0	0	0	3
	1993 0	0	0	0	1	0	1
	1994 0	0	3	1	1	0	5
	1995 0	0	0	0	2	0	2
	1996 0	1	1	0	1	1	4
	1997 0	1	0	2	0	0	3
Province de Québec	1987 35	258	524	401	150	30	1398
	1988 30	244	551	487	205	36	1553
	1989 46	238	522	482	211	37	1536
	1990 45	244	521	549	238	34	1631
	1991 59	290	543	515	253	36	1696
	1992 48	237	520	538	278	38	1659
	1993 73	255	497	474	266	33	1598
	1994 47	191	459	517	319	61	1594
	1995 48	200	416	482	287	41	1474
	1996 47	203	390	440	243	47	1370
	1997 51	182	355	405	265	63	1321

Taux d'incidence des grossesses ectopiques (par 1 000 grossesses) par région socio-santaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1987-1997)

Région socio-santaire	15-19 ans	20-24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	Total
Bas St-Laurent	1987 0,0 1988 0,0 1989 0,0 1990 6,3 1991 0,0 1992 0,0 1993 5,0 1994 0,0 1995 4,9 1996 4,5 1997 0,0	8,8 10,6 4,6 3,1 5,0 3,2 11,0 1,6 5,0 11,1 8,4	12,1 9,0 6,9 4,0 10,0 10,1 5,5 9,9 15,5 8,7 8,9	14,9 15,0 18,5 10,1 18,1 12,9 9,1 18,2 15,5 11,9 13,8	13,5 36,6 37,6 13,3 12,7 20,6 30,8 44,4 27,7 20,2 37,7	0,0 87,0 0,0 0,0 51,3 0,0 0,0 43,5 23,8 81,1 43,5	11,3 12,3 10,7 6,1 11,4 9,5 9,9 13,2 14,8 11,9 12,8
Lac St-Jean	1987 6,0 1988 0,0 1989 6,8 1990 6,4 1991 6,0 1992 3,1 1993 5,2 1994 5,1 1995 5,3 1996 6,2 1997 7,8	12,0 7,7 5,6 9,1 9,4 9,9 15,5 6,5 7,8 6,6 5,2	13,2 13,7 17,3 13,4 12,7 11,4 11,6 10,3 7,4 10,4 12,2	11,9 24,8 16,8 15,9 21,1 13,1 18,7 18,2 20,3 18,1 18,1	31,9 49,3 23,1 29,1 27,4 34,8 30,9 21,9 30,4 12,9 27,4	0,0 27,8 27,8 136,4 0,0 26,3 43,5 52,6 0,0 68,2 55,6	12,8 15,2 14,0 13,9 14,3 12,4 15,4 12,2 9,8 9,8 12,8
Québec	1987 9,6 1988 11,6 1989 8,8 1990 5,2 1991 10,6 1992 6,4 1993 14,8 1994 3,1 1995 0,0 1996 2,9 1997 11,0	8,9 7,5 6,4 6,5 8,5 14,4 9,4 16,4 6,8 7,8 12,4	9,6 15,1 9,8 9,3 11,6 10,1 11,1 8,3 11,0 11,8 10,1	16,8 15,1 18,9 13,0 15,5 16,3 14,9 14,5 13,8 12,2 16,6	30,5 39,6 42,3 35,3 25,7 30,0 19,6 18,7 31,1 24,0 15,1	10,0 28,2 18,0 20,2 38,2 47,3 7,5 52,6 13,8 7,6 20,6	12,6 15,8 13,8 11,8 13,6 14,7 12,8 13,1 11,7 13,3
Mauricie/ Bois-Francis	1987 2,3 1988 2,4 1989 4,4 1990 6,0 1991 5,7 1992 4,9 1993 3,5 1994 1,5 1995 6,2 1996 4,5 1997 4,4	7,5 4,0 4,6 7,5 7,6 7,0 7,1 6,5 7,1 7,2 7,0	9,0 9,9 8,7 7,9 5,7 8,2 9,4 6,5 9,1 11,9 9,8	16,5 20,4 17,6 13,2 11,3 10,8 14,8 13,1 15,4 17,0 12,3	32,6 28,0 28,0 36,8 22,4 19,8 36,8 24,6 22,6 18,3 17,9	42,6 0,0 43,5 0,0 109,4 16,9 0,0 31,7 45,5 16,4 38,0	10,9 11,1 10,4 9,3 9,0 11,6 10,2 11,7 10,1
Estrie	1987 5,9 1988 2,8 1989 5,4 1990 2,6 1991 12,8 1992 7,4 1993 4,6 1994 4,6 1995 2,4 1996 6,2 1997 0,0	6,8 12,1 7,7 9,2 11,0 5,6 13,7 4,5 3,5 12,9 9,5	8,8 10,8 14,5 12,9 9,3 10,1 11,1 7,2 9,6 10,2 5,3	10,5 19,5 26,2 26,5 21,6 13,5 17,4 23,4 23,4 13,5 15,6	18,4 13,1 46,6 23,7 21,1 34,0 19,2 38,8 37,0 18,2 11,7	90,9 0,0 27,8 22,7 25,0 21,3 30,8 27,8 16,9 56,6 16,9	9,3 12,1 15,8 14,4 13,3 11,1 13,3 12,6 12,4 9,0

Région socio-santaire	15-19 ans	20-24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	Total
Montréal centre	1987 3,9 1988 3,7 1989 4,1 1990 5,0 1991 5,8 1992 5,3 1993 6,0 1994 2,9 1995 4,5 1996 2,8 1997 4,9	11,8 9,1 8,7 9,3 8,4 6,8 8,6 6,3 7,9 7,5 6,2	13,8 15,1 11,1 11,8 11,1 11,5 9,9 11,3 10,0 10,6 9,3	16,2 18,9 16,0 18,6 14,6 17,2 12,0 13,1 11,0 13,2 11,9	15,2 20,9 19,2 20,6 21,3 22,4 18,7 22,2 18,7 17,6 17,9	20,6 23,1 19,5 12,5 9,0 14,9 15,9 21,6 9,7 17,7 15,1	13,5 14,6 12,3 13,5 12,1 13,0 11,2 11,9 10,6 11,2 10,5
Outaouais	1987 2,8 1988 2,7 1989 2,5 1990 8,3 1991 4,1 1992 1,9 1993 7,9 1994 6,2 1995 8,0 1996 3,6 1997 2,1	7,4 10,8 10,2 6,8 7,0 8,8 6,1 1,5 13,6 5,0 5,2	14,9 18,0 6,7 8,4 9,8 12,0 11,5 12,0 11,8 6,5 10,5	13,3 17,8 13,9 19,5 8,7 15,0 15,3 13,5 16,7 11,4 13,5	4,6 16,5 23,5 16,2 27,1 26,9 15,7 24,0 22,6 18,1 21,4	0,0 0,0 27,8 23,8 16,7 0,0 14,1 13,0 12,0 14,2 50,0	10,8 14,5 9,8 11,1 9,6 12,1 11,3 10,6 8,3 11,1
Abitibi/ Témiscamingue	1987 0,0 1988 0,0 1989 7,8 1990 6,8 1991 4,8 1992 4,0 1993 13,4 1994 10,0 1995 3,3 1996 9,7 1997 0,0	14,1 11,9 15,9 7,1 18,9 10,1 9,3 9,4 11,2 7,8 5,8	20,3 16,0 10,3 19,3 17,1 17,0 15,5 9,3 12,3 15,6 8,7	29,1 34,5 24,5 31,2 23,3 25,5 17,8 21,8 8,9 28,7 21,5	63,8 35,7 18,0 43,2 23,3 14,6 40,8 39,7 17,6 35,5 50,3	0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0	19,3 17,1 14,4 17,7 20,0 15,4 15,2 13,7 11,2 16,4 12,5
Côte-Nord	1987 16,0 1988 11,4 1989 16,0 1990 10,5 1991 5,3 1992 4,8 1993 15,7 1994 0,0 1995 13,5 1996 22,2 1997 5,1	5,7 4,0 9,6 15,0 20,6 9,5 8,6 4,8 17,7 8,5 6,3	23,5 40,0 27,6 15,2 17,7 10,5 21,4 24,8 13,9 16,8 16,2	35,2 43,6 43,6 22,9 20,7 16,7 28,4 18,1 19,0 25,7 4,9	34,5 42,9 25,3 44,0 37,4 37,4 31,3 98,2 31,5 26,3 31,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,9 62,5 0,0	19,5 19,6 20,9 17,3 18,7 12,3 19,7 19,9 17,7 18,3 10,7
Nord-du Québec	1987 21,7 1988 0,0 1989 0,0 1990 0,0 1991 0,0 1992 38,5 1993 0,0 1994 0,0 1995 0,0 1996 0,0 1997 0,0	5,1 27,6 7,6 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 21,1 11,0	13,3 11,8 20,5 21,5 29,4 13,1 7,5 14,3 29,1 0,0 8,7	0,0 18,5 50,0 14,3 15,9 14,5 69,4 34,1 34,5 32,8 54,1	9,1 0,0 0,0 0,0 28,5 190,5 35,7 71,4 71,9 52,6 50,0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	9,1 16,3 18,8 11,4 28,5 26,2 18,9 24,5 18,9 14,9 20,6

-: aucune grossesse rapportée


Taux d'incidence des grossesses ectopiques (par 1 000 grossesses) par région socio-sanaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1987-1997) suite

Région socio-sanaire	15-19 ans	20-24 ans	25 à 29 ans	30 à 34 ans	35 à 39 ans	40 à 44 ans	Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1987 0,0 1988 28,3 1989 0,0 1990 0,0 1991 0,0 1992 18,9 1993 0,0 1994 9,1 1995 0,0 1996 0,0 1997 0,0	9,7 10,2 2,9 5,6 11,2 12,6 10,7 10,7 5,7 3,1 3,3	10,4 6,9 11,3 10,5 15,5 15,5 13,1 20,7 12,4 14,1	6,8 23,0 28,4 17,0 27,1 14,5 41,2 21,5 9,1 6,8	16,9 70,4 52,6 60,2 66,0 37,5 63,2 26,5 43,5 16,9	0,0 0,0 0,0 90,9 125,0 0,0 0,0 76,9 200,0 90,9	8,7 15,7 12,9 14,9 18,2 16,6 20,6 11,9
Chaudière/ Appalaches	1987 0,0 1988 0,0 1989 6,6 1990 0,0 1991 3,4 1992 10,7 1993 3,1 1994 6,2 1995 5,7 1996 2,6 1997 5,5	3,6 6,0 7,6 7,3 8,3 6,2 1,7 6,2 3,4 9,4 5,9	9,6 6,4 12,9 6,7 8,3 6,8 4,0 8,7 5,8 7,8 7,0	15,5 15,3 10,8 16,2 13,3 14,3 11,6 11,7 6,3 10,4 11,9	22,1 22,2 11,0 24,2 19,0 15,9 11,5 13,3 11,2 16,9 14,2	0,0 37,0 21,7 50,0 15,9 14,1 0,0 11,0 40,0 0,0 54,8	9,7 9,2 10,9 10,5 10,2 9,7 6,1 9,3 6,3 9,2
Laval	1987 8,4 1988 3,8 1989 15,0 1990 3,3 1991 24,8 1992 11,2 1993 13,9 1994 8,0 1995 11,0 1996 0,0 1997 8,7	10,5 5,9 12,0 7,1 10,7 7,9 8,8 4,9 6,1 4,9 9,6	10,7 9,9 12,6 7,8 13,2 9,9 9,9 12,0 10,2 7,8 9,7	23,8 19,7 14,5 11,6 18,7 15,4 15,4 13,3 17,3 11,5 11,1	27,4 34,9 26,4 24,0 8,8 21,7 21,5 12,3 13,3 16,0 21,3	30,3 15,6 12,7 26,7 11,8 30,9 8,1 37,3 14,7 27,3 44,4	14,8 12,9 14,1 10,0 14,5 12,7 12,8 11,6 12,3 9,2 12,4
Lanaudière	1987 0,0 1988 10,8 1989 3,2 1990 11,6 1991 5,0 1992 2,6 1993 15,6 1994 4,5 1995 4,3 1996 9,5 1997 4,4	6,5 6,0 5,3 8,8 9,2 6,4 7,2 14,3 8,1 11,6 7,4	10,8 8,8 6,6 10,5 11,0 8,5 13,7 8,2 14,0 6,8 12,9	18,4 22,7 14,5 16,0 19,8 14,1 8,9 17,2 12,8 9,7 16,5	39,1 29,3 28,4 16,6 35,8 20,9 20,3 23,9 16,3 14,9 21,1	0,0 0,0 20,4 36,4 13,5 0,0 17,5 25,0 11,2 0,0 19,6	12,2 13,3 9,2 12,1 14,2 10,0 11,7 13,3 11,9 9,4 12,9
Laurentides	1987 2,9 1988 2,7 1989 2,6 1990 2,2 1991 8,9 1992 6,2 1993 9,1 1994 8,3 1995 1,7 1996 5,8 1997 8,0	5,2 9,7 7,6 8,0 15,2 14,4 11,9 3,6 5,6 10,7 10,6	9,2 12,6 8,7 8,9 10,7 14,4 16,1 12,2 8,7 18,2 9,2	18,3 15,1 20,1 17,2 12,9 13,9 20,8 15,8 19,6 23,1 9,4	22,0 35,1 26,7 19,7 35,2 34,5 37,0 23,3 30,0 24,5 24,5	60,6 0,0 17,9 14,7 33,7 10,3 19,0 43,9 0,0 27,5 55,1	10,7 12,8 11,7 10,9 14,0 17,6 12,5 12,4 12,8 11,7
Montréal	1987 5,1 1988 1,5 1989 6,3 1990 5,4 1991 6,0 1992 3,8 1993 6,6 1994 6,5 1995 6,3 1996 3,1 1997 8,1	6,5 7,7 8,3 7,9 10,2 8,2 11,0 6,9 7,8 5,3 5,1	9,3 7,2 8,7 8,4 10,1 11,7 11,3 11,1 10,1 10,7 11,4	13,7 13,3 13,4 15,7 13,7 14,5 11,6 14,1 13,9 13,8 11,8	14,7 16,5 18,4 17,4 23,4 20,7 21,1 29,8 22,5 18,5 17,2	36,6 32,4 33,9 31,7 11,3 23,5 21,0 16,4 32,3 24,5 17,0	9,9 10,4 10,7 10,7 11,8 12,0 12,0 12,5 10,7 10,7
Nunavik	1987 30,3 1988 0,0 1989 16,9 1990 0,0 1991 0,0 1992 0,0 1993 0,0 1994 22,5 1995 0,0 1996 0,0 1997 0,0	44,0 38,1 35,4 20,6 16,9 24,4 16,8 16,8 8,4 9,5 8,5	98,4 37,0 15,4 32,3 24,4 33,7 24,1 12,5 25,3 50,5 0,0	45,5 37,0 57,1 0,0 26,3 26,3 22,2 75,0 83,3 125,0 41,7	0,0 0,0 0,0 0,0 83,3 0,0 166,7 153,8 58,8 0,0 333,3	0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	52,4 31,6 16,4 17,0 19,8 29,1 22,8 24,2 19,2
Terres Crées/ Baie James	1987 0,0 1988 0,0 1989 0,0 1990 0,0 1991 0,0 1992 0,0 1993 0,0 1994 0,0 1995 0,0 1996 0,0 1997 0,0	0,0 8,8 0,0 9,4 20,8 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 13,5 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 0,0 12,2 0,0	0,0 0,0 28,6 20,0 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 33,3	0,0 0,0 100,0 0,0 76,9 0,0 62,5 47,6 74,1 50,0 0,0	0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0	0,0 10,1 12,8 5,9 7,8 2,7 12,9 5,1 10,6 8,2
Province de Québec	1987 4,7 1988 3,9 1989 5,6 1990 5,2 1991 6,8 1992 5,2 1993 7,6 1994 4,8 1995 4,9 1996 4,2 1997 5,5	8,9 8,5 8,1 8,2 10,0 8,4 9,3 7,0 7,5 7,7 7,0	11,7 11,9 10,6 10,0 10,7 10,7 11,0 10,7 10,5 10,2 9,9	16,2 18,5 16,4 16,9 15,3 15,5 13,7 14,9 14,0 13,5 12,9	19,8 25,1 23,5 22,8 23,5 24,0 22,2 24,8 22,0 18,8 19,6	23,0 23,5 22,8 19,9 12,6 18,2 15,4 25,4 17,0 22,5 24,1	12,2 12,1 12,1 12,3 12,3 12,2 12,3 11,7 11,1 11,2

-: aucune grossesse rapportée

ANNEXE

*SURVEILLANCE
PÉRIODIQUE DES MTS,
PÉRIODE 10 :
DU 2 JANVIER AU
7 OCTOBRE 2000*



PÉRIODE 10: du 2 janvier au 7 octobre 2000

[illegible]

Un + signifie un excès de cas observés en 2000 par rapport aux deux années antérieures. Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 2 janvier 2000 et la dernière se termine le 30 décembre 2000. Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Chlamydia (génitale)
Hommes

PÉRIODE 10: du 2 janvier au 7 octobre 2000

													2000		1999	1998		Région	1998 cumulatif	1999 cumulatif	2000 cumulatif													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	courant	courant	courant	1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
													2	8	7	69	Bas St-Laurent 01	40	29															
													5	7	6	51	Saguenay/ Lac St-Jean 02	65	71															
													18	23	16	157	Québec 03	175	170															
													17	10	14	102	Mauricie/ Centre du Québec 04	83	108															
													3	9	13	78	Estrie 05	77	79															
													47	67	73	440	Montréal- centre 06	530	478															
													6	3	5	47	Outaouais 07	54	59															
													7	5	7	43	Abitibi/ Témiscamingue 08	38	38															
													0	7	3	44	Côte-Nord 09	48	52															
													0	1	0	1	Nord-du-Québec 10	7	4															
													0	0	1	7	Gaspésie/ îles de la Madeleine 11	3	11															
													7	4	2	47	Chaudière/ Appalaches 12	48	55															
													8	10	11	55	Laval 13	70	77															
													7	14	8	51	Lanaudière 14	89	68															
													3	9	16	79	Laurentides 15	76	86															
													24	24	10	174	Montréal 16	190	211															
													2	4	5	54	Nunavik 17	65	46															
													0	0	2	10	Terres Cries/Baie James 18	6	1															
													156	205	199	1509	Province de Québec	1664	1643															

Un + signifie un excès de cas observés en 2000 par rapport aux deux années antérieures.
Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 2 janvier 2000 et la dernière se termine le 30 décembre 2000.
Les données ont été importées de la banque personnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

PÉRIODE 10: du 2 janvier au 7 octobre 2000

Un + signifie un excès de cas observés en 2000 par rapport aux deux années antérieures. Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 2 janvier 2000 et la dernière se termine le 30 décembre 2000. Les données ont été importées de la banque généralisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Gonorrhée
Femmes

PÉRIODE 10: du 2 janvier au 7 octobre 2000

													Février 1998													Février 1999													Février 2000																																																																																																																				
													courant													courant													courant													cumulatif													cumulatif													cumulatif																																																																													
													Région													Région													Région													Région													Région													Région																																																																													
													Bas St-Laurent 01													Bas St-Laurent 01													Bas St-Laurent 01													Bas St-Laurent 01													Bas St-Laurent 01													Bas St-Laurent 01																																																																													
													Saguenay/ Lac St-Jean 02													Saguenay/ Lac St-Jean 02													Saguenay/ Lac St-Jean 02													Saguenay/ Lac St-Jean 02													Saguenay/ Lac St-Jean 02													Saguenay/ Lac St-Jean 02																																																																													
													Québec 03													Québec 03													Québec 03													Québec 03													Québec 03													Québec 03													Québec 03																																																																
													Mauricie/ Centre du Québec 04													Mauricie/ Centre du Québec 04													Mauricie/ Centre du Québec 04													Mauricie/ Centre du Québec 04													Mauricie/ Centre du Québec 04													Mauricie/ Centre du Québec 04																																																																													
													Estrie 05													Estrie 05													Estrie 05													Estrie 05													Estrie 05													Estrie 05													Estrie 05																																																																
													Montréal- centre 06													Montréal- centre 06													Montréal- centre 06													Montréal- centre 06													Montréal- centre 06													Montréal- centre 06													Montréal- centre 06																																																																
													Outaouais 07													Outaouais 07													Outaouais 07													Outaouais 07													Outaouais 07													Outaouais 07													Outaouais 07																																																																
													Abitibi/ Témiscamingue 08													Abitibi/ Témiscamingue 08													Abitibi/ Témiscamingue 08													Abitibi/ Témiscamingue 08													Abitibi/ Témiscamingue 08													Abitibi/ Témiscamingue 08													Abitibi/ Témiscamingue 08																																																																
													Côte-Nord 09													Côte-Nord 09													Côte-Nord 09													Côte-Nord 09													Côte-Nord 09													Côte-Nord 09													Côte-Nord 09																																																																
													Nord-du-Québec 10													Nord-du-Québec 10													Nord-du-Québec 10													Nord-du-Québec 10													Nord-du-Québec 10													Nord-du-Québec 10													Nord-du-Québec 10																																																																
													Gaspésie/ îles de la													Gaspésie/ îles de la													Gaspésie/ îles de la													Gaspésie/ îles de la													Gaspésie/ îles de la													Gaspésie/ îles de la													Gaspésie/ îles de la																																																																
													Madeleine 11													Madeleine 11													Madeleine 11													Madeleine 11													Madeleine 11													Madeleine 11													Madeleine 11													Madeleine 11																																																			
													Chaudière/ Appalaches 12													Chaudière/ Appalaches 12													Chaudière/ Appalaches 12													Chaudière/ Appalaches 12													Chaudière/ Appalaches 12													Chaudière/ Appalaches 12													Chaudière/ Appalaches 12																																																																
													Laval 13													Laval 13													Laval 13													Laval 13													Laval 13													Laval 13													Laval 13													Laval 13																																																			
													Lanaudière 14													Lanaudière 14													Lanaudière 14													Lanaudière 14													Lanaudière 14													Lanaudière 14													Lanaudière 14													Lanaudière 14																																																			
													Laurentides 15													Laurentides 15													Laurentides 15													Laurentides 15													Laurentides 15													Laurentides 15													Laurentides 15													Laurentides 15																																																			
													Montréal 16													Montréal 16													Montréal 16													Montréal 16													Montréal 16													Montréal 16													Montréal 16													Montréal 16																																																			
													Nunavik 17													Nunavik 17													Nunavik 17													Nunavik 17													Nunavik 17													Nunavik 17													Nunavik 17													Nunavik 17																																																			
													Terres Cries/Baie James 18													Terres Cries/Baie James 18													Terres Cries/Baie James 18													Terres Cries/Baie James 18													Terres Cries/Baie James 18													Terres Cries/Baie James 18													Terres Cries/Baie James 18																																																																
													Province de Québec													Province de Québec													Province de Québec													Province de Québec													Province de Québec													Province de Québec													Province de Québec													Province de Québec																																																			
																																																																																																																																		</																									

Un + signifie un excès de cas observés en 2000 par rapport aux deux années antérieures.
Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 2 janvier 2000 et la dernière se termine le 30 décembre 2000.
Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

PÉRIODE 10: du 2 janvier au 7 octobre 2000

Un + signifie un excès de cas observés en 2000 par rapport aux deux années antérieures. Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 2 janvier 2000 et la dernière se termine le 30 décembre 2000. Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

PÉRIODE 10: du 2 janvier au 7 octobre 2000

PÉRIODE du 2 ^e janvier au 7 ^e octobre 2000													2000 cumulatif	1999 cumulatif	1998 cumulatif	Région	1998 courant	1999 courant	2000 courant																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Un + signifie un excès de cas observés en 2000 par rapport aux deux années antérieures. Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 2 janvier 2000 et la dernière se termine le 30 décembre 2000. Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Hépatite B
Hommes

PÉRIODE 10: du 2 janvier au 7 octobre 2000

														2000		1999	1998	Région	1998		1999	1998	1999	1998	1999	2000
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	courant	courant	courant	courant		courant	courant	courant	cumulatif	cumulatif	cumulatif	cumulatif	cumulatif
						+	+	+						1	0	2	7	Bas St-Laurent 01				5	11			
														0	1	1	11	Saguenay/ Lac St-Jean 02 Québec 03				5	3			
														3	4	6	44					54	38			
						+					+			1	1	5	18	Mauricie/ Centre du Québec 04 Estrie 05				15	16			
						+								3	3	3	16					14	17			
						+					+		+	38	48	24	331	Montréal-centre 06 Outaouais 07				375	366			
														2	1	2	26					19	18			
								+						0	0	2	6	Abitibi/ Témiscamingue 08 Côte-Nord 09				0	7			
				+		+								1	0	0	3					2	4			
														0	0	0	0	Nord-du-Québec 10				0	0			
													+	1	1	1	5	Gaspésie/ Îles de la Madeleine 11 Chaudière/ Appalaches 12				3	3			
						+	+	+				+		0	0	2	11					13	6			
														1	0	1	21	Laval 13 Lanaudière 14				22	31			
														0	2	1	11					18	15			
														0	2	1	15	Laurentides 15				16	20			
								+						4	13	6	79	Monterégie 16				94	67			
														0	0	0	3	Nunavik 17				0	2			
														0	0	0	1	Terres Cries/Baie James 18				0	0			
						+	+				+			55	76	56	608	Province de Québec				655	624			

Un + signifie un excès de cas observés en 2000 par rapport aux deux années antérieures.
Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 2 janvier 2000 et la dernière se termine le 30 décembre 2000.
Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Syphilis récente
Total des cas

PÉRIODE 10: du 2 janvier au 7 octobre 2000

Remodelé au 7 octobre 2000													2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1605	1604	1603	1602	1601	1600	1599	1598	1597	1596	1595	1594	1593	1592	1591	1590	1589	1588	1587	1586	1585	1584	1583	1582	1581	1580	1579	1578	1577	1576	1575	1574	1573	1572	1571	1570	1569	1568	1567	1566	1565	1564	1563	1562	1561	1560	1559	1558	1557	1556	1555	1554	1553	1552	1551	1550	1549	1548	1547	1546	1545	1544	1543	1542	1541	1540	1539	1538	1537	1536	1535	1534	1533	1532	1531	1530	1529	1528	1527	1526	1525	1524	1523	1522	1521	1520	1519	1518	1517	1516	1515	1514	1513	1512	1511	1510	1509	1508	1507	1506	1505	1504	1503	1502	1501	1500	1499	1498	1497	1496	1495	1494	1493	1492	1491	1490	1489	1488	1487	1486	1485	1484	1483	1482	1481	1480	1479	1478	1477	1476	1475	1474	1473	1472	1471	1470	1469	1468	1467	1466	1465	1464	1463	1462	1461	1460	1459	1458	1457	1456	1455	1454	1453	1452	1451	1450	1449	1448	1447	1446	1445	1444	1443	1442	1441	1440	1439	1438	1437	1436	1435	1434	1433	1432	1431	1430	1429	1428	1427	1426	1425	1424	1423	1422	1421	1420	1419	1418	1417	1416	1415	1414	1413	1412	1411	1410	1409	1408	1407	1406	1405	1404	1403	1402	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388	1387	1386	1385	1384	1383	1382	1381	1380	1379	1378	1377	1376	1375	1374	1373	1372	1371	1370	1369	1368	1367	1366	1365	1364	1363	1362	1361	1360	1359	1358	1357	1356	1355	1354	1353	1352	1351	1350	1349	1348	1347	1346	1345	1344	1343	1342	1341	1340	1339	1338	1337	1336	1335	1334	1333	1332	1331	1330	1329	1328	1327	1326	1325	1324	1323	1322	1321	1320	1319	1318	1317	1316	1315	1314	1313	1312	1311	1310	1309	1308	1307	1306	1305	1304	1303	1302	1301	1300	1299	1298	1297	1296	1295	1294	1293	1292	1291	1290	1289	1288	1287	1286	1285	1284	1283	1282	1281	1280	1279	1278	1277	1276	1275	1274	1273	1272	1271	1270	1269	1268	1267	1266	1265	1264	1263	1262	1261	1260	1259	1258	1257	1256	1255	1254	1253	1252	1251	1250	1249	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1238	1237	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	1229	1228	1227	1226	1225	1224	1223	1222	1221	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210	1209	1208	1207	1206	1205	1204	1203	1202	1201	1200	1199	1198	1197	1196	1195	1194	1193	1192	1191	1190	1189	1188	1187	1186	1185	1184	1183	1182	1181	1180	1179	1178	1177	1176	1175	1174	1173	1172	1171	1170	1169	1168	1167	1166	1165	1164	1163	1162	1161	1160	1159	1158	1157	1156	1155	1154	1153	1152	1151	1150	1149	1148	1147	1146	1145	1144	1143	1142	1141	1140	1139	1138	1137	1136	1135	1134	1133	1132	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1123	1122	1121	1120	1119	1118	1117	1116	1115	1114	1113	1112	1111	1110	1109	1108	1107	1106	1105	1104	1103	1102	1101	1100	1099	1098	1097	1096	1095	1094	1093	1092	1091	1090	1089	1088	1087	1086	1085	1084	1083	1082	1081	1080	1079	1078	1077	1076	1075	1074	1073	1072	1071	1070	1069	1068	1067	1066	1065	1064	1063	1062	1061	1060	1059	1058	1057	1056	1055	1054	1053	1052	1051	1050	1049	1048	1047	1046	1045	1044	1043	1042	1041	1040	1039	1038	1037	1036	1035	1034	1033	1032	1031	1030	1029	1028	1027	1026	1025	1024	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1013	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001	1000	999	998	997	996	995	994	993	992	991	990	989	988	987	986	985	984	983	982	981	980	979	978	977	976	975	974	973	972	971	970	969	968	967	966	965	964	963	962	961	960	959	958	957	956	955	954	953	952	951	950	949	948	947	946	945	944	943	942	941	940	939	938	937	936	935	934	933	932	931	930	929	928	927	926	925	924	923	922	921	920	919	918	917	916	915	914	913	912	911	910	909	908	907	906	905	904	903	902	901	900	899	898	897	896	895	894	893	892	891	890	889	888	887	886	885	884	883	882	881	880	879	878	877	876	875	874	873	872	871	870	869	868	867	866	865	864	863	862	861	860	859	858	857	856	855	854	853	852	851	850	849	848	847	846	845	844	843	842	841	840	839	838	837	836	835	834	833	832	831	830	829	828	827	826	825	824	823	822	821	820	819	818	817	816	815	814	813	812	811	810	809	808	807	806	805	804	803	802	801	800	799	798	797	796	795	794	793	792	791	790	789	788	787	786	785	784	783	782	781	780	779	778	777	776	775	774	773	772	771	770	769	768	767	766	765	764	763	762	761	760	759	758	757	756	755	754	753	752	751	750	749	748	747	746	745	744	743	742	741	740	739	738	737	736	735	734	733	732	731	730	729	728	727	726	725	724	723	722	721	720	719	718	717	716	715	714	713	712	711	710	709	708	707	706	705	704	703	702	701	700	699	698	697	696	695	694	693	692	691	690	689	688	687	686	685	684	683	682	681	680	679	678	677	676	675	674	673	672	671	670	669	668	667	666	665	664	663	662	661	660	659	658	657	656	655	654	653	652	651	650	649	648	647	646	645	644	643	642	641	640	639	638	637	636	635	634	633	632	631	630	629	628	627	626	625	624	623	622	621	620	619	618	617	616	615	614	613	612	611	610	609	608	607	606	605	604	603	602	601	600	599	598	597	596	595	594	593	592	591	590	589	588	587	586	585	584	583	582	581</
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Un + signifie un excès de cas observés en 2000 par rapport aux deux années antérieures.
Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 2 janvier 2000 et la dernière se termine le 30 décembre 2000.
Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Syphilis récente
Femmes

PÉRIODE 10: du 2 janvier au 7 octobre 2000

Remodelé au 7 octobre 2000													2000 courant	1999 courant	1998 courant	Région	1998 cumulatif	1999 cumulatif	2000 cumulatif
													0	0	0	Bas St-Laurent 01	0	0	0
													0	0	0	Saguenay/ Lac St-Jean 02	0	0	0
													0	0	0	Québec 03	0	1	0
													0	0	0	Mauricie/ Centre du Québec 04	1	0	0
													0	0	0	Estrie 05	0	0	0
													0	0	0	Montréal- centre 06	0	1	0
													0	0	0	Outaouais 07	0	0	0
													0	0	0	Abitibi/ Témiscamingue 08	0	0	0
													0	0	0	Côte-Nord 09	0	0	0
													0	0	0	Nord-du-Québec 10	0	0	0
													0	0	0	Gaspésie/ îles de la Madeleine 11	0	0	0
													0	0	0	Chaudière/ Appalaches 12	0	0	0
													0	0	0	Laval 13	0	0	0
													0	0	0	Lanaudière 14	0	0	0
													0	0	0	Laurentides 15	0	0	0
													0	0	0	Montréal 16	0	0	0
													0	0	0	Nunavik 17	0	0	0
													0	0	0	Terres Cries/Baie James 18	0	0	0
													0	0	0	Province de Québec	1	2	0

Un + signifie un excès de cas observés en 2000 par rapport aux deux années antérieures.
Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 2 janvier 2000 et la dernière se termine le 30 décembre 2000.
Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

Syphilis récente
Hommes

PÉRIODE 10: du 2 janvier au 7 octobre 2000

Remodelé au 7 octobre 2000													1998		1999		2000	
													courant	courant	courant	courant		
Région													1998 cumulatif	1999 cumulatif	2000 cumulatif			
													Bas St-Laurent 01	0	0	0		
													Saguenay/ Lac St-Jean 02	0	0	0		
													Québec 03	0	0	0		
													Mauricie/ Centre du Québec 04	1	0	0		
													Estrie 05	0	0	0		
													Montréal- centre 06	1	1	0		
													Outaouais 07	0	0	0		
													Abitibi/ Témiscamingue 08	0	0	0		
													Côte-Nord 09	0	0	0		
													Nord-du-Québec 10	0	0	0		
													Gaspésie/ îles de la Madeleine 11	0	0	0		
													Chaudière/ Appalaches 12	0	0	0		
													Laval 13	0	0	0		
													Lanaudière 14	0	0	0		
													Laurentides 15	0	0	0		
													Montréal 16	0	0	0		
													Nunavik 17	0	0	0		
													Terres Cries/Baie James 18	0	0	0		
													Province de Québec	2	1	0		

Un + signifie un excès de cas observés en 2000 par rapport aux deux années antérieures.
Périodes de quatre semaines (CDC). La première période commence le 2 janvier 2000 et la dernière se termine le 30 décembre 2000.
Les données ont été importées de la banque dépersonnalisée MADO, le lundi suivant la fin de chaque période.

