
BULLETIN ORNITHOLOGIQUE

Club des ornithologues du Québec

a/s C.L.R.Q., 1990, boul. Charest ouest,
Bureau 225, Ste-Foy (Québec) G1N 4K8

Volume 26 Août, Septembre, Octobre, Novembre 1981 Numéro 4



BULLETIN ORNITHOLOGIQUE

Volume 26, Numéro 4
Août, septembre, octobre, novembre 1981

Publié par:

Club des ornithologues du Québec
a/s Conseil des loisirs - région de Québec
1990, boul. Charest ouest - Bureau 225
Ste-Foy - G1N 4K8

Les informations de la chronique "Observations ornithologiques" proviennent des feuillets d'observations quotidiennes. Ces feuillets que le Club distribue gratuitement sur demande aux membres qui veulent nous faire connaître leurs observations, doivent nous être expédiés une fois remplis le plus rapidement possible, préférablement à chaque mois.

Pour demander des feuillets ou nous les retourner, et pour signaler tout changement d'adresse, on écrit à l'adresse indiquée ci-dessus.

Les articles qui ne sont pas explicitement signés par le bureau de direction du COQ n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Bureau de direction 1981-82 du Club des ornithologues du Québec:

Yves Aubry
Raymond Barry, vice-président
André Bourget
Pierre Brousseau
Normand David
André Desrochers
Gisèle Gaumont
Jean Giroux
Jean Hardy
Jacques Larivée
Luc Major
Harvey Mead
Pierre Rainville, trésorier
Gilles Seutin
Claude Simard, président
Roger Simard

ISSN 0007-5256

MOT DES REDACTEURS

Le présent Bulletin marque probablement la fin de l'ère des compilateurs au profit de celle des analystes. Cela n'est pas dû au fait que les compilateurs soient nouveaux, mais parce que la méthode de compilation a changé. Elle se fait maintenant par ordinateur via le projet EPOQ, permettant de consacrer la majeure partie du temps au travail d'analyse et de rédaction plutôt qu'à la compilation des feuillets. De plus, cette méthode permettra l'addition régulière au fichier des feuillets produits à chaque saison. Les coûts de saisie seront couverts à même les opérations financières ordinaires du COQ, plutôt que par de subventions gouvernementales de plus en plus difficiles à obtenir.

Le territoire couvert par le Bulletin s'est vu amputé de plusieurs régions au cours des dernières années, celles-ci étant maintenant couvertes, et fort bien, par des clubs régionaux. Pour cette raison, le contenu du présent numéro, et sans doute de ceux qui suivront, couvrira plus en profondeur la région de Québec, sans toutefois négliger les mentions intéressantes provenant des autres régions non-couvertes par les clubs régionaux. Il est également à noter que la majeure partie des feuillets proviennent de cette région et qu'il est normal que cette tendance se reflète dans le contenu du Bulletin. Ainsi la mention de chaque espèce est donnée pour la région de Québec; elle est donnée pour une autre région seulement si plus tardive. Ces "dernières" mentions ne sont pas nécessairement valables pour la province, car car nous rappelons que le Bulletin ne couvre pas tout le Québec.

Nous avons voulu ainsi faire un Bulletin axé avant tout sur la chronologie de la migration. De cette façon, nous revenons à la forme qu'avait le Bulletin avant 1979. Cependant, nous avons cru bon lui donner une forme plus intéressante à lire qu'un simple tableau en utilisant la formule des derniers numéros. Nous espérons que cette forme de "néo-classicisme" vous plaira.

En terminant, une demande à tous les observateurs qui nous font parvenir leurs mentions: afin de s'implifier les opérations d'entrée des feuillets sur le fichier et de là en diminuer le coût, il est impératif de n'utiliser qu'un seul feuillet par localité et par journée.

Nous remercions tous ceux qui nous font parvenir leurs observations sans qui le Bulletin ornithologique ne pourrait exister dans sa forme actuelle. Vos commentaires sur son contenu et sa forme sont bienvenus.

André Desrochers
Roger Simard

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES

1 AOUT - 30 NOVEMBRE 1981

L'origine des informations traitées pour le Bulletin cet automne se présente comme suit:

	AOUT	SEPT	OCT	NOV	TOTAL
Nombre de feuillets reçus	203	103	89	67	462
Nombre de mentions	4078	2055	1327	562	8022
Nombre moyen de mentions/feuillets	20.0	20.0	14.9	8.52	17.4

Il est à noter que même si le nombre de feuillets reçus est hautement variable d'année en année, les nombres moyens de mentions par feuillet, sur une base mensuelle, semblent coïncider étroitement à chachaque automne (Bulletin ornithologique 22:126). Cependant, l'absence de statistiques élaborées pour chaque espèce dans les numéros antérieurs rend difficile toute comparaison au niveau de l'abondance, fréquence, etc... avec les années précédentes, il faut ajouter à cela les délais de rédaction qui nous limite considérablement.

STATISTIQUES (sur une base saisonnière)

N: nombre de feuillets sur lesquels l'espèce est mentionnée.

M: nombre moyen d'individus par mention = $\frac{\text{total d'individus}}{N}$

A: indice d'abondance = $\frac{\text{total d'individus}}{\text{total de feuillets}}$

C: constance: % de feuillets sur lesquels l'espèce est mentionnée.

N.B.: Nous n'avons pas retenu les valeurs de M, A et C pour les espèces dont $N < 10$, car elles seraient peu significatives.

HUART A COLLIER - Gavia immer

N=59, M=2.5, A=0.3, C=12.8

HUART A GORGE ROUSSE - Gavia stellata

N=8

Deux (2) mentions pour la région de Québec: un individu à Maizerets le 29 octobre (P. Delacretaz, A. Desrochers, M. Poulin) et un autre le 8 novembre (COQ, A. Desrochers).

GREBE JOUGRIS - Podiceps grisegena

N=15, M=3.6, A=0.1, C=3.2

Un individu le 6 août à Rouyn (J. Pinkos, M. Morin). Les deux (2) individus notés à Beauport le 17 septembre (C. Falardeau) furent les premiers pour la région de Québec cet automne. Les derniers nous sont rapportés le 11 octobre: six (6) à Maizerets (A. Desrochers) et cinq (5) à Bergeronnes (A. Bouchard).

GREBE CORNU - Podiceps auritus

N=10, M=3.2, A=0.1, C=2.2

Le 25 septembre, quinze (15) individus sont notés à l'Ile des Soeurs (P. Bannon). Toutes les autres mentions proviennent de la région de Québec dont: à Maizerets, un (1) individu le 30 septembre (P. Delacretaz), six (6) le 11 octobre (A. Desrochers) et enfin un (1) le 1er novembre (C. Simard, Y. Aubry).

GREBE A BEC BIGARRE - Podilymbus podiceps

N=14, M=1.7, A=0.1, C=3.0

Sa présence se concrétise dans l'est de la province: deux (2) oiseaux sont observés à Fatima (Iles-de-la-Madeleine) le 3 août (Y. Aubry). La dernière mention de la saison provient de l'Ile-des-Soeurs, soit un (1) adulte avec un (1) immature le 24 octobre (P.F. Dupal).

FULMAR BOREAL - Fulmarus glacialis

N=2

Outre l'oiseau noté à St-Roch-des-Aulnaies (cf. "résumé prov."), P. Lane (et al.) nous mentionnent un (1) individu au large de Romaine le 1er août.

GRAND PUFFIN - Puffinus gravis

N=3

Une mention de trente-six (36) individus le 13 août près de Natashquan (A. Bouchard). Voir autres chroniques.

PUFFIN CENDRE - Puffinus diomedea

Voir résumé provincial.

PUFFIN DES ANGLAIS - Puffinus puffinus

Voir résumé provincial.

PUFFIN FULIGINEUX - Puffinus griseus

N=3

Près de Natashquan, A. Bouchard signale 4 et 2 individus respectivement les 13 et 16 août.

PETREL CUL-BLANC - Oceanodroma leucorhoa

N=9

Encore cette année, on le mentionne régulièrement à Québec. On note 1 individu le 24 septembre puis un autre le lendemain depuis le traversier Québec-Lévis alors qu'il est poursuivi par un Goéland à bec cerclé (S. Marchand). Un oiseau est observé à Maizerets le 3 octobre (COQ, R. Simard) et 4 le 9 octobre à Lauzon (F. Grenon). Enfin, le 10 octobre, on rapporte un individu à Maizerets (A. Desrochers) et un (le même?) à St-David (F. Grenon).

Les autres mentions (pour les secteurs considérés ici) sont de la basse Côte-Nord et de Montréal, ainsi que des Îles-de-la-Madeleine. (Voir autres chroniques).

PETREL OCEANITE - Oceanites oceanicus

N=7

Cette espèce fut fréquente, voir abondante! près de Québec cet automne. J. Hardy note un individu à Maizerets les 23 et 24 septembre; F. Grenon en observe un autre le 9 octobre à Lauzon. Le 10 octobre, 5 individus sont présents à Maizerets (A. Desrochers, P. Chagnon, G. Duquette) et le lendemain A. Desrochers en mentionne 3 au même endroit tandis que P. Bannon et Y. Aubry observent 2 individus à Côte Ste-Catherine. Cette "invasion" se termine le 18 octobre alors qu'un individu est noté à Maizerets par J. Hardy; cette date tardive constitue un record pour la province.

PETRELS

Le 9 octobre à Lauzon, en plus des pétrels sus-mentionnés, F. Grenon en observe 10 qu'il ne peut identifier:

"Entre le moment où j'ai trouvé le premier oiseau et celui où je comptais le 15e, il s'était peut-être écoulé 3 ou 4 minutes, et encore! Il s'agissait réellement d'un mouvement de masse, bien que les oiseaux étaient distants les uns des autres d'au moins une vingtaine de mètres. A deux (2) reprises seulement j'ai constaté un regroupement mais cela n'excédait jamais les trois (3) individus.

Un autre fait est aussi remarquable: tous les oiseaux venaient de l'est, et les seuls oiseaux identifiés (et d'ailleurs identifiables) furent ceux qui ont, à un moment ou à un autre, volés contre le vent, en effet, la majorité des oiseaux gardaient leur orientation est - ouest et se laissant déporter avec le vent devenaient ainsi pratiquement inidentifiables. Le seul avantage de ce mouvement à sens unique fut que je n'avais qu'à "remonter à contre courant" avec le télescope et compter les oiseaux qui "rentraient" dans mon champ, tout en m'assurant qu'aucun oiseau n'y revenait; j'évitais ainsi toute erreur quant au nombre. Restait l'identification..."

N.D.L.R. Les quantités exceptionnelles de pétrels mentionnées dans la région de Québec semblent refléter la situation ayant prévalu cet automne dans l'estuaire du St-Laurent.

FOU DE BASSAN - Morus bassanus

N=21, M=280, A=13, C=4.5

Il est signalé pour une treizième (13) fois dans la région de Québec alors qu'un individu fut observé le 15 octobre à Maizerets par J. Hardy.

GRAND CORMORAN - Phalacrocorax carbo

N=10, M=190, A=4.1, C=2.2

Une mention inusitée de quatre (4) individus à St-François-du-Lac le 26 septembre (D. Jauvin) aurait dû être documentée. Voir autres chroniques.

CORMORAN A AIGRETTES - Phalacrocorax auritus

	N	M	A	C
Août	86	300	130	42
Septembre	44	450	190	43
Octobre	10	27	3.1	11
Novembre	1	1.0	0.02	1.5
Total	141	330	100	31

Présence de dix mille (10,000) individus à grande entrée (Iles-de-la-Madeleine) le 1er septembre (M. Darveau, D. White). L'espèce fut notée jusqu'au 26 octobre dans la région de Québec (Cap Tourmente, cinq (5) individus par J.P. et R. Barry et L. Messely); la dernière mention pour le Québec est de Beauharnois, soit un (1) individu le 8 novembre (P. Bannon).

GRAND HERON - Ardea herodias

	N	M	A	C
Août	89	4.5	2.0	44
Septembre	52	7.8	3.9	50
Octobre	20	2.2	0.51	22
Novembre	2	1.0	0.03	3.0
Total	163	5.2	1.9	35.

La présence de deux (2) individus à Sept-Iles le 18 août (A. Bouchard) est possiblement un cas de dispersion post-nuptiale. L'individu présent à Maizerets le 10 novembre (Y. Aubry) constitue la dernière mention de la saison.

HERON VERT - Butorides striatus

N=9

Une seule mention pour la région de Québec un (1) immature à Ste-Thérèse-de-Lisieux le 12 août (P. Delacretaz, A. Desrochers). L'espèce fut aussi observée à St-Joseph-de-Beauce le 15 août: trois (3) individus (C., L., et Y. Maheu). La dernière mention nous parvient de l'Ile-du-Moine où l'individu fut noté le 12 septembre (P. Smith, R. Yank).

HERON GARDE-BOEUFS - Bubulcus ibis

Voir résumé provincial.

GRANDE AIGRETTE - Casmerodius albus

Voir résumé provincial.

AIGRETTE NEIGEUSE - Egretta thula

Voir résumé provincial.

BIHOREAU A COURONNE NOIRE - Nycticorax nycticorax

N=43, M=7.9, A=0.74, C=9.3

Le 28 novembre, P. Bannon observe un (1) individu à l'Ile Ste-Hélène: "Il s'agit d'un immature. Les gros points blancs sur l'aile et les pieds qui ne dépassent pas complètement la queue en vol m'indiquent qu'il s'agit bien d'un Bihoreau à couronne noire". La date la plus tardive connue était le 16 novembre .

Plus près de Québec, l'espèce fut rapportée jusqu'au 26 octobre alors qu'un individu fut noté au Cap Tourmente (J.-P. et R. Barry, L. Messely).

PETIT BUTOR - Ixobrychus exilis

N=2

Un (1) individu est noté à Plaisance le 5 septembre (J. Morin, D. Perreault) et deux (2) à Calixa-Lavallée le 24 octobre (A. Dupuis, J. Mignault).

N.D.L.R. Cette dernière mention est évidemment très tardive.

BUTOR D'AMERIQUE - Botaurus lentiginosus

N=23, M=2.1, A=0.10, C=5.0

Dernière mention cet automne: 14 octobre à Cap Tourmente, un (1) spécimen trouvé mort. (COQ, P. Lane).

FLAMANT DU CHILI - Phoenicopterus chilensis

Voir autres chroniques.

BERNACHE DU CANADA - Branta canadensis canadensis

N=24, M=98, A=5.1, C=5.2

Mille cinq cent (1500) à Calixa-Lavallée le 24 octobre (A. Dupuis, J. Mignault).

N.D.L.R. Rappelons qu'à l'automne, c'est en octobre que l'espèce est la plus abondante.

BERNACHE CRAVANT - Branta bernicla

L'unique mention provient de Maizerets alors que G. Falardeau en observe une le 28 octobre.

OIE BLANCHE - Chen caerulescens

N=46, M=7500, A=750, C=10

Cinquante (50) individus sont encore présents au Cap Tourmente le 15 novembre (C. Bourget, M. Darveau).

OIE DE ROSS - Chen rossii

L'espèce est à nouveau notée au Cap Tourmente alors que deux (2) individus y sont observés le 3 octobre par Y. Aubry et M. Gosselin et un (1) le 24 octobre par A. Gouge.

CANARD MALARD - Anas platyrhynchos

	N	M	A	C
Août	42	13	2.6	21
Septembre	25	230	56	24
Octobre	17	44	8.4	19
Novembre	5	8.6	0.65	7.6
Total	89	79	15	19

Une mention à Cap-aux-Meules le 29 août (M. Darveau, D. White) est intéressante tout comme cinq mille(5000) au Cap Tourmente le 19 septembre (COQ, R. Simard). L'espèce est toujours présente à Québec le 28 novembre alors que vingt (20) oiseaux sont notés au pont de l'Ile-d'Orléans (R. Simard).

CANARD NOIR - Anas rubripes

	N	M	A	C
Août	76	41	15	37
Septembre	34	421	140	33
Octobre	38	265	110	43
Novembre	12	124	22	18
Total	160	181	63	35

Dix mille (10,000) oiseaux au Cap Tourmente le 19 septembre (COQ, R. Simard) ne surprennent plus. Les huit cent (800) individus notés au pont de l'Ile-d'Orléans le 28 novembre (R. Simard) laissent supposer que cet endroit est un lieu de prédilection aussi bien à l'automne qu'au printemps.

CANARD CHIPEAU - Anas strepera

N=19, M=12, A=0.50, C=4.1

On note cent (100) individus le 12 septembre à l'Ile du Moine (D. Smith, R. Yank). L'espèce est observée pour la dernière fois dans la région de Québec le 28 octobre au Cap Tourmente deux (2) individus (M. Darveau, M. Moreau) alors que quatre (4) individus sont encore présents à Laprairie le 14 novembre (D. Perreault).

CANARD PILET - Anas acuta

	N	M	A	C
Août	50	19	4.5	25
Septembre	26	24	6.0	25
Octobre	17	130	26	19
Novembre	4	17	1.0	6.1
Total	97	40	8.4	21

Le Cap Tourmente en abrite mille (1,000) le 4 octobre (D. White, M. Darveau), le pont de l'Ile-d'Orléans, deux (2) individus le 28 novembre (R. Simard).

SARCELLE A AILES VERTES - Anas crecca

	N	M	A	C
Août	51	13	3.3	25
Septembre	30	520	150	29
Octobre	13	270	40	15
Novembre	1	16	0.24	1.5
Total	95	210	43	21

Parmi tous les Canards barboteurs observés le 19 octobre au Cap Tourmente, cette espèce domine avec quinze mille (15,000) individus (COQ, R. Simard). Les seize (16) individus à Montmagny le 8 novembre sont les derniers à nous être rapportés (P. Brousseau, P. Talbot).

SARCELLE A AILES BLEUES - Anas discors

	N	M	A	C
Août	51	30	7.5	25
Septembre	21	13	2.7	20
Octobre	2	7.5	0.17	2.3
Novembre	0	0	0	0
Total	74	25	4.0	16

Les cinq (5) observés au Cap Tourmente le 14 octobre constituent la dernière mention qui nous est rapportée (COQ, P. Lane). Voir autres chroniques.

CANARD SIFFLEUR D'AMERIQUE - Anas americana

N=18, M=26, A=1.0, C=3.9

Trente-six (36) sont notés à Rouyn le 12 août (J. Pinkos, M. Morin). L'individu présent au Cap Tourmente le 19 septembre est le dernier mentionné pour la région de Québec cependant, trente (30) individus sont encore présents à Côté Ste-Catherine le 11 octobre (P. Bannon, Y. Aubry). (Voir "Iles-de-la-Madeleine").

CANARD SOUCHET - Anas clypeata

N=40, M=15, A=1.3, C=8.7

L'individu noté à Cap-aux-Meules le 10 août concrétise se présence aux Iles-de-la-Madeleine. On en rapporte deux cent (200) à l'Ile du Moine le 8 septembre (R. Yank, M. McIntosh). La dernière mention implique deux (2) individus au Cap Tourmente le 14 octobre (COQ, P. Lane).

CANARD HUPPE - Aix sponsa

N=10, M=2,2, A=0.04, C=2.2

Un (1) individu est observé à Noranda le 6 août (M. Morin, J. Pinkos).

N.D.L.R. Le statut de cette espèce est peu connu pour l'Abitibi.

On rapporte sept (7) individus à East-Broughton le 26 septembre (A. Corriveau).

N.D.L.R. Deux (2) mentions seulement pour la région immédiate de Québec.

MORILLON A TETE ROUGE - Aythya americana

N=10, M=11, A=0.24, C=2.2

Trois (3) mentions pour la région de Québec, dont deux (2) individus à Maizerets le 5 septembre (G. Falardeau, C. Simard) et le 17 septembre (G. Falardeau). Plus au sud, l'espèce est signalée entre autre le 13 septembre à Baieville, trente-deux (32) individus (D. Jauvin) et le 31 octobre à Beauharnois, un (1) seul (P. Bannon).

MORILLON A COLLIER - Aythya collaris

N=11, M=1.8, A=0.04, C=2.4

L'espèce est signalée jusqu'au 22 septembre à Maizerets (G. Falardeau) alors qu'elle est encore présente plus au nord le 18 octobre à Bergeronnes (A. Bouchard). La dernière mention provient de Deauville le 24 octobre (R. Lebrun et al). Toutes ces mentions impliquent un (1) individu.

MORILLON A DOS BLANC - Aythya valisineria

N=4

Douze (12) individus à Beauharnois le 31 octobre constituent un nombre intéressant (P. Bannon). Un à la Pocatière le 7 novembre (A. Côté, Y. Maheu). La seule mention près de Québec est celle de R. Barry qui observa un mâle à Maizerets le 10 novembre: "...Profil fuyant de la tête très remarquable. Dos grisâtre et flancs gris sale, le cou et la tête sont bruns avec des taches de rouge sur et derrière la tête".

GRAND MORILLON - Aythya marila

N=14, M=27, A=0.81, C=3.0

PETIT MORILLON - Aytyha affinis

N=14, M=31, A=0.92, C=3.0

MORILLONS- Aythya SPP

N=16, M=44, A=1.5, C=3.5

GARROT COMMUN - Bucephala clangula

	N	M	A	C
Août	9	4.1	0.18	4.4
Septembre	17	2.6	0.44	17
Octobre	13	14	2.0	15
Novembre	13	23	4.6	20
Total	52	11	1.2	11

PETIT GARROT - Bucephala albeola

N=8

La région de Québec n'a reçu la visite que d'un oiseau: une femelle présente à Maizerets entre les 25 et 30 novembre (P. Delacretaz et al).

CANARD KAKAWI - Clangula hyemalis

N=18, M=230, A=8.8, C=3.9

A. Bouchard note l'espèce à partir du 10 octobre aux Bergeronnes. Maizerets reçoit ses deux (2) premiers oiseaux le 28 octobre (G. Falardeau) alors que 25 y sont notés le 8 novembre (COQ, A. Desrochers). Les quatre mille (4000) individus notés à Tadoussac le 7 novembre (Y. Aubry) sont largement responsables de la valeur élevée du nombre moyen d'individus par mention (230).

EIDER A DUVET - Somateria mollissima

N=44, M=260, A=25, C=9.5

Y. Aubry rapporte quatre cent (400) individus à l'Ile-Brion (Iles-de-la-Madeleine) le 1er août dont: "...un groupe d'au moins vingt (20) jeunes encore en duvet". Bergeronnes en recèle huit cent (800) le 20 août (A. Bouchard), ce qui est le nombre maximal à nous être rapportés cet automne.

MACREUSE A AILES BLANCHES - Melanitta deglandi

N=12, M=6.1, A=0.16, C=2.6

A Maizerets l'espèce est notée du 10 octobre (un individu) au 21 novembre (un individu), (A. Desrochers et al).

MACREUSE A FRONT BLANC - Melanitta perspicillatta

N=11, M=5.0, A=0.11, C=2.4

Huit (8) oiseaux le 22 septembre au Lac St-Pierre (D. Jauvin). L'espèce est observée jusqu'au 29 octobre à Maizerets, un individu (M. Poulin et al) et jusqu'au 1er novembre à New Liverpool, un autre (L. Messely).

MACREUSE A BEC JAUNE - Melanitta nigra

N=9

L'espèce est observée à Maizerets (11, A. Desrochers) et à Baie Ste-Catherine (20, P. Bannon) à partir du 11 octobre. Le dernier individu est noté à Portneuf le 8 novembre (C. Marcotte).

CANARD ROUX - Oxyura jamaicensis

N=9

De deux (2) à huit (8) individus sont présents à Baieville du 27 août au 17 septembre (D. Jauvin). Deux (2) oiseaux à Montmagny le 12 octobre (P. Brousseau, D. Legault), un autre à Portneuf le 1er novembre (G. Morissette) et finalement deux (2) à Laprairie le 14 novembre (D. Perreault).

N.D.L.R. Les petits canards à calotte foncée et queue retroussée doivent être examinés avec attention car il y a risque de confusion avec la Macreuse à bec jaune.

BEC-SCIE COURONNE - Lophodytes cucullatus

N=11, M=3.0, A=0.07, C=2.4

N.D.L.R. Aucune mention de plus de dix (10) individus.

GRAND BEC-SCIE - Mergus merganser

N=21, M=13, A=0.60, C=4.5

Les deux (2) individus notés à Gagnon le 12 septembre (S. Tremblay) sont à la limite nord de leur aire de dispersion.

BEC-SCIE A POITRINE ROUSSE - Mergus serrator

N=17, M=16, A=0.60, C=3.7

Cent vingt (120) aux Bergeronnes le 18 octobre (A. Bouchard).

VAUTOUR A TETE ROUGE - Cathartes aura

Voir résumé provincial.

AUTOUR - Accipiter gentilis

N=11, M=1.0, A=0.02, C=2.4

Un oiseau à St-Urbain le 25 octobre (COQ, M. Darveau). Plus près de Québec, J.-L. Desgranges note un individu en plumage type "femelle" à St-Nicolas, le 29 novembre; plus tôt, soit le 9 octobre, F. Grenon avait observé un immature attrapant un Goéland à bec cerclé sur la grève Gilmour à Lauzon.

EPERVIER BRUN - Accipiter striatus

N=28, M=2.9, A=0.17, C=6.1

Un automne apparemment sans histoire pour cette espèce: le nombre maximal fut noté au Cap Tourmente le 5 septembre alors que vingt-cinq (25) individus étaient présents (A. Desrochers, P. Delacretaz).

EPERVIER DE COOPER - Accipiter cooperii

N=5

Quatre (4) mentions pour la région de Québec. Le dernier oiseau fut observé au Cap Tourmente le 18 octobre par P. Brousseau et M.-F. Poirier.

BUSE A QUEUE ROUSSE - Buteo jamaicensis

N=29, M=2.2, A=0.13, C=6.3

Un individu est observé à Gagnon le 12 septembre (S. Tremblay). Dans le sud du Québec, on ne nous rapporte pas de grosses concentrations cet automne: le maximum n'est que de vingt (20) oiseaux au Cap Tourmente, le 14 octobre (COQ, P. Lane).

BUSE A EPAULETTES ROUSSES - Buteo lineatus

N=7

G. Falardeau note deux (2) oiseaux à Boischatel le 5 octobre. La dernière mention cet automne date du 12 novembre , un individu à La Pocatière (Y. Maheu).

PETITE BUSE - Buteo platypterus

N=9

Un groupe intéressant de dix (10) individus à Maizerets le 13 septembre (COQ, R. Simard) est toutefois modeste si on le compare aux quantités exceptionnelles notées à Montréal cet automne (voir "résumé provincial"). Le Cap Tourmente est encore une fois l'hôte d'une dernière mention cet automne, soit un oiseau le 26 octobre (J.-P. et R. Barry, L. Messely).

N.D.L.R. Les statistiques pour la présente espèce n'incluent pas les centaines d'oiseaux de Montréal, elle donnent cependant une bonne idée de ce qui est vu habituellement, ce qui n'aurait probablement pas été le cas si des nombres astronomiques avaient été ajoutés.

BUSE PATTUE - Buteo lagopus

N=26, M=1.5, A=0.88, C=5.6

Le premier oiseau cet automne fut noté au Lac St-Pierre le 6 septembre (G. Pauzé, M. Léger).

AIGLE DORE - Aquila chrysaetos

N=3

Plusieurs excursionnistes du COQ ont été agréablement surpris par l'apparition subite d'un sous-adulte près du Mont du Lac des Cygnes à St-Urbain le 24 octobre (responsable M. Darveau). M. McIntosh eut la chance d'en observer un le 29 octobre à Ste-Anne-de-Bellevue puis A. Seutin et P. Chagnon en rencontrèrent un le lendemain à St-Etienne-de-Lauzon.

BUSARD DES MARAIS - Circus cyaneus

N=76, M=2.0, A=0.33, C=16

Du nombre surprenant de mentions cet automne, retenons les trois (3) dernières mentions: un oiseau le 25 octobre à La Pocatière (C. Auchu), deux (2) le lendemain au Cap Tourmente (J.-P. Barry et al) et un dernier individu le 29 octobre à Varennes (G. Veilleux, G. Lafrance et G. Ross).

BALBUZARD PECHEUR - Pandion haliaetus

N=52, M=1.5, A=0.17, C=11

Y. Hamel découvre un nid habité à trente (30) milles au nord de St-Urbain le 12 août. L'espèce nous quitte tôt comme le démontre le dernier oiseau près de Québec (St-Nicolas) le 6 septembre (J.-L. Desgranges) et la toute dernière à Bergeronnes le 30 du même mois (deux (2) individus, A. Bouchard).

GERFAUT - Falco rusticolus

N=3

Y. Aubry observa le premier oiseau cet automne à Tadoussac le 7 novembre, tandis qu'à Maizerets, on rapporte un individu en phase grise dès le 29 novembre (P. Lane).

FAUCON PELERIN - Falco peregrinus

N=4

Quatre (4) oiseaux cet automne: un à St-Joseph-de-Beauce le 15 août (L. Maheu et al), un autre à Maizerets le 26 septembre (P. Lane) et un immature au Cap Tourmente le 4 octobre (D. White, M. Darveau). Enfin un à La Pocatière le 6 décembre (C. Auchu).

FAUCON EMERILLON - Falco columbarius

N=34, M=1.3, A=0.09, C=7.4

Comme à tous les automnes, on le rapporte très souvent sur les rives du fleuve. Retenons la dernière mention datant du 26 octobre, alors qu'un oiseau était présent au Cap Tourmente (L. Messely et al).

CRECERELLE D'AMERIQUE

	N	M	A	C
Août	32	2.1	0.34	16
Septembre	28	3.0	0.83	27
Octobre	8	4.0	0.36	9.0
Novembre	8	1.1	0.14	12
Total	76	2.5	0.43	16

Les mentions de S. Tremblay impliquant deux (2) et un oiseau(x) à Gagnon le 20 août et le 12 septembre respectivement auraient pu être documentées car un coup d'oeil aux cartes de distribution nous fait constater que la présence de cette espèce à une telle latitude est pour le moins surprenante.

TETRAS DES SAVANES - Canachites canadensis

N=3

Neuf (9) oiseaux près de St-Urbain le 9 septembre (H. Mead); deux (2) autres le 12 septembre à Gagnon (S. Tremblay) et un dernier au Mont du Lac des Cygnes (St-Urbain) le 24 octobre (COQ, M. Darveau).

GELINOTTE HUPPEE - Bonasa umbellus

N=30, M=1.9, A=0.12, C=6.5

FAISAN A COLLIER - Phasianus colchicus

Un même adulte capable de voler est noté par C. Simard en bordure d'une route à Ste-Brigitte-de-Laval le 19 septembre.

N.D.L.R. Très probablement un échappé de captivité...

PERDRIX GRISE D'EUROPE - Perdix perdix

Les seules mentions proviennent de D. Jauvin qui en observa neuf (9) à Baieville le 13 septembre et dix (10) à St-Elphège le 23 octobre.

RALE DE VIRGINIE - Rallus limicola

Un oiseau cet automne au Cap Tourmente le 14 octobre (COQ, P. Lane).

RALE DE CAROLINE - Porzana carolina

N=4

Trois (3) oiseaux à Fatima (Iles-de-la-Madeleine) le 3 août (Y. Aubry) pourront intéresser le lecteur.

RALE JAUNE - Coturnicops noveboracensis

Le seul individu noté cet automne a été contraint de s'envoler sous les yeux de A. Bouchard le 10 août à St-Paul-du-Nord.

GALLINULE COMMUNE - Gallinula chloropus

N=15, M=12, A=0.39, C=3.2

Quarante (40) oiseaux à l'Ile aux Fermiers le 21 août (J. Hardy et al) constituent évidemment un bon nombre... Les seuls oiseaux notés près de Québec sont l'adulte et le juvénile observés par R. Barry au Cap Tourmente le 3 septembre.

FOULQUE D'AMERIQUE - Fulica americana

N=5

R. Barry observa un adulte et neuf (9) juvéniles le 3 septembre au Cap Tourmente accompagnant les deux (2) gallinules sus-mentionnées. On note cette espèce au même endroit jusqu'au 14 octobre, alors que deux (2) individus sont encore présents (COQ, P. Lane). Voir autres chroniques.

PLUVIER A COLLIER - Charadrius semipalmatus

	N	M	A	C
Août	81	24	9.7	40
Septembre	36	13	4.5	35
Octobre	5	1.4	0.08	5.6
Novembre	0	0	0	0
Total	122	20	5.3	26

Trois cent (300) oiseaux à Rivière-Portneuf le 10 août (A. Bouchard). Le 10 octobre, les trois (3) derniers individus pour Maizerets sont notés (P. Chagnon et al), tandis qu'à Beauharnois, on en note encore un le 31 octobre (P. Bannon).

PLUVIER SIFFLEUR - Charadrius melodus

Voir "Iles-de-la-Madeleine".

PLUVIER KILDIR - Charadrius vociferus

	N	M	A	C
Août	78	9.9	3.8	38
Septembre	42	12	4.9	41
Octobre	12	5.5	0.74	13
Novembre	1	1.0	0.02	1.5
Total	133	10	2.9	29

Un «rassemblement» de cent quinze (115) oiseaux est observé à St-Joseph-de-Beauce le 15 août (Y. Maheu et al). Le 25 novembre, R. Barry et L. Messely notent à Maizerets un dernier individu pour la région de Québec cet automne.

PLUVIER DORE D'AMERIQUE - Pluvialis dominica

N=28, M=22, A=1.3, C=6.1

L'espèce est d'abord notée le 10 août à Cap-aux-Meules, deux (2) individus (Y. Anbry), puis à l'Ile-aux-Grues alors que J. Hardy et al en observèrent trois (3). Deux (2) observations intéressantes de par le nombre d'individus réunis: quarante-trois (43) à St-Joseph-de-Beauce le 23 août (C. Maheu et al) et quatre cent cinquante (450) à St-Lazare le 6 septembre (R. Yank, P. Smith). Les deux (2) derniers oiseaux sont notés à Maizerets le 30 septembre (G. Falardeau).

PLUVIER ARGENTE - Pluvialis squatarola

	N	M	A	C
Août	78	63	24	38
Septembre	22	13	2.8	21
Octobre	7	12	.91	7.9
Novembre	5	2.8	.21	7.6
Total	112	47	12	24

La présence, entre autres espèces, de mille (1000) individus à Rivière-Portneuf le 17 août (A. Desrochers, P. Delacretaz) confirme l'excellence du site pour les limicoles. Le dernier oiseau de l'automne est observé à Maizerets le 18 novembre par D. Blouin.

TOURNE-PIERRE ROUX -Arenaria interpres

N=68, M=18, A=2.7, C=15

Nous retenons seulement la dernière mention, soit un oiseau à Maizerets le 30 octobre (P. Chagnon).

BECASSE D'AMERIQUE - Philohela minor

N=2

Un oiseau à Bergeronnes le 17 octobre (A. Bouchard). Il ne fait aucun doute que des chasseurs nous auraient "rapporté" plus d'oiseaux.

BECASSINE DES MARAIS - Capella gallinago

N=37, M=12, A=0.94, C=8.0

Seule la dernière mention de l'automne est retenue ici: un individu au Cap Tourmente le 31 octobre (Y. Aubry).

COURLIS CORLIEU - Numenius phaëopus

N=26, M=16, A=0.89, C=5.6

Y. Aubry en mentionne au groupe de cent (100) à Havre-aux-Maisons (Iles-de-la-Madeleine) le 7 août. Un oiseau est présent à Maizerets le 9 août (P. Perreault) et un autre le 3 septembre (F. Grenon).

MAUBECHE DES CHAMPS - Bartramia longicauda

N=3

Trois (3) mentions de un individu: St-Joseph-de-Beauce le 15 et le 23 août (L.,Y.,C. Maheu) et St-Lazare le 6 septembre (R. Yank, P. Smith).

MAUBECHE BRANLE-QUEUE - Actitis macularia

	N	M	A	C
Août	96	5.5	2.6	47
Septembre	36	3.5	1.3	35
Octobre	3	2.0	0.07	3.4
Novembre	0	0.0	0.0	0.0
Total	135	4.9	1.4	29

Les deux (2) dernières sont notées à Maizerets le 10 octobre par A. Duquette et al.

CHEVALIER SOLITAIRE - Tringa solitaria

N=20, M=1.4, A=0.06, C=4.3

Cinq (5) à Villeneuve le 12 août (A. Desrochers, P. Delacretaz) et un dernier au Cap Tourmente le 12 octobre (L. Gariépy).

CHEVALIER SEMI-PALME - Catoptrophorus semipalmatus

Voir "Iles-de-la-Madeleine".

GRAND CHEVALIER A PATTES JAUNES - Tringa melanoleuca

	N	M	A	C
Août	82	16	6.6	40
Septembre	30	20	5.7	29
Octobre	16	14	2.5	18
Novembre	1	1.0	0.02	1.5
Total	129	16	4.6	28

Un dernier oiseau à Maizerets le 8 novembre (COQ, A. Desrochers).

PETIT CHEVALIER A PATTES JAUNES - Tringa flavipes

	N	M	A	C
Août	84	46	19	41
Septembre	37	20	7.0	36
Octobre	4	7.5	0.34	4.5
Total	125	37	10	27

A. Bouchard décrit un oiseau coloré de jaune, porteur d'une bague bleue au pied droit le 13 septembre à Bergeronnes. L'espèce est rapportée jusqu'au 10 octobre, alors que deux (2) sont présents à Maizerets (R. Bisson et al) et vingt (20) aux Bergeronnes (A. Bouchard).

BECASSEAU A POITRINE ROUSSE - Calidris canutus

N=30, M=9.4, A=0.61, C=6.5

Un seul oiseau est vu dans la région de Québec à Maizerets du 1er au 3 août (F. Grenon). Celui du 25 octobre à Melocheville (R. Yank) constitue la dernière mention.

BECASSEAU MARITIME - Calidris maritima

N=4

Deux (2) individus à Maizerets du 28 octobre au 1er novembre (P. Delacretaz et al) et quatre (4) autres à l'extrémité du quai de la cimenterie à Villeneuve (A. Desrochers et al); puis un le 4 novembre dans le même secteur (G. Falardeau).

BECASSEAU A POITRINE CENDREE - Calidris melanotos

N=35, M=4.5, A=0.34, C=7.6

La dernière mention provient de Maizerets, un oiseau le 30 octobre (G. Seutin).

BECASSEAU A CROUPION BLANC - Calidris fuscicollis

N=71, M=19, A=3.0, C=15

Un groupe de cinq cent (500) à Maizerets le 20 août (Y. Aubry) est inusité pour l'endroit. Les trois (3) derniers oiseaux de la saison y étaient présents le 1er novembre (C. Simard).

BECASSEAU DE BAIRD - Calidris bairdii

N=10, M=2.4, A=0.05, C=2.2

Deux (2) oiseaux à la Pointe de l'Est (Iles-de-la-Madeleine) le 2 août (Y. Aubry). Noté par plusieurs observateurs à cinq (5) reprises à Maizerets entre le 11 août et le 13 septembre pour un maximum de trois (3) individus. Mentionnons enfin la présence de huit (8) individus à Baieville le 24 septembre (D. Jauvin).

BECASSEAU MINUSCULE - Calidris minutilla

N=107, M=21, A=5.0, C=23

Deux cent (200) oiseaux à Rivière-Portneuf le 10 août (A. Bouchard) ne surprennent pas, contrairement à cent quatre-vingt (180) à Maizerets le 29 août (F. Grenon). Les dernières mentions sont: quatre (4) à Bergeronnes le 21 septembre (A. Bouchard) et un seul le 22 au Lac St-Pierre (D. Jauvin).

BECASSEAU VARIABLE - Calidris alpina

N=51, M=8.8, A=0.97, C=11

Un dernier individu à Maizerets le 21 novembre (A. Desrochers, R. Simard).

BECASSEAU ROUX - Limnodromus griseus

N=54, M=4.8, A=0.57, C=12

Cette espèce nous quitte tôt: le 6 septembre à Beauport (A. Desrochers et le 12 septembre à l'Ile du Moine (R. Yank, P. Smith).

BECASSEAU A LONG BEC - Limnodromus scolopaceus

Le 29 août, R. Yank décrit ainsi un oiseau: bec au moins 2.5 fois la longueur de la tête. Tête, nuque, gorge et partie supérieure de la poitrine gris uniforme, un peu plus pâle que le dos. Côtés de la poitrine, à partir du replis de l'aile jusqu'à la base de la queue, marques de rayures grises. Marques sur le côté et en dessous de la queue plutôt irrégulière consistant en taches plutôt qu'en rayures; le reste des parties inférieures blancs sans roux. Pattes verdâtres; manteau gris avec plumes de l'aile, grandes sus-alaires, grises avec une étroite bordure blanchâtre.

Le 7 septembre, Pierre Bannon dit parlant du même oiseau: «plumage très gris, bec très long; cri caractéristique très différent de celui du Bécasseau roux (série de notes très hautes)».

BECASSEAU A ECHASSES - Micropalma himantopus

N=24, M=1.6, A=0.08, C=5.2

Des vingt-quatre (24) mentions reçues, dix-neuf (19) proviennent des battures de Beauport alors que de un à deux (2) individus y sont présents du 12 août au 7 septembre (Y. Aubry et al). L'Ile-aux-Grues pour sa part en accueille un le 22 août (N. David et al).

N.D.L.R. Le nombre de mentions ne reflète évidemment pas le statut réel de cette espèce rare dans la région de Québec en particulier.

BECASSEAU SEMI-PALME - Calidris pusilla

	N	M	A	C
Août	94	1500	700	46
Septembre	40	500	190	39
Octobre	4	4.2	19	4.5
Total	138	1200	350	30

Outre Maizerets avec ses dix mille (10,000) le 11 août (M. Darveau), Rivière-Portneuf se signale avec ses six mille (6,000) la journée précédente (A. Bouchard). L'espèce est mentionnée pour la dernière fois le 10 octobre à Maizerets alors que A. Desrochers et al y notent cinq (5) oiseaux.

BECASSEAU DU NORD-OUEST - Calidris mauri

N=2

P. Bannon vous livre la description suivante de ceux observés à Côté Ste-Catherine (voir résumé provincial): "Observés à moins de dix (10) pieds; à cette distance, il est facile de noter le roux dans les scapulaires. Les deux (2) oiseaux présentent également un peu de roux dans

le dos; les extrémités de certaines tertiaires sont également colorées de roux. Le bec est définitivement plus long et plus épais que celui du Bécasseau semi-palmé; il est également très légèrement incurvé".

BECASSEAU ROUSSATRE - Tryngites subruficollis

N=4

Un oiseau à trois (3) reprises à l'Ile du moine: le 22 août (P. Bannon, P. Chagnon) le 7 septembre (P. Bannon, J. Wright) et le 12 septembre (R. Yank, P. Smith). Un autre photographié à Maizerets le 27 août (Y. Aubry).

BARGE MARBREE - Limosa fedoa

Voir résumé provincial.

BARGE HUDSONIENNE - Limosa haemastica

N=13, M=2.1, A=0.06, C=2.8

Un adulte est présent du 13 août au 12 septembre à Beauport (G. Parent et al) et une autre le 24 octobre (G. Falardeau). Une mention très tardive d'un individu à Maizerets le 1er novembre (A. Gouge, L. Parent, C. Vachon, C. Simard).

CHEVALIER COMBATTANT - Philomachus pugnax

Voir autres chroniques.

BECASSEAU SANDERLING - Calidris alba

N=66, M=33, A=4.7, C=14

Le 22 août, A. Bouchard et al en comptent cinq cent (500) à Rivière-Portneuf et le 2 septembre M. Darveau et D. White mille (1,000) à l'Etang du Nord (Iles-de-la-Madeleine). Le 8 novembre un oiseau est encore présent à Maizerets (COQ, A. Desrochers).

PHALAROPE ROUX - Phalaropus fulicarius

N=2

Un adulte est présent à Maizerets le 30 septembre (G. Falardeau):

- bec entièrement noir assez épais;
- dessus de la tête et nuque noirs se prolongeant à l'arrière du cou en une bande grisâtre;
- une bande noire traverse l'oeil;
- parties inférieures blanches; elles seraient immaculées si ce n'était d'un soupçon de mazout.
- dos gris pâle uniforme

La couleur des pattes ne peut être notée. Un autre adulte au même endroit le 30 octobre (P. Chagnon, G. Seutin).

PHALAROPE DE WILSON - Steganopus tricolor

N=10, M=1.6, A=0.03, C=2.2

En plus des endroits habituels, l'espèce est signalée à Berniè-res le 17 août par G. Fréchette, sur des pelouses commerciales de grande étendue,avec des chevaliers à pattes jaunes,se nourrissant dans des fla-ques d'eau.

PHALAROPE HYPERBOREEN - Lobipes lobatus

N=14, M=14, A=0.41, C=3.0

A noter la présence de soixante (60) individus à Bergeronnes le 30 août (A. Bouchard) et de vingt-et-un (21) à Baieville le 1er septem-bre (D. Jauvin). Le groupe de quinze (15) à Tadoussac le 4 octobre constitue la dernière mention.

M. Gosselin nous livre le commentaire suivant à propos du qua-trième (4e) et dernier oiseau noté à Maizerets cet automne: (article suivant)

«Le 26 septembre 1981 peu après-midi, je me rends à la pointe de "Maizerets" (Québec) dans l'espoir d'y observer le Phalarope roux si-gnalé là quelques minutes plus tôt et qui m'avait été décrit comme por-tant encore des traces de plumage nuptial: roux sur la poitrine, noir et or sur le dos. Nous n'eûmes aucune difficulté à retrouver l'oiseau exactement où il devait être, seul sur la plage, au nord du petit sta-tionnement nouvellement aménagé à la pointe.

Ce Phalarope grassouillet, monté sur des pattes jaunâtres, cour-tes et fortes, avait l'allure caractéristique d'un Phalarope roux avec son dos noir et or et sa poitrine lavée de roux. Comme on nous l'avait dit, nous pûmes facilement nous approcher à un ou deux (2) mètres de l'oiseau. Il m'apparu alors que le roux de la poitrine ne pouvait être un reste du plumage nuptial puisqu'il se fondait imperceptiblement dans le blanc adjacent sans aucune des mouchetures caractéristiques de la mue. Lorsque l'oiseau se nourrissait dans l'eau, ce roux, du front jusqu'au ventre, se terminait exactement à la ligne de flottaison. J'o-sais donc voir là des traces d'une oxydation semblable à celle qui mar-que si fréquemment les oies et les canards, mais j'hésitais à attribuer à cette seule cause une coloration aussi évidente.


Le dos noir portait un large〈V〉d'or tandis que les scapulaires et les tertiaires, noires aussi, étaient marginées de roux doré. Ce motif était différent du plumage nuptial du Phalarope roux où toutes les plumes du dos sont également marginées de roux doré formant un des-sin uniformément ligné et non chevronné.

N'étant pas aussi familier avec les caractéristiques d'âge des Phalaropes qu'avec celles des Bécasseaux plus communs, je notai soigneu-sement tous les détails du plumage. Mes soupçons, à l'effet que l'oi-seau était un jeune de l'année se trouvèrent confirmés dès que je pus consulter quelques ouvrages de référence. Tous les traits de plumage, y compris les dessous teintés de roux s'accordaient parfaitement avec ceux des juvéniles du Phalarope roux ou hyperboréen, lesquels s'avèrent étrangement semblables à ce stade.

Mon attention s'était également portée sur le bec mince et noir, fin comme une aiguille, que je savais être celui d'un Phalarope hyperboréen. Bien que la coloration jaune de bec puisse être absente chez le Phalarope roux (surtout juvénile), la structure du bec ne change pas le Phalarope roux a un bec relativement court et obtus, un peu semblable à celui du Bécasseau semi-palmé.

Les Phalaropes roux et hyperboréens adultes sont généralement illustrés avec des pattes respectivement jaunes et noires, mais ce caractère varie avec l'âge et la saison (grisâtre chez les jeunes P. roux et jaunâtre chez les jeunes P. hyperboréens). Quant à l'aspect rondelet de notre oiseau, il était nul doute dû aux énormes quantités de graisse que les limicoles peuvent accumuler à l'automne (près d'un centimètre d'épaisseur par moment)».

Michel Gosselin



D'après sketch original, Québec le 26 septembre 1981, M.G.

LABBE POMARIN - Stercorarius pomarinus

Les trois (3) observés au large de Tadoussac le 4 octobre constituent la seule mention pour l'automne (G. Seutin et al). Voir "Iles-de-la-Madeleine".

LABBE PARASITE - Stercorarius parasiticus

N=7

N.D.L.R. Aucune mention hors de l'estuaire du St-Laurent.

LABBES - Stercorarius spp.

N=7

Jean Hardy fut le seul à notre connaissance qui observa des Labbes dans la région de Québec: deux (2) le 4 octobre et trois (3) le 9 à Maizerets.

GOELAND BOURGMESTRE - Larus hyperboreus

N=4

Le 7 novembre, cinq cent (500) sont présents à Tadoussac (Y. Aubry) alors que pour la région de Québec le premier individu, un juvénile est signalé le 23 novembre à Québec (P. Delacretaz).

GOELAND ARCTIQUE Larus glaucoides

N=4

Deux mille (2,000) sont présents à Tadoussac le 7 novembre (Y. Aubry) alors qu'à Maizerets, un individu est noté le 25 novembre (L. Viau, M. Darveau).

GOELAND A MANTEAU NOIR - Larus marinus

	N	M	A	C
Août	98	68	33	48
Septembre	43	32	13	42
Octobre	40	19	8.5	45
Novembre	29	67	29	44
Total	210	51	23	45

Y. Aubry en mentionne mille (1,000) à Tadoussac le 7 novembre alors que le 8, P. Bannon en note cinq cent (500) à Beauharnois.

GOELAND ARGENTE - Larus argentatus

	N	M	A	C
Août	100	270	130	50
Septembre	45	125	55	44
Octobre	44	121	60	49
Novembre	31	470	220	47
Total	223	240	110	48

Dix mille (10,000) à Tadoussac le 7 novembre (Y. Aubry) et le 8 novembre trois mille (3,000) à Beauharnois (P. Bannon).

GOELAND A BEC CERCLE - Larus delawarensis

	N	M	A	C
Août	110	210	11	53
Septembre	57	200	9.6	55
Octobre	36	96	39	40
Novembre	25	500	190	38
Total	230	220	110	49

Cinq cent (500) à Tadoussac le 7 novembre (Y. Aubry) et dix mille (10,000) à Beauharnois le 8 (P. Bannon).

GOELAND CENDRE - Larus canus

N=2

Deux (2) adultes furent observés un à Beauharnois du 8 au 13 novembre (P. Bannon et al) et un autre à l'embouchure de la rivière Malbaie les 7 et 8 novembre (Y. Aubry et al). Ces deux (2) observateurs notent les détails suivants:

- tête et cou rayés gris-brun;
- bec plus mince et plus court que celui d'un Goéland à bec cerclé et de couleur uniforme.

Yves Aubry ajoute:

- oeil foncé;
- taille d'un Goéland à bec cerclé;
- pattes jaunes;
- manteau de couleur intermédiaire entre Goéland à bec cerclé et Mouette rieuse d'Amérique;
- la région blanche subterminale de la dixième (10e) primaire est plus étendue.

et Pierre Bannon:

- plus petit qu'un Goéland à bec cerclé;
- manteau d'un gris semblable;
- pattes et bec verdâtres.

N.D.L.R. Les différences notées entre ces deux (2) oiseaux peuvent originer de caractères individuels et intra-spécifiques, puisqu'il est possible de rencontrer au moins deux (2) sous-espèces identifiables de cette espèce au Québec.

MOUETTE RIEUSE D'EUROPE - Larus ridibundus

N=8

L'adulte signalé à Havre St-Pierre au mois de juillet y est toujours les 17 et 19 août (A. Bouchard et al). Un autre (?) adulte est présent à Tadoussac le 12 septembre (R. Simard, P. Delacretaz). Le 10 novembre à Maizerets, Y. Aubry observe un sub-adulte:

" - grosseur intermédiaire entre Mouette de Bonaparte et Goéland à bec cerclé;

- couverture des ailes encore marquée d'un motif brun pâle;
- primaires externes marquées de la large région blanche semblable à celle des adultes;
- dessous de l'extrémité des ailes noirâtres;
- les deux (2) tiers proximaux du bec jaunâtre, tiers distal noir;
- bande subterminale noire à la queue;
- manteau gris".

Toutes les autres mentions proviennent des Iles-de-la-Madeleine.

MOUETTE RIEUSE D'AMERIQUE - Larus atricilla

La seule mention est du 23 août à St-Joseph-de-Beauce alors que L., Y., et C. Maheu donnent une bonne description d'un individu en plumage de 2o hiver.

MOUETTE DE FRANKLIN - Larus pipixcan

Le spécimen trouvé mort à Maizerets le 4 novembre par G. Falardeau était une jeune femelle dont la cause de la mort n'a pu être déterminée celle-ci s'étant révélée en bonne condition suite à son examen par les Musées Nationaux du Canada.

MOUETTE DE BONAPARTE - Larus philadelphia

N=57, M=23, A=2.9, C=12

Les dix-neuf (19) individus observés à Maizerets le 22 novembre par C. Simard constituent une mention très tardive pour cette espèce près de Québec.

MOUETTE PYGMEE - Larus minutus

N=5

Cinq (5) mentions impliquant chacune un individu le 8 août: à l'Ile du Moine (M. McIntosh et al) le 18 août, à Lauzon (P. Thibault) et aux Escoumins le 29 septembre (A. Bouchard) et enfin le 4 octobre à Tadoussac (G. Seutin et al). Voir "Iles-de-la-Madeleine".

MOUETTE TRIDACTYLE - Rissa tridactyla

N=46, M=370, A=37, C=10

Une immature est observée à Maizerets le 10 août (F. Grenon).

MOUETTE DE SABINE - Xema sabini

Voir résumé provincial.

STERNE COMMUNE - Sterna hirundo

N=64, M=200, A=28, C=14

Les six (6) dernières pour la saison sont vues à St-François-du-Lac le 26 septembre par D. Jauvin.

STERNE ARCTIQUE - Sterna paradisaea

N=14, M=51, A=1.6, C=3.0

Une colonie comptant cent cinquante (150) sternes est signalée sur une petite île, en face de Port-Cartier; visitée par L. Guillemette le 15 août. Le 4 octobre, M. Gosselin et al en observent une au large de Tadoussac: "Vue de dessous, bec noir assez court, calotte noire (front non observé); motif caractéristique des ailes, très blanc avec une mince bordure formée par l'extrémité sombre des primaires; apparence relativement trapue". Deux (2) individus sont signalés à l'Ile-aux-Grues le 16 octobre par D. Jauvin (aucun détail).

STERNE ROSEE - Sterna dougallii

Voir "Iles-de-la-Madeleine".

STERNE CASPIENNE - Sternia caspia

N=3

R. Yank et al en observent une à l'Ile-du-Moine le 8 août. Voir "Iles-de-la-Madeleine".

STERNE NOIRE - Chlidonias niger

N=17, M=7.2, A=0.26, C=3.7

Un individu fréquente les battures de Beauport du 1er au 27 août (F. Grenon et al). Voir "Iles-de-la-Madeleine".

GODE - Alca torda

N=6

Un oiseau est présent à Maizerets le 28 novembre (M. Poulin et al). Voir "Iles-de-la-Madeleine".

MARMETTE COMMUNE - Uria aalge

N=2

Les mentions proviennent de ses quartiers de nidification.

MERGULE NAIN - Alle alle

N=2

Un individu est d'abord noté à Maizerets le 23 novembre par D. Toussaint: "...contraste noir blanc des Alcidés, a peu près de la taille d'un pluvier; vole très rapidement, très près de la surface..."

Puis un autre au même endroit le 28 novembre par P. Delacretaz, R. Simard, A. Desrochers et M. Poulin. "Observés de près au vol en compagnie d'un gode. Taille minuscule, pas de tache blanche dans les ailes, vol ramé très caractéristique. La tête n'est pas trapue comme celle du macareux; d'ailleurs la gorge et le bas du cou sont blancs". A. D.

GUILLEMOT NOIR - Cepphus grylle

N=35, M=13, A=0.98, C=7.6

Nous retiendrons les mentions de Maizerets: un (1) le 8 août (P. Lane et al) et le 10 octobre (P. Chagnon, G. Duquette, A. Desrochers), six (6) en plumage d'hiver le 8 novembre (COQ, A. Desrochers) et enfin, un le 25 novembre (P. Delacretaz et al).

MACAREUX MOINE - Fratercula arctica

N=3

Y. Aubry et G. Duquette en dénombrent trois cent (300) à l'Ile Brion (Iles-de-la-Madeleine) le 1er août.

PIGEON BISET - Columba livia

N=93, M=29, A=5.9, C=20

TOURTERELLE TRISTE - Zenaida macroura

N=38, M=3.4, A=0.29, C=8.2

On en signale une à Port-Cartier le 15 août (L. Guillemette). La dernière mention provient de A. Bouchard qui en observe une le 18 octobre aux Bergeronnes.

PETIT-DUC MACULE - Otus asio

Une seule observation provenant de Beaconsfield alors que R. Yank entend le cri d'un individu.

GRAND-DUC D'AMERIQUE - Bubo virginianus

N=11, M=1.1, A=0.02, C=2.38

On note la présence d'un individu à la colonie de Maizerets à partir du 18 novembre (D. Blouin); un deuxième (2e) oiseau lui tient compagnie le 21 novembre (R. Simard, A. Desrochers).

HARFANG DES NEIGES - Nyctea scandiaca

N=5

L'espèce est mentionnée tôt aux-Iles-de-la-Madeleine (Voir "Iles-de-la-Madeleine". Puis l'espèce est signalée à Kamouraska le 14 octobre (P. Bannon) et à Maizerets à partir du 17 novembre (R. Simard).

CHOUETTE EPERVIERE - Sturnia ulula

M. Giroux et M. Boulé en découvrent une à Charlesbourg le 30 novembre . A suivre.

CHOUETTE RAYEE - Strix varia

La seule mention est celle d'un individu qu'observa G. Morissette à Portneuf-Station le 4 novembre.

HIBOU DES MARAIS - Asio flammeus

N=8

Deux (2) individus à Maizerets le 1er novembre (Y. Aubry), un le 29 (C. Simard) et deux (2) le 30 novembre (P. Delacretaz).

NYCTALE BOREALE - Aegolius funereus

Voir "Iles-de-la-Madeleine".

PETITE NYCTALE - Aegolius acadicus

N=4

A. Bouchard mentionne un individu aux Bergeronnes le 8 novembre. C. Marcotte en avait trouvé une morte à St-Marc-des-Carrières le 4 novembre.

ENGOULEMENT MANGE-MARINGOUINS - Chordeiles minor

N=10, M=1.7, A=0.03, C=2.2

L'espèce est signalée jusqu'au 27 août alors que A. Bouchard et A. Pelletier en notent un à Bergeronnes et Y. Aubry trois (3) à Maizerets.

MARTINET RAMONEUR - Chaetura pelagica

N=4

L'espèce semble nous quitter tôt, les deux (2) derniers individus étant observés à St-Joseph-de-Beauce le 15 août par L. Maheu et al.

N.D.L.R. Cette espèce est peu mentionnée à l'automne.

COLIBRI A GORGE RUBIS - Archilochus colubris

N=22, M=3.5, A=0.16, C=4.8

Quelques mentions impliquant un nombre intéressant d'individus: à Villeneuve quinze (15) le 12 août (A. Desrochers, P. Delacretaz) et dix (10) le 26 (A. Desrochers) puis à St-Lambert de Lévis, trente (30) le 6 septembre (P. Thibault).

MARTIN-PECHEUR - Megaceryle alcyon

N=89, M=3.0, A=0.60, C=19

D. Perreault et J. Morin en notent cinquante (50) à Plaisance le 5 septembre. La dernière mention de la saison, un individu le 25 octobre à Portneuf, en est une tardive pour la région de Québec.

PIC FLAMBOYANT - Colaptes auratus

	N	M	A	C
Août	38	2.1	0.40	19
Septembre	23	2.3	0.51	22
Octobre	6	2.5	0.17	6.7
Novembre	1	1.0	0.02	1.5
Total	68	2.2	0.33	15

Cap Tourmente recèle trois (3) individus le 14 octobre (COQ, P. Lane) et St-Laurent (Montréal) un le 5 novembre.

GRAND PIC - Dryocopus pileatus

N=7

On note la présence d'un individu le 9 septembre à St-Augustin (R. Angers).

PIC MACULE - Sphyrapicus varius

N=7

La dernière mention de la saison est celle d'un individu à Ste-Foy le 1er octobre (P. Delacretaz).

PIC CHEVELU - Picoides villosus

	N	M	A	C
Août	9	1.3	0.06	4.4
Septembre	3	1.3	0.04	2.9
Octobre	15	1.3	0.22	17
Novembre	15	1.2	0.27	23
Total	42	1.2	0.12	9.1

PIC MINEUR - Picoides pubescens

	N	M	A	C
Août	14	1.2	0.08	6.9
Septembre	7	1.0	0.07	6.8
Octobre	25	1.7	0.49	28
Novembre	15	1.7	0.39	23
Total	61	1.5	0.20	13

Le 5 août à Bergeronnes, A. Bouchard signale un mâle avec "la calotte entièrement rouge".

PIC A DOS NOIR - Picoides arcticus

N=6

La seule mention dans la région de Québec est celle d'une femelle observée à Portneuf-Station le 11 novembre par G. Morissette.

TYRAN TRITRI - Tyrannus tyrannus

N=32, M=4.0, A=0.28, C=6.9

G. Seutin et al en mentionnent vingt (20) à l'Ile-aux-Grues alors que le lendemain le même groupe d'observateurs en notent dix (10) au Cap Tourmente. Du même endroit provient la dernière mention, un individu le 19 septembre (COQ, R. Simard).

MOUCHEROLLE HUPPE - Myiarchus crinitus

N=8

Fidèle à son habitude, cette espèce nous quitte tôt alors qu'elle est signalée pour la dernière fois de la saison le 25 août à St-François-du-Lac (D. Jauvin) si on exclue celui de LG-2 (voir résumé provincial).

MOUCHEROLLE PHEBI - Sayornis phoebe

N=3

Très peu de mentions nous furent rapportées cet automne. Dernière mention: le 4 octobre, un individu à Vimont (R. Pelletier).

MOUCHEROLLE A VENTRE JAUNE - Empidonax flaviventris

N=4

L'espèce fut observée le 8 août, un individu à Buckland (R. Bisson) et deux (2) à l'Ile-Verte (G. Pauzé, M. Lebel, A. Leclerc) le 17 août, un à Havre St-Pierre (A. Bouchard) et le 22 août, un à l'Ile-aux-Grues (J. Hardy et al).

MOUCHEROLLE DES AULNES - Empidonax alnorum

N=18, M=3.8, A=0.15, C=3.9

La chronologie de migration de cette espèce nous semble paradoxale si on s'en tient au dernières mentions qui nous sont parvenues de diverses régions de la province: le 14 août à Notre-Dame-des-Bois (V. Létourneau, F. Shaffer) pour le sud, le 15 août à Boischatel (G. Falardeau) pour le centre et le 30 août à Bergeronnes (A. Bouchard) pour le nord.

MOUCHEROLLE TCHEBEC - Empidonax minimus

N=8

Celui observé à Courville le 27 août par A. Desrochers constitue la dernière mention à nous parvenir.

MOUCHEROLLES - Empidonax SPP

N=10, M=2.9, A=0.06, C=2.2

Le dernier à Cap Tourmente le 5 septembre (P. Delacretaz, A. Desrochers).

PIOUI DE L'EST - Contopus virens

N=19, M=2.5, A=0.10, C=4.11

L'espèce nous est signalée jusqu'au 6 septembre alors que D. Perreault et J. Morin notent trois (3) individus à Plaisance et que J.-L. Desgranges en note un à St-Nicolas.

MOUCHEROLLE A COTES OLIVE - Nuttallornis borealis

N=4

Parmi le petit nombre de mentions, nous retiendrons la dernière en date: un oiseau à Québec le 7 septembre (C. Vachon) et la mention record (voir résumé provincial).

ALOUETTE CORNUE - Eremophila alpestris

N=67, M=23, A=3.3, C=14

Trois cent (300) sur la pelouse ensemencée de l'aéroport de Gagnon le 25 septembre (S. Tremblay).

HIRONDELLE BICOLORE - Iridoproche bicolor

N=53, M=90, A=10, C=11

P. Brousseau nous rapporte la présence de deux (2) individus à La Pocatière le 16 novembre. Cette date est à une journée près du record provincial.

HIRONDELLE DES SABLES - Riparia riparia

N=53, M=86, A=9.9, C=11

A. Desrochers et M. Darveau évaluent à mille (1,000) celles présentes aux battures de Beauport le 16 août. Les quatre (4) dernières sont signalées au Lac St-Pierre le 22 septembre (D. Jauvin).

HIRONDELLE DES GRANGES - Hirundo rustica

N=53, M=16, A=1.8, C=11

Voir résumé provincial.

HIRONDELLE A FRONT BLANC - Petrochelidon pyrrhonota

N=5

Trois cent (300) à Plaisance le 5 septembre (D. Perreault, J. Morissette) et dix (10) le lendemain.

N.D.L.R. Pas mentionnée près de Québec.

HIRONDELLE POURPREE - Progne subis

N=5

La dernière mention est de St-Nicolas, trois (3) individus le 30 août (J.-L. Desgranges).

GEAI GRIS - Perisoreus canadensis

N=18, M=3.0, A=0.11, C=3.9

On note la présence d'un oiseau à Maizerets le 10 octobre (A. Michaud et al), ce qui est inusité.

GEAI BLEU - Cyanocitta cristata

	N	M	A	C
Août	19	3.5	0.33	9.3
Septembre	15	8.4	1.2	15
Octobre	19	2.3	0.49	21
Novembre	17	5.2	1.3	26
Total	70	4.6	0.71	15

GRAND CORBEAU - Corvus corax

N=73, M=4.7, A=0.75, C=16

CORNEILLE D'AMERIQUE - Corvus brachyrhynchos

	N	M	A	C
Août	73	16	5.9	36
Septembre	44	52	22	43
Octobre	35	37	15	39
Novembre	9	6.6	0.91	14
Total	161	30	10	35

MESANGE A TETE NOIRE - Parus atricapillus

N=148, M=8.4, A=2.7, C=32

MESANGE A TETE BRUNE - Parus hudsonicus

N=36, M=6.0, A=0.46, C=7.8

Y. Hamel en mentionne une à un poste d'alimentation au Lac Beauport le 18 septembre. Plus au sud, une première le 24 octobre à l'Ile-des-Soeurs (P.-F. Dupal); puis trente (30) le 1er novembre à St-Lazare (P. Bannon).

SITTELLE A POITRINE BLANCHE - Sitta carolinensis

N=33, M=1.5, A=0.10, C=7.1

SITTELLE A POITRINE ROUSSE - Sitta canadensis

N=56, M=2.7, A=0.33, C=12

Des sittelles à tendance pélagique nous sont signalées: le 16 août, sur le "Fort Mingan", au large de Natashquan, A. Bouchard en rencontre une sur le pont; puis M. Darveau et D. White vivent une expérience similaire le 4 septembre sur le traversier les menant aux-Iles-de-la-Madeleine. L'espèce semble plus abondante en milieu terrestre: cinquante (50) à St-Lazare le 1er novembre (P. Bannon).

GRIMPEREAU BRUN - Certhia familiaris

N=10, M=1.7, A=0.03, C=2.2

TROGLODYTE FAMILIER - Troglodytes aedon

N=2

Un à Baieville le 1er septembre (D. Jauvin) et un autre au Cap Tourmente le 14 octobre (COQ, P. Lane).

TROGLODYTE DES FORETS - Troglodytes troglodytes

N=10, M=1.8, A=0.03, C=2.2

Dernière mention: deux (2) au Cap Tourmente le 26 octobre (L. Messely et al).

TROGLODYTE DES MARAIS - Cistothorus palustris

N=2

On note la présente de cinq (5) individus à l'Ile-du-Moine le 8 septembre (R. Yank, M. McIntosh).

TROGLODYTE A BEC COURT - Cistothorus platensis

N=2

Deux (2) mentions à l'Ile-du-Moine: un le 8 août et six (6) le 29 du même mois (R. Yank).

MOQUEUR POLYGLOTTE - Mimus polyglottos

Le seul individu mentionné fut observé à Lévis le 2 novembre par F. Grenon.

MOQUEUR CHAT - Dumetella carolinensis

N=23, M=2.2, A=0.11, C=4.9

Le dernier est noté le 26 octobre au Cap Tourmente par J.-P. Barry et al.

MERLE D'AMERIQUE - Turdus migratorius

	N	M	A	C
Août	49	14	3.4	24
Septembre	23	8.0	1.8	22
Octobre	28	8.2	2.6	31
Novembre	6	1.6	0.15	9.1
Total	106	11	2.4	23

Un groupe de quatre cent (400) le 23 août au Cap Tourmente (J. Hardy et al).

GRIVE DES BOIS - Hylocichla mustelina

N=3

Un seul oiseau mentionné près de Québec, soit à Courville le 1er août, André Desrochers.

GRIVE SOLITAIRE - Catharus guttatus

N=13, M=1.3, A=0.03, C=2.8

La mention d'un individu à Maizerets le 28 novembre (R. et J.-P. Barry) n'est pas surprenante.

GRIVE A DOS OLIVE - Catharus ustulatus

N=17, M=2.0, A=0.07, C=3.67

L'individu signalé au Cap Tourmente le 18 octobre (M.-F. Poirier) est le dernier de la saison.

GRIVE A JOUES GRISES - Catharus minimus

On en mentionne deux (2) à l'Ile-Verte le 8 août (G. Pauzé, M.Léger et A. Leclerc). Pas de détails...

GRIVE FAUVE - Catharus fuscescens

N=7

Le 26 octobre, J.-P. et R. Barry et L. Messely repèrent un individu au Cap Tourmente. Peut-être leur apprendra-t-on qu'il s'agit d'une date record, battant l'ancienne d'une journée.

MERLE BLEU A POITRINE ROUGE - Sialia sialis

N=2

Le 26 août, P. Thibault en note deux (2) à St-Lambert-de-Lévis et le 4 octobre, R. Barry en signale cinq (5) à Lévis.

TRAQUET MOTTEUX - Oenanthe oenanthe

N=2

R. Yank nous fournit la description suivante d'un adulte en plumage d'hiver à l'Ile-du-Moine (voir résumé provincial): "...importante région blanche sur le croupion et la queue lorsque l'oiseau s'éloigne au vol. L'oiseau se pose ensuite sur une bûche où il est bien observé au téléscope: face et partie inférieure rosâtres uniforme, bec et oeil noirs avec ligne noire traversant l'oeil; dos brunâtre; les plumes des ailes avec une mince bordure rosâtre. Le balancement de la queue est remarquée lorsque l'oiseau est au repos".

SOLITAIRE DE TOWNSEND - Myadestes townsendi

Voir autres chroniques.

ROITELET A COURONNE DOREE - Regulus satrapa

N=10, M=5.6, A=0.12, C=2.2

ROITELET A COURONNE RUBIS - Regulus calendula

N=22, M=2.4, A=0.11, C=4.8

P. Lane mentionne une femelle se nourrissant d'un mélange de graisse de lard, de beurre d'arachides et de petites graines à son poste d'alimentation de Courville; observée à partir du 28 novembre.

PIPIT COMMUN - Anthus spinoletta

N=39, M=24, A=2.0, C=8.4

Un pipit à Havre St-Pierre le 19 août (A. Desrochers, P. Delacretaz) est à la limite sud de son aire de nidification. L'espèce fréquente Maizerets du 6 septembre (C. Brière) au 1er novembre (Y. Aubry) avec un maximum de cent (100) individus le 3 octobre (D. Jauvin).

JASEUR DE BOHEME - Bombycilla garrulus

N=7

Le premier individu est signalé le 1er novembre à Courville (P. Lane).

JASEUR DES CEDRES - Bombycilla cedrorum

N=74, M=11, A=1.8, C=16

Jusqu'à neuf (9) individus à Gagnon entre le 12 et le 25 septembre (S. Tremblay). Dernière mention: deux (2) à La Pocatière le 26 septembre (C. Auchu).

PIE-GRIECHE BOREALE - Lanius excubitor

N=15, M=1.3, N=0.04, C=3.2

Les deux (2) premières le 14 octobre au Cap Tourmente (COQ, P. Lane).

ETOURNEAU SANSONNET - Sturnus vulgaris

N=120, M=32, A=8.4, C=26

VIREO A GORGE JAUNE - Vireo flavifrons

Voir résumé provincial.

VIREO A TETE BLEUE - Vireo solitarius

N=16, M=1.5, A=0.05, C=3.5

L'espèce est signalée pour la dernière fois le 26 octobre au Cap Tourmente (encore!) alors que R. Barry et al en trouvent quatre (4).

VIREO AUX YEUX ROUGES - Vireo olivaceus

N=22, M=2.5, A=0.12, C=4.8

Dernière mention: un à Bergeronnes le 12 septembre (A. Bouchard).

VIREO DE PHILADELPHIE - Vireo philadelphicus

N=7

Soulignons la mention intéressante, à une date record, d'un individu à Cartierville (Montréal) le 15 novembre: "Observé de près, dans un arbre dénudé. Un oiseau olivâtre sans marque évidente et qui pourrait à première vue être un Parulidé, un Sylviidé ou un Viréonidé. En observant attentivement, on remarque la combinaison de calotte grise, sourcil blanchâtre et gorge jaunâtre, caractéristique de cette espèce. Le bec relativement épais à l'extrémité confirme l'identification. Autres observateurs: Guy Gendron, Lisette Hallé, Normand David, Yves Aubry.

Michel Gosselin

VIREO MELODIEUX - Vireo gilvus

N=2

Signalons une mention, la dernière, de dix (10) individus à Plaisance le 6 septembre (D. Perreault, G. Morissette).

FAUVETTE NOIR ET BLANC - Mniotilta varia

N=18, M=1.7, A=0.06, C=3.9

Une dernière au Cap Tourmente le 14 octobre (COQ, P. Lane).

FAUVETTE OBSCURE - Vermivora peregrina

N=36, M=3.1, A=0.24, C=7.8

Les mentions d'un individu le 24 octobre à l'Ile-des-Soeurs (P.-F. Dupal) et le 26 octobre au Cap Tourmente (J.-P. Barry et al) sont exceptionnellement tardives,

FAUVETTE VERDATRE - Vermivora celata

Un adulte probable suffisamment bien décrit est mentionné le 5 octobre à Lévis par F. Grenon.

FAUVETTE A JOUES GRISES - Vermivora ruficapilla

N=25, M=2.2, A=0.12, C=5.4

Mentionnée en dernier lieu au Cap Tourmente le 4 octobre, un individu (D. White, M. Darveau).

FAUVETTE PARULA - Parula americana

N=4

Une mention tardive au Cap Tourmente, un oiseau le 14 octobre (COQ, P. Lane) et une très tardive, le 25 octobre à Baie St-Paul (COQ, M. Darveau), constituant une date record.

FAUVETTE JAUNE - Dendroica petechia

N=17, M=3.0, A=0.11, C=3.7

Le dernier oiseau est noté à Maizerets le 7 septembre par C. Simard et G. Falardeau.

FAUVETTE A TETE CENDREE - Dendroica magnolia

N=21, M=6.7, A=0.30, C=4.5

A. Bouchard en mentionne cent (100) aux Bergeronnes le 3 août. Les trois (3) dernières sont vues au Cap Tourmente le 26 octobre par L. Messely et al.

FAUVETTE TIGREE - Dendroica tigrina

N=8

Dernière mention le 15 septembre, deux (2) individus à Ste-Foy (P. Delacretaz).

FAUVETTE BLEUE A GORGE NOIRE - Dendroica caerulescens

N=4

Une à Ste-Foy le 21 septembre (P. Delacretaz).

FAUVETTE A CROUPION JAUNE - Dendroica coronata

	N	M	A	C
Août	34	27	4.5	17
Septembre	25	13	3.2	25
Octobre	21	22	5.2	24
Novembre	2	1.0	0.03	3.0
Total	82	21	3.7	18

Une mention de quatre cent (400) individus au Cap Tourmente le 23 août (N. David et al) et une autre de trois cent (300) le 4 octobre (D. White, M. Darveau). On note simultanément un individu à Courville (P. Lane) et à Québec (P. Delacretaz) le 1er novembre pour les dernières mentions de la saison.

FAUVETTE VERTE A GORGE NOIRE - Dendroica virens

N=22, M=1.9, A=0.09, C=4.8

Une autre date record: cinq (5) le 26 octobre au Cap Tourmente (J.-P. et R. Barry, L. Messely).

FAUVETTE A GORGE ORANGEE - Dendroica fusca

N=10, M=2.3, A=0.04, C=2.2

Une espèce qui quitte la région de Québec tôt, un le 20 août (!) à St-Nicolas (J.-L. Desgranges), mais demeure plus longtemps sur la Côte Nord, deux (2) le 21 septembre à Bergeronnes (A. Bouchard).

FAUVETTE A FLANCS MARRON - Dendroica pensylvanica

N=7

Le Cap Tourmente accueille le dernier individu à nous être signalé le 19 septembre (COQ, R. Simard).

FAUVETTE A POITRINE BAIE - Dendroica castanea

N=13, M=2.6, A=0.07, C=2.8

Un groupe intéressant de dix (10) individus à Maizerets le 8 août (COQ, A. Desrochers). R. Barry et al nous fournissent une fois de plus une dernière mention le 26 octobre au Cap Tourmente où un individu s'est attardé.

FAUVETTE RAYEE - Dendroica striata

N=6

Toutes les mentions pour la région de Québec se situent entre le 6 et le 15 septembre (G. Falardeau, P. Delacretaz).

FAUVETTE DES PINS - Dendroica pinus

N=2

Une à St-Michel-des-Saints le 13 août (J.-G. Gaulin) n'est pas décrite. Cinq (5) le 7 septembre dans la réserve du St-Maurice (R. Simard); identifiées alors qu'au moins une d'entre elles chantait...

FAUVETTE A COURONNE ROUSSE - Dendroica palmarum

N=4

Le 19 septembre, un à Maizerets (P. Delacretaz, M. Poulin), le 11 octobre, trois (3) au Cap Tourmente (R. Bisson et al) et le 14 octobre, deux (2) (COQ, P. Lane); enfin le 12 octobre, un à St-Joachim (L. Gariépy).

FAUVETTE COURONNEE - Seiurus aurocapillus

N=8

Le 15 septembre, un individu est encore présent à Ste-Foy (P. Delacretaz) et le 17, trois (3) sont repérés à St-Urbain (M. Comeau).

FAUVETTE DES RUISSEAUX - Seiurus noveboracensis

N=4

L'espèce semble être disparue très tôt; la dernière à Cap-aux-Meules le 10 août (Y. Aubry).

N.D.L.R. Aucune mention pour la région de Québec.

FAUVETTE TRISTE - Oporornis philadelphia

N=4

Un seul oiseau noté près de Québec, le 1er août à Villeneuve (A. Desrochers).

FAUVETTE MASQUEE - Geothlypis trichas

	N	M	A	C
Août	34	2.8	0.48	17
Septembre	14	2.6	0.36	14
Octobre	4	1.5	0.07	4.5
Total	52	2.6	0.30	11

FAUVETTE A CALOTTE NOIRE - Wilsonia pusilla

N=16, M=2.0, A=0.07, C=3.5

La dernière près de Québec fut signalée le 14 octobre au Cap Tourmente (COQ, P. Lane).

FAUVETTE DU CANADA - Wilsonia canadensis

N=15, M=1.8, A=0.06, C=3.24

Deux (2) à St-Nicolas le 6 septembre (J.-L. Desgranges) alors qu'il y en a encore une aux Bergeronnes le 21 septembre (A. Bouchard).

FAUVETTE FLAMBOYANTE - Setophaga ruticilla

N=33, M=2.1, A=0.15, C=7.1

Les dernières mentions datant du 21 septembre: deux (2) à Ste-Foy (P. Delacretaz) et une à Bergeronnes (A. Bouchard).

MOINEAU DOMESTIQUE - Passer domesticus

N=61, M=12, A=13, C=1.6

GOGLU - Dolichonyx orizyrorus

N=21, M=70, A=3.2, C=4.5

M. Gosselin et al en dénombrent soixante (60) le 22 août à l'Ile-aux-Grues et cinq cent (500) le 23 au Cap Tourmente. P. Delacretaz et A. Desrochers en notent encore vingt-cinq (25) (les derniers) le 5 septembre à ce dernier endroit.

STURNELLE DES PRES - Sturnella magna

N=10, M=2.1, A=0.04, C=2.2

Dernière mention: un au Cap Tourmente le 11 octobre (B. Cormier et al).

CAROUGE A EPAULETTES - Agelaius phoeniceus

Août	55	62	17	27
Septembre	23	105	23	22
Octobre	8	129	12	9
Novembre	1	10	0.15	1.5
Total	87	79	15	19

Signalons la présence de mille (1,000) oiseaux le 28 août à Maizerets (J. Hardy, Y. Aubry).

ORIOLE ORANGE - Icterus galbula

N=9

Voir résumé provincial.

MAINATE ROUILLEUX - Euphagus carolinus

N=22, M=14, A=0.65, C=4.8

Les quinze (15) derniers individus de l'automne sont signalés au Cap Tourmente le 26 octobre (L. Messely, J.-P. et R. Barry).

MAINATE BRONZE - Quiscalus quiscula

	N	M	A	C
Août	33	15	2.4	16
Septembre	14	28	3.8	14
Octobre	11	25	3.1	12
Novembre	4	3.2	0.20	6
Total	62	19	2.5	13

VACHER A TETE BRUNE - Molothrus ater

N=20, M=25, A=1.1, C=4.3

TANGARA ECARLATE - Piranga olivacea

N=6

Retenons les deux (2) dernières mentions: un à Ste-Foy le 15 septembre (P. Delacretaz) et un autre le 20 septembre à LaPocatière (C. Auchu).

CARDINAL ROUGE - Cardinalis cardinalis

N=8

En plus de ceux mentionnés par Michel Gosselin et Normand David dans le résumé provincial, nous parvient (en dernière heure!), la mention d'un mâle présent à Portneuf-Station à partir du 26 octobre (C. Marcotte).

GROS-BEC A POITRINE ROSE - Pheucticus ludovicianus

N=33, M=4.6, A=0.33, C=7.1

L'espèce est notée près de Québec jusqu'au 7 septembre, un individu à Maizerets (C. Simard, G. Falardeau) alors qu'aux Bergeronnes, A. Bouchard en repère un le 21 septembre.

BRUANT INDIGO - Passerina cyanea

N=3

Une mention sans précédent, constituant une date record pour la province, nous est fournie par A. Bouchard, d'un Bruant indigo femelle présent à sa mangeoire du 15 au 18 octobre où il se nourrit de graines de tournesol.

DICKCISSEL - Spiza americana

G. Seutin et M. Gosselin donnent la description suivante de l'oiseau du Cap Tourmente le 12 octobre: "L'oiseau fut observé environ une demi-heure près de la "grande ferme"... Il s'agissait d'un mâle à son premier automne... L'oiseau n'a pas été revu".

Voir aussi résumé provincial.

GROS-BEC ERRANT - Hesperiphona vespertina

	N	M	A	C
Août	35	24	4.2	17
Septembre	18	9.1	1.6	17
Octobre	22	8.5	2.1	25
Novembre	16	13	3.1	24
Total	91	15	3.0	20

ROSELIN POURPRE - Carpodacus purpureus

N=42, M=7.8, A=0.71, C=9.1

Aucune mention de l'espèce pour le mois de novembre, les dernières étant: trois (3) au Cap Tourmente le 14 octobre (COQ, P. Lane) et un à l'Ile-des-Soeurs le 24 octobre.

ROSELIN FAMILIER - Carpodacus mexicanus

"Un premier individu est observé à proximité de ma demeure. Il s'agit d'une femelle. Elle se nourrit des fruits d'un sorbier en compagnie de plusieurs autres oiseaux, tel que des Merles d'Amérique, des Gros-becs à poitrine rose et des Roselins pourprés. Le spécimen a attiré mon attention au début parce qu'il était beaucoup moins farouche. C'était une femelle très caractéristique: le bec est plus petit que celui des femelles de Roselins pourprés, aucune marque spéciale sur la tête et les joues. Les femelles de Roselins pourprés ont une moustache très distincte et de grosses taches dans le cou. Puis un mâle est observé: le bec plus petit lui aussi, le rouge de la tête plus intense et moins étendu, les marques sur les côtés sont très visibles".

C'est là la description que donne D. Roy du couple présent à St-David-de-Lévis le 12 septembre. Cette mention est la première de l'espèce pour la région de Québec.

GROS-BEC DES PINS - Pinicola enucleator

N=36, M=4.6, A=7.8, C=0.37

L'espèce est d'abord signalée au Cap Tourmente, quatre (4) individus le 11 octobre (A. Desrosiers et al), puis à Laval, sept (7) le 3 novembre (B. Crevier).

SIZERIN A TETE ROUGE - Carduelis flammea

N=34, M=26, A=1.9, C=7.4

D'abord deux (2) près de St-Urbain le 6 septembre (H. Mead) puis cinquante (50) au Cap Tourmente le 14 octobre (COQ, P. Lane) et enfin cinq (5) à Montréal le 31 octobre (B. Crevier).

CHARDONNERET DES PINS - Carduelis pinus

N=25, M=14, A=0.76, C=5.4

CHARDONNERET JAUNE - Carduelis tristis

N=84, M=7.3, A=1.3, C=18

A. Desrochers et P. Delacretaz nous signalent un nid avec des jeunes le 19 août à Havre St-Pierre. Cette mention provient de l'extrême nord de son aire de nidification.

BEC-CROISE ROUGE - Loxia curvirostra

Voir "Iles-de-la-Madeleine".

BEC-CROISE A AILES BLANCHES - Loxia leucoptera

N=18, M=7.3, A=0.28, C=3.9

Six (6) à St-Nicolas le 20 août (J.-L. Desgranges) puis cinquante-cinq (55) à St-Lazare le 1er novembre (P. Bannon).

PINSON DES PRES - Passerculus sandwichensis

	N	M	A	C
Août	61	31	9.2	30
Septembre	37	23	8.3	36
Octobre	12	2.5	0.34	13
Novembre	4	2.0	0.12	6
Total	114	24	6.0	25

M. Darveau et D. White en mentionnent cent cent (500) à Cap-aux-Meules le 29 août.

PINSON A QUEUE AIGUE - Amnospiza caudacuta

N=3

Les deux (2) dernières mentions datant du 8 août, deux (2) à l'Ile-du-Moine (R. Yank, M. McIntosh) et du 20 septembre, un à La Pocatière (C. Auchu). Voir "Iles-de-la-Madeleine".

PINSON VESPERAL - Pooecetes gramineus

Nous n'avons reçu qu'une seule mention de cette espèce qui nous délaisse tôt: deux (2) individus à l'Ile-Verte le 8 août (G. Pauzé, M. Lebel, A. Leclerc).

JUNCO ARDOISE - Junco hyemalis

N=58, M=26, A=3.3, C=13

PINSON HUDSONIEN - Spizella arborea

N=31, M=31, A=2.1, C=6.7

Dix (10) individus sont déjà présents à Maizerets le 19 septembre (Y. Aubry) alors qu'on en compte trois cent (300) le 28 octobre au Cap Tourmente (M. Moreau, M. Darveau).

PINSON FAMILIER - Spizella passerina

N=19, M=3.2, A=0.13, C=4.1

L'espèce est présente aux Bergeronnes jusqu'au 18 septembre (12 par A. Bouchard), près de Québec, au Lac Beauport jusqu'au 19 septembre (un par P. Hainault) et à Montréal jusqu'au 31 octobre (5 par B. Crevier).

PINSON DES CHAMPS - Spizella pusilla

La famille découverte le 26 juillet à Ste-Thérèse-de-Lisieux y est encore le 1er août alors que P. Perreault observe deux (2) adultes avec quatre (4) jeunes.

N.D.L.R. Mentionnons que les lignes à haute tension, site de nidification de cette famille, semblerait constituer un couloir par lequel des espèces tels les coulicous, le Bruant indigo et le Tangara écarlate effectuent des extensions d'aire de nidification.

PINSON A COURONNE BLANCHE - Zonotrichia leucophrys

N=34, M=17, A=1.3, C=7.4

L'espèce est d'abord signalée le 13 septembre à Bergeronnes, deux (2) individus (A. Bouchard). Le 18 septembre, G. Massicotte en note un à Portneuf-Station et le 24 septembre, G. Lafrance et al en observent un à Varennes. La dernière mention provient du Cap Tourmente, trente-sept (37) le 26 octobre (R. Barry et al).

PINSON A GORGE BLANCHE - Zonotrichia albicollis

	N	M	A	C
Août	45	6.0	1.3	22
Septembre	32	11	3.3	31
Octobre	28	6.2	2.0	31
Novembre	3	1.0	0.05	4.6
Total	108	7.3	1.7	23

PINSON FAUVE - Passerella iliaca

N=13, M=4.2, A=0.11, C=2.8

L'individu observé au Cap Tourmente le 26 octobre par J.-P. Barry et al constitue la dernière mention pour cet automne dans la région de Québec.

PINSON DE LINCOLN - Melospiza lincolnii

N=25, M=1.8, A=0.10, C=5.4

L. Messely , J.-P. et R. Barry notent les trois (3) derniers individus de l'espèce pour cet automne à la même date et au même endroit que pour une foule d'autres espèces, soit le 26 octobre au Cap Tourmente.

PINSON DES MARAIS - Melospiza georgiana

N=15, M=3.9, A=0.12, C=3.2

Quinze (15) le 3 octobre à Maizerets (COQ, R. Simard) et cinq (5) le 14 octobre au Cap Tourmente (COQ, P. Lane) pour la dernière mention de l'automne.

PINSON CHANTEUR - Melospiza melodia

N=103, M=3.7, A=0.84, C=22

Retenons une mention: cinquante (50) à l'Etang-du-Nord (Iles-de-la-Madeleine) le 30 août (M. Darveau, D. White).

BRUANT LAPON - Calcarius lapponicus

N=5

On mentionne jusqu'à vingt (20) individus (D. Jauvin) à Maizerets entre le 30 septembre et le 10 octobre. Une seule mention ailleurs: un individu le 19 octobre à Kamouraska (P. Brousseau).

BRUANT DES NEIGES - Plectrophenax nivalis

N=28, M=130, A=7.6, C=6.1

Trente-cinq (35) oiseaux à Cap-aux-Meules (M. Darveau, D. White) le 29 août constituent à notre connaissance une mention hâtive sans précédent pour cette espèce à pareille latitude. Par comparaison, un premier individu à Maizerets le 11 octobre se présente à une date presque hâtive pour Québec.

* * * * * * * * * * * * *

LISTE DES OBSERVATEURS

ANDERSON, F.-V.
ANGERS, R.
AUBRY, Y.
AUCHU, C.
BANNON, P.
BARRY, J.-P.
BARRY, R.
BINVEL, A.
BISSON, R.
BLANCHETTE, J.
BLOUIN, D.
BOUCHARD, A.
BOUCHARD, R.
BOURGET, C.
BRIERE, C.
BROUSSEAU, P.
CHAGNON, P.
CLOUTIER, J.
LA POCATIERE, C.O.
COMEAU, M.
COQ
CORMIER, B.
CORRIVEAU, A.
COTE, A.
CREVIER, B.
DARVEAU, M.
DARVEAU, O.
DAVID, N.
DELACRETAZ, P.
DESGRANGES, J.-L.
DESROCHERS, A.
DESROSIERS, A.
DUMAIS, Y.
DUPAL, P.-F.
DUPUIS, G.
DUQUETTE, G.
FALARDEAU, G.
FRECHETTE, G.
GAGNON, J.
GARIEPY, L.
GAULIN, J.-L.
GENDRON, G.
GINGRAS, D.
GIROUX, M.
GOSSELIN, M.
GOUGE, A.
GRENON, F.
GUILLEMETTE, L.
HAINAULT, P.
HAMEL, Y.
HAMON, J.
HARDY, J.
HOUDE, B.
JAUVIN, D.
JEAN, B.
LAFRANCE, G.
LANE, P.
LAPORTE, M.
LEBRUN, R.
LECLERC, A.
LEGAULT, D.
LEGER, M.
LEGROS, J.-Y.
LEMIEUX, M.
LEPAGE, G.
LETOURNEAU, V.
LEVESQUE, G.
MAHEU, C.
MAHEU, L.
MEHEU, Y.
MAILLE, S.
MARCHAND, S.
MARCOTTE, C.
MARSHALL, P.
MASSICOTTE, S.
MCINTOSH, M.
MEAD, H.
MESSELY, L.
MICHAUD, G.
MIGNAULT, J.
MOREAU, M.
MORIN, J.
MORIN, M.
MORISSETTE, G.
OUELLET, C.
PARENT, G.
PARENT, L.
PAUZE, G.
PELLETIER, A.
PELLETIER, R.
PERREAULT, D.
PERREAULT, P.
PINKOS, J.
POIRIER, J.
POIRIER, M.-F.
POULIN, M.
P.Q.S.P.B.
ROCHEFORT, L.
RONDEAU, G.
ROSS, G.
SAINTONGE, L.
SEUTIN, G.
SHAFFER, F.
SIMARD, G.
SIMARD, R.
SMITH, P.
STE-MARIE, L.
ST-HILAIRE, D.
TALBOT, P.
THIBAULT, P.
TOUSSAINT, D.
TREMBLAY, S.
VACHON, A.
VACHON, C.
VEILLEUX, G.
VIAU, L.
WHITE, D.
WRIGHT, J.
YANK, R.

ADDITION AU BULLETIN MARS, AVRIL, MAI 1980

Voici un compte rendu de l'observation que nous avons fait d'une Pie bavarde le 25 mai 1980 au Cap Tourmente.

Voici les faits: Nous étions à mi-chemin entre la falaise et la cime lorsque nous vîmes une espèce d'oiseau qui nous paraissait très inusité. L'apercevant à la cime d'un arbre, nous avons immédiatement remarqué qu'il avait le plastron noir et la poitrine blanche.

Voici les observations effectuées à l'aide d'un télescope (20-60 Bushnell) et d'un appareil photographique équipé d'un 200mm plus doubleur.

1- Bec noir semblable à celui de la corneille d'Amérique mais moins gros.

2- Longue queue de couleur noire.

3- Dessous des rémiges primaires blanc.

4- Comportement de geai au vol et à la façon de se percher.

5- Taille approximative d'un grand pic.

6- A noter qu'aucune observation n'a été faite sur le dessus de l'oiseau.

Autres informations:

- temps d'observation - 30 à 45 secondes
- ciel dégagé, ensoleillé
- température - environ 18 à 20 degrés celcius

Ne pouvant l'identifier immédiatement, nous avons vérifié dans le Guide des oiseaux d'Amérique du Nord de Robbins, Bruun, Zim, Singer et nous n'avons pu faire le rapport entre l'image représentée et l'oiseau observé. Nous avons regardé dans le livre des Oiseaux du Canada de W. Earl Godfrey et là non plus nous n'avons pas fait le rapport.

Ce n'est que récemment (ceci nous préoccupant depuis lors) que nous avons pu enfin l'identifier dans le volume Birds de The Audubon Society, Encyclopédia of North America de John K. Terres. Les photos représentées correspondaient à l'oiseau observé. Du même coup, le rapprochement se fît avec les deux (2) autres volumes cités plus haut, admettant alors la possibilité que l'oiseau était une espèce non commune à la région.

Jacques Turcotte

Jocelyn Tremblay

Compilation des observations ornithologiques des Iles-de-la-Madeleine - été 1981

Yves Aubry

Accéder aux Iles-de-la-Madeleine par le traversier reliant Souris (Ile-du-Prince-Edouard) et Cap-aux-Meules demeure souvent un premier contact enrichissant pour tout ornithologue. Les 28 août et 4 septembre M. Darveau et D. White ont observé respectivement six (6) et quatre (4) Grand Puffin à moins de quarante (40km) de l'archipel. J'ai également identifié un spéciment de cette espèce qu'un pêcheur de Grande-Entrée a capturé le 4 août au large de cet endroit sur le "Fond cassé" (Broken Reef) plusieurs kilomètres à l'est. A nouveau depuis le traversier, à moins de cinquante (50km), le 8 août douze (12) Pétrel sp. ont été observés desquels on a identifié positivement cinq (5) Pétrel cul-blanc (Y.A., G. Duquette, N. Lépine).

Le 1er août, au cours d'une excursion en bateau autour de l'Ile Brion mille cinq cent (1,500) Grand Cormoran ont été dénombrés (Y.A., G.D., N.L.). Par les années passées (plus de 15 ans) cette espèce ne s'y rencontrait que par petits groupes.

La mention la plus singulière de l'été a été celle d'un flamant. Le 9 août C. Simard et A. Dupéré ont observé un Flamant sp. dans la lagune de la Grande-Entrée entre Pointe-aux-Loups et Grosse-Ile. Les photographies ainsi que la description qu'ils en ont fait a permis de l'identifier comme étant un Flamant du Chili (Phoenicopterus chilensis) probablement échappé de captivité, d'on ne sait où.

Un rassemblement migratoire de mille (1,000) Sarcelle à ailes bleues a été noté le 29 août dans le Havre-aux-Basques (M.D., D.W.). La présence dans la partie nord-est du Havre-aux-Basques d'un groupe familial de Canard siffleur d'Amérique établit une deuxième mention de nidification pour les îles. Le 30 juillet, une femelle accompagnée de onze (11) canetons âgés d'environ une semaine se nourrissaient en bordure de la végétation haute (Y.A., G.D.).

Une première mention de nidification intéressante est celle du Foulque d'Amérique. Le 16 août, à l'étang du Cap Vert V. Létourneau et F. Shaffer notent: "Quatre (4) jeunes ont été observés en compagnie d'un adulte qui en nourrit un sous nos yeux. Ils étaient tous en duvet noir très profond, certains individus laissant remarquer un peu de rouge sur le bec et les plumes de la face; atteignent les deux tiers (2/3) de la taille de l'adulte".

Plusieurs observations de Pluvier siffleur m'ont été communiquées: Bassin aux Huitres (Grande-Entrée) un nid a été localisé en juin et le 31 juillet suivant le couple y était accompagné de trois (3) jeunes capables de voler (Y.A.); sur la Dune du Sud le 2 août un adulte accompagné d'un jeune en premier duvet ("natal down") (G.D., N.L.), en raison de la date tardive, il doit être issu d'une seconde ponte. Des adultes solitaires ont également été observés: un adulte le 25 juillet à la plage de la Martinique (R. Pelletier), un le 28 juillet à la Pointe de l'Est (Y.A.) et un le 9 août à la Pointe-aux-Loups (C.S., A.D.). Par contre aucun n'a été noté sur le Sandy Hook le 28 juillet (G.D., N.L.).

Deux (2) observations de Chevalier semi-palmé ont été faites à Grosse-Ile: le 27 juillet (G.D.) et le 5 août (Y.A.) probablement le même individu. Deux (2) Chevalier combattant ont séjourné aux îles. Un premier mâle adulte en plumage d'hiver a été localisé le 30 juillet dans le Havre-aux-Basques (Y.A., G.D.), puis le 3 août à l'Etang du Cap Vert (Fatima) (Y.A.) et enfin le 7 août dans la Baie de Grosse-Ile (G.D.); il est intéressant de noter ce déplacement d'un même oiseau sur l'archipel. Un second mâle, celui-ci en plumage nuptial a été observé les 2 et 3 août dans un étang temporaire sur la Dune de la Grande-Echouerie près de Old Harry (Y.A.).

Un Labbe pomarin adulte, en phase pâle, a été capturé le 28 juillet sur le "Fond cassé" par un pêcheur de Grande-Entrée.

De nouveau cette année la Mouette rieuse d'Europe est observée à plusieurs reprises aux îles: à Gros-Cap, trois (3) adultes le 3 août (Y.A.), un adulte les 4 et 5 août (Y.A., G.D.), dans le Havre-aux-Basques: dix (10) le 5 août, à l'extrémité sud-ouest près de l'Etang des Caps (G.D., N.L.), une le 29 août au même endroit (M.D., D.W.) et finalement

un adulte sur la plage de la Martinique le 2 septembre (M.D., D.W.). Cette mouette a été trouvée nicheuse ces dernières années à Terre-Neuve; des investigations plus poussées en juillet pourrait bien nous réserver des surprises pour les îles également... M. Darveau a observé une Mouette pygmée le 31 août sur la Dune du Nord.

Le 1er août parmi les colonies de sternes près de la Pointe-aux-Loups, deux (2) Sterne rosée adultes ont été minutieusement observées au repos puis en vol, leur cri caractéristique a également été entendu à plusieurs reprises (Y.A., G.D., N.L.). La Sterne caspienne est un migrateur qui semble régulier aux îles après la saison de nidification mais observée d'habitude individuellement et rarement en petit groupe. R. Pelletier en a observé une le 28 juillet à Gros-Cap. Par contre M. Darveau note treize (13) adultes accompagnés de trois (3) juvéniles le 29 août dans le Havre-aux-Basques (près de l'Etang des Caps), puis quatorze (14) le 3 septembre dans le port de Havre-aux-Maisons. Il serait intéressant de pouvoir déterminer s'il s'agissait d'un déplacement post-reproduction d'oiseaux venant du sud ou encore plus d'un indice du redressement ou rétablissement des colonies de la Côte-Nord du Québec (?), jadis décimées par des braconniers et malfaiteurs. Pour la seconde occasion sur l'archipel une Sterne noire adulte est rapportée dans le Havre-aux-Basques les 29 juillet (Y.A.) et 5 août (G.D., N.L.).

Un rassemblement de quatre-vingt (80) Gode le 1er septembre à Old Harry (M.D.) est intéressant compte tenu du nombre et qu'ils se trouvaient à proximité de la côte.

Durant son séjour à l'Ile Brion, du 29 juillet au 1er août, E. Leblanc, de l'Etang du Nord, a observé deux (2) Harfang des neiges. L'estivage de cet oiseau dans l'archipel a été rapporté à plusieurs reprises depuis la fin du siècle dernier selon une revue de littérature. Les ressources alimentaires abondantes en Alcidés, Laridés, Anatidés et autres pourraient être à l'origine de l'estivage de ces oiseaux probablement non-reproducteurs. M. Darveau nous communique les notes suivantes concernant l'observation de Nyctale boréale le 1er septembre: "trois (3) Nyctale boréale sont entendues à Gros-Cap aux alentours du camping gouvernemental. Deux (2) d'entre elles furent aperçues à la fin du crépuscule et ce suffisamment bien pour dire qu'il s'agit de Nyctale sp. Le chant caractéristique était celui de la Nyctale boréale".

Pour une description un peu plus détaillée du chant, le lecteur pourra consulter le Bulletin ornithologique, volume 26 (1): 12, ou faire l'audition du Guide sonore de R.T. Peterson région de l'ouest.

Le 20 août, près de l'extrémité sud-est de la réserve nationale de faune de la Pointe-de-l'Est, F. Shaffer a observé un Solitaire de Townsend, voici des extraits de son texte qu'il nous a fait parvenir:

> *"... oiseau plus petit qu'un merle, gris uniforme, queue assez longue proportionnellement au reste du corps, le bec foncé est mince, droit et court, cercle blanc autour de l'oeil, patron dans les ailes lorsqu'au vol pas très éclatant ni très étendu... Il était perché tout près du sommet d'une épinette..."*

Il mentionne aussi avoir entendu un chant:

> *"... quelques notes fortes et gazouillées. L'allure générale du chant pouvait ressembler à celui du Viréo mélodieux..."*

Ce rapport représente la première mention de présence de cette espèce pour les Iles-de-la-Madeleine.

Sur les terrains de la réserve de la Pointe-de-l'Est, un groupe de trente-cinq (35) Bec-croisé rouge a été observé et entendu le 5 août. "La taille, l'absence de bandes allaires ainsi que les cris ont été notés". (Y.A.).

Dans les prés salés de l'Etang du Cap Vert (Fatima) deux (2) mâles chanteurs de Pinson à queue aiguë ont été localisés le 29 juillet au début du crépuscule aux environs de 18:00 heures (Y.A.).

Je voudrais remercier tous les observateurs qui ont bien accepté que leurs notes ornithologiques des Iles-de-la-Madeleine soient publiées sous une même rubrique.

* * * * * * * * * * * * *

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES QUEBECOISES

AUTOMNE 1981

Les mentions les plus notables chez les Procellariidés furent un Fulmar boréal à St-Roch-des-Aulnaies le 17 octobre (P. Dupuis), un Puffin des Anglais au large de Kégashka le 13 août et un Grand Puffin au large de Trois-Pistoles le 24 août (A. Bouchard). Mais encore plus étonnante fut l'observation d'un Puffin cendré au large de Kégashka le 13 août (A. Bouchard); l'ayant vu avec des Grands Puffins l'observateur a pu noter le bec jaune, la calotte indistincte et les dessus uniformes.

L'apparition automnale de quelques pétrels à Québec est un phénomène annuel. Cette fois-ci, on peut cependant parler d'une mini-invasion dans l'ouest de la province: deux (2) Pétrels cul-blanc au large de Trois-Pistoles le 17 août (P. Delacretaz) et un le 27 septembre (P. Chagnon), un au large de Tadoussac le 19 septembre (J.-L. Desgranges), un à Québec les 24 et 25 septembre, jusqu'à quatre (4) à Québec et Lauzon les 9-10 octobre (F. Grenon), six (6) au large des Escoumins (A. Bouchard) et un à Laprairie le 11 octobre (B. Barnhurst), de même qu'un très tardif à Pointe-au-Père le 22 novembre (G. Gendron). Un Pétrel océanite était aussi signalé à Québec les 23-24 septembre (J. Hardy, F. Grenon), un au large de Trois-Pistoles le 27 septembre (Y. Aubry, A. Desrochers), jusqu'à cinq(5) à Québec et Lauzon les 9-10 et 11 octobre (F. Grenon, G. Duquette et al) et deux (2) à Laprairie les 10 et 11 octobre (F. Hilton, P. Bannon et al).

Phénomène rare depuis une vingtaine (20) d'années (mais plus régulier au cours des années trente (30) et quarante (40) , un jeune Fou de Bassan fut observé à Québec les 18 et 19 novembre (J. Hardy) et un autre plongeait dans les eaux du Lac St-Louis en face de Beauharnois le 22 (C. Hanrahan et al). La présence d'un Grand Cormoran à Lasalle le 5 septembre était aussi inattendue que celle d'un Cormoran à aigrettes à Murdochville le 15 (M. Lemieux). Le seul Héron garde-boeufs de l'année était à l'Ile-aux-Fermiers du 19 au 23 août (N. David et al) et une Aigrette neigeuse séjourna à Hudson du 13 août au 6 septembre (R. et L. McGovern et al). Les trois (3) Grandes Aigrettes aperçues à l'Ile du Moine le 29 août (M. McIntosh) appartenaient sans doute au groupe de quatre (4), notés aur l'Ile de la Commune de Berthierville les 1er et 6 septembre (D. Perreault, G. Pauzé). L'observation d'un Bihoreau à couronne noire à l'Ile Ste-Hélène le 28 novembre (P. Bannon) établit la mention la plus tardive de l'espèce.

Si la présence d'un flamant passe difficilement inaperçue, la confirmation de son identité et de son origine ne sont pas toujours facilement acquises. Autant la présence ici du Flamant rose nicheur aux Caraïbes est tout à fait concevable, autant un oiseau échappé de captivité n'appartient pas nécessairement à cette espèce. Ce fut le cas cette année alors que le Flamant du Chili (Phoenicopterus chilensis) fut rencontré à Granby les 20-22 juin (Y. Morin), à Grosse-Ile, Iles-de-la-Madeleine le 9 août (C. Simard) et à l'Isle-Verte le 26 septembre (R. Fortin); selon toute apprence l'oiseau observé à Baie Ste-Catherine le 11 août (J. Rosa, fide Y. Aubry) appartenait à la même espèce.

Une Oie à front blanc immature fut observée à New-Richmond le 25 octobre (H. Bourque et al) et la découverte de deux (2) Oies de Ross à Cap Tourmente le 3 octobre (M. Gosselin) confirme une fois de plus la régularité de l'association de cette espèce avec les troupeaux d'oies qui séjournent dans la région de Québec. Les deux (2) seuls Canards siffleurs d'Europe de la saison étaient en plumage femelle: un à Georgeville du 12 au 21 octobre (P. Landry et al) et un à Cacouna le 9 octobre (G. Gendron). Aylmer fut le théâtre du rassemblement sans précédent de huit cent (800) Morillons à collier le 18 octobre (B. Dilabio). Deux (2) Morillons à dos blanc le 13 novembre à Cacouna (L. Hallé) et un Canard roux au même endroit le 12 septembre (A. Desrochers) constituent des mentions plutôt inusitées dans le Bas St-Laurent. Un Vautour à tête rouge à Baie St-Paul le 13 octobre (J. Fair) ne suscite plus l'étonnement. Un passage sans précédent de plus de huit mille (8,000) Petites Buses cet automne au-dessus de la partie ouest de l'Ile de Montréal incluait mille neuf cent quatre-vingt-huit (1,988) oiseaux le 11 septembre, deux mille deux cent soixante-huit (2,268) le 12 et mille deux cent quatre-vingt-huit (1,288) le 15 (B. Barnhurst, M. McIntosh).

La nidification de la Foulque d'Amérique fut confirmée aux Iles de-la-Madeleine par l'observation d'un adulte et de quatre (4) jeunes à Fatima le 16 août (V. Létourneau, F. Shaffer). Une étonnante concentration de six cent trente (630) Pluviers dorés fut notée au Lac Taureau le 31 août (F. Hilton) et un maximum de quatre cent cinquante (450) oiseaux sur les gazonnières de la région de la Station-du-Coteau le 6 septembre (R. Yank, P. Smith); en Estrie P. Boily rapporta cinquante (50) oiseaux à Ayer's Cliff le 28 septembre et vingt (20) à Hillhurst le 8 octobre. Les mentions inhabituelles de Courlis corlieu incluaient cent dix (110) oiseaux au Lac Taureau le 2 septembre (F. Hilton) et deux (2) à Aylmer le même jour (B. Dilabio). La mention la plus tardive connue d'un Petit Chevalier à pattes jaunes fut rapportée à Pointe-au-Père le 28 novembre (P. Brousseau, Y. Gauthier).

Le Bécasseau du Nord-Ouest n'a pas passé inaperçu cet automne: un fut découvert à l'Ile-aux-Grues le 22 août (J. Hardy et al) et à Pointe-au-Père le 3 septembre (G. Gendron et al) et deux (2) ont pu être photographiés de très près au parc Côte Ste-Catherine du 5 au 13 septembre (P. Bannon et al). Un Bécasseau à long bec séjourna à l'Ile du Moine du 29 août au 13 septembre (R. Yank, M. Gosselin). Les mentions de Bécasseau roussâtre à St-Fulgence les 26-28 août (N. Breton et al), Chandler le 29 (R. Bisson, P. Poulin) et Pointe-au-Père le 3 octobre (P. Brousseau) indiquent l'amplitude de la distribution de ce migrateur régulier à l'automne. La même chose peut être dite de la Barge marbrée avec des observations à la Petite Ile au Marteau en Minganie le 12 août (A. Bouchard) et au Bic du 12 au 15 septembre (Y. Turcotte et al). Deux (2) Chevaliers combattant différents étaient présents aux Iles-de-la-Madeleine: l'un à Old Harry les 2 et 3 août (Y. Aubry), l'autre au Havre-aux-Basques le 30 juillet, à Fatima le 3 août et Grosse-Ile le 7 août (Y. Aubry, G. Duquette); un autre fut aperçu brièvement à l'Ile du Moine le 29 août (R. Yank). Le Phalarope roux fut signalé à St-Fulgence le 28 août (N. Breton, Y. Blackburn) et à Québec le 30 septembre (A. Desrochers, P. Delacretaz).

Deux (2) Labbes parasites adultes furent aperçus à Hull le 2 septembre (B. Dilabio) et cinq (5) à Cacouna le 15 (R. Simard), tandis qu'un retardataire à Pointe-au-Père le 22 novembre (G. Gendron) marque l'observation la plus tardive connue. Comme l'an dernier, un Labbe à longue queue fut signalé au large de Tadoussac le 20 septembre (A. Reed). Les Goélands à manteau noir se montèrent particulièrement nombreux dans l'Outaouais et au Lac St-Jean à la fin de l'automne (m. Gosselin, Y. Blackburn); l'augmentation des migrateurs dans ces régions est peut-être liée à l'expansion récente de cette espèce dans le Nord. Beauharnois fut visité par un Goéland brun en plumage deuxième-hiver du 29 octobre au 8 novembre (B. Barnhurst). Un déversement d'huile dans le port de Québec en septembre a souillé des centaines de Goélands à bec cerclé, les entraînant ainsi vers une mort certaine. Deux (2) adultes Goélands cendrés ont été découverts, l'un à La Malbaie les 7 et 8 novembre (Y. Aubry et al), l'autre à Beauharnois les 8 et 9 novembre (P. Bannon, B. Barnhurst).

Un maximum de dix (10) Mouettes rieuses d'Europe fréquentaient l'Etang des Caps, Iles-de-la-Madeleine le 6 août (G. Duquette). Une Mouette rieuse d'Amérique est apparue à St-Joseph-de-Beauce le 22 août (C. et Y. Maheu) et une autre à Bonaventure le 29 août (R. Bisson). Des Mouettes de Franklin furent notées le 2 juillet à Port-au-Saumon (L. Messely) le 18 août à La Malbaie (J. Hardy), le 18 septembre au large de Trois-Pistoles (B. Gauthier, P. Poulin), le 20 octobre au Lac Magog (P. Boily) et le 4 novembre à Québec où un spécimen mort récemment fut trouvé (spec. au MNSN, J. Falardeau). Des Mouettes de Sabine immatures ont été rencontrées dans la région du Lac St-Louis du 13 au 25 septembre (B. Banhurst et al), au large de Tadoussac le 19 septembre (3, J.-L. Desgranges) et de Trois-Pistoles le 26 septembre (G. Gendron). Parmi les oiseaux marins que les forts vents d'est de l'automne ont poussé vers l'intérieur des terres, on retrouve cent cinquante (150) Mouettes tridactyles à Québec le 24 septembre (F. Grenon) de même que des oiseaux près de Katevale et Beauharnois en octobre et novembre (P. Boily, B. Barnhurst).

Quatre-vingt (80) Sternes arctiques furent découvertes à Bonaventure le 29 août, en compagnie d'une centaine (100) d'autres qui étaient probablement de la même espèce (R. Bisson, P. Poulin); c'est donc dire que même dans la Baie des Chaleurs les sternes doivent être regardées de près. Une sterne arctique très tardive se trouvait encore au large de Tadoussac le 4 octobre (M. Gosselin et al). Seize (16) Sternes caspiennes furent comptées au Havre-aux-Basques, Iles-de-la-Madeleine le 29 août (M. Darveau); cette présence annuelle est sans doute le fait de migrateurs venus de la Côte-Nord ou de Terre-Neuve puisque la nidification de cette sterne ne pourrait passer inaperçue bien longtemps.

Comme il arrive occasionnellement, une Marmette de Brünnich fut localisée dans la colonie de l'Ile Bonaventure le 3 août (M. Pageot). Un maximum de quarante-sept (47) Marmettes de Brünnich et quatre-vingt-quinze (95) Mergules nains fut compté sur la traverse Matane - Godbout le 2 décembre (G. Duquette et al). Un mouvement d'environ cent vingt-cinq (125) mergules avaient été notés lors d'une tempête le 21 novembre à Pointe-au-Père (G. Gendron), phénomène qui n'avait pas été vu dans l'estuaire depuis longtemps. Un mergule fut également remarqué à Québec le 28 novembre (A. Desrochers), tandis qu'un déversement d'huile près de Grosse-Ile a anéanti mille deux cent (1,200) mergules vers la même époque.

Un Coulicou à bec jaune près de Percé du 5 au 8 octobre devint finalement la proie d'un chat (J. Wiseman). Quelques Chouettes épervières sont apparues dans le sud de la province en novembre: à l'Ile Bizard (N. Pole), St-Pierre-de-Wakefield (R. Dubois), Charlesbourg (M. Giroux), Ste-Marthe-de-Vaudreuil (R. McGovern) et Alma (fide Y. Blackburn). Un Moucherolle huppé trouvé mort au barrage L-G2 le 21 octobre (G. Chénard, fide Y. Aubry) était loin de son aire habituelle; le spécimen fut heureusement conservé pour le Musée national des sciences naturelles car les divers Myiarchus migrateurs se ressemblent étrangement pour la plupart. Un Moucherolle à côtés olive à St-Ferdinand le 28 octobre marque un départ tardif sans précédent (A. Côté). Nombre d'hirondelles très tardives se sont manifestées dans l'est à la mi-novembre: une Hirondelle bicolore le 7 novembre à Pointe-au-Père (J. Rocheleau), une Hirondelle des sables à Barachois le 8 novembre (R. Bisson), une Hirondelle des granges à La Malbaie le 7 novembre (F. Grenon), deux (2) à Cap-à-l'Orignal le 8 novembre (Y. Gauthier), trois (3) à Cap-d'Espoir entre le 9 et 11 novembre (D. Smith), Cap-des-Rosiers le 14 novembre (M. St-Amour) et La Pocatière le 15 novembre (A. Côté) et enfin une Hirondelle à front blanc à Cap-d'Espoir le 9 novembre (D. Bérubé).

Un bon nombre de Traquets motteux fut noté durant la migration: un pénétra dans une aréna de la Baie le 10 août (G. Savard), un autre fut trouvé à l'Ile du Moine les 8 et 9 septembre (M. McIntosh, R. Yank), un fut observé sur un bord de route à Ste-Luce le 30 septembre (P. H. Ouellet), un immature fut attaqué par un chat à Sherbrooke le 10 octobre (R. Lebrun) et un mâle adulte fut observé à Hatley le 21 octobre (P. Boily). L'observation d'un Solitaire de Townsend près de Old Harry, Iles-de-la-Madeleine le 20 août (F. Shaffer) est des plus hâtive pour ce rare visiteur de l'ouest. Un Gobe-moucheron gris-bleu était présent à Forillon le 29 août (B. Houde). La Mésange à tête brune a littéralement envahi le sud de la province en octobre. A Lennoxville, une Mésange huppée d'Amérique visita un poste d'alimantation à partir du 5 novembre (E. Turner).

Comme à tous les automnes, une brochette de passereaux ont été signalés à des dates record: des Viréos à gorge jaune à Laval le 6 octobre (B. Crevier) et Hudson le 10 octobre (R. McGovern), un Viréo de Philadelphie à Montréal le 15 novembre (G. Gendron, M. Gosselin) et une Fauvette à calotte noire à Cap-à-l'Aigle le 29 octobre (P. Blain). Le Moineau domestique s'est implanté à Blanc-Sablon comme en témoigne une observation du 25 juillet (P. Lane). Un groupe de vingt-cinq (25) Sturnelles des prés se trouvait à Murdochville, au coeur du massif gaspésien en août (M. Lemieux). Plusieurs Orioles orangés tardifs furent notés cette saison: le 2 octobre à l'ile Bonaventure (P. Poulin), le 25 octobre à Forillon (B. Cormier), le 10 novembre à Rimouski (G. Gendron), à compter du 25 novembre à Beebe (A. Elliot) et également à la fin novembre à Longueuil (G. Pelletier).

Trois (3) Cardinals rouges sont apparus en novembre à Ste-Foy (R. Barry, L. St-Onge, Y. Aubry) ainsi qu'un à St-Raymond (G. Lepage), St-Romuald (L. Fortin) et La Pocatière (G. Simard). Le Dickcissel s'est manifesté aux quatre (4) coins de la province: à St-Félix-de-Valois le 15 août (F. Anderson), à Sault-au-Mouton le 3 octobre (M. Gawn, I. Jones),

jusqu'à deux (2) à Cap-d'Espoir entre le 5 et le 12 octobre (P. Poulin et al) et un à Cap-Tourmente le 12 octobre (M. Gosselin et al). Un nid de Chardonneret jaune fut découvert à Havre-St-Pierre le 19 août (A. Desrochers). Plusieurs Pinsons nordiques sont arrivés en grand nombre cet automne, notamment les Sizerins à tête rouge, les Becs-croisés à ailes blanches et les Gros-becs des pins. Un Roselin familier a été signalé à Philipsburg du 5 au 9 novembre (C. Chalk).

Normand David
Michel Gosselin

UNE MENTION DE NIDIFICATION DU CANARD ROUX (Oxyura jamaïcensis) AU QUEBEC

Le Canard roux est un migrateur observé régulièrement en petit nombre, dans le sud du Québec (Godfrey, 1967, Ouellet, 1974 et David, 1980).

A notre connaissance, une seule mention de nidification est connue pour le Québec, soit un juvénal capturé au Lac St-Pierre (Godfrey, 1967).

Le 2 juillet 1981, une femelle et six (6) canetons étaient observés près de Baieville (46° 08, 72° 43). Les canetons étaient âgés d'environ huit (8) jours selon l'indice de Gollop et Marshall (1954). De plus, le mâle en plumage nuptial nageait à proximité de la couvée, ce qui est caractéristique chez cette espèce d'anatidae (Harrison, 1978).

Ces oiseaux furent observés dans un étang de traitement des eaux usées, d'une superficie d'environ un hectare. Une ceinture de végétation émergente, composée principalement de massettes (Typha sp.) borde cet étang.

Ouellet, 1974 soulignait qu'il est peu probable que cette espèce niche dans la région de Montréal, à cause d'un manque d'habitats propices. Or, la dimension et la physionomie des étangs de traitement des eaux usées correspondent aux conditions de nidification de cette espèce, telles que décrites par (Godfrey, 1967, et Harrison, 1978).

Peu nombreux présentement, ces habitats pourront se rencontrer plus fréquemment à l'avenir puisqu'ils représentent une solution intéressante à l'épuration des eaux pour les petites agglomérations. Il sera alors intéressant d'y suivre l'occupation par le Canard roux de ces habitats.

Le couple et les six (6) canetons ont été observés au même endroit le 28 juillet suivant. Des photos ont alors été prises.

BIBLIOGRAPHIE

David, N., 1980. Etat et distribution des oiseaux du Québec méridional. Club des ornithologues du Québec, cahiers d'ornithologie Victor-Gaboriault, numéro 3.

Godfrey, W. Earl, 1967. Les oiseaux du Canada. Ottawa, Mus. Nat. Canada, Bull., numéro 203.

Gollop, J.B. et W.H. Marshall, 1954. A guide for aging duck broods in the field. Miss. Flyway Counc. Tech. Sect. 14p.

Harrison, C., 1978. A field guide to the nests, eggs and nestlings of north american birds. Collins.

Yvon Champagne, Marc Surprenant
CANARDS ILLIMITES (CANADA)
929, boul. du Séminaire
St-Jean-sur-Richelieu
J3A 1B6

* * * * * * * * * * * * * * *

Prédation d'une Corneille d'Amérique sur un Pigeon biset

Le 21 juin 1981, vers 13:00 heures, nous avons été témoins d'un spectacle assez inusité sur les terrains du collège McDonald, à Ste-Anne-de-Bellevue; un pigeon y était pourchassé par une corneille, laquelle à son tour était poursuivie par un Pluvier kildir.

Harcelé sans répit par la corneille qui le suivait de très près, le pigeon dut se poser derrière une colline. Deux (2) minutes plus tard, nous retrouvons les trois (3) oiseaux dans un espace labouré. Corneille et pigeon sont très près l'un de l'autre sur la bordure herbeuse, tandis que le pluvier observe le tout d'un peu plus loin, dans le creux d'un sillon. Tout à coup, de toute sa hauteur, avec précision, la corneille assène un violent coup de bec à l'arrière de la tête du pigeon. Ahuri, l'attaqué ne s'éloigne que de quelques pas. Le manège se répète une dizaine (10) de fois, les coups étant portés de plus en plus fréquemment. Etourdi, le pigeon titube et finalement s'écrase, assommé au sol. Quelques coups encore... il est mort.

Au télescope, on peut alors voir l'agresseur arracher par paquets les plumes de la poitrine de la victime et commencer à la manger. Comme le temps nous pressait, nous avons dû quitter l'endroit sans pouvoir aller constater de près quelles parties de l'oiseau avaient été touchées. Durant les dix (10) minutes qu'a duré la mise à mort, une deuxième corneille a tenté de s'approcher mais l'assaillante l'a tenue à distance. Elle n'a pu porter que quelques coups de bec sur le pigeon mort, aussitôt chassée par la première.

Bien que la littérature mentionne de nombreux cas ou oeufs et oisillons de plusieurs espèces ont servi de nourriture à des corneilles et qu'à l'occasion de petits oiseaux aient été mangés, il est quand même très rare qu'une corneille s'attaque à un oiseau adulte de la taille d'un pigeon.

Gaétan Duquette
Nicole Lépine

Les oiseaux d'été du golfe de Richmond

(Lac Guillaume-Delisle)

Par: Line Rochefort

La synthèse des observations que je vous présente n'a pas la rigueur scientifique qu'exigerait un rapport d'inventaire exhaustif. Vous y trouverez tout au plus des observations ornithologiques faites au cours d'un été dans un secteur du Nouveau-Québec.

Aucune revue de littérature rigoureuse n'a été consultée, sauf le Peterson, 1981 et Robbins et al, 1966 pour identifier certaines espèces sur le terrain et leur distribution géographique. Mes observations furent faites à l'aide d'une paire de jumelle 7X35 et d'un télescope (22Xgrand angle).

Dans le cadre d'un travail d'été pour la compte du Centre d'études nordiques, j'ai passé la période du 31 mai au 28 août 1981 dans la toundra québécoise. L'équipe dont je faisais partie avait établi son campement au golfe de Richmond (56º 10, 56º 30 N). Le golfe peut être considéré comme un appendice de la Baie d'Hudson.

A la fin de ce texte, vous trouverez une liste des oiseaux déjà vus au golfe par deux (2) chasseurs Inuits: Alec et Joshua Sala. Ils ont reconnu les oiseaux par identification visuelle dans le Peterson, 1981. J'ai ajouté aussi les oiseaux observés à Poste-de-la-Baleine au début de mon séjour.

Observations au golfe de Richmond

J'ai pu observer à loisir, au cours de l'été, un nid de Pluvier à collier et un nid de Maubèche branle-queue qui n'était qu'à cinq cent (500) pieds de chaque côté de ma tente. Les deux (2) espèces ont pondu quatre (4) oeufs. Le pluvier a couvé pendant vingt-huit (28) jours, un oeuf n'a pas éclos, deux (2) petits ont vu le jour et je n'ai jamais su le sort du quatrième (4e) oeuf. La Maubèche a couvé pendant dix-sept (17) jours, les quatre (4) ont éclos et deux (2) jours après toute la famille était partie.

Il était possible d'observer quand on le désirait, trois (3) couples de rapaces ayant établi leur territoire sur trois (3) falaises (cuesta) voisines. Les falaises avaient environ 2,5km de distance entre elles et étaient situées dans le sud du golfe. Ainsi on retrouvait un couple de Buse pattue près de la Baie d'Hudson, un couple d'aigle doré sur la forteresse et un couple d'Aigle à tête blanche dans la vallée de l'Anurik. Les trois (3) couples ont été observés au vol, perchés et lançaient des cris tout le temps de notre présence, ce qui laisse supposer qu'ils ont probablement niché en ces endroits mais ayant changé de comportement avant la fin de juillet, aucun jeune ou immature n'a été aperçu. (Voir tableau des observations du golfe de Richmond).

Observations à Poste-de-la-Baleine

A mon arrivée, le 31 mai, la Baie d'Hudson était encore complètement gelée et la Grande Rivière de la Baleine venait de débâcler trois (3) jours auparavant. Donc, les oiseaux commençaient tout juste à arriver. Il était très difficile d'observer les canards car avec l'arrivée de ces oiseaux, débutait le temps de la chasse pour les cris et les Inuits. (Voir tableau des observations à Poste-de-la-Baleine).

* * * * * * * * * * * * * * *

TABLEAU DES OBSERVATIONS DU GOLFE DE RICHMOND

ETE 1981

	Juin								Juillet														Août			
	14	15	18	21	22	27	29	30	2	4	6	7	8	9	10	12	14	16	22	24	28	29	4	11	14	18
Huart à collier							2	1				3														
Huart à gorge rousse	4	2	2	3	1						1	1									1					
Bernache du Canada	15		1				5	7		1	8				5								30		2	
Bernache cravant		6																								
Oie blanche					5																					
Canard noir	1♂		6		1		1	1														50	1			
Canard pilet	2♀																									
Sarcelle à ailes vertes	1																									
Grand Morillon																			4♂							
Garrot commun						5		10	5		15♂	1♂					5♂		1♀			3				
Eider à duvet				5			25	8	32		5♀	1♀														
Macreuse à front blanc		1♂						15	21		100	5												4		
Macreuse à bec jaune		1♀						15	18		200	10									20	40				
Grand Bec-Scie				3	1♂	2♂	2		6		3					2	5♂			2					15	
Bec-scie à poitrine rousse		2						12										1					5♀		25	
Buse pattue		1			2																					
Aigle doré		1	1				1			1	2															
Aigle à tête blanche	2																									
Aigle-pêcheur							1	1																		
Faucon émerillon	1																					1			1	
Tétras des savanes						1♂								1												
Pluvier à collier	6	4	3		4	3	1	2		1	2			2	1	2	1				2	3				2
Maubèche branle-queue	3	3	3		3	2	2	1		2	6	6	2	2		1	2						1			
Bécasseau semi-palmé	5																									
Bécasseau minuscule																							1		30	

TABLEAU DES OBSERVATIONS DU GOLFE DE RICHMOND

ETE 1981

	Juin								Juillet														Août			
	14	15	18	21	22	27	29	30	2	4	6	7	8	9	10	12	14	16	22	24	28	29	4	11	14	18
Phalarope hyperboréen	7		6	2																						
Goéland arctique		1																								
Goéland argenté	9	5	4	23	50	50	48	75	36	10	30		35	27	30	15		1			100	10	15	1	4	3
Sterne arctique	25	15	10	14		45		25										15								
Guillemot noir	18	4	16	2	25	4	100	20	22	8	78	6	10	12	13	4	1		2		50	20				1
Geai gris						1				2	1								1							
Grand Corbeau							1						2		1	6					3					
Merle d'Amérique	2	2			2	3	2	7		1	2				1	2	2	1	1	3				1		
Grive à joues grises											1	1										3		1		
Traquet motteux						1																				
Pic flamboyant											1															
Fauvette jaune						2	1				1		1	1							1	1	1			
Fauvette rayée		4			1	1	6	1		3	2			2					2	1						
Fauvette des ruisseaux		1					1			1	1			2												
Fauvette à calotte noire		2																								
Fauvette obscure											1	1														
Roselin pourpré						10																				
Sizerin à tête rouge		2				4	20	12			10	15	8			6		3	4	5			1	7	6	4
Pinson des prés				2		5	2	2																		
Junco ardoisé																									1	
Pinson hudsonien		1					3						1	1					6	6						
Pinson familier		1																								
Pinson à couronne blanche	4	2		5	6	10	12	5		4	4	2				2	2	1	12	15	3		1			2
Bruant lapon																										
Bruant des neiges			1	2																					4	

TABLEAU DES OBSERVATIONS A POSTE-DE-LA-BALEINE

	Mai	Juin						
	31	1	2	3	5	8	11	12
Huart à collier								
Huart à gorge rousse			3	1				
Bernache du Canada		106	1	1	15		50	
Oie blanche					1		40	
Canard noir		3♂		1		1♂		
Canard pilet		8♂ 6♀		10♂	4♂	4♂		3♂
Sarcelle à ailes vertes		16♂ 6♀		4♀ 16♀	2♀	8♂		4♀
Grand Morillon			6	11♂				
Canard kakawi				3♂ 1♂		1♂		
Canard arlequin				1♀				
Macreuse à front blanc			26	12♂				
Macreuse à bec jaune		1♂	45	6♀				
Bec-scie à poitrine rousse			4					1♀
Buse pattue					1	1		
Aigle-pêcheur							1	
Faucon émerillon				1				
Pluvier à collier		4	32	32	7	10	6	10
Maubèche branle-queue								6
Petit Chevalier à pattes jaunes		1						
Bécasseau minuscule				6		2		
Bécasseau semi-palmé				22		4	2	3
Bécasseau				2	7			
Phalarope hyperboréen							1♂	
Goéland bourgmestre					2			
Goéland arctique			1		3		1	
Goéland argenté	1	150	300	36	120	20	25	15

TABLEAU DES OBSERVATIONS A POSTE-DE-LA-BALEINE

	Mai			Juin				
	31	1	2	3	5	8	11	12
Pic flamboyant				1				
Alouette cornue	16	45	55	2	60	45	4	3
Hirondelle bicolore						4	10	4
Grand Corbeau		2			1		2	
Merle d'Amérique		4	1	3	8	3	3	4
Fauvette jaune								2
Fauvette à croupion jaune					1			
Fauvette rayée							2♂	3♂
Fauvette à calotte noire							2♂	2♂
Sizerin à tête rouge							4♀ 2♂	
Pinson des prés		1	3	2		5	5	3
Junco ardoisé						2		
Pinson hudsonien		2		7	2	7	7	10
Pinson familier					4			
Pinson à couronne blanche		1	4	3	12	10	2	2
Pinson à gorge blanche							2	
Pinson fauve		2		1				
Bruant lapon						8	12	
Bruant des neiges	12	35	120	6	30	35	15	4

Plectrophane des neiges et Alouette cornue

Ces oiseaux sont présents en grand nombre dans le village. Ils me font penser à ce que sont les moineaux ici. Les jeunes de Poste-de-la-Baleine se pratiquent à viser ces oiseaux avec des "tire-roches".

Liste des oiseaux aperçus ou tués aux environs du golfe de Richmond.

	Alec	Joshua
Huart à collier	X	X
Huart à bec jaune		X
Huart à gorge rousse	X	X
Huart arctique	X	X
Marmette de Brünnich	X	X
Mergule nain		X
Guillemot noir	X	X
Cygne siffleur	X	X
Bernache du Canada	X	X
Bernache cravant	X	X
Oie blanche	X	X
Canard malard	X	X
Canard noir	X	X
Canard pilet	X	X
Sarcelle à ailes vertes	X	X
Garrot commun	X	X
Canard kakawi	X	X
Canard arlequin	X	X
Eider à duvet	X	X
Eider remarquable	X	X
Macreuse a front blanc	X	X
Macreuse à bec jaune	X	X
Morillon à collier		X
Grand Morillon		X
Grand Bec-Scie	X	X
Bec-scie à poitrine rousse	X	X
Buse pattue	X	
Aigle doré	X	
Aigle à tête blanche	X	X
Aigle-pêcheur	X	
Busard des marais		X
Gerfaut	X	X
Crécerelle d'Amérique	X	
Faucon pèlerin		X
Tétras des savanes	X	X
Lagopède des saules	X	X
Lagopède des rochers	X	
Pluvier à collier	X	X
Pluvier kildir	X	
Pluvier doré d'Amérique	X	X
Pluvier à ventre noir (argenté)	X	X

	Alec	Joshua
Tourne-pierre roux	X	
Bécassine des marais	X	
Courlis corlieu	X	
Maubèche branle-queue	X	X
Petit Chevalier à pattes jaunes	X	
Bécasseau minuscule	X	
Bécasseau semi-palmé	X	
Bécasseau sanderling	X	
Phalarope roux	X	X
Labbe à longue queue	X	
Goéland à manteau noir	X	X
Goéland argenté	X	X
Sterne arctique	X	X
Grand Duc	X	
Harfang des neiges	X	X
Martin-pêcheur	X	
Alouette cornue	X	X
Hirondelle bicolore	X	
Geai gris		
Grand Corbeau	X	X
Mésange à tête brune	X	
Merle d'Amérique	X	
Grive à joues grises	X	
Pipit commun	X	X
Pie-grièche boréale	X	
Fauvette noir et blanc	X	
Fauvette jaune	X	
Fauvette rayée	X	
Fauvette à calotte noire	X	
Mainate rouilleux	X	
Roselin pourpré	X	
Sizerin à tête rouge	X	X
Bec-croisé à ailes blanches	X	
Pinson hudsonien	X	
Pinson à couronne blanche	X	
Pinson à gorge blanche	X	
Pinson fauve	X	
Bruant lapon	X	X
Bruant des neiges	X	X

On remarque dans cette liste que Joshua connaît surtout les oiseaux en rapport avec la chasse puisqu'il est un chasseur de longue expérience, tandis que l'autre Inuit connaissait mieux les petits oiseaux grâce à un field guide qu'il possédait lui-même.