

PARTIE 2



État de santé



7. État de santé global

7.1 Population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé (2005)

Définition : Proportion : Proportion du nombre de personnes à domicile, âgées de 12 ans et plus, considérant leur santé passable ou mauvaise au moment de l'enquête, par rapport à l'ensemble de la population à domicile, âgée de 12 ans et plus.

Nombre estimé : Application du taux régional à la population âgée de 12 ans et plus de chacun des territoires de CSSS pour obtenir un nombre estimé de personnes par territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la centaine la plus proche.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2005 (cycle 3.1). Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2007 produites en février 2008.

Note : Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

7.1 Population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé (2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13 	10
	N ^e	400	1 500	4 500	2 400	2 700	4 900	15 700	666 000
HOMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13 	10
	N ^e	200	800	2 200	1 200	1 400	2 500	7 800	308 500
FEMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13 	11
	N ^e	200	700	2 300	1 200	1 400	2 400	7 800	357 500

Légende

%	Pourcentage
N ^e	Nombre estimé
n.d.	Donnée non disponible
	Situation comparable à celle du reste du Québec (aucune différence statistique significative)
	Situation plus défavorable que celle du reste du Québec (différence statistique significative)

7.2 Espérance de vie à la naissance (2001 à 2005)

Définition : Nombre moyen d'années à vivre à partir de la naissance dans l'hypothèse où les taux de mortalité par âge, observés durant une période déterminée, dans un territoire donné, demeurent stables dans le temps.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des décès 2001 à 2005.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2003 révisées en février 2008.

Note : Les données de mortalité pour l'année 2005 sont provisoires car il manque les décès de résidents québécois survenus en Ontario. Cela peut affecter légèrement les résultats pour les territoires de CSSS limitrophes à l'Ontario, tels que celui de Témiscaming-et-de-Kipawa et, dans une moindre mesure, celui du Lac-Témiscamingue. On peut néanmoins penser qu'il s'agit d'un problème marginal puisque l'indicateur est calculé sur la mortalité observée durant 5 ans.

7.2 Espérance de vie à la naissance (2001 à 2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS	N années	78,7 ■	78,1 ■	78,7 ◆	78,0 ◆	77,9 ◆	77,6 ◆	78,1 ◆	79,8
HOMMES	N années	76,2 ■	75,0 ■	76,1 ■	75,5 ■	75,6 ■	74,5 ◆	75,4 ◆	77,1
FEMMES	N années	81,0 ■	81,4 ■	81,2 ■	80,7 ■	80,3 ■	80,8 ◆	80,8 ◆	82,3

Légende

N années	Nombre d'années à vivre
■	Situation comparable à celle de l'ensemble du Québec (aucune différence statistique significative)
◆	Situation plus défavorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)



7.3 Espérance de vie à 65 ans (2001 à 2005)

Définition : Nombre moyen d'années à vivre à partir de 65 ans dans l'hypothèse où les taux de mortalité par âge, observés durant une période déterminée, dans un territoire donné, demeurent stables dans le temps.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des décès 2001 à 2005.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2003 révisées en février 2008.

Note : Les données de mortalité pour l'année 2005 sont provisoires car il manque les décès de résidents québécois survenus en Ontario. Cela peut affecter légèrement les résultats pour les territoires de CSSS limitrophes à l'Ontario, tels que celui de Témiscaming-et-de-Kipawa et, dans une moindre mesure, celui du Lac-Témiscamingue. On peut néanmoins penser qu'il s'agit d'un problème marginal puisque l'indicateur est calculé sur la mortalité observée durant 5 ans.

7.3 Espérance de vie à 65 ans (2001 à 2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS	N années	18,0 ■	18,0 ■	18,3 ■	18,1 ◆	17,7 ◆	17,4 ◆	17,9 ◆	19,1
HOMMES	N années	15,7 ■	16,6 ■	16,3 ■	16,6 ■	15,8 ■	15,1 ◆	16,0 ◆	17,0
FEMMES	N années	19,9 ■	19,3 ■	20,1 ■	19,5 ■	19,5 ■	19,5 ◆	19,6 ◆	20,8

Légende

N années	Nombre d'années à vivre
■	Situation comparable à celle de l'ensemble du Québec (aucune différence statistique significative)
◆	Situation plus défavorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)

7.4 Espérance de vie en bonne santé (sans incapacité) (2001)

Définition : Nombre moyen d'années à vivre en bonne santé (sans incapacité), à partir de la naissance, dans l'hypothèse où les taux de mortalité et d'incapacité par âge, observés durant une période déterminée, dans un territoire donné, demeurent stables dans le temps.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichiers des décès et des naissances vivantes, 1999 à 2003.

Statistique Canada, recensement de 2001 (Taux d'institutionnalisation et d'incapacité).
Traitement effectué par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Note : Les données du recensement de 2006 (le plus récent disponible), spécifiques au calcul de cet indicateur, ne sont pas encore disponibles.

7.4 Espérance de vie en bonne santé (sans incapacité) (2001)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS	N années	61,7	64,3	64,8	65,1	64,6	64,2	64,5	67,0
HOMMES	N années	62,5	61,8	63,1	63,4	62,9	62,8	62,9	65,8
FEMMES	N années	62,0	66,8	66,5	67,0	66,2	65,8	66,3	68,1
Légende N années Nombre d'années à vivre									

7.5 Taux des années potentielles de vie perdues selon la cause (2001 à 2005)

Définition : Taux pour 100 000 : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen des années de vie perdues pour certaines causes spécifiques de décès, survenus avant l'âge de 75 ans, chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée, à la population totale du même territoire au milieu de la même période, multiplié par 100 000. À noter que le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2001 comme population de référence.

Les causes de mortalité prématurée retenues ici sont les suivantes :

- Ensemble des causes;
- Tumeurs malignes;
- Maladies de l'appareil circulatoire;
- Traumatismes non intentionnels (accidents de transport, complications de soins médicaux et chirurgicaux).

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des décès.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2003 révisées en février 2008.

7.5 Taux des années potentielles de vie perdues selon la cause (2001 à 2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
ENSEMBLE DES CAUSES									
SEXES RÉUNIS	Tx moy/an /100 000	6 008 *	6 163	5 707	6 239	6 199	6 185	6 063	5 095
	Tx réfé.	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095	5 095		
HOMMES	Tx moy/an /100 000	7 217 *	8 512	6 754	7 997	7 179	7 776	7 499	6 331
	Tx réfé.	6 331	6 331	6 331	6 331	6 331	6 331		
FEMMES	Tx moy/an /100 000	4 667 *	3 579	4 639	4 378	5 054	4 515	4 551	3 847
	Tx réfé.	3 847	3 847	3 847	3 847	3 847	3 847		
TUMEURS MALIGNES									
SEXES RÉUNIS	Tx moy/an /100 000	2 288 *	2 194	2 117	1 855	1 648	2 000	1 974	1 773
	Tx réfé.	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773		
HOMMES	Tx moy/an /100 000	2 628 *	2 453	1 886	2 181	1 633	1 875	1 940	1 809
	Tx réfé.	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809	1 809		

7.5 Taux des années potentielles de vie perdues selon la cause (2001 à 2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eschers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE	FEMMES								
	Tx moy/an /100 000	2 041 **	1 916 *	2 361 ■	1 512 ■	1 648 ■	2 131 ■	2 003 ■	
	Tx réfé.	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736
SEXES RÉUNIS	Tx moy/an /100 000	621 **	965 *	850 ■	828 ■	686 ■	734 ■	787 ■	
	Tx réfé.	820	820	820	820	820	820	820	820
HOMMES	Tx moy/an /100 000	816 **	1 393 *	1 138 ■	1 086 *	861 *	1 021 ■	1 063 ■	
	Tx réfé.	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161
TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS	FEMMES								
	Tx moy/an /100 000	356 **	454 *	543 *	538 *	482 *	423 *	484 ■	
	Tx réfé.	476	476	476	476	476	476	476	476
SEXES RÉUNIS	Tx moy/an /100 000	1 129 **	974 *	808 *	684 *	1 245 *	1 001 ◆	946 ◆	
	Tx réfé.	552	552	552	552	552	552	552	552

7.5 Taux des années potentielles de vie perdues selon la cause (2001 à 2005)


	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS									
HOMMES	Tx moy/an /100 000	1 660 **	1 385 *	1 247 *	812 *	1 788 *	1 541 *	1 388 	
	Tx réfé.	829	829	829	829	829	829	829	829
FEMMES	Tx moy/an /100 000	493 **	518 **	369 **	556 **	684 **	444 *	491 	
	Tx réfé.	274	274	274	274	274	274	274	274

Légende

Tx moy/an/100 000	Taux annuel moyen pour 100 000 personnes
Tx réfé.	Taux québécois de référence
*	Attention, estimation de qualité moyenne (coefficient de variation $\geq 16,6\%$ et $\leq 33,3\%$)
**	Estimation peu fiable en raison de la trop grande variabilité du taux (coefficient de variation $> 33,3\%$)
	Situation plus favorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)
	Situation comparable à celle de l'ensemble du Québec (pas de différence statistique significative)
	Situation plus défavorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)



8. Incapacités



8.1 Population présentant une incapacité (2006)

Définition : Proportion : Proportion de la population vivant en ménage privé ou collectif non institutionnel, présentant une incapacité selon une perspective fonctionnelle, c'est-à-dire que l'incapacité correspond à la faculté restreinte d'exécuter certaines tâches communes de façon « normale » par rapport à l'ensemble de la population vivant en ménage privé ou collectif non institutionnel.

Nombre estimé : Application du taux provincial à la population de chacun des territoires de réseaux locaux pour obtenir un nombre estimé de personnes par territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la dizaine la plus proche.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités (EPLA) 2006.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2007 produites en février 2008.

8.1 Population présentant une incapacité (2006)


	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming-et-Kipawa	Lac-Témiscamingue	Rouyn-Noranda	Aurores-Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de-l'Or		
SEXES RÉUNIS									
0-14 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3
	N ^e	20	70	200	100	130	230	750	36 980
15-24 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3
	N ^e	10	50	160	80	100	180	580	27 930
25-44 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6
	N ^e	60	180	580	280	360	640	2 100	113 950
45-64 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12
	N ^e	110	500	1 450	810	900	1 600	5 390	267 040
65-74 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	22
	N ^e	50	240	650	380	370	650	2 350	127 460
75 ans et +	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	46
	N ^e	90	420	1 070	710	610	1 050	3 950	194 780
Total	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10
	N ^e	380	1 390	4 110	2 190	2 530	4 500	15 100	768 140
HOMMES									
0-14 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4
	N ^e	10	50	120	70	80	150	480	23 330
15-24 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3
	N ^e	10	30	90	40	50	100	320	15 090

8.1 Population présentant une incapacité (2006)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
HOMMES									
25-44 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6
	N ^e	40	100	310	150	190	350	1 140	59 410
45-64 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12
	N ^e	60	260	720	410	460	800	2 700	128 310
65-74 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	21
	N ^e	30	120	280	180	180	300	1 090	56 220
75 ans et +	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	40
	N ^e	30	150	380	260	200	360	1 370	66 050
Total	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	10
	N ^e	180	660	1 890	1 020	1 190	2 110	7 040	348 410
FEMMES									
0-14 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2
	N ^e	10	30	70	40	40	80	270	13 640
15-24 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3
	N ^e	10	20	70	40	50	80	260	12 840
25-44 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5
	N ^e	30	90	280	130	170	300	1 000	54 540

8.1 Population présentant une incapacité (2006)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
FEMMES									
45-64 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13
	N ^e	60	240	730	400	450	800	2 670	138 730
65-74 ans	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	23
	N ^e	30	130	370	200	190	350	1 260	71 240
75 ans et +	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	49
	N ^e	60	270	690	450	410	680	2 570	128 730
Total	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11
	N ^e	200	720	2 200	1 150	1 330	2 370	7 980	419 730
Légende									
N ^e	Nombre estimé								
%	Pourcentage								
n.d.	Donnée non disponible								



8.2 Population de 15 ans et plus selon la nature de l'incapacité (2006)

Définition : Proportion : Proportion de la population de 15 ans ou plus vivant en ménage privé ou collectif non institutionnel, présentant une incapacité selon la nature de l'incapacité, soit :

- liée à l'audition : difficulté à entendre ce qui se dit dans une conversation avec une autre personne, dans une conversation avec au moins trois autres personnes ou dans une conversation téléphonique;
- liée à la vision : difficulté à voir les caractères ordinaires d'un journal ou à voir clairement le visage d'une personne à une distance de 4 mètres (12 pieds);
- liée à la parole : difficulté à parler et ou à se faire comprendre;
- liée à la mobilité : difficulté à marcher un demi-kilomètre ou à monter et à descendre un escalier d'environ 12 marches sans se reposer, à se déplacer d'une pièce à l'autre, à transporter un objet de 5 kg (10 lbs) sur une distance de 10 mètres (30 pieds) ou à se tenir debout pendant de longues périodes;
- liée à l'agilité : difficulté à se pencher, à s'habiller ou à se déshabiller, à se mettre au lit ou à en sortir, à se couper les ongles d'orteils, à utiliser ses doigts pour saisir ou manier des objets, à tendre les bras dans n'importe quelle direction (au-dessus de sa tête par exemple) ou à couper sa nourriture;
- liée à la douleur : limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'une douleur, de longue durée qui est constante ou qui revient de temps à autre, un mal de dos récurrent par exemple;

- liée à l'apprentissage : difficulté à apprendre en raison d'un état comme des problèmes d'attention (hyperactivité ou dyslexie), que cet état ait été ou non diagnostiqué par un enseignant, un médecin ou un autre professionnel de la santé;
- liée à la mémoire : limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison de périodes fréquentes de confusion ou d'une difficulté à se souvenir de certaines choses. Ces difficultés peuvent être associées à la maladie d'Alzheimer, à des lésions cérébrales ou à d'autres états semblables;
- liée à la déficience intellectuelle : limitations cognitives attribuables à une déficience intellectuelle ou à un trouble du développement, comme le syndrome de Down, l'autisme ou une déficience intellectuelle causée par un manque d'oxygène à la naissance;
- psychologique : limitations sur le plan de la quantité ou du genre d'activités qu'on peut effectuer en raison d'un état émotif, psychologique ou psychiatrique, comme des phobies, la dépression, la schizophrénie ou des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue;

Par rapport à la population totale de 15 ans ou plus vivant en ménage privé ou collectif non institutionnel.

Nombre estimé : Application du taux provincial à la population âgée de 15 ans et plus de chacun des territoires de réseaux locaux pour obtenir un nombre estimé de personnes par territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la dizaine la plus proche.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités (EPLA) 2006.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2007 produites en février 2008.

8.2 Population de 15 ans et plus selon la nature de l'incapacité (2006)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
AUDITION	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3
	N ^e	100	350	1 060	560	640	1 140	3 850	195 740
VISION	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2
	N ^e	70	240	730	390	440	790	2 650	136 650
PAROLE	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1
	N ^e	40	150	460	250	280	500	1 690	83 180
MOBILITÉ	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9
	N ^e	250	930	2 800	1 500	1 710	3 040	10 220	526 450
AGILITÉ	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8
	N ^e	240	900	2 700	1 440	1 650	2 930	9 860	506 450
DOULEUR	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	8
	N ^e	230	860	2 570	1 370	1 570	2 790	9 380	478 970
APPRENTISSAGE	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2
	N ^e	60	210	630	330	380	680	2 290	117 120

8.2 Population de 15 ans et plus selon la nature de l'incapacité (2006)


	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eschers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
MÉMOIRE	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1
	N ^e	30	120	360	190	220	390	1 320	67 890
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0,4
	N ^e	10	40	130	70	80	140	480	26 590
PSYCHOLOGIQUE	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2
	N ^e	40	170	500	260	300	540	1 800	95 380

Légende

N ^e	Nombre estimé
%	Pourcentage
n.d.	Donnée non disponible



9. Santé physique



9.1 Taux d'incidence de certaines maladies infectieuses à déclaration obligatoire (2003 à 2007)

Définition : Nombre : Nombre annuel moyen de nouveaux cas déclarés de certaines maladies infectieuses à déclaration obligatoire chez les résidents d'un territoire donné, au cours d'une période donnée. Les maladies infectieuses retenues ici sont la chlamydiose et l'hépatite C. Ces maladies doivent légalement faire l'objet d'une déclaration de la part des médecins ou des laboratoires à la Direction de santé publique de la région où réside la personne au moment du diagnostic de la maladie.

Taux pour 100 000 : Rapport pour une période donnée du nombre annuel moyen de nouveaux cas déclarés de certaines maladies infectieuses à déclaration obligatoire chez les résidents d'un territoire donné, au cours d'une période donnée, à la population totale du même territoire au milieu de la même période. À noter que le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2001 comme population de référence.

Sources : Laboratoire de santé publique du Québec, 2003 à 2007.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2005 révisées en février 2008.

9.1 Taux d'incidence de certaines maladies infectieuses à déclaration obligatoire (2003 à 2007)


	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming-et-Kipawa	Lac-Témiscamingue	Rouyn-Noranda	Aurores-Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de-l'Or		
CHLAMYDIA									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	5	22	97	27	44	125	319	12 826
	Tx moy/an /100 000	132 *	162	249	134	173	295	222	
	Tx réfé.	173	173	173	173	173	173	173	173
HOMMES	N moy/an	1	5	28	6	10	30	82	3 744
	Tx moy/an /100 000	65 **	80 *	143	64 *	80	142	113	
	Tx réfé.	99	99	99	99	99	99	99	99
FEMMES	N moy/an	4	16	69	21	33	94	237	9 049
	Tx moy/an /100 000	202 *	250	354	208	274	463	338	
	Tx réfé.	251	251	251	251	251	251	251	251
HÉPATITE C									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	0,4	3	13	3	11	12	41	2 316
	Tx moy/an /100 000	10 **	20 *	33	15 *	48	28	30	
	Tx réfé.	31	31	31	31	31	31	31	31

9.1 Taux d'incidence de certaines maladies infectieuses à déclaration obligatoire (2003 à 2007)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec	
		Témiscaming-et-Kipawa	Lac-Témiscamingue	Rouyn-Noranda	Aurores-Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de-l'Or			
HÉPATITE C	HOMMES	N moy/an	0,2	2	8	2	8	6	25	1 520
		Tx moy/an /100 000	8 **	28 *	41 	17 **	65 	26 *	35 	
		Tx réfé.	41	41	41	41	41	41	41	41
	FEMMES	N moy/an	0,2	1	5	1	3	6	16	746
		Tx moy/an /100 000	13 **	10 **	25 *	13 **	29 *	30 *	24 	
		Tx réfé.	20	20	20	20	20	20	20	20

Légende

N moy/an	Nombre moyen par année
Tx moy/an/100 000	Taux moyen par année pour 100 000 personnes
Tx réfé.	Taux québécois de référence
*	Attention, estimation de qualité moyenne (coefficient de variation $\geq 16,6\%$ et $\leq 33,3\%$)
**	Estimation peu fiable en raison de la trop grande variabilité du taux (coefficient de variation $> 33,3\%$)
■	Situation plus favorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)
■	Situation comparable à celle de l'ensemble du Québec (pas de différence statistique significative)
◆	Situation plus défavorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)



9.2 Taux d'incidence du cancer selon le siège (2003 à 2005)

Définition : Nombre : Nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer enregistrés chez les résidents d'un territoire donné, au cours d'une période donnée. La catégorie « *Ensemble des tumeurs malignes* » comprend tous les types de cancers (codes 140 à 208 de la Classification internationale des maladies 9^e révision (CIM-9)) à l'exception des tumeurs bénignes (CIM-9=211 à 226), des tumeurs à évolution imprévisible (CIM-9=235 à 239), des carcinomes in situ (CIM-9=230 à 234) et des cancers de la peau sans mélanome (CIM-9=173). Les autres types de cancer retenus ici sont les plus fréquents, à savoir : cancer du poumon, cancer du côlon-rectum, cancer du sein chez les femmes et cancer de la prostate chez les hommes.

Taux pour 100 000 : Rapport pour une période donnée du nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer enregistrés chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée à la population totale du même territoire au milieu de la même période, multiplié par 100 000. À noter que le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2001 comme population de référence.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des tumeurs.
Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2004 révisées en février 2008.

Note : Les fichiers tumeurs 2003, 2004 et 2005 utilisés ici pour les calculs sont des fichiers temporaires et incomplets qui ne comprennent pas les nouveaux cas de cancer survenus chez des Québécois ayant été diagnostiqués en Ontario. Cela a surtout un impact sur les données locales des CSSS limitrophes à l'Ontario, en l'occurrence, celui de Témiscaming-et-de-Kipawa et, dans une moindre mesure, celui du Lac-Témiscamingue, car beaucoup de résidents de ces territoires vont chercher des services de santé en Ontario en raison de la proximité géographique. L'impact sur les données régionales est probablement moindre bien qu'existant aussi. Conséquemment, il est également préférable de ne pas comparer ces données avec d'autres produites antérieurement au moyen de fichiers complets.

9.2 Taux d'incidence du cancer selon le siège (2003 à 2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
ENSEMBLE DES TUMEURS MALIGNES									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	7	60	175	109	91	193	635	37 316
	Tx moy/an /100 000	220 *	412 🌸	448 🌸	461 🟦	404 🌸	482 🟦	445 🌸	
	Tx réfé.	504	504	504	504	504	504	504	504
HOMMES	N moy/an	5	34	87	63	48	103	340	19 070
	Tx moy/an /100 000	288 *	431 🟦	431 🌸	488 🟦	413 🌸	503 🟦	456 🌸	
	Tx réfé.	523	523	523	523	523	523	523	523
FEMMES	N moy/an	2	26	88	47	42	89	295	18 247
	Tx moy/an /100 000	147 **	381 🌸	461 🟦	419 🟦	386 🌸	457 🟦	427 🌸	
	Tx réfé.	487	487	487	487	487	487	487	487
CANCER DU POU MON									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	2	11	35	19	18	46	131	6 559
	Tx moy/an /100 000	53 **	75 *	89 🟦	79 🟦	80 🟦	116 🔴	91 🟦	
	Tx réfé.	89	89	89	89	89	89	89	89

9.2 Taux d'incidence du cancer selon le siège (2003 à 2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming-et-Kipawa	Lac-Témiscamingue	Rouyn-Noranda	Aurores-Boréales	Les Esfers de l'Abitibi	Vallée-de-l'Or		
CANCER DU POU MON									
HOMMES	N moy/an	2	7	19	11	12	27	78	3 850
	Tx moy/an /100 000	105 **	92 *	95	85 *	103 *	134	106	
	Tx réfé.	106	106	106	106	106	106	106	106
FEMMES	N moy/an	0	4	16	8	6	19	52	2 709
	Tx moy/an /100 000	0	52 *	81	74 *	51 *	96	74	
	Tx réfé.	72	72	72	72	72	72	72	72
CANCER DU CÔLON-RECTUM									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	1	8	24	10	13	30	87	5 036
	Tx moy/an /100 000	33 **	57 *	63	43 *	58	76	61	
	Tx réfé.	68	68	68	68	68	68	68	68
HOMMES	N moy/an	1	5	15	7	6	21	55	2 674
	Tx moy/an /100 000	59 **	59 *	72	56 *	50 *	101	73	
	Tx réfé.	73	73	73	73	73	73	73	73
FEMMES	N moy/an	0	4	9	3	7	9	32	2 362
	Tx moy/an /100 000	0	52 *	51 *	26 **	65 *	49 *	48	
	Tx réfé.	63	63	63	63	63	63	63	63

9.2 Taux d'incidence du cancer selon le siège (2003 à 2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eschers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
CANCER DU SEIN									
	FEMMES								
	N moy/an	0	6	21	15	14	27	83	5 122
	Tx moy/an /100 000	0	86 *	107 ■	132 ■	127 ■	133 ■	117 ■	
	Tx réfé.	137	137	137	137	137	137	137	137
CANCER DE LA PROSTATE									
	HOMMES								
	N moy/an	0	8	16	19	10	15	67	4 055
	Tx moy/an /100 000	0	96 *	80 ■	145 ◆	86 *	75 ■	90 ■	
	Tx réfé.	111	111	111	111	111	111	111	111

Légende

N moy/an	Nombre annuel moyen
Tx moy/an/100 000	Taux annuel moyen pour 100 000 personnes
Tx réfé.	Taux québécois de référence
*	Attention, estimation de qualité moyenne (coefficient de variation $\geq 16,6\%$ et $\leq 33,3\%$)
**	Estimation peu fiable en raison de la trop grande variabilité du taux (coefficient de variation $> 33,3\%$)
■	Situation comparable à celle de l'ensemble du Québec (pas de différence statistique significative)
■	Situation plus favorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)
◆	Situation plus défavorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)

9.3 Prévalence du diabète parmi la population de 20 ans et plus (2004-2005)

Définition : Nombre : Nombre de personnes diabétiques, âgées de 20 ans et plus, d'un territoire donné, en date de l'année financière 2004-2005.

Une personne est diabétique si, elle a :

- a) 2 diagnostics de diabète inscrits au fichier des services médicaux rémunérés à l'acte de la RAMQ l'intérieur d'une période de 2 ans, ou;
- b) 1 diagnostic de diabète inscrit parmi les diagnostics principaux ou secondaires au fichier des hospitalisations ou;
- c) 1 diagnostic de diabète inscrit au fichier des services médicaux rémunérés à l'acte suivi d'une hospitalisation avec le même diagnostic à l'intérieur d'une période de 2 ans. Les cas retenus comprennent les personnes souffrant de diabète de type I ou II mais excluent les femmes ayant eu seulement un diabète gestationnel.

Proportion : Nombre de personnes diabétiques, âgées de 20 ans et plus, d'un territoire donné, en date de l'année financière 2004-2005 rapporté à la population âgée de 20 ans et plus du même territoire au milieu de la période, multiplié par 100. À noter que le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2001 comme population de référence.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des tumeurs.
Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2004 révisées en février 2008.

9.3 Prévalence du diabète parmi la population de 20 ans et plus (2004-2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS - 20 ANS ET PLUS	N	98	590	2 084	1 139	1 242	2 029	7 182	393 855
	%	4,1 	5,5 	7,0 	6,4 	7,1 	6,6 	6,5 	6,5
HOMMES - 20 ANS ET PLUS	N	48	290	1 062	544	586	1 027	3 557	205 330
	%	4,4 	5,5 	7,5 	6,2 	6,9 	6,9 	6,7 	7,5
FEMMES - 20 ANS ET PLUS	N	50	300	1 022	595	656	1 002	3 625	188 525
	%	3,9 	5,3 	6,4 	6,4 	7,2 	6,2 	6,3 	5,7

Légende

- N Nombre
- % Pourcentage
-  Situation plus favorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)
-  Situation comparable à celle de l'ensemble du Québec (aucune différence statistique significative)
-  Situation plus défavorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)

9.4 Prévalence de certains problèmes de santé chroniques (2005)

Définition : Proportion : Proportion du nombre de personnes à domicile, âgées de 12 ans et plus, ayant rapporté lors de l'enquête avoir un problème de santé qui dure depuis six mois ou plus et qui a été diagnostiqué par un professionnel de la santé, par rapport à l'ensemble de la population à domicile, âgée de 12 ans et plus. Les problèmes de santé retenus ici sont : maladie cardiaque, hypertension, asthme, bronchite chronique, arthrite ou rhumatisme, allergies alimentaires, allergies non alimentaires, maux de dos (autre que la fibromyalgie ou l'arthrite), migraines, problèmes de la thyroïde.

Nombre estimé : Application du taux régional à la population âgée de 12 ans et plus de chacun des territoires de CSSS pour obtenir un nombre estimé de personnes par territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la centaine la plus proche.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2005 (cycle 3.1). Traitement des données réalisé par l'Infocentre de santé publique du Québec.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2007 produites en février 2008.

Note : Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

9.4 Prévalence de certains problèmes de santé chroniques (2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming-et-Kipawa	Lac-Témiscamingue	Rouyn-Noranda	Aurores-Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de-l'Or		
MALADIE CARDIAQUE									
SEXES RÉUNIS - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5 *	5
	N ^e	100	500	1 600	800	1 000	1 700	5 500	331 600
HOMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5 *	6
	N ^e	100	300	900	500	500	900	3 200	197 800
FEMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4 *	4
	N ^e	100	200	700	400	400	700	2 300	133 800
HYPERTENSION									
SEXES RÉUNIS - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16 	15
	N ^e	500	1 800	5 400	2 900	3 300	5 800	18 800	977 100
HOMMESs - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	14 	14
	N ^e	200	800	2 500	1 300	1 500	2 700	8 800	433 600
FEMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	17 	17
	N ^e	300	1 000	2 900	1 500	1 800	3 100	10 100	543 400

9.4 Prévalence de certains problèmes de santé chroniques (2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
ASTHME									
SEXES RÉUNIS - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	11 	9
	N ^e	300	1 300	3 800	2 000	2 300	4 100	13 200	555 300
HOMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9 	7
	N ^e	100	500	1 600	800	1 000	1 700	5 500	212 900
FEMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	13 	10
	N ^e	200	700	2 200	1 200	1 300	2 400	7 600	342 500
BRONCHITE CHRONIQUE									
SEXES RÉUNIS - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3 *	3
	N ^e	100	400	1 100	600	700	1 200	3 900	179 100
HOMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2 **	2
	N ^e	0	100	400	200	300	500	1 500	63 400
FEMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4 *	4
	N ^e	100	200	700	400	400	800	2 500	115 700

9.4 Prévalence de certains problèmes de santé chroniques (2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
ARTHRITE OU RHUMATISME									
SEXES RÉUNIS - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	17 	14
	N ^e	500	1 900	5 800	3 100	3 500	6 300	20 300	909 900
HOMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12 	10
	N ^e	200	700	2 100	1 100	1 300	2 300	7 300	328 700
FEMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	22 	18
	N ^e	300	1 200	3 800	2 000	2 300	4 000	13 000	581 300
ALLERGIES ALIMENTAIRES									
SEXES RÉUNIS - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5 	6
	N ^e	200	600	1 800	1 000	1 100	1 900	6 300	375 300
HOMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4 	5
	N ^e	100	200	700	400	400	700	2 400	151 600
FEMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7 	7
	N ^e	100	400	1 100	600	700	1 200	3 900	223 700

9.4 Prévalence de certains problèmes de santé chroniques (2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
ALLERGIES NON ALIMENTAIRES									
SEXES RÉUNIS - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	23 	25
	N ^e	700	2 700	8 100	4 300	4 900	8 700	28 000	1 597 200
HOMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	18 	21
	N ^e	300	1 100	3 100	1 700	1 900	3 400	10 800	671 600
FEMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	29 	28
	N ^e	400	1 600	5 000	2 600	3 000	5 300	17 200	925 700
MAUX DE DOS									
SEXES RÉUNIS - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16 	16
	N ^e	500	1 800	5 500	2 900	3 300	5 900	19 000	1 062 200
HOMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	17 	16
	N ^e	300	1 000	2 900	1 600	1 800	3 200	10 200	508 000
FEMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	15 	17
	N ^e	200	800	2 600	1 300	1 500	2 700	8 800	554 200

9.4 Prévalence de certains problèmes de santé chroniques (2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming-et-Kipawa	Lac-Témiscamingue	Rouyn-Noranda	Aurores-Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de-l'Or		
MIGRAINES									
SEXES RÉUNIS - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9 	10
	N ^e	300	1 000	3 000	1 600	1 900	3 300	10 600	631 700
HOMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6 *	6
	N ^e	100	300	1 000	500	600	1 100	3 400	197 900
FEMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12 	13
	N ^e	200	700	2 100	1 100	1 300	2 200	7 200	433 800

9.4 Prévalence de certains problèmes de santé chroniques (2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
PROBLÈMES DE LA THYROÏDE									
SEXES RÉUNIS - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6 	7
	N ^e	200	700	2 100	1 100	1 300	2 200	7 200	433 700
HOMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5 	3
	N ^e	100	300	800	400	500	900	2 900	96 300
FEMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	7 *	10
	N ^e	100	400	1 300	700	800	1 400	4 400	336 800

Légende

%	Pourcentage
N ^e	Nombre estimé
n.d.	Donnée non disponible
*	Attention, estimation de qualité moyenne (coefficient de variation $\geq 16,6\%$ et $\leq 33,3\%$)
**	Estimation peu fiable en raison de la trop grande variabilité du taux (coefficient de variation $> 33,3\%$)
	Situation comparable à celle du reste du Québec (aucune différence statistique significative)
	Situation plus défavorable que celle du reste du Québec (différence statistique significative)

9.5 Taux d'hospitalisation en courte durée selon le diagnostic principal (2001-2002 à 2005-2006)

Définition : Nombre : Nombre annuel moyen de cas d'hospitalisation en soins physiques de courte durée enregistrés chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée. La catégorie « *ensemble des causes* » comprend tous les cas hospitalisés quel que soit le diagnostic principal à l'origine de l'hospitalisation. Sont toutefois exclues les hospitalisations des nouveaux-nés en bonne santé et celles pour troubles mentaux. Les autres grandes catégories retenues le sont à partir du diagnostic principal suivant : tumeurs malignes, maladies de l'appareil respiratoire, maladies de l'appareil circulatoire, maladies de l'appareil digestif et traumatismes non intentionnels (accidents de la route, chutes accidentelles, lésions et empoisonnements, brûlures, etc.). Les hospitalisations hors Québec de résidents québécois n'ont cependant pas pu être incluses ici. Cela peut surtout avoir un impact sur les résultats des territoires des CSSS frontaliers, en l'occurrence, le CSSS de Témiscaming-et-de-Kipawa et, dans une moindre mesure, le CSSS du Lac-Témiscamingue.

Taux pour 10 000 : Rapport pour une période donnée du nombre annuel moyen de cas d'hospitalisation en soins physiques de courte durée enregistrés chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée à la population totale du même territoire au milieu de la même période. À noter que le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2001 comme population de référence.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, années financières 2001-2002 à 2005-2006.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2003 révisées en février 2008.

Note : En raison de certaines modifications dans la méthode de calcul de l'indicateur, les données de la présente édition ne peuvent être comparées avec celles du Tableau de bord - Édition 2006.

9.5 Taux d'hospitalisation en courte durée selon le diagnostic principal (2001-2002 à 2005-2006)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
ENSEMBLE DES CAUSES									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	249	1 267	3 587	2 384	2 272	3 775	13 534	588 333
	Tx moy/an /10 000	788 	923 	948 	1 092 	990 	947 	970 	
	Tx réfé.	795	795	795	795	795	795	795	795
HOMMES	N moy/an	99	573	1 555	1 109	1 023	1 604	5 962	248 864
	Tx moy/an /10 000	720 	864 	869 	1 025 	950 	858 	899 	
	Tx réfé.	755	755	755	755	755	755	755	755
FEMMES	N moy/an	150	694	2 032	1 276	1 249	2 171	7 572	339 466
	Tx moy/an /10 000	875 	1 000 	1 034 	1 173 	1 062 	1 059 	1 058 	
	Tx réfé.	864	864	864	864	864	864	864	864
MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	53	262	719	441	348	628	2 451	106 786
	Tx moy/an /10 000	176 	186 	189 	192 	159 	166 	178 	
	Tx réfé.	144	144	144	144	144	144	144	144

9.5 Taux d'hospitalisation en courte durée selon le diagnostic principal (2001-2002 à 2005-2006)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE									
HOMMES	N moy/an	27	142	394	252	212	360	1 387	61 374
	Tx moy/an /10 000	194 	217 	224 	231 	210 	207 	216 	
	Tx réfé.	192	192	192	192	192	192	192	192
FEMMES	N moy/an	26	120	325	189	136	268	1 064	45 412
	Tx moy/an /10 000	156 	155 	156 	155 	116 	130 	142 	
	Tx réfé.	105	105	105	105	105	105	105	105
MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	20	143	375	246	194	457	1 435	66 185
	Tx moy/an /10 000	64 	103 	97 	111 	83 	111 	101 	
	Tx réfé.	89	89	89	89	89	89	89	89
HOMMES	N moy/an	8	76	182	122	87	215	690	31 869
	Tx moy/an /10 000	54 	112 	98 	112 	78 	109 	100 	
	Tx réfé.	94	94	94	94	94	94	94	94
FEMMES	N moy/an	12	67	192	124	107	242	745	34 316
	Tx moy/an /10 000	71 	95 	96 	110 	89 	115 	102 	
	Tx réfé.	87	87	87	87	87	87	87	87

9.5 Taux d'hospitalisation en courte durée selon le diagnostic principal (2001-2002 à 2005-2006)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	33	119	389	315	344	466	1 666	60 657
	Tx moy/an /10 000	106	84	104	141	151	118	120	
	Tx réfé.	82	82	82	82	82	82	82	82
HOMMES	N moy/an	13	67	212	173	202	253	921	31 974
	Tx moy/an /10 000	94	104	125	163	192	143	144	
	Tx réfé.	99	99	99	99	99	99	99	99
FEMMES	N moy/an	20	51	177	142	141	213	744	28 684
	Tx moy/an /10 000	115	68	89	124	117	102	101	
	Tx réfé.	71	71	71	71	71	71	71	71
TUMEURS									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	14	88	247	160	123	282	914	47 099
	Tx moy/an /10 000	44	63	64	68	55	71	65	
	Tx réfé.	64	64	64	64	64	64	64	64

9.5 Taux d'hospitalisation en courte durée selon le diagnostic principal (2001-2002 à 2005-2006)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec		
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or				
TUMEURS	HOMMES	N moy/an	9	47	130	98	66	148	497	24 336	
		Tx moy/an /10 000	67 	73 	73 	88 	63 	82 	76 		
		Tx réfé.	75	75	75	75	75	75	75	75	
	FEMMES	N moy/an	5	41	117	62	57	134	417	22 763	
		Tx moy/an /10 000	34 	56 	57 	52 	49 	64 	57 		
		Tx réfé.	56	56	56	56	56	56	56	56	
	TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS	SEXES RÉUNIS	N moy/an	16	133	269	188	190	288	1 085	56 105
			Tx moy/an /10 000	51 	96 	70 	86 	80 	71 	77 	
			Tx réfé.	76	76	76	76	76	76	76	76
HOMMES		N moy/an	8	76	149	111	125	168	636	28 635	
		Tx moy/an /10 000	51 	113 	80 	104 	102 	82 	90 		
		Tx réfé.	84	84	84	84	84	84	84	84	

9.5 Taux d'hospitalisation en courte durée selon le diagnostic principal (2001-2002 à 2005-2006)

TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming-et-Kipawa	Lac-Témiscamingue	Rouyn-Noranda	Aurores-Boréales	Les Eschers de l'Abitibi	Vallée-de-l'Or		
FEMMES	N moy/an	8	57	120	77	66	121	449	27 469
	Tx moy/an /10 000	49 	76 	58 	66 	55 	58 	60 	
	Tx réfé.	66	66	66	66	66	66	66	66

Légende

N moy/an	Nombre moyen par année
Tx moy/an/10 000	Taux moyen par année pour 10 000 personnes
Tx réfé.	Taux québécois de référence
*	Attention, estimation de qualité moyenne (coefficient de variation $\geq 16,6\%$ et $\leq 33,3\%$)
	Situation plus favorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)
	Situation comparable à celle de l'ensemble du Québec (pas de différence statistique significative)
	Situation plus défavorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)

9.6 Taux de mortalité selon la cause (2001 à 2005)

Définition : Nombre : Nombre annuel moyen de décès survenus chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée. Les décès retenus ici sont ceux attribuables à l'ensemble des causes, de même que ceux attribuables aux causes spécifiques suivantes : tumeurs malignes, maladies de l'appareil circulatoire, maladies de l'appareil respiratoire et traumatismes non intentionnels.

Taux pour 100 000 : Rapport pour une période donnée du nombre annuel moyen de décès pour une cause spécifique survenus chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée à la population totale du même territoire au milieu de la même période, multiplié par 100 000. À noter que le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2001 comme population de référence.

Pourcentage par rapport au total des causes : Nombre annuel moyen de décès, pour une cause spécifique, survenus chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée, rapporté au nombre annuel moyen de décès pour l'ensemble des causes de mortalité chez les résidents du même territoire à la même période, multiplié par 100.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des décès.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2003 révisées en février 2008.

9.6 Taux de mortalité selon la cause (2001 à 2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming-et-Kipawa	Lac-Témiscamingue	Rouyn-Noranda	Aurores-Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de-l'Or		
ENSEMBLE DES CAUSES									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	22	114	287	179	167	303	1 073	55 132
	Tx moy/an /100 000	719 	818 	785 	806 	831 	858 	817 	
	Tx réfé.	745	745	745	745	745	745	745	745
HOMMES	N moy/an	12	62	154	100	91	169	588	27 703
	Tx moy/an /100 000	891 	1 025 	984 	991 	1 038 	1 153 	1 034 	
	Tx réfé.	958	958	958	958	958	958	958	958
FEMMES	N moy/an	10	52	133	79	76	134	484	27 429
	Tx moy/an /100 000	576 	639 	636 	650 	677 	659 	649 	
	Tx réfé.	599	599	599	599	599	599	599	599
TUMEURS MALIGNES									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	7	35	96	54	45	99	336	17 592
	Tx moy/an /100 000	243 	249 	254 	233 	210 	267 	246 	
	Tx réfé.	238	238	238	238	238	238	238	238
	% / Tot. Causes	31,8	30,7	33,4	30,2	26,9	32,7	31,3	31,9

9.6 Taux de mortalité selon la cause (2001 à 2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
TUMEURS MALIGNES									
HOMMES	N moy/an	6	20	50	32	26	55	190	9 344
	Tx moy/an /100 000	435 *	326	307	307	284	353	318	
	Tx réfé.	309	309	309	309	309	309	309	309
	% / Tot. Causes	50,0	32,3	32,5	32,0	28,6	32,5	32,3	33,7
FEMMES	N moy/an	2	15	46	21	18	44	145	8 247
	Tx moy/an /100 000	110 **	190	221	175	158	212	195	
	Tx réfé.	193	193	193	193	193	193	193	193
	% / Tot. Causes	20,0	28,8	34,6	26,6	23,7	32,8	30,0	30,1
MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	6	32	78	51	48	85	299	15 836
	Tx moy/an /100 000	191 *	225	217	237	252	253	235	
	Tx réfé.	214	214	214	214	214	214	214	214
	% / Tot. Causes	27,3	28,1	27,2	28,5	28,7	28,1	27,9	28,7

9.6 Taux de mortalité selon la cause (2001 à 2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming-et-Kipawa	Lac-Témiscamingue	Rouyn-Noranda	Aurores-Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de-l'Or		
MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE									
HOMMES	N moy/an	3	16	42	26	25	46	157	7 803
	Tx moy/an /100 000	174 *	276	280	265	316	350	295	
	Tx réfé.	279	279	279	279	279	279	279	279
	% / Tot. Causes	25,0	25,8	27,3	26,0	27,5	27,2	26,7	28,2
FEMMES	N moy/an	3	15	36	25	23	39	142	8 033
	Tx moy/an /100 000	191 *	179	170	210	206	193	190	
	Tx réfé.	168	168	168	168	168	168	168	168
	% / Tot. Causes	30,0	28,8	27,1	31,6	30,3	29,1	29,3	29,3
MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	2	8	24	17	17	27	95	4 687
	Tx moy/an /100 000	74 *	57	67	78	90	78	74	
	Tx réfé.	63	63	63	63	63	63	63	63
	% / Tot. Causes	9,1	7,0	8,4	9,5	10,2	8,9	8,9	8,5

9.6 Taux de mortalité selon la cause (2001 à 2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming-et-Kipawa	Lac-Témiscamingue	Rouyn-Noranda	Aurores-Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de-l'Or		
MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE									
HOMMES	N moy/an	1	5	14	9	9	16	53	2 441
	Tx moy/an /100 000	60 **	89 *	97	98	115	116	103	
	Tx réfé.	93	93	93	93	93	93	93	93
	% / Tot. Causes	8,3	8,1	9,1	9,0	9,9	9,5	9,0	8,8
FEMMES	N moy/an	1	3	10	8	8	11	42	2 246
	Tx moy/an /100 000	86 **	30 *	48	65	74	55	56	
	Tx réfé.	48	48	48	48	48	48	48	48
	% / Tot. Causes	10,0	5,8	7,5	10,1	10,5	8,2	8,7	8,2
TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS									
SEXES RÉUNIS	N moy/an	1	7	15	8	12	16	60	2 006
	Tx moy/an /100 000	40 **	52 *	43	38	54	42	45	
	Tx réfé.	27	27	27	27	27	27	27	27
	% / Tot. Causes	4,5	6,1	5,2	4,5	7,2	5,3	5,6	3,6

9.6 Taux de mortalité selon la cause (2001 à 2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec	
		Témiscaming-et-Kipawa	Lac-Témiscamingue	Rouyn-Noranda	Aurores-Boréales	Les Eschers de l'Abitibi	Vallée-de-l'Or			
TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS	HOMMES	N moy/an	1	4	9	5	8	11	37	1 185
		Tx moy/an /100 000	51 **	59 *	52 ◆	45 *	71 ◆	62 ◆	58 ◆	
		Tx réfé.	37	37	37	37	37	37	37	37
		% / Tot. Causes	8,3	6,5	5,8	5,0	8,8	6,5	6,3	4,3
	FEMMES	N moy/an	0,4	3	7	4	4	5	23	820
		Tx moy/an /100 000	24 **	41 *	32 *	32 *	38 *	24 *	32 ◆	
		Tx réfé.	18	18	18	18	18	18	18	18
		% / Tot. Causes	4,0	5,8	5,3	5,1	5,3	3,7	4,8	3,0

Légende

N moy/an	Nombre annuel moyen
Tx moy/an/100 000	Taux annuel moyen pour 100 000 personnes
Tx réfé.	Taux québécois de référence
%	Total des causes – Pourcentage par rapport au total des causes
*	Attention, estimation de qualité moyenne (coefficient de variation $\geq 16,6\%$ et $\leq 33,3\%$)
**	Estimation peu fiable en raison de la trop grande variabilité du taux (coefficient de variation $> 33,3\%$)
■	Situation comparable à celle de l'ensemble du Québec (pas de différence statistique significative)
◆	Situation plus défavorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)



10. Santé mentale

10.1 Population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale (2005)

Définition : Proportion : Proportion du nombre de personnes à domicile, âgées de 12 ans et plus, considérant leur santé mentale passable ou mauvaise au moment de l'enquête, par rapport à l'ensemble de la population à domicile, âgée de 12 ans et plus.

Nombre estimé : Application du taux régional à la population âgée de 12 ans et plus de chacun des territoires de CSSS pour obtenir un nombre estimé de personnes par territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la centaine la plus proche.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2005 (cycle 3.1). Traitement des données réalisé par l'infocentre de santé publique du Québec.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2007 produites en février 2008.

Note : Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire l'ensemble du Québec excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le tableau se rapportent bien à l'ensemble du Québec.

10.1 Population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale (2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4 *	4
	N ^e	100	500	1 400	700	800	1 500	4 600	233 000
HOMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3 *	3
	N ^e	0	200	500	300	300	600	1 800	105 300
FEMMES - 12 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5 *	4
	N ^e	100	300	900	500	500	900	2 800	127 600

Légende

%	Pourcentage
N ^e	Nombre estimé
n.d.	Donnée non disponible
*	Attention, estimation de qualité moyenne (coefficient de variation $\geq 16,6\%$ et $\leq 33,3\%$)

10.2 Population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé (2007)

Définition : Proportion : Proportion de personnes à domicile, âgées de 15 ans et plus, ayant déclaré que la plupart des journées de leur vie étaient assez ou extrêmement stressantes par rapport à l'ensemble de la population à domicile âgée de 15 ans et plus.

Nombre estimé : Application du taux régional à la population âgée de 12 ans et plus de chacun des territoires de CSSS pour obtenir un nombre estimé par territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la centaine la plus proche.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2007 (cycle 4.1), Tableau 13-018 XWF.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2007 produites en février 2008.


Note : Les données présentées ici sont issues des tableaux diffusés par Statistique Canada (fichier-maître) sur son site Web.

10.2 Population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé (2007)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eschers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS - 15 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	26 	26
	N ^e	800	2 800	8 500	4 500	5 200	9 300	29 800	1 664 100
HOMMES - 15 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	24 	26
	N ^e	400	1 300	3 900	2 100	2 400	4 300	13 900	800 200
FEMMES - 15 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	28 	27
	N ^e	400	1 500	4 600	2 400	2 800	4 900	15 900	863 900

Légende

%	Pourcentage
N ^e	Nombre estimé
n.d.	Donnée non disponible
	Situation comparable à celle de l'ensemble du Québec (aucune différence statistique significative)



10.3 Population de 15 ans et plus ayant souffert d'un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois (2002)

Définition : Proportion : Proportion du nombre de personnes à domicile, âgées de 15 ans et plus, ayant souffert d'un épisode dépressif majeur au cours des 12 mois précédant l'enquête par rapport à l'ensemble de la population à domicile, âgée de 15 ans et plus. Un épisode dépressif majeur se caractérise par au moins une période de deux semaines ou plus durant lesquelles persiste une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir pour presque toutes les activités normales, associée à des symptômes tels qu'une réduction de l'énergie, un changement du sommeil et de l'appétit, des difficultés à se concentrer et un sentiment de culpabilité, de désespoir ou des idées suicidaires.

Nombre estimé : Application du taux provincial à la population âgée de 15 ans et plus de la région et de chacun des territoires de réseaux locaux pour obtenir un nombre estimé de personnes par territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la dizaine la plus proche.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2002 (cycle 1.2).


Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2007 produites en février 2008.

10.3 Population de 15 ans et plus ayant souffert d'un épisode dépressif majeur au cours des 12 derniers mois (2002)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS – 15 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	5
	N ^e	140	530	1 580	840	960	1 720	5 770	292 046
HOMMES – 15 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4
	N ^e	50	200	590	320	360	650	2 180	107 713
FEMMES – 15 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	6
	N ^e	90	320	1 000	520	600	1 060	3 590	184 333

Légende

N ^e	Nombre estimé
%	Pourcentage
n.d.	Donnée non disponible



10.4 Population de 15 ans et plus ayant souffert de trouble panique au cours des 12 derniers mois (2002)

Définition : Proportion : Proportion du nombre de personnes à domicile, âgées de 15 ans et plus, ayant souffert de trouble panique au cours des 12 mois précédant l'enquête par rapport à l'ensemble de la population à domicile, âgée de 15 ans et plus. Un trouble panique se caractérise par des attaques récurrentes et inattendues de crainte intense et d'anxiété où au moins une des attaques a été suivie d'une période d'un mois ou plus de préoccupations ou d'inquiétudes persistantes de subir une nouvelle attaque, ou encore la manifestation de symptômes physiologiques comme des palpitations, une douleur à la poitrine, une sensation d'étouffement ou d'étranglement, une sensation de vertige, de la transpiration, des nausées ou une gêne abdominale, des tremblements ou des bouffées de chaleur et des frissons.

Nombre estimé : Application du taux provincial à la population âgée de 15 ans et plus de la région et de chacun des territoires de réseaux locaux pour obtenir un nombre estimé de personnes par territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la dizaine la plus proche.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2002 (cycle 1.2).


Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2007 produites en février 2008.

10.4 Population de 15 ans et plus ayant souffert de trouble panique au cours des 12 derniers mois (2002)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS – 15 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1
	N ^e	40	150	460	250	280	500	1 680	83 139

Légende

N ^e	Nombre estimé
%	Pourcentage
n.d.	Donnée non disponible



10.5 Population de 15 ans et plus ayant souffert de phobie sociale (trouble d'anxiété sociale) au cours des 12 derniers mois (2002)

Définition : Proportion : Proportion du nombre de personnes à domicile, âgées de 15 ans et plus, ayant souffert de phobie sociale (trouble d'anxiété sociale) au cours des 12 mois précédant l'enquête par rapport à l'ensemble de la population à domicile, âgée de 15 ans et plus. La phobie sociale (trouble d'anxiété sociale) se caractérise par une peur persistante, irrationnelle, de situations sociales ou de performance durant lesquelles la personne pourrait être observée attentivement et jugée par autrui, comme prendre la parole en public, manger ou travailler. La personne reconnaît le caractère excessif ou irraisonné de la peur. L'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse dans la ou les situations redoutées perturbent de façon importante les activités quotidiennes de la personne.


Nombre estimé : Application du taux provincial à la population âgée de 15 ans et plus de la région et de chacun des territoires de réseaux locaux pour obtenir un nombre estimé de personnes par territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la dizaine la plus proche.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2002 (cycle 1.2).

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2007 produites en février 2008.

10.5 Population de 15 ans et plus ayant souffert de phobie sociale (trouble d'anxiété sociale) au cours des 12 derniers mois (2002)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS – 15 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2
	N ^e	60	220	660	350	400	710	2 410	120 137
HOMMES – 15 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2
	N ^e	30	100	290	160	180	330	1 090	52 935
FEMMES – 15 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2
	N ^e	30	120	370	190	220	390	1 320	67 202
Légende N ^e Nombre estimé % Pourcentage n.d. Donnée non disponible									



10.6 Population de 15 ans et plus ayant présenté une dépendance à l'alcool au cours des 12 derniers mois (2002)

Définition : Proportion : Proportion du nombre de personnes à domicile, âgées de 15 ans et plus, ayant présenté une dépendance à l'alcool au cours des 12 mois précédant l'enquête par rapport à l'ensemble de la population à domicile, âgée de 15 ans et plus. La dépendance probable à l'alcool a été établie à partir d'une classification fondée sur un ensemble de questions portant sur la tolérance à l'alcool (comme le besoin de consommer plus pour sentir les effets), le sevrage, la perte de contrôle et les problèmes sociaux ou physiques associés à la consommation d'alcool dans la vie quotidienne. Les renseignements recueillis sur la dépendance brossent un tableau des comportements de consommation d'alcool entraînant une déficience ou une détresse cliniquement significative.

Nombre estimé : Application du taux provincial à la population âgée de 15 ans et plus de la région et de chacun des territoires de réseaux locaux pour obtenir un nombre estimé de personnes par territoire. À noter que ces estimations sont arrondies à la dizaine la plus proche.

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2002 (cycle 1.2).


Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2007 produites en février 2008.

10.6 Population de 15 ans et plus ayant présenté une dépendance à l'alcool au cours des 12 derniers mois (2002)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS – 15 ANS ET PLUS	%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2
	N ^e	60	210	630	330	380	680	2 290	116 363

Légende

N ^e	Nombre estimé
%	Pourcentage
n.d.	Donnée non disponible



10.7 Taux d'hospitalisation pour troubles mentaux (2001-2002 à 2005-2006)

Définition : Nombre : Nombre annuel moyen de cas d'hospitalisation dont le diagnostic principal fait partie de la catégorie des troubles mentaux. Cela inclut les hospitalisations pour soins d'un jour, de même que les hospitalisations dont la durée de séjour ne dépasse pas 6 mois (182 jours), enregistrés chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée, peu importe le lieu des hospitalisations au Québec. Les hospitalisations hors Québec de résidents québécois n'ont pas pu être incluses ici. Cela pourrait surtout avoir un impact sur les résultats des territoires des CSSS frontaliers, en l'occurrence, le CSSS de Témiscaming-et-de-Kipawa et, dans une moindre mesure, le CSSS du Lac-Témiscamingue.

Taux pour 10 000 : Rapport pour une période donnée du nombre annuel moyen de cas d'hospitalisation pour troubles mentaux enregistrés chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée à la population totale du même territoire au milieu de la même période multiplié par 10 000. À noter que le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2001 comme population de référence.

Durée moyenne de séjour : Moyenne de la durée de séjour, en nombre de jours, d'une hospitalisation pour troubles mentaux dans un territoire donné au cours d'une période donnée.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, années financières 2001-2002 à 2005-2006.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2003 révisées en février 2008.

Notes : L'indicateur ne comprend pas tous les diagnostics rattachés à la grande catégorie des troubles mentaux mais cible ceux qui sont plus spécifiques à la santé mentale, soit :

- les psychoses non organiques (code 295 à 299 de la 9^e Classification internationale des maladies);
- les troubles névrotiques (code 300);
- les troubles de la personnalité (code 301);
- les autres troubles non psychotiques dont les déviations et troubles sexuels (code 302);
- les troubles du fonctionnement physiologique d'origine psychique (code 306);
- les troubles spéciaux non classés ailleurs (code 307) (anorexie mentale, tics, etc.);
- les états réactionnels aigus (code 308);
- les troubles de l'adaptation (code 309);
- les troubles dépressifs non classés ailleurs (code 311);
- les troubles de la conduite non classés ailleurs (code 312);
- les troubles de l'affectivité spécifiques de l'enfance et de l'adolescence (code 313);
- et l'instabilité de l'enfance (code 314).


La pratique médicale pouvant différer d'un établissement à l'autre et influencer grandement la durée et le nombre des hospitalisations, aucune comparaison n'est effectuée entre les différents territoires et l'ensemble du Québec. Cela a pour but d'éviter d'associer un nombre élevé d'hospitalisations à une morbidité accrue.

10.7 Taux d'hospitalisation pour troubles mentaux (2001-2002 à 2005-2006)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eskers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS	N moy/an	14	60	276	210	215	206	981	34 250
	Tx moy/an /10 000	41	44	71	98	89	49	68	46
	Séjour moyen	10	13	15	12	7	21	14	21
HOMMES	N moy/an	5	33	147	107	118	98	507	15 528
	Tx moy/an /10 000	31 *	48	77	100	96	46	70	42
	Séjour moyen	11	13	14	12	7	21	13	21
FEMMES	N moy/an	9	28	129	103	97	109	474	18 721
	Tx moy/an /10 000	52	41	65	96	81	51	66	49
	Séjour moyen	10	14	16	12	8	22	14	21

Légende

N moy/an	Nombre moyen par année
Tx moy/an/10 000	Taux moyen par année pour 10 000 personnes
Séjour moyen	Durée moyenne, en jours, d'une hospitalisation
*	Attention, estimation de qualité moyenne (coefficient de variation $\geq 16,6\%$ et $\leq 33,3\%$)



10.8 Taux de mortalité par suicide (2001 à 2005)

Définition : Nombre : Nombre annuel moyen de décès par suicide survenus chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée.

Taux pour 100 000 : Rapport pour une période donnée du nombre annuel moyen de décès par suicide survenus chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée à la population totale du même territoire au milieu de la même période, multiplié par 100 000. À noter que le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2001 comme population de référence.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des décès.


Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2003 révisées en février 2008.

10.8 Taux de mortalité par suicide (2001-2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamingue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Eschers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS	N moy/an	0,4	2	8	6	7	11	34	1 233
	Tx moy/an /100 000	10 **	15 *	20 ■	28 *	31 *	25 ◆	24 ◆	
	Tx réfé.	17	17	17	17	17	17	17	17
HOMMES	N moy/an	0,4	2	7	5	6	8	28	958
	Tx moy/an /100 000	17 **	27 **	36 *	44 *	47 *	38 ◆	38 ◆	
	Tx réfé.	26	26	26	26	26	26	26	26
FEMMES	N moy/an	0,0	0,2	1	1	2	2	7	275
	Tx moy/an /100 000	0	3 **	4 **	12 **	15 **	11 *	9 *	
	Tx réfé.	7	7	7	7	7	7	7	7

Légende

N moy/an	Nombre annuel moyen
Tx moy/an/100 000	Taux annuel moyen pour 100 000 personnes
Tx réfé.	Taux québécois de référence
*	Attention, estimation de qualité moyenne (coefficient de variation $\geq 16,6\%$ et $\leq 33,3\%$)
**	Estimation peu fiable en raison de la trop grande variabilité du taux (coefficient de variation $> 33,3\%$)
■	Situation plus favorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)
■	Situation comparable à celle de l'ensemble du Québec (pas de différence statistique significative)
◆	Situation plus défavorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)



10.9 Taux des années potentielles de vie perdues pour suicide (2001 à 2005)

Définition : Taux pour 100 000 : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen des années de vie perdues pour des décès par suicide, survenus avant l'âge de 75 ans, chez les résidents d'un territoire donné au cours d'une période donnée, à la population totale du même territoire au milieu de la même période, multiplié par 100 000. À noter que le taux est ensuite ajusté selon la méthode de standardisation directe avec la population du Québec de 2001 comme population de référence.

Sources : Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, fichier des décès.

Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec, estimations démographiques pour l'année 2003 révisées en février 2008.

10.9 Taux des années potentielles de vie perdues pour suicide (2001 à 2005)

	Unité	CSSS						Région A-T	Québec
		Témiscaming- et-Kipawa	Lac- Témiscamin- gue	Rouyn- Noranda	Aurores- Boréales	Les Esquers de l'Abitibi	Vallée-de- l'Or		
SEXES RÉUNIS	Tx moy/an /100 000	390 **	399 **	601 *	861 *	1 038 ◆	841 ■	763 ◆	549
	Tx réfé.	549	549	549	549	549	549	549	
HOMMES	Tx moy/an /100 000	700 **	709 **	1 059 *	1 296 *	1 352 *	1 332 *	1 188 ◆	853
	Tx réfé.	853	853	853	853	853	853	853	
FEMMES	Tx moy/an /100 000	0	83 **	146 **	394 **	699 **	325 **	325 *	243
	Tx réfé.	243	243	243	243	243	243	243	

Légende

Tx moy/an/100 000 Taux annuel moyen pour 100 000 personnes

Tx réfé. Taux québécois de référence

* Attention, estimation de qualité moyenne (coefficient de variation $\geq 16,6\%$ et $\leq 33,3\%$)

** Estimation peu fiable en raison de la trop grande variabilité du taux (coefficient de variation $\geq 33,3\%$)

■ Situation comparable à celle de l'ensemble du Québec (aucune différence statistique significative)

◆ Situation plus défavorable que celle de l'ensemble du Québec (différence statistique significative)