

BILAN DE L'ASSURANCE RÉCOLTE 2009

RÉGION ADMINISTRATIVE DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Publié par La Financière agricole du Québec

Juillet 2009

Dans la région administrative de la Chaudière-Appalaches, les conditions climatiques du début de la saison 2009 ont été généralement favorables à la production agricole. Du gel hivernal a cependant endommagé les plantes fourragères. Des pertes hivernales dans les ruches ont également été enregistrées. La saison a débuté par une récolte de sirop d'érable aux rendements supérieurs à la moyenne et à la qualité variant de moyenne à supérieure. L'ensemencement et la levée des cultures annuelles se sont déroulés dans de bonnes conditions, mais la croissance a été ralentie par le temps frais de mai jusqu'à la mi-juin. Les conditions climatiques ont été favorables au déroulement de la première fauche de foin jusqu'au 24 juin; les rendements s'annoncent inférieurs à la moyenne mais de bonne qualité. Quant aux rendements des cultures annuelles, des pommes et de la première miellée, ils s'annoncent autour des moyennes et plutôt variables pour les petits fruits selon les secteurs. Il s'agit somme toute d'un assez bon début de saison, malgré le manque de chaleur.

En détail

Grâce à des conditions hivernales favorables, la survie à l'hiver des pommiers et des plants de petits fruits a été bonne. Il y a eu une bonne couverture de neige dans l'ensemble de la région. Toutefois, à la fin de décembre et au milieu de février, les redoux accompagnés de pluie ont nui aux plantes pérennes. Ainsi, des dommages d'intensité variable, dus au gel du sol, ont été observés dans les légumineuses. Les producteurs de miel ont subi des pertes importantes lors de l'hivernement, qui sont dues à plusieurs facteurs, dont la présence du varroa.

La production de sirop d'érable a débuté lentement, en mars; par la suite, le maintien des écarts de températures entre le jour et la nuit, et le temps souvent ensoleillé en avril, ont favorisé la coulée des érables.

Les rendements ont été supérieurs à la moyenne, et la qualité a été de moyenne à supérieure à celle-ci.

L'ensemencement des céréales, du canola, du maïs et du soya a été réalisé rapidement dans des conditions favorables. En effet, la neige a fondu à la fin de mars et les premiers semis ont été réalisés dès la fin d'avril. Les travaux se sont terminés dans la période habituelle ou en avance de quelques jours à une semaine. La plantation des pommes de terre et l'ensemencement des cultures maraîchères ont également été réalisés dans de bonnes conditions.

La pluie, bien que peu fréquente mais suffisante, a permis la germination et la levée uniforme des plantes, mais le temps frais de mai jusqu'à la mi-juin a quelque peu retardé leur croissance. Par ailleurs, dans différentes cultures, on a observé des dommages causés par la tipule des prairies; toutefois les dommages sont généralement moins élevés que ceux enregistrés en 2008. À partir du 25 juin, les conditions humides ont permis d'accroître le développement des cultures. Par contre, les semis les plus tardifs sont affectés par l'excès de pluie de la fin de juin, et on remarque du jaunissement à la suite de l'asphyxie des racines, plus particulièrement dans les sols lourds. De plus, dans le secteur sud de la Chaudière-Appalaches, quelques champs de foin et de maïs fourrager ont été endommagés par une crue des eaux le 3 juillet. On a observé une bonne floraison des pommiers, mais des conditions variables pour la production de la première miellée.

Malgré un début de saison favorable au développement des plantes fourragères, le temps frais en mai et jusqu'à la mi-juin a retardé leur croissance. Les conditions climatiques ont été favorables à la récolte du foin jusqu'au 24 juin. Au 22 juin, entre 40 et 60 % des superficies étaient récoltées. À partir du 25 juin, les pluies fréquentes et abondantes ont arrêté la fenaison. En date du 6 juillet,

entre 50 et 85 % de la récolte était terminée. Les rendements de la première fauche s'annoncent inférieurs à la moyenne mais de bonne qualité.

La cueillette des fraises, qui a débuté avec un léger retard par rapport à la période habituelle, était réalisée dans une proportion de 15 % le 6 juillet. Les rendements prévus pour les céréales, le canola, le maïs et le soya s'annoncent autour des moyennes. On s'attend aussi à des rendements autour des moyennes pour, les pommes, les pommes de terre, les légumes et la première miellée. Quant aux fraises les rendements s'avèrent variables selon les secteurs. Il s'agit somme toute d'un assez bon début de saison, malgré le manque de chaleur.

DIRECTION DE L'INTÉGRATION DES PROGRAMMES,
EN COLLABORATION AVEC LES CENTRES DE SERVICES
DE LÉVIS, DE SAINTE-MARIE ET DE SAINT-GEORGES

1 800 749-3646
www.fadq.qc.ca