



MARS 2011

# LANAUDIÈRE ET SES RLS

Un aperçu des indicateurs de l'Enquête  
québécoise sur la santé de la population, 2008

Service de surveillance, recherche et évaluation  
DSPE de Lanaudière





# LANAUDIÈRE ET SES RLS

Un aperçu des indicateurs de l'Enquête  
québécoise sur la santé de la population, 2008

### Conception et traitement des données

Geneviève Marquis  
Josée Payette  
Techniciennes en recherche psychosociale

### Comité de lecture

Christine Garand  
Abdoul Aziz Gbaya  
André Guillemette  
Louise Lemire  
Marie-Eve Simoneau

### Sous la coordination de

Élizabeth Cadieux

### Conception graphique

Micheline Clermont  
Josée Payette

### Mise en page

Micheline Clermont  
Sylvie Harvey

La version PDF de ce document est disponible sur le site Web de l'Agence au : [www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA](http://www.agencelanaudiere.qc.ca/SYLIA) sous l'onglet *Nos publications*.

À la condition d'en mentionner la source, sa reproduction à des fins non commerciales est autorisée. Toute information extraite de ce document devra porter la source suivante :

MARQUIS, Geneviève, et Josée PAYETTE. *Lanaudière et ses RLS. Un aperçu des indicateurs de l'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008*, Joliette, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Direction de santé publique et d'évaluation, Service de surveillance, recherche et évaluation, mars 2011, 109 pages.

Dépôt légal  
Premier trimestre 2011  
ISBN : 978-2-89669-048-0 (version imprimée)  
978-2-89669-049-7 (version PDF)  
Bibliothèque et Archives du Canada  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

# TABLE DES MATIÈRES

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AVANT-PROPOS .....                                                                                    | 7         |
| CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION .....                                                               | 14        |
| COMMENT LIRE LES DONNÉES .....                                                                        | 19        |
| <br>► BLESSURES ET TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES                                                      |           |
| Blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois .....                  | 22        |
| Blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois .....                                       | 24        |
| Troubles musculosquelettiques au cours des 12 derniers mois .....                                     | 26        |
| Troubles musculosquelettiques liés au travail actuel ou antérieur au cours des 12 derniers mois ..... | 27        |
| <br>► COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES                                                       |           |
| Test de Pap au cours d'une période de moins de trois ans .....                                        | 30        |
| Test de Pap au cours d'une période de moins d'un an .....                                             | 31        |
| Contraception hormonale combinée .....                                                                | 32        |
| Contraception hormonale combinée chez les femmes qui fument la cigarette .....                        | 33        |
| <br>► COMPORTEMENTS SEXUELS ET USAGE DE LA CONTRACEPTION                                              |           |
| Population active sexuellement au cours des 12 derniers mois .....                                    | 36        |
| Femmes actives sexuellement ayant utilisé un moyen contraceptif au cours des 12 derniers mois .....   | 38        |
| ► Usage du condom comme moyen contraceptif .....                                                      | 39        |
| ► Usage de la pilule comme moyen contraceptif .....                                                   | 40        |
| Diagnostic d'infection transmise sexuellement .....                                                   | 41        |
| Hommes actifs sexuellement ayant utilisé un moyen contraceptif au cours des 12 derniers mois .....    | 42        |
| ► Usage du condom comme moyen contraceptif .....                                                      | 44        |
| ► Usage de la pilule comme moyen contraceptif .....                                                   | 46        |
| Population ayant toujours utilisé le condom au cours des 12 derniers mois .....                       | 48        |
| <br>► CONSOMMATION DE DROGUES                                                                         |           |
| Consommation de drogues au cours de la vie .....                                                      | 52        |
| Consommation de cannabis au cours de la vie .....                                                     | 54        |
| Consommation de cocaïne au cours de la vie .....                                                      | 56        |
| Consommation d'amphétamines au cours de la vie .....                                                  | 58        |
| Consommation de drogues au cours des 12 derniers mois .....                                           | 60        |
| <i>Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois .....</i>                                   | <i>62</i> |

|                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ► ÉTAT DE SANTÉ                                                                                                                                 |     |
| Perception négative de son état de santé .....                                                                                                  | 66  |
| ► SITUATION FINANCIÈRE                                                                                                                          |     |
| Perception négative de sa situation financière .....                                                                                            | 70  |
| ► TENSION ARTÉRIELLE                                                                                                                            |     |
| Prise de la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin .....                                                              | 74  |
| Prise de la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin<br>parmi ceux qui ont consulté au cours de la dernière année ..... | 75  |
| ► RHINITE ALLERGIQUE ET HERBE À POUX                                                                                                            |     |
| Diagnostic de rhinite allergique .....                                                                                                          | 78  |
| Symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois<br>parmi les personnes ayant déjà reçu un diagnostic .....                        | 80  |
| Diagnostic d'allergie à l'herbe à poux .....                                                                                                    | 82  |
| ► SANTÉ BUCCODENTAIRE                                                                                                                           |     |
| Perception de sa santé buccodentaire .....                                                                                                      | 86  |
| Édentation .....                                                                                                                                | 88  |
| Brossage de dents ou de prothèses dentaires .....                                                                                               | 90  |
| Utilisation de la soie dentaire .....                                                                                                           | 92  |
| ► SANTÉ MENTALE                                                                                                                                 |     |
| Insatisfaction à l'égard de sa vie sociale .....                                                                                                | 96  |
| Niveau élevé de détresse psychologique .....                                                                                                    | 98  |
| Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie .....                                                                                            | 100 |
| Tentative de suicide au cours de la vie .....                                                                                                   | 101 |
| ► STATUT PONDÉRAL                                                                                                                               |     |
| Perception d'un excès de poids .....                                                                                                            | 104 |
| Tentative de perdre du poids .....                                                                                                              | 106 |
| Surplus de poids .....                                                                                                                          | 108 |
| RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES .....                                                                                                               | 109 |



## AVANT-PROPOS

Les enquêtes sociosanitaires constituent une source d'information complémentaire aux données fournies par les banques de données administratives. Elles contribuent à éclairer la prise de décision liée au processus de planification et permettent d'apprécier l'état de santé de la population et des déterminants qui lui sont associés. À bien des égards, elles sont même les seules sources disponibles.

### Mise en contexte

En 2008, dix ans se sont écoulés depuis la parution des trois enquêtes sur la santé et le bien-être des Québécois réalisées par Santé Québec (*l'Enquête Santé Québec 1987*, *l'Enquête sociale et de santé 1992-1993* et *l'Enquête sociale et de santé 1998*). L'Institut de la statistique du Québec (ISQ), en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) renoue avec les enquêtes générales de santé en lançant la première édition d'une nouvelle enquête : *l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008*.

L'EQSP 2008 s'inscrit parmi une « nouvelle génération d'enquêtes planifiées à des fins de surveillance » (Traoré, Camirand et Baulne, 2010, p. 3) au *Plan ministériel d'enquêtes sociales et de santé - volet État de santé* élaboré en 2006 pour répondre aux besoins d'information du MSSS et du réseau de la santé et des services sociaux. En complément à d'autres enquêtes, notamment *l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)* de Statistique Canada, l'EQSP 2008 est une enquête transversale à portée régionale. Elle devrait être reprise à tous les cinq ans.

## Objectifs de l'enquête et thèmes étudiés

L'objectif général de l'EQSP 2008 est de dresser un portrait de santé de la population par la collecte, l'analyse et l'interprétation de données, avec une représentativité régionale. Il s'agit de :

- ▶ combler certains besoins d'information prioritaire à l'échelle du Québec et de ses régions sur l'état de santé de la population et ses déterminants, dont la meilleure source est l'enquête;
- ▶ suivre l'évolution temporelle, au sein de la population, de certains problèmes spécifiques de santé et leurs déterminants (en assurant la récurrence de l'enquête);
- ▶ informer la population sur son état de santé.

Plus spécifiquement, l'enquête vise à :

- ▶ recueillir de l'information sur les indicateurs non couverts ou mal documentés au niveau régional par les sources de données existantes. Le contenu du questionnaire aborde les grandes thématiques suivantes :
  - ▶ profil sociodémographique (15 questions)
  - ▶ santé générale et allergies (16)
  - ▶ poids et perception de son apparence physique (33)
  - ▶ hygiène et santé buccodentaire (5)
  - ▶ blessures (16)
  - ▶ santé au travail (29)
  - ▶ troubles musculosquelettiques (13)
  - ▶ bien-être et santé mentale (7)
  - ▶ tendances suicidaires (6)
  - ▶ habitudes de vie (tabac, drogues, sexualité) (36)
  - ▶ développement socio-émotionnel des enfants de 3 à 14 ans (34).

## Aspects méthodologiques... en bref

### Population cible

La population visée par l'EQSP 2008 est composée de l'ensemble des personnes âgées de 15 ans et plus vivant dans un ménage privé au Québec<sup>1</sup>. N'en font pas partie les personnes vivant dans un ménage collectif (ex. : centre hospitalier, CHSLD, maison de retraités, pénitencier) et les personnes vivant dans une réserve amérindienne. L'enquête couvre 16 des 18 régions sociosanitaires (RSS) du Québec<sup>2</sup>.

La collecte de données s'est déroulée du 13 février 2008 au 15 mars 2009. Au terme de celle-ci, 38 154 entrevues ont été réalisées, réparties en cinq périodes de collecte, pour tenir compte d'éventuelles variations saisonnières.

### Taux de réponse

Le nombre de répondants attendus par l'EQSP 2008 a été fixé à 2 011 pour chaque région sociosanitaire couverte par l'enquête. La taille de l'échantillon et sa répartition ont été fixées de façon à fournir des estimations fiables et précises.

Bien que le taux de réponse obtenu pour l'ensemble du Québec (58 %) soit un peu inférieur à ce qui était attendu, le taux visé par région (un minimum de 60 %, tout en espérant 65 %) est atteint pour la grande majorité de celle-ci. Les taux régionaux oscillent entre 60 % et 67 %, à l'exception des régions de Montréal et de Laval ayant obtenu des taux de 47 % et de 54 %. Quant à celui de Lanaudière, il est de 63 %.

---

<sup>1</sup> Dans le cas où le répondant est le parent d'au moins un enfant de 3 à 14 ans habitant dans le ménage, une sélection aléatoire d'un de ses enfants a été effectuée afin que le parent réponde à des questions sur le développement psychosocial de son enfant. Pour toute information sur les aspects méthodologiques, le lecteur est invité à consulter le chapitre *Aspects méthodologiques* du rapport de l'enquête (Camirand et autres, 2010).

<sup>2</sup> Les régions 17 (Nunavik) et 18 (Terres-Cries-de-la-Baie-James) ont été exclues.

## *À propos de la représentativité de Lanaudière... une première*

Compte tenu de certains besoins régionaux, l'ISQ et le MSSS ont offert aux directions régionales de santé publique l'opportunité d'acheter des unités d'échantillons additionnelles afin de permettre l'obtention d'estimations fiables à l'échelle des réseaux locaux de services (RLS).

La Direction de santé publique et d'évaluation (DSPE) de Lanaudière s'est prévaluée de cette possibilité. La répartition prévue de l'échantillon régional permettait d'emblée l'atteinte des objectifs de précision infrarégionaux en raison du nombre de RLS dans la région, soit deux. Il a alors été demandé à l'ISQ que la méthodologie développée pour la région assure la production d'estimations fiables à l'échelle locale<sup>3</sup>.

## *Présentation de données à l'échelle locale*

Ce document, sous forme de recueil statistique, expose les premiers résultats de l'EQSP 2008 pour la région de Lanaudière mettant en évidence les deux territoires de RLS. Il a été conçu afin de produire des informations locales fiables sur l'état de santé des Lanaudoises et des Lanaudois et ses déterminants. Il vise à donner un aperçu des résultats et à illustrer le potentiel d'analyse des données de cette enquête. Au cours des prochains mois, des rapports proposant des analyses descriptives sur certaines problématiques seront produits.

Le présent document ne couvre pas toutes les thématiques de l'enquête. Douze thèmes sont présentés. Sauf indication contraire, la majorité des indicateurs liés à ces derniers concernent la population de 15 ans et plus. Ils ont été croisés selon le sexe et l'âge et sont présentés par territoire de RLS, pour Lanaudière et le reste du Québec. Pour en savoir davantage sur chaque indicateur, le lecteur est invité à consulter le SYstème Lanaudois d'Information et d'Analyse (SYLIA) sur le site Web de l'Agence au : [www.agencelanaudiere.qc.ca/Sylia](http://www.agencelanaudiere.qc.ca/Sylia) sous l'onglet Statistiques. Il y trouvera une fiche qui présente une description détaillée de chaque indicateur.

---

<sup>3</sup> Le nombre de répondants est de 1 094 pour le RLS de Lanaudière-Nord et de 976 pour le RLS de Lanaudière-Sud pour des taux de réponse de 64 % et de 62 % respectivement.

## *Utilité de l'outil*

Nous souhaitons que les données présentées puissent soutenir les gestionnaires et les intervenants dans leur responsabilité populationnelle. Grâce aux informations contenues dans ce document, ils pourront être mieux informés sur l'état de santé de leur population, cibler les phénomènes préoccupants ou en émergence, et finalement, mieux comprendre l'importance des déterminants qui influencent la santé de leur population.

Finalement, nous espérons vivement que les données de l'EQSP 2008 contribueront à soutenir la mise en œuvre des plans d'action en santé publique, tant à l'échelle régionale que locale.



## CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION

# Caractéristiques de la population

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

## Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                                                         | RLS de Lanaudière-Nord          |      | RLS de Lanaudière-Sud           |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|
|                                                         | Population estimée <sup>1</sup> | %    | Population estimée <sup>1</sup> | %    |
| <b>Sexe</b>                                             |                                 |      |                                 |      |
| Hommes                                                  | 82 000                          | 50,6 | 102 300                         | 49,8 |
| Femmes                                                  | 80 100                          | 49,4 | 103 100                         | 50,2 |
| <b>Groupe d'âge</b>                                     |                                 |      |                                 |      |
| 15-24 ans                                               | 23 200                          | 14,3 | 35 300                          | 17,2 |
| 25-44 ans                                               | 48 000                          | 29,6 | 72 500                          | 35,3 |
| 45-64 ans                                               | 62 400                          | 38,5 | 73 600                          | 35,9 |
| 65 ans et plus                                          | 28 500                          | 17,6 | 24 000                          | 11,7 |
| <b>Niveau de scolarité</b>                              |                                 |      |                                 |      |
| Inférieur au diplôme d'études secondaires               | 54 100                          | 33,9 | 50 500                          | 25,0 |
| Diplôme d'études secondaires                            | 49 100                          | 30,8 | 56 500                          | 28,0 |
| Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup> | 34 900                          | 21,9 | 55 200                          | 27,3 |
| Diplôme d'études universitaires                         | 21 500                          | 13,4 | 39 900                          | 19,7 |
| <b>Composition du ménage</b>                            |                                 |      |                                 |      |
| Personne seule                                          | 19 600                          | 12,4 | 14 200                          | 7,2  |
| Couple sans enfant                                      | 51 800                          | 32,9 | 49 200                          | 25,0 |
| Couple avec enfants                                     | 63 200                          | 40,2 | 108 400                         | 55,2 |
| Famille monoparentale                                   | 11 400                          | 7,2  | 15 700                          | 8,0  |
| Autre                                                   | 11 600                          | 7,3  | 8 900                           | 4,5  |
| <b>Occupation principale</b>                            |                                 |      |                                 |      |
| Travailleurs                                            | 95 000                          | 59,2 | 131 000                         | 64,4 |
| Étudiants                                               | 15 800                          | 9,8  | 25 600                          | 12,6 |
| Personnes sans emploi                                   | 13 300                          | 8,3  | 15 200                          | 7,4  |
| Retraités                                               | 36 400                          | 22,7 | 31 700                          | 15,6 |
| <b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>             |                                 |      |                                 |      |
| Quintile 1 (niveau inférieur)                           | 26 700                          | 17,3 | 30 500                          | 15,6 |
| Quintile 2                                              | 28 800                          | 18,7 | 40 900                          | 21,0 |
| Quintile 3                                              | 35 700                          | 23,2 | 36 800                          | 18,9 |
| Quintile 4                                              | 29 500                          | 19,1 | 52 400                          | 26,9 |
| Quintile 5 (niveau supérieur)                           | 33 500                          | 21,7 | 34 400                          | 17,7 |

1 : Population estimée arrondie à la centaine.

2 : Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

Source : © Gouvernement du Québec, 2010, Institut de la statistique du Québec, 2010. Fichier masqué contre l'identification involontaire (FMII), Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008.

# Caractéristiques de la population

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

## Répartition de la population selon certaines caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                                                         | Lanaudière                      |      | Reste du Québec                 |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|
|                                                         | Population estimée <sup>1</sup> | %    | Population estimée <sup>1</sup> | %    |
| <b>Sexe</b>                                             |                                 |      |                                 |      |
| Hommes                                                  | 184 200                         | 50,1 | 2 942 100                       | 49,4 |
| Femmes                                                  | 183 100                         | 49,9 | 3 017 200                       | 50,6 |
| <b>Groupe d'âge</b>                                     |                                 |      |                                 |      |
| 15-24 ans                                               | 58 500                          | 15,9 | 915 300                         | 15,4 |
| 25-44 ans                                               | 120 500                         | 32,8 | 1 988 000                       | 33,4 |
| 45-64 ans                                               | 136 000                         | 37,0 | 2 087 800                       | 35,0 |
| 65 ans et plus                                          | 52 500                          | 14,3 | 968 200                         | 16,2 |
| <b>Niveau de scolarité</b>                              |                                 |      |                                 |      |
| Inférieur au diplôme d'études secondaires               | 104 600                         | 28,9 | 1 445 900                       | 24,5 |
| Diplôme d'études secondaires                            | 105 600                         | 29,2 | 1 476 500                       | 25,1 |
| Diplôme ou certificat d'études collégiales <sup>2</sup> | 90 000                          | 24,9 | 1 537 600                       | 26,1 |
| Diplôme d'études universitaires                         | 61 300                          | 17,0 | 1 432 100                       | 24,3 |
| <b>Composition du ménage</b>                            |                                 |      |                                 |      |
| Personne seule                                          | 33 700                          | 9,5  | 788 900                         | 13,6 |
| Couple sans enfant                                      | 100 900                         | 28,5 | 1 662 400                       | 28,7 |
| Couple avec enfants                                     | 171 600                         | 48,5 | 2 454 200                       | 42,4 |
| Famille monoparentale                                   | 27 100                          | 7,6  | 495 500                         | 8,6  |
| Autre                                                   | 20 400                          | 5,8  | 392 700                         | 6,8  |
| <b>Occupation principale</b>                            |                                 |      |                                 |      |
| Travailleurs                                            | 225 900                         | 62,1 | 3 540 300                       | 60,1 |
| Étudiants                                               | 41 400                          | 11,4 | 779 000                         | 13,2 |
| Personnes sans emploi                                   | 28 500                          | 7,8  | 419 300                         | 7,1  |
| Retraités                                               | 68 100                          | 18,7 | 1 156 200                       | 19,6 |
| <b>Indice du niveau de revenu du ménage</b>             |                                 |      |                                 |      |
| Quintile 1 (niveau inférieur)                           | 57 100                          | 16,4 | 1 101 400                       | 19,5 |
| Quintile 2                                              | 69 700                          | 20,0 | 1 174 500                       | 20,8 |
| Quintile 3                                              | 72 400                          | 20,8 | 1 101 500                       | 19,5 |
| Quintile 4                                              | 81 800                          | 23,5 | 1 146 100                       | 20,3 |
| Quintile 5 (niveau supérieur)                           | 67 800                          | 19,4 | 1 135 500                       | 20,1 |

1 : Population estimée arrondie à la centaine.

2 : Cette catégorie inclut aussi le diplôme ou le certificat d'études d'une école de métiers ou d'une école de formation professionnelle.

Source : © Gouvernement du Québec, 2010, Institut de la statistique du Québec, 2010. Fichier masqué contre l'identification involontaire (FMII), Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008.



COMMENT LIRE  
LES DONNÉES








A large, solid maroon shape that occupies the right side of the page. It has a complex, angular form, resembling a stylized letter 'P' or a folded piece of paper. The shape is oriented diagonally, with its top-left corner pointing towards the center of the page and its bottom-right corner extending towards the bottom right edge.

# BLESSURES ET TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

# Blessures et troubles musculosquelettiques

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



**Population de 15 ans et plus victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 18 900                          | 11,7                            | 24 100                          | 11,5                            |
| Hommes         | 9 500                           | 11,7                            | 12 200                          | 11,9 *                          |
| Femmes         | 9 400                           | 11,7                            | 11 900                          | 11,2                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
| 15-24 ans      | 1 900                           | 8,1 **                          | 4 200                           | 11,8 **                         |
| 25-44 ans      | 7 200                           | 14,9 *                          | 7 500                           | 10,4 *                          |
| 45-64 ans      | 7 800                           | 12,5                            | 10 900                          | 14,8                            |
| 65 ans et plus | 2 000                           | 7,0 *                           | 1 500                           | 6,2 **                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Blessures et troubles musculosquelettiques

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



**Population de 15 ans et plus victime d'une blessure attribuable à des mouvements répétitifs au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 43 000                          | 11,5                            | 705 200                         | 11,8                            |
| Hommes         | 21 700                          | 11,6                            | 354 800                         | 11,9                            |
| Femmes         | 21 300                          | 11,5                            | 350 400                         | 11,7                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 6 000                           | 10,3 *                          | 92 700                          | 10,1                            |
| 25-44 ans      | 14 700                          | 12,2                            | 274 100                         | 13,8                            |
| 45-64 ans      | 18 700                          | 13,8                            | 291 800                         | 14,0                            |
| 65 ans et plus | 3 500                           | 6,7 *                           | 46 500                          | 4,8                             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Blessures et troubles musculosquelettiques

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 21 500                          | 13,5                            | 23 500                          | 11,2                            |
| Hommes         | 14 300                          | 17,8                            | 13 300                          | 12,2                            |
| Femmes         | 7 200                           | 9,1 *                           | 10 200                          | 9,9                             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
|                |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 15-24 ans      | 5 700                           | 24,4 *                          | 8 400                           | 23,8 *                          |
| 25-44 ans      | 6 600                           | 13,8 *                          | 5 700                           | 7,9 *                           |
| 45-64 ans      | 7 100                           | 11,4 *                          | 7 000                           | 9,5 *                           |
| 65 ans et plus | 2 100                           | 7,3 **                          | 2 400                           | 10,1 **                         |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Blessures et troubles musculosquelettiques

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus victime d'une blessure non intentionnelle au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 45 000                          | 12,1                            | 653 500                         | 11,0                            |
| Hommes         | 27 600                          | 14,6                            | 375 600                         | 12,6                            |
| Femmes         | 17 400                          | 9,5                             | 277 900                         | 9,3                             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 14 100                          | 24,1                            | 156 400                         | 17,1                            |
| 25-44 ans      | 12 400                          | 10,3                            | 242 500                         | 12,2                            |
| 45-64 ans      | 14 100                          | 10,3                            | 192 400                         | 9,2                             |
| 65 ans et plus | 4 500                           | 8,6 *                           | 62 100                          | 6,4                             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## Blessures et troubles musculosquelettiques

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

### Population de 15 ans et plus ayant eu des troubles musculosquelettiques à au moins une région du corps au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total          | 51 600                          | 31,8                          | 64 100                          | 31,2                          |
| Hommes         | 23 200                          | 28,3                          | 28 500                          | 27,9                          |
| Femmes         | 28 400                          | 35,5                          | 35 600                          | 34,6                          |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> |
| 15-24 ans      | 3 900                           | 17,0 *                        | 8 600                           | 24,5 *                        |
| 25-44 ans      | 15 700                          | 32,7                          | 19 400                          | 26,7                          |
| 45-64 ans      | 22 300                          | 35,7                          | 28 200                          | 38,3                          |
| 65 ans et plus | 9 700                           | 33,9                          | 7 900                           | 33,0                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

### Population de 15 ans et plus ayant eu des troubles musculosquelettiques à au moins une région du corps au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                  |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| Total          | 115 700                         | 31,5                          | 1 803 000                       | 30,3             |
| Hommes         | 51 600                          | 28,0                          | 740 800                         | 25,2             |
| Femmes         | 64 000                          | 35,0                          | 1 062 100                       | 35,2             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| 15-24 ans      | 12 600                          | 21,5                          | 204 700                         | 22,4             |
| 25-44 ans      | 35 100                          | 29,1                          | 554 800                         | 27,9             |
| 45-64 ans      | 50 500                          | 37,1                          | 725 600                         | 34,8             |
| 65 ans et plus | 17 600                          | 33,5                          | 318 700                         | 32,9             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## Blessures et troubles musculosquelettiques

### Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

**Population de 15 ans et plus ayant eu des troubles musculosquelettiques liés au travail actuel ou antérieur à au moins une région du corps au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total          | 32 000                          | 19,2                          | 41 200                          | 19,8                          |
| Hommes         | 15 900                          | 18,5                          | 20 200                          | 19,4                          |
| Femmes         | 16 200                          | 19,9                          | 21 000                          | 20,1                          |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> |
| 15-24 ans      | 1 800                           | 7,9 **                        | 5 100                           | 14,4 *                        |
| 25-44 ans      | 10 700                          | 22,1                          | 15 800                          | 21,8                          |
| 45-64 ans      | 15 900                          | 24,6                          | 17 900                          | 24,1                          |
| 65 ans et plus | 3 500                           | 11,8 *                        | 2 000                           | 7,7 **                        |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

**Population de 15 ans et plus ayant eu des troubles musculosquelettiques liés au travail actuel ou antérieur à au moins une région du corps au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                  |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| Total          | 73 200                          | 19,5                          | 1 085 700                       | 17,7             |
| Hommes         | 36 100                          | 19,0                          | 480 000                         | 15,8             |
| Femmes         | 37 200                          | 20,0                          | 605 800                         | 19,6             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| 15-24 ans      | 6 900                           | 11,8 *                        | 108 300                         | 11,8             |
| 25-44 ans      | 26 400                          | 21,9                          | 394 300                         | 19,5             |
| 45-64 ans      | 33 800                          | 24,3                          | 487 100                         | 22,7             |
| 65 ans et plus | 5 600                           | 9,9 *                         | 90 200                          | 8,8              |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

 Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



A large, solid maroon shape that resembles a stylized, tilted rectangle or a large arrow pointing towards the bottom right. It occupies the right half of the page.

# COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

# Comportements de santé propres aux femmes

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

## Proportion de femmes de 18-69 ans ayant passé un test de Pap au cours d'une période de moins de trois ans selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|           | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total     | 46 800                          | 69,3                          | 66 700                          | 76,1                          |
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute              | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> |
|           |                                 |                               |                                 |                               |
| 18-24 ans | 3 200                           | 43,2 *                        | 5 600                           | 61,8                          |
| 25-44 ans | 19 100                          | 81,6                          | 31 800                          | 87,1                          |
| 45-69 ans | 24 400                          | 66,9                          | 29 300                          | 69,4                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

## Proportion de femmes de 18-69 ans ayant passé un test de Pap au cours d'une période de moins de trois ans selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|           | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                  |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| Total     | 113 500                         | 73,1                          | 1 826 600                       | 73,3             |
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
|           |                                 |                               |                                 |                  |
| 18-24 ans | 8 800                           | 53,2                          | 179 800                         | 63,1             |
| 25-44 ans | 50 900                          | 85,0                          | 802 500                         | 82,4             |
| 45-69 ans | 53 700                          | 68,3                          | 843 500                         | 68,4             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

 Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

 Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 % La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements de santé propres aux femmes

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

## Proportion de femmes de 18-69 ans ayant passé un test de Pap au cours d'une période de moins d'un an selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|           | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total     | 34 000                          | 50,4                          | 44 000                          | 50,1                          |
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> |
|           |                                 |                               |                                 |                               |
| 18-24 ans | 3 100                           | 41,3 *                        | 4 600                           | 50,9 *                        |
| 25-44 ans | 14 800                          | 63,0                          | 22 200                          | 60,9                          |
| 45-69 ans | 16 100                          | 44,2                          | 17 200                          | 40,6                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

## Proportion de femmes de 18-69 ans ayant passé un test de Pap au cours d'une période de moins d'un an selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|           | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                  |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| Total     | 77 900                          | 50,2                          | 1 229 100                       | 49,3             |
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
|           |                                 |                               |                                 |                  |
| 18-24 ans | 7 700                           | 46,5                          | 141 600                         | 49,7             |
| 25-44 ans | 37 000                          | 61,7                          | 551 800                         | 56,6             |
| 45-69 ans | 33 300                          | 42,3                          | 535 000                         | 43,4             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## Comportements de santé propres aux femmes

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

### Femmes de 15 à 49 ans qui utilisent la contraception hormonale combinée selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|           | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total     | 9 000                           | 25,0                          | 17 100                          | 29,0                          |
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute              | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute              |
| 15-24 ans | 4 600                           | 61,6                          | 8 400                           | 68,6                          |
| 25-49 ans | 4 300                           | 15,2 *                        | 8 700                           | 18,6                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

### Femmes de 15 à 49 ans qui utilisent la contraception hormonale combinée selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|           | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>3</sup>    |                  |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| Total     | 26 100                          | 27,5                          | 442 400                         | 30,6             |
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute              | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| 15-24 ans | 13 000                          | 65,9                          | 205 700                         | 66,9             |
| 25-49 ans | 13 100                          | 17,3                          | 235 900                         | 20,7             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

 Valeur significativement différente à celle de l'autre groupe d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## Comportements de santé propres aux femmes

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

### Femmes de 15 à 49 ans qui utilisent la contraception hormonale combinée et qui fument la cigarette selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|           | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total     | 2 600                           | 28,8 *                        | 3 300                           | 19,0 **                       |
|           | Population estimée              | Proportion brute              | Population estimée              | Proportion brute              |
| 15-24 ans | np                              | np                            | np                              | np                            |
| 25-49 ans | np                              | np                            | np                              | np                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

### Femmes de 15 à 49 ans qui utilisent la contraception hormonale combinée et qui fument la cigarette selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|           | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                  |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| Total     | 5 900                           | 22,4 *                        | 104 000                         | 23,5             |
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| 15-24 ans | 3 800                           | 29,3 *                        | 56 400                          | 27,4             |
| 25-49 ans | 2 000                           | 15,5 **                       | 47 400                          | 20,1             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.






COMPORTEMENTS  
SEXUELS ET USAGE  
DE LA CONTRACEPTION

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus active sexuellement au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 128 000                         | 78,9                            | 169 900                         | 80,4                            |
| Hommes         | 67 900                          | 82,4                            | 86 400                          | 83,1                            |
| Femmes         | 60 100                          | 75,4                            | 83 500                          | 78,5                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 15 500                          | 66,7                            | 24 700                          | 70,1                            |
| 25-44 ans      | 45 600                          | 95,1                            | 69 200                          | 95,5                            |
| 45-64 ans      | 52 000                          | 83,3                            | 64 500                          | 87,7                            |
| 65 ans et plus | 14 000                          | 49,0                            | 10 800                          | 45,2                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus active sexuellement au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>3</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 297 900                         | 79,8                            | 4 644 600                       | 77,4                            |
| Hommes         | 154 300                         | 82,6                            | 2 441 200                       | 82,1                            |
| Femmes         | 143 700                         | 77,2                            | 2 204 200                       | 73,4                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 40 100                          | 68,7                            | 613 100                         | 67,0                            |
| 25-44 ans      | 114 800                         | 95,3                            | 1 854 600                       | 93,3                            |
| 45-64 ans      | 116 500                         | 85,7                            | 1 721 900                       | 82,5                            |
| 65 ans et plus | 24 800                          | 47,2                            | 427 400                         | 44,1                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec, en 2008.

3 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

## Femmes de 15 à 49 ans actives sexuellement au cours des 12 derniers mois qui ont utilisé un moyen contraceptif selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|           | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total     | 23 200                          | 64,3                          | 40 400                          | 68,4                          |
|           | Population estimée              | Proportion brute              | Population estimée              | Proportion brute              |
| 15-24 ans | np                              | np                            | np                              | np                            |
| 25-34 ans | np                              | np                            | np                              | np                            |
| 35-49 ans | np                              | np                            | np                              | np                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

## Femmes de 15 à 49 ans actives sexuellement au cours des 12 derniers mois qui ont utilisé un moyen contraceptif selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|           | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>3</sup>    |                               |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total     | 63 600                          | 66,9                          | 964 400                         | 66,6                          |
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute              | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute              |
| 15-24 ans | 17 900                          | 90,5                          | 277 100                         | 89,9                          |
| 25-34 ans | 19 600                          | 74,3                          | 313 800                         | 70,8                          |
| 35-49 ans | 26 100                          | 53,2                          | 373 000                         | 53,6                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

 Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elle ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

**Femmes de 15 à 49 ans actives sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé le condom comme moyen de contraception selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|           | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total     | 7 100                           | 19,8                          | 12 300                          | 21,0                          |
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute              |
| 15-24 ans | 3 200                           | 41,9 *                        | 6 400                           | 52,6                          |
| 25-34 ans | 2 200                           | 21,7 *                        | 3 500                           | 21,3 **                       |
| 35-49 ans | 1 800                           | 9,7 **                        | 2 400                           | 8,0 **                        |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

**Femmes de 15 à 49 ans actives sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé le condom comme moyen de contraception selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|           | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                               |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total     | 19 400                          | 20,6                          | 329 000                         | 22,8                          |
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute              | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute              |
| 15-24 ans | 9 600                           | 48,5                          | 130 200                         | 42,3                          |
| 25-34 ans | 5 600                           | 21,4 *                        | 99 500                          | 22,5                          |
| 35-49 ans | 4 200                           | 8,7 *                         | 99 000                          | 14,3                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

**Femmes de 15 à 49 ans actives sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé la pilule contraceptive comme moyen de contraception selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|           | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total     | 8 900                           | 24,6                          | 16 500                          | 28,1                          |
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute              | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute              |
| 15-24 ans | 4 500                           | 59,9                          | 8 000                           | 65,2                          |
| 25-34 ans | 3 600                           | 35,8 *                        | 6 600                           | 40,4 *                        |
| 35-49 ans | 800                             | 4,1 **                        | 1 900                           | 6,3 **                        |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

**Femmes de 15 à 49 ans actives sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé la pilule contraceptive comme moyen de contraception selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|           | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>3</sup>    |                  |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| Total     | 25 400                          | 26,8                          | 432 300                         | 30,0             |
|           | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute              | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| 15-24 ans | 12 500                          | 63,2                          | 202 000                         | 65,6             |
| 25-34 ans | 10 200                          | 38,7                          | 162 700                         | 36,9             |
| 35-49 ans | 2 700                           | 5,5 *                         | 67 300                          | 9,7              |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

-  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
-  Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

## Population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles (orales, vaginales ou anales) qui a eu un diagnostic d'infection transmise sexuellement selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total          | 9 500                           | 6,1                           | 15 300                          | 7,9                           |
| Hommes         | 4 400                           | 5,6 *                         | 7 600                           | 8,0 *                         |
| Femmes         | 5 100                           | 6,7 *                         | 7 600                           | 7,7 *                         |
|                | Population estimée              | Proportion brute              | Population estimée              | Proportion brute              |
| 15-24 ans      | np                              | np                            | np                              | np                            |
| 25-44 ans      | np                              | np                            | np                              | np                            |
| 45-64 ans      | np                              | np                            | np                              | np                            |
| 65 ans et plus | np                              | np                            | np                              | np                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

## Population de 15 ans et plus ayant déjà eu des relations sexuelles (orales, vaginales ou anales) qui a eu un diagnostic d'infection transmise sexuellement selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                  |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| Total          | 24 800                          | 7,1                           | 464 200                         | 8,2              |
| Hommes         | 12 000                          | 6,9                           | 198 000                         | 7,1              |
| Femmes         | 12 800                          | 7,3                           | 266 100                         | 9,3              |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| 15-24 ans      | 1 700                           | 4,0 **                        | 33 400                          | 5,0              |
| 25-44 ans      | 14 800                          | 12,5                          | 219 700                         | 11,2             |
| 45-64 ans      | 7 200                           | 5,3 *                         | 181 000                         | 8,8              |
| 65 ans et plus | 700                             | 1,3 **                        | 26 000                          | 2,8              |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

 Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois qui ont utilisé un moyen contraceptif selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 30 900                          | 45,7                            | 43 000                          | 46,8                            |
|                | Population estimée              | Proportion brute                | Population estimée              | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 25-34 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 35-44 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 45 ans et plus | np                              | np                              | np                              | np                              |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois qui ont utilisé un moyen contraceptif selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 73 900                          | 46,2                            | 1 142 900                       | 45,9                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 18 400                          | 91,1                            | 259 500                         | 87,7                            |
| 25-34 ans      | 16 200                          | 62,4                            | 312 000                         | 69,1                            |
| 35-44 ans      | 16 500                          | 53,1                            | 270 400                         | 56,7                            |
| 45 ans et plus | 22 700                          | 29,7                            | 290 700                         | 25,0                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

**Proportion brute des hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé le condom comme moyen de contraception, RLS de Lanaudière, 2008 (%)**



**Hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé le condom comme moyen de contraception selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 9 400                           | 14,7                            | 13 500                          | 16,1                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
|                |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 15-24 ans      | 2 900                           | 37,3 **                         | 6 700                           | 54,1 *                          |
| 25-34 ans      | 2 200                           | 20,6 **                         | 2 500                           | 16,7 **                         |
| 35-44 ans      | 2 000                           | 16,1 **                         | 2 500                           | 13,8 **                         |
| 45 ans et plus | 2 300                           | 6,6 **                          | 2 100                           | 5,4 **                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé le condom comme moyen de contraception selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 22 900                          | 15,5                            | 421 000                         | 18,1                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 9 600                           | 47,6                            | 156 900                         | 53,2                            |
| 25-34 ans      | 4 700                           | 18,3 *                          | 123 900                         | 27,6                            |
| 35-44 ans      | 4 500                           | 14,7 *                          | 81 100                          | 17,2                            |
| 45 ans et plus | 4 400                           | 6,0 *                           | 59 200                          | 5,3                             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

**Proportion brute des hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé la pilule contraceptive comme moyen de contraception, RLS de Lanaudière, 2008 (%)**



**Hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé la pilule contraceptive comme moyen de contraception selon l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 11 700                          | 19,1                            | 15 500                          | 18,2                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
|                |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 15-24 ans      | 4 200                           | 54,1 *                          | 8 900                           | 71,8                            |
| 25-34 ans      | 4 700                           | 44,2 *                          | 4 400                           | 29,0 *                          |
| 35-44 ans      | 2 200                           | 17,6 **                         | 1 700                           | 9,5 **                          |
| 45 ans et plus | 700                             | 2,0 **                          | 1 000                           | 2,4 **                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

**Proportion brute des hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé la pilule contraceptive comme moyen de contraception, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (%)**



**Hommes de 15 ans et plus actifs sexuellement au cours des 12 derniers mois (relations hétérosexuelles) ayant utilisé la pilule contraceptive comme moyen de contraception selon l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>3</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 27 200                          | 18,6                            | 476 200                         | 20,2                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 13 000                          | 64,9                            | 171 800                         | 58,3                            |
| 25-34 ans      | 9 100                           | 35,2                            | 167 100                         | 37,3                            |
| 35-44 ans      | 4 000                           | 12,8 *                          | 89 600                          | 19,0                            |
| 45 ans et plus | 1 700                           | 2,3 **                          | 47 500                          | 4,3                             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Les proportions selon le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus active sexuellement au cours des 12 derniers mois ayant toujours utilisé un condom selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 15 400                          | 12,7                            | 17 300                          | 10,3                            |
| Hommes         | 8 300                           | 12,9 *                          | 8 700                           | 10,6 *                          |
| Femmes         | 7 100                           | 12,4                            | 8 600                           | 9,9                             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
|                |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 15-24 ans      | 6 600                           | 43,1 *                          | 10 000                          | 40,7                            |
| 25-34 ans      | 1 800                           | 8,5 **                          | 2 500                           | 7,9 **                          |
| 35-44 ans      | 3 100                           | 12,7 *                          | 1 900                           | 5,0 **                          |
| 45 ans et plus | 3 700                           | 5,5 *                           | 3 000                           | 4,0 **                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Comportements sexuels et usage de la contraception

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus active sexuellement au cours des 12 derniers mois ayant toujours utilisé un condom selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 32 700                          | 11,2                            | 658 300                         | 13,9                            |
| Hommes         | 17 000                          | 11,5                            | 367 200                         | 15,4                            |
| Femmes         | 15 600                          | 10,8                            | 291 100                         | 12,4                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 16 600                          | 41,7                            | 250 100                         | 41,0                            |
| 25-34 ans      | 4 300                           | 8,1 *                           | 154 500                         | 17,1                            |
| 35-44 ans      | 5 000                           | 8,1 *                           | 120 800                         | 12,9                            |
| 45 ans et plus | 6 600                           | 4,7 *                           | 123 900                         | 5,7                             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.


Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



# CONSOMMATION DE DROGUES

# Consommation de drogues

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



**Population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours de la vie selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 80 000                          | 50,0                            | 103 700                         | 47,7                            |
| Hommes         | 46 200                          | 56,2                            | 60 200                          | 55,4                            |
| Femmes         | 33 900                          | 43,7                            | 43 600                          | 40,2                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
|                |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 15-24 ans      | 14 700                          | 63,6                            | 22 100                          | 62,7                            |
| 25-34 ans      | 16 800                          | 77,1                            | 20 500                          | 61,7                            |
| 35-44 ans      | 15 900                          | 60,4                            | 23 700                          | 60,3                            |
| 45 ans et plus | 32 200                          | 35,5                            | 37 000                          | 37,9                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Consommation de drogues

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



**Population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours de la vie selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 183 700                         | 48,6                            | 2 702 100                       | 44,5                            |
| Hommes         | 106 400                         | 55,6                            | 1 514 400                       | 49,8                            |
| Femmes         | 77 500                          | 41,6                            | 1 188 900                       | 39,4                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 36 800                          | 63,1                            | 525 000                         | 57,4                            |
| 25-34 ans      | 37 200                          | 67,8                            | 629 800                         | 64,4                            |
| 35-44 ans      | 39 600                          | 60,4                            | 521 400                         | 51,6                            |
| 45 ans et plus | 69 200                          | 36,7                            | 1 005 000                       | 32,9                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis (marijuana ou haschich) au cours de la vie selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 77 100                          | 48,3                            | 100 300                         | 46,3                            |
| Hommes         | 44 300                          | 54,2                            | 58 400                          | 53,9                            |
| Femmes         | 32 700                          | 42,4                            | 42 100                          | 38,8                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
|                |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 15-24 ans      | 14 000                          | 60,5                            | 21 800                          | 61,9                            |
| 25-34 ans      | 16 400                          | 75,7                            | 20 400                          | 61,5                            |
| 35-44 ans      | 15 300                          | 58,2                            | 22 900                          | 58,1                            |
| 45 ans et plus | 30 900                          | 34,0                            | 35 200                          | 36,1                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.


- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis (marijuana ou haschich) au cours de la vie selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 177 400                         | 47,1                            | 2 600 400                       | 43,2                            |
| Hommes         | 102 700                         | 54,0                            | 1 465 000                       | 48,4                            |
| Femmes         | 74 800                          | 40,3                            | 1 137 300                       | 38,1                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 35 800                          | 61,3                            | 516 800                         | 56,5                            |
| 25-34 ans      | 36 900                          | 67,2                            | 618 300                         | 63,2                            |
| 35-44 ans      | 38 100                          | 58,2                            | 506 300                         | 50,1                            |
| 45 ans et plus | 66 200                          | 35,1                            | 949 000                         | 31,1                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus ayant consommé de la cocaïne ou du crack au cours de la vie selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 18 900                          | 11,9                            | 22 900                          | 10,5                            |
| Hommes         | 12 200                          | 15,1                            | 17 300                          | 15,8                            |
| Femmes         | 6 700                           | 8,7 *                           | 5 700                           | 5,2 *                           |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
|                |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 15-24 ans      | 2 700                           | 11,8 **                         | 4 300                           | 12,1 **                         |
| 25-34 ans      | 4 000                           | 18,4 *                          | 3 800                           | 11,3 **                         |
| 35-44 ans      | 5 100                           | 19,3 *                          | 8 200                           | 20,9 *                          |
| 45 ans et plus | 7 000                           | 7,7 *                           | 6 600                           | 6,8 *                           |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Consommation de drogues

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



**Population de 15 ans et plus ayant consommé de la cocaïne ou du crack au cours de la vie selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 41 800                          | 11,1                            | 627 100                         | 10,4                            |
| Hommes         | 29 500                          | 15,5                            | 422 200                         | 13,8                            |
| Femmes         | 12 400                          | 6,7                             | 206 000                         | 6,9                             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 7 000                           | 12,0 *                          | 80 100                          | 8,8                             |
| 25-34 ans      | 7 800                           | 14,1 *                          | 170 000                         | 17,4                            |
| 35-44 ans      | 13 300                          | 20,3                            | 159 000                         | 15,8                            |
| 45 ans et plus | 13 600                          | 7,2                             | 213 500                         | 7,0                             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus ayant consommé des amphétamines au cours de la vie selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 13 000                          | 8,2                             | 18 300                          | 8,2                             |
| Hommes         | 8 200                           | 10,1 *                          | 11 700                          | 10,5                            |
| Femmes         | 4 800                           | 6,3 *                           | 6 600                           | 6,0 *                           |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
| 15-24 ans      | 5 300                           | 22,9 *                          | 7 600                           | 21,6 *                          |
| 25-34 ans      | 3 200                           | 14,7 *                          | 3 800                           | 11,4 **                         |
| 35-44 ans      | 900                             | 3,6 **                          | 3 400                           | 8,7 **                          |
| 45 ans et plus | 3 400                           | 3,7 *                           | 3 300                           | 3,4 **                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Consommation de drogues

## Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



### Population de 15 ans et plus ayant consommé des amphétamines au cours de la vie selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 31 200                          | 8,2                             | 428 800                         | 7,1                             |
| Hommes         | 19 900                          | 10,4                            | 264 900                         | 8,6                             |
| Femmes         | 11 300                          | 6,1                             | 164 500                         | 5,5                             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 12 900                          | 22,1                            | 130 500                         | 14,3                            |
| 25-34 ans      | 7 000                           | 12,7 *                          | 144 300                         | 14,8                            |
| 35-44 ans      | 4 300                           | 6,6 **                          | 48 800                          | 4,8                             |
| 45 ans et plus | 6 700                           | 3,5 *                           | 99 700                          | 3,3                             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



### Population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 22 000                          | 14,1                            | 26 700                          | 11,9                            |
| Hommes         | 13 000                          | 16,3                            | 17 100                          | 15,2                            |
| Femmes         | 9 000                           | 11,9                            | 9 600                           | 8,6 *                           |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
| 15-24 ans      | 9 200                           | 39,6                            | 11 700                          | 33,3                            |
| 25-34 ans      | 5 400                           | 25,0 *                          | 7 000                           | 21,1 *                          |
| 35-44 ans      | 2 900                           | 11,1 *                          | 3 500                           | 8,8 **                          |
| 45 ans et plus | 4 100                           | 4,5 *                           | 4 100                           | 4,2 *                           |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elle ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Consommation de drogues

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



**Population de 15 ans et plus ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>3</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 48 700                          | 12,8                            | 777 500                         | 12,7                            |
| Hommes         | 30 100                          | 15,6                            | 509 300                         | 16,5                            |
| Femmes         | 18 600                          | 10,0                            | 269 100                         | 8,9                             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 20 900                          | 35,8                            | 314 900                         | 34,4                            |
| 25-34 ans      | 12 400                          | 22,6                            | 223 900                         | 22,9                            |
| 35-44 ans      | 6 400                           | 9,7 *                           | 99 200                          | 9,8                             |
| 45 ans et plus | 8 200                           | 4,4 *                           | 124 000                         | 4,1                             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.


\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elle ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



### Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis (marijuana ou haschich) au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 21 000                          | 13,6                            | 24 900                          | 11,2                            |
| Hommes         | 12 400                          | 15,6                            | 16 000                          | 14,4                            |
| Femmes         | 8 700                           | 11,7                            | 8 900                           | 8,1 *                           |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
|                |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 15-24 ans      | 9 100                           | 39,4                            | 11 700                          | 33,3                            |
| 25-34 ans      | 5 300                           | 24,5 *                          | 6 900                           | 20,8 *                          |
| 35-44 ans      | 2 800                           | 10,7 *                          | 2 900                           | 7,4 **                          |
| 45 ans et plus | 3 600                           | 3,9 *                           | 3 400                           | 3,4 **                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.


\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



### Population de 15 ans et plus ayant consommé du cannabis (marijuana ou haschich) au cours des 12 derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>3</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 45 900                          | 12,2                            | 724 300                         | 12,0                            |
| Hommes         | 28 400                          | 14,8                            | 478 700                         | 15,6                            |
| Femmes         | 17 600                          | 9,6                             | 247 100                         | 8,4                             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 20 900                          | 35,8                            | 303 800                         | 33,2                            |
| 25-34 ans      | 12 200                          | 22,2                            | 214 100                         | 21,9                            |
| 35-44 ans      | 5 700                           | 8,7 *                           | 88 900                          | 8,8                             |
| 45 ans et plus | 6 900                           | 3,7 *                           | 111 100                         | 3,6                             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



ÉTAT DE SANTÉ



**Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 17 900                          | 10,6                            | 16 300                          | 8,7                             |
| Hommes         | 10 100                          | 12,0                            | 7 200                           | 7,9 *                           |
| Femmes         | 7 800                           | 9,3                             | 9 100                           | 9,4                             |
|                | Population estimée              | Proportion brute                | Population estimée              | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 25-44 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 45-64 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 65 ans et plus | np                              | np                              | np                              | np                              |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.


\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 34 200                          | 9,6                             | 649 700                         | 11,0                            |
| Hommes         | 17 300                          | 9,9                             | 290 700                         | 10,2                            |
| Femmes         | 16 900                          | 9,4                             | 358 700                         | 11,7                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 1 500                           | 2,6 **                          | 51 700                          | 5,7                             |
| 25-44 ans      | 5 100                           | 4,2 *                           | 123 400                         | 6,2                             |
| 45-64 ans      | 15 900                          | 11,7                            | 272 400                         | 13,0                            |
| 65 ans et plus | 12 000                          | 22,8                            | 209 800                         | 21,7                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



SITUATION  
FINANCIÈRE



**Population de 15 ans et plus se percevant pauvre ou très pauvre selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 20 700                          | 12,7                            | 14 500                          | 7,2                             |
| Hommes         | 7 900                           | 9,6                             | 5 800                           | 5,8 *                           |
| Femmes         | 12 800                          | 15,9                            | 8 700                           | 8,6                             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
| 15-24 ans      | 3 000                           | 12,8 **                         | 3 100                           | 8,8 **                          |
| 25-44 ans      | 5 600                           | 11,6 *                          | 5 400                           | 7,4 *                           |
| 45-64 ans      | 8 600                           | 13,8                            | 3 600                           | 4,9 *                           |
| 65 ans et plus | 3 600                           | 12,7 *                          | 2 500                           | 10,3 **                         |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.


\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus se percevant pauvre ou très pauvre selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 35 200                          | 9,7                             | 660 400                         | 11,1                            |
| Hommes         | 13 700                          | 7,6                             | 313 500                         | 10,6                            |
| Femmes         | 21 400                          | 11,8                            | 346 900                         | 11,5                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 6 100                           | 10,4 *                          | 74 800                          | 8,2                             |
| 25-44 ans      | 10 900                          | 9,1                             | 221 800                         | 11,2                            |
| 45-64 ans      | 12 200                          | 9,0                             | 248 000                         | 11,9                            |
| 65 ans et plus | 6 100                           | 11,6                            | 116 800                         | 12,1                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



TENSION ARTÉRIELLE

## Prise de la tension artérielle

### Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

#### Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total          | 129 600                         | 84,2                          | 158 900                         | 83,0                          |
| Hommes         | 62 500                          | 80,8                          | 77 000                          | 80,0                          |
| Femmes         | 67 200                          | 87,7                          | 81 800                          | 86,0                          |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> |
|                |                                 |                               |                                 |                               |
| 18-24 ans      | 11 300                          | 74,8                          | 12 500                          | 58,4                          |
| 25-44 ans      | 35 800                          | 74,6                          | 55 900                          | 77,1                          |
| 45-64 ans      | 56 200                          | 90,2                          | 67 300                          | 91,4                          |
| 65 ans et plus | 26 500                          | 92,9                          | 22 700                          | 94,7                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

#### Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                  |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| Total          | 288 600                         | 83,6                          | 4 673 800                       | 83,2             |
| Hommes         | 139 500                         | 80,3                          | 2 260 300                       | 81,9             |
| Femmes         | 149 000                         | 86,8                          | 2 412 400                       | 84,5             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
|                |                                 |                               |                                 |                  |
| 18-24 ans      | 23 900                          | 65,5                          | 381 500                         | 66,9             |
| 25-44 ans      | 91 600                          | 76,1                          | 1 539 300                       | 77,4             |
| 45-64 ans      | 123 500                         | 90,9                          | 1 841 700                       | 88,2             |
| 65 ans et plus | 49 200                          | 93,8                          | 911 100                         | 94,1             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## Prise de la tension artérielle

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

### Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste parmi ceux qui ont consulté au cours de la dernière année selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total          | 100 300                         | 84,4                          | 119 700                         | 84,0                          |
| Hommes         | 45 800                          | 81,1                          | 53 200                          | 80,7                          |
| Femmes         | 54 500                          | 87,4                          | 66 300                          | 86,8                          |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> |
| 18-24 ans      | 7 700                           | 74,3                          | 8 200                           | 61,3                          |
| 25-44 ans      | 23 900                          | 72,2                          | 37 600                          | 75,9                          |
| 45-64 ans      | 44 500                          | 90,3                          | 52 900                          | 92,0                          |
| 65 ans et plus | 24 500                          | 93,4                          | 21 100                          | 95,4                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

### Population de 18 ans et plus dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste parmi ceux qui ont consulté au cours de la dernière année selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                  |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| Total          | 219 900                         | 84,2                          | 3 537 100                       | 83,4             |
| Hommes         | 99 000                          | 80,9                          | 1 574 000                       | 82,7             |
| Femmes         | 120 800                         | 87,1                          | 1 961 100                       | 84,0             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| 18-24 ans      | 15 900                          | 66,9                          | 272 100                         | 68,0             |
| 25-44 ans      | 61 500                          | 74,4                          | 1 029 600                       | 76,1             |
| 45-64 ans      | 97 400                          | 91,2                          | 1 424 700                       | 87,7             |
| 65 ans et plus | 45 600                          | 94,3                          | 823 400                         | 94,3             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.


- 1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.
  - 2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.
  - 3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.
  - 4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière et les RLS.
- Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



## RHINITE ALLERGIQUE ET HERBE À POUX

# Rhinite allergique et herbe à poux

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus ayant déjà reçu un diagnostic de rhinite allergique selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 25 300                          | 15,8                            | 40 100                          | 19,0                            |
| Hommes         | 11 700                          | 14,4                            | 17 700                          | 17,0                            |
| Femmes         | 13 600                          | 17,2                            | 22 300                          | 21,1                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
| 15-24 ans      | 3 700                           | 15,9 *                          | 6 700                           | 18,9 *                          |
| 25-44 ans      | 9 100                           | 18,9                            | 15 500                          | 21,4                            |
| 45-64 ans      | 10 900                          | 17,5                            | 14 900                          | 20,2                            |
| 65 ans et plus | 1 600                           | 5,5 **                          | 2 900                           | 12,2 *                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Rhinite allergique et herbe à poux

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus ayant déjà reçu un diagnostic de rhinite allergique selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 65 300                          | 17,5                            | 998 200                         | 16,7                            |
| Hommes         | 29 400                          | 15,7                            | 448 500                         | 15,1                            |
| Femmes         | 35 900                          | 19,4                            | 549 900                         | 18,4                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 10 300                          | 17,7 *                          | 158 100                         | 17,3                            |
| 25-44 ans      | 24 600                          | 20,4                            | 415 300                         | 20,9                            |
| 45-64 ans      | 25 800                          | 19,0                            | 334 700                         | 16,0                            |
| 65 ans et plus | 4 500                           | 8,6 *                           | 89 400                          | 9,2                             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.


4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Rhinite allergique et herbe à poux

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

**Proportion brute de la population de 15 ans et plus ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois parmi les personnes ayant déjà reçu un diagnostic selon le sexe, RLS de Lanaudière, 2008 (%)**



**Population de 15 ans et plus ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois parmi les personnes ayant déjà reçu un diagnostic selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 10 600                          | 35,5                            | 15 500                          | 34,1                            |
| Hommes         | 5 100                           | 34,2 *                          | 7 700                           | 38,2 *                          |
| Femmes         | 5 500                           | 35,3 *                          | 7 900                           | 31,1 *                          |
|                | Population estimée              | Proportion brute                | Population estimée              | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 25-44 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 45-64 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 65 ans et plus | np                              | np                              | np                              | np                              |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Rhinite allergique et herbe à poux

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

**Proportion brute de la population de 15 ans et plus ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois parmi les personnes ayant déjà reçu un diagnostic selon le sexe, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (%)**



**Population de 15 ans et plus ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois parmi les personnes ayant déjà reçu un diagnostic selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 26 200                          | 35,0                            | 495 800                         | 42,6                            |
| Hommes         | 12 800                          | 37,4                            | 205 700                         | 38,7                            |
| Femmes         | 13 300                          | 33,1                            | 290 100                         | 45,7                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 3 000                           | 24,9 **                         | 59 300                          | 33,4                            |
| 25-44 ans      | 10 400                          | 41,3                            | 211 400                         | 46,2                            |
| 45-64 ans      | 11 100                          | 39,1                            | 176 800                         | 45,7                            |
| 65 ans et plus | 1 600                           | 21,4 **                         | 47 900                          | 37,5                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 % La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## Rhinite allergique et herbe à poux

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



### Population de 15 ans et plus ayant déjà reçu un diagnostic d'allergie à l'herbe à poux selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 12 900                          | 8,0                             | 21 000                          | 10,0                            |
| Hommes         | 5 800                           | 7,2 *                           | 10 700                          | 10,3 *                          |
| Femmes         | 7 100                           | 8,8                             | 10 300                          | 9,8                             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
| 15-24 ans      | 1 600                           | 6,7 **                          | 2 000                           | 5,6 **                          |
| 25-44 ans      | 4 500                           | 9,3 *                           | 9 500                           | 13,1 *                          |
| 45-64 ans      | 6 100                           | 9,8 *                           | 7 800                           | 10,5 *                          |
| 65 ans et plus | 800                             | 2,7 **                          | 1 700                           | 7,3 **                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Rhinite allergique et herbe à poux

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

**Proportion brute de la population de 15 ans et plus  
ayant déjà reçu un diagnostic d'allergie à l'herbe à poux selon le sexe,  
Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (%)**



**Population de 15 ans et plus ayant déjà reçu un diagnostic d'allergie à l'herbe à poux  
selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                         |                                    | Reste du Québec <sup>4</sup>       |                                    |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>ajustée <sup>2</sup> | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 33 900                             | 9,1                                | 505 500                            | 8,5                                |
| Hommes         | 16 500                             | 8,8                                | 221 900                            | 7,5                                |
| Femmes         | 17 400                             | 9,4                                | 283 600                            | 9,5                                |
|                | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>brute <sup>3</sup>   | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>brute                |
| 15-24 ans      | 3 500                              | 6,0 **                             | 70 000                             | 7,7                                |
| 25-44 ans      | 14 000                             | 11,6                               | 215 900                            | 10,9                               |
| 45-64 ans      | 13 900                             | 10,2                               | 175 800                            | 8,4                                |
| 65 ans et plus | 2 500                              | 4,8 *                              | 43 800                             | 4,5                                |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 % La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 % La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.


4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



SANTÉ  
BUCCODENTAIRE

**Proportion brute de la population de 15 ans et plus  
ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire selon le sexe,  
RLS de Lanaudière, 2008 (%)**



**Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire  
selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord             |                                    | RLS de Lanaudière-Sud              |                                    |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>ajustée <sup>2</sup> | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 17 000                             | 10,3                               | 19 500                             | 9,5                                |
| Hommes         | 9 100                              | 10,8                               | 11 500                             | 11,1 *                             |
| Femmes         | 7 900                              | 9,7                                | 8 100                              | 7,8 *                              |
|                | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>brute <sup>3</sup>   | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>brute <sup>3</sup>   |
| 15-24 ans      | 1 300                              | 5,7 **                             | 1 600                              | 4,6 **                             |
| 25-44 ans      | 4 600                              | 9,6 *                              | 7 000                              | 9,6 *                              |
| 45-64 ans      | 7 800                              | 12,5                               | 9 100                              | 12,4                               |
| 65 ans et plus | 3 300                              | 11,4 *                             | 1 800                              | 7,4 **                             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

**Proportion brute de la population de 15 ans et plus  
ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire selon le sexe,  
Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (%)**



**Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire  
selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                         |                                    | Reste du Québec <sup>4</sup>       |                                    |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>ajustée <sup>2</sup> | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 36 500                             | 9,9                                | 701 600                            | 11,8                               |
| Hommes         | 20 600                             | 11,1                               | 393 900                            | 13,5                               |
| Femmes         | 15 900                             | 8,7                                | 308 100                            | 10,2                               |
|                | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>brute <sup>3</sup>   | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>brute                |
|                |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 15-24 ans      | 2 900                              | 5,0 **                             | 94 600                             | 10,3                               |
| 25-44 ans      | 11 600                             | 9,6 *                              | 214 000                            | 10,8                               |
| 45-64 ans      | 16 900                             | 12,4                               | 265 700                            | 12,7                               |
| 65 ans et plus | 5 000                              | 9,5 *                              | 128 300                            | 13,3                               |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 23 100                          | 13,5                            | 21 200                          | 12,4                            |
| Hommes         | 9 500                           | 11,0                            | 9 700                           | 12,0                            |
| Femmes         | 13 600                          | 15,8                            | 11 400                          | 12,8                            |
|                | Population estimée              | Proportion brute                | Population estimée              | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 25-44 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 45-64 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 65 ans et plus | np                              | np                              | np                              | np                              |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.


np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

**Proportion brute de la population de 15 ans et plus  
n'ayant aucune dent naturelle selon le sexe,  
Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (%)**



**Population de 15 ans et plus n'ayant aucune dent naturelle selon le sexe et l'âge,  
Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                         |                                    | Reste du Québec <sup>3</sup>       |                                    |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>ajustée <sup>2</sup> | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 44 300                             | 12,9                               | 650 800                            | 11,2                               |
| Hommes         | 19 200                             | 11,4                               | 250 100                            | 9,4                                |
| Femmes         | 25 000                             | 14,2                               | 400 000                            | 12,8                               |
|                | Population<br>estimée              | Proportion<br>brute                | Population<br>estimée              | Proportion<br>brute                |
| 15-24 ans      | np                                 | np                                 | np                                 | np                                 |
| 25-44 ans      | np                                 | np                                 | np                                 | np                                 |
| 45-64 ans      | np                                 | np                                 | np                                 | np                                 |
| 65 ans et plus | np                                 | np                                 | np                                 | np                                 |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.


np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Les proportions selon le sexe n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus se brossant les dents ou les prothèses au moins deux fois par jour selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 117 700                         | 72,8                            | 164 000                         | 79,3                            |
| Hommes         | 50 200                          | 61,2                            | 71 900                          | 69,2                            |
| Femmes         | 67 500                          | 84,6                            | 91 900                          | 88,8                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
|                |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 15-24 ans      | 17 600                          | 75,9                            | 31 300                          | 88,7                            |
| 25-44 ans      | 36 100                          | 75,3                            | 59 700                          | 82,3                            |
| 45-64 ans      | 46 200                          | 74,0                            | 56 200                          | 76,3                            |
| 65 ans et plus | 17 600                          | 61,8                            | 16 900                          | 70,6                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.


- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus se brossant les dents ou les prothèses au moins deux fois par jour selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 281 800                         | 76,5                            | 4 702 600                       | 78,8                            |
| Hommes         | 122 200                         | 65,7                            | 2 044 700                       | 69,0                            |
| Femmes         | 159 400                         | 87,0                            | 2 654 800                       | 88,1                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 48 800                          | 83,6                            | 764 500                         | 83,5                            |
| 25-44 ans      | 95 800                          | 79,5                            | 1 634 500                       | 82,2                            |
| 45-64 ans      | 102 400                         | 75,3                            | 1 606 100                       | 76,9                            |
| 65 ans et plus | 34 600                          | 65,9                            | 692 300                         | 71,5                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population âgée de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle et qui utilise  
la soie dentaire tous les jours selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord             |                                    | RLS de Lanaudière-Sud              |                                    |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>ajustée <sup>2</sup> | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 44 100                             | 31,4                               | 59 200                             | 32,4                               |
| Hommes         | 16 300                             | 22,2                               | 20 600                             | 22,7                               |
| Femmes         | 27 800                             | 41,4                               | 38 400                             | 42,0                               |
|                | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>brute <sup>3</sup>   | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>brute <sup>3</sup>   |
|                |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 15-24 ans      | 6 100                              | 26,3 *                             | 10 500                             | 29,8 *                             |
| 25-44 ans      | 13 500                             | 28,4                               | 21 300                             | 29,4                               |
| 45-64 ans      | 20 200                             | 38,6                               | 23 200                             | 37,0                               |
| 65 ans et plus | 4 200                              | 27,0                               | 4 100                              | 30,5 *                             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.


\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

<sup>1</sup> : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

<sup>2</sup> : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

<sup>3</sup> : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle et qui utilise la soie dentaire tous les jours selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 103 300                         | 31,9                            | 1 759 100                       | 33,6                            |
| Hommes         | 36 900                          | 22,3                            | 666 600                         | 24,8                            |
| Femmes         | 66 200                          | 41,8                            | 1 089 700                       | 42,3                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 16 600                          | 28,4                            | 245 400                         | 27,0                            |
| 25-44 ans      | 34 800                          | 29,0                            | 590 400                         | 29,9                            |
| 45-64 ans      | 43 300                          | 37,7                            | 701 300                         | 38,6                            |
| 65 ans et plus | 8 300                           | 28,7                            | 217 300                         | 37,0                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74 et 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



SANTÉ  
MENTALE



**Population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 9 000                           | 5,5                             | 11 500                          | 5,6                             |
| Hommes         | 5 400                           | 6,6 *                           | 5 100                           | 5,0 *                           |
| Femmes         | 3 600                           | 4,3 *                           | 6 300                           | 6,2 *                           |
|                | Population estimée              | Proportion brute                | Population estimée              | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 25-44 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 45-64 ans      | np                              | np                              | np                              | np                              |
| 65 ans et plus | np                              | np                              | np                              | np                              |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.


np : Données non présentées en raison des petits nombres.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

Proportion brute de la population de 15 ans et plus  
insatisfaite de sa vie sociale selon le sexe,  
Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (%)



Population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale selon le sexe et l'âge,  
Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                         |                                    | Reste du Québec <sup>4</sup>       |                                    |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>ajustée <sup>2</sup> | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 20 400                             | 5,6                                | 389 400                            | 6,5                                |
| Hommes         | 10 500                             | 5,7                                | 176 500                            | 5,9                                |
| Femmes         | 9 900                              | 5,4                                | 212 700                            | 7,0                                |
|                | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>brute <sup>3</sup>   | Population<br>estimée <sup>1</sup> | Proportion<br>brute                |
| 15-24 ans      | 2 200                              | 3,8 **                             | 34 200                             | 3,7 *                              |
| 25-44 ans      | 6 100                              | 5,1 *                              | 144 300                            | 7,3                                |
| 45-64 ans      | 8 600                              | 6,3                                | 156 500                            | 7,5                                |
| 65 ans et plus | 3 500                              | 6,6 *                              | 53 700                             | 5,5                                |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.


1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 37 000                          | 23,0                            | 40 000                          | 19,5                            |
| Hommes         | 15 800                          | 19,5                            | 13 500                          | 12,7                            |
| Femmes         | 21 100                          | 26,5                            | 26 500                          | 25,8                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
|                |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 15-24 ans      | 6 200                           | 27,0 *                          | 9 700                           | 27,6 *                          |
| 25-44 ans      | 12 500                          | 26,0                            | 11 400                          | 15,7 *                          |
| 45-64 ans      | 11 600                          | 18,6                            | 14 700                          | 19,9                            |
| 65 ans et plus | 6 600                           | 23,1                            | 4 200                           | 17,7 *                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.


\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.



**Population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 77 000                          | 21,0                            | 1 325 000                       | 22,2                            |
| Hommes         | 29 300                          | 15,8                            | 539 500                         | 18,2                            |
| Femmes         | 47 600                          | 26,0                            | 784 200                         | 26,0                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 16 000                          | 27,4                            | 221 200                         | 24,2                            |
| 25-44 ans      | 23 900                          | 19,8                            | 487 900                         | 24,5                            |
| 45-64 ans      | 26 200                          | 19,3                            | 430 900                         | 20,6                            |
| 65 ans et plus | 10 800                          | 20,6                            | 180 700                         | 18,7                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

  Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

**Population de 15 ans et plus ayant sérieusement songé au suicide au cours de sa vie selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total          | 19 600                          | 12,7                          | 16 400                          | 8,3                           |
| Hommes         | 11 800                          | 14,7                          | 8 800                           | 8,9 *                         |
| Femmes         | 7 900                           | 10,5                          | 7 600                           | 7,7 *                         |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> |
| 15-24 ans      | 2 100                           | 9,5 **                        | 1 900                           | 5,6 **                        |
| 25-44 ans      | 7 400                           | 16,7                          | 6 500                           | 9,5 *                         |
| 45-64 ans      | 8 300                           | 13,8                          | 6 900                           | 9,8 *                         |
| 65 ans et plus | 1 700                           | 5,9 **                        | 900                             | 4,1 **                        |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

**Population de 15 ans et plus ayant sérieusement songé au suicide au cours de sa vie selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                  |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| Total          | 36 000                          | 10,2                          | 579 200                         | 10,2             |
| Hommes         | 20 600                          | 11,5                          | 281 600                         | 9,9              |
| Femmes         | 15 400                          | 8,9                           | 297 500                         | 10,4             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| 15-24 ans      | 4 000                           | 7,1 **                        | 75 900                          | 8,6              |
| 25-44 ans      | 14 000                          | 12,3                          | 205 200                         | 10,9             |
| 45-64 ans      | 15 200                          | 11,6                          | 245 900                         | 12,4             |
| 65 ans et plus | 2 600                           | 5,1 *                         | 48 700                          | 5,1              |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

**Population de 15 ans et plus ayant tenté de se suicider au cours de sa vie selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)**

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total          | 7 700                           | 4,7 *                         | 8 000                           | 3,9 *                         |
| Hommes         | 2 200                           | 2,7 **                        | 2 800                           | 2,7 **                        |
| Femmes         | 5 500                           | 6,9 *                         | 5 300                           | 5,1 *                         |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> |
|                |                                 |                               |                                 |                               |
| 15-24 ans      | 1 300                           | 5,7 **                        | 1 100                           | 3,2 **                        |
| 25-44 ans      | 3 400                           | 7,1 *                         | 3 500                           | 4,8 **                        |
| 45-64 ans      | 2 400                           | 3,8 *                         | 2 600                           | 3,5 **                        |
| 65 ans et plus | 500                             | 1,7 **                        | 900                             | 3,7 **                        |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

**Population de 15 ans et plus ayant tenté de se suicider au cours de sa vie selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)**

|                | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                  |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| Total          | 15 700                          | 4,3                           | 266 300                         | 4,5              |
| Hommes         | 4 900                           | 2,7 *                         | 106 000                         | 3,6              |
| Femmes         | 10 800                          | 5,9                           | 160 000                         | 5,3              |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
|                |                                 |                               |                                 |                  |
| 15-24 ans      | 2 400                           | 4,2 **                        | 35 400                          | 3,8              |
| 25-44 ans      | 6 900                           | 5,7 *                         | 105 000                         | 5,3              |
| 45-64 ans      | 4 900                           | 3,6 *                         | 100 300                         | 4,8              |
| 65 ans et plus | 1 400                           | 2,6 **                        | 24 100                          | 2,5              |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

 Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.






STATUT PONDÉRAL ET  
ACTIONS ENTREPRISES  
CONCERNANT  
SON POIDS

# Statut pondéral et actions entreprises concernant son poids

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus se percevant avec un excès de poids selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 62 900                          | 38,4                            | 85 200                          | 42,0                            |
| Hommes         | 30 400                          | 36,5                            | 39 700                          | 38,5                            |
| Femmes         | 32 500                          | 40,4                            | 45 500                          | 45,4                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
|                |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 15-24 ans      | 2 500                           | 11,0 **                         | 6 500                           | 18,7 *                          |
| 25-44 ans      | 17 900                          | 38,2                            | 29 400                          | 41,9                            |
| 45-64 ans      | 31 700                          | 50,8                            | 38 700                          | 52,5                            |
| 65 ans et plus | 10 800                          | 38,0                            | 10 600                          | 44,1                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.



Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.



Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Statut pondéral et actions entreprises concernant son poids

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus se percevant avec un excès de poids selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 148 200                         | 40,5                            | 2 265 200                       | 38,3                            |
| Hommes         | 70 100                          | 37,7                            | 1 072 900                       | 36,5                            |
| Femmes         | 78 000                          | 43,2                            | 1 191 900                       | 40,2                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 9 000                           | 15,6 *                          | 150 800                         | 16,6                            |
| 25-44 ans      | 47 300                          | 40,4                            | 722 600                         | 37,4                            |
| 45-64 ans      | 70 400                          | 51,7                            | 1 017 200                       | 48,7                            |
| 65 ans et plus | 21 400                          | 40,8                            | 373 800                         | 38,6                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.


3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Statut pondéral et actions entreprises concernant son poids

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus ayant essayé de perdre du poids au cours des six derniers mois selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                                 | RLS de Lanaudière-Sud           |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 28 300                          | 17,2                            | 44 400                          | 21,4                            |
| Hommes         | 11 600                          | 14,0                            | 16 500                          | 16,5                            |
| Femmes         | 16 700                          | 20,6                            | 27 800                          | 26,4                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   |
| 15-24 ans      | 3 000                           | 12,9 **                         | 6 000                           | 17,0 *                          |
| 25-44 ans      | 7 200                           | 15,0                            | 16 300                          | 22,5                            |
| 45-64 ans      | 14 800                          | 23,8                            | 17 600                          | 23,9                            |
| 65 ans et plus | 3 200                           | 11,4 *                          | 4 500                           | 18,6 *                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 % La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

\*\* : Coefficient de variation supérieur à 25 % La valeur de la proportion n'est présentée qu'à titre indicatif.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.


2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Statut pondéral et actions entreprises concernant son poids

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008



## Population de 15 ans et plus ayant essayé de perdre du poids au cours des six derniers mois selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                                 | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion ajustée <sup>2</sup> |
| Total          | 72 700                          | 19,6                            | 1 109 500                       | 18,5                            |
| Hommes         | 28 100                          | 15,4                            | 447 000                         | 15,1                            |
| Femmes         | 44 500                          | 24,0                            | 661 500                         | 22,0                            |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup>   | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute                |
| 15-24 ans      | 9 000                           | 15,4 *                          | 132 700                         | 14,5                            |
| 25-44 ans      | 23 500                          | 19,5                            | 404 900                         | 20,4                            |
| 45-64 ans      | 32 400                          | 23,8                            | 435 300                         | 20,9                            |
| 65 ans et plus | 7 700                           | 14,7                            | 133 400                         | 13,8                            |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

  Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

1 : Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.

2 : Proportion ajustée selon la structure par âge (15 à 24, 25 à 44, 45 à 64, 65 à 74, 75 ans et plus), sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 2008.

3 : Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.

4 : Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.

Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

# Statut pondéral et actions entreprises concernant son poids

Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2008

## Population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids (embonpoint + obésité) selon le sexe et l'âge, RLS de Lanaudière, 2008 (n et %)

|                | RLS de Lanaudière-Nord          |                               | RLS de Lanaudière-Sud           |                               |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> |
| Total          | 83 700                          | 55,0                          | 108 100                         | 57,2                          |
| Hommes         | 50 900                          | 65,8                          | 67 000                          | 69,6                          |
| Femmes         | 32 700                          | 43,6                          | 41 000                          | 44,3                          |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> |
|                |                                 |                               |                                 |                               |
| 18-24 ans      | 4 100                           | 27,8 *                        | 8 100                           | 38,2 *                        |
| 25-44 ans      | 25 200                          | 53,7                          | 38 600                          | 55,1                          |
| 45-54 ans      | 18 900                          | 56,2                          | 26 200                          | 59,2                          |
| 55-64 ans      | 18 200                          | 63,2                          | 20 600                          | 70,0                          |
| 65 ans et plus | 17 500                          | 61,3                          | 14 600                          | 60,9                          |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

## Population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids (embonpoint + obésité) selon le sexe et l'âge, Lanaudière et le reste du Québec, 2008 (n et %)

|                | Lanaudière                      |                               | Reste du Québec <sup>4</sup>    |                  |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>2</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
| Total          | 191 900                         | 56,2                          | 2 893 600                       | 52,1             |
| Hommes         | 118 000                         | 67,9                          | 1 712 100                       | 62,0             |
| Femmes         | 73 800                          | 44,0                          | 1 178 200                       | 42,2             |
|                | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute <sup>3</sup> | Population estimée <sup>1</sup> | Proportion brute |
|                |                                 |                               |                                 |                  |
| 18-24 ans      | 12 200                          | 34,0                          | 148 400                         | 26,4             |
| 25-44 ans      | 63 800                          | 54,5                          | 960 300                         | 49,7             |
| 45-54 ans      | 45 100                          | 57,9                          | 671 600                         | 57,4             |
| 55-64 ans      | 38 700                          | 66,6                          | 564 600                         | 61,6             |
| 65 ans et plus | 32 000                          | 61,1                          | 551 000                         | 56,9             |

Des tests statistiques ont été effectués sur l'ensemble des données du tableau.

- Valeur significativement différente entre les sexes à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente à celle de l'autre territoire, au seuil de 5 %.
- Valeur significativement différente de celles de tous les autres groupes d'âge à l'intérieur d'un même territoire, au seuil de 5 %.

\* : Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur de la proportion doit donc être interprétée avec prudence.

- Population estimée arrondie à la centaine. Puisque les non-répondants partiels ont été répartis pour le calcul des estimations de la population, elles ne doivent pas être additionnées.
  - Le résultat des tests statistiques entre les proportions brutes doit être interprété avec prudence. La présence ou l'absence de différence significative pourrait résulter d'une structure par sexe ou âge différente entre les populations concernées.
  - Il peut y avoir des différences significatives entre les groupes d'âge. Toutefois, seules les valeurs significativement différentes de celles de tous les autres groupes d'âge sont identifiées.
  - Les proportions selon le sexe et le groupe d'âge n'ont pas été comparées entre elles pour le reste du Québec. Ces comparaisons n'ont été faites que pour Lanaudière.
- Source : INSPQ, Infocentre de santé publique, fichier maître de l'Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2008, Institut de la statistique du Québec, novembre 2010.

## RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

CAMIRAND, Hélène, Francine BERNÈCHE, Linda CAZALE, Renée DUFOUR, Jimmy BAULNE et autres. *L'Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 : pour en savoir plus sur la santé des Québécois*, Québec, Institut de la statistique de Québec, 2010, 205 p.

TRAORÉ, Issouf, Hélène CAMIRAND et Jimmy BAULNE. *Enquête québécoise sur la santé de la population, 2008 : analyse des données régionales. Recueil statistique*, Québec, Institut de la statistique du Québec, 2010, 878 p.







**Agence de la santé  
et des services sociaux  
de Lanaudière**

**Québec**

