

## Mortalité selon la cause Bas-Saint-Laurent, 2000 à 2003

Bon an mal an, selon les chiffres de 2000 à 2003, 1695 personnes décèdent annuellement dans le Bas-Saint-Laurent, ce qui correspond à un taux ajusté de 694,4 décès par tranche de 100 000 habitants, soit un taux moins élevé que celui enregistré au Québec (737,3).<sup>1</sup>

Les hommes enregistrent un taux de mortalité passablement plus élevé que celui des femmes, soit 741,1 contre 648,9 sur 100 000 personnes. Comparativement à la population masculine et féminine du Québec, dans les deux cas, les taux de mortalité respectifs sont plus faibles dans la région.

Les deux principales causes de mortalité, le cancer et les maladies de l'appareil circulatoire, sont responsables de 61 % de tous les décès enregistrés au Bas-Saint-Laurent. Les taux de mortalité ajustés selon l'âge pour ces deux types de maladies dans la région sont plus faibles que ceux du Québec. Pour ce qui est de la mortalité par tumeur, les taux sont particulièrement faibles dans les MRC de Rivière-du-Loup, Kamouraska et Rimouski-Neigette. Quant aux taux associés à la mortalité causée par les maladies de l'appareil circulatoire, Rivière-du-Loup se démarque avec un taux significativement plus bas que celui du Québec.

Les maladies de l'appareil respiratoire, principalement les maladies pulmonaires obstructives chroniques, constituent la troisième cause de mortalité dans la région, et ce, avec un taux ajusté de 63,4 décès sur 100 000 habitants (163 décès en moyenne par année). À ce chapitre, le taux de la région est plus élevé que celui de la province (58,5). Les maladies de l'appareil respiratoire touchent davantage les hommes que les femmes (78,3 contre 49,0 sur 100 000).

Les maladies du système nerveux (ex. : maladie d'Alzheimer) et les maladies endocriniennes (ex. : diabète), représentent pour leur part les quatrième et cinquième plus grandes causes de mortalité dans la région. Tandis que le taux ajusté de mortalité des maladies du système nerveux est plus faible dans la région qu'au Québec (32,3 contre 40,6), le taux pour les maladies endocriniennes se situe dans le même ordre de grandeur (30,0 contre 31,9).

Le taux de mortalité par traumatisme non intentionnel (ex. : accident de la route) est plus élevé dans la région qu'au Québec (32,0 contre 25,9). Les hommes sont particulièrement touchés par cette cause de décès, ils enregistrent au Bas-Saint-Laurent un taux de 40,8 sur 100 000 (Québec : 31,4).

<sup>1</sup> Il est à noter que c'est l'ajustement selon l'âge de ce taux qui a pour effet de le faire passer sous la barre du taux québécois. En effet, sans cet ajustement, le taux de mortalité serait plus élevé dans la région, et ce, essentiellement en raison du fait que la population du Bas-Saint-Laurent est plus âgée que celle du Québec, voir la définition du taux de mortalité à la dernière page de ce document.

**Nombre moyen annuel de décès et taux ajusté de mortalité (pour 100 000 habitants) selon la cause initiale du décès, territoire de MRC, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2000 à 2003**

Territoire de MRC	Tumeurs		Appareil circulatoire		Appareil respiratoire		Maladies du système nerveux	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	56	231,7	51	200,2	22	80,5 (+)	10	39,7
Matane	69	248,5	55	193,0	15	50,7	12	43,8
La Mitis	62	254,0	53	205,0	15	54,6	9	*36,1
Rimouski-Neigette	122	216,4 (-)	117	206,8	39	69,9 (+)	12	20,5 (-)
Les Basques	32	219,4	29	182,9	9	*55,0	6	*34,2
Rivière-du-Loup	74	195,0 (-)	77	189,7 (-)	27	65,4	10	26,5 (-)
Témiscouata	57	213,5	56	204,9	19	65,7	12	42,8
Kamouraska	57	194,0 (-)	63	204,2	18	55,0	10	33,1
<b>Bas-Saint-Laurent</b>	528	220,0 (-)	501	199,6 (-)	163	63,4 (+)	80	32,3 (-)
<b>Québec</b>	17529	237,0	16369	221,3	4325	58,5	3003	40,6

(suite)

Territoire de MRC	Maladies endocriniennes		Traumatismes non intentionnels		Ensemble des causes	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	8	*30,0	8	*39,7	180	729,8
Matane	7	*25,6	8	*30,4	204	738,8
La Mitis	4	*16,8 (-)	8	*36,7	185	743,6
Rimouski-Neigette	20	35,5	14	24,9	383	681,5 (-)
Les Basques	4	*23,7	4	*31,8	101	672,3
Rivière-du-Loup	9	*21,4 (-)	12	31,3	250	640,9 (-)
Témiscouata	13	49,4 (+)	11	44,6 (+)	223	847,0 (+)
Kamouraska	10	33,4	8	*28,0	210	711,3
<b>Bas-Saint-Laurent</b>	74	30,0	71	32,0 (+)	1695	694,4 (-)
<b>Québec</b>	2362	31,9	1915	25,9	54542	737,3


(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 0,05.

\* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence

-- Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est pas présentée.

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000 à 2003

**Répartition des décès selon la cause initiale, Bas-Saint-Laurent, 2000-2003**



**Nombre moyen annuel de décès et taux ajusté de mortalité (pour 100 000 habitants) selon la cause initiale du décès, population de sexe masculin, territoire de MRC, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2000 à 2003**

Territoire de MRC	Tumeurs		Appareil circulatoire		Appareil respiratoire		Maladies du système nerveux	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	33	259,6	25	188,2	17	125,0 (+)	4	*29,6
Matane	42	297,4	32	220,1	9	*60,1	6	*40,8
La Mitis	35	272,3	29	209,2	10	69,9	4	*31,8
Rimouski-Neigette	59	217,1 (-)	57	212,2	22	82,3 (+)	6	*20,9 (-)
Les Basques	18	230,4	16	188,2	5	*61,2	2	--
Rivière-du-Loup	39	210,5 (-)	39	200,3	15	73,9	4	*23,5
Témiscouata	33	234,1	29	196,4	14	90,5 (+)	6	*40,7
Kamouraska	37	245,3	30	188,1	10	60,4	4	*25,2
<b>Bas-Saint-Laurent</b>	294	242,3 (-)	256	202,7 (-)	102	78,3 (+)	36	28,7
<b>Québec</b>	9370	256,9	8098	222,0	2316	63,5	1136	31,2

(suite)

Territoire de MRC	Maladies endocriniennes		Traumatismes non intentionnels		Ensemble des causes	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	3	*25,8	6	*57,9 (+)	102	800,4
Matane	3	*20,7	5	*43,2	113	811,7
La Mitis	2	-- (-)	5	*50,8	99	763,8
Rimouski-Neigette	10	37,4	8	*29,7	193	721,8
Les Basques	1	-- (-)	2	--	53	694,9
Rivière-du-Loup	5	*23,8	6	*28,5	131	692,8
Témiscouata	7	*45,4 (+)	7	*54,4 (+)	112	784,3
Kamouraska	5	*35,6	5	*32,4	105	682,9
<b>Bas-Saint-Laurent</b>	35	28,5	44	40,8 (+)	906	741,1
<b>Québec</b>	1087	29,8	1146	31,4	27692	759,2


(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 0,05.

\* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence

-- Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est pas présentée.

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000 à 2003

**Répartition des décès selon la cause initiale, population de sexe masculin, Bas-Saint-Laurent, 2000-2003**



**Nombre moyen annuel de décès et taux ajusté de mortalité (pour 100 000 habitants) selon la cause initiale du décès, population de sexe féminin, territoire de MRC, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2000 à 2003**

Territoire de MRC	Tumeurs		Appareil circulatoire		Appareil respiratoire		Maladies du système nerveux	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	23	204,5	26	211,9	5	*37,3	6	*49,6
Matane	27	200,9	23	166,7 (-)	6	*41,7	7	*46,7
La Mitis	28	236,2	25	200,9	5	*39,8	5	*40,3
Rimouski-Neigette	63	215,8	60	201,5	17	57,8	6	*20,1 (-)
Les Basques	14	208,7	14	177,7	4	*48,9	4	*46,3
Rivière-du-Loup	35	179,9 (-)	38	179,5 (-)	12	57,1	6	*29,4 (-)
Témiscouata	24	193,4	27	213,1	5	*41,7	6	*44,7
Kamouraska	20	144,2 (-)	33	219,8	8	*49,7	6	*40,7
<b>Bas-Saint-Laurent</b>	234	198,2 (-)	245	196,7 (-)	61	49,0	44	35,8 (-)
<b>Québec</b>	8159	217,6	8271	220,6	2009	53,6	1866	49,8

(suite)

Territoire de MRC	Maladies endocriniennes		Traumatismes non intentionnels		Ensemble des causes	
	Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
La Matapédia	4	*34,1	3	*22,0	78	661,1
Matane	4	*30,4	2	--	91	667,8
La Mitis	2	--	3	*23,0	87	724,0
Rimouski-Neigette	10	33,7	6	*20,2	190	642,3 (-)
Les Basques	3	*34,9	2	--	48	650,4
Rivière-du-Loup	4	*19,2 (-)	6	*34,0 (+)	120	590,4 (-)
Témiscouata	7	*53,3 (+)	4	*35,0 (+)	112	907,9 (+)
Kamouraska	5	*31,3	3	*23,7	105	738,8
<b>Bas-Saint-Laurent</b>	39	31,5	28	23,5	790	648,9 (-)
<b>Québec</b>	1276	34,0	769	20,5	26850	716,1


(-)(+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 0,05.

\* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence

-- Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est pas présentée.

Source : MSSS, Fichier des décès, 2000 à 2003

**Répartition des décès selon la cause initiale, population de sexe féminin, Bas-Saint-Laurent, 2000-2003**



### **Définition**

Les taux de mortalité présentés dans cette fiche thématique correspondent au rapport, pour les années 2000 à 2003, entre le nombre annuel moyen de décès, pour une cause spécifique, et la population totale enregistrée en 2001. Ces taux sont présentés sur la base de 100 000 personnes.

Les taux sont ajustés selon la structure par âge de la population du Québec en 2001. Cet ajustement des taux permet d'annuler l'influence des différentes structures d'âge des territoires et ainsi de pouvoir comparer les résultats obtenus entre eux.

\* \* \* \* \*

### **Réalisation**

Équipe de surveillance de l'état de santé de la population de l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Traitement des données et rédaction : *Jean-Pierre St-Cyr*

Relecture du document : *Roger Dubé*

Révision grammaticale et mise en pages : *Diane Morin*

Mise à jour : novembre 2006