

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES : TOUS LES MÉDECINS, PHARMACIENS ET RÉSIDENTS

EXPÉDITEURS : Nathalie Lussier MD, microbiologiste-infectiologue
Comité de pharmacologie
et
Carole Delorme, pharmacienne

DATE : Le 20 février 2012

OBJET : **Erratum** Guide d'utilisation des antibiotiques
de l'Hôpital Charles-Le Moyne, 5^e édition, Septembre 2011

Veillez prendre note des corrections suivantes qui doivent être apportées au Guide d'utilisation des antibiotiques de l'Hôpital Charles-Le Moyne, 5^e édition, Septembre 2011.

Page 49 : Nom de commerce devrait être Cubicin (au lieu de Doribax).

Page 169 : La dose pour le Méropénem de 2 g devrait être réservée pour les infections du SNC.

AJUSTEMENTS POSOLOGIQUES EN INSUFFISANCE RÉNALE (suite)						
Nom générique	Dose usuelle si fonction rénale normale	Clairance créatinine (mL/min)				
		80 – 50	49 – 30	29 – 10	< 10	Hémodialyse
Méropénem	1 g IV q 8h SNC 2 g IV q 8h	1 g IV q 8h SNC 2 g IV q 8h	1 g IV q 12h SNC 2 g IV q 12h	0,5 g IV q 12h SNC 1 g IV q 12h	0,5 g IV q 24h SNC 1 g IV q 24h	0,5 g IV post-dialyse, puis q 24h SNC 1 g IV post-dialyse, puis q 24h

Page 172 : Oseltamivir, traitement 30 mg x 1 dose.

Page 177 : Lamivudine, diminuer la dose à 150 mg die pour Clcr entre 49-30 (mL/min).

Nous vous remercions de votre compréhension.