



AMÉLIORER LA QUALITÉ DES FLEURS ANNUELLES EN MULTICELLULES

À tout problème, il y a une solution. Voici donc des trucs et précautions à prendre afin d'améliorer la production de fleurs annuelles en multicellules.

Quelques problématiques en serre

1. Dégouttage de l'eau de condensation des polyéthylènes

Lors des périodes de températures extérieures froides (environ -12°C et moins), les polyéthylènes accumulent de l'eau de condensation (froid sur chaud) qui dégoutte particulièrement aux niveaux des plis des polyéthylènes et tombe sur les plantes.

Solutions

- Utiliser du polyéthylène antibuée afin de réduire considérablement ce phénomène. Toutefois, après 1 à 2 années d'utilisation, l'effet antibuée devient moins efficace.
- Mettre une bande de polyéthylène à l'intérieur des serres entre chaque arche de la toiture.
- Produire les cultures sur tables sous des tunnels de polyéthylène.
- Pour ceux qui ont des « fan-jet », diriger si possible les orifices d'air vers la zone de dégouttement du toit.

2. Apparition de tapis de racines sous les plateaux multicellulaires

Les tables en bois retiennent l'humidité et la croissance des racines se fait hors des cellules.

Solutions

- Utiliser des tables avec un dessus en treillis métallique (ex. : en Dramex).
- Si vous avez des tables à dessus de bois, placez les plateaux en culture sur des cabarets grillagés inversés ou sur des tuyaux (2,5 cm de diamètre) de PVC noir attachés sur les tables.

3. Plateaux qui « débordent » de substrat ou recouverts d'une épaisseur excessive de vermiculite

Les plateaux trop remplis entraînent :

- La dissémination des algues et des maladies sur la surface entière du plateau.
- Un étalement des racines de cellules en cellules.
- Une faiblesse de la tige des plantules sous les cotylédons si la couche de vermiculite est trop épaisse.

Solutions

Lors du remplissage, s'assurer que chaque contour des cellules est bien dégagé. Si l'on utilise la vermiculite pour couvrir les semences, le contour de la cellule doit encore être dégagé.

4. Les algues et les mouches noires

Les algues apparaissent peu de temps après le semis surtout durant les mois de janvier et février. Elles peuvent être de couleur verte ou rouille. Les plateaux atteints montrent des zones de couleur verte ou rouille. Les algues peuvent étouffer les jeunes plantules dans le cas des cultures « longues » comme les bégonias et les lisianthus. Elles favorisent la prolifération des mouches noires et se dispersent dans les serres par l'air et l'eau d'irrigation.

Solutions

- Maintenir une atmosphère humide pour la germination des semences plutôt que d'arroser les semis superficiellement et trop fréquemment. En pratique, utiliser soit une chambre humide, soit un matériel synthétique non tissé vendu en bâches ou encore des tables recouvertes de tunnels de polyéthylène pour la germination des espèces lentes (ex. : Begonia).
- Au stade cotylédon, faire fluctuer la teneur en eau de la surface du substrat. Les plateaux dont la surface est toujours tenue assez humide ou mouillée présentent toujours une couverture d'algues plus importante.
- Dans un programme de fertilisation pour les multicellules, démarrer les applications d'engrais au stade cotylédon avec 50-75 ppm N (azote). Cela assurera une vitesse de croissance des plantules plus rapide que celle des algues
- Nettoyer les surfaces verdies par les algues (murs et planchers) avec des algicides homologués en serre (ex. : Chemprocide).
- Appliquer Agribrom à 15 ppm en continu. Très efficace contre les algues.
- Améliorer le drainage à l'intérieur et au pourtour des serres de façon à réduire l'humidité excessive du sol qui favorise la multiplication des mouches noires et des algues.
- Nettoyer les accumulations de vieux substrats sous les tables. Ce sont des foyers d'infestation de mouches noires. Par la suite, étendre environ 3 mm de chaux hydratée sous les tables et les planchers de ciment là où il y a eu des accumulations de substrat, de terre et d'algues.

Régie de culture de quelques annuelles

Stades de développement des plantules de multicellules :

Stade 1 : Germination et émergence de la racine (radicule). Stade 2 : Émergence et épanouissement des cotylédons. Stade 3 : Développement des vraies feuilles (1-5 feuilles). Stade 4 : Plants repiquables ou vendables, plus de 5 feuilles et endurcissement.

Note importante : Une température supérieure à 28 °C pendant le stade 1 entraîne une dormance des semences pour la majorité des espèces d'annuelles. Par la suite, la levée en serre (stade 2) sera très inégale. Visez 23 à 24 °C pour le stade 1.

Bégonia

- pH du substrat de 5,5 à 5,8. Salinité de 0,75 mS/cm au stade 1 et d'environ 1,25 ms/cm au stade 2 (test de sol selon la méthode maison 2:1, soit 2 volumes d'eau pour 1 volume de terreau).
- Température de sol de 24-25 °C pour les stades 1 et 2.
- Avec la semence enrobée, l'enrobage doit être toujours tenu humide durant le stade 1 pour obtenir une bonne levée.
- Au stade 1 et 2, arrosez avec un jet fin qui ne compactera pas le substrat afin d'éviter la croissance des algues.
- Lorsque la première vraie feuille est développée, réduisez la fréquence des arrosages.



Géranium

- Température de sol à 21-24 °C au stade 1.
- pH du substrat entre 6,2 et 6,5 durant tous les stades pour éviter les toxicités en fer et manganèse.
- Le géranium est sensible aux infections de *Pythium* aux stades 3 et 4 si le substrat est tenu détrempe ou trop sec et si la salinité est supérieure à 1,2 (test 2:1).

Impatiens

- Température de sol à 22-25 °C au stade 1.
- pH du substrat entre 6,2 à 6,5 durant tous les stades.
- Mort du bourgeon terminal à la fin du stade 2 et/ou début du stade 3 :

Causes possibles de la mort du bourgeon terminal :

- Carence de bore car le pH du substrat est supérieur à 6,3.
- Accumulation d'eau dans l'apex des plants causant un manque d'oxygène à la croissance de l'apex.
- Accumulation nocive d'éthylène naturelle dans la plantule si le substrat est tenu trop mouillé et frais.

Pensée

- Température de sol à 18-24 °C au stade 1.
- pH du substrat de 5,8 à 6,0 durant tous les stades.
- Les feuilles déformées aux stades 3 et 4 sont peut-être le signe d'un manque de calcium; ne pas négliger les apports en calcium dans la fertilisation.
- Utiliser des plateaux multicellulaires neufs pour éviter les problèmes de *Thielaviopsis* (pourriture noire des racines).

Pétunia

- Température de sol à 22-24 °C au stade 1.
- pH du substrat de 5,8 à 6,2 pour tous les stades.
- Au stade 2, tenir le substrat humide autour de la semence mais faire fluctuer son humidité. Cela augmente le pourcentage de plants transplantables.
- Utiliser des plateaux neufs pour éviter les problèmes de *Thielaviopsis*.

Texte rédigé par :

Michel Senécal, agronome, Centre de service horticole de Laval du MAPAQ

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES CULTURES EN SERRES

LIETTE LAMBERT, agronome - Avertisseuse

Centre de services de Saint-Rémi, MAPAQ

118, rue Lemieux, Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

Téléphone : (450) 454-2210, poste 224 - Télécopieur : (450) 454-7959

Courriel : liette.lambert@agr.gouv.qc.ca

Édition et mise en page : Rémy Fortin, agronome et Cindy Ouellet, RAP

© **Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document**
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Bulletin d'information No 08 – cultures en serres – 17 février 2004

