

Les mortinaissances selon le poids à la naissance et la durée de grossesse en Mauricie-Centre-du-Québec, 1994-1998 et 1999-2003




Tableau 1				
Nombre moyen et proportion de mortinaissances selon le poids à la naissance, Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 1994-1998 et 1999-2003				
	Moyenne 1994-1998		Moyenne 1999-2003	
	N	%	N	%
Québec				
Moins de 2500 grammes	239	71,3	210	70,2
2500 grammes et plus	97	28,8	89	29,8
Total	336		300	
Région				
Moins de 2500 grammes	14	72,9	10	66,7
2500 grammes et plus	5	27,1	5	33,3
Total	19		16	

Source : MSSS, Fichier des mortinaissances 1994 à 2003

Selon le poids à la naissance

Environ sept mortinaissances sur dix sont de petit poids (moins de 2500 grammes). Soit près de 12 fois plus que pour les naissances vivantes. Ce ratio demeure stable entre les deux périodes observées et les données régionales et québécoises ne diffèrent pas (tableau 1).

Figure 1
Proportion de mortinaissances de moins de 2500 grammes selon l'âge de la mère,
Québec, 1994-1998 et 1999-2003



Source : MSSS, Fichier des mortinaissances 1994 à 2003

Comme l'indiquent les données québécoises, les mort-nés de mères de moins de 20 ans sont en plus forte proportion d'insuffisance pondérale (figure 1).


Selon la durée de grossesse

Tableau 2				
Nombre moyen et proportion de mortinaissances selon la durée de grossesse, Mauricie et Centre-du-Québec et Québec, 1994-1998 et 1999-2003				
	Moyenne 1994-1998		Moyenne 1999-2003	
	N	%	N	%
Québec				
Moins de 37 semaines	236	69,7	211	70,6
37 semaines et plus	513	30,3	88	29,4
Total	339		300	
Région				
Moins de 37 semaines	14	69,4	10	64,1
37 semaines et plus	6	30,6	6	35,9
Total	20		16	

Source : MSSS, Fichier des mortinaissances 1994 à 2003

À l'instar du poids à la naissance, on constate que près de sept mortinaissances sur dix sont prématurées (tableau 2). Comme l'indiquent les valeurs de l'ensemble du Québec, les mortinaissances survenues chez des mères de moins de 20 ans affichent les proportions les plus élevées de prématurité (figure 2).

Figure 2
Proportion de mortinaissances de moins de 37 semaines de grossesse selon l'âge de la mère, Québec, 1994-1998 et 1999-2003



Source : MSSS, Fichier des mortinaissances 1994 à 2003

Selon le poids à la naissance et la durée de grossesse

Tableau 3 Nombre moyen et proportion de mortinaissances selon la prématurité et l'insuffisance pondérale, Mauricie et Centre-du-Québec, 1994-1998 et 1999-2003								
	Moyenne 1994-1998				Moyenne 1999-2003			
	Moins de 2500 grammes		2500 grammes et plus		Moins de 2500 grammes		2500 grammes et plus	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Québec								
Moins de 37 semaines	217	92,8	17	7,2	194	92,6	16	7,4
37 semaines et plus	21	20,8	80	79,2	17	18,8	73	81,2
Total	238	71,3	97	28,8	211	70,6	88	29,4
Région								
Moins de 37 semaines	13	95,5	1	4,5	9	86,0	1	14,0
37 semaines et plus	1	20,7	5	79,3	2	32,1	4	67,9
Total	14	72,9	5	27,1	10	64,1	5	35,9

Source : MSSS, Fichier des mortinaissances 1994 à 2003

Sans surprise plus de neuf mort-nés prématurés sur dix pèsent moins de 2500 grammes (tableau 3). Toutefois, parmi les mort-nés non prématurés, près d'un sur cinq pèse moins de 2 500 grammes au Québec (21 % en 1994-1998 et 19 % en 1999-2003). Les données régionales vont dans ce sens et ne diffèrent pas de celles du Québec, malgré un écart qui apparaît marqué en 1999-2003.