Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Guide d'identification des mauvaises herbes du Québec

par Claude J. Bouchard et Romain Néron, avec la collaboration de Louise Guay
Centre Arico, Direction des services technologiques, MAPAQ



Le guide regroupe les caractères les plus utiles pour l'identification de quelque 120 plantes que l'on retrouve fréquemment dans les cultures, du stade plantule au stade adulte.

Près de 650 photographies en couleurs sont intégrées aux descriptions des mauvaises herbes. La présence des clés simples et visuelles facilite le repérage des espèces qui peuvent correspondre au spécimen inconnu à identifier.

En bref, le guide met l'accent sur la reconnaissance des plantes avant la maturité.

Le guide est édité par le Conseil des productions végétales du Québec inc. (CPVQ).

Pour commander:
Distribution de livres UNIVERS

par la poste
845, rue Marie-Victorin
Saint-Nicolas (Québec)
G7S 3S8
par teléphone :
1-(418) 831-74474
1-800-859-7474 (extérieur de Québec)
par télécopieur : (418) 831-4021

Tables des prix:


1 à 24 copies.....$16.00 (l'unité)
25 à 49 copies.....$15.00 (l'unité)
50 et plus copies.....$14.00 (l'unité)

Frais de manutention (valides pour toute livraison au Canada seulement): 2$ pour un exemplaire, 3$ pour deux exemplaires ou plus.

Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 06 décembre 1999



Centre ARICO

Direction des services technologiques
MAPAQ

Centre Arico | Index des noms scientifiques |

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec

(Les fiches sont tirées du Guide d'identification des mauvaises herbes du Québec)

Index des noms communs

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Index des noms communs
Abutilon
Achillée mille-feuille
Agrostide blanche
Alpiste roseau
Amarante à racine rouge
Amarante de Powell
Armoise vulgaire
Arroche étalée
Arroche hastée
Asclépiade commune
Asclépiade de Syrie
Avoine
Barbarée vulgaire
Bident penché
Blé
Bourse-à-pasteur
Bouton-d'or
Brome inerme
Camomille des chiens

Carotte sauvage
Céraiste vulgaire
Chardon des champs
Chardon vulgaire
Chénopode blanc
Chénopode glauque
Chiendent
Chou gras
Dactyle pelotonné
Digitaire astringente
Digitaire sanguine
Échinochloa pied-de-coq
Euphorbe réveille-matin
Fétuque rouge
Fléole des prés
Folle avoine
Galinsoga cilié
Gnaphale des vases
Grande bardane
Herbe à dinde
Herbe à poux (petite herbe à poux)
Herbe à la puce
Herbe Saint-Jean
Ivraie multiflore
Ivraie vivace
Laiteron des champs
Laiteron des champs glabre
Laiteron potager
Laiteron rude
Laitue scariole
Lampourde glouteron
Léersie faux-riz
Lépidie densiflore
Linaire vulgaire

Liseron des champs
Liseron des haies
Luzerne
Lychnide blanche
Marguerite blanche
Matricaire inodore
Matricaire odorante
Mil
Morelle noire
Morelle noire de l’Est
Morelle poilue
Moutarde des champs
Moutarde des oiseaux
Muhlenbergie feuillée
Onagre bisannuelle
Orge
Ortie royale
Oxalide d’Europe
Panic capillaire
Panic d’automne dressé
Panic d’automne géniculé
Panic millet
Patience crépue
Pâturin annuel
Pâturin des prés
Pâturin du Kentucky
Pétards
Petite bardane
Petite herbe à poux
Petite oseille
Phragmite commun
Pissenlit
Plantain majeur
Potentille de Norvège

Potentille dressée
Pourpier potager
Prèle des champs
Radis sauvage
Ray-grass anglais
Ray-grass d'Italie
Renoncule âcre
Renoncule rampante
Renouée coriace
Renouée des oiseaux
Renouée liseron
Renouée persicaire
Renouée poivre-d'eau
Renouée scabre
Ricinelle rhomboïde
Rorippe d'Islande
Rorippe sylvestre
Roseau commun
Salsifis des prés
Sarrasin commun
Seigle
Séneçon vulgaire
Sétaire géante
Sétaire glauque
Sétaire verte
Sétaire verticillée
Silène enflé
Silène noctiflore
Souchet comestible
Spargoute des champs
Stellaire à feuilles de graminée
Stellaire moyenne
Surette
Tabouret des champs

Toques
Trèfle alsike
Trèfle blanc
Trèfle rouge
Tussilage pas-d'âne
Vélar fausse giroflée
Verge d'or à feuilles de graminée
Verge d'or du Canada
Vergerette du Canada
Vesce jargeau




Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 21 juillet 2000

La caverne d'Alibaba des Webmestres Francophones



Centre ARICO

Direction des services technologiques
MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs |

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec

(Les fiches sont tirées du Guide d'identification des mauvaises herbes du Québec)

Index des noms scientifiques

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Index des noms scientifiques
Abutilon theophrasti
Acalypha rhomboidea
Achillea lanulosa
Achillea millefolium
Agropyron repens
Agrostis alba var. major
Agrostis gigantea
Amaranthus powellii
Amaranthus retroflexus
Ambrosia artemisiifolia
Anthemis cotula
Arctium lappa
Arctium minus
Artemisia vulgaris
Asclepias syriaca
Atriplex prostrata
Atriplex patula
Atriplex patula var. hastata
Avena fatua
Avena sativa
Barbarea vulgaris

Bidens cernua
Brassica campestris
Brassica kaber var. pinnatifida
Brassica rapa
Bromus inermis
Capsella bursa-pastoris
Cerastium fontanum
Cerastium vulgatum
Chenopodium album
Chenopodium glaucum
Chrysanthemum leucanthemum
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Convolvulus arvensis
Convolvulus sepium
Cyperus esculentus
Dactylis glomerata
Daucus carota
Digitaria ischaemum
Digitaria sanguinalis
Echinochloa crusgalli
Elytrigia repens
Equisetum arvense
Erigeron canadensis
Erysimum cheiranthoides
Euphorbia helioscopia
Fagopyrum esculentum
Festuca rubra
Galeopsis tetrahit
Galinsoga ciliata
Galinsoga quadriradiata
Gnaphalium uliginosum
Hordeum vulgare
Lactuca scariola
Lactuca serriola
Leersia oryzoides
Lepidium densiflorum

Linaria vulgaris
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lychnis alba
Matricaria maritima
Matricaria matricarioides
Matricaria perforata
Medicago sativa
Muhlenbergia frondosa
Oenothera biennis
Oxalis europaea
Oxalis stricta
Panicum capillare
Panicum dichotomiflorum var. dichotomiflorum
Panicum dichotomiflorum var. geniculatum
Panicum miliaceum
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phragmites australis
Phragmites communis
Plantago major
Poa annua
Poa pratensis
Polygonum achoreum
Polygonum aviculare
Polygonum convolvulus
Polygonum hydropiper
Polygonum persicaria
Polygonum scabrum
Portulaca oleracea
Potentilla norvegica
Potentilla recta
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum
Rhus radicans var. radicans

Rhus radicans var. rydbergii
Rorippa islandica
Rorippa sylvestris
Rumex acetosella
Rumex crispus
Secale cereale
Senecio vulgaris
Setaria faberii
Setaria glauca
Setaria verticillata
Setaria viridis
Silene alba
Silene cucubalus
Silene noctiflora
Silene vulgaris
Sinapis arvensis
Solanum nigrum
Solanum ptycanthum
Solanum sarrachoides
Solidago canadensis
Solidago graminifolia
Sonchus arvensis
Sonchus arvensis var. glabrescent
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Spergula arvensis
Stellaria graminea
Stellaria media
Taraxacum officinale
Thlaspi arvense
Tragopogon pratensis
Trifolium hybridum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Triticum aestivum
Tussilago farfara
Vicia cracca

Xanthium strumarium

Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 21 juillet 2000

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Abutilon

Velvetleaf

Abutilon theophrasti Medic., espèce annuelle.






Plantule

Plantule à tige et à feuilles alternes. Toutes les parties recouvertes de poils soyeux. (Odeur fétide .)

Cotylédons

Orbiculaires ou en forme de pique, 10 à 15 mm de longueur, pétiole aussi long que le limbe.

Nombreux poils courts et glanduleux surtout à la marge ; nervures ramifiées, mais peu visibles.

Feuilles

Toutes semblables : grandes (7 à 20 cm de longueur), base en cœur, sommet en pointe, bord grossièrement denté. Velouteuses au toucher, recouvertes de poils souples.

Nervures palmées (partent de la base et rayonnent).

Pétiole très pubescent, aussi long que le limbe.




Plante adulte

Plante vigoureuse pouvant atteindre plus de 2 m de hauteur.

Tige dressée, ramifiée au sommet, finement velue.

Feuilles pouvant devenir très grandes : plus de 50 cm de longueur.

Fleurs et fruits

Fleurs jaunes ou jaune orangé, solitaires ou en petits bouquets à l'aisselle des feuilles.

Fruits velus composés de 12 à 15 follicules soudés (" couronne de roi "), noirâtres à maturité ; persistent sur les tiges dénudées en fin de saison.




Abutilon





Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Abutilon

Velvetleaf

Abutilon theophrasti Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Abutilon

Velvetleaf

Abutilon theophrasti Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Abutilon

Velvetleaf

Abutilon theophrasti Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Abutilon

Velvetleaf
Abutilon theophrasti Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Abutilon

Velvetleaf

Abutilon theophrasti Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Abutilon

Velvetleaf

Abutilon theophrasti Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Abutilon

Velvetleaf

Abutilon theophrasti Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Abutilon

Velvetleaf

Abutilon theophrasti Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Abutilon

Velvetleaf

Abutilon theophrasti Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |


Les feuilles sont définies selon deux caractéristiques essentiels de leur morphologie:

1. le degré de découpure foliaire (les groupes morphologiques de feuilles)
2. le rapport longueur/largeur du limbe (les formes de feuilles).

Les groupes morphologiques de feuilles



Les formes de feuilles



© Guide d'identification des mauvaises herbes du Québec MAPAQ

Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation


© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 06 décembre 1999

Les formes de cotylédons


Formes communes

Vérifier le rapport longueur/largeur (L/l) du limbe







Orbiculaire : longueur égale à la largeur



Oblongue : longueur entre 1 fois et 3 fois la largeur



Allongée : longueur entre 3 fois et 8 fois la largeur



Linéaire : longueur plus de 8 fois la largeur


Formes remarquables



Orbiculaire-auriculée



Coeur



Pique



Losange



Carrée

© Guide d'identification des mauvaises herbes du Québec MAPAQ

Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 06 décembre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ricinelle rhomboïde

Three-seeded mercury
Acalypha rhomboidea Raf., espèce annuelle.




Plantule
Plantule à tige, les deux premières feuilles opposées, les suivantes alternes.
Cotylédons
De forme orbiculaire, 3 à 10 mm de longueur, nervures bien visibles, sommet légèrement échancré, pétiole distinct.
Feuilles
Toutes semblables : dentées, ovales à légèrement allongées, nervures bien visibles, pubescence moyenne, poils plutôt couchés.
Les feuilles ont une apparence vert bronzé.



Plante adulte
Plante pubescente, poils en crochet (visibles à la loupe).
Tige dressée, souvent peu ramifiée, 10 à 60 cm de hauteur.
Fleurs verdâtres en petits groupes dans un organe feuillé au point d'attache des pétioles sur la tige.




Espèce semblable
Amarante de Powell (pl., vég.).



Ricinelle rhomboïde



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ricinelle rhomboïde

Three-seeded mercury
Acalypha rhomboidea Raf.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ricinelle rhomboïde

Three-seeded mercury
Acalypha rhomboidea Raf.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ricinelle rhomboïde

Three-seeded mercury
Acalypha rhomboidea Raf.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ricinelle rhomboïde

Three-seeded mercury
Acalypha rhomboidea Raf.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ricinelle rhomboïde

Three-seeded mercury
Acalypha rhomboidea Raf.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ricinelle rhomboïde

Three-seeded mercury
Acalypha rhomboidea Raf.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Amarante de Powell

Green pigweed
Amaranthus powellii S. Wats., espèce annuelle.



Plantule
Plantule à tige et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme allongée, 10 à 15 mm de longueur, nervure médiane bien visible.
Face inférieure souvent colorée de rouge-violet.
Feuilles
Premières feuilles : entières, arrondies-ovales, échancrées au sommet ; souvent colorées de rouge-violet à la face inférieure (comme les cotylédons), glabres.
Feuilles matures : entières à marge sinuée-ondulée, ovales, échancrées légèrement au sommet (on peut y voir un mucron prolongeant la nervure centrale), presque glabres.
Les feuilles sont d'un vert luisant souvent d'apparence rougeâtre ou cuivrée.







Plant végétatif et plante adulte
Plante presque glabre (l'amarante à racine rouge est densément pubescente).
Tige dressée, rougeâtre, ramifiée, 20 cm à 1,5 m de hauteur.
Fleurs (unisexuées) petites et verdâtres, regroupées en épis longs et grêles (comparativement à l'amarante à racine rouge) formant une sorte de panicule plutôt lâche au sommet de la tige ou des rameaux.



Espèces semblables
Amarante à racine rouge (pl., vég., fl.), morelle noire de l'Est (pl.), ricinelle rhomboïde (pl.).

Amarante de Powell



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 04 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Amarante de Powell

Green pigweed
Amaranthus powellii S. Wats., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Amarante de Powell

Green pigweed
Amaranthus powellii S. Wats., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Amarante de Powell

Green pigweed
Amaranthus powellii S. Wats., espèce annuelle.



Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Amarante de Powell

Green pigweed
Amaranthus powellii S. Wats., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Amarante de Powell

Green pigweed
Amaranthus powellii S. Wats., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Amarante à racine rouge

Redroot pigweed
Amaranthus retroflexus L., espèce annuelle.



Plantule

Plantule à tige et à feuilles alternes.

Cotylédons

De forme allongée, 10 à 15 mm de longueur, nervure médiane bien visible.
Face inférieure souvent colorée de rouge-violet.





Feuilles

Premières feuilles : entières, arrondies-ovales, échancrées au sommet, légèrement pubescentes; souvent colorées de rouge-violet à la face inférieure (comme les cotylédons).
Feuilles matures : entières à marge sinuée-ondulée, ovales, échancrées légèrement au sommet (on peut y voir un mucron prolongeant la nervure centrale), pubescentes (poils fins, couchés, souvent frisés).
Les feuilles sont vert mat.





Plante adulte

Plante pubescente, poils fins, couchés, souvent frisés (l'amarante de Powell est presque glabre).
Tige dressée, très ramifiée, 20 cm à 1,5 m de hauteur.
Fleurs (unisexuées) petites et verdâtres, regroupées en épis compacts formant une sorte de panicule dense au sommet de la tige ou des rameaux.



Espèces semblables

Amarante de Powell (pl., vég., fl.), ricinelle rhomboïde (pl.).

Amarante à racine rouge



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 01 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Amarante à racine rouge

Redroot pigweed
Amaranthus retroflexus L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Amarante à racine rouge

Redroot pigweed
Amaranthus retroflexus L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Amarante à racine rouge

Redroot pigweed
Amaranthus retroflexus L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Amarante à racine rouge

Redroot pigweed
Amaranthus retroflexus L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Amarante à racine rouge

Redroot pigweed
Amaranthus retroflexus L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Amarante à racine rouge

Redroot pigweed
Amaranthus retroflexus L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle noire de l'Est

Eastern black nightshade
Solanum ptycanthum Dunal, espèce annuelle.




Plantule
Plantule à tige et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme oblongue à allongée, 10 à 15 mm de longueur, nervure médiane bien visible. Face inférieure souvent colorée de violet.
Feuilles
Premières feuilles : arrondies à ovales, bord du limbe entier ou avec quelques dents. Souvent partiellement colorées de violet à la face inférieure.
Feuilles matures : ovales (aussi en forme de losange), sinuées-dentées. Pétiole un peu foliacé : une lisière de limbe de chaque côté.
Les feuilles sont minces et presque glabres.



Plante adulte
Plante entièrement glabre. Tige dressée (peut atteindre 1 m de hauteur) ou affaissée et très ramifiée surtout dans le haut. Les feuilles de la tige sont souples et très minces.
Fleurs et fruits
Fleurs à 5 pétales blancs (découpés plus profondément que ceux de la morelle poilue) et à étamines jaunes soudées en tube. Les fleurs groupées par 3, 4 ou 5 sont supportées par des rayons partant tous du sommet de courts pédoncules (ombelle) qui s'insèrent directement sur la tige, comme des branches.
Les fruits sont des petites baies noires (à maturité) de 6 à 9 mm de diamètre. Le calice ne se développe pas avec le fruit. (Le fruit est poison.)





Espèces semblables
Morelle noire (pl., vég., fl.), morelle poilue (pl., vég., fl.), amarante de Powell (pl.).

Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 04 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle noire de l’Est

Eastern black nightshade
Solanum ptycanthum Dunal



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle noire de l’Est

Eastern black nightshade
Solanum ptycanthum Dunal



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle noire de l’Est

Eastern black nightshade
Solanum ptycanthum Dunal



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle noire de l’Est

Eastern black nightshade
Solanum ptycanthum Dunal



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle noire de l’Est

Eastern black nightshade
Solanum ptycanthum Dunal



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle noire de l’Est

Eastern black nightshade
Solanum ptycanthum Dunal



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle poilue

Hairy nightshade
Solanum sarrachoides Sendtner, espèce annuelle.















Cliquez pour agrandir

N.B. : espèce polymorphe, on peut distinguer deux types de populations dans nos régions : à feuilles entières et à feuilles dentées.

Plantule

Plantule à tige et à feuilles alternes.

Cotylédons

De forme oblongue à allongée, terminés en pointe, 10 à 15 mm de longueur. Présence de poils (terminés par des glandes).

Feuilles

Les premières feuilles, arrondies-ovales, sont entières ou presque.

Les feuilles matures sont de deux types :

1) feuilles entières d'une teinte vert foncé (font penser aux feuilles de l'amarante) ;

2) feuilles dentées de couleur vert pâle (font penser aux feuilles du chénopode).

Toutes ces feuilles sont de forme ovale et plutôt épaisses (les feuilles de la morelle noire de l'Est sont minces), elles portent aussi des poils glanduleux (feuilles légèrement collantes) et leur pétiole est un peu foliacé (une lisière de limbe de chaque côté).

Plante adulte

Tige très ramifiée qui atteint près de 1 m de hauteur. Dressée en début de saison, la tige est plus ou moins affaissée lorsqu'elle porte des fruits.

Les feuilles sont toujours épaisses, mais dentées ou entières selon le type de population de l'espèce en place.

La tige et les feuilles sont couvertes d'une pubescence dense et glanduleuse (collante).

Fleurs et fruits

Fleurs à 5 pétales blancs soudés sur environ la moitié de leur longueur et formant une étoile ; les étamines jaunes sont soudées en tube. Les fleurs sont groupées par 3, 4 ou 5, en grappes (en ombelle chez la morelle noire de l'Est)

au bout de courts pédoncules qui s’insèrent directement sur la tige, comme des branches.
Les fruits sont des petites baies vert brunâtre à brun foncé de 6 à 9 mm de diamètre. Les baies sont partiellement enveloppées dans le calice qui s’est développé avec la maturation du fruit.

Espèces semblables
Morelle noire de l’Est (pl., vég., fl.), amarante à racine rouge (pl.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle poilue

Hairy nightshade
Solanum sarrachoides Sendtner



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle poilue

Hairy nightshade
Solanum sarrachoides Sendtner



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle poilue

Hairy nightshade
Solanum sarrachoides Sendtner



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle poilue

Hairy nightshade
Solanum sarrachoides Sendtner



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle poilue

Hairy nightshade
Solanum sarrachoides Sendtner



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle poilue

Hairy nightshade
Solanum sarrachoides Sendtner



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle poilue

Hairy nightshade
Solanum sarrachoides Sendtner



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Achillée mille-feuille (herbe à dinde)

Yarrow


Achillea millefolium L. (incl. *Achillea lanulosa* Nutt.), espèce vivace.











Plantule

Plantule à rosette. Les deux premières feuilles opposées, les suivantes alternes.

Cotylédons

De forme oblongue, 3 à 6 mm de longueur. Pas de pétiole.

Feuilles

Premières feuilles : allongées, quelques dents ou lobes.
Feuilles matures : allongées, profondément divisées en segments très fins.
Les feuilles portent des poils et leurs segments sont terminés par des petites pointes (mucrons).

Rosette développée

Provient d'une plantule ou d'une pousse végétative issue d'un court rhizome.
Feuilles longues (jusqu'à 20 cm) et profondément divisées en segments très fins et mucronés.

Plante adulte

Plante légèrement pubescente qui peut développer des touffes de feuilles denses.
Tige dressée et ramifiée surtout dans la partie supérieure, 30 à 80 cm de hauteur.
Fleurs blanches (parfois roses) réunies en petits capitules (environ 5 mm de diamètre) serrés les uns sur les autres.
Les capitules, disposés en corymbe, arrivent à peu près à la même hauteur et donnent une forme aplatie au sommet de la plante.
L'inflorescence est persistante sur la plante.
Fleurs et feuillage légèrement aromatiques.

Espèces semblables

Matricaire odorante (pl., vég.), matricaire inodore (pl., vég.).

Achillée mille-feuille



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Achillée mille-feuille (herbe à dinde)

Yarrow

Achillea millefolium L. (incl. *Achillea lanulosa* Nutt.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Achillée mille-feuille (herbe à dinde)

Yarrow

Achillea millefolium L. (incl. *Achillea lanulosa* Nutt.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Achillée mille-feuille (herbe à dinde)

Yarrow

Achillea millefolium L. (incl. *Achillea lanulosa* Nutt.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Achillée mille-feuille (herbe à dinde)

Yarrow

Achillea millefolium L. (incl. *Achillea lanulosa* Nutt.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Achillée mille-feuille (herbe à dinde)

Yarrow

Achillea millefolium L. (incl. *Achillea lanulosa* Nutt.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Matricaire odorante

Pineappleweed
Matricaria matricarioides (Less.) Porter, espèce annuelle ou annuelle hivernante.



Plantule
Plantule à rosette. Les deux premières feuilles opposées, les suivantes alternes. (Odeur agréable au froissement.)

Cotylédons
De forme orbiculaire à oblongue, très petits, 2 à 4 mm de longueur. Pas de pétiole.



Feuilles
Premières feuilles : allongées à linéaires, entières ou portant 1, 2 ou 3 grosses dents vers le milieu du limbe.
Feuilles matures : profondément découpées ; la division du limbe en segments de plus en plus fins s'observe avec l'apparition des nouvelles feuilles (voir les feuilles sur la rosette développée et la plante adulte).
Les feuilles sont glabres.

Rosette développée
Avant l'apparition de la tige, la plante développe une rosette de feuilles qui peut être assez dense.



Plante adulte
Plante glabre. Tige dressée, très ramifiée et courte (souvent le port est buissonnant), 15 à 30 cm de hauteur.
Fleurs jaunes réunies en petits capitules (5 à 10 mm de diamètre) de forme conique et sans rayons.
(Toutes les parties de la plante dégagent une odeur agréable au froissement, particulièrement les fleurs.)





Espèces semblables
Matricaire inodore (pl., vég.), achillée mille-feuille (pl., vég.).

Matricaire odorante



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Matricaire odorante

Pineappleweed
Matricaria matricarioides (Less.) Porter



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Matricaire odorante

Pineappleweed
Matricaria matricarioides (Less.) Porter



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Matricaire odorante

Pineappleweed
Matricaria matricarioides (Less.) Porter



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Matricaire odorante

Pineappleweed
Matricaria matricarioides (Less.) Porter



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Matricaire odorante

Pineappleweed
Matricaria matricarioides (Less.) Porter



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Matricaire inodore

Scentless chamomile

Matricaria perforata Merat (= *Matricaria maritima* L.), espèce bisannuelle ou vivace.





Plantule

Plantule à rosette.

Les deux premières feuilles opposées, les suivantes alternes.

Cotylédons

De forme orbiculaire à oblongue, très petits, 3 à 5 mm de longueur. Pas de pétiole.



Feuilles

Premières feuilles : profondément découpées, 4 ou 5 segments.

Feuilles matures : similaires aux précédentes mais encore plus découpées (les segments deviennent linéaires).

Les feuilles sont glabres.





Rosette développée

La plante développe une rosette de feuilles qui peut être très dense.

Les feuilles sont très finement découpées.

Plante adulte

Plante glabre pouvant former de larges touffes et fleurissant abondamment. Les tiges peuvent atteindre 80 cm de hauteur.

Fleurs semblables à celles de la marguerite, mais les capitules sont un peu plus petits (environ 4 cm de diamètre) et plus bombés. Les fleurs jaunes tubuleuses, au centre du réceptacle, n'ont pas de bractée.

Cliquez pour agrandir

Espèces semblables

Camomille des chiens (pl., vég., fl.), matricaire odorante (pl., vég.), marguerite blanche (fl.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Matricaire inodore

Scentless chamomile
Matricaria perforata Merat (= *Matricaria maritima* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Matricaire inodore

Scentless chamomile
Matricaria perforata Merat (= *Matricaria maritima* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Matricaire inodore

Scentless chamomile
Matricaria perforata Merat (= *Matricaria maritima* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Matricaire inodore

Scentless chamomile
Matricaria perforata Merat (= *Matricaria maritima* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Matricaire inodore

Scentless chamomile
Matricaria perforata Merat (= *Matricaria maritima* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Marguerite blanche

Ox-eye daisy
Chrysanthemum leucanthemum L., espèce vivace.




Plantule
Plantule à rosette.
Les deux premières feuilles opposées, les suivantes alternes.
Cotylédons
De forme orbiculaire à oblongue, 3 à 5 mm de longueur, sommet arrondi.
Feuilles
Premières feuilles : entières ou presque, allongées, sans poils.
(Peuvent être facilement confondues avec les cotylédons.)
Feuilles matures : bord du limbe de plus en plus denté (dents grossières) avec l'apparition des nouvelles feuilles, ovales-arrondies, généralement sans poils.
Le limbe s'atténue progressivement en pétiole.
Les feuilles sont légèrement charnues, glabres ou pubescentes.





Rosette développée et plante adulte
La plante développe une rosette de feuilles qui peut être très dense. Tige dressée, simple ou peu ramifiée, 20 à 90 cm de hauteur.
Les feuilles du haut de la tige sont allongées et sans pétiole, leur base entoure légèrement la tige.
Inflorescence
Capitules grands (3 à 5 cm de diamètre) comptant de nombreux rayons blancs (une trentaine) et des fleurs jaunes en forme de tube au centre du réceptacle. Ce dernier est plutôt plat (bombé chez les matricaires).
Les capitules sont habituellement solitaires au bout de la tige ou des rameaux.



Espèces semblables
Barbarée vulgaire (pl., vég.), matricaire inodore (fl.).

Marguerite blanche



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Marguerite blanche

Ox-eye daisy
Chrysanthemum leucanthemum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Marguerite blanche

Ox-eye daisy
Chrysanthemum leucanthemum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Marguerite blanche

Ox-eye daisy
Chrysanthemum leucanthemum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Marguerite blanche

Ox-eye daisy
Chrysanthemum leucanthemum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Marguerite blanche

Ox-eye daisy
Chrysanthemum leucanthemum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Barbarée vulgaire

Yellow rocket
Barbarea vulgaris R. Br., espèce bisannuelle ou vivace.



Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme oblongue à orbiculaire, sommet arrondi, limbe de 3 à 8 mm de longueur, pétiole distinct.
Feuilles
Premières feuilles : entières, arrondies, parfois à base légèrement en forme de cœur, sommet arrondi, longuement pétiolées.
Feuilles matures : profondément découpées ; segment terminal arrondi et beaucoup plus grand que les segments latéraux, eux aussi arrondis.
Les feuilles peuvent être d'un vert foncé très brillant.





Rosette développée et plante adulte
La rosette développée est hivernante.
La tige se développe au début de la 2e saison de croissance, elle est dressée, anguleuse, ramifiée, 20 à 80 cm de hauteur.
Les feuilles de la tige sont moins découpées que celles de la rosette ; elles comportent à leur base 2 petits lobes qui enserrent la tige.





Fleurs et fruits
Les fleurs (pétales en croix) sortent tôt au printemps et ressemblent à celles d'une moutarde (au stade plantule à cette époque), mais elles sont plus petites et plus brillantes.
Les fruits sont des siliques qui dépassent rarement 2,5 cm de longueur, le pédicelle est court et épais.

Espèces semblables
Rorippe d'Islande (pl., fl.), marguerite blanche (pl., vég.).





Barbarée vulgaire




Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Barbarée vulgaire

Yellow rocket
Barbarea vulgaris R. Br.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Barbarée vulgaire

Yellow rocket
Barbarea vulgaris R. Br.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Barbarée vulgaire

Yellow rocket
Barbarea vulgaris R. Br.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Barbarée vulgaire

Yellow rocket
Barbarea vulgaris R. Br.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Barbarée vulgaire

Yellow rocket
Barbarea vulgaris R. Br.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Barbarée vulgaire

Yellow rocket
Barbarea vulgaris R. Br.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Barbarée vulgaire

Yellow rocket
Barbarea vulgaris R. Br.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Rorippe d’Islande

Marsh yellow cress
Rorippa islandica (Oeder) Borb., espèce annuelle ou annuelle hivernante.




Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme oblongue à orbiculaire, très petits, 2 à 3 mm de longueur, sommet arrondi, pétiolés.
Feuilles



Premières feuilles : arrondies, entières ou sinuées, généralement sans poils, pétiolées.
Feuilles matures : profondément découpées ; le lobe terminal de plus grande taille que les lobes latéraux, les lobes ou segments eux-mêmes dentés ; sans poils ou presque, pétiolées.

Plante adulte
Tige dressée et ramifiée, 15 cm à 1 m de hauteur, plus ou moins pubescente, souvent pourpre dans la partie inférieure.




Feuilles de la partie supérieure de la tige faiblement lobées à irrégulièrement dentées. Pas de pétiole. Fleurs jaunes, petites, réunies en grappes allongées à l’extrémité de la tige et des rameaux. Les fruits sont des petites siliques de 2 à 10 mm de longueur, épaisses et portées par de fins pédicelles d’égale longueur ou plus courts.

Espèce semblable
Rorippe sylvestre (pl., vég., fl.).

Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Rorippe d'Islande

Marsh yellow cress
Rorippa islandica (Oeder) Borb



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 28 septembre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Rorippe d'Islande

Marsh yellow cress
Rorippa islandica (Oeder) Borb



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Rorippe d'Islande

Marsh yellow cress
Rorippa islandica (Oeder) Borb



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Rorippe d'Islande

Marsh yellow cress
Rorippa islandica (Oeder) Borb



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Rorippe d'Islande

Marsh yellow cress
Rorippa islandica (Oeder) Borb



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Rorippe sylvestre

Creeping yellow cress
Rorippa sylvestris (L.) Bess., espèce vivace.





Cliquez pour agrandir

Plante vivace produisant de nombreux rhizomes.
Toutes les feuilles sont profondément découpées, le lobe terminal n'étant pas beaucoup plus important que les lobes latéraux.
Tiges courtes, moins de 30 cm de hauteur.
Les siliques (2 à 15 mm) sont portées par des pédicelles d'égale longueur ou plus longs.

Espèce semblable
Rorippe d'Islande (pl., vég., fl.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Rorippe sylvestre

Creeping yellow cress
Rorippa sylvestris (L.) Bess..



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Rorippe sylvestre

Creeping yellow cress
Rorippa sylvestris (L.) Bess..



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Camomille des chiens

Stinking mayweed
Anthemis cotula L., espèce annuelle.



Cliquez pour agrandir

Espèce souvent confondue avec les matricaires.
La camomille des chiens diffère des matricaires par les caractères suivants :
- ses feuilles sont légèrement pubescentes et leurs segments se terminent par une petite pointe (mucron) ;
- chacune de ses fleurs jaunes (fleurs tubuleuses) au centre du réceptacle est munie d'une bractée très étroite et persistante ;
- une odeur fétide se dégage au froissement.

Espèces semblables
Matricaire inodore (pl., vég., fl.), matricaire odorante (pl., vég.), marguerite blanche (fl.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Camomille des chiens

Stinking mayweed
Anthemis cotula L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Chiendent

Quack grass

Agropyron repens (L.) Beauv. (= *Elytrigia repens* (L.) Nevski), espèce vivace.













Pousses végétatives

Les feuilles des pousses sont glabres sauf les premières, parfois pubescentes.
Les nouvelles feuilles apparaissent enroulées sur elles-mêmes.
Oreillettes présentes à la base du limbe, elles sont comme des petits crochets ou des griffes enserrant la tige.
Ligule membraneuse et très courte (difficile à observer).
Plante qui ne talle pas beaucoup (ne forme pas de touffes, l'énergie étant utilisée surtout pour la multiplication des rhizomes).
Rhizomes de teinte pâle munis d'une pointe dure à l'extrémité, et longuement rampants dans le sol entre 8 et 15 cm de profondeur.

Plante adulte

Plante généralement glabre (mais on peut trouver des poils sur les feuilles au bas de la tige et surtout sur leur gaine).
Port dressé, tige de 40 cm à 1 m de hauteur.
L'inflorescence est un épi allongé (5 à 20 cm de longueur) et étroit où les épillets sont disposés en alternance sur l'axe.

Remarque : le chiendent comporte de nombreux biotypes montrant une grande variété dans les caractères végétatifs aussi bien que floraux.

Épillets

Les épillets comprennent de 3 à 7 fleurs. Ces dernières sont opposées par leur côté à l'axe de l'inflorescence (chez les ivraies, c'est le dos des fleurs qui est opposé à l'axe).
Les glumes à la base de l'épillet et les pièces florales portent des arêtes à leur extrémité ou en sont dépourvues.

Espèces semblables



Cliquez pour agrandir

Agrostide blanche (vég.), brome inerme (vég.), ivraie vivace (fl.).

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chiendent

Quack grass

Agropyron repens (L.) Beauv. (= *Elytrigia repens* (L.) Nevski), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chiendent

Quack grass

Agropyron repens (L.) Beauv. (= *Elytrigia repens* (L.) Nevski), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chiendent

Quack grass

Agropyron repens (L.) Beauv. (= *Elytrigia repens* (L.) Nevski), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chiendent

Quack grass

Agropyron repens (L.) Beauv. (= *Elytrigia repens* (L.) Nevski), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chiendent

Quack grass

Agropyron repens (L.) Beauv. (= *Elytrigia repens* (L.) Nevski), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chiendent

Quack grass

Agropyron repens (L.) Beauv. (= *Elytrigia repens* (L.) Nevski), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Agrostide blanche

Redtop

Agrostis gigantea Roth (= *Agrostis alba* L. var. *major* Gaud.), espèce vivace.










Pousses végétatives

Pousses glabres.
Les nouvelles feuilles apparaissent enroulées sur elles-mêmes.
Oreillettes absentes.
Ligule membraneuse assez longue (1,5 à 4 mm).
Les feuilles sont de longueur variable, droites (un peu raides) et allongées.
Les rhizomes sont courts et enfouis peu profondément dans le sol.

Plante adulte

Plante généralement dressée, parfois couchée sur le sol, tige de 30 à 80 cm de hauteur.
L'inflorescence, d'abord verdâtre et fermée, s'étale et prend une teinte rougeâtre caractéristique au moment de la floraison.

Inflorescence et épillets

Une panicule d'apparence fine, bien garnie d'épillets et longue de 10 à 25 cm.
Les épillets sont très petits (2 mm) et ne comprennent qu'une seule fleur.
Les glumes englobent totalement la fleur et persistent sur la plante après que les graines soient tombées.

Espèces semblables

Chiendent (vég.), fléole des prés (vég.).

Agrostide blanche



Cliquez pour agrandir

[Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée](#)

[Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine](#)

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Agrostide blanche

Redtop

Agrostis gigantea Roth (= *Agrostis alba* L. var. *major* Gaud.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Agrostide blanche

Redtop

Agrostis gigantea Roth (= *Agrostis alba* L. var. *major* Gaud.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Agrostide blanche

Redtop

Agrostis gigantea Roth (= *Agrostis alba* L. var. *major* Gaud.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Agrostide blanche

Redtop

Agrostis gigantea Roth (= *Agrostis alba* L. var. *major* Gaud.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Agrostide blanche

Redtop

Agrostis gigantea Roth (= *Agrostis alba* L. var. *major* Gaud.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Agrostide blanche

Redtop

Agrostis gigantea Roth (= *Agrostis alba* L. var. *major* Gaud.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Agrostide blanche

Redtop

Agrostis gigantea Roth (= *Agrostis alba* L. var. *major* Gaud.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Agrostide blanche

Redtop

Agrostis gigantea Roth (= *Agrostis alba* L. var. *major* Gaud.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fléole des prés (mil)

Timothy

Phleum pratense L., espèce vivace.




Plantules avancées (tallées) et pousses végétatives

Jeunes plantes entièrement glabres.
Les nouvelles feuilles apparaissent enroulées sur elles-mêmes.
Oreillettes absentes.
Ligule membraneuse irrégulière (sommet pointu et une encoche de chaque côté) et de longueur moyenne (1,5 à 3 mm).
Les feuilles sont dressées et de longueur variable, la marge est rude.
Pas de rhizomes, ni de stolons, mais des talles formant des touffes denses (plante cespiteuse).
Un renflement en pseudobulbe se développe à la base des tiges (stockage des réserves dans les entre-nœuds). On peut mieux voir les pseudobulbes en grattant les gaines plus ou moins desséchées qui les recouvrent.



Plante adulte

Tige dressée de 50 cm à 1,2 m de hauteur.
Inflorescence cylindrique qui ressemble à un épi (un faux-épi). Dans les faits, c'est une panicule où les fleurs sont très rapprochées les unes des autres et où les branches rattachant les épillets à l'axe principal sont très courtes.




Espèces semblables

Agrostide blanche (vég.), alpiste roseau (vég.).




Fléole des prés





Cliquez pour agrandir

[Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée](#)

[Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine](#)

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fléole des prés (mil)

Timothy

Phleum pratense L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fléole des prés (mil)

Timothy

Phleum pratense L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fléole des prés (mil)

Timothy

Phleum pratense L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fléole des prés (mil)

Timothy

Phleum pratense L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

à Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fléole des prés (mil)

Timothy

Phleum pratense L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fléole des prés (mil)

Timothy

Phleum pratense L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fléole des prés (mil)

Timothy

Phleum pratense L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Alpiste roseau

Reed canary grass
Phalaris arundinacea L., espèce vivace.



Cliquez pour agrandir

Pousses végétatives
Pousses vigoureuses, en touffes ou isolées selon qu'elles proviennent des souches formées par les anciennes pousses ou des nouveaux bourgeons sur les rhizomes en croissance.
Les nouvelles feuilles apparaissent enroulées sur elles-mêmes.
Oreillettes absentes.
Ligule membraneuse et longue (environ 5 mm).
Feuilles planes et larges, assez rigides.
Gaines à bords se chevauchant, souvent teintées de rose à la base.
Le collet (jonction du limbe et de la gaine au dos de la feuille) est large et jaunâtre.

Plante adulte
Plante qui croît bien dans les endroits humides et pouvant former de grandes colonies.
La tige est dressée, non ramifiée, raide et peut dépasser 1,5 m de hauteur ; les feuilles sont nombreuses, planes et larges (jusqu'à 2 cm).
L'inflorescence est une panicule souvent teintée de violet, elle est ouverte au moment de la fécondation des fleurs et se referme ensuite pour prendre l'aspect d'un épi (couleur paille).

Espèces semblables
Brome inerme (vég.), fléole des prés (vég.).

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Alpiste roseau

Reed canary grass
Phalaris arundinacea L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Alpiste roseau

Reed canary grass
Phalaris arundinacea L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Alpiste roseau

Reed canary grass
Phalaris arundinacea L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Alpiste roseau

Reed canary grass
Phalaris arundinacea L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Alpiste roseau

Reed canary grass
Phalaris arundinacea L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Alpiste roseau

Reed canary grass
Phalaris arundinacea L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Alpiste roseau

Reed canary grass
Phalaris arundinacea L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Brome inerme

Smooth brome
Bromus inermis Leyss., espèce vivace.









Pousses végétatives

Les premières feuilles des pousses sont généralement pubescentes tandis que les suivantes sont glabres.
Les nouvelles feuilles apparaissent enroulées sur elles-mêmes.
Oreillettes absentes.
Ligule membraneuse entière et courte (1 à 2 mm).
Gaine fermée : les bords sont soudés sur presque toute leur longueur.
Feuilles planes de teinte vert mat, longues de 10 à 30 cm.
On peut trouver une marque en forme de W au centre du limbe des feuilles principales.
Rhizomes robustes et longs.

Plante adulte

Plante glabre et dressée, tige de 30 cm à 1 m de hauteur. (Espèce envahissante pouvant former d'importantes colonies.)


Inflorescence et épillets

Une panicule dressée et ramifiée, longue de 10 à 20 cm.
Ses rameaux sont grêles et portent de très longs épillets (2 à 3 cm) d'apparence lisse.
Les épillets contiennent de 5 à 9 fleurs.
On peut voir des arêtes très courtes (moins de 2 mm) sur les pièces florales.

Espèces semblables

Chiendent (vég.), agrostide blanche (vég.).

Brome inerme



Cliquez pour agrandir

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 05 août 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Brome inerme

Smooth brome

Bromus inermis Leyss., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Brome inerme

Smooth brome

Bromus inermis Leyss., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Brome inerme

Smooth brome

Bromus inermis Leyss., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Brome inerme

Smooth brome

Bromus inermis Leyss., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Brome inerme

Smooth brome

Bromus inermis Leyss., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Brome inerme

Smooth brome

Bromus inermis Leyss., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Brome inerme

Smooth brome

Bromus inermis Leyss., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Brome inerme

Smooth brome

Bromus inermis Leyss., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ


Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec


© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Zone du collet chez une feuille de graminée



Types de ligules



ligule membraneuse | ligule ciliée | trace blanche (ligule absente)


© Guide d'identification des mauvaises herbes du Québec MAPAQ

Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation


© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 06 décembre 1999

Préfoliation des nouvelles feuilles




préfoliation enroulée




préfoliation pliée

Section de la gaine



section arrondie



section aplatie

© Guide d'identification des mauvaises herbes du Québec MAPAQ

Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 06 décembre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie vivace (ray-grass anglais)

Perennial rye grass
Lolium perenne L., espèce vivace de courte durée.





Plantules et plantules avancées (tallées)

Jeunes plantes entièrement glabres.
Les nouvelles feuilles apparaissent pliées sur elles-mêmes (chez l'ivraie multiflore elles se présentent enroulées).
Les oreillettes à la base du limbe sont présentes à partir de la 3e ou 4e feuille.
Ligule (3e feuille) membraneuse et courte (moins de 2 mm).
Les feuilles sont légèrement luisantes (celles de l'ivraie multiflore sont très luisantes).
La base des jeunes plantes (axe principal de la plantule et talles) est rougeâtre (chez l'ivraie multiflore elle est d'un rouge éclatant).




Plante adulte

Plante glabre, dressée et de taille légèrement inférieure à celle de l'ivraie multiflore.
Tige de 30 à 80 cm de hauteur.
Les feuilles sont droites (un peu raides) et mesurent de 6 à 15 cm de longueur par 5 à 8 mm de largeur.
L'inflorescence (10 à 20 cm de longueur) est un épi d'aspect aplati. Les épillets sont disposés en alternance sur l'axe.




Épillets

Les épillets comprennent plusieurs fleurs.
Ces dernières étant opposées par leur dos à l'axe central sont responsables de l'apparence aplatie de l'inflorescence (chez le chiendent, c'est le côté des fleurs qui est opposé à l'axe).
Une glume seulement, opposée à l'axe et égalant plus de la moitié de l'épillet (la glume de l'ivraie multiflore est plus courte).
Les pièces florales, contrairement à celles de l'ivraie multiflore, ne portent pas d'arêtes.



Espèces semblables

Ivraie multiflore (vég., fl.), chiendent (fl.).



Cliquez pour agrandir

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 04 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie vivace (ray-grass anglais)

Perennial rye grass

Lolium perenne L., espèce vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie vivace (ray-grass anglais)

Perennial rye grass

Lolium perenne L., espèce vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie vivace (ray-grass anglais)

Perennial rye grass

Lolium perenne L., espèce vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie vivace (ray-grass anglais)

Perennial rye grass

Lolium perenne L., espèce vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie vivace (ray-grass anglais)

Perennial rye grass

Lolium perenne L., espèce vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie vivace (ray-grass anglais)

Perennial rye grass

Lolium perenne L., espèce vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie vivace (ray-grass anglais)

Perennial rye grass

Lolium perenne L., espèce vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie vivace (ray-grass anglais)

Perennial rye grass

Lolium perenne L., espèce vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie multiflore (ray-grass d'Italie)

Italian rye grass

Lolium multiflorum Lam., espèce annuelle ou vivace de courte durée.




Plantules et plantules avancées (tallées)

Jeunes plantes entièrement glabres.

Les nouvelles feuilles apparaissent enroulées sur elles-mêmes (chez l'ivraie vivace elles se présentent pliées).

Les oreillettes à la base du limbe sont présentes à partir de la 3e ou 4e feuille.

Ligule (3e feuille) membraneuse et courte (moins de 2 mm).




Feuilles très luisantes à la face inférieure du limbe. Au champ, ce caractère distingue bien les colonies de l'espèce.

La base des jeunes plantes (axe principal de la plantule et talles) est colorée d'un rouge vif.

Plante adulte

Plante glabre.

Tige dressée, de 50 cm à 1 m de hauteur.

Les feuilles sont souples et mesurent de 10 à 20 cm de longueur par 5 à 8 mm de largeur.

L'inflorescence (10 à 25 cm de longueur) est un épi d'aspect aplati où les épillets, assez distancés les uns des autres, sont disposés en alternance sur l'axe.




Épillets

Les épillets comprennent plusieurs fleurs.

Ces dernières étant opposées par leur dos à l'axe central sont responsables de l'apparence aplatie de l'inflorescence (chez le chiendent, c'est le côté des fleurs qui est opposé à l'axe).

Une glume seulement, opposée à l'axe et égalant moins de la moitié de l'épillet (la glume de l'ivraie vivace est plus longue).



Les pièces florales portent une arête bien visible (pas d'arête chez l'ivraie vivace).

Espèces semblables

Ivraie vivace (vég., fl.), fétuque rouge (vég.), chiendent (fl.).



Cliquez pour agrandir

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie multiflore (ray-grass d'Italie)

Italian rye grass

Lolium multiflorum Lam., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie multiflore (ray-grass d'Italie)

Italian rye grass

Lolium multiflorum Lam., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie multiflore (ray-grass d'Italie)

Italian rye grass

Lolium multiflorum Lam., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie multiflore (ray-grass d'Italie)

Italian rye grass

Lolium multiflorum Lam., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie multiflore (ray-grass d'Italie)

Italian rye grass

Lolium multiflorum Lam., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie multiflore (ray-grass d'Italie)

Italian rye grass

Lolium multiflorum Lam., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ivraie multiflore (ray-grass d'Italie)

Italian rye grass

Lolium multiflorum Lam., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fétuque rouge

Red fescue
Festuca rubra L., espèce vivace.











Plantules avancées (tallées) et pousses végétatives
Jeunes plantes glabres ou finement pubescentes.
Les nouvelles feuilles apparaissent pliées sur elles-mêmes.
Les oreillettes à la base du limbe sont réduites à de petits renflements.
Ligule membraneuse et très courte (0,5 mm).
Gaine fermée : les bords sont soudés presque jusqu'au sommet (elle finit par s'ouvrir sous la pression des organes en développement qu'elle renferme).
Les feuilles, très étroites (2 à 4 mm) et toujours un peu pliées sur elles-mêmes, ressemblent à des feuilles de jonc.
La base des jeunes plantes (axe principal de la plantule et talles) est rouge.
Les rhizomes sont courts et peu nombreux.
Plante remarquable par les touffes de feuilles denses qu'elle peut produire. Elles sont formées des nombreuses talles provenant des bourgeons situés à l'aisselle des feuilles, ou des pousses végétatives issues des rhizomes.

Plante adulte
Plante plutôt glabre à port dressé, tige de 30 à 50 cm de hauteur.
L'inflorescence est une panicule comportant peu de branches et longue de 10 à 20 cm. La panicule s'étale au moment de la floraison et prend une teinte rougeâtre caractéristique (comme chez l'agrostide blanche).
Les épillets ont 1 cm de longueur et comptent de 4 à 7 fleurs.
Les pièces florales sont terminées par une arête de 2 à 3 mm de longueur.

Espèces semblables
Pâturin des prés (vég.), ivraie vivace (vég.).

Fétuque rouge



Cliquez pour agrandir

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fétuque rouge

Red fescue

Festuca rubra L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fétuque rouge

Red fescue

Festuca rubra L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fétuque rouge

Red fescue

Festuca rubra L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fétuque rouge

Red fescue

Festuca rubra L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fétuque rouge

Red fescue

Festuca rubra L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fétuque rouge

Red fescue

Festuca rubra L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fétuque rouge

Red fescue
Festuca rubra L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fétuque rouge

Red fescue

Festuca rubra L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Fétuque rouge

Red fescue

Festuca rubra L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin des prés (pâturin du Kentucky)

Kentucky blue grass
Poa pratensis L., espèce vivace.













Pousses végétatives

Pousses entièrement glabres.
Les nouvelles feuilles apparaissent pliées sur elles-mêmes (allure aplatie des jeunes feuilles et des gaines).
Oreillettes absentes.
Ligule membraneuse et très courte (0,5 mm).
Feuilles plus ou moins longues, de teinte bleutée ou vert mat.
La nervure centrale, seule bien visible sur le limbe, est bordée de deux encavures en " traces de ski " (caractère commun aux pâturins, souvent difficile à observer).
Rhizomes nombreux et formant des réseaux denses.

Plante adulte

Plante glabre de taille moyenne ; les tiges ont moins de 40 cm de hauteur. (Plante gazonnante.)
L'inflorescence est une panicule ouverte et un peu plus fournie (branches regroupées par 3 à 5) que celle du pâturin annuel ; de forme triangulaire et souvent teintée de pourpre, elle est longue de 8 à 15 cm.
Les épillets contiennent de 3 à 5 fleurs, ils sont courts (3 à 6 mm) et aplatis.

Remarque : les feuilles à préfoliation pliée se terminent en pointe de canot, ce caractère est bien visible chez les pâturins.

Espèces semblables

Pâturin annuel (vég., fl.), ivraie vivace (vég.), fétuque rouge (vég.).



Cliquez pour agrandi

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin des prés (pâturin du Kentucky)

Kentucky blue grass
Poa pratensis L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin des prés (pâturin du Kentucky)

Kentucky blue grass
Poa pratensis L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin des prés (pâturin du Kentucky)

Kentucky blue grass
Poa pratensis L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin des prés (pâturin du Kentucky)

Kentucky blue grass
Poa pratensis L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin des prés (pâturin du Kentucky)

Kentucky blue grass
Poa pratensis L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin des prés (pâturin du Kentucky)

Kentucky blue grass
Poa pratensis L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ


Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin annuel

Annual blue grass
Poa annua L., espèce annuelle ou vivace de courte durée.









Cliquez pour agrandir

Plantules et plantules avancées (tallées)
Jeunes plantes entièrement glabres.
Les nouvelles feuilles apparaissent pliées sur elles-mêmes.
Oreillettes absentes.
Ligule (3e feuille) membraneuse de longueur moyenne (1,5 à 3 mm).
Feuilles courtes et étroites de couleur vert mat. Certaines d'entre elles portent des plis vers le centre du limbe (voir dactyle).
La nervure centrale, seule bien visible sur le limbe, est bordée de deux encavures en " traces de ski " (caractère commun aux pâturins souvent difficile à observer).
La base des jeunes plantes (axe principal de la plantule et talles) est blanchâtre.

Plante adulte
Plante glabre de taille réduite.
Les tiges fleurissent très tôt, avant même de s'être complètement dégagées du feuillage de la plante. Chez l'adulte à pleine maturité les tiges se sont plus ou moins affaissées au sol et atteignent environ 25 cm de hauteur.

Remarque : les feuilles à préfoliation pliée se terminent en pointe de canot, ce caractère est bien visible chez les pâturins.

Inflorescence et épillets
L'inflorescence est une panicule ouverte comportant peu de branches ; de forme triangulaire, elle est longue de 6 à 12 cm.
Les épillets contiennent de 3 à 7 fleurs, ils sont courts (3 à 6 mm) et aplatis.

Espèces semblables
Pâturin des prés (vég., fl.), dactyle pelotonné (vég.).

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine



Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin annuel

Annual blue grass

Poa annua L., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin annuel

Annual blue grass

Poa annua L., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin annuel

Annual blue grass

Poa annua L., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin annuel

Annual blue grass

Poa annua L., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin annuel

Annual blue grass

Poa annua L., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin annuel

Annual blue grass

Poa annua L., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pâturin annuel

Annual blue grass

Poa annua L., espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Dactyle pelotonné

Orchard grass
Dactylis glomerata L., espèce vivace.









Plantules avancées (tallées) et pousses végétatives
Jeunes plantes glabres.
Les nouvelles feuilles apparaissent pliées sur elles-mêmes.
Oreillettes absentes.
Ligule membraneuse très longue (3 à 5 mm) avec une pointe au sommet.
Les gaines sont aplaties et donnent un aspect comprimé aux talles.
Les feuilles sont planes et vert mat. On peut en voir avec des stries transversales vers le centre du limbe (aspect gaufré) comme chez les pâturins. La nervure centrale est proéminente.
Pas de rhizomes ni de stolons, mais des talles très nombreuses formant des touffes (plante cespiteuse).
Cette plante produit des souches très fortes qui font saillie sur le terrain. Elles donnent naissance à des touffes de feuilles bien garnies qui apparaissent comme des petites " buttes feuillées " sur le sol.
Les feuilles sont planes et peuvent devenir très longues (plus de 80 cm).

Plante adulte
Plante glabre.
Tige dressée, de 40 cm à plus de 1 m de hauteur.
L'inflorescence est très caractéristique de l'espèce : une panicule ouverte à la base (branches écartées de l'axe) et fermée au sommet, les épillets apparaissant en paquets denses au bout des branches.
Les épillets comprennent de 3 à 5 fleurs, leur longueur est de 5 à 7 mm et ils sont aplatis.

Espèces semblables
Pâturin annuel (vég.), alpiste roseau (vég.).

Dactyle pelotonné




Cliquez pour agrandir

[Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée](#)

[Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine](#)

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Dactyle pelotonné

Orchard grass
Dactylis glomerata L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Dactyle pelotonné

Orchard grass
Dactylis glomerata L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Dactyle pelotonné

Orchard grass
Dactylis glomerata L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Dactyle pelotonné

Orchard grass
Dactylis glomerata L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Dactyle pelotonné

Orchard grass
Dactylis glomerata L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Dactyle pelotonné

Orchard grass
Dactylis glomerata L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Dactyle pelotonné

Orchard grass
Dactylis glomerata L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite herbe à poux

Common ragweed
Ambrosia artemisiifolia L., espèce annuelle.















Plantule
Plantule à tige et à feuilles opposées.
Cotylédons
De forme orbiculaire, 6 à 9 mm de longueur, sommet arrondi, face inférieure verte ou avec des plages rouge-violet.
Feuilles
Premières feuilles : profondément divisées, 3 lobes bien distincts.
Feuilles matures : profondément divisées, plusieurs segments ou lobes eux-mêmes plus ou moins découpés. Pubescence assez dense, poils courts et couchés.

Plant végétatif et plante adulte
Tige dressée, ramifiée, assez pubescente, 15 cm à 1,5 m de hauteur.
Les feuilles du haut de la tige deviennent alternes.
Fleurs
Fleurs mâles et femelles séparées. Les fleurs mâles, productrices de pollen, sont regroupées en capitules ressemblant à des petites coupes renversées ; ils sont disposés en grappes au bout de la tige et des rameaux. Les fleurs femelles, peu nombreuses et plus discrètes, sont situées à l'aisselle des feuilles.
Le pollen de la petite herbe à poux cause la fièvre des foins, il s'échappe de la plante vers la fin de l'été.

Espèces semblables
Armoise vulgaire (pl., vég.).
(Dans les plates-bandes d'œillets d'Inde ou tagètes (marigold), la petite herbe à poux peut être confondue avec cette plante en train de s'établir.)

Petite herbe à poux



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 23 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite herbe à poux

Common ragweed
Ambrosia artemisiifolia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite herbe à poux

Common ragweed
Ambrosia artemisiifolia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite herbe à poux

Common ragweed
Ambrosia artemisiifolia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite herbe à poux

Common ragweed
Ambrosia artemisiifolia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite herbe à poux

Common ragweed
Ambrosia artemisiifolia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite herbe à poux

Common ragweed
Ambrosia artemisiifolia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite herbe à poux

Common ragweed
Ambrosia artemisiifolia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Armoise vulgaire (herbe Saint-Jean)

Mugwort

Artemisia vulgaris L., espèce vivace.



Cliquez pour agrandir

Plantule

Plantule à rosette et à feuilles alternes. (Odeur agréable au froissement.)

Cotylédons

De forme orbiculaire, 1,5 à 3 mm de longueur.

Feuilles

Premières feuilles : arrondies à ovales, généralement avec 2 ou 3 dents terminées par une pointe. Feuilles matures : ovales, grossièrement dentées (dents terminées par une pointe) à lobées. Les feuilles sont recouvertes d'une pilosité blanchâtre à la face inférieure : aspect argenté.

Plant végétatif et plante adulte

Des pousses peuvent provenir des rhizomes souterrains ou du collet des anciennes pousses. Tige rouge, striée, 50 cm à 1,5 m de hauteur.

Les feuilles de la tige, profondément divisées en segments, ressemblent quelque peu à celles de la petite herbe à poux, mais elles sont argentées à la face inférieure et la base du pétiole est engainante.

Les fleurs sont réunies en petits capitules blanchâtres, à leur tour regroupés en grappes à l'aisselle des feuilles supérieures de la tige et des rameaux.

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Armoise vulgaire (herbe Saint-Jean)

Mugwort

Artemisia vulgaris L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Armoise vulgaire (herbe Saint-Jean)

Mugwort

Artemisia vulgaris L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Armoise vulgaire (herbe Saint-Jean)

Mugwort

Artemisia vulgaris L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Armoise vulgaire (herbe Saint-Jean)

Mugwort

Artemisia vulgaris L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Grande bardane

Great burdock
Arctium lappa L., espèce bisannuelle.



Espèce de plus grande taille que la petite bardane petite bardane, mais les caractères végétatifs sont dans l'ensemble trop variables pour bien séparer les deux espèces, sauf peut-être les pétioles qui normalement sont pleins au lieu d'être creux. Les caractères floraux sont plus fiables : capitules d'une teinte plus pâle, plus gros (3 à 4,5 cm de diamètre) et disposés en corymbe plutôt qu'en grappes.

Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 février 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Grande bardane

Great burdock
Arctium lappa L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Petite bardane (toques)

Common burdock
Arctium minus (Hill) Bernh., espèce bisannuelle.



Cliquez pour agrandir

Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme oblongue, 15 à 25 mm de longueur, charnus, pétiole
distinct. Nervure médiane bien visible à la face inférieure.
Feuilles
Premières feuilles : entières à sinuées, arrondies-ovales, base atténuée, pubescentes.
Feuilles matures : entières à sinuées, arrondies-ovales, grandes, base en forme de cœur ; pubescentes, la face inférieure est blanchâtre (poils laineux).
Les feuilles sont épaisses et la nervation en réseau marque profondément le limbe. Le pétiole est en forme de U avec une base élargie et violacée ; une coupe transversale montre qu'il est creux.

Rosette développée
La rosette développée est hivernante. Les feuilles remarquables (à l'origine de plusieurs noms de la plante : rhubarbe sauvage, tabac du diable, etc.) peuvent atteindre plus de 50 cm de longueur ; elles sont rattachées à une racine pivotante profonde.

Plante adulte
Tige forte et ramifiée de 1,5 m et plus de hauteur.
Les fleurs sont pourpres et réunies en capitules. Des noms populaires de la plante (artichaut, toques, rapace, etc.) rappellent soit la forme globuleuse des capitules, soit la forme en crochet de leurs bractées.
Les capitules, d'un diamètre de 1,5 à 3 cm, sont portés par de longs pédoncules et regroupés en grappes au sommet de la tige et des rameaux.

Espèce semblable : Grande Bardane

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 février 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite bardane (toques)

Common burdock
Arctium minus (Hill) Bernh.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite bardane (toques)

Common burdock
Arctium minus (Hill) Bernh.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite bardane (toques)

Common burdock
Arctium minus (Hill) Bernh.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite bardane (toques)

Common burdock
Arctium minus (Hill) Bernh.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite bardane (toques)

Common burdock
Arctium minus (Hill) Bernh.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Asclépiade de Syrie (asclépiade commune)

Common milkweed
Asclepias syriaca L., espèce vivace.















Plantule
Plantule à tige et à feuilles opposées.
Cotylédons
De forme oblongue, sommet arrondi, limbe de 6 à 12 mm de longueur, nervation abondante. Pétiole distinct.
Feuilles
Feuilles toutes semblables : entières, allongées, souvent terminées par une petite pointe, nervures réunies en réseau, poils à la face inférieure et à la marge du limbe. La pilosité devient de plus en plus dense avec les nouvelles feuilles qui apparaissent. Finalement, le dessous des feuilles, complètement recouvert de poils laineux, devient duveteux et prend une apparence blanchâtre.

Pousses végétatives
Des tiges feuillées émergent du sol à partir des racines.

Plante adulte
Tige dressée, non ramifiée, 1 à 1,5 m de hauteur, plus ou moins poilue.
Toutes les parties de la plante contiennent du latex en abondance.
Fleurs et fruits
Les fleurs sont rosées ou blanchâtres, en bouquet (ombelles) à l'extrémité de la tige et à l'aisselle des feuilles supérieures.
Les fruits ressemblent à de petites bananes (follicules) de 7 à 10 cm de longueur. Ils s'ouvrent à maturité pour libérer des graines munies de longues soies.



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Asclépiade de Syrie (asclépiade commune)

Common milkweed

Asclepias syriaca L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Asclépiade de Syrie (asclépiade commune)

Common milkweed

Asclepias syriaca L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Asclépiade de Syrie (asclépiade commune)

Common milkweed

Asclepias syriaca L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Asclépiade de Syrie (asclépiade commune)

Common milkweed

Asclepias syriaca L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Asclépiade de Syrie (asclépiade commune)

Common milkweed

Asclepias syriaca L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Asclépiade de Syrie (asclépiade commune)

Common milkweed

Asclepias syriaca L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Asclépiade de Syrie (asclépiade commune)

Common milkweed
Asclepias syriaca L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Arroche hastée

Halberd-leaved atriplex

Atriplex prostrata Boucher ex DC. (= *Atriplex patula* L. var. *hastata* (L.) Gray), espèce annuelle.



Se distingue de l'arroche étalée par ses feuilles hastées.

Feuilles largement triangulaires (avec une base droite ou légèrement concave) dont le limbe est étiré en pointe de chaque côté du pétiole.

Espèces semblables

Arroche étalée (pl., vég., fl.), chénopode blanc (pl., vég.).

Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Arroche hastée

Halberd-leaved atriplex

Atriplex prostrata Boucher ex DC. (= *Atriplex patula* L. var. *hastata* (L.) Gray)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Arroche étalée

Spreading atriplex
Atriplex patula L., espèce annuelle.











Cliquez pour agrandir

Plantule

Plantule à tige, les 6 à 10 premières feuilles opposées, les suivantes alternes.
Aspect farineux, mais moins marqué que chez le chénopode blanc.

Cotylédons

De forme allongée, 15 à 25 mm de longueur, charnus, pétiole peu distinct du limbe.
Face inférieure verte, pas de nervure médiane.

Feuilles

Premières feuilles : allongées, entières.
Feuilles matures : allongées, sinuées-dentées irrégulièrement, 2 dents de grande taille se détachent du limbe à sa base.

Plant végétatif et plante adulte

Plante légèrement farineuse. Tige dressée, ramifiée, 15 cm à 1,2 m de hauteur. Rameaux de la base aussi longs que la tige, port en corbeille.
Fleurs qui ressemblent à celles des chénopodes, mais elles sont unisexuées (mâles ou femelles). Les fleurs femelles ont des petites feuilles (bractées) de forme triangulaire bien visibles.

Espèces semblables

Arroche hastée (pl., vég., fl.), chénopode blanc (pl., vég.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Arroche étalée

Spreading atriplex
Atriplex patula L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Arroche étalée

Spreading atriplex
Atriplex patula L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Arroche étalée

Spreading atriplex
Atriplex patula L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Arroche étalée

Spreading atriplex
Atriplex patula L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Arroche étalée

Spreading atriplex
Atriplex patula L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chénopode blanc (chou gras)

Lamb's-quarters
Chenopodium album L., espèce annuelle.




Plantule
Plantule à tige.
Les deux ou quatre premières feuilles opposées, les suivantes alternes.
Aspect farineux, bien visible sur les nouvelles feuilles.
Cotylédons
De forme allongée, 10 à 15 mm de longueur, charnus, pétiole bien distinct du limbe.
Face inférieure parfois colorée de rouge-violet, pas de nervure médiane.
Feuilles
Premières feuilles : triangulaires-ovales, entières à sinuées.
Feuilles matures : triangulaires-ovales à largement triangulaires, irrégulièrement dentées (profondeur des dents s'accentuant avec les nouvelles feuilles).
La face inférieure des feuilles est souvent teintée de rose.



Plante adulte
Tige dressée, souvent ramifiée, 20 cm à plus de 1,5 m de hauteur.
Plante farineuse.
Chénopode signifie patte d'oie, allusion à la forme de la feuille.
Fleurs
Fleurs très petites, verdâtres, réunies en glomérules compacts d'aspect granuleux eux-mêmes disposés en panicule au sommet de la tige et des rameaux.



Espèces semblables
Arroche étalée (pl., vég.), chénopode glauque (pl., vég.).





Chénopode blanc



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chénopode blanc (chou gras)

Lamb's-quarters
Chenopodium album L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chénopode blanc (chou gras)

Lamb's-quarters
Chenopodium album L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chénopode blanc (chou gras)

Lamb's-quarters
Chenopodium album L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chénopode blanc (chou gras)

Lamb's-quarters
Chenopodium album L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

à

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chénopode blanc (chou gras)

Lamb’s-quarters
Chenopodium album L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chénopode glauque

Oak-leaved goosefoot
Chenopodium glaucum L., espèce annuelle.



Plantule
Plantule à tige, port étalé, presque couché.
Les deux ou quatre premières feuilles opposées, les suivantes alternes.
Aspect farineux moins marqué que chez le chénopode blanc.



Cotylédons
De forme allongée, 6 à 10 mm de longueur, charnus, pétiole bien distinct du limbe.
Face inférieure parfois légèrement colorée de rouge-violet, pas de nervure médiane.

Feuilles
Premières feuilles : ovales, la 1re entière ; la 2e munie d'une dent ou d'une encoche.
Feuilles matures : ovales à allongées, sinuées-dentées.
Les feuilles sont charnues et leur face supérieure est souvent d'un vert sombre et un peu rougeâtre.



Plante adulte
Plante légèrement farineuse et d'aspect un peu gras.
Tige souvent étalée ou couchée, ramifiée, jusqu'à 50 cm de hauteur.

Fleurs
Fleurs très petites, verdâtres, réunies en glomérules compacts et granuleux formant de petits épis à l'aisselle des feuilles supérieures.



Espèces semblables
Chénopode blanc (pl., vég.), arroche étalée (pl., vég.).

Chénopode glauque



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chénopode glauque

Oak-leaved goosefoot
Chenopodium glaucum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chénopode glauque

Oak-leaved goosefoot
Chenopodium glaucum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chénopode glauque

Oak-leaved goosefoot
Chenopodium glaucum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chénopode glauque

Oak-leaved goosefoot
Chenopodium glaucum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Folle avoine

Wild oats

Avena fatua L., espèce annuelle.



Cliquez pour agrandir

Plantule

Plantule presque glabre, on peut voir des cils (fugaces) à la bordure du limbe sur plus de la moitié de la longueur des feuilles (sur pas plus de la moitié de la longueur des feuilles chez l'avoine cultivée).
Les nouvelles feuilles apparaissent enroulées sur elles-mêmes.
Ligule (3e feuille) membraneuse, longue (2 à 5 mm), dentée et à sommet anguleux. Oreillettes absentes.
Gaine à section arrondie, ovale.
(Pour ne pas confondre avec l'avoine cultivée, il est conseillé de déterrer la plantule et de vérifier la graine.)

Remarque : dans un semis de céréales, la folle avoine a de fortes chances de se retrouver à côté du rang.

Plante adulte

Plante dressée, tige de 80 cm à 1,5 m de hauteur.
Feuilles longues et larges, de couleur vert foncé ou vert bleuté.
L'inflorescence est une grande panicule ouverte, chargée d'épillets pendant au bout des branches.

Épillets

Les épillets de 20 à 25 mm de longueur sont constitués de 2 grosses glumes englobant 2 à 3 fleurs portant chacune une longue arête au dos. Avec la maturité, l'arête au dos des fleurs se courbe vers le milieu pour apparaître finalement coudée. L'arête est toujours spiralée dans sa partie inférieure.
Les fleurs sont d'une teinte foncée et couvertes de longs poils ; elles mûrissent une graine qui se détache du plant avant qu'on puisse la cueillir.

Une avoine cultivée : des fleurs jaunâtres ou de teinte pâle, elles sont peu ou pas pubescentes et ne portent pas d'arête au dos ou alors cette dernière est plutôt courte, jamais spiralée et presque droite.
Les graines ne se séparent des épillets que lors du battage.

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Folle avoine

Wild oats

Avena fatua L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Folle avoine

Wild oats

Avena fatua L., espèce annuelle.



©

MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Folle avoine

Wild oats

Avena fatua L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Folle avoine

Wild oats

Avena fatua L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Folle avoine

Wild oats

Avena fatua L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Folle avoine

Wild oats

Avena fatua L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Folle avoine

Wild oats

Avena fatua L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Folle avoine

Wild oats

Avena fatua L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Folle avoine

Wild oats

Avena fatua L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Avoine

Oats

Avena sativa L., espèce annuelle.



Cliquez pour agrandir

Ligule membraneuse, longue (plus de 3 mm).
Oreillettes absentes.
L'inflorescence est une grande panicule ouverte.
Les épillets sont constitués de 2 grosses glumes englobant 2 ou 3 fleurs jaunâtres ou de teinte pâle, peu ou pas pubescentes.
Selon les cultivars, les fleurs portent une arête droite au dos ou n'en portent pas. (Voir la folle avoine.)

Espèces semblables
Blé (pl., vég.), orge (pl., vég.), seigle (pl.,vég.).

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 05 août 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Avoine

Oats

Avena sativa L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Avoine

Oats

Avena sativa L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Avoine

Oats

Avena sativa L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Blé

Wheat

Triticum aestivum L., espèce annuelle ou bisannuelle.



Cliquez pour agrandir

Ligule membraneuse de moins de 3 mm.
Oreillettes (en crochet) bien développées.
L'inflorescence est un épi.
Les épillets, avec ou sans arêtes (selon le cultivar), comprennent de 2 à 5 fleurs.
En défaisant délicatement l'épi on trouve un épillet à chacun des nœuds de l'axe.
Les deux glumes à la base de l'épillet sont fermes mais autrement peu différentes des pièces florales.

Espèces semblables

Avoine (pl., vég.), orge (pl., vég., fl.), seigle (pl., vég., fl.).

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 04 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Blé

Wheat
Triticum aestivum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Blé

Wheat
Triticum aestivum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Blé

Wheat
Triticum aestivum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Blé

Wheat
Triticum aestivum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Orge

Barley

Hordeum vulgare L., espèce annuelle ou bisannuelle.





Cliquez pour agrandir

Ligule membraneuse de moins de 3 mm.
Oreillettes (en crochet) bien développées comme celles du blé.
L'inflorescence est un épi. Les épillets, aristés (avec des arêtes), comprennent une seule fleur.
En défaisant délicatement l'épi on trouve 3 épillets à chacun des nœuds pour l'orge à 6 rangs (on trouverait un seul épillet par nœud sur l'orge à 2 rangs).
À la base de chaque épillet se trouvent deux glumes étroites, minces et terminées par une longue pointe.

Espèces semblables
Avoine (pl., vég.), blé (pl., vég., fl.), seigle (pl., vég., fl.).

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 04 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Orge

Barley

Hordeum vulgare L



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Orge

Barley

Hordeum vulgare L



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Orge

Barley

Hordeum vulgare L



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Seigle

Rye

Secale cereale L., espèce annuelle ou bisannuelle.





Cliquez pour agrandir

Ligule membraneuse de moins de 3 mm.
Oreillettes présentes mais peu développées.
L'inflorescence est un épi.
Les épillets, longuement aristés (avec de longues arêtes), comprennent 2 fleurs.
En défaisant délicatement l'épi on trouve un épillet à chacun des nœuds.
Les deux glumes à la base de l'épillet sont courtes et terminées en pointe.

Espèces semblables

Avoine (pl., vég.), blé (pl., vég., fl.), orge (pl., vég., fl.).

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 04 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Seigle

Rye

Secale cereale L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Seigle

Rye

Secale cereale L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Seigle

Rye

Secale cereale L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Bident penché

Nodding beggarticks
Bidens cernua L., espèce annuelle.



Cliquez pour agrandir

Plantule
Plantule à tige et à feuilles opposées.
Cotylédons
De forme allongée, environ 5 mm de longueur, nervure centrale bien visible. Pétiole distinct.
Feuilles
Premières feuilles : allongées, entières à sinuées.
Feuilles matures : très allongées et devenant de plus en plus dentées avec les nouvelles feuilles, mais les dents ne sont jamais profondes.

Plant végétatif et plante adulte
Tige dressée et ramifiée, recouverte de longs poils raides ; souvent rougeâtre, 10 cm à 1 m de hauteur. Les feuilles (opposées) peuvent être soudées par leur base autour des nœuds de la tige. Fleurs jaunes réunies en capitules de grande taille (jusqu'à 4 ou 5 cm de diamètre), généralement à 8 rayons (parfois sans rayons) ; des grandes bractées vertes ressemblant à des feuilles étroites sont étalées sous les capitules. Capitules penchés à maturité.
La graine est allongée (5 mm), légèrement aplatie et munie au sommet de 4 arêtes barbelées et très accrochantes.

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Bident penché

Nodding beggarticks
Bidens cernua L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Bident penché

Nodding beggarticks
Bidens cernua L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Bident penché

Nodding beggarticks
Bidens cernua L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Bident penché

Nodding beggarticks
Bidens cernua L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des oiseaux

Bird rape

Brassica campestris L. (= *Brassica rapa* L.), espèce annuelle.




Plantule

Plantule à rosette et à feuilles alternes.

Cotylédons

En forme de cœur, échancrure peu profonde.

Pétiole long, mais mesurant moins de 20 mm à complet développement.

Feuilles

Premières feuilles : plus ou moins arrondies, sinuées-dentées à lobées.

Feuilles matures : ovales à allongées, lobées à profondément découpées.

Les feuilles, abondamment nervées, ont des poils à base bulbeuse.



Plante adulte

Plante d'un vert souvent bleuté comme le chou.

Tige lisse, dressée et ramifiée, 30 cm à 1,5 m de hauteur.

Feuilles du haut de la tige simplement dentées avec 2 lobes à la base du limbe qui enserrent la tige.



Fleurs et fruits

Fleurs jaunes (pétales en croix) disposées en grappes au bout de la tige et des rameaux.

Les fruits sont des siliques cylindriques (lisses ou simplement ridées) pouvant atteindre 7 cm de longueur ; le pédicelle est mince et long, environ 2 cm.

Espèces semblables

Moutarde des champs (pl., vég., fl.), radis sauvage (pl., vég., fl.).




Moutarde des oiseaux





Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des oiseaux

Bird rape

Brassica campestris L. (= *Brassica rapa* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des oiseaux

Bird rape

Brassica campestris L. (= *Brassica rapa* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des oiseaux

Bird rape

Brassica campestris L. (= *Brassica rapa* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des oiseaux

Bird rape

Brassica campestris L. (= *Brassica rapa* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des oiseaux

Bird rape

Brassica campestris L. (= *Brassica rapa* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des oiseaux

Bird rape

Brassica campestris L. (= *Brassica rapa* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des champs

Wild mustard

Sinapis arvensis L. (= *Brassica kaber* (DC.) L.C. Wheeler var. *pinnatifida* (Stokes) L.C. Wheeler), espèce annuelle.













Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
En forme de cœur, échancrure peu profonde au sommet. Pétiole long, mais mesurant moins de 20 mm à complet développement.
Feuilles
Premières feuilles : plus ou moins arrondies, sinuées-dentées.
Feuilles matures : allongées, sinuées-dentées à lobées. Les feuilles portent des poils et elles sont un peu rugueuses au toucher.

Plante adulte
Plante d'un vert mat ou vert-jaune.
Tige dressée et ramifiée, plus ou moins garnie de poils couchés, 30 cm à 1 m de hauteur.
Feuilles du haut de la tige simplement dentées et sans pétiole.
Fleurs et fruits
Fleurs jaunes (pétales en croix) disposées en grappes au bout de la tige et des rameaux.
Les fruits sont des siliques cylindriques et bosselées pouvant atteindre 4,5 cm de longueur, le pédicelle est court et mince.

Espèces semblables
Moutarde des oiseaux (pl., vég., fl.), radis sauvage (pl., vég., fl.).

Moutarde des champs




Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 23 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des champs

Wild mustard

Sinapis arvensis L. (= *Brassica kaber* (DC.) L.C. Wheeler var. *pinnatifida* (Stokes) L.C. Wheeler).



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des champs

Wild mustard

Sinapis arvensis L. (= *Brassica kaber* (DC.) L.C. Wheeler var. *pinnatifida* (Stokes) L.C. Wheeler).



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des champs

Wild mustard

Sinapis arvensis L. (= *Brassica kaber* (DC.) L.C. Wheeler var. *pinnatifida* (Stokes) L.C. Wheeler).



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des champs

Wild mustard

Sinapis arvensis L. (= *Brassica kaber* (DC.) L.C. Wheeler var. *pinnatifida* (Stokes) L.C. Wheeler).



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des champs

Wild mustard

Sinapis arvensis L. (= *Brassica kaber* (DC.) L.C. Wheeler var. *pinnatifida* (Stokes) L.C. Wheeler).



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Moutarde des champs

Wild mustard

Sinapis arvensis L. (= *Brassica kaber* (DC.) L.C. Wheeler var. *pinnatifida* (Stokes) L.C. Wheeler).



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Radis sauvage


Wild radish

Raphanus raphanistrum L., espèce annuelle.










Plantule

Plantule à rosette et à feuilles alternes.
(Odeur de radis au froissement.)

Cotylédons

En forme de cœur, échancrure profonde.
Pétiole long, pouvant porter quelques poils et mesurant plus de 20 mm à complet développement.

Feuilles

Premières feuilles : allongées, lobées à profondément découpées.
Feuilles matures : profondément découpées, segments sinués-dentés.
Les feuilles ont des poils raides et elles sont rugueuses au toucher.


Plante adulte

Tige dressée et ramifiée, 30 cm à 1 m de hauteur.
Feuilles du haut de la tige grossièrement dentées et pétiolées.
Fleurs blanches, rosées ou d'apparence jaune délavé, pétales en croix et veinés de violet.
Les fruits sont des siliques étranglées qui se divisent en fragments à maturité.

Espèces semblables

Moutarde des champs (pl., vég., fl.), moutarde des oiseaux (pl., vég., fl.).

Radis sauvage




Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 23 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Radis sauvage

Wild radish

Raphanus raphanistrum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Radis sauvage

Wild radish

Raphanus raphanistrum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Radis sauvage

Wild radish

Raphanus raphanistrum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Radis sauvage

Wild radish

Raphanus raphanistrum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Radis sauvage

Wild radish

Raphanus raphanistrum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Radis sauvage

Wild radish

Raphanus raphanistrum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Radis sauvage

Wild radish

Raphanus raphanistrum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Radis sauvage

Wild radish

Raphanus raphanistrum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Bourse-à-pasteur

Shepherd's-purse

Capsella bursa-pastoris (L.) Medic., espèce annuelle ou annuelle hivernante.




Plantule

Plantule à rosette.

Les deux premières feuilles opposées, les suivantes alternes.

Cotylédons

De forme oblongue, 3 à 6 mm de longueur, sommet arrondi.



Feuilles

Premières feuilles : entières ou presque, arrondies à ovales.

Feuilles matures : généralement à découpures profondes, allongées.

Présence de poils simples et de poils à 5 branches en forme d'étoile sur toutes les feuilles (voir la rosette développée).

N.B. : dans certaines populations de l'espèce, les feuilles matures demeurent entières ou simplement dentées.




Rosette développée

La rosette développée est hivernante. Elle comporte habituellement de nombreuses feuilles découpées ou entières. La vérification de la présence des poils étoilés (visibles à la loupe) permet de conclure l'identification.

Plante adulte

La tige est peu ramifiée, 10 à 50 cm de hauteur.

Les fleurs, petites et blanches, sont portées par de longs pédicelles.

Les fruits sont des siliques aplaties, de forme triangulaire ou en cœur.




Espèces semblables

Vélar fausse giroflée (pl., vég.), lépidie densiflore (pl., vég.), vergerette du Canada (pl.).



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Bourse-à-pasteur

Shepherd's-purse
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Bourse-à-pasteur

Shepherd's-purse
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Bourse-à-pasteur

Shepherd's-purse
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Bourse-à-pasteur

Shepherd's-purse
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Bourse-à-pasteur

Shepherd's-purse
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Bourse-à-pasteur

Shepherd's-purse
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Bourse-à-pasteur

Shepherd's-purse
Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vélar fausse giroflée

Wormseed mustard

Erysimum cheiranthoides L., espèce annuelle ou annuelle hivernante.




Plantule

Plantule à rosette.

Les deux premières feuilles opposées, les suivantes alternes.

Cotylédons

De forme oblongue, 3 à 6 mm de longueur, sommet arrondi.

Présence de poils à 3 branches à la face supérieure.

Feuilles

Premières feuilles : entières ou presque, arrondies à allongées.

Feuilles matures : légèrement dentées, allongées.

Poils à 3 branches (visibles à la loupe) couvrant les feuilles, rudes au toucher.



Rosette développée et plante adulte

La rosette développée est hivernante. Elle comporte habituellement plusieurs feuilles.

Tige ramifiée, 15 cm à 1,2 m de hauteur, anguleuse ; poils couchés à 2 branches.

Fleurs jaunes, réunies en grappes au sommet de la tige et des rameaux.

Les fruits sont des siliques cylindriques comme celles des moutardes, mais portant des poils à 3 branches.

Poils ramifiés, à 2 ou 3 branches, sur tous les organes de la plante.




Espèces semblables

Bourse-à-pasteur (pl., vég.), lépidie densiflore (pl., vég.).




Vélar fausse giroflée



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vélar fausse giroflée

Wormseed mustard
Erysimum cheiranthoides L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vélar fausse giroflée

Wormseed mustard
Erysimum cheiranthoides L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vélar fausse giroflée

Wormseed mustard
Erysimum cheiranthoides L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vélar fausse giroflée

Wormseed mustard
Erysimum cheiranthoides L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vélar fausse giroflée

Wormseed mustard
Erysimum cheiranthoides L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vélar fausse giroflée

Wormseed mustard
Erysimum cheiranthoides L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vélar fausse giroflée

Wormseed mustard
Erysimum cheiranthoides L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lépidie densiflore

Common pepper-grass
Lepidium densiflorum Schrad., espèce annuelle ou annuelle hivernante.




Plantule
Plantule à rosette.
Les deux premières feuilles opposées, les suivantes alternes.
Cotylédons
De forme allongée avec un sommet arrondi, 10 à 15 mm de longueur, teinte vert foncé. Pétiole à base parfois rougeâtre.



Feuilles
Premières feuilles : ovales à allongées, bord du limbe entier. Pétiole assez distinct.
Feuilles matures : allongées, d'abord dentées à limbe s'atténuant en pétiole puis profondément découpées et pétiolées.
Les feuilles sont d'apparence glabre (des poils sont présents, mais ils sont très courts et visibles à la loupe).



Rosette développée
Feuilles de la rosette profondément découpées.
Feuilles de la tige peu nombreuses, courtes, étroites et simplement dentées.

Plante adulte
Tige très ramifiée dans sa partie supérieure, apparence glabre (poils très courts, visibles à la loupe), 20 à 50 cm de hauteur.
Fleurs peu voyantes (pétales très petits), blanchâtres à verdâtres.
L'inflorescence est formée de grappes très denses de fleurs qui donnent des silicules (fruit sec).
Les silicules (moins de 3 mm de diamètre) de forme arrondie sont aplaties avec une échancrure au sommet ; chacune contient 2 graines.
(La silicule du tabouret des champs a une forme similaire, mais elle est nettement ailée et plus grosse, 8 à 12 mm de diamètre.)






Cliquez pour agrandir

Espèces semblables

Bourse-à-pasteur (pl., vég.), tabouret des champs (pl., vég.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 04 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lépidie densiflore

Common pepper-grass
Lepidium densiflorum Schrad.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lépidie densiflore

Common pepper-grass
Lepidium densiflorum Schrad.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lépidie densiflore

Common pepper-grass
Lepidium densiflorum Schrad.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lépidie densiflore

Common pepper-grass
Lepidium densiflorum Schrad.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lépidie densiflore

Common pepper-grass
Lepidium densiflorum Schrad.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lépidie densiflore

Common pepper-grass
Lepidium densiflorum Schrad.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tabouret des champs

Stinkweed
Thlaspi arvense L., espèce annuelle.





Plantule
Plantule à rosette.
Les deux premières feuilles opposées, les suivantes alternes.
(Odeur d'ail au froissement.)
Cotylédons
De forme orbiculaire à oblongue, limbe de 4 à 6 mm de longueur, sommet arrondi à tronqué ou légèrement émarginé, pétiole distinct.
Feuilles
Premières feuilles : entières, ovales-arrondies, pétiolées, sans poils.
Feuilles matures : sinuées-dentées, ovales-allongées, pétiole plus ou moins distinct, sans poils.






Plante adulte
Plante glabre. Tige anguleuse, dressée et ramifiée, 10 à 60 cm de hauteur.
Les feuilles de la tige sont sinuées-dentées, sans pétiole ; leur base se divise en 2 petits lobes aigus.
Petites fleurs blanches réunies en grappes au bout de la tige et des rameaux.
Les fruits sont des silicules (8 à 12 mm de diamètre) ailées de forme arrondie, aplaties et portées par de longs pédicelles.

Espèces semblables
Lépidie densiflore (pl., vég.), barbarée vulgaire (pl.).



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tabouret des champs

Stinkweed
Thlaspi arvense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tabouret des champs

Stinkweed

Thlaspi arvense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tabouret des champs

Stinkweed

Thlaspi arvense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tabouret des champs

Stinkweed

Thlaspi arvense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tabouret des champs

Stinkweed

Thlaspi arvense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tabouret des champs

Stinkweed

Thlaspi arvense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tabouret des champs

Stinkweed

Thlaspi arvense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vergerette du Canada

Canada fleabane

Erigeron canadensis L., espèce annuelle ou annuelle hivernante.




Plantule

Plantule à rosette et à feuilles alternes.

Cotylédons

De forme oblongue, très petits, 2 à 3 mm de longueur. Sommet arrondi, pétiole court.

Feuilles

Premières feuilles : entières, arrondies à ovales, très pubescentes (poils dressés et blanchâtres).

Feuilles matures : quelques grosses dents sur le bord du limbe, allongées, très pubescentes (poils soyeux).

Les feuilles sont d'une teinte vert mat, le pétiole est plus ou moins distinct.



Plante adulte

Plante pubescente. Tige dressée, ramifiée surtout dans sa partie supérieure, 20 cm à 1 m de hauteur.

Feuilles de la tige très allongées, entières, limbe atténué en pétiole. De longs cils dressés bordent la partie inférieure des feuilles.

La plante prend une teinte vert pâle à la floraison.




Fleurs

Fleurs blanchâtres à verdâtres (rayons peu apparents) réunies en petits capitules (2 à 5 mm de diamètre). Ces derniers sont très nombreux à l'extrémité de la tige et des rameaux.

La graine porte une petite aigrette.




Espèces semblables

Verge d'or à feuilles de graminée (pl.), verge d'or du Canada (pl.).

Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vergerette du Canada

Canada fleabane
Erigeron canadensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vergerette du Canada

Canada fleabane
Erigeron canadensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vergerette du Canada

Canada fleabane
Erigeron canadensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vergerette du Canada

Canada fleabane
Erigeron canadensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vergerette du Canada

Canada fleabane
Erigeron canadensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vergerette du Canada

Canada fleabane
Erigeron canadensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vergerette du Canada

Canada fleabane
Erigeron canadensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Verge d'or à feuilles de graminée

Narrow-leaved goldenrod
Solidago graminifolia (L.) Salisb., espèce vivace.






Cliquez pour agrandir

Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
Oblongs, très petits, 1,5 à 2,5 mm de longueur.
Feuilles
Premières feuilles : arrondies à ovales, entières, sans poils.
Feuilles matures : allongées, entières, nervures parallèles, sans poils.

Plant végétatif et plante adulte
Plante à rhizomes.
Tige dressée, ramifiée dans le haut, 30 cm à 1 m de hauteur.
Feuilles nombreuses, glabres, étroites et entières (graminoïdes). Surface du limbe plutôt lisse.
Fleurs jaunes en capitules réunis en petits groupes à l'extrémité de la tige et des rameaux, l'ensemble donne une forme aplatie au sommet de la plante.

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Verge d'or à feuilles de graminée

Narrow-leaved goldenrod
Solidago graminifolia (L.) Salisb.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Verge d'or à feuilles de graminée

Narrow-leaved goldenrod
Solidago graminifolia (L.) Salisb.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Verge d'or à feuilles de graminée

Narrow-leaved goldenrod
Solidago graminifolia (L.) Salisb.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Verge d'or à feuilles de graminée

Narrow-leaved goldenrod
Solidago graminifolia (L.) Salisb.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Verge d’or du Canada

Canada goldenrod
Solidago canadensis L., espèce vivace.



Cliquez pour agrandir

Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
Oblongs, très petits, 1,5 à 2,5 mm de longueur.
Feuilles
Premières feuilles : arrondies à ovales, bord du limbe portant 1 ou 2 encoches ou quelques dents grossières, pubescentes.
Feuilles matures : allongées, dentées, 3 nervures (2 d’entre elles naissent de la nervure principale), pubescence blanchâtre à la face inférieure (voir le plant végétatif).

Plant végétatif et plante adulte
Plante à rhizomes courts.
Tige dressée, ramifiée dans le haut, 1,5 m de hauteur, poils dans la partie supérieure. Feuilles s’attachant directement à la tige (pas de pétiole) et légèrement rugueuses au toucher.
Fleurs jaunes réunies en capitules formant une inflorescence pyramidale au sommet de la plante.

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Verge d’or du Canada

Canada goldenrod
Solidago canadensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Verge d’or du Canada

Canada goldenrod
Solidago canadensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Verge d’or du Canada

Canada goldenrod
Solidago canadensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Verge d’or du Canada

Canada goldenrod
Solidago canadensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Céraiste vulgaire

Mouse-eared chickweed

Cerastium fontanum Baumg. (= *Cerastium vulgatum* L.), espèce annuelle ou vivace de courte durée.




Plantule

Plantule à tige et à feuilles opposées.

Cotylédons

De forme oblongue, 3 à 6 mm de longueur.

Feuilles

Toutes semblables : petites (1 à 2 cm de longueur), entières, de forme arrondie à ovale ; présence de longs poils dressés sur les premières feuilles qui deviennent plus nombreux sur les feuilles suivantes.



Plant végétatif et plante adulte

Plante pubescente.

Tige et rameaux couchés à la base et souvent d'une teinte rouge-brun ; 15 à 40 cm de longueur. Les premiers nœuds peuvent s'enraciner.

Si on pince la tige, on découvre un axe très élastique à l'intérieur (comme chez les stellaires).




Fleurs et fruits

Petites fleurs blanches dont les pétales sont échancrés assez profondément au sommet. Les fleurs sont groupées à l'extrémité de longs pédoncules.

Le fruit est une longue capsule courbée dans le haut et se terminant par de petites dents (une dizaine).




Espèces semblables

Stellaire moyenne (pl., vég.), stellaire à feuilles de graminée (pl., vég.).

Céraiste vulgaire



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Céraiste vulgaire

Mouse-eared chickweed

Cerastium fontanum Baumg. (= *Cerastium vulgatum* L.), espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Céraiste vulgaire

Mouse-eared chickweed

Cerastium fontanum Baumg. (= *Cerastium vulgatum* L.), espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Céraiste vulgaire

Mouse-eared chickweed

Cerastium fontanum Baumg. (= *Cerastium vulgatum* L.), espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Céraiste vulgaire

Mouse-eared chickweed

Cerastium fontanum Baumg. (= *Cerastium vulgatum* L.), espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Céraiste vulgaire

Mouse-eared chickweed

Cerastium fontanum Baumg. (= *Cerastium vulgatum* L.), espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Céraiste vulgaire

Mouse-eared chickweed

Cerastium fontanum Baumg. (= *Cerastium vulgatum* L.), espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Céraiste vulgaire

Mouse-eared chickweed

Cerastium fontanum Baumg. (= *Cerastium vulgatum* L.), espèce annuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire moyenne

Chickweed

Stellaria media (L.) Vill., espèce annuelle ou annuelle hivernante.



Plantule

Plantule à tige et à feuilles opposées.

Cotylédons

De forme oblongue à allongée, limbe de 5 à 8 mm de longueur, sommet en pointe.

Le pétiole peut devenir aussi long que le limbe.

Feuilles

Toutes semblables : entières, ovales, avec une pointe au sommet.

Les pétioles portent de longs poils.





Plante adulte

Tige couchée, ronde, rampante ou presque (peut s'enraciner aux nœuds), très ramifiée,
5 à 50 cm de longueur.

Fleurs petites, blanches, en forme d'étoile, pétales profondément divisés en V.

La plante peut former des tapis denses.





Traits remarquables :

- une ligne de poils court sur la tige en se décalant d'un certain angle à chaque entre-nœud ;
- la tige est élastique à l'extension (si on pince légèrement la tige et qu'on l'étire, sa partie périphérique se rompt et laisse voir un cordon central tendu comme un élastique).

Espèce semblable

Stellaire à feuilles de graminée (pl., vég.).





Stellaire moyenne



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire moyenne

Chickweed
Stellaria media (L.) Vill.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire moyenne

Chickweed

Stellaria media (L.) Vill.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire moyenne

Chickweed

Stellaria media (L.) Vill.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire moyenne

Chickweed

Stellaria media (L.) Vill.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire moyenne

Chickweed

Stellaria media (L.) Vill.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire moyenne

Chickweed

Stellaria media (L.) Vill.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire moyenne

Chickweed

Stellaria media (L.) Vill.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire à feuilles de graminée

Grass-leaved stitchwort
Stellaria graminea L., espèce vivace.















Plantule
Plantule à tige et à feuilles opposées.
Cotylédons
De forme oblongue à allongée, 5 à 10 mm de longueur, sommet en pointe.
Feuilles
Premières feuilles : entières, ovales, terminées en pointe (comme les feuilles de la stellaire moyenne).
Ressemblent aux cotylédons.
Feuilles matures : entières, allongées, terminées en pointe, nervure centrale bien apparente.
Les feuilles sont glabres.

Pousses végétatives
Elles proviennent des tiges couchées sur le sol dont les nœuds se sont enracinés.

Plante adulte
Plante presque glabre.
Tige carrée, couchée, très ramifiée, 20 à 50 cm de longueur.
Les tiges s'enracinent aux nœuds et donnent des pousses.
Feuilles étroites rappelant celles des graminées.
Si on pince la tige, on découvre un axe très élastique à l'intérieur.
Fleurs
Fleurs : petites (6 à 12 mm de diamètre), en forme d'étoile, blanches, 5 pétales profondément divisés en V (aspect de fleurs à 10 pétales). Elles sont nombreuses et disposées sur des pédoncules grêles.
(Fleurs semblables à celles de la stellaire moyenne mais plus dégagées du feuillage.)

Espèces semblables
Stellaire moyenne (pl., vég.), céraiste vulgaire (pl., vég.).

Stellaire à feuilles de graminée



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 04 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire à feuilles de graminée

Grass-leaved stitchwort
Stellaria graminea L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire à feuilles de graminée

Grass-leaved stitchwort
Stellaria graminea L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire à feuilles de graminée

Grass-leaved stitchwort
Stellaria graminea L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire à feuilles de graminée

Grass-leaved stitchwort
Stellaria graminea L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire à feuilles de graminée

Grass-leaved stitchwort
Stellaria graminea L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire à feuilles de graminée

Grass-leaved stitchwort
Stellaria graminea L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Stellaire à feuilles de graminée

Grass-leaved stitchwort
Stellaria graminea L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon des champs

Canada thistle
Cirsium arvense (L.) Scop., espèce vivace.



Plantule
Plantule à rosette.
Les deux premières feuilles opposées, les suivantes alternes.

Cotylédons
De forme oblongue, sommet arrondi, 8 à 15 mm de longueur, charnus, nervure centrale visible, pétiole court.





Feuilles
Premières feuilles : allongées, bord du limbe sinué-denté et muni d'aiguillons, pilosité blanchâtre (poils laineux) à la face inférieure.
Feuilles matures : comme celles des pousses végétatives.

Pousses végétatives
Les pousses sont issues des racines.
Feuilles profondément découpées, piquantes et épineuses à la marge qui est ondulée. Poils laineux à la face inférieure (pilosité blanchâtre).





Plante adulte
Tige dressée et ramifiée, 30 cm à 1,2 m de hauteur.
Les feuilles de la tige, devenues très épineuses, perdent leur pubescence blanchâtre à la face inférieure.
Fleurs rose violacé réunies en capitules petits (10 à 20 mm de diamètre), nombreux, non épineux.
Les fleurs mâles et femelles sont sur des plantes différentes.
Les graines sont munies d'une aigrette plumeuse d'un roux terne.



Espèces semblables
Chardon vulgaire (pl., vég.), laiteron des champs (pl.).

Chardon des champs



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon des champs

Canada thistle
Cirsium arvense (L.) Scop.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon des champs

Canada thistle
Cirsium arvense (L.) Scop.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon des champs

Canada thistle
Cirsium arvense (L.) Scop.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon des champs

Canada thistle
Cirsium arvense (L.) Scop.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon des champs

Canada thistle
Cirsium arvense (L.) Scop.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon des champs

Canada thistle
Cirsium arvense (L.) Scop.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon vulgaire

Bull thistle

Cirsium vulgare (Savi) Tenore, espèce bisannuelle.









Plantule

Plantule à rosette.

Les deux premières feuilles opposées, les suivantes alternes.

Cotylédons

De forme oblongue, sommet arrondi, 8 à 15 mm de longueur, charnus, nervure centrale visible, pétiole court.

Feuilles

Premières feuilles : allongées, bord du limbe sinué-denté et muni d'aiguillons, pilosité blanchâtre (poils laineux) à la face inférieure.

Feuilles matures : sinuées-dentées à profondément découpées, piquantes et épineuses à la marge, pilosité blanchâtre (poils laineux) à la face inférieure.

Les feuilles ont une teinte plus foncée, un limbe plus large et une marge moins ondulée que celles du chardon des champs.

Plant de 1re année

Une rosette de feuilles rattachées à une racine pivotante.

Plante adulte

Tige dressée, ramifiée, 30 cm à 1,5 m de hauteur.

Feuilles caulinaires décurrentes (le limbe se prolonge sur la tige).

Fleurs pourpres réunies en capitules assez gros (2 à 7 cm de diamètre) mais peu nombreux.

Capitules épineux (non épineux chez le chardon des champs).

Graines munies d'une aigrette plumeuse.

Espèces semblables

Chardon des champs (pl., vég.), laiteron rude (pl.).

Chardon vulgaire




Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon vulgaire

Bull thistle
Cirsium vulgare (Savi) Tenore



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon vulgaire

Bull thistle
Cirsium vulgare (Savi) Tenore



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon vulgaire

Bull thistle

Cirsium vulgare (Savi) Tenore



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon vulgaire

Bull thistle
Cirsium vulgare (Savi) Tenore



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon vulgaire

Bull thistle
Cirsium vulgare (Savi) Tenore



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon vulgaire

Bull thistle
Cirsium vulgare (Savi) Tenore



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Chardon vulgaire

Bull thistle
Cirsium vulgare (Savi) Tenore



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Laiteron rude

Spiny annual sow-thistle
Sonchus asper (L.) Hill, espèce annuelle.









Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme orbiculaire à oblongue, sommet arrondi à tronqué, limbe de 3 à 6 mm de longueur, pétiole court. La face inférieure est souvent teintée de rouge-violet.
Feuilles
Premières feuilles : arrondies-ovales à allongées, sinuées-dentées. Pétiole plus ou moins distinct.
Feuilles matures : allongées, sinuées-dentées à plus ou moins profondément découpées.
Les feuilles sont rigides, à bordure ondulée et munies de dents se terminant par des épines légèrement piquantes.

Remarque : on peut reconnaître le caractère annuel de la plante par sa racine qui s'effile vers le bas et qui ne s'attache à aucun organe souterrain (à comparer avec le laiteron des champs, espèce vivace).

Plante adulte
Tige dressée, creuse, peu ramifiée, 40 cm à 1,2 m de hauteur, sans poils.
Les feuilles caulinaires sont munies de 2 larges oreillettes enroulées sur elles-mêmes (spiralées) qui enserrent la tige.
Fleurs jaunes réunies en capitules d'environ 2 cm de diamètre (légèrement plus petits que ceux du laiteron des champs).
Les capitules sont portés par de longs pédoncules au sommet de la tige et des rameaux. Présence de latex à la brisure d'un organe de la plante.

Espèces semblables
Laiteron des champs (pl., vég., fl.), laiteron potager (pl., vég., fl.).



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 05 août 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron rude

Spiny annual sow-thistle
Sonchus asper (L.) Hill



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron rude

Spiny annual sow-thistle
Sonchus asper (L.) Hill



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron rude

Spiny annual sow-thistle
Sonchus asper (L.) Hill



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron rude

Spiny annual sow-thistle
Sonchus asper (L.) Hill



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron rude

Spiny annual sow-thistle
Sonchus asper (L.) Hill



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron rude

Spiny annual sow-thistle
Sonchus asper (L.) Hill



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron rude

Spiny annual sow-thistle
Sonchus asper (L.) Hill



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Laiteron des champs

Perennial sow-thistle
Sonchus arvensis L., espèce vivace.



Cliquez pour agrandir

Plantules (peu fréquentes le printemps)
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme orbiculaire à oblongue, 5 à 8 mm de longueur.
Feuilles
Premières feuilles : arrondies-ovales à allongées, sinuées-dentées. Pétiole plus ou moins distinct.
Feuilles matures : comme celles des pousses végétatives.

Pousses végétatives
Les pousses végétatives sont issues des nombreux bourgeons sur les racines (l'espèce se développe en colonies); elles forment des rosettes de feuilles alternes.
Feuilles
Allongées, sinuées-dentées à plus ou moins profondément découpées, un peu bleuâtres, pratiquement sans poils, nervure centrale blanchâtre.
Le bord du limbe est muni de dents inégales, épineuses mais non piquantes.

Plante adulte
Tige dressée, creuse, 60 cm à 1,5 m de hauteur, sans poils à la base mais fortement velue (poils glanduleux) dans le haut.
Les feuilles caulinaires prolongent leur limbe de 2 petites oreillettes arrondies qui entourent plus ou moins la tige (ne pas confondre avec les oreillettes spiralées du laiteron rude).
Fleurs jaunes réunies en capitules de grande taille (jusqu'à 4 cm de diamètre).
Les capitules, sur de longs pédoncules au sommet de la tige et des rameaux, sont couverts d'une pubescence glanduleuse.
Présence de latex à la brisure d'un organe de la plante.

Espèces semblables
Laiteron des champs glabre (pl.,vég., fl.), laiteron rude (pl., vég., fl.), laiteron potager (pl., vég., fl.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron des champs

Perennial sow-thistle
Sonchus arvensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron des champs

Perennial sow-thistle
Sonchus arvensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron des champs

Perennial sow-thistle
Sonchus arvensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron des champs

Perennial sow-thistle
Sonchus arvensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron des champs

Perennial sow-thistle
Sonchus arvensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron des champs

Perennial sow-thistle
Sonchus arvensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron des champs

Perennial sow-thistle
Sonchus arvensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron des champs glabre

Smooth perennial sow-thistle
Sonchus arvensis L. var. *glabrescens* Guenth., Grab. & Wimm., espèce vivace.



Se distingue du laiteron des champs par l'absence de poils sur la tige et les capitules.

Espèces semblables
Laiteron des champs (pl., vég.,fl.), laiteron rude (pl., vég., fl.), laiteron potager (pl., vég., fl.).

Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron des champs glabre

Smooth perennial sow-thistle
Sonchus arvensis L. var. *glabrescens* Guenth., Grab. & Wimm.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron potager

Annual sow-thistle
Sonchus oleraceus L., espèce annuelle.







Cliquez pour agrandir

Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme orbiculaire à oblongue, sommet arrondi à tronqué, 5 à 8 mm de longueur, pétiole distinct.
Feuilles
Premières feuilles : arrondies-ovales à allongées, sinuées-dentées devenant profondément découpées. Segment terminal arrondi à légèrement triangulaire. Pétiole plus ou moins distinct.
Feuilles matures (à partir de la 4e ou 5e f.) : profondément découpées en segments.
Le segment terminal est triangulaire et de plus grande taille que les segments latéraux. Le bord du limbe est muni de dents fines, épineuses mais non piquantes comme chez le laiteron des champs (dents piquantes chez le laiteron rude).
Pas de poils.
Pétiole foliacé : une lisière de limbe de chaque coté.
Feuilles molles et d'aspect fragile.

Plante adulte
Tige dressée, creuse, peu ramifiée, 40 cm à 1 m de hauteur, sans poils.
Les feuilles caulinaires ont à leur base 2 petites oreillettes pointues qui entourent plus ou moins la tige (les oreillettes du laiteron des champs sont arrondies ; celles du laiteron rude sont spiralées).
Fleurs jaunes réunies en capitules d'une grosseur comparable à ceux du laiteron rude, environ 2 cm de diamètre. Capitules portés par de longs pédoncules au sommet de la tige et des rameaux.
Présence de latex à la brisure d'un organe de la plante.

Caractères communs des laiterons :
- plantes à latex (signification du nom laiteron) ;
- les feuilles naissantes sont pourvues d'une pilosité

blanchâtre formée de poils à plusieurs cellules qui apparaissent disposées en chapelets (aussi chez le séneçon vulgaire) ;
- les feuilles ont des dents épineuses peu ou pas piquantes et des oreillettes qui prolongent la base du limbe (aussi chez la laitue scariole).

Espèces semblables
Laiteron rude (pl., vég., fl.), laiteron des champs (pl., vég., fl.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec
© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron potager

Annual sow-thistle
Sonchus oleraceus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron potager

Annual sow-thistle
Sonchus oleraceus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron potager

Annual sow-thistle
Sonchus oleraceus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron potager

Annual sow-thistle
Sonchus oleraceus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laiteron potager

Annual sow-thistle
Sonchus oleraceus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Séneçon vulgaire

Common groundsel
Senecio vulgaris L., espèce annuelle.





Plantule

Plantule à tige très courte (les feuilles semblent disposées en rosette) et à feuilles alternes.

Cotylédons

De forme oblongue à allongée, sommet arrondi, 6 à 10 mm de longueur, pétiole distinct.

Feuilles

Premières feuilles : à bord denté, ovales-arrondies à progressivement allongées, souvent teintées de violet à la face inférieure.
Le pétiole peut porter quelques poils.
Feuilles matures : profondément découpées, allongées, bord sinué-denté. Pétiole plus ou moins distinct.
Les feuilles sont légèrement charnues et plutôt glabres, sauf les nouvelles feuilles qui sont recouvertes de poils laineux.




Plante adulte

Plante complétant rapidement son cycle.
Tige dressée, ramifiée, 10 à 60 cm de hauteur, légèrement charnue.
Les feuilles du bas de la tige n'ont pas de pétiole distinct, celles situées plus haut ont de petits lobes à la base du limbe qui entourent la tige.
Inflorescence formée de nombreux petits capitules de fleurs jaunes sans rayons groupés au bout de la tige et des rameaux.



Séneçon vulgaire



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Séneçon vulgaire

Common groundsel
Senecio vulgaris L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Séneçon vulgaire

Common groundsel
Senecio vulgaris L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Séneçon vulgaire

Common groundsel
Senecio vulgaris L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Séneçon vulgaire

Common groundsel
Senecio vulgaris L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Séneçon vulgaire

Common groundsel
Senecio vulgaris L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Séneçon vulgaire

Common groundsel
Senecio vulgaris L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laitue scariole

Prickly lettuce
Lactuca scariola L. (= *Lactuca serriola* L.), espèce annuelle.









Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme orbiculaire, 4 à 8 mm de longueur, sommet tronqué à émarginé.
Présence de poils glanduleux assez persistants.
Feuilles
Premières feuilles : ovales-arrondies à allongées, sinuées à sinuées-dentées (quelques dents fines sur la bordure du limbe un peu comme les premières feuilles du pissenlit), quelques poils glanduleux qui disparaissent assez rapidement.
Feuilles matures : voir plant végétatif.

Plant végétatif
Feuilles allongées, bord sinué à sinué-denté à lobé. La bordure du limbe est munie de dents fines (épineuses mais non piquantes). Sur la nervure centrale, sous la feuille, on trouve une ligne de poils raides.

Plante adulte
Tige dressée, très ramifiée, munie d'épines à la base, haute de 50 cm à 1,5 m.
Les feuilles situées au bas ou au haut de la tige sont peu divisées, les autres sont profondément découpées en lobes.
Les feuilles caulinaires ont à leur base 2 petites oreillettes aiguës (arrondies ou spiralées chez les laiterons) qui entourent plus ou moins la tige.
Nervure centrale blanchâtre, saillante et munie d'une ligne d'épines sous la feuille.
Les feuilles tendent à maintenir leur limbe en position verticale par la torsion de leur base : feuilles en drapeau.
Plante à latex.
Inflorescence et fleurs
Fleurs jaune pâle réunies en petits capitules de 4 à 8 mm de diamètre. Les capitules sont très nombreux et

Cliquez pour agrandir

disposés en panicule au sommet de la tige et des rameaux.

Espèces semblables
Laiteron des champs (pl., vég.), laiteron rude (pl., vég.), pissenlit (pl., vég.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laitue scariole

Prickly lettuce
Lactuca scariola L. (= *Lactuca serriola* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laitue scariole

Prickly lettuce
Lactuca scariola L. (= *Lactuca serriola* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laitue scariole

Prickly lettuce
Lactuca scariola L. (= *Lactuca serriola* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laitue scariole

Prickly lettuce
Lactuca scariola L. (= *Lactuca serriola* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laitue scariole

Prickly lettuce
Lactuca scariola L. (= *Lactuca serriola* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laitue scariole

Prickly lettuce
Lactuca scariola L. (= *Lactuca serriola* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Laitue scariole

Prickly lettuce
Lactuca scariola L. (= *Lactuca serriola* L.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pissenlit

Dandelion

Taraxacum officinale Weber, espèce vivace.




Plantule

Plantule à rosette et à feuilles alternes.

Cotylédons

De forme orbiculaire à oblongue, sommet arrondi, 5 à 10 mm de longueur, pétiole court.

Feuilles

Premières feuilles : arrondies, la première adopte une forme géométrique à 6 côtés, les suivantes sinuées-dentées.

Feuilles matures : allongées, sinuées-dentées à profondément découpées, segments irréguliers, marge généralement dentée.

Les feuilles ont des formes très variables d'une plante à l'autre ; généralement glabres, elles peuvent être aussi pubescentes.






Rosette développée et plante adulte

Feuilles toutes disposées en rosette à la base de la plante. Racine pivotante forte. Pas de tige, mais des hampes florales (issues du centre des rosettes) nues, creuses et de 5 à 30 cm de hauteur.

Fleurs jaunes à rayons réunies en capitules (un seul par hampe florale) de 3 à 5 cm de diamètre.

Graines à aigrette blanche dispersées par le vent.

Présence de latex.




Espèces semblables

Laiteron des champs (pl., vég.), tussilage pas-d'âne (fl.).



Pissenlit



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pissenlit

Dandelion
Taraxacum officinale Weber



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pissenlit

Dandelion
Taraxacum officinale Weber



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pissenlit

Dandelion
Taraxacum officinale Weber



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pissenlit

Dandelion
Taraxacum officinale Weber



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pissenlit

Dandelion
Taraxacum officinale Weber



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pissenlit

Dandelion
Taraxacum officinale Weber



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pissenlit

Dandelion
Taraxacum officinale Weber



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pissenlit

Dandelion
Taraxacum officinale Weber



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tussilage pas-d’âne

Colt’s-foot
Tussilago farfara L., espèce vivace.





Pousses florales
Issues de rhizomes souterrains, elles sortent tôt le printemps avant les feuilles. Ce sont des tiges sans feuilles, mais munies d’écailles rougeâtres et recouvertes d’une pilosité blanchâtre. Terminées par un capitule de fleurs jaune or, elles mesurent de 5 à 50 cm de hauteur. Leurs fleurs ressemblent beaucoup à celles du pissenlit, mais les rayons sont plus étroits et plus courts.



Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme oblongue à allongée, sommet arrondi, limbe de 5 à 10 mm de longueur.
Feuilles
Premières feuilles : entières ou presque, arrondies.
Feuilles matures : triangulaires à arrondies, bord sinué-denté, base en forme de cœur (voir pousses végétatives pour description plus complète).





Pousses végétatives
Les pousses végétatives sortent plus tard que les pousses florales mais elles sont issues des mêmes rhizomes que celles-ci. La tige est courte.
Feuilles
Grandes feuilles (7 à 13 cm de longueur par 10 à 20 cm de largeur), de forme triangulaire à arrondie, bord sinué-denté (les dents souvent brun rougeâtre), base en cœur. Nervures palmées (partent de la base et rayonnent) très visibles. Pétioles longs et dressés.
Les feuilles, à leur apparition, sont couvertes d’une pilosité laineuse qui ne persiste qu’à la face inférieure.



Tussilage pas-d’âne



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tussilage pas-d’âne

Colt’s-foot
Tussilago farfara L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tussilage pas-d’âne

Colt’s-foot
Tussilago farfara L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tussilage pas-d’âne

Colt’s-foot
Tussilago farfara L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tussilage pas-d’âne

Colt’s-foot
Tussilago farfara L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tussilage pas-d’âne

Colt’s-foot
Tussilago farfara L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Tussilage pas-d'âne

Colt's-foot
Tussilago farfara L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Liseron des champs

Field bindweed
Convolvulus arvensis L., espèce vivace.





Cliquez pour agrandir

Espèce très proche du liseron des haies.
S'en distingue bien par ses fleurs plus petites (généralement entre 1,5 et 2 cm de longueur) quoique roses ou blanches elles aussi et par ses bractées (à ne pas confondre avec les sépales à la base de la fleur) linéaires et situées vers le milieu du long pédoncule floral.
Les feuilles sont de forme et de dimension très variables, mais toujours hastées ou sagittées.

Espèces semblables
Liseron des haies (pl., vég., fl.), renouée liseron (pl., vég.), sarrasin commun (pl., vég.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Liseron des champs

Field bindweed
Convolvulus arvensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Liseron des champs

Field bindweed
Convolvulus arvensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Liseron des haies

Hedge bindweed
Convolvulus sepium L., espèce vivace.



Cliquez pour agrandir

Plantule
Plantule à tige et à feuilles alternes.
Cotylédons
Carrés, grands, 10 à 20 mm de longueur, nervés sur toute leur surface, échancrés au sommet et à la base, longuement pétiolés.
Feuilles
Toutes semblables : entières, ovales-triangulaires, le limbe est prolongé à la base par 2 petits lobes (feuilles hastées ou sagittées).

Pousses végétatives
Des tiges feuillées émergent du sol à partir des rhizomes formant un réseau très étendu dans le sol. Feuilles hastées ou sagittées.

Plante adulte
Tige couchée, très ramifiée, jusqu'à plus de 3 m de longueur ; elle peut s'enrouler autour d'un support et grimper comme une liane.
Très grandes fleurs en trompette (généralement entre 5 et 6 cm de longueur), roses ou blanches, le plus souvent solitaires au bout d'un long pédoncule.
Deux grandes bractées (feuilles modifiées accompagnant les fleurs) sont situées immédiatement à la base de la fleur et cachent les sépales (au nombre de 5).
Pas d'ochréa aux nœuds (voir renouée liseron et sarrasin commun).

Espèces semblables
Liseron des champs (pl., vég., fl.), renouée liseron (pl., vég.), sarrasin commun (pl., vég.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Liseron des haies

Hedge bindweed
Convolvulus sepium L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Liseron des haies

Hedge bindweed
Convolvulus sepium L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Liseron des haies

Hedge bindweed
Convolvulus sepium L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Liseron des haies

Hedge bindweed
Convolvulus sepium L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Liseron des haies

Hedge bindweed
Convolvulus sepium L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Liseron des haies

Hedge bindweed
Convolvulus sepium L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée liseron

Wild buckwheat
Polygonum convolvulus L., espèce annuelle.











Plantule
Plantule à tige et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme allongée, 10 à 25 mm de longueur, nervure centrale bien visible.
Face inférieure verte avec des plages rosées.
Feuilles
Toutes semblables : entières, ovales-triangulaires ; le limbe est prolongé à sa base par 2 petits lobes (feuilles hastées ou sagittées), comme celles du sarrasin et des liserons.
Chaque nouvelle feuille se dégage d'un fourreau membraneux (ochréa).

Plante adulte
Tige couchée au sol, ramifiée, volubile (peut s'enrouler comme une liane autour d'un support), 20 cm à plus de 2 m de longueur.
Ochréas de la tige et inflorescence
Une gaine membraneuse (ochréa) à la base du pétiole entoure la tige à chaque nœud, elle est courte.
Fleurs petites, blanchâtres à rougeâtres, regroupées en grappes peu denses à l'aisselle des feuilles et au sommet des rameaux.

Espèces semblables
Liseron des champs (pl., vég.), liseron des haies (pl., vég.), sarrasin commun (pl., vég.).

Renouée liseron




Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée liseron

Wild buckwheat

Polygonum convolvulus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Renouée liseron

Wild buckwheat

Polygonum convolvulus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée liseron

Wild buckwheat

Polygonum convolvulus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée liseron

Wild buckwheat

Polygonum convolvulus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée liseron

Wild buckwheat

Polygonum convolvulus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sarrasin commun

Buckwheat

Fagopyrum esculentum Moench, espèce annuelle.











Plantule

Plantule à tige et à feuilles alternes.

Cotylédons

De forme orbiculaire très élargie, peut atteindre 15 mm de longueur par 25 mm de largeur.

Feuilles

Toutes semblables : ovales-triangulaires, entières ; le limbe est prolongé à sa base par 2 petits lobes (feuilles hastées ou sagittées), comme chez la renouée liseron, le liseron des champs et le liseron des haies.

Chaque nouvelle feuille se dégage d'un fourreau membraneux (ochréa), comme chez les renouées.

Plante adulte

Tige dressée, peu ramifiée, peut atteindre 1 m de hauteur. Une gaine membraneuse (ochréa) à la base du pétiole entoure la tige à chaque nœud, elle est courte.


Fleurs

Fleurs blanches ou roses regroupées en grappes à l'aisselle des feuilles et au sommet de la tige et des rameaux.

Espèces semblables

Liseron des champs (pl., vég.), liseron des haies (pl., vég.), renouée liseron (pl., vég.).

Sarrasin commun



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sarrasin commun

Buckwheat
Fagopyrum esculentum Moench



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sarrasin commun

Buckwheat

Fagopyrum esculentum Moench



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sarrasin commun

Buckwheat

Fagopyrum esculentum Moench



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sarrasin commun

Buckwheat
Fagopyrum esculentum Moench



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sarrasin commun

Buckwheat

Fagopyrum esculentum Moench



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Souchet comestible

Yellow nut sedge
Cyperus esculentus L., espèce vivace.










Pousses végétatives

Pousses feuillées glabres, issues d'un rhizome ou d'un tubercule.
Rhizomes brunâtres ou blanchâtres, minces, 5 à 20 cm de longueur ; certains d'entre eux donnent des tubercules (entre-nœuds rapprochés).
Tubercules : oblongs à arrondis, 5 à 15 mm de longueur, brun foncé à complet développement (se retrouvent principalement dans les 15 premiers centimètres du sol). Ils peuvent facilement se détacher des rhizomes et propager la plante.
Feuilles : voir plante adulte.

Plante adulte

Plante glabre.
Feuilles semblables à celles des graminées, longues, étroites, vert pâle, sans poils. Elles sont abondantes à la base de la tige et quelques-unes sont réunies en cercle immédiatement sous l'inflorescence.
Gaine fermée par un tissu membraneux qui se déchire facilement.
Pas d'appendice à la jonction de la gaine et du limbe qui pourrait correspondre à la ligule ou aux oreillettes des graminées.
Tige triangulaire (ronde chez les graminées), dressée, 20 à 70 cm de hauteur. Les feuilles y sont portées sur 3 rangs (les feuilles des graminées sont sur 2 rangs).
L'inflorescence forme comme un bouquet de petits rameaux brun doré au sommet de la tige.

Souchet comestible




Cliquez pour agrandir

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 27 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Souchet comestible

Yellow nut sedge

Cyperus esculentus L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Souchet comestible

Yellow nut sedge
Cyperus esculentus L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Souchet comestible

Yellow nut sedge
Cyperus esculentus L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Souchet comestible

Yellow nut sedge
Cyperus esculentus L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Souchet comestible

Yellow nut sedge

Cyperus esculentus L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Souchet comestible

Yellow nut sedge

Cyperus esculentus L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Souchet comestible

Yellow nut sedge
Cyperus esculentus L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Souchet comestible

Yellow nut sedge
Cyperus esculentus L., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Carotte sauvage

Wild carrot
Daucus carota L., espèce bisannuelle.




Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
(Odeur de carotte au froissement.)
Cotylédons
De forme linéaire, 15 à 25 mm de longueur. Base rougeâtre.
Feuilles
Toutes semblables : profondément découpées, 1re f. à 3 segments principaux, 2e f. à 5 segments principaux, les feuilles suivantes sont de plus en plus finement divisées en de nombreux segments.
Les feuilles portent quelques poils et les segments ultimes sont terminés par des petites pointes (mucrons).
Pétioles longs en forme de V avec une base élargie.







Rosette développée
Rosette de feuilles rattachées à une racine pivotante blanchâtre à orangée (carotte fibreuse).

Plante adulte
La tige se développe la 2e année de croissance, elle est dressée, striée, couverte de poils raides, peu feuillée et mesure de 40 cm à 1,2 m de hauteur.
Fleurs blanches groupées en ombelles qui se composent elles-mêmes de plusieurs ombellules. On trouve une fleur pourpre au centre de chaque ombelle.
À maturité, les ombelles se contractent en nid d'oiseau.



Remarque : la carotte cultivée provient de la sélection de lignées dans les populations de la carotte sauvage.

Espèces semblables
Achillée mille-feuille (pl., vég.), matricaire inodore (pl., vég.).

Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Carotte sauvage

Wild carrot

Daucus carota L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Carotte sauvage

Wild carrot

Daucus carota L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Carotte sauvage

Wild carrot

Daucus carota L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Carotte sauvage

Wild carrot

Daucus carota L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Carotte sauvage

Wild carrot

Daucus carota L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Carotte sauvage

Wild carrot

Daucus carota L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Carotte sauvage

Wild carrot

Daucus carota L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Digitaire astringente

Smooth crab grass

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl., espèce annuelle.














Plantule

Pubescente jusqu'au stade 3e ou 4e feuille, poils lâches.
Feuilles rabattues au sol.
Ligule (3e feuille) : membraneuse à sommet anguleux.
Gaine à section arrondie, ovale.
Nouvelles feuilles enroulées sur elles-mêmes.
(Vérifier la graine dans le sol permet une identification plus sûre.)

Plant végétatif et plante adulte

Port couché, 10 à 40 cm de hauteur.
Plante glabre (à partir de la 5e ou 6e feuille), quelques longs poils cependant à la base du limbe près de la ligule.
Feuilles vert foncé, parfois colorées de pourpre à l'extrémité.


Inflorescence et graines

Inflorescence composée de 2 à 6 branches grêles assez rapprochées sur un axe principal et disposées un peu comme les doigts d'une main. Elle est généralement violacée.
Graine noire, 2 mm de longueur.

Espèces semblables

Digitaire sanguine (pl., vég., fl.), panic d'automne (vég.).

Digitaire astringente



Cliquez pour agrandir

[Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée](#)

[Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine](#)

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Digitaire astringente

Smooth crab grass

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Digitaire astringente

Smooth crab grass

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Digitaire astringente

Smooth crab grass

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Digitaire astringente

Smooth crab grass

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Digitaire astringente

Smooth crab grass

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Digitaire astringente

Smooth crab grass

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic d’automne géniculé

Fall panicum

Panicum dichotomiflorum Michx. var. *geniculatum* (Wood) Fern., espèce annuelle.













Plantule

Velue sur les gaines et à la face inférieure du limbe des premières feuilles ; pratiquement sans poils à partir du stade 4e ou 5e feuille.
Limbe moins élargi à sa base que celui des autres panics.
Ligule (3e feuille) constituée d’une rangée de poils. Ces derniers sont collés sur environ la moitié de leur longueur.
Gaine à section arrondie, ovale.
Nouvelles feuilles enroulées sur elles-mêmes.
(Vérifier la graine dans le sol permet une identification plus sûre.)

Plante adulte

Plante glabre ne dépassant pas 60 cm de hauteur.
Tige en zigzag.
Port en corbeille.
Ligule ciliée d’apparence membraneuse à sa base.
Inflorescence : une panicule (moins volumineuse et plus grossière que celle du panic capillaire).
Panicule incluse ou courtement exserte (peu ou pas dégagée de la gaine).
Graine rougeâtre à verdâtre, 2 mm de longueur.

Espèces semblables

Panic d'automne dressé (pl.,vég., fl.), sétaire verte (pl., vég.), échinochloa pied-de-coq (vég.).

Cliquez pour agrandir

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic d’automne géniculé

Fall panicum

Panicum dichotomiflorum Michx. var. *geniculatum* (Wood) Fern., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic d’automne géniculé

Fall panicum

Panicum dichotomiflorum Michx. var. *geniculatum* (Wood) Fern., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic d’automne géniculé

Fall panicum

Panicum dichotomiflorum Michx. var. *geniculatum* (Wood) Fern., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic d’automne géniculé

Fall panicum

Panicum dichotomiflorum Michx. var. *geniculatum* (Wood) Fern., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic d’automne géniculé

Fall panicum

Panicum dichotomiflorum Michx. var. *geniculatum* (Wood) Fern., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic d’automne géniculé

Fall panicum

Panicum dichotomiflorum Michx. var. *geniculatum* (Wood) Fern., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic d’automne dressé

Fall panicum

Panicum dichotomiflorum Michx. var. *dichotomiflorum*, espèce annuelle.

Pas de photos

Panic d’automne à floraison tardive.
Il se distingue du panic d’automne géniculé par ses plants à tige droite et à inflorescence nettement exserte.
Aussi, sa taille est plus élevée (peut atteindre 1 m de hauteur), sa panicule plus longue (20 à 40 cm de longueur) et ses graines sont plus grosses (2,2 mm de longueur).

Espèces semblables
Panic d'automne géniculé (pl.,vég.,fl.), sétaire verte (pl., vég.), échinochloa pied-de-coq (vég.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 23 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire verte

Green foxtail
Setaria viridis (L.) Beauv., espèce annuelle.









N.B. : l'espèce comporte un biotype à floraison tardive qui est doté d'une plus grande taille et d'une inflorescence plus longue.

Plantule

Apparence glabre, mais des poils sont discrètement localisés sur les bords de la gaine.
Ligule (3e feuille) constituée d'une rangée de poils.
Gaine à section arrondie, ovale.
Nouvelles feuilles enroulées sur elles-mêmes.
(Vérifier la graine dans le sol permet une identification plus sûre.)

Plante adulte

Port généralement dressé, 30 à 70 cm de hauteur (peut atteindre 1 m de hauteur chez le biotype).
Poils seulement sur les bords de la gaine.
Ligule ciliée avec des poils plus longs aux deux extrémités.
Feuilles effilées en pointe.
Gaines parfois rougeâtres à leur base (comme la sétaire glauque).
Collet souvent teinté de rouge.
L'inflorescence est un faux-épi (panicule très contractée) de forme conique, 4 à 10 cm de longueur (jusqu'à 15 cm de longueur chez le biotype).
Des soies garnissent le faux-épi, elles sont vertes, parfois blanchâtres ou pourpres.
Graine marbrée (ou brune), 2 mm de longueur.

Espèces semblables

Sétaire géante (pl., vég., fl.), sétaire glauque (pl., vég., fl.), panic d'automne (pl., vég.).

Sétaire verte




Cliquez pour agrandir

[Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée](#)

[Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine](#)

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire verte

Green foxtail
Setaria viridis (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire verte

Green foxtail

Setaria viridis (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire verte

Green foxtail

Setaria viridis (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire verte

Green foxtail
Setaria viridis (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire verte

Green foxtail
Setaria viridis (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire verte

Green foxtail
Setaria viridis (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire verte

Green foxtail
Setaria viridis (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire glauque

Yellow foxtail
Setaria glauca (L.) Beauv., espèce annuelle.




N.B. : l'espèce comporte un biotype à floraison tardive qui est doté d'une plus grande taille et d'une inflorescence plus longue.

Plantule


Glabre jusqu'au stade 3e feuille à partir duquel de longs poils laineux apparaissent à la base du limbe des feuilles.
Feuilles allongées, étroites et spiralées.



Ligule (3e feuille) constituée d'une rangée de poils.
Gaine très aplatie.
Nouvelles feuilles enroulées sur elles-mêmes.
(Vérifier la graine dans le sol permet une identification plus sûre.)

Plante adulte

Port généralement dressé, 30 à 60 cm de hauteur (peut atteindre 80 cm de hauteur chez le biotype).
Feuilles bleutées et spiralées. Poils laineux et blanchâtres à la base du limbe.

Gaines souvent rougeâtres à leur base (la sétaire verte peut aussi présenter ce caractère).
Ligule ciliée bien visible.
L'inflorescence est un faux-épi (panicule très contractée) de forme cylindrique (fait penser à la fléole des prés), 4 à 6 cm de longueur (jusqu'à 9 cm de longueur chez le biotype).




Des soies garnissent le faux-épi, elles sont jaunâtres à orangées.
Graine brun-beige à surface fortement ridée, 3 mm de longueur.

Espèces semblables

Sétaire verte (pl., vég., fl.), échinochloa pied-de-coq (pl., vég.).

Sétaire glauque



Cliquez pour agrandir

[Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée](#)

[Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine](#)

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire glauque

Yellow foxtail
Setaria glauca (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire glauque

Yellow foxtail
Setaria glauca (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire glauque

Yellow foxtail
Setaria glauca (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire glauque

Yellow foxtail
Setaria glauca (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire glauque

Yellow foxtail
Setaria glauca (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire glauque

Yellow foxtail
Setaria glauca (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire glauque

Yellow foxtail
Setaria glauca (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ


Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Échinochloa pied-de-coq

Barnyard grass
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., espèce annuelle.






Plantule
Plantule glabre.
Feuilles dressées, longues.
Ligule absente.
Gaine aplatie.
Nouvelles feuilles enroulées sur elles-mêmes.
(Vérifier la graine dans le sol permet une identification plus sûre.)

Plante adulte
Port généralement dressé, peut atteindre 1,5 m de hauteur.
Plante glabre, parfois 2 ou 3 longs cils à la base du limbe.
Feuilles longues et larges (jusqu'à 50 cm par 2 cm).
Ligule absente (à sa place, une trace blanchâtre et luisante).

Inflorescence et graines
Inflorescence composée d'un axe central et de branches latérales (panicule) ; ces dernières sont chargées de grappes denses d'épillets.
Les épillets, souvent colorés de pourpre ou de violet, sont poilus. Sur un même plant on trouvera des épillets sans arête et d'autres munis d'une arête pouvant atteindre 20 mm de longueur.
Graine pâle, 3 mm de longueur.

Espèces semblables
Sétaire glauque (pl., vég.), panic d'automne (vég.).

Échinochloa pied-de-coq



Cliquez pour agrandir

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Échinochloa pied-de-coq

Barnyard grass
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Échinochloa pied-de-coq

Barnyard grass

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Échinochloa pied-de-coq

Barnyard grass

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Échinochloa pied-de-coq

Barnyard grass
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Échinochloa pied-de-coq

Barnyard grass
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Échinochloa pied-de-coq

Barnyard grass
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Échinochloa pied-de-coq

Barnyard grass
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire géante

Giant foxtail
Setaria faberii Herrm., espèce annuelle.



Plantule

Poils à la face supérieure des feuilles (quelquefois à la face inférieure) et sur les bords de la gaine (comme la sétaire verte).
Ligule (3e feuille) constituée d'une rangée de poils.
Gaine à section arrondie, ovale.
Nouvelles feuilles enroulées sur elles-mêmes.
(Vérifier la graine dans le sol permet une identification plus sûre.)





Plante adulte

Pilosité des feuilles et ligule comme au stade plantule.
Port généralement dressé, peut dépasser 1,5 m de hauteur.
L'inflorescence est un faux-épi (panicule très contractée) de forme conique, très long (15 à 20 cm), arqué à pleine maturité (caractère permettant de conclure l'identification).
Des soies garnissent le faux-épi ; vertes au début, elles deviennent rousses à maturité.
Graine brun-beige à surface fortement ridée, 2,5 mm de longueur.





Espèces semblables

Sétaire verte (pl., vég., fl.), sétaire verticillée (pl., vég.).

Sétaire géante



Cliquez pour agrandir

[Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée](#)

[Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine](#)

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire géante

Giant foxtail

Setaria faberii Herrm., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire géante

Giant foxtail

Setaria faberii Herrm., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire géante

Giant foxtail

Setaria faberii Herrm., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire géante

Giant foxtail

Setaria faberii Herrm., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire géante

Giant foxtail

Setaria faberii Herrm., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire verticillée

Bristly foxtail
Setaria verticillata (L.) Beauv., espèce annuelle.





Cliquez pour agrandir

Espèce proche des autres sétaires qui s'en distingue principalement par son inflorescence : une panicule étagée (en verticille), les rameaux sont courts et groupés par 3 à 5 sur l'axe principal en laissant des vides entre eux, surtout à la base de l'inflorescence.
La panicule a un aspect de faux-épi moins marqué que chez les autres sétaires, sauf peut-être à l'époque de l'épiaison où la jeune panicule est toute contractée.
Au champ, les inflorescences de la sétaire verticillée sont souvent emmêlées car les soies, à la base des épillets sont garnies de petites dents dirigées vers le bas qui les rendent accrochantes.
La graine est brun-beige, sa surface est faiblement ridée et elle mesure 2 mm de longueur.
Du côté végétatif on observera les caractères suivants :
- une pilosité localisée sur la bordure de la gaine comme chez la sétaire verte, mais on pourra aussi trouver des poils sur les feuilles comme sur celles de la sétaire géante ;
- la ligule est ciliée, caractère commun à toutes les sétaires ;
- la gaine est aplatie comme celle de la sétaire glauque.

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire verticillée

Bristly foxtail
Setaria verticillata (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Sétaire verticillée

Bristly foxtail
Setaria verticillata (L.) Beauv., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Digitaire astringente

Smooth crab grass

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Digitaire astringente

Smooth crab grass

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Prèle des champs

Field horsetail
Equisetum arvense L., espèce vivace.













N.B. : cette plante est parente avec les fougères, elle produit des spores.

Cycle de la plante
En suivant le développement de la plante au cours de la saison de croissance on voit d'abord apparaître les tiges fertiles qui se dessèchent et disparaissent après peu de temps.
D'autres pousses sortent ensuite pour donner les tiges stériles.
Toutes les tiges sont issues de rhizomes.

Tiges fertiles
De couleur brun rougeâtre, sans chlorophylle, creuses; gaines bien visibles aux nœuds; pas de branches latérales.
Un cône, au sommet, contient les spores.

Tiges stériles
Dès leur apparition à la surface du sol, des branches disposées en étage commencent à se développer.
Les tiges stériles sont vertes, creuses et dressées ; elles peuvent atteindre 50 cm de hauteur.
Les branches ou rameaux sont anguleux, pleins et munis eux aussi de gaines dentées aux nœuds. Ces gaines, plus discrètes que celles de la tige, sont en réalité un assemblage de très petites feuilles soudées les unes aux autres.
Les rameaux peuvent se ramifier aux nœuds et donner d'autres branches.
La plante ressemble à un petit conifère (pin).

Espèce semblable
Spargoute des champs (vég.).

Prèle des champs




Cliquez pour agrandir

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Prèle des champs

Field horsetail
Equisetum arvense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Prèle des champs

Field horsetail
Equisetum arvense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Prèle des champs

Field horsetail
Equisetum arvense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Prèle des champs

Field horsetail
Equisetum arvense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Prèle des champs

Field horsetail
Equisetum arvense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Prèle des champs

Field horsetail
Equisetum arvense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Spargoute des champs

Corn spurry
Spergula arvensis L., espèce annuelle.








Plantule
Plantule à rosette, puis à tige assez rapidement.
Les deux premières feuilles opposées, les suivantes disposées en étage (verticillées) sur la tige.
Cotylédons
Filiformes, cylindriques, 10 à 15 mm de longueur.
Feuilles
Toutes semblables : filiformes, presque cylindriques à planes, le plus souvent sans poils. Ressemblent aux cotylédons.

Plante adulte
Plante grêle.
Tige dressée, ramifiée ou parfois simple, 10 à 40 cm de hauteur, glabre ou finement velue, un peu visqueuse.
Les feuilles sont filiformes et par groupe de 6 et plus (verticillées) aux nœuds de la tige.
Fleurs et fruits
Petites fleurs blanches sur des pédoncules courts au sommet de la tige et des rameaux.
Le fruit est une petite capsule ovoïde contenant une multitude de petites graines noires.

Espèce semblable
Prèle des champs (vég.).

Spargoute des champs



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 04 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Spargoute des champs

Corn spurry
Spergula arvensis L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Spargoute des champs

Corn spurry
Spergula arvensis L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Spargoute des champs

Corn spurry
Spergula arvensis L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Spargoute des champs

Corn spurry
Spergula arvensis L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Spargoute des champs

Corn spurry
Spergula arvensis L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Spargoute des champs

Corn spurry
Spergula arvensis L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Euphorbe réveille-matin

Sun spurge
Euphorbia helioscopia L., espèce annuelle.









Plantule
Plantule à tige.
Premières feuilles opposées, les suivantes alternes.
Présence de latex à la brisure d'un organe.

Cotylédons
De forme oblongue, sommet arrondi, limbe de 6 à 10 mm de longueur, face inférieure souvent rougeâtre.

Feuilles
Toutes semblables : arrondies-ovales, bord finement denté à la partie supérieure du limbe, glabres.
Les feuilles, très rapprochées les unes des autres, semblent disposées en cercle sur la jeune tige.

Plante adulte
Plante glabre ou presque.
Tige dressée, simple ou ramifiée, souvent rougeâtre, 10 à 60 cm de hauteur.
Présence de latex à la brisure d'un organe.

Fleurs
Fleurs jaune verdâtre réunies en petits bouquets à 5 branches (ombelles) au sommet de la tige et des rameaux.

Euphorbe réveille-matin



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Euphorbe réveille-matin

Sun spurge
Euphorbia helioscopia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Euphorbe réveille-matin

Sun spurge
Euphorbia helioscopia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Euphorbe réveille-matin

Sun spurge
Euphorbia helioscopia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Euphorbe réveille-matin

Sun spurge
Euphorbia helioscopia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Euphorbe réveille-matin

Sun spurge
Euphorbia helioscopia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Euphorbe réveille-matin

Sun spurge
Euphorbia helioscopia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

f46-7.jpg

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Euphorbe réveille-matin

Sun spurge
Euphorbia helioscopia L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ortie royale

Hemp-nettle
Galeopsis tetrahit L., espèce annuelle.









Plantule
Plantule à tige et à feuilles opposées.
Cotylédons
De forme orbiculaire mais auriculés (2 pointes bien visibles à la base), 5 à 15 mm de longueur.
Pétiole distinct portant quelques poils.
Feuilles
Toutes semblables : régulièrement dentées, ovales à légèrement allongées. Nervures profondes donnant du relief à la feuille.
Pubescence dense, poils longs.

Plante adulte
Tige dressée à section carrée et à nœuds renflés, ramifiée, 30 cm à 1 m de hauteur, poils raides.
Fleurs rosâtres à blanchâtres (souvent tachetées de pourpre), en glomérules au sommet de la tige et des rameaux et à l'aisselle des feuilles supérieures.
Chaque fleur donne 4 graines logées au fond d'un réceptacle tubuleux (calice) et muni de 5 aiguillons au sommet.

Espèce semblable
Galinsoga cilié (pl., vég.).

Ortie royale




Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ortie royale

Hemp-nettle
Galeopsis tetrahit L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ortie royale

Hemp-nettle
Galeopsis tetrahit L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ortie royale

Hemp-nettle
Galeopsis tetrahit L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ortie royale

Hemp-nettle
Galeopsis tetrahit L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ortie royale

Hemp-nettle
Galeopsis tetrahit L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ortie royale

Hemp-nettle
Galeopsis tetrahit L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Ortie royale

Hemp-nettle
Galeopsis tetrahit L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Galinsoga cilié

Hairy galinsoga

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. (= *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake), espèce annuelle.









Plantule

Plantule à tige et à feuilles opposées.

Cotylédons

De forme orbiculaire, 4 à 8 mm de longueur, pétiole bien visible. Le limbe est très légèrement échancré au sommet où on peut voir aussi une petite pointe.

Feuilles

Premières feuilles : arrondies à ovales, peu dentées, terminées en pointe, pubescentes.

Feuilles matures : peu différentes des précédentes mais nettement dentées, la nervation (3 nervures partant de la base) et la pubescence sont aussi plus apparentes.

Les feuilles ont une teinte vert pâle.

Plante adulte

Plante pubescente à croissance rapide qui peut former des colonies très denses.

Tige dressée, ramifiée, couverte de poils raides et dressés, 20 à 60 cm de hauteur.

Fleurs jaunes réunies en petits capitules (4 à 8 mm de diamètre) portés par des pédoncules plus ou moins longs.

Quelques fleurs (4 ou 5) sur le pourtour du disque ont des rayons blancs.

Graine coiffée d'une petite couronne écailleuse.

Espèces semblables

Ortie royale (pl., vég.), ricinelle rhomboïde (pl.).

Galinsoga cilié



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Galinsoga cilié

Hairy galinsoga

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. (= *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Galinsoga cilié

Hairy galinsoga

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. (= *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Galinsoga cilié

Hairy galinsoga
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. (= *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Galinsoga cilié

Hairy galinsoga

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. (= *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Galinsoga cilié

Hairy galinsoga

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. (= *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Galinsoga cilié

Hairy galinsoga

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. (= *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

à

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Galinsoga cilié

Hairy galinsoga

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. (= *Galinsoga ciliata* (Raf.) Blake)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Gnaphale des vases

Low cudweed
Gnaphalium uliginosum L., espèce annuelle.








Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme oblongue, très petits, 2 à 3 mm de longueur. (Difficile d'observer la plantule à ce stade, l'apparition des premières feuilles se fait très rapidement.)
Feuilles
Toutes semblables : petites, très allongées (un peu élargies au sommet), à bord entier. Pas de pétiole.
Les feuilles sont recouvertes d'une pubescence blanchâtre abondante.
(Sur le terrain, la plantule apparaît comme un petit bouquet de feuilles dressées.)

Plante adulte
Plante de petite taille, généralement moins de 20 cm de hauteur. À la base de la plante, des rameaux relativement longs se développent : port en corbeille. Les feuilles (2 à 4 cm de longueur) sont nombreuses le long de la tige et des rameaux, particulièrement à leur sommet. Pubescence laineuse très forte sur toutes les parties de la plante.
Fleurs
Les fleurs sont petites, blanchâtres ou brunâtres et regroupées en capitules de 2 à 4 mm de diamètre. Les capitules sont disposés en petits paquets serrés au sommet (bien feuillé) de la tige et des rameaux et aussi à l'aisselle des feuilles.

Gnaphale des vases



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Gnaphale des vases

Low cudweed

Gnaphalium uliginosum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Gnaphale des vases

Low cudweed

Gnaphalium uliginosum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Gnaphale des vases

Low cudweed

Gnaphalium uliginosum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Gnaphale des vases

Low cudweed

Gnaphalium uliginosum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Gnaphale des vases

Low cudweed

Gnaphalium uliginosum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Gnaphale des vases

Low cudweed

Gnaphalium uliginosum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Léersie faux-riz

Rice cut grass
Leersia oryzoides (L.) Sw., espèce vivace.






Graminée de la même sous-famille que le riz cultivé, elle établit des colonies dans les milieux humides.
Plante pubescente et aussi munie de petits poils très raides (aiguillons) orientés vers le bas, rendant toutes les parties de la plante (particulièrement les feuilles) rudes et très accrochantes.
La tige mesure 50 cm à 1 m de longueur ; les nœuds sont couverts de longs poils hérissés.
L'inflorescence est une panicule lâche (10 à 20 cm de longueur) dont les branches sont ondulées.
Les épillets (4 à 5 mm de longueur) sont aplatis, sans glumes et ne contiennent qu'une seule fleur.
Les feuilles sont de teinte vert pâle, sans oreillettes ; la ligule, membraneuse, est très courte.
Les nouvelles feuilles apparaissent enroulées sur elles-mêmes.
Les rhizomes, courts et blanchâtres, sont situés peu profondément dans le sol.

Cliquez pour agrandir

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Léersie faux-riz

Rice cut grass
Leersia oryzoides (L.) Sw., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Léersie faux-riz

Rice cut grass
Leersia oryzoides (L.) Sw., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Léersie faux-riz

Rice cut grass

Leersia oryzoides (L.) Sw., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Léersie faux-riz

Rice cut grass

Leersia oryzoides (L.) Sw., espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Linaire vulgaire

Yellow toadflax
Linaria vulgaris Mill., espèce vivace.



Plantule
Plantule à tige, les 8 à 12 premières feuilles opposées, les suivantes alternes.
Cotylédons
En forme de losange (voir ceux de l'onagre bisannuelle), 10 à 15 mm de longueur.
Nervure médiane bien visible.
Feuilles
Premières feuilles : ovales à allongées (rappelant la forme des cotylédons), bord du limbe entier.
Feuilles matures : allongées à linéaires, bord du limbe entier, glabres. Nervure centrale très apparente (voir le plant végétatif).





Plant végétatif et plante adulte
Tige dressée, peu ramifiée, 25 à 50 cm de hauteur.
Les feuilles sont nombreuses et semblent disposées en cercle sur la tige. Dans les faits, les feuilles sont alternes (sauf celles dans le bas de la tige, opposées), mais très rapprochées les unes des autres.
Plante glabre.
Les nombreuses pousses, issues des racines qui courent près de la surface du sol, assurent la propagation de la plante.
D'importantes colonies peuvent se former.
Fleurs
Fleurs irrégulières comprenant des pièces soudées. De couleur jaune pâle avec une partie orangée (lèvres), elles sont prolongées inférieurement par un long éperon (qui contient du nectar).
Les fleurs sont réunies en grappes à l'extrémité de la tige et des rameaux.





Espèces semblables
Onagre bisannuelle (pl.), verge d'or à feuilles de graminée (vég.).

Linaire vulgaire




Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Linaire vulgaire

Yellow toadflax
Linaria vulgaris Mill.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Linaire vulgaire

Yellow toadflax
Linaria vulgaris Mill.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Linaire vulgaire

Yellow toadflax
Linaria vulgaris Mill.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Linaire vulgaire

Yellow toadflax
Linaria vulgaris Mill.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Linaire vulgaire

Yellow toadflax
Linaria vulgaris Mill.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Onagre bisannuelle

Yellow evening-primrose
Oenothera biennis L., espèce bisannuelle ou vivace de courte durée.




Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
En forme de losange (ressemblent à ceux de la linaire vulgaire), 10 à 15 mm de longueur.
Nervure médiane bien visible.
Limbe souvent marqué de rouge.




Feuilles
Premières feuilles : ovales-allongées, entières, légèrement pubescentes. Nervures apparentes, blanchâtres, parfois rosâtres.
Feuilles matures : allongées (s'élargissant près du sommet), bord entier à légèrement sinué-denté. Nervures bien marquées, la principale est large.
Les feuilles sont rigides et souvent colorées de rouge, leur limbe est graduellement atténué en pétiole.



Rosette de 1re année
Les feuilles peuvent être ondulées. La racine principale (blanchâtre, collet rouge) est pivotante.





Plante adulte
Plante légèrement pubescente. Tige dressée, ramifiée, forte, haute de 50 cm à 1,5 m.
Fleurs jaunes, grandes et très voyantes, disposées en épis feuillés au sommet de la tige et des rameaux. Les fleurs sont reliées à la tige par un long tube ressemblant à un pédoncule, mais il contient l'ovaire.
Le fruit est une capsule de 3 à 5 cm de longueur.

Espèce semblable
Vélar fausse giroflée (vég.).

Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 04 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Onagre bisannuelle

Yellow evening-primrose
Oenothera biennis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Onagre bisannuelle

Yellow evening-primrose
Oenothera biennis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Onagre bisannuelle

Yellow evening-primrose
Oenothera biennis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Onagre bisannuelle

Yellow evening-primrose
Oenothera biennis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Onagre bisannuelle

Yellow evening-primrose
Oenothera biennis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Onagre bisannuelle

Yellow evening-primrose
Oenothera biennis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Onagre bisannuelle

Yellow evening-primrose
Oenothera biennis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Onagre bisannuelle

Yellow evening-primrose
Oenothera biennis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lychnide blanche

White cockle

Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause (= *Lychnis alba* Mill.), espèce bisannuelle ou vivace de courte durée.



Plantule

Plantule à rosette et à feuilles opposées.

Cotylédons

De forme oblongue à allongée, 10 à 15 mm de longueur, charnus et sans poils.

Feuilles

Premières feuilles : entières, arrondies-ovales, terminées par une petite pointe. Pubescentes, poils longs sur le bord du limbe.

Feuilles matures : entières, allongées, plus larges au sommet (spatulées), le limbe s'atténuant plus ou moins abruptement en un long pétiole, nervures bien apparentes. Pubescentes, poils longs sur le bord du limbe.





Rosette développée et plante adulte

La rosette développée provient d'une plantule ou d'un bourgeon du collet. Les feuilles peuvent être légèrement ondulées.

Tige dressée (légèrement collante), ramifiée dès la base, nœuds renflés, 30 à 90 cm de hauteur.

Feuilles pubescentes et s'attachant directement à la tige par leur base élargie.

Inflorescences longues et peu feuillées. Pédoncules floraux et calice des fleurs légèrement collants (visqueux et très collants chez la silène noctiflore).

Racines fortes et charnues s'ancrant solidement dans le sol.









Fleurs

Les fleurs mâles et femelles sont sur des plantes différentes.

Les sépales soudées forment un calice plus ou moins renflé avec des nervures saillantes. Les pétales sont blancs ou légèrement rosés.

Les fleurs femelles à calice ovoïde comptent 5 ou 6 styles au sommet de l'ovaire (on peut les voir en déchirant le calice). Les fleurs mâles ont un calice peu renflé et contiennent environ 10 étamines.

Lychnide blanche



Cliquez pour agrandir

Espèces semblables
Silène noctiflore (pl., vég., fl.), silène enflé (pl.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lychnide blanche

White cockle

Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause (= *Lychnis alba* Mill.), espèce bisannuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lychnide blanche

White cockle

Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause (= *Lychnis alba* Mill.), espèce bisannuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lychnide blanche

White cockle

Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause (= *Lychnis alba* Mill.), espèce bisannuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lychnide blanche

White cockle

Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause (= *Lychnis alba* Mill.), espèce bisannuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lychnide blanche

White cockle

Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause (= *Lychnis alba* Mill.), espèce bisannuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lychnide blanche

White cockle

Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause (= *Lychnis alba* Mill.), espèce bisannuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lychnide blanche

White cockle

Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause (= *Lychnis alba* Mill.), espèce bisannuelle ou vivace de courte durée.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Silène noctiflore

Night-flowering catchfly
Silene noctiflora L., espèce annuelle.







Cliquez pour agrandir

Plantule

La plantule est très similaire à celle de la lychnide blanche (difficile de différencier les deux espèces à ce stade de leur développement), voir sa description.

Plante adulte

Tige dressée, ramifiée, 30 à 60 cm de hauteur.
Feuilles de la tige pubescentes et s'attachant directement à la tige par leur base élargie.
Inflorescences longues et peu feuillées.
Les tiges, les pédoncules floraux et le calice des fleurs sont visqueux et très collants au toucher : couverts de poils à glandes sécrétrices (ces organes sont non visqueux et peu collants chez la lychnide blanche).
Racines peu développées.

Fleurs

Fleurs comprenant un ovaire surmonté de 3 styles et une dizaine d'étamines. Les sépales soudés forment un tube portant des nervures saillantes : le calice (visqueux et collant). Pétales blancs ou jaunâtres à rosés.

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Silène noctiflore

Night-flowering catchfly
Silene noctiflora L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Silène noctiflore

Night-flowering catchfly
Silene noctiflora L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Silène noctiflore

Night-flowering catchfly
Silene noctiflora L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Silène enflé (pétards)

Bladder campion

Silene vulgaris (Moench) Garcke (= *Silene cucubalus* Wibel), espèce vivace.



Cliquez pour agrandir

Plantule et pousses végétatives

Plantule à rosette et à feuilles opposées.
Les cotylédons de forme oblongue à allongée sont charnus.
Les premières feuilles sont semblables aux feuilles matures, mais un peu plus arrondies. Celles-ci, bleutées comme les feuilles du chou, sont ovales à allongées, à bord entier et terminées par une petite pointe. Elles sont glabres, sauf le bord du limbe qui est muni de poils raides.
Les pousses végétatives sont issues du collet.

Plante adulte

Tige dressée, ramifiée dès la base, glabre, nœuds renflés (chez la lychnide blanche aussi), 20 à 90 cm de hauteur.
Base souvent rougeâtre.
Feuilles de la tige entièrement glabres.
Fleurs blanches ou rosées avec 3 styles sur l'ovaire. Les sépales soudés forment un calice très gonflé, mince, à nervures nombreuses, mais non saillantes.
La plante est remarquable par sa racine pivotante forte et munie de nombreuses racines secondaires s'étendant profondément dans le sol.

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Silène enflé (pétards)

Bladder campion

Silene vulgaris (Moench) Garcke (= *Silene cucubalus* Wibel), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Silène enflé (pétards)

Bladder campion

Silene vulgaris (Moench) Garcke (= *Silene cucubalus* Wibel), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Silène enflé (pétards)

Bladder campion

Silene vulgaris (Moench) Garcke (= *Silene cucubalus* Wibel), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Silène enflé (pétards)

Bladder campion

Silene vulgaris (Moench) Garcke (= *Silene cucubalus* Wibel), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Luzerne

Alfalfa
Medicago sativa L., espèce vivace.







Cliquez pour agrandir

Plantule
Ressemble à celle des trèfles, mais en diffère par les traits suivants : plantule à tige; feuilles matures composées de 3 folioles allongées, le pétiolule de la foliole centrale étant plus long que celui des folioles latérales.

Plante adulte
Tige dressée.
Feuilles légèrement pubescentes.
Fleurs violettes, bleuâtres ou rosées en épi dans le haut des tiges.

Espèces semblables
Trèfle blanc (pl., vég.), trèfle alsike (pl., vég.), trèfle rouge (pl.,vég.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 04 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Luzerne

Alfalfa
Medicago sativa L



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 30 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Luzerne

Alfalfa

Medicago sativa L



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Luzerne

Alfalfa

Medicago sativa L



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Trèfle blanc

White clover
Trifolium repens L., espèce vivace.







Cliquez pour agrandir

Plantule

Plantule à rosette et à feuilles alternes
Cotylédons : de forme arrondie à oblongue, charnus.
Première feuille : arrondie-ovale avec une base droite.
Feuilles matures : composées de 3 folioles arrondies supportées par des petits pétioles (pétiolules) de même longueur.

Plante adulte

Tige rampante s'enracinant aux nœuds.
Feuilles glabres, souvent marquées d'une trace blanchâtre en V.
Fleurs blanches réunies en capitules au bout de longs pédoncules.

Espèces semblables

Trèfle alsike (pl., vég., fl.), trèfle rouge (pl., vég.), luzerne (pl., vég.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 05 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Trèfle blanc

White clover
Trifolium repens L. Vill.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Trèfle blanc

White clover
Trifolium repens L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Trèfle blanc

White clover
Trifolium repens L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Trèfle alsike

Alsike clover
Trifolium hybridum L., espèce vivace.




Cliquez pour agrandir

Plantule
Similaire à celle du trèfle blanc.

Plante adulte
Tige couchée à la base puis dressée.
Feuilles légèrement pubescentes.
Fleurs roses réunies en capitules portés par des pédoncules.

Espèces semblables
Trèfle blanc (pl., vég., fl.), trèfle rouge (pl., vég., fl.), luzerne (pl., vég.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 05 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Trèfle alsike

Alsike clover
Trifolium hybridum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Trèfle alsike

Alsike clover
Trifolium hybridum L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Trèfle rouge

Red clover
Trifolium pratense L., espèce vivace.



Cliquez pour agrandir

Plantule
Similaire à celle du trèfle blanc.

Plante adulte
Tige couchée à la base puis dressée.
Feuilles très pubescentes, souvent marquées d'une trace blanchâtre en V.
Fleurs d'un rouge plus ou moins foncé et réunies en capitules portés directement au sommet de la tige.

Espèces semblables
Trèfle blanc (pl., vég., fl.), trèfle alsike (pl., vég., fl.), luzerne (pl., vég.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 05 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Trèfle rouge

Red clover

Trifolium pratense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Trèfle rouge

Red clover
Trifolium pratense L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Muhlenbergie feuillée

Wire-stemmed muhly
Muhlenbergia frondosa (Poiret) Fernald, espèce vivace.






Plante glabre de 40 à 80 cm de hauteur ; la tige et les rameaux (généralement nombreux, aspect buissonnant) sont dressés ou partiellement couchés.
L'inflorescence est une panicule contractée ou peu ouverte, souvent arquée, douce au toucher, longue de 10 à 20 cm.
La panicule est garnie de grappes denses d'épillets, ceux-ci mesurent moins de 3 mm et ne contiennent qu'une seule fleur.
Les feuilles sont courtes et minces ; il n'y a pas d'oreillettes à la base du limbe et la ligule, membraneuse, est très courte.
Les gaines sont plus longues que les entre-nœuds de la tige.
Une coloration pourpre peut marquer les différentes parties de la plante : l'inflorescence, les entre-nœuds de la tige et même les rhizomes.
Les nouvelles feuilles apparaissent enroulées sur elles-mêmes.
Les rhizomes sont très caractéristiques : courts, superficiels, cassants et recouverts d'écailles.

Cliquez pour agrandir

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Muhlenbergie feuillée

Wire-stemmed muhly
Muhlenbergia frondosa (Poiret) Fernald, espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Muhlenbergie feuillée

Wire-stemmed muhly
Muhlenbergia frondosa (Poiret) Fernald, espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Muhlenbergie feuillée

Wire-stemmed muhly
Muhlenbergia frondosa (Poiret) Fernald, espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Muhlenbergie feuillée

Wire-stemmed muhly
Muhlenbergia frondosa (Poiret) Fernald, espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Oxalide d'Europe (surette)

European wood-sorrel

Oxalis stricta L. (= *Oxalis europaea* Jord.), espèce vivace.




Plantule

Plantule à tige et à feuilles alternes.

Cotylédons

De forme oblongue, 3 à 6 mm de longueur. Présence de quelques cils sur le bord du limbe, mais ils disparaissent rapidement.



Feuilles

Toutes semblables : composées de 3 folioles entières en forme de cœur et fixées à un pétiole long et dressé. Les folioles sont rabattues sur le pétiole et plus ou moins pliées en deux le long de leur nervure centrale.

Les feuilles sont glabres, mais on peut trouver quelques poils sur le bord du limbe.

Pousses végétatives

Elles sont issues des rhizomes provenant de la plante-mère.



Plante adulte

Plante de petite taille. Tige dressée, ramifiée, 10 à 25 cm de hauteur.

Fleurs jaunes (4 à 8 mm de diamètre) disposées par paire au sommet de longs pédoncules.

Le fruit est une capsule anguleuse.

On peut trouver des poils sur la tige, les pétioles, les pédoncules et les capsules.





Espèces semblables

Les trèfles (pl., vég.).

Oxalide d’Europe




Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Oxalide d’Europe (surette)

European wood-sorrel

Oxalis stricta L. (= *Oxalis europaea* Jord.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Oxalide d’Europe (surette)

European wood-sorrel

Oxalis stricta L. (= *Oxalis europaea* Jord.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Oxalide d’Europe (surette)

European wood-sorrel

Oxalis stricta L. (= *Oxalis europaea* Jord.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Oxalide d’Europe (surette)

European wood-sorrel

Oxalis stricta L. (= *Oxalis europaea* Jord.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Oxalide d’Europe (surette)

European wood-sorrel

Oxalis stricta L. (= *Oxalis europaea* Jord.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Oxalide d’Europe (surette)

European wood-sorrel

Oxalis stricta L. (= *Oxalis europaea* Jord.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Oxalide d’Europe (surette)

European wood-sorrel

Oxalis stricta L. (= *Oxalis europaea* Jord.)



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic capillaire

Witch grass
Panicum capillare L., espèce annuelle.




Plantule
Velue, poils longs, grossiers et dressés.
Limbe élargi à la base.
Ligule (3e feuille) constituée d'une rangée de poils.
Gaine à section arrondie, ovale.
Nouvelles feuilles enroulées sur elles-mêmes.
(Vérifier la graine dans le sol permet une identification plus sûre.)



Plante adulte
Port généralement dressé, peut atteindre 1 m de hauteur.
Pubescente, longs poils couvrant toutes les parties de la plante.
Ligule ciliée bien visible.
L'inflorescence est une panicule largement ouverte, volumineuse et aussi importante que la partie végétative de la plante.
Graine de couleur paille à verdâtre, 1,5 mm de longueur.

Espèces semblables
Panic millet (pl., vég.), digitaire sanguine (pl., vég.).







Cliquez pour agrandir

Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée

Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic capillaire

Witch grass
Panicum capillare L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic capillaire

Witch grass
Panicum capillare L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic capillaire

Witch grass
Panicum capillare L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic capillaire

Witch grass
Panicum capillare L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic capillaire

Witch grass
Panicum capillare L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic capillaire

Witch grass
Panicum capillare L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic millet

Proso millet
Panicum miliaceum L., espèce annuelle.



Plantule

De grande taille (comparable à celle du maïs).
Velue, poils longs, grossiers et dressés (comme le panic capillaire).
Ligule (3e feuille) constituée d'une rangée de poils.
Gaine à section arrondie, ovale.
Nouvelles feuilles enroulées sur elles-mêmes.
(Vérifier la graine dans le sol permet une identification plus sûre.)

Plante adulte



Port généralement dressé, peut dépasser 1,5 m de hauteur.
Plante robuste, tiges fortes, feuilles larges.
Longs poils couvrant toutes les parties de la plante.
Ligule ciliée bien visible.
La forme de l'inflorescence et la couleur des graines caractérisent les différents biotypes :
-deux types d'inflorescences : à panicule fermée en balai, à panicule largement ouverte ;
-six couleurs de graines : blanche, jaune, vert olive, orange, brun-rouge, vert foncé.
Le panic millet à graines vert foncé, dit à graines noires, est le biotype le plus envahissant.
Graines volumineuses, plus de 3 mm de longueur.









Espèces semblables

Panic capillaire (pl., vég.), digitaire sanguine (pl.).

Panic millet



Cliquez pour agrandir

[Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée](#)

[Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine](#)

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic millet

Proso millet
Panicum miliaceum L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic millet

Proso millet
Panicum miliaceum L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic millet

Proso millet
Panicum miliaceum L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic millet

Proso millet
Panicum miliaceum L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Panic millet

Proso millet
Panicum miliaceum L., espèce annuelle.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Phragmite commun (roseau commun)

Commond reed

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Streud. (= *Phragmites communis* Trin.), espèce vivace.




Pousses végétatives

Pousses issues de forts rhizomes ou de longs stolons rampants à la surface du sol.
Les nouvelles feuilles apparaissent enroulées sur elles-mêmes.
Oreillettes absentes.
Ligule composée de différents types de poils dont la longueur varie de 2 à 10 mm (près de la ligule, d'autres poils peuvent prendre naissance sur les rebords du collet).
Feuilles rigides à bord rude, effilées vers le sommet et finement pubescentes.
Gaines à bordure souvent pourpre où on trouve aussi des poils.







Plante adulte

Grande plante formant des colonies denses dans les milieux humides (fréquente dans les fossés le long des autoroutes).
Tige dressée, très forte et non ramifiée, 1,5 à 2,5 m de hauteur.
Feuilles longues et planes.
L'inflorescence est une grande panicule (20 à 30 cm de longueur) plumeuse (des touffes de poils fins garnissent les épillets) comportant de nombreux rameaux.
Les panicules sont jaune verdâtre ou plus généralement rouge plus ou moins foncé à brunâtres ; elles persistent tout l'hiver sur les tiges dénudées.




Espèce semblable

Alpiste roseau (vég.).

Phragmite commun



Cliquez pour agrandir

[Zone du collet et type de ligules chez une feuille de graminée](#)

[Préfoliation des nouvelles feuilles et section de la gaine](#)

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 22 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Phragmite commun (roseau commun)

Commond reed

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Streud. (= *Phragmites communis* Trin.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Phragmite commun (roseau commun)

Commond reed

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Streud. (= *Phragmites communis* Trin.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Phragmite commun (roseau commun)

Commond reed

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Streud. (= *Phragmites communis* Trin.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Phragmite commun (roseau commun)

Commond reed

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Streud. (= *Phragmites communis* Trin.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Phragmite commun (roseau commun)

Commond reed

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Streud. (= *Phragmites communis* Trin.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Phragmite commun (roseau commun)

Commond reed

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Streud. (= *Phragmites communis* Trin.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Phragmite commun (roseau commun)

Commond reed

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Streud. (= *Phragmites communis* Trin.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Phragmite commun (roseau commun)

Commond reed

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Streud. (= *Phragmites communis* Trin.), espèce vivace.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Plantain majeur

Broad-leaved plantain
Plantago major L., espèce vivace.




Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme oblongue à allongée, sommet arrondi à anguleux, limbe de 5 à 10 mm de longueur, pétiole court.
Feuilles
Premières feuilles : ovales à légèrement allongées, entières.
Feuilles matures : ovales, bord généralement sinué-denté, peu de poils. Trois à cinq nervures arquées et parallèles, saillantes.
Toutes les feuilles ont un pétiole large en forme de V. Le pétiole est un peu élastique ; lorsqu'on l'étire, son limbe finit par lâcher et glisse sur les nervures, plus résistantes.






Rosette développée et plante adulte
Feuilles toutes disposées en rosette à la base de la plante. Pas de tige, mais des hampes florales (sans feuilles) issues du centre des rosettes et pouvant atteindre 50 cm de hauteur.
Les fleurs, petites et verdâtres, y sont réunies en épis compacts et cylindriques.




Plantain majeur



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Plantain majeur

Broad-leaved plantain
Plantago major L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Plantain majeur

Broad-leaved plantain
Plantago major L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Plantain majeur

Broad-leaved plantain
Plantago major L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Plantain majeur

Broad-leaved plantain
Plantago major L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Plantain majeur

Broad-leaved plantain
Plantago major L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Plantain majeur

Broad-leaved plantain
Plantago major L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Plantain majeur

Broad-leaved plantain
Plantago major L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée coriace

Striate knotweed
Polygonum achoreum Blake, espèce annuelle.





Espèce proche de la renouée des oiseaux.
Se distingue par son aspect bleuté, son port buissonnant, sa tige assez ferme et courte (moins de 30 cm de hauteur) et ses feuilles épaisses et arrondies.
De plus ses fleurs sont discrètes et verdâtres.

Espèce semblable
Renouée des oiseaux (pl., vég., fl.).

Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 26 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée coriace

Striate knotweed
Polygonum achoreum Blake



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée coriace

Striate knotweed
Polygonum achoreum Blake



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée des oiseaux

Prostrate knotweed
Polygonum aviculare L., espèce annuelle.











Plantule
Plantule à tige et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme linéaire, 10 à 15 mm de longueur, sommet arrondi.
Feuilles
Toutes semblables : entières, allongées et étroites, terminées en pointe, sans poils. Chaque nouvelle feuille se dégage d'un fourreau membraneux (ochréa).

Plante adulte
Tige couchée ou partiellement dressée, ramifiée, 10 à 70 cm de longueur, pas de poils ; gaine membraneuse (ochréa) à chaque nœud, elle est lacérée au sommet. Fleurs petites, de teinte blanchâtre à rougeâtre, regroupées par 2, 3 ou 4 à l'aisselle des feuilles.

Espèce semblable
Renouée coriace (pl., vég., fl.).

Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée des oiseaux

Prostrate knotweed
Polygonum aviculare L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée des oiseaux

Prostrate knotweed
Polygonum aviculare L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée des oiseaux

Prostrate knotweed
Polygonum aviculare L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée des oiseaux

Prostrate knotweed
Polygonum aviculare L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée des oiseaux

Prostrate knotweed
Polygonum aviculare L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée poivre-d'eau

Marshpepper smartweed
Polygonum hydropiper L., espèce annuelle.




Plantule
Plantule à tige et à feuilles alternes.
(Goût de poivre.)
Cotylédons
De forme oblongue, sommet arrondi, 5 à 10 mm de longueur.
Face inférieure verte à rouge-violet, quelques points noirs épars sur le limbe.
Feuilles
Premières feuilles : entières, arrondies à allongées, limbe tacheté de points noirs.
Feuilles matures : entières, allongées, légèrement ciliées sur la bordure de la feuille, limbe souvent ondulé et tacheté de points noirs.
Chaque nouvelle feuille se dégage d'un fourreau membraneux (ochréa).





Plante adulte
Tige dressée, ramifiée, 20 à 60 cm de hauteur.
Ochréas de la tige et inflorescence
Une gaine membraneuse (ochréa) à la base du pétiole entoure la tige à chaque nœud, elle est ciliée au sommet.
Fleurs petites, rougeâtres à blanchâtres, regroupées en longs épis grêles et arqués au sommet de la tige et des rameaux.





Espèces semblables
Renouée persicaire (pl.), renouée scabre (pl.).

Renouée poivre-d'eau




Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée poivre-d'eau

Marshpepper smartweed
Polygonum hydropiper L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée poivre-d'eau

Marshpepper smartweed
Polygonum hydropiper L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée poivre-d'eau

Marshpepper smartweed
Polygonum hydropiper L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée poivre-d'eau

Marshpepper smartweed
Polygonum hydropiper L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée poivre-d'eau

Marshpepper smartweed
Polygonum hydropiper L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée persicaire

Lady's-thumb
Polygonum persicaria L., espèce annuelle.








Plantule

Plantule à tige et à feuilles alternes.

Cotylédons

De forme oblongue à allongée (parfois en forme de croissant), 6 à 12 mm de longueur.
Face inférieure verte à rouge-violet.

Feuilles

Premières feuilles : entières, allongées, possiblement quelques points noirs sur le limbe.
Feuilles matures : entières, allongées, souvent une tache noirâtre au centre du limbe, légèrement ciliées en bordure.
Chaque nouvelle feuille se dégage d'un fourreau membraneux (ochréa).

Plante adulte

Tige dressée, ramifiée, 20 à 90 cm de hauteur.

Ochréas de la tige et inflorescence

Une gaine membraneuse (ochréa) à la base du pétiole entoure la tige à chaque nœud, elle est pubescente et ciliée au sommet.
Fleurs petites, de couleur rose, quelques-unes presque blanches, regroupées en épis denses au sommet de la tige et des rameaux.

Espèces semblables

Renouée scabre (pl., vég.), renouée poivre-d'eau (pl.).

Renouée persicaire




Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée persicaire

Lady’s-thumb
Polygonum persicaria L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée persicaire

Lady’s-thumb
Polygonum persicaria L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée persicaire

Lady’s-thumb
Polygonum persicaria L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée persicaire

Lady’s-thumb
Polygonum persicaria L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée persicaire

Lady’s-thumb
Polygonum persicaria L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée persicaire

Lady’s-thumb
Polygonum persicaria L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée scabre

Green smartweed
Polygonum scabrum Moench, espèce annuelle.



Plantule

Plantule à tige et à feuilles alternes.

Cotylédons

De forme oblongue à allongée, 6 à 15 mm de longueur. Face inférieure verte à rouge-violet.

Feuilles

Premières feuilles : entières, allongées, plus ou moins recouvertes de longs poils blancs et fins (surtout à la face inférieure) mais peu persistants.
Feuilles matures : comme les premières feuilles mais ciliées en bordure, points noirs sur le limbe et souvent une tache sombre au centre de celui-ci.
Chaque nouvelle feuille se dégage d'un fourreau membraneux (ochréa).



Plante adulte

Tige dressée, ramifiée, 20 à 90 cm de hauteur.

Ochréas de la tige et inflorescence

Une gaine membraneuse (ochréa) à la base du pétiole entoure la tige à chaque nœud, elle n'est pas ciliée au sommet.
Fleurs petites, blanc verdâtre, regroupées en épis denses au sommet de la tige et des rameaux.



Espèce semblable

Renouée persicaire (pl., vég.).





Renouée scabre




Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée scabre

Green smartweed
Polygonum scabrum Moench



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée scabre

Green smartweed
Polygonum scabrum Moench



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée scabre

Green smartweed
Polygonum scabrum Moench



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée scabre

Green smartweed
Polygonum scabrum Moench



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renouée scabre

Green smartweed
Polygonum scabrum Moench



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pourpier potager

Purslane
Portulaca oleracea L., espèce annuelle.




Plantule
Plantule à tige. Les 6 à 10 premières feuilles opposées, les suivantes alternes.
(Souvent la tige n'est pas bien dressée, elle semble écrasée sur elle-même.)
Cotylédons
De forme oblongue à allongée, 2 à 6 mm de longueur, charnus et généralement de teinte rougeâtre.
Feuilles
Toutes semblables : arrondies à allongées, à base étroite avec un sommet arrondi (en forme de massue), bord du limbe entier, pas de pétiole.
Limbe charnu souvent rougeâtre à la marge.



Plante adulte
Plante couchée tapissant le sol de petites colonies circulaires de 20 à 60 cm de diamètre.
Tige cylindrique, très charnue et rougeâtre.
Feuilles glabres, luisantes, alternes, concentrées surtout à l'extrémité de la tige et des rameaux où elles sont très rapprochées les unes des autres.
Fleurs et fruits
Fleurs petites, jaune pâle, situées à l'aisselle des feuilles supérieures ou à la jonction des rameaux sur la tige.
Le fruit est une capsule dont la partie supérieure, un peu en forme de cône, se détache à maturité.




Pourpier potager



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pourpier potager

Purslane

Portulaca oleracea L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pourpier potager

Purslane

Portulaca oleracea L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pourpier potager

Purslane

Portulaca oleracea L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pourpier potager

Purslane

Portulaca oleracea L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pourpier potager

Purslane

Portulaca oleracea L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Pourpier potager

Purslane

Portulaca oleracea L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Potentille de Norvège

Rough cinquefoil

Potentilla norvegica L., espèce annuelle, bisannuelle ou vivace de courte durée.











Plantule

Plantule à rosette et à feuilles alternes.

Cotylédons

De forme orbiculaire, 3 à 5 mm de longueur, pétiole distinct.

Limbe de couleur vert bleuté.

Feuilles

Premières feuilles : plus larges que longues à arrondies-ovales.

La 1re feuille porte de grosses dents au sommet du limbe, les feuilles suivantes sont dentées sur tout leur pourtour.

Feuilles matures : composées de 3 folioles ; chaque foliole a une forme allongée et des dents sur la totalité de son pourtour. À partir de la 5e ou 6e feuille, on trouve 2 petits appendices foliacés à la base du pétiole (stipules).

Toutes les feuilles sont pubescentes.

Plante adulte

Plante entièrement pubescente. Tige dressée, 20 à 50 cm de hauteur.

Les stipules (appendices foliacés) sont bien visibles au point d'insertion du pétiole sur la tige.

Fleurs de couleur jaune (5 à 8 mm de diamètre), pétales égalant les sépales. Les fleurs sont portées par de courts pédoncules dans la partie supérieure (bien feuillée) de la tige et des rameaux.

Espèce semblable

Potentille dressée (pl., vég., fl.).

Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Potentille de Norvège

Rough cinquefoil
Potentilla norvegica L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Potentille de Norvège

Rough cinquefoil
Potentilla norvegica L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Potentille de Norvège

Rough cinquefoil
Potentilla norvegica L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Potentille de Norvège

Rough cinquefoil
Potentilla norvegica L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Potentille de Norvège

Rough cinquefoil
Potentilla norvegica L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Potentille dressée

Sulphur cinquefoil
Potentilla recta L., espèce vivace.



Cliquez pour agrandir

Espèce d'allure similaire à la potentille de Norvège, mais ses fleurs sont plus grandes, leur couleur est d'un jaune plus pâle et les pétales dépassent les sépales.
Les feuilles matures se composent généralement de 5 à 7 folioles.

Espèce semblable
Potentille de Norvège (pl., vég., fl.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Potentille dressée

Sulphur cinquefoil
Potentilla recta L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renoncule âcre (bouton-d'or)

Tall buttercup

Ranunculus acris L., espèce vivace.





Espèce proche de la renoncule rampante.

Elle en diffère par l'absence de stolons, sa taille plus élevée (40 à 80 cm de hauteur) et ses feuilles. Ces dernières sont pubescentes et comportent 3 à 5 segments plus fins que ceux des feuilles de la renoncule rampante ; le segment médian n'est pas pétiolulé (la base du limbe est seulement étirée vers le bas).

Espèce semblable

Renoncule rampante (pl., vég., fl.).

Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999


Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renoncule âcre (bouton-d'or)

Tall buttercup

Ranunculus acris L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renoncule âcre (bouton-d'or)

Tall buttercup

Ranunculus acris L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renoncule rampante

Creeping buttercup
Ranunculus repens L., espèce vivace.








Cliquez pour agrandir

Plantule

Plantule à rosette et à feuilles alternes.

Cotylédons

De forme oblongue, 6 à 12 mm de longueur. Pétiole distinct qui peut devenir aussi long que le limbe.

Feuilles

Premières feuilles : plus larges que longues et à base échancrée ; le limbe d'abord divisé en 3 grosses dents (1re f.) devient profondément découpé en 3 lobes eux-mêmes dentés (3e, 4e f.). Les pétioles sont longs.
Feuilles matures (à partir de la 5e ou 6e f.) : feuilles comportant 3 segments dont le bord est denté à profondément découpé ; le segment médian a son propre petit pétiole (pétiolule).
(Voir la pousse végétative ou la plante adulte.)
Les feuilles sont glabres ou un peu pubescentes.

Pousse végétative

Plante à port rampant et à stolons (tiges qui courent sur le sol et qui s'enracinent aux nœuds).

Plante adulte

La tige est plus ou moins dressée, 20 à 30 cm de hauteur.
Les feuilles sont longuement pétiolées.
Fleurs (1,5 à 2 cm de diamètre) d'un jaune brillant, portées par des pédoncules courts et peu feuillés.
Fruits réunis en petites masses globuleuses. Le fruit est un akène (fruit sec ne s'ouvrant pas à maturité) aplati avec un bec en crochet.

Espèce semblable

Renoncule âcre (pl., vég., fl.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---



Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renoncule rampante

Creeping buttercup
Ranunculus repens L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renoncule rampante

Creeping buttercup
Ranunculus repens L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renoncule rampante

Creeping buttercup
Ranunculus repens L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renoncule rampante

Creeping buttercup
Ranunculus repens L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renoncule rampante

Creeping buttercup
Ranunculus repens L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Renoncule rampante

Creeping buttercup
Ranunculus repens L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

L’herbe à la puce

Poison-ivy

Rhus radicans L. var. *rydbergii* (Small ex Rydb.) Rehder, espèce vivace ligneuse. Famille des Anacardiacées.



Toutes les parties de la plante contiennent une substance vénéneuse causant des irritations cutanées sérieuses. On attrape l’herbe à la puce en touchant directement la plante ou en manipulant des objets ou des vêtements (ou même des animaux) ayant eu des contacts avec le végétal.

Description générale de la plante et habitats

Plante ligneuse ayant l’aspect d’un arbuste, elle mesure de 20 cm à près de 1 m de hauteur. (On pourra aussi trouver une forme grimpante dans le sud-ouest du Québec : *Rhus radicans* L. var. *radicans*.)
La tige est plutôt courte et cachée par le feuillage.
Les stolons (des tiges rampantes provenant d’un bourgeon à la base du plant et plus ou moins enfouis dans le sol) assurent la propagation de la plante qui peut former d’importantes colonies.
L’herbe à la puce se retrouve dans divers habitats allant des boisés aux cultures, mais elle prolifère surtout dans les endroits peu entretenus comme le bord des chemins ou le long des clôtures. Les endroits secs, rocailleux et bien éclairés lui sont particulièrement favorables.













Les feuilles

Au printemps, des feuilles plissées et rougeâtres apparaissent sur les vieilles tiges ou sur de nouvelles tiges issues des stolons. Elles s’étalent et prennent leur teinte vert foncé et leur aspect brillant caractéristiques.
Les feuilles sont alternes et composées de 3 folioles terminant un long pétiole (peut atteindre 20 cm) dressé. Chaque foliole est munie d’un petit pétiole (pétiolule), celui du centre étant un peu plus long que les deux autres. (Ces derniers caractères sont les plus constants chez les feuilles de cette plante : ceux qui aident le plus à la reconnaissance de l’espèce).
Les folioles ont généralement une forme ovale avec un sommet abruptement terminé en pointe, elles sont aussi bien nervées. Leur limbe, plutôt ferme est à bord entier ou






Cliquez pour agrandir

plus ou moins découpé .
Souvent des grosses dents inégales apparaissent sur un seul côté du limbe, faisant paraître la foliole comme asymétrique (la nervure centrale la divisant en deux parties inégales).

Les fleurs et les fruits

Les fleurs mâles et femelles sont sur des plants différents. Elles sont petites, blanchâtres à verdâtres et réunies en un amas de grappes à l’aisselle des feuilles (celles-ci les recouvrant, elles sont peu visibles).
Les fruits d’abord verdâtres deviennent blanc jaunâtre ; ils sont globuleux, côtelés, durs et gros comme un pois.
En automne, les feuilles se colorent de rouge ou d’orangé et tombent, mettant à nu les grappes de fruits qui peuvent persister sur la plante jusqu’au printemps suivant.

Espèce semblable

La vigne vierge (*Parthenocissus quinquefolia* L.) est une espèce avec laquelle l’herbe à la puce est souvent confondue.
Les deux plantes forment des colonies importantes, partagent souvent le même habitat et ont même allure : longs pétioles, folioles rabattues.
Pour différencier les deux espèces, il suffira de vérifier le nombre de folioles : 5 ou plus chez la vigne vierge.

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 04 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

L’herbe à la puce

Poison-ivy

Rhus radicans L. var. *rydbergii* (Small ex Rydb.) Rehder, espèce vivace ligneuse. Famille des Anacardiacées.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

L’herbe à la puce

Poison-ivy

Rhus radicans L. var. *rydbergii* (Small ex Rydb.) Rehder, espèce vivace ligneuse. Famille des Anacardiacées.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

L’herbe à la puce

Poison-ivy

Rhus radicans L. var. *rydbergii* (Small ex Rydb.) Rehder, espèce vivace ligneuse. Famille des Anacardiacées.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

L’herbe à la puce

Poison-ivy

Rhus radicans L. var. *rydbergii* (Small ex Rydb.) Rehder, espèce vivace ligneuse. Famille des Anacardiacées.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

L’herbe à la puce

Poison-ivy

Rhus radicans L. var. *rydbergii* (Small ex Rydb.) Rehder, espèce vivace ligneuse. Famille des Anacardiacées.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

L’herbe à la puce

Poison-ivy

Rhus radicans L. var. *rydbergii* (Small ex Rydb.) Rehder, espèce vivace ligneuse. Famille des Anacardiacées.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

L’herbe à la puce

Poison-ivy

Rhus radicans L. var. *rydbergii* (Small ex Rydb.) Rehder, espèce vivace ligneuse. Famille des Anacardiacées.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

L’herbe à la puce

Poison-ivy

Rhus radicans L. var. *rydbergii* (Small ex Rydb.) Rehder, espèce vivace ligneuse. Famille des Anacardiacées.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

L’herbe à la puce

Poison-ivy

Rhus radicans L. var. *rydbergii* (Small ex Rydb.) Rehder, espèce vivace ligneuse. Famille des Anacardiacées.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite oseille

Sheep sorrel
Rumex acetosella L., espèce vivace.nnuelle.




Plantule

Plantule à rosette et à feuilles alternes.

Cotylédons

De forme oblongue à allongée, charnus, 7 à 12 mm de longueur.
Face inférieure souvent tachetée de rouge-violet.

Feuilles

Premières feuilles : arrondies-ovales, bord du limbe entier.
Feuilles matures (à partir de la 4e ou 5e feuille) : entières, allongées et munies à la base de 2 lobes donnant la forme hastée ou sagittée caractéristique aux feuilles de l'espèce.
Les feuilles sont un peu charnues et elles ont un goût acide.
Le pétiole est long et en forme de V.
Chaque nouvelle feuille se dégage d'un fourreau membraneux (ochréa), comme chez les renouées.






Rosette développée

Elle provient de la plantule ou d'une pousse végétative issue d'un bourgeon situé sur les racines.
Remarque : les bourgeons apparaissent sur les racines entre les stades 5e à 10e feuille de la plantule ; ils peuvent régénérer la plante si on tente de l'éliminer. Ces bourgeons sont aussi à l'origine d'un développement végétatif important : après deux saisons de croissance, à partir d'une germination, la plante peut produire environ 3500 pousses et couvrir de son feuillage près de 4 m^2 de surface.



Plante adulte

Plante glabre. Tige dressée de 25 à 50 cm de hauteur. Gaine membraneuse (ochréa) à chacun des nœuds de la tige (comme chez les renouées).
Fleurs petites, très nombreuses, formant de longues inflorescences au sommet de la tige et des rameaux. Les pièces florales d'abord verdâtres se teintent de rouge.
Les fleurs mâles et femelles sont sur des plantes différentes.
Remarque : un clone femelle (issu d'une plantule) produit, après deux années de croissance, environ 450 000 graines.

Petite oseille



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite oseille

Sheep sorrel
Rumex acetosella L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite oseille

Sheep sorrel
Rumex acetosella L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite oseille

Sheep sorrel
Rumex acetosella L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite oseille

Sheep sorrel
Rumex acetosella L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite oseille

Sheep sorrel
Rumex acetosella L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Petite oseille

Sheep sorrel
Rumex acetosella L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Patience crépue

Curled dock

Rumex crispus L., espèce vivace.



Plantule

Plantule à rosette et à feuilles alternes.

Cotylédons

De forme allongée, 10 à 20 mm de longueur.

Pétiole et base du limbe souvent tachetés de rouge-violet.

Feuilles

Premières feuilles : arrondies-ovales, bord entier à légèrement sinueux, souvent tachetées de rouge-violet (comme les cotylédons).

Feuilles matures : comme les feuilles de la rosette développée.

Chaque nouvelle feuille se dégage d'un fourreau membraneux (ochréa), comme chez les renouées.



Rosette développée

Feuilles allongées (peuvent atteindre plus de 30 cm de longueur) à bord très ondulé leur donnant un aspect frisé ; elles sont parfois colorées de pourpre. Limbe arrondi ou effilé à sa base. Pétiole long à base élargie. Racine pivotante de couleur jaunâtre.





Plante adulte

Plante glabre.

Tige dressée, peu ramifiée, 30 à 80 cm de hauteur. Gaine membraneuse (ochréa) à chacun des nœuds de la tige (comme chez les renouées).

Fleurs verdâtres donnant des fruits triangulaires ailés (3 petites membranes minces).

Inflorescence terminale très voyante : masses compactes de fleurs et, en fin de saison, de fruits.



Espèce semblable

Petite oseille (pl.).

Patience crépue



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Patience crépue

Curled dock
Rumex crispus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Patience crépue

Curled dock
Rumex crispus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Patience crépue

Curled dock
Rumex crispus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Patience crépue

Curled dock
Rumex crispus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Patience crépue

Curled dock
Rumex crispus L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Morelle noire

Black nightshade
Solanum nigrum L., espèce annuelle.

Pas de photos

Espèce peu fréquente, mais qu'il est possible de trouver près des endroits où certains types de cette morelle ont déjà été cultivés. Morphologiquement très proche de la morelle noire de l'Est, elle se distingue par ses fleurs disposées en grappes et ses fruits généralement un peu plus gros.
Il est très difficile de séparer ces espèces par les seuls caractères végétatifs, les deux plantes étant presque glabres.

Espèces semblables
Morelle noire de l'Est (pl., vég., fl.), morelle poilue (pl., vég., fl.), amarante de Powell (pl.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 23 avril 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Salsifis des prés

Meadow goat's-beard
Tragopogon pratensis L., espèce bisannuelle ou vivace de courte durée.




Plantule
Plantule à rosette et à feuilles alternes.
Cotylédons
De forme linéaire, très longs (30 à 50 mm de longueur), la base est soudée et forme un tube.
Feuilles
Toutes semblables : très allongées, bord entier, nervures parallèles, glabres. (Elles ressemblent à des feuilles de graminée.)




Rosette développée
Les feuilles ne se déplient pas complètement, elles ont une forme en V et la bordure du limbe peut être ondulée. La nervure centrale est large et blanchâtre. La racine est pivotante et jaunâtre.




Plante adulte
Plante glabre. Tige dressée, 40 cm à 1 m de hauteur. Feuilles de la tige sans pétiole, à bord ondulé et à l'extrémité en pointe qui peut s'enrouler. Présence de latex.
Fleurs
Les fleurs sont à rayons jaunes. Elles sont réunies en capitules très grands (4 à 6 cm de diamètre) et solitaires au bout de la tige ou des rameaux. Une fois la fécondation des fleurs complétée, les capitules se referment pour mûrir leurs graines. Ces dernières, longues d'environ 3 cm, sont munies d'une aigrette plumeuse aplatie.





Salsifis des prés



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles

Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Salsifis des prés

Meadow goat's-beard
Tragopogon pratensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Salsifis des prés

Meadow goat's-beard
Tragopogon pratensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Salsifis des prés

Meadow goat's-beard
Tragopogon pratensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Salsifis des prés

Meadow goat's-beard
Tragopogon pratensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999


Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Salsifis des prés

Meadow goat's-beard
Tragopogon pratensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Salsifis des prés

Meadow goat's-beard
Tragopogon pratensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Salsifis des prés

Meadow goat's-beard
Tragopogon pratensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Salsifis des prés

Meadow goat's-beard
Tragopogon pratensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Salsifis des prés

Meadow goat's-beard
Tragopogon pratensis L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vesce jargeau

Tufted vetch
Vicia cracca L., espèce vivace.






Plantule et pousses végétatives

Les jeunes plantes qui émergent du sol proviennent surtout des rhizomes, ce sont des pousses végétatives. Ces dernières diffèrent peu des plantules : les deux ont des feuilles composées de folioles et la plantule n'a pas de cotylédons qui pourraient la distinguer car elle a un type de levée semblable à celui des graminées où la graine ne se défait pas dans le sol.
Toutes les jeunes plantes sont à tige.

Feuilles

Les feuilles, alternes, sont composées de paires de folioles opposées et terminées par une vrille plus ou moins ramifiée ; elles mesurent de 4 à 10 cm de longueur.
Les premières qui apparaissent comportent 1 ou 2 paires de folioles tandis que les feuilles matures en comptent de 6 à 12 paires.
Les folioles sont courtement pétiolulées, finement pubescentes et portent une pointe au sommet.





Plante adulte

Plante rampante à tige grêle, très ramifiée et très longue (peut atteindre 2 m).
Les tiges s'entremêlent facilement aux plantes voisines et s'élèvent au-dessus du sol par l'action des vrilles (au bout des feuilles) qui s'accrochent à tout support.

Fleurs et fruits

Les fleurs bleues, violettes ou mauves sont regroupées en grappes (10 à 30 fleurs alignées) dans la partie supérieure d'un long pédoncule (3 à 6 cm).
Le fruit est une petite gousse brunâtre à noirâtre contenant de 3 à 8 graines.

Vesce jargeau



Cliquez pour agrandir

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles Les formes de cotylédons

---

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vesce jargeau

Tufted vetch
Vicia cracca L



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vesce jargeau

Tufted vetch
Vicia cracca L



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vesce jargeau

Tufted vetch
Vicia cracca L



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vesce jargeau

Tufted vetch
Vicia cracca L



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vesce jargeau

Tufted vetch
Vicia cracca L



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vesce jargeau

Tufted vetch
Vicia cracca L



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Vesce jargeau

Tufted vetch
Vicia cracca L



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 08 octobre 1999

Lampourde glouteron

Cocklebur

Xanthium strumarium L., espèce annuelle.













Cliquez pour agrandir

Plantule

Plantule à tige. Les deux premières feuilles opposées, les suivantes alternes. (Rude au toucher.)

Cotylédons

De forme allongée, 20 à 40 mm de longueur, nervure médiane bien visible. Face inférieure souvent colorée de rouge. Pétiole distinct. Cotylédons très persistants sur la plante.

Feuilles

Premières feuilles : ovales-allongées, bord du limbe finement denté ou presque entier. Pétiole distinct.
Feuilles matures : triangulaires, dentées, 3 nervures principales. Pétiole distinct. (Voir aussi le plant végétatif.)
Les feuilles ont des poils raides et sont rudes au toucher.

Plant végétatif

Les feuilles ont essentiellement les mêmes caractères que les feuilles matures de la plantule, mais elles sont en général dentées plus grossièrement et la base du limbe, droite ou en forme de cœur, est mieux marquée.
Des poils raides couvrent les feuilles, les pétioles et la tige.

Plante adulte

Tige dressée, ramifiée, 40 cm à 1,5 m de hauteur, colorée plus ou moins de rouge et marquée de stries violacées.
Fleurs mâles et femelles en capitules séparés : capitules femelles épineux (chacun contenant 2 fleurs) à l'aisselle des feuilles et des rameaux ; capitules mâles non épineux et au-dessus des capitules femelles.

Fruits

Des capsules de 1,5 à 2 cm de longueur à parois épaisses et dures, couvertes d'épines crochues et terminées par 2 becs recourbés ressemblant à des petites cornes. Elles contiennent 2 graines (dans des loges séparées) dont l'une est toujours plus petite que l'autre.

Espèce semblable
Petite bardane (pl.).

Les groupes morphologiques et les formes de feuilles | Les formes de cotylédons

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 19 mars 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lampourde glouteron

Cocklebur

Xanthium strumarium L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lampourde glouteron

Cocklebur

Xanthium strumarium L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lampourde glouteron

Cocklebur

Xanthium strumarium L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lampourde glouteron

Cocklebur

Xanthium strumarium L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lampourde glouteron

Cocklebur

Xanthium strumarium L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999

Fiches descriptives des mauvaises herbes du Québec
Centre ARICO, Direction des services technologiques, MAPAQ

Centre Arico | Index des noms communs | Index des noms scientifiques |

Lampourde glouteron

Cocklebur

Xanthium strumarium L.



© Guide d'identification des mauvaises herbes MAPAQ

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Québec

© Gouvernement du Québec, 1999

Mis à jour le 12 octobre 1999