

## Comité consultatif québécois sur la santé des voyageurs (CCQSV)

### VIGIE EN SANTÉ DES VOYAGEURS

21 août 2012, vol. 13, no 10

### ÉCLOSION DE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE CAUSÉE PAR LE VIRUS EBOLA EN OUGANDA

#### ÉTAT DE LA SITUATION :

Une écloison de fièvre hémorragique causée par le virus Ebola (FVHE) sévit actuellement en Ouganda. Les cas proviennent du district de Kibaale dans la partie occidentale du pays. En date du 10 août 2012, l'OMS recensait 24 cas probables ou confirmés (11 cas confirmés en laboratoire) dont 16 décès.

À ce jour, aucun pays limitrophe à l'Ouganda n'a confirmé de cas en lien avec l'éclosion en Ouganda. Toutefois, des cas sont suspectés en Tanzanie, près de la frontière avec l'Ouganda. De plus, des cas ont été confirmés dans la province Orientale en République Démocratique du Congo. Pour ces derniers cas, l'espèce de virus Ebola est toutefois différente de celle retrouvée en Ouganda

La fièvre hémorragique Ebola est une maladie hautement létale (25-90 %). Le réservoir est animal (chauves-souris surtout mais beaucoup d'autres animaux dont les chimpanzés, gorilles, singes, antilopes de forêt, porcs, porc-épics, duikers et roussettes peuvent être infectés). La transmission se fait initialement à l'humain suite à un contact avec un animal infecté. Par la suite, l'éclosion se développera suite à une transmission inter-humaine via le sang ou les liquides corporels et ce par contact direct ou indirect. Après une incubation de 2 à 21 jours, la maladie apparaît sous formes de signes et symptômes peu spécifiques, d'allure grippale. Par la suite, la maladie se complique d'une atteinte rénale, hépatique et de signes hémorragiques. Il n'existe aucun traitement spécifique, ni de vaccin contre la FVHE.

#### RECOMMANDATIONS :

Les voyageurs à destination des zones à risque doivent être informés de l'éclosion en cours. Ils doivent être avisés d'éviter les contacts avec le sang ou les liquides corporels des personnes infectées. Les contacts avec les animaux, autant morts que vivants, doivent être évités.

Les voyageurs présentant des signes ou symptômes compatibles avec la FVHE doivent être avisés de consulter rapidement.

Les voyageurs de retour des zones à risque et consultant pour un tableau clinique compatible avec une fièvre hémorragique Ebola doivent faire l'objet de mesures de prévention des infections appropriées (blouse, gants, masque et lunettes de protection).

Rédigé par D<sup>r</sup> Villayvong Loungnarath et D<sup>re</sup> Suzanne Gagnon  
Pour le Comité consultatif québécois sur la santé des voyageurs.

#### Sources :

1. WHO : Ebola in Uganda-update (17/8/2012)
2. ASPC : Ebola en Ouganda (10/08/2012)
3. Promed Mail : Ebola hemorrhagic fever- Democratic Republic of Congo (14/8/2012)
4. Promed Mail : Ebola hemorrhagic fever- Tanzania (5/8/2012)