




Guide posologique des antibiotiques courants chez l'enfant

Janvier 2005

Ce guide est présenté à titre indicatif et ne remplace pas le jugement du praticien.

ANTIBIOTIQUE DÉNOMINATION COMMUNE / COMMERCIALE*	DOSE QUOTIDIENNE† ORALE	INTERVALLE POSOLOGIQUE	PRÉSENTATIONS	PRIX APPROXIMATIF RAMQ‡ (10 JOURS)	
				ENFANT 10 Kg	ENFANT 20 Kg
Amoxicilline (anciennement Amoxil®)	50 mg/kg/jour	aux 8 ou 12 heures	Susp. 125 et 250 mg/5 mL Caps. 250 et 500 mg Co. Mast. 125 et 250 mg	5 \$ (250 mg/5 mL)	9 \$ (250 mg/5 mL)
	90 mg/kg/jour (haute dose)			9 \$ (haute dose)	14 \$ (haute dose)
Amoxicilline- clavulanate de K (Clavulin®)	45 à 50 mg/kg/jour (amoxicilline)	aux 8 heures (formule 4:1)	Susp. 125 et 250 mg d'amoxicilline/5 mL Co. 250 et 500 mg	18 \$ (250 mg/5 mL)	37 \$ (250 mg/5 mL)
	45 à 90 mg/kg/jour (amoxicilline)	aux 12 heures (formule 7:1)§	Susp. 200 et 400 mg d'amoxicilline/5 mL Co. 875 mg	34 \$ (400 mg/5 mL)	68 \$ (400 mg/5 mL)
Azithromycine (Zithromax®)	10 mg/kg/jour jour 1 puis 5 mg/kg/jour jour 2 à 5 (otite-pneumonie)	aux 24 heures	Susp. 100 et 200 mg/5 mL Co. 250 mg	16 \$ (100 mg/5 mL)	33 \$ (200 mg/5 mL)
	10 mg/kg/jour x 3 jours (otite)	aux 24 heures		16 \$ (100 mg/5 mL)	33 \$ (200 mg/5 mL)
	12 mg/kg/jour x 5 jours (pharyngite)	aux 24 heures		33 \$ (200 mg/5 mL)	66 \$ (200 mg/5 mL)
Céfaclor (Ceclor®)	40 mg/kg/jour	aux 8 ou 12 heures	Susp. 125, 250 et 375 mg/5 mL Caps. 250 et 500 mg	20 \$ (375 mg/5 mL)	20 \$ (375 mg/5 mL)
Céfixime (Suprax®)	8 mg/kg/jour	aux 12 ou 24 heures	Susp. 100 mg/5 mL Co. 400 mg	33 \$ (100 mg/5 mL)	33 \$ (100 mg/5 mL)
Cefprozil (Cefzil®)	30 mg/kg/jour (otite-sinusite)	aux 12 heures	Susp de 125 et 250 mg/5 mL Co. 250 et 500 mg	30 \$ (250 mg/5 mL)	60 \$ (250 mg/5 mL)
	15 mg/kg/jour (pharyngite)	aux 12 heures		15 \$ (125 mg/5 mL)	30 \$ (250 mg/5 mL)
	20 mg/kg/jour (peau et tissus mous)	aux 24 heures		15 \$ (125 mg/5 mL)	30 \$ (250 mg/5 mL)
Céfuroxime axétil (Ceftin®)	30 mg/kg/jour	aux 12 heures	Susp. 125 mg/5 mL Co. 250 et 500 mg	32 \$ (Susp.)	48 \$ (Susp.)
Céphalexine (anciennement Kéflex®)	30 à 50 mg/kg/jour	aux 6 ou 8 heures	Susp. 125 et 250 mg/5 mL Co. et Caps. 250 et 500 mg	10 \$ (250 mg/5 mL)	20 \$ (250 mg/5 mL)

ANTIBIOTIQUE DÉNOMINATION COMMUNE / COMMERCIALE*	DOSE QUOTIDIENNE† ORALE	INTERVALLE POSOLOGIQUE	PRÉSENTATIONS	PRIX APPROXIMATIF RAMQ‡ (10 JOURS)	
				ENFANT 10 Kg	ENFANT 20 Kg
Clarithromycine (Biaxin®)	15 mg/kg/jour	aux 12 heures	Susp. 125 et 250 mg/5 mL Co. 250 et 500 mg (Biaxin®)	39\$ (125 mg/5 mL)	39\$ (125 mg/5 mL)
(Biaxin® XL)		aux 24 heures	Co. L.A. 500 mg		
Clindamycine (Dalacin®)	20 à 30 mg/kg/jour	aux 8 heures	Susp. 75 mg/5 mL Caps. 150 et 300 mg	22\$ (Susp.)	33\$ (Susp.)
Érythromycine	30 à 50 mg/kg/jour	aux 6 ou 8 heures	Susp. estolate : 125 et 250 mg/5 mL	3\$ (125 mg/5 mL)	6\$ (250 mg/5 mL)
			Susp. éthylsuccinate : 200 et 400 mg/5 mL	10\$ (200 mg/5 mL)	16\$ (400 mg/5 mL)
			Co. ou Caps. Ent. 250 et 333 mg		
Érythromycine-sulfisoxazole (Pediazole®)	40 à 50 mg/kg/jour (érythromycine)	aux 6 ou 8 heures	Susp. 200 mg d'érythromycine /5 mL	21\$ (Susp.)	21\$ (Susp.)
Métronidazole (Flagyl®)	30 mg/kg/jour	aux 8 heures	Co. 250 mg	0,60\$	1,20\$
Nitrofurantoïne (Macrochantin®)	5 à 7 mg/kg/jour	aux 6 ou 8 heures	Caps. 50 et 100 mg	3\$	6\$
Pénicilline V (Pen-Vee®)	25 à 50 mg/kg/jour	aux 6 heures aux 12 heures (pharyngite)	Susp. 125, 180, 250 et 300 mg/5 mL Co. 300 mg	3\$ (300 mg/5 mL)	6\$ (300 mg/5 mL)
Pivampicilline (Pondocillin®)	40 mg/kg/jour	aux 12 heures	Susp. 175 mg/5 mL Co. 500 mg	13\$ (175 mg/5 mL)	25\$ (175 mg/5 mL)
Triméthoprim-sulfaméthoxazole (Septra®)	8 mg/kg/jour (triméthoprim)	aux 12 heures	Susp. 40 mg (TMP)/5 mL Co. 20, 80, 160 mg (TMP)	2\$ (Susp.)	4\$ (Susp.)
Vancomycine (Vancocin®)	40 mg/kg/jour	aux 6 heures	Caps. 125 et 250 mg	262\$ (Caps. 125 mg)	524\$ (Caps. 250 mg)

* Une seule marque de commerce a été inscrite bien que plusieurs fabricants puissent offrir les produits sous d'autres noms commerciaux

† La dose quotidienne doit être répartie selon l'intervalle recommandé. La dose maximale quotidienne ne peut excéder la dose adulte

‡ Prix approximatifs apparaissant à la Liste de médicaments de la RAMQ (octobre 2003), excluant les honoraires du pharmacien et la marge bénéficiaire du grossiste.

Certaines conditions nécessitent des durées de traitement inférieures ou supérieures à 10 jours

§ La formulation 7:1 (BID) du Clavulin® est préférée à cause de sa meilleure tolérance digestive