

***Bibliothèque
et Archives
nationales***

Québec



Le présent fichier est une publication en ligne reçue en dépôt légal, convertie en format PDF et archivée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. L'information contenue dans le fichier peut donc être périmée et certains liens externes peuvent être inactifs.

Version visionnée sur le site Internet d'origine le 26 janvier 2010.

Section du dépôt légal

Le portrait de santé de la Montérégie et ses territoires de CLSC - Édition 2003

(données de recensement de 1996)

Table des matières

[Remerciements](#)

Partie 1

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE

[1.1 INTRODUCTION](#)

[1.2 MÉTHODOLOGIE](#)

[UNIVERS DES INDICATEURS RETENUS](#)

[DÉCOUPAGE GÉOGRAPHIQUE](#)

[CALCULS DES INDICATEURS](#)

[TESTS STATISTIQUES, COEFFICIENTS DE VARIATION ET COMPARABILITÉ](#)

[DES DONNÉES](#)

[LISTE DES SOURCES](#)

Partie 2

SOMMAIRE DES RÉSULTATS

[2.1 PROFIL RÉGIONAL](#)

[INTRODUCTION](#)

[PROFIL GÉNÉRAL](#)

[Déterminants sociodémographiques et écomomiques](#)

[Présentation des indicateurs](#)

[Faits saillants et enjeux](#)

[Déterminants : services](#)

[Présentation des indicateurs](#)

[Faits saillants et enjeux](#)

[État de santé](#)

[Présentation des indicateurs](#)

[Faits saillants et enjeux](#)

[PROFIL PAR GRANDS GROUPES D'ÂGE](#)

[PROFIL PAR SEXE](#)

[PROFIL ÉVOLUTIF](#)

2.2 PROFIL PAR TERRITOIRE DE CLSC

INTRODUCTION

GRAPHIQUES SYNTHÈSES DES POSITIONS DES 10 CLSC SELON L'UNITÉ DE MESURE DES INDICATEURS

CLSC LA PRESQU'ÎLE

Localisation du CLSC

Faits saillants

Tableau synthèse des positions relatives

Tableau synthèse des indicateurs

Tableau de bord des indicateurs

CLSC HUNTINGDON

Localisation du CLSC

Faits saillants

Tableau synthèse des positions relatives

Tableau synthèse des indicateurs

Tableau de bord des indicateurs

CLSC SEIGNEURIE DE BEAUHARNOIS

Localisation du CLSC

Faits saillants

Tableau synthèse des positions relatives

Tableau synthèse des indicateurs

Tableau de bord des indicateurs

CLSC CHÂTEAUGUAY

Localisation du CLSC

Faits saillants

Tableau synthèse des positions relatives

Tableau synthèse des indicateurs

Tableau de bord des indicateurs

CLSC JARDIN DU QUÉBEC

Localisation du CLSC

Faits saillants

Tableau synthèse des positions relatives

Tableau synthèse des indicateurs

Tableau de bord des indicateurs

CLSC KATERI

Localisation du CLSC

Faits saillants

Tableau synthèse des positions relatives

Tableau synthèse des indicateurs

Tableau de bord des indicateurs

CLSC SAMUEL DE CHAMPLAIN

[Localisation du CLSC](#)

[Faits saillants](#)

[Tableau synthèse des positions relatives](#)

[Tableau synthèse des indicateurs](#)

[Tableau de bord des indicateurs](#)

CLSC LONGUEUIL-OUEST

[Localisation du CLSC](#)

[Faits saillants](#)

[Tableau synthèse des positions relatives](#)

[Tableau synthèse des indicateurs](#)

[Tableau de bord des indicateurs](#)

CLSC LONGUEUIL-EST

[Localisation du CLSC](#)

[Faits saillants](#)

[Tableau synthèse des positions relatives](#)

[Tableau synthèse des indicateurs](#)

[Tableau de bord des indicateurs](#)

CLSC ST-HUBERT

[Localisation du CLSC](#)

[Faits saillants](#)

[Tableau synthèse des positions relatives](#)

[Tableau synthèse des indicateurs](#)

[Tableau de bord des indicateurs](#)

CLSC DES SEIGNEURIES

[Localisation du CLSC](#)

[Faits saillants](#)

[Tableau synthèse des positions relatives](#)

[Tableau synthèse des indicateurs](#)

[Tableau de bord des indicateurs](#)

CLSC CHAMPAGNAT DE LA VALLÉE DES FORTS

[Localisation du CLSC](#)

[Faits saillants](#)

[Tableau synthèse des positions relatives](#)

[Tableau synthèse des indicateurs](#)

[Tableau de bord des indicateurs](#)

CLSC VALLÉE DES PATRIOTES

[Localisation du CLSC](#)

[Faits saillants](#)

[Tableau synthèse des positions relatives](#)

[Tableau synthèse des indicateurs](#)

[Tableau de bord des indicateurs](#)

[CLSC DU RICHELIEU](#)

[Localisation du CLSC](#)

[Faits saillants](#)

[Tableau synthèse des positions relatives](#)

[Tableau synthèse des indicateurs](#)

[Tableau de bord des indicateurs](#)

[CLSC DU HAVRE](#)

[Localisation du CLSC](#)

[Faits saillants](#)

[Tableau synthèse des positions relatives](#)

[Tableau synthèse des indicateurs](#)

[Tableau de bord des indicateurs](#)

[CLSC DES MASKOUTAINS](#)

[Localisation du CLSC](#)

[Faits saillants](#)

[Tableau synthèse des positions relatives](#)

[Tableau synthèse des indicateurs](#)

[Tableau de bord des indicateurs](#)

[CLSC LA POMMERAIE](#)

[Localisation du CLSC](#)

[Faits saillants](#)

[Tableau synthèse des positions relatives](#)

[Tableau synthèse des indicateurs](#)

[Tableau de bord des indicateurs](#)

[CLSC DE LA HAUTE-YAMASKA](#)

[Localisation du CLSC](#)

[Faits saillants](#)

[Tableau synthèse des positions relatives](#)

[Tableau synthèse des indicateurs](#)

[Tableau de bord des indicateurs](#)

[CLSC LA CHÊNAIE](#)

[Localisation du CLSC](#)

[Faits saillants](#)

[Tableau synthèse des positions relatives](#)

[Tableau synthèse des indicateurs](#)

[Tableau de bord des indicateurs](#)

2.3 TEXTE THÉMATIQUE PAR TERRITOIRE DE CLSC

FICHES PAR INDICATEUR

DÉTERMINANTS

Sociodémographiques et économiques

1. [Taux d'accroissement de la population](#)
2. Répartition de la population selon l'âge et le sexe ([1](#) | [2](#) | [3](#))
3. [Taux de fécondité selon l'âge](#)
4. [Répartition de la population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial de fait](#)
5. [Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille](#)
6. [Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent](#)
7. [Proportion de la population vivant seule](#)
8. [Proportion de la population](#)
9. [Répartition de la population selon la langue parlée à la maison](#)
10. [Proportion d'immigrants](#)
11. [Répartition de la population selon le plus haut niveau de scolarité](#)
12. [Taux d'emploi](#)
13. [Taux de chômage](#)
14. [Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu](#)
 - 14.a [Répartition des ménages privés dont 30% ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation](#)
15. [Proportion de prestataires de l'assistance-emploi](#)
16. [Répartition des adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide](#)
17. [Proportion de la population se percevant pauvre ou très pauvre](#)

Comportements et facteurs de risque

1. [Proportion de la population percevant avoir de moyennes ou mauvaises habitudes alimentaires](#)
2. [Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir](#)
3. [Proportion de fumeurs actuels](#)
4. [Proportion de la population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine](#)

5. [Proportion de la population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année](#)
6. [Répartition des naissances vivantes selon la scolarité de la mère](#)
7. [Proportion de naissances vivantes de faible poids](#)
8. [Proportion de naissances vivantes prématurées](#)
9. [Proportion de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine](#)
10. [Proportion de la population présentant un excès de poids](#)
11. [Taux de prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse](#)
12. [Proportion de la population ayant déjà consommé des drogues illicites au cours de leur vie](#)
13. [Proportion de la population n'ayant aucun confident](#)
14. [Proportion de la population présentant un des trois éléments de l'indice d'insécurité alimentaire](#)

Services

1. [Taux d'occupation des lits dressés selon l'unité de service](#)
2. [Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations](#)
3. [Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations](#)
4. [Pourcentage de séjours excessifs à l'urgence](#)
5. [Proportion de la population de 65 ans et plus en institution de santé](#)
6. [Taux d'admission et durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée](#)
7. [Taux d'interventions dites pertinentes](#)
8. [Taux de césariennes](#)
9. [Taux d'hospitalisations jugées évitables](#)
10. [Taux de mortalité évitable](#)
11. [Proportion de la population ne connaissant pas le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC](#)
 - 11.a [Taux des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC et taux de certains services dispensés en CLSC](#)
12. [Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie au cours d'une période de deux ans](#)
13. [Proportion de personnes produisant sans rémunération des soins aux personnes âgées](#)
14. [Proportion des logements privés nécessitant des préparations majeures](#)
15. [Proportion de la population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région](#)
16. [Taux de mortalité par la prévention et la promotion](#)

ÉTAT DE SANTÉ

1. [Proportion de la population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé](#)
2. [Proportion de la population insatisfaite de sa vie sociale](#)
3. [Taux d'hospitalisations en soins physiques de courte durée selon le diagnostic](#)

[principal](#)

4. [Taux d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels](#)
5. [Taux d'incidence du cancer](#)
6. [Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire](#)
7. [Population ayant une limitation d'activités à long terme](#)
8. [Espérance de vie à la naissance](#)
9. [Espérance de vie en bonne santé](#)
10. [Taux de mortalité selon l'âge](#)
11. [Taux de mortalité infantile](#)
12. [Taux de mortalité périnatale](#)
13. [Taux de mortalité selon la cause](#)
14. [Taux de mortalité par tumeurs](#)
15. [Taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire](#)
16. [Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire](#)
17. [Taux de mortalité par traumatismes non intentionnels](#)
18. [Taux de mortalité par suicide](#)
19. [Taux des années potentielles de vie perdues](#)
20. [Proportion de la population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé mentale](#)
21. [Taux de mortalité associée au tabagisme](#)
22. [Indice de surfaces, de dents cariées, absentes ou obturées \(CAOF\)](#)

REMERCIEMENTS

Le présent document s'inspire en partie de l'édition 2001 du Portrait de santé « *Le Québec et ses régions* » publié par l'Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) et à la réalisation duquel nous avons eu le plaisir de participer en collaboration avec messieurs Robert Choinière, Michel Pageau et Marc Ferland, respectivement des régies régionales de la santé de Montréal-Centre et de Québec. Nous les remercions particulièrement pour leur contribution à la documentation des indicateurs ainsi qu'à la production des données régionales tirées du rapport de l'INSPQ.

Nos remerciements s'adressent aussi à monsieur Aimé Lebeau, coordonnateur du secteur Évaluation et recherche, cadre responsable de l'exercice de la fonction essentielle de surveillance continue de la santé de la population de la Montérégie, pour ses suggestions et commentaires, mais aussi pour son support constant tout au long de la réalisation de ce projet.

Enfin, nous tenons à souligner le travail exceptionnel de madame Josée Payette, technicienne de recherche, à la Direction de la santé publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie, pour la production de l'ensemble des tableaux, des graphiques et des cartes, ainsi que madame Sylvie Pichette, secrétaire, de la même direction, pour le travail de traitement de texte et la mise en pages de l'ensemble du document.

Nos remerciements s'adressent également pour leur contribution à certaines fiches, à :

Guylaine Allard

MSSS, Service des indicateurs et de la mesure de la performance

Guylaine Allard, Robert Ste-Marie, Lorraine Desprès

RRSSS de la Montérégie, Direction de l'organisation des services à la clientèle

Suzanne Bélanger et Geneviève Baron

RRSSS de la Montérégie, Programme de dépistage du cancer du sein

Christiane Charpentier

RRSSS de la Montérégie, Direction de l'organisation des services à la clientèle

Robert Choinière pour sa contribution personnelle à la production directe de certaines fiches

RRSSS de Montréal-Centre, Direction de la santé publique

Gisèle Drapeau

MSSS, Service des indicateurs et de la mesure de la performance

Marie-Hélène Dubuc

Les centres Jeunesse de la Montérégie

François Milord

RRSSS de la Montérégie, Direction de la santé publique

Manon Noisoux

RRSSS de la Montérégie, Direction de la santé publique

Gilles Pelletier

MSSS, Service du développement de l'information, Direction de la gestion de l'information

Marc-André Saint-Pierre

MSSS, Service du développement de l'information, Direction de la gestion de l'information

Éveline Savoie

RRSSS de la Montérégie, Direction de la santé publique

Victor Tremblay

STATPLUS

Mélanie Villeneuve

RRSSS de la Montérégie, Direction de la santé publique

MOT DU DIRECTEUR

C'est avec plaisir que je vous présente la toute dernière édition du Portrait de santé de la Montérégie et de ses 19 territoires de CLSC. L'édition 2003 de ce portrait est organisée à partir de l'analyse de 70 indicateurs sociosanitaires dont plusieurs présentent des données inédites pour la région, selon les 19 territoires géographiques des CLSC de la Montérégie, le sexe et les groupes d'âge. Ce document est enrichi de représentations graphiques et d'un atlas thématique complet. Il présente sous forme de faits saillants les principaux enjeux susceptibles d'intéresser spécialistes, gestionnaires, intervenants et citoyens qui, de près ou de loin, s'intéressent au domaine de la santé en Montérégie.


D'une manière plus spécifique, ce document est produit à partir d'une quinzaine de sources différentes. Il présente, notamment, des données et des faits saillants sur les déterminants démographiques, sociaux et économiques, les déterminants liés aux comportements et facteurs de risque, l'état de santé général ainsi que l'état de santé relatif à la morbidité, à l'incapacité et à la mortalité.

Les lecteurs y trouveront donc plusieurs renseignements pertinents qui sont présentés sous forme de 70 fiches pour autant d'indicateurs sociosanitaires différents. Chaque fiche présente une évolution dans le temps des indicateurs retenus et, pour plusieurs d'entre eux, une ventilation par âge ou par sexe ainsi que la distribution géographique par territoire de CLSC. On y retrouve aussi des faits saillants généraux sur la base des groupes d'âge, du sexe ou des territoires de CLSC ainsi qu'un atlas thématique complet affichant la valeur la plus récente de ces 70 indicateurs pour l'ensemble de la Montérégie et pour chaque territoire de CLSC.

La diffusion de l'information relative à l'état de santé répond à un mandat légal dévolu au directeur de santé publique dans le cadre de la nouvelle Loi sur la santé publique. Cette dernière identifie l'obligation de mettre à jour un rapport périodique sur l'état de santé de la population de la région.

Je crois que le document devrait faciliter autant la planification que le développement des services sociosanitaires en Montérégie. L'utilisation de cet outil m'apparaît très importante pour soutenir toutes initiatives liées aux efforts d'adaptation du système de santé en Montérégie.

Le directeur par intérim,



Richard Côté, M.D., FRCPC

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements	3

Partie 1

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE	15
1.1 INTRODUCTION.....	17
1.2 MÉTHODOLOGIE.....	17
UNIVERS DES INDICATEURS RETENUS	17
DÉCOUPAGE GÉOGRAPHIQUE	18
CALCULS DES INDICATEURS	18
TESTS STATISTIQUES, COEFFICIENTS DE VARIATION ET COMPARABILITÉ DES DONNÉES.....	19
LISTE DES SOURCES	20

Partie 2

SOMMAIRE DES RÉSULTATS.....	23
2.1 PROFIL RÉGIONAL.....	25
INTRODUCTION.....	25
PROFIL GÉNÉRAL	25
<i>Déterminants sociodémographiques et économiques</i>	<i>25</i>
Faits saillants et enjeux.....	25
<i>Déterminants : comportements et facteurs de risque</i>	<i>28</i>
Présentation des indicateurs	28
Faits saillants et enjeux.....	29
<i>Déterminants : services</i>	<i>31</i>
Présentation des indicateurs	31
Faits saillants et enjeux.....	32
<i>État de santé</i>	<i>34</i>
Présentation des indicateurs	34
Faits saillants et enjeux.....	34

PROFIL PAR GRANDS GROUPES D'ÂGE	37
PROFIL PAR SEXE.....	39
PROFIL ÉVOLUTIF	42
2.2 PROFIL PAR TERRITOIRE DE CLSC.....	43
INTRODUCTION.....	43
GRAPHIQUES SYNTHÈSES DES POSITIONS DES 19 CLSC SELON L'UNITÉ DE MESURE DES INDICATEURS.....	48
CLSC LA PRESQU'ÎLE	
Localisation du CLSC.....	49
Faits saillants	50
Tableau synthèse des positions relatives.....	51
Tableau synthèse des indicateurs.....	52
Tableau de bord des indicateurs	53
CLSC HUNTINGDON	
Localisation du CLSC.....	59
Faits saillants	60
Tableau synthèse des positions relatives.....	61
Tableau synthèse des indicateurs.....	62
Tableau de bord des indicateurs	63
CLSC SEIGNEURIE DE BEAUHARNOIS	
Localisation du CLSC.....	69
Faits saillants	70
Tableau synthèse des positions relatives.....	71
Tableau synthèse des indicateurs.....	72
Tableau de bord des indicateurs	73
CLSC CHÂTEAUGUAY	
Localisation du CLSC.....	79
Faits saillants	80
Tableau synthèse des positions relatives.....	81
Tableau synthèse des indicateurs.....	82
Tableau de bord des indicateurs	83
CLSC JARDIN DU QUÉBEC	
Localisation du CLSC.....	89
Faits saillants	90
Tableau synthèse des positions relatives.....	91
Tableau synthèse des indicateurs.....	92
Tableau de bord des indicateurs	93
CLSC KATERI	
Localisation du CLSC.....	99
Faits saillants	100
Tableau synthèse des positions relatives.....	101
Tableau synthèse des indicateurs.....	102
Tableau de bord des indicateurs	103

CLSC SAMUEL DE CHAMPLAIN	
Localisation du CLSC.....	109
Faits saillants	110
Tableau synthèse des positions relatives.....	111
Tableau synthèse des indicateurs.....	112
Tableau de bord des indicateurs	113
CLSC LONGUEUIL-OUEST	
Localisation du CLSC.....	119
Faits saillants	120
Tableau synthèse des positions relatives.....	121
Tableau synthèse des indicateurs.....	122
Tableau de bord des indicateurs	123
CLSC LONGUEUIL-EST	
Localisation du CLSC.....	129
Faits saillants	130
Tableau synthèse des positions relatives.....	131
Tableau synthèse des indicateurs.....	132
Tableau de bord des indicateurs	133
CLSC SAINT-HUBERT	
Localisation du CLSC.....	139
Faits saillants	140
Tableau synthèse des positions relatives.....	141
Tableau synthèse des indicateurs.....	142
Tableau de bord des indicateurs	143
CLSC DES SEIGNEURIES	
Localisation du CLSC.....	149
Faits saillants	150
Tableau synthèse des positions relatives.....	151
Tableau synthèse des indicateurs.....	152
Tableau de bord des indicateurs	153
CLSC CHAMPAGNAT DE LA VALLÉE DES FORTS	
Localisation du CLSC.....	159
Faits saillants	160
Tableau synthèse des positions relatives.....	161
Tableau synthèse des indicateurs.....	162
Tableau de bord des indicateurs	163
CLSC VALLÉE DES PATRIOTES	
Localisation du CLSC.....	169
Faits saillants	170
Tableau synthèse des positions relatives.....	171
Tableau synthèse des indicateurs.....	172
Tableau de bord des indicateurs	173

CLSC DU RICHELIEU	
Localisation du CLSC	179
Faits saillants	180
Tableau synthèse des positions relatives.....	181
Tableau synthèse des indicateurs.....	182
Tableau de bord des indicateurs	183
CLSC DU HAVRE	
Localisation du CLSC.....	189
Faits saillants	190
Tableau synthèse des positions relatives.....	191
Tableau synthèse des indicateurs.....	192
Tableau de bord des indicateurs	193
CLSC DES MASKOUTAINS	
Localisation du CLSC.....	199
Faits saillants	200
Tableau synthèse des positions relatives.....	201
Tableau synthèse des indicateurs.....	202
Tableau de bord des indicateurs	203
CLSC LA POMMERAIE	
Localisation du CLSC.....	209
Faits saillants	210
Tableau synthèse des positions relatives.....	211
Tableau synthèse des indicateurs.....	212
Tableau de bord des indicateurs	213
CLSC DE LA HAUTE-YAMASKA	
Localisation du CLSC.....	219
Faits saillants	220
Tableau synthèse des positions relatives.....	221
Tableau synthèse des indicateurs.....	222
Tableau de bord des indicateurs	223
CLSC LA CHÉNAIE	
Localisation du CLSC.....	229
Faits saillants	230
Tableau synthèse des positions relatives.....	231
Tableau synthèse des indicateurs.....	232
Tableau de bord des indicateurs	233
2.3 ATLAS THÉMATIQUE PAR TERRITOIRE DE CLSC	239
Introduction.....	230
Cartes	240

Partie 3

FICHES PAR INDICATEURS 271

DÉTERMINANTS

Sociodémographiques et économiques

1.	Taux d'accroissement de la population	273
2.	Répartition de la population selon l'âge et le sexe	276
3.	Taux de fécondité selon l'âge.....	283
4.	Répartition de la population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial de fait.....	285
5.	Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille	287
6.	Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent.....	289
7.	Proportion de la population vivant seule	291
8.	Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé	294
9.	Répartition de la population selon la langue parlée à la maison.....	297
10.	Proportion d'immigrants	299
11.	Répartition de la population selon le plus haut niveau de scolarité atteint.....	301
12.	Taux d'emploi	303
13.	Taux de chômage	305
14.	Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu.....	307
14.a	Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation	310
15.	Proportion de prestataires de l'assistance-emploi	312
16.	Répartition des adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide	315
17.	Proportion de la population se percevant pauvre ou très pauvre	317

Comportements et facteurs de risque

18.	Proportion de la population percevant avoir de moyennes ou mauvaises habitudes alimentaires	319
19.	Répartition de la population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir	321
20.	Proportion de fumeurs actuels	323
21.	Proportion de la population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine.....	325
22.	Proportion de la population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année	327
23.	Répartition des naissances vivantes selon la scolarité de la mère	329
24.	Proportion de naissances vivantes de faible poids	331
25.	Proportion de naissances vivantes prématurées	333
26.	Proportion de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine.....	335

27.	Proportion de la population présentant un excès de poids	337
28.	Taux de prises en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse	339
29.	Proportion de la population ayant déjà consommé des drogues illicites au cours de la vie.....	342
30.	Proportion de la population n'ayant aucun confident	344
31.	Proportion de la population présentant un des trois éléments de l'indice d'insécurité alimentaire.....	346

Services

32.	Taux d'occupation des lits dressés selon l'unité de service	348
33.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations	350
34.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations.....	353
35.	Pourcentage de séjours excessifs à l'urgence	355
36.	Proportion de la population de 65 ans et plus en institution de santé	357
37.	Taux d'admission et durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée	359
38.	Taux d'interventions dites pertinentes	361
39.	Taux de césarienne	363
40.	Taux d'hospitalisations jugées évitables.....	365
41.	Taux de mortalité évitable	367
42.	Proportion de la population ne connaissant pas le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC	369
42.a	Taux des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC et taux de certains services dispensés en CLSC.....	371
43.	Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie au cours d'une période de deux ans.....	373
44.	Proportion de personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées.....	375
45.	Proportion des logements privés nécessitant des réparations majeures	377
46.	Proportion de la population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région	379
47.	Taux de mortalité évitable par la prévention et la promotion.....	381

ÉTAT DE SANTÉ

48.	Proportion de la population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé	383
49.	Proportion de la population insatisfaite de sa vie sociale.....	385
50.	Taux d'hospitalisations en soins physiques de courte durée selon le diagnostic principal.....	387
51.	Taux d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels	391
52.	Taux d'Incidence du cancer	393
53.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire.....	395
54.	Population ayant une limitation d'activités à long terme.....	397
55.	Espérance de vie à la naissance	399
56.	Espérance de vie en bonne santé	401
57.	Taux de mortalité selon l'âge	403
58.	Taux de mortalité infantile.....	406
59.	Taux de mortalité périnatale	408
60.	Taux de mortalité selon la cause.....	410
61.	Taux de mortalité par tumeurs.....	414

62.	Taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire	416
63.	Taux de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire	418
64.	Taux de mortalité par traumatismes non intentionnels	420
65.	Taux de mortalité par suicide.....	422
66.	Taux des années potentielles de vie perdues	424
67.	Proportion de la population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé mentale.....	426
68.	Taux de mortalité associé au tabagisme	428
69.	Indice de surfaces, de dents cariées, absentes ou obturées (CAOF)	430

PARTIE 1

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE



1.1 Introduction

Le présent portrait de santé de la Montérégie a été élaboré en continuité avec *Le portrait de santé : Le Québec et ses régions* (INSPQ, M. Pageau, R. Choinière, M. Ferland et Y. Sauvageau, octobre 2001, 432 p.). Il constitue le volet régional de ce portrait tout en y ajoutant des données inédites par territoire de CLSC.

La publication provinciale est disponible pour consultation dans les centres de documentation de chacun des 19 CLSC et dans celui de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie. Elle peut être achetée chez tout libraire diffusant les publications de l'Éditeur officiel du Québec. Une version électronique complète peut être obtenue à l'adresse suivante : www.inspq.qc.ca. La section 2.3 « Synthèse régionale », de la partie I (pages 136 à 141) présente les valeurs montérégiennes en comparaison avec celles du Québec pour tous les indicateurs. En outre, la publication provinciale contient plusieurs autres renseignements essentiels que nous avons cru inutiles de reproduire ici.

Le lecteur du présent portrait a donc avantage à consulter la publication provinciale pour accéder à des données et informations complémentaires et essentielles, à savoir les définitions, les méthodes de calcul, les sources détaillées, l'interprétation des indicateurs ainsi que plusieurs annexes techniques.

Pour faciliter la correspondance entre les deux publications, chaque indicateur a une numérotation double, soit la première qui est propre au présent portrait régional et une seconde, placée entre parenthèses, correspondant au numéro attribué au même indicateur dans la publication provinciale.

Le portrait provincial documente dans un chapitre de « Méthodologie » les principaux paramètres techniques du portrait : le choix des indicateurs, le modèle de classification, le découpage géographique, le calcul des indicateurs, les tests statistiques et les sources de données.

Nous ne traiterons ici que des différences entre les deux publications pour chaque paramètre considérant que les publications sont complémentaires et permettent de couvrir l'ensemble des éléments méthodologiques associés à l'élaboration du portrait de santé.

Les lignes suivantes mettent l'accent sur les éléments qui présentent des différences entre les deux documents.

1.2 Méthodologie

Univers des indicateurs retenus

L'univers des indicateurs couverts dans les deux portraits diffèrent partiellement. En effet, soixante des quatre-vingt-treize indicateurs du portrait provincial sont intégrés dans le présent portrait régional.

Les indicateurs inclus dans le portrait provincial mais exclus de notre portrait régional, l'ont été soit parce que la donnée n'était pas disponible ou soit parce qu'elle n'était pas pertinente au niveau du découpage précis d'un territoire de CLSC.

À titre d'illustration les indicateurs suivants ont été exclus : les taux de grossesse et d'interruption volontaire de grossesse, le revenu personnel par habitant, le supplément de revenu garanti, les condamnations pour facultés affaiblies, les taux de sorties sans diplôme du secondaire, les trois indicateurs relatifs aux crimes, le nombre de médecins par habitant, les taux de participation en médecine et chirurgie et aux programmes de services

dentaires pour les enfants, la détresse psychologique, la vaccination contre la grippe pour les personnes âgées, les idées suicidaires sérieuses, les taux d'éducation, les proportions d'élèves handicapés, les pourcentages de conducteurs décédés selon leur taux d'alcoolémie, etc.

Par contre, certains indicateurs ont été ajoutés : la consommation de drogues à vie, l'absence de confident, l'insécurité alimentaire, la satisfaction des services de santé offerts dans la région, la mortalité évitable par la prévention et la promotion, la santé mentale perçue, la mortalité par tabagisme, certains services dispensés en CLSC, etc.

Découpage géographique

Presque tous les indicateurs ont été calculés sur la base des territoires de CLSC respectant les ententes de services.

Certains indicateurs comme ceux relatifs aux hospitalisations et quelques indicateurs sociodémographiques ont dû être calculés sur la base des anciens territoires dits « officiels » pour respecter les définitions et/ou la méthode de calcul présentées dans le portrait provincial ou parce que la donnée n'était pas disponible sur une autre base de territoire de CLSC.

Dans tous les cas où le territoire dit « officiel » est utilisé, l'élément 4 des fiches des indicateurs libelle toujours l'en-tête de colonne sur les territoires de CLSC « CLSC officiels », par opposition à la presque totalité des fiches où l'en-tête de colonne est simplement intitulé « CLSC » pour désigner les territoires respectant les ententes de services. L'atlas thématique procède de la même manière.

Calculs des indicateurs

Certains des indicateurs ont nécessité un ajustement des données (taux de mortalité, d'incidence, etc.) afin de faciliter les comparaisons entre les territoires de CLSC (élément 4 des fiches dans la majorité des cas) et contrôler l'effet dû à la différence de structures d'âge entre les populations. Le portrait régional remplace donc souvent la méthode de standardisation directe des taux appliquée dans le portrait provincial par celle de la standardisation indirecte mieux adaptée aux situations où le nombre d'événements est restreint comme c'est souvent le cas au niveau des territoires de CLSC. L'indice comparatif de mortalité est donc issu de l'ajustement indirect. Il est calculé et utilisé pour comparer les territoires de CLSC avec la valeur de la région.

La mortalité type ou l'incidence type utilisées pour l'ajustement indirect est celui de la Montérégie pour chacune des périodes en cause.

Dans le cas des hospitalisations, compte tenu du grand nombre de cas, la méthode de standardisation directe a été utilisée mais les indices comparatifs de mortalité ont été calculés en divisant simplement les taux des territoires de CLSC avec le taux régional. Dans ce cas, en plus des comparaisons avec la région et entre les CLSC on peut effectuer des comparaisons entre les périodes.

Lorsque l'ajustement direct a été maintenu comme méthode (comme dans le cas des hospitalisations pour tous les éléments des fiches des indicateurs ou pour les éléments 1 des fiches des indicateurs pour la mortalité ou l'incidence des cancers), la population type retenue est celle de la Montérégie 1996 corrigée pour le sous-dénombrement et non pas celle du Québec (1996) comme c'est le cas dans le portrait provincial. Cette différence dans le choix de la population de référence explique, en partie, les écarts entre les deux publications sur les valeurs calculées pour les mêmes périodes.

Le calcul d'un indice comparatif, bien que souvent effectué dans le cadre de l'ajustement direct ou indirect des taux, peut également être utilisé dans d'autres contextes n'impliquant pas de tels ajustements. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas du taux de prise en charge (fiche 28), l'incidence des maladies infectieuses (fiche 53), etc., l'indice comparatif résulte du simple rapport entre le taux d'un territoire de CLSC et celui de la région.

Tests statistiques, coefficients de variation et comparabilité des données

Dans le cas des données issues de l'Enquête régionale téléphonique *ad hoc* de la firme SOM (printemps 2000), les coefficients de variation, qui permettent d'évaluer le niveau de qualité statistique d'un estimé, ainsi que les tests pour établir la présence ou non d'une différence entre la valeur d'un territoire de CLSC et celle de la région, ont été calculés en tenant compte du plan de sondage complexe de cette enquête. Dans ces derniers tests, les niveaux de signification varient de 0,01 (« ou »), 0,05 (< ou >) à 0,10 (+ ou -).

Compte tenu des taux de réponse différents (plus élevés pour l'Enquête régionale téléphonique SOM), de la période de cueillette (toute l'année 1998 pour l'Enquête sociale et de santé c. uniquement le printemps 2000 pour l'Enquête SOM), compte tenu aussi des modalités de cueillette différentes (entrevues téléphoniques de 10 minutes c. questionnaire autoadministré comprenant 241 questions sur 61 pages) et finalement des différences dans le contenu du questionnaire utilisé, nous avons présenté les indicateurs calculés à partir de l'Enquête SOM (printemps 2000) uniquement pour comparer les territoires de CLSC entre eux et avec la région.

Pour comparer l'évolution des valeurs entre 1987 et 1998, nous nous en sommes tenus aux données de Santé Québec puisque ces dernières sont issues de protocoles d'enquête comparables.

Dans le présent portrait, compte tenu des différences méthodologiques énoncées, nous n'incluons donc pas les données d'enquête SOM pour suivre l'évolution d'un indicateur au niveau de la région entre 1998 et 2000.

Dans le cas des tests portant sur la signification des indices comparatifs de mortalité issus de l'ajustement indirect, la méthode proposée par Bouyer¹ a été retenue.

Lorsque l'ajustement direct a été retenu, la méthode des tests de différence utilisée décrite dans la publication provinciale a été retenue et appliquée aux indices comparatifs correspondant aux rapports entre les taux des territoires de CLSC et le taux régional (indicateurs d'hospitalisations).

Lorsque les données étaient comparables tant du point de vue de la source que de la méthode de calcul, la valeur pour l'ensemble du Québec a été présentée en plus de la valeur régionale. Lorsque cette valeur n'est pas présentée, c'est que la source ou la date d'interrogation de la source ou de la méthode de calcul ne permettent pas de comparer les valeurs des territoires de CLSC ou de la région avec celle du Québec paraissant dans la publication provinciale.

Malgré l'utilisation d'une même source et d'une méthode de calcul identique, certaines différences peuvent subsister entre les valeurs du portrait régional et celles de la publication provinciale pour un même indicateur et ceci, pour plusieurs raisons :

- Les dates différentes d'interrogation des fichiers qui sont constamment mis à jour;
- Les différences de découpage géographique pour les mêmes territoires, par exemple les données du recensement géocodées ou non;
- Les nombres de décimales retenues dans les calculs pour fins d'arrondissement;
- Les arrondissements aléatoires des données du recensement, agrégées par territoire de CLSC à partir des subdivisions de recensement ainsi que l'exclusion des cas hospitalisés hors Québec dans le cas des hospitalisations.

¹ Jean Bouyer et coll., (1993) *Épidémiologie, Principes et méthodes quantitatives*, Les Éditions INSERM, Paris, pages 219-221.

Liste des sources

Les sources suivantes ont été utilisées dans la confection du portrait montréalais :

Les Centres jeunesse de la Montérégie

Direction générale

Institut de la statistique Québec

Enquêtes de Santé Québec

Projections de population par RSS et territoire de CLSC de 1981 à 2021

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Base de données STATEVO

Fichier des naissances

Fichier des décès

Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO

Fichier des mortinaissances

Fichier des tumeurs

Registre des patients sur des civières dans les salles d'urgence (J56)

Service du développement de l'information

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Direction de la recherche, de l'évaluation et de la statistique

Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie, Direction de la santé publique

Enquête de santé dentaire

Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000

Programme de dépistage du cancer du sein

Statistique Canada

Recensements

Bien que nous soyons en 2003, l'année la plus récente disponible pour la plupart des sources remonte à trois ou même cinq ans. Les années plus récentes, comme par exemple les données de recensement de mai 2001, seront intégrées au portrait dans la version électronique sur le site WEB de la régie à mesure de leur disponibilité soit en 2003, 2004 et 2005 selon la source.

Le lecteur désireux d'en savoir plus sur les sources listées plus haut peut consulter les notes techniques particulières présentées à cette fin dans *Le portrait de santé : Le Québec et ses régions* aux pages 10 à 15. Comme l'Enquête téléphonique SOM du printemps 2000 est une source exclusive au portrait de santé montréalais voici, en vrac, les principaux paramètres méthodologiques s'y rapportant.

Cette enquête téléphonique d'une durée de dix minutes, précédée auprès des ménages répondants d'une lettre du directeur de la Direction de santé publique de la régie régionale et menée entre le 17 avril et le 20 juin 2000, par une vingtaine d'interviewers formés à cette enquête et supportés par la technique d'entrevue assistée par ordinateur, visait à estimer, sur la base de 19 strates non proportionnelles correspondant aux 19 territoires de CLSC, une quinzaine de variables de santé à partir de questions tirées du questionnaire autoadministré (QAA) de l'Enquête sociale et de santé menée par la Direction Santé Québec de l'ISQ, en 1998.

Elle est basée sur un plan de sondage complexe à deux degrés soit 19 territoires de CLSC et une personne de 15 ans et plus choisie aléatoirement dans les ménages privés sélectionnés.

Le nombre de répondants est de 5 765 pour la région et oscille entre 288 et 324 selon le territoire de CLSC.

Compte tenu des effets de plan calculés par SOM, de 1,4 pour la région et de 1,2 à 1,3 au niveau des 19 territoires, les nombres de répondants effectifs sont ramenés à 4 120 pour la région et oscillent entre 226 et 263 pour les divers CLSC.

Les taux de réponse globaux sont de 80 % pour la région et les taux de non-réponse partiels pour chacune des questions oscillent entre 0,1 % (fumeurs, perception de la qualité des habitudes alimentaires et santé perçue) et 9,4 % (connaissance de l'existence du service INFO-SANTÉ CLSC).

Au niveau régional, les erreurs échantillonnales oscillent entre 0,7 % pour une proportion estimée de 5 % (ex. : santé mentale perçue comme moyenne ou mauvaise) et 1,4 % pour une proportion de 30 % (ex. : fumeurs actuels).

Toutes les données dans le présent portrait sont pondérées pour tenir compte de la probabilité de sélection, du taux de réponse et de la répartition de la population âge sexe du recensement 1996. L'analyse statistique tient compte de l'effet de plan intégrée aux tests bilatéraux avec des niveaux de confiance de 0,01, 0,05 et 0,10 selon le cas comparant chacun des territoires de CLSC avec le reste des 18 autres territoires.

2.1 PROFIL RÉGIONAL

Introduction

La présente section a un objectif double. Tout d'abord, produire un tableau des faits saillants du portrait de santé par thématique (les faits saillants détaillés par indicateur se retrouvent sur la première page de chacune des fiches) et, dans un second temps, identifier les enjeux qui sont susceptibles d'avoir dans le futur un impact négatif ou positif sur cet état de santé.

L'enjeu se définit comme un risque ou une possibilité de gain ou de perte, d'amélioration ou de détérioration dans un contexte ou dans une situation donnée dont l'issue n'est pas déterminée à l'avance et qui a fait l'objet dans le passé d'améliorations et de détériorations.

Dans le contexte d'un portrait de santé à caractère populationnel, l'objet des enjeux porte plus sur les résultats (« outcomes ») au niveau de la population et moins sur les moyens d'interventions ou les stratégies pour obtenir ces derniers. Le lecteur doit considérer la trentaine d'enjeux énoncés ici comme des formulations d'enjeux dans la perspective d'un portrait de santé populationnel plutôt que comme des impératifs absolus d'action ou de services à mettre en place.

Les enjeux populationnels sont multiples mais peuvent être priorisés selon l'importance des conséquences sur la santé puis selon l'ampleur en termes de personnes affectées.

La formulation des enjeux résulte d'une démarche d'analyse où certains critères, énoncés plus haut, sont pris en considération, de telle sorte que pour une même problématique, selon la pondération attribuée aux divers critères (ampleur, effet sur la santé, variabilité dans le temps), plusieurs enjeux différents pourraient être formulés.

Pour une problématique dont les conséquences sur la santé sont importantes et qui touchent un grand nombre de personnes (par exemple : le tabagisme), une petite amélioration mesurée par une diminution de un ou deux points de pourcentage enregistré auprès de certains groupes (ex. : les plus jeunes...) ou dans certains territoires de CLSC plus vulnérables, peut se traduire par un bénéfice général important au niveau de l'ensemble de la population montérégienne.

La séquence de présentation variera : pour certaines thématiques, les enjeux seront énoncés en premier lieu, puis documentés par la suite à l'aide des principaux faits saillants; pour d'autres, la séquence inverse sera suivie soit une présentation des résultats de base suivie des enjeux qui en découlent.

Profil général

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

Faits saillants et enjeux

Les phénomènes démographiques, sociaux et économiques constituent des déterminants majeurs du domaine de la santé et des services sociaux en Montérégie.

L'état actuel de ces déterminants en Montérégie résultent de l'évolution de facteurs sociodémographiques, sociaux et socioéconomiques sous-jacents sur lesquels notre système régional de santé et de services sociaux a

peu de prise et qui doivent donc, de son point de vue, être considérés comme des données incontournables auxquelles il ne pourra se soustraire. Ces déterminants s'imposent à lui de l'extérieur. Il sera appelé à composer avec eux sans quoi il risque de ne pas répondre aux besoins de la population de la région. Quels sont les principaux enjeux associés à la thématique sociodémographique? Énonçons-les sommairement avant de les documenter un peu plus en détail à l'aide de données sélectionnées.

Vieillesse de la population

Parmi les phénomènes démographiques, l'importance relative du volume de population ainsi que sa distribution par âge revêtent une importance considérable comme prédicteurs de l'ampleur et de la répartition des facteurs de risque, des problèmes de santé et de la consommation des services. En effet, la population de la Montérégie s'approchera du 1 400 000 habitants d'ici dix ans et représentera sur cette période toujours près des trois quarts de celle de la région de Montréal, et 18 % de celle de l'ensemble du Québec.

Le volume de population à desservir demeurera donc considérable même si sa croissance sera de beaucoup ralentie par rapport à certaines périodes précédentes. Elle croîtra malgré tout légèrement, un peu plus que celle du Québec, ce qui devrait, dans le meilleur des cas, maintenir la pression sur la demande de services de la région.

Le vieillissement de la population montérégienne sera comparativement beaucoup plus accéléré que l'augmentation de la population totale et plus que celui de l'accroissement de la population des personnes âgées au niveau de l'ensemble du Québec. Par conséquent, la proportion montérégienne de personnes âgées de 65 ans et plus sera très voisine de celle du Québec d'ici dix ans. La proportion et le nombre de consommateurs de services de santé qui aura 65 ans et plus en 2011, qui requièrent beaucoup plus de services et présentent davantage de problèmes de santé et d'incapacité, seront d'au moins 50 % plus élevés qu'ils ne le sont actuellement.

Malgré les gains au plan de la santé de la génération actuelle des personnes ayant entre 60 et 70 ans, la pression sur la demande de services requis pour les personnes âgées dans la région, devrait donc augmenter et, en termes relatifs, plus rapidement que celle de la population totale et que celle des personnes âgées au niveau de l'ensemble du Québec.

Croissance accentuée de la diversité des structures familiales

Au niveau des familles, on constate une augmentation plus rapide en Montérégie qu'au Québec, à la fois des liens matrimoniaux moins formels entre les adultes de la région (union libre, divorces, célibataires jamais mariés) et, une diversité plus grande de la structure familiale traditionnelle (parents en union libre, parents seuls). La famille est le lieu toujours privilégié pour la socialisation des enfants. Cette situation est susceptible de créer une pression supplémentaire sur le système régional de services qui sera de plus en plus appelé à supporter la mise en place de conditions favorisant la continuité de certaines fonctions autrefois dévolues à la famille traditionnelle, ou même appelé à inventer de nouveaux types de soutien du moins pour une période de transition avant que ces modes nouveaux ne deviennent peut-être la règle.

Si le rythme des changements rapportés ici, survenus entre une période de seulement cinq ans (1991-1996), devait se maintenir, ce n'est pas simplement le type de réaction du système de santé qui importerait mais surtout sa rapidité d'adaptation. Ce dernier devra donc agir rapidement et être plutôt proactif que réactif face aux enjeux qui sont en train de se dessiner.

Défavorisation économique préoccupante

Finalement, malgré une position relativement favorable par rapport à celle de l'ensemble du Québec, compte tenu du volume élevé de la population montérégienne, on dénombre une grande quantité de Montérégiens affectés par la défavorisation socioéconomique. Ainsi, ce phénomène est manifesté autant du point de vue d'une durée prolongée de dépendance à l'aide sociale, du chômage, de la sous-scolarisation, du manque de

ressources financières pour assurer la satisfaction de ses besoins de base que des inégalités socioéconomiques entre les Montérégiens, associées à leur âge, à leur sexe ou à leur lieu de résidence.

Il s'agit d'un autre défi qui ne manquera pas de questionner la légitimité de la gestion ou des impacts du système régional de services de santé, si les inégalités socioéconomiques devaient se traduire par des inégalités de santé. Ces pressions supplémentaires revêtiront un caractère politique sur la base d'arguments reliés à une certaine justice sociale, tout au moins du point de vue de certaines sous-populations. Plusieurs individus ou groupes pourraient y trouver alors amplement de justifications pour un questionnement du caractère universel du système de santé ou de ses retombées présumées sur la santé dans la région.

Au total, compte tenu de la diversité des enjeux énoncés, c'est aussi la flexibilité, le temps de création et la capacité d'adaptation d'un système de santé et des services sociaux complexe et d'envergure comme celui de la Montérégie qui est en cause, dans la mise en place au moment opportun de solutions diversifiées à des rythmes différents et auprès de populations présentant des profils variés de besoins.

Des chiffres éloquentes à l'appui de ces enjeux pour notre système de santé

Les données détaillées justifiant la formulation des enjeux précédents sont les suivantes. Premièrement, en ce qui a trait à la démographique, le nombre total de personnes résidant en Montérégie (1 324 799 estimé en 2001 et plus de 1 375 148 en 2011) est en partie le résultat d'une croissance historique supérieure à celle du Québec et qui situe depuis toujours la région au second rang, après Montréal, en termes d'effectifs.

La croissance globale, après avoir connu un sommet entre 1986 et 1991 (9,4 %), s'est considérablement ralentie avec des taux de 4,0 %, 2,9 % et 2,1 % estimés respectivement pour 1991-1996, 1996-2001 et 2001-2006. On estime que la population a possiblement augmenté de plus de 88 000 habitants entre 1996 et 2001, soit l'équivalent de la population du territoire du CLSC de Saint-Hubert.

Les principaux facteurs en cause sont une diminution presque continue de la fécondité des femmes depuis vingt ans et du jeu combiné de la diminution de l'importance des jeunes, du passage progressif vers le groupe des personnes âgées de la génération des « baby boomers » qui formait la cohorte la plus importante du groupe des adultes de 15-64 ans et de l'allongement de plus d'une année de l'espérance de vie des aînés depuis les vingt dernières années.

Avec 1,5 enfant par femme en 1998, la fécondité se situe bien en deçà du nombre moyen d'enfant requis pour permettre le renouvellement des générations soit 2,1 enfants par femme. Phénomène plus marquant, cette sous-fécondité se maintient depuis plus de vingt ans.

Les mères plus jeunes de 20-29 ans, qui représentent plus de 40 % de toute la fécondité, constitue le seul groupe d'âge où une diminution notable est observée depuis 1990-1992. La cohorte des « baby boomers » ne fait que commencer à entrer dans le groupe des aînés, l'espérance de vie s'élève sans interruption depuis vingt ans et finalement, le ralentissement de la croissance ainsi que le vieillissement s'observent au niveau de presque tous les CLSC qui composent géographiquement la Montérégie. Ces tendances témoignent du caractère important des changements en cours.

Deuxièmement, au plan social, les récentes données plus détaillées (entre 1991 et 1996) montrent que près des deux tiers des adultes en 1991 comme en 1996 sont mariés ou vivent en union libre. Cependant, la proportion des gens mariés baisse (de 52 % à 46 %) au profit des personnes optant pour l'union libre (de 13 % à 16 %), le divorce (de 5 % à 6 %) ou le célibat (de 24 % à 25 %).

Non seulement le nombre moyen d'enfants dans les familles est moindre, compte tenu de la baisse de la fécondité, mais ces enfants vivent davantage dans des familles à structure plus diversifiée qu'auparavant. La forte majorité est encore formée de deux parents (84 % en 1991 et 82 % en 1996), mais celles dirigées par des parents mariés sont passées de 70 % en 1991 à 59 % en 1996 des familles avec enfant mineur tandis que les parents vivant en union libre dirigent 22 % des familles en 1996 c. 14 % en 1991 seulement cinq ans auparavant. Ces dernières familles expliquent ainsi la majeure partie de la baisse de la proportion de familles

dirigées par des parents mariés suivies de loin par les familles à parent unique qui en passant de 16 % en 1991 à 18 % en 1996 rendent compte d'une autre partie de la baisse.

Troisièmement, au plan socioéconomique, les données plus détaillées sont les suivantes. Bien que la position historique de la région soit généralement plus favorable que celle observée dans l'ensemble du Québec, les données suivantes révèlent de faits préoccupants : les proportions des adultes prestataires de l'assistance-emploi depuis dix ans et plus (48 % des adultes prestataires en mars 2002), ou de l'ensemble des enfants et adultes (0-64 ans) prestataires (6 % en mars 2001), de personnes en chômage (9 % au recensement de 1996), sous-scolarisées (16 % n'ont pas complété leur neuvième année en 1996), ou vivant sous le seuil de faible revenu (18 % en 1995) correspondent à des effectifs respectifs non négligeables de près de 26 000, 74 000, 60 000, 160 000 et 223 000 personnes. Il s'agit d'un bassin considérable de personnes plus susceptibles que les autres de présenter des facteurs de risque ou de vulnérabilité susceptibles de produire ces problèmes et de santé.

De plus, pour chacun des indicateurs précédents, de grandes inégalités existent au niveau des âges et surtout au niveau géographique des territoires de CLSC; certains d'entre eux présentent même des prévalences supérieures à celle estimée pour l'ensemble du Québec. Ces disparités pourraient être associées à des inégalités de santé.

Par exemple, en 1996, si on retient les valeurs les plus élevées, la population du territoire de La Chênaie se démarque avec une proportion de 28 % de personnes de 15 ans et plus sous-scolarisées, du Havre avec seulement 50 % des personnes de 15 ans et plus occupant un emploi; Seigneurie de Beauharnois et du Havre avec un taux de chômage pour les mêmes personnes de 13 %, Longueuil-Ouest avec 34 % de personnes vivant sous le seuil de faible revenu et 15 % de prestataires de l'assistance-emploi, et La Pommeraie avec 56 % de ses adultes bénéficiaires de l'assistance-emploi qui reçoivent des prestations (0-64 ans) pour une durée cumulative de dix ans et plus.

Les femmes présentent des valeurs supérieures à celles estimées pour les hommes, mais cette situation est en voie de changement, puisque chez les plus jeunes, habituellement les 15-24 ans, les écarts sont souvent minimes entre les sexes.

Les personnes âgées de 65 ans et plus affichent la plus grande proportion de personnes vivant sous le seuil de faible revenu. Les jeunes de 15-24 ans présentent des taux de chômage doubles par rapport aux autres groupes d'âge et les adultes de 55-64 ans ont le taux le plus élevé de prestataires de l'aide sociale en mars 2001, soit plus de 8 %.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

Présentation des indicateurs

Le présent portrait, en présentant les données de certains indicateurs sociosanitaires sur la base géographique des territoires de CLSC, prend en considération les indicateurs qui sont issus des données générées par les banques de données administratives comme le fichier des naissances ou celui relatif aux indicateurs repères dans le cadre de l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse par territoire de CLSC auxquels s'ajoutent un nombre restreint de quatorze indicateurs dont plusieurs sont calculés à partir des données recueillies lors d'une enquête régionale téléphonique SOM *ad hoc* menée au printemps 2000.

Nous présenterons d'abord les indicateurs puis dans un deuxième temps, les faits saillants détaillés par thématique ou problématique illustrés à l'aide de ces indicateurs. Ceux-ci correspondent à diverses sous-populations de la Montérégie.

Pour la population adulte de 15 ans et plus vivant en ménage privé ce sont : la qualité perçue des habitudes alimentaires, un des trois éléments de l'indice d'insécurité alimentaire, l'excès de poids, le niveau de pratique de

l'activité physique de loisir, la prévalence du tabagisme, la consommation élevée d'alcool sur une base occasionnelle ou régulière, la consommation de drogue à vie, l'absence de confident.

Certains de ces facteurs sont susceptibles d'exercer une influence nuisible directe ou le plus souvent indirecte sur les individus en facilitant l'apparition de maladies telles les maladies cardiovasculaires, les tumeurs, le diabète, les maladies respiratoires ou digestives, etc. ou en entraînant même certains décès prématurés.

D'autres facteurs comme la pratique de l'activité physique ou la présence de confidents peuvent aider au maintien et même au recouvrement de la santé en agissant comme facteurs de protection et en augmentant la résistance à la maladie.

Pour les mères et les nouveau-nés, plusieurs indicateurs relatifs aux naissances sont susceptibles d'affecter la santé maternelle et infantile tels que les bébés de faible poids, les prématurés ou avec retard de croissance intra-utérine et les mères sous-scolarisées souvent plus susceptibles d'être isolées socialement ou d'avoir des habitudes de vie à risque.

Pour les jeunes de 0-17 ans, le taux de signalements de cas retenus dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse et le taux de cas pour lesquels la sécurité et le développement des enfants sont compromis révèlent certaines problématiques préoccupantes pour le développement des jeunes.

Faits saillants et enjeux

Chez les adultes de 15 ans et plus, les principaux enjeux où des gains pourraient être obtenus sont les suivants.

Le **tabagisme**, qui affecte encore environ un Montérégien de 15 ans et plus sur trois soit environ 300 000 personnes, arrive au premier rang des problématiques préoccupantes compte tenu de son importance primordiale sur la morbidité et la mortalité prématurée considérant le nombre important de personnes entretenant encore cette habitude délétère.

Les groupes vulnérables sont, outre les hommes qui affichent la proportion la plus élevée de fumeurs, les jeunes de 15-24 ans qui commencent à fumer de plus en plus jeunes et les femmes qui, bien que présentant une prévalence inférieure à celle des hommes, affichent une baisse plus lente que ces derniers de leur prévalence de fumeuses.

L'enjeu consiste à agir pour maintenir et à accélérer la légère tendance à la baisse du tabagisme en Montérégie. Pour ce faire, l'action doit viser des objectifs afin de réduire chez les femmes et par la prévention en amont des habitudes tabagiques chez les jeunes tout en maintenant la pression sur la baisse chez les hommes.

La **sédentarité** (pratique sur une période de trois mois d'une séance d'activité physique de 20 à 30 minutes moins d'une fois par semaine) afflige près de la moitié de la population adulte et donc près de 500 000 personnes et présente une hausse significative entre 1992-1993 et 1998. L'enjeu consiste ici d'abord à freiner cette hausse marquée de la sédentarité pour ensuite viser à réduire le nombre considérable de personnes pratiquant peu d'activité physique de loisir.

L'**excès de poids** qui affecte un peu moins de 300 000 personnes constitue un troisième enjeu majeur compte tenu de son impact sur la morbidité et, dans certains cas, sur la mortalité.

L'enjeu consiste à supporter toute intervention susceptible de ralentir, voire à freiner, la tendance ininterrompue à l'augmentation de la prévalence de ce facteur de risque depuis dix ans en Montérégie, par une action particulièrement ciblée chez les hommes et les jeunes de 15-24 ans. Si la tendance actuelle se maintient nous pourrions nous retrouver dans quelques années seulement avec près du tiers de toute la population des quinze ans et plus de la région qui présenterait un excès de poids.

La **consommation élevée d'alcool** sur une base occasionnelle, cinq fois ou plus sur douze mois, constitue un quatrième enjeu de taille : près du quart des Montérégiens de 15 ans et plus, soit plus de 200 000 personnes,

rapportent cette consommation élevée occasionnelle. Presque tous les groupes d'âge sont visés ici par une intervention préventive : les jeunes de 15-24 ans et de 25-44 ans à cause de la prévalence élevée chez ces groupes et les personnes âgées de 45-64 ans à cause de l'augmentation significative estimée chez eux entre les enquêtes de 1992-1993 et de 1998. Comme pour l'excès de poids, l'enjeu consiste dans un premier temps à ralentir la tendance à la hausse particulièrement préoccupante chez les 45-64 ans ainsi que la prévalence plus élevée chez les 15-24 ans et chez les hommes en général.

L'**alimentation** constitue un cinquième enjeu de taille à cause de son impact comme facteur de morbidité et du fait que l'alimentation perçue comme « moyenne ou mauvaise » affecte environ 140 000 Montérégiens.

Pire encore, le fait qu'environ 70 000 personnes « disent manger moins qu'elles ne le devraient, parfois ou souvent, parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour la nourriture » et ceci, dans une région relativement favorisée comme la Montérégie, présente un défi du point de vue de l'inégalité de la distribution des facteurs de risque face à la santé. L'enjeu en matière d'alimentation consiste à supporter toute initiative susceptible d'enrayer le plus possible cette problématique socialement inacceptable.

En dernier lieu, l'**absence de confident**, situation vécue par près de 100 000 Montérégiens, et composante importante du soutien social, présente un enjeu important en termes de contribution des services à la promotion d'un meilleur réseau de soutien pour plusieurs Montérégiens.

Chez les mères, la **sous-scolarisation**, qui affecte environ 1 700 d'entre elles, constitue encore un défi pour les interventions de santé publique puisque, même en baisse lente, cette situation entraîne souvent des risques d'accoucher de bébés de faible poids, près de 900 en moyenne pour la période 1994-1998, ou à des bébés prématurés ou avec un retard intra-utérin comme c'est le cas pour plus de mille naissances en Montérégie.

L'enjeu est centré sur une intervention préventive active auprès de ces mères, souvent isolées des services, pour contrer les facteurs de risque souvent liés à une telle défavorisation sociale synonyme d'isolement social.

Finalement, **chez les jeunes de 0-17 ans** dont la sécurité et le développement sont considérés comme compromis dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse se situe à près de 1 400 pour un taux de 4,5 pour 1 000 et constitue une préoccupation surtout en ce qui a trait aux **problématiques de négligence et de troubles de comportements** qui composent 80 % des cas. Une plus grande intégration des suivis offerts par les acteurs concernés représente un enjeu significatif.

Outre les enjeux identifiés plus haut, le plus souvent à partir des données de l'Enquête sociale et de santé 1998, et liés à des problématiques ou des groupes démographiques particuliers, un enjeu supplémentaire mérite d'être mis en évidence : il s'agit des disparités géographiques sur la base des territoires de CLSC estimées lors de l'Enquête régionale téléphonique *ad hoc* réalisée par SOM au printemps 2000, quant aux prévalences des comportements ou facteurs de risque mesurés avec les mêmes questions que celles de l'Enquête sociale et de santé de 1998 sur la base des territoires de CLSC de résidence.

Pour tous les indicateurs utilisés, la valeur régionale n'est qu'une moyenne pondérée qui masque des différences, simples tendances ou différences significatives au plan statistique, entre quelques unes ou plusieurs des populations des territoires de CLSC.

Les écarts sont, dans plusieurs cas, plus importants entre les valeurs estimées pour certains territoires de CLSC et celle de la région qu'entre les prévalences estimées pour certains groupes démographiques.

À titre d'exemple, la population du territoire du CLSC Seigneurie de Beauharnois affiche pour au moins cinq indicateurs des valeurs significativement supérieures au plan statistique à celle de la région, c'est le cas pour les populations de Longueuil-Ouest et de Huntingdon pour au moins quatre indicateurs.

Les plans d'action régional et locaux d'interventions devront préconiser des adaptations en tenant compte des profils différents des populations en termes de facteurs de risque ceci dans le but de réduire les écarts observés selon les territoires de CLSC.

DÉTERMINANTS : SERVICES

Présentation des indicateurs

Dans les sections précédentes, nous avons présenté certains déterminants démographiques et comportementaux ou facteurs de risque directement ou indirectement associés à l'état de santé. Dans chaque cas, nous avons souligné les enjeux qui pouvaient y être associés.

Les services de santé dispensés dans le but de rétablir ces états de santé peuvent être à leur tour considérés comme des déterminants de la santé puisque s'ils sont adéquats, ils peuvent contribuer au rétablissement et à l'amélioration de l'état de santé ou dans le cas contraire précipiter une morbidité ou même une mortalité par ailleurs évitable s'ils ne répondent pas à certains besoins. Sans aller jusqu'à avoir de telles conséquences sur la santé, des services difficiles d'accès par exemple, peuvent créer des irritants en termes de satisfaction dans la population générale et entacher les perceptions, l'image et la notoriété du système de soins ou de certaines de ses composantes.

Près d'une quinzaine d'indicateurs de services ont été retenus dans le présent portrait, chacun visant une contribution particulière à l'amélioration de l'état de santé des Montérégiens ou à l'estimation du niveau général de satisfaction face aux services de santé. Dressons-en une liste sommaire.

Les **nombre de lits dressés** dans les hôpitaux présentent l'univers des ressources hospitalières disponibles dans la région tandis que le taux d'occupation des lits dressés permet de mesurer l'utilisation de ces lits disponibles.

La **dépendance de la population** permet de connaître la proportion des hospitalisations des résidents d'un territoire de CLSC ou de la région qui ont lieu dans un C.H. situé dans ce territoire de CLSC ou dans la région.

La **dépendance de la ressource** permet d'estimer la part des hospitalisations dispensées dans la région ou dans un C.H. localisé dans un CLSC qui originent soit des habitants de ce CLSC où est le C.H., soit des habitants des autres CLSC de la région ou des personnes provenant d'autres régions.

Les **pourcentages des séjours** « excessifs », c'est-à-dire 48 heures ou plus, des personnes à l'urgence dénotent une tendance dont il faut établir et suivre l'ampleur dans le temps et ceci par C.H.

La **proportion de personnes de 65 ans et plus en institution de santé** donne une idée de l'ampleur de la pression créée sur les admissions dans les institutions de soins et du volume de la population âgée vivant encore en ménage privé mais éventuellement susceptible d'avoir besoin de services de maintien à domicile.

Les **taux d'hébergement dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée** et la **durée moyenne d'attente** qui s'y rattache peuvent être des indicateurs indirects de l'engorgement à l'entrée de ces centres et du fardeau à supporter par les bénéficiaires eux-mêmes et les aidants naturels qui les entourent jusqu'à la prise en charge par les services institutionnels.

Le **service INFO-SANTÉ CLSC** apporte sa contribution en donnant des informations de toute nature qui peuvent aider à régler directement des problèmes présentés par les résidents soit pour eux-mêmes ou l'un des leurs. De plus, ce service contribue à acheminer les demandeurs vers les bonnes ressources et permettent ainsi de désengorger d'autres ressources déjà surutilisées, notamment, les salles d'urgences des hôpitaux.

D'autres indicateurs comme les **hospitalisations évitables** par les soins témoignent du manque possible d'accès à certains services de première ligne là où certains problèmes pourraient recevoir un traitement adéquat puisque les diagnostics d'hospitalisation retenus ici pourraient faire l'objet de traitement en première ligne.

Il en est de même de l'indicateur portant sur les **interventions dites « pertinentes »** qui permettent de donner aux personnes d'importants bénéfices en ce qui a trait à une meilleure qualité de vie.

L'indicateur relatif au **taux de mortalité évitable**, qui consigne les causes de décès qui dans bien des cas n'auraient pas dû se produire puisque, pour ces dernières, des interventions connues et efficaces et des soins appropriés peuvent être dispensés.

La **pratique de la mammographie de dépistage** pour les femmes de 50-69 ans est considéré comme un moyen pertinent de diminuer la mortalité due au cancer du sein chez ces femmes par le dépistage précoce, ce qui permet une intervention plus rapide avant que la maladie n'atteigne un stade irréversible.

Finalement, le **taux de satisfaction générale des services de santé** dans la région constitue un indicateur global de perception positive ou négative du système par la population adulte de la région.

Comme on a pu le voir dans certains cas, les indicateurs précédents se réfèrent à des populations différentes de Montérégien.

Certains des indicateurs présentés plus haut ne sont pas calculés sur la base de la population mais plutôt sur une combinaison des ressources et des clientèles de certains services durant une période donnée (comme le nombre de lits dressés, les séjours moyens ou les séjours excessifs à l'urgence pour les personnes ayant occupé une civière à l'urgence, les nombres d'hospitalisations pour les indices de dépendance, etc.).

D'autres indicateurs sont calculés pour une population particulière : la proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie, le taux de césarienne pour les mères ayant accouché et qui résident en Montérégie; les personnes en institution de santé ne concernent que les personnes de 65 ans et plus; les personnes de 18 ans et plus pour les interventions dites « pertinentes »; la population totale ou celle de certains groupes d'âge spécifiques pour les taux d'hospitalisations jugées évitables ou la population de 0-64 ans et celle de certains groupes d'âge pour la mortalité évitable, et finalement, la population de 15 ans et plus en ce qui a trait au service INFO-SANTÉ CLSC que le service ait été demandé en leur nom ou au nom d'une autre personne (souvent des enfants).

Faits saillants et enjeux

Examinons maintenant les faits saillants détaillés relatifs aux indicateurs de services retenus ici et esquissons au passage certains enjeux à l'aide des ces derniers.

Les lits dressés en Montérégie en 1998-1999 étaient respectivement au nombre de 5 183 et de 1 708 pour les soins de longue durée et les soins de courte durée soit 12,3 % dans le premier cas, et 11,2 % dans le second par rapport au total des lits dressés dans l'ensemble du Québec.

Les taux d'occupation étant, pour la même année, de 94 % pour la longue durée et de 90 % pour la courte durée, ce taux étant supérieur au taux québécois situé à 84 %.

Les séjours moyens de courte durée sont voisins de celui du Québec tandis que celui pour la longue durée est inférieur (191 c. 214 jours).

Sur le total des 110 000 hospitalisations originant des Montérégiens, la dépendance de la population par rapport à la ressource hospitalière se traduit par le fait que près des trois quarts des Montérégiens qui sont hospitalisés le sont en Montérégie. Ce taux est de 39 % lorsque on considère le C.H. dans le territoire de CLSC de résidence. Cette dépendance par rapport à la région augmente lentement avec les années. Mais, puisqu'il y a encore place à l'amélioration, l'enjeu consiste à contribuer à augmenter davantage cette dépendance pour les Montérégiens, et par conséquent, à faciliter l'accès aux services hospitaliers dispensés dans leur propre région.

Parmi les 110 000 hospitalisations, 81 000 hospitalisations ont lieu dans les C.H. de la Montérégie. La dépendance des ressources hospitalières en place dans la région est de 96 %. En d'autres termes, la majorité des hospitalisations proviennent des résidents de la région, ce qui diffère grandement des régions comme Montréal, Québec ou Laval où une part importante des hospitalisations proviennent de résidents d'autres régions.

En ce qui concerne des séjours excessifs passés sur des civières à l'urgence, près du quart (23 %) des personnes ayant occupé une civière y sont demeurées 24 heures et plus alors que 4 % ont séjourné 48 heures et plus. Ces proportions sont en hausse mais demeurent inférieures, dans le cas des 24 heures et plus à celle de l'ensemble du Québec. Par contre, les proportions sont supérieures dans le cas des 48 heures et plus. L'enjeu consiste à viser une diminution des séjours excessifs de 48 heures et plus au sein des urgences.

La majorité (90 %) des personnes de 65 ans et plus vivent en ménage privé comparativement à 60 % des personnes âgées de 85 ans et plus. Il s'agit d'une manifestation particulière de l'impact sur les soins dont nous avons traité plus haut en parlant des déterminants démographiques comme le vieillissement. L'enjeu de planification et de mise en place des ressources adéquates au niveau du maintien à domicile en est un de taille, compte tenu de l'espérance de vie qui s'accroît sans cesse et de la légère diminution de la proportion des personnes âgées qui vivent en institution de santé.

Le taux des interventions dites « pertinentes » augmente en Montérégie mais avec 96 pour 10 000 personnes de 18 ans et plus, il est inférieur à celui de l'ensemble du Québec qui dépasse 100. L'enjeu consiste à augmenter le nombre des interventions pertinentes susceptibles d'augmenter la qualité de vie des Montérégiens.

Le taux de césarienne est de 17 pour 100 accouchements. Il est en légère baisse et déjà inférieur à celui du Québec. Des gains supplémentaires pourraient être faits auprès des mères de 35 ans et plus où le taux a augmenté.

Le taux des hospitalisations qui auraient pu être évitées avec l'utilisation de soins appropriés de première ligne s'est accru pour se situer à 56 pour 10 000 personnes. L'enjeu consiste à examiner les principaux aspects des services de première ligne qui sont susceptibles d'engendrer de telles hospitalisations autrement évitables.

La mortalité évitable par les interventions efficaces et des soins appropriés est à 52 pour 100 000. Cette situation correspond à environ 600 décès qui auraient pu théoriquement être évités. Ce taux a fait des gains en Montérégie et se retrouve en deçà de la valeur québécoise. L'enjeu consiste à réduire davantage le trop grand nombre de décès encore évitables. La mortalité évitable par la prévention ou la promotion se situe à 134 pour 100 000 ce qui représente encore plus de 1 600 décès évitables en moyenne dont environ 1000 qui sont associés directement au tabagisme.

En Montérégie chez les femmes de 50-69 ans, la pratique de la mammographie pour tout motif (dépistage et autres) a considérablement augmenté, passant de 50 % en 1992-1993 à 65 % en 1998.

En ce qui a trait à la mammographie exclusivement pour fins de dépistage, une femme sur deux a suivi la recommandation. L'enjeu consiste à porter ce taux au 70 % visé, à mesure de la mise en place et du rodage du Programme québécois de dépistage du cancer du sein en Montérégie.

Le service INFO-SANTÉ CLSC est connu des trois quarts des Montérégiens adultes de 15 ans et plus, davantage chez les femmes et moins chez les 25-44 ans. L'enjeu consiste donc à accroître la notoriété du service surtout auprès des hommes et des personnes de 25-44 ans, d'autant plus qu'une partie de ces personnes est susceptible d'être un parent et que ce service constitue une source précieuse d'information et de référence pour les parents.

Finalement, la satisfaction générale face aux services de santé dans la région demeure élevée puisque les trois quarts des adultes de 15 ans et plus s'en disent « satisfaits ». L'enjeu consiste à identifier les causes du niveau légèrement inférieur de satisfaction observé chez les hommes et les adultes de 25-64 ans.

Outre les enjeux identifiés plus haut qui sont liés à des problématiques ou à des groupes démographiques particuliers, il existe un enjeu relatif aux disparités selon les territoires de CLSC dans le sens d'une différence d'exposition à ces problématiques entre les populations de ces territoires de CLSC.

Pour les séjours excessifs de 24 heures et plus et de 48 heures et plus, la population du Havre qui utilise l'urgence du C.H. de l'Hôtel-Dieu de Sorel doit subir des taux élevés de séjours excessifs à la hausse, de la

même façon, pour les populations constituant le bassin de desserte du C.H. Charles-LeMoine où les mêmes taux sont également élevés.

Contrairement aux indicateurs socioéconomiques ou aux facteurs de risque où un même territoire de CLSC pouvait présenter des excédents sur plusieurs indicateurs, au niveau des services, le même territoire est rarement nommé plus d'une ou deux fois comme présentant la situation la plus défavorable. À titre d'exemple, Samuel de Champlain affiche une position désavantageuse quant à la proportion plus faible de personnes connaissant le service INFO-SANTÉ CLSC et à son taux plus élevé d'attente pour l'hébergement et les soins de longue durée; Saint-Hubert quant à son taux inférieur pour les « interventions jugées pertinentes » et son taux plus élevé d'attente pour l'hébergement et les soins de longue durée. La plupart des CLSC présentent un profil mitigé au chapitre des services avec une position tantôt avantageuse et tantôt désavantageuse.

ÉTAT DE SANTÉ

Présentation des indicateurs

Dans la section précédente, nous avons présenté certains comportements et facteurs de risque en rappelant leurs effets négatifs directs ou indirects sur l'état de santé.

En autant que l'importance d'un enjeu pour une problématique donnée est partiellement tributaire de l'ampleur des effets de cette dernière sur l'état de santé de la population, la vingtaine d'indicateurs que nous allons retenir dans la présente section, pour dresser le portrait de l'état de santé des Montérégiens, aident à illustrer indirectement et à souligner à nouveau l'importance de plusieurs enjeux décrits dans la section sur les facteurs de risque. De plus, ils permettent d'identifier les enjeux propres à l'état de santé de la population montérégienne.

La presque totalité des indicateurs concernent la santé physique : la santé perçue comme « moyenne ou mauvaise », l'incidence des maladies infectieuses, les nouveaux cas de cancer, les hospitalisations pour les principaux diagnostics médicaux, la prévalence des incapacités, la mortalité reliée aux diagnostics médicaux les plus fréquents, au facteur de risque majeur qu'est le tabac, la mortalité prématurée ou évitable par la prévention, l'espérance de vie et l'espérance de vie dite sans incapacité ou en bonne santé.

Au niveau de la santé mentale, seulement deux indicateurs sont retenus et disponibles sur la base des territoires de CLSC.

Le premier réfère à la santé mentale perçue globalement qui, comme la santé physique perçue, s'avère associée à la morbidité et à la consommation de services. Le second indicateur réfère au taux de suicide.

Sur la vingtaine d'indicateurs retenus, seulement quatre ne sont pas calculés sur la base de la population totale. Il s'agit de la santé générale et la santé mentale perçue qui réfère aux adultes de quinze ans et plus exclusivement, la mortalité prématurée et celle évitable par la prévention qui excluent les décès qui ont lieu après l'âge de 74 ans.

Faits saillants et enjeux

Voyons plus en détails les principaux enjeux qui se dessinent ainsi que des faits saillants quant à l'état de santé.

Pour les personnes de 15 ans et plus, en matière de **santé physique**, environ 87 000 personnes soit 9 % de ce groupe d'âge rapportent une perception « moyenne ou mauvaise » de leur santé en 1998, en baisse depuis 1992-1993. Cet indicateur témoigne d'une amélioration de la situation observée particulièrement chez les personnes de 45 ans et plus où la baisse est continue et marquée depuis 1987. En autant que cette perception constitue un bon prédicteur de l'état de santé objectif, il nous porte à penser que le profil de santé de la population vieillissante pourrait être différent dans les prochaines années sinon meilleur que celui de la génération précédente.

Pour cette même population, en matière de **santé mentale**, ce sont environ 80 000 personnes ou 8 % qui se disent en « moyenne ou mauvaise » santé mentale en comparaison avec les autres personnes de leur âge. Cet indicateur étant utilisé pour la première fois dans l'enquête de 1998, il n'est pas possible de tracer, comme pour l'indicateur précédent, un profil évolutif, mais l'ampleur du phénomène mérite qu'on s'attarde à la problématique de la santé mentale.

Pour la population totale, l'incidence des principales **maladies infectieuses** présente un taux de 212 pour 100 000. Ce taux correspond à un nombre annuel moyen de près de 2 800 nouveaux cas et, bien qu'en baisse sur une période de dix ans, cette problématique, particulièrement composée des maladies transmises sexuellement, demeure préoccupante compte tenu à la fois du nombre de personnes impliquées et des conséquences potentielles sur la santé. L'enjeu consiste à améliorer la vigilance continue et les actions préventives et de protection chez les adultes, les jeunes adultes en particulier, en ce qui a trait aux maladies transmises sexuellement.

Les **hospitalisations en soins physiques de courte durée** présentent un taux de 853 pour 10 000 personnes pour un nombre annuel moyen de 110 989 hospitalisations. L'enjeu consiste à diminuer les hospitalisations pour les maladies cardiovasculaires et pour celles de l'appareil digestif bien que le second type ait baissé plus que le premier entre les périodes étudiées.

Les nouveaux cas de cancer avec un taux de 381 cas pour 100 000 et un nombre annuel moyen d'environ 5 000 cas demeure une problématique d'envergure compte tenu de son incidence élevée, des faibles gains enregistrés dans le temps et des conséquences sur la santé des Montérégiens. De plus, le nombre de cas est appelé à augmenter régulièrement compte tenu du vieillissement de la population. Un des enjeux majeurs se situe au niveau des cancers de la prostate, du sein et du poumon, particulièrement pour ce dernier chez la femme, où on enregistre les hausses les plus importantes parmi les causes retenues pour la prévention possible de certains cancers, la dispensation et l'intégration des soins et des systèmes d'information.

La **prévalence des incapacités** est estimée entre près de 80 000 et de 200 000 personnes en Montérégie selon la méthodologie et l'enquête retenues pour mesurer le phénomène. Il s'agit d'un enjeu majeur compte tenu de son ampleur, de son impact sur la qualité et l'espérance de vie en bonne santé et de son augmentation significative entre 1992-1993 et 1998, surtout chez les personnes de 65 ans et plus. Cette augmentation est plus grande en Montérégie que celle observée pour le même groupe d'âge au niveau du Québec. L'enjeu consiste à mettre en place les mesures facilitant la prévention et l'adaptation des personnes ayant à vivre avec des limitations dans le but d'augmenter la qualité de vie et indirectement l'espérance de vie en bonne santé.

La **mortalité générale** présente des enjeux prioritaires au niveau de l'état de santé puisqu'elle réfère aux conditions médicales susceptibles d'entraîner non seulement une diminution de la qualité de vie mais la mort elle-même. Ces enjeux témoignent également dans plusieurs cas d'un historique de comportements et facteurs de risque dont certains sont prévenables. Plusieurs enjeux se dessinent : les 25-44 ans affichent la deuxième plus faible baisse du taux général de décès parmi les groupes d'âge considérés, après celle estimée pour les personnes de 75 ans et plus. Les enjeux d'amélioration visent aussi particulièrement les maladies de l'appareil circulatoire et les tumeurs, depuis longtemps les causes principales de décès, mais aussi les maladies de l'appareil respiratoire en forte augmentation chez les femmes. Cette augmentation devrait se poursuivre compte tenu de la diminution plus faible de la prévalence des femmes fumeuses depuis plusieurs années et de l'augmentation chez les jeunes femmes.

Au niveau des traumatismes non intentionnels, la **problématique des chutes** devient un enjeu avec la seule hausse significative de taux dans une famille de diagnostics par ailleurs en forte baisse.

Dans le cas des décès évitables par la prévention en général, on observe une baisse continue de ce taux. Cependant, une hausse est notée en ce qui a trait aux décès dus au **cancer du poumon** et aux **maladies pulmonaires obstructives chroniques** associés au tabagisme. Dans le cas spécifique des décès liés au tabac, on observe également une hausse continue. Ces données viennent corroborer l'importance de poursuivre la lutte anti-tabac amorcée depuis plusieurs années.

En matière de santé mentale, la **mortalité par suicide** demeure toujours une problématique majeure, surtout chez les hommes de la région, avec des taux en légère hausse bien que ces derniers présentent encore un taux inférieur à celui des québécois. Le taux total est de 15 pour 100 000 personnes mais de 25 chez les hommes pour un nombre annuel moyen d'environ 200 (1994-1998).

L'**espérance de vie à la naissance** (1996-1998), qui résume l'ensemble de l'expérience de la mortalité des Montérégiens, atteint maintenant 78,4 ans et se bonifie continuellement depuis les vingt dernières années. L'enjeu consiste à travailler à la réduction de l'écart de plus de cinq ans estimé en défaveur des hommes dans le but de diminuer la disparité entre les sexes et d'augmenter l'espérance de vie générale. L'action sur certains comportements et facteurs de risque davantage prévalents chez les hommes (alcool, tabac et excès de poids) pourrait s'avérer bénéfique à cet égard.

L'enjeu se situe aussi au niveau de l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, à savoir l'espérance de vie dont on a retranché les années vécues avec des incapacités. À ce chapitre, on assiste à une perte suite à l'augmentation de la prévalence des incapacités dans la région. L'espérance de vie augmente pour les Montérégiens mais leur espérance de vie sans incapacité diminue surtout chez les femmes. Compte tenu du vieillissement de la population et de la féminisation du vieillissement, il est difficile d'imaginer une baisse de la prévalence de l'incapacité. L'enjeu consiste à ralentir le rythme de cette hausse et d'augmenter les moyens d'apporter plus de support à une population présentant de plus en plus d'incapacité compte tenu de son incidence sur la consommation des services et sur la qualité de vie des Montérégiennes.

Entre les sexes, l'excédent de mortalité en défaveur des hommes est préoccupant. On observe un ratio de 1,6 pour les décès par tumeurs, de 1,9 pour les maladies de l'appareil circulatoire, de 1,8 pour l'ensemble de la mortalité prématurée et de 4,2 pour les suicides. Outre les enjeux identifiés plus haut et liés à des problématiques ou des groupes démographiques particuliers, il existe un enjeu relatif aux disparités géographiques dans le sens d'une différence d'exposition à ces problématiques entre les populations des territoires de CLSC.

Pour tous les indicateurs utilisés, la valeur régionale n'est qu'une moyenne pondérée qui masque des différences souvent significatives entre quelques unes ou plusieurs des populations des territoires de CLSC et la région.

Les écarts sont, dans plusieurs cas, plus importants entre les valeurs de certains territoires de CLSC et celle de la région qu'entre cette dernière et la prévalence estimée pour certains groupes démographiques.

À titre d'exemple, les CLSC Longueuil-Est, du Havre et Longueuil-Ouest affichent pour plus de cinq indicateurs, des valeurs excédentaires par rapport à la valeur régionale. Au niveau spécifique des indicateurs de la mortalité, le territoire du CLSC Longueuil-Est présente le profil comparatif le moins reluisant.

Profil par grands groupes d'âge

Compte tenu de la disponibilité des données, du plan d'analyse et des méthodes de calcul des indicateurs présentés dans ce portrait, la plupart de ces indicateurs ne sont pas calculés sur la base de groupes d'âge très détaillés, tandis que certains indicateurs ne sont même pas ventilés par groupes d'âge.

De plus, les groupes d'âge calculés diffèrent souvent d'un indicateur à l'autre, ce qui rend les comparaisons entre les groupes d'âge ou entre les indicateurs par groupe d'âge incomplètes. Les faits saillants ici ne sont donc malheureusement pas tirés d'un tableau complet comparant tous les indicateurs pour les mêmes groupes d'âge détaillés.

Dans le but de ne retenir que les faits saillants les plus marquants, nous avons choisi de présenter ici, sur la base des indicateurs ventilés selon l'âge, seulement la valeur statistique la plus élevée qui pourrait se rencontrer dans un groupe d'âge en particulier.

Un groupe d'âge n'est mentionné que s'il affiche cette valeur maximale pour un indicateur donné.

Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, de l'ensemble des faits saillants qui pourraient se dégager d'un portrait de santé sur la base de 70 indicateurs ventilés chacun pour tous les groupes d'âge.

CHEZ LES JEUNES (MOINS DE 18 ANS)

Déterminants sociodémographiques et économiques

La **diminution entre 2001-2006 des effectifs de population** la plus importante de tous les groupes d'âge s'observe chez les 6-11 ans (18 %).

À l'intérieur des familles avec enfant de moins de 18 ans, en 1996, la proportion la plus élevée de **parents vivant en union libre** se retrouve chez les familles avec au moins un très jeune enfant soit de 0 à 5 ans (34 %).

La majorité des familles monoparentales se retrouvent surtout chez les familles avec le plus jeune enfant âgé entre 15 et 17 ans (23 %) en 1996.

Déterminants : comportements et facteurs de risque

La proportion la plus élevée de **naissances de faible poids** s'observe chez les mères de moins de 18 ans en 1996-1998 (9,3 %).

Le **taux de prise en charge** en 2000-2001 dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse est le plus élevé chez les 12-17 ans particulièrement pour les troubles de comportements (taux 7,6 pour 1 000).

Déterminants : services

Peu d'indicateurs calculés sur la base des groupes d'âge et aucun ne présente une valeur maximale chez les jeunes.

État de santé

L'**incidence** la plus élevée pour l'année 2000 est obtenue chez les 0-14 ans pour cinq des treize **maladies infectieuses**, soit dans l'ordre décroissant d'incidence; la coqueluche (taux de 49,8 pour 100 000), la giardiase, la salmonellose, l'infection à la bactérie *E. coli* et celle à méningocoque (taux de 1,2).

CHEZ LA POPULATION ADULTE (15-64 ANS OU 18-64 ANS SELON L'INDICATEUR)

Déterminants sociodémographiques et économiques

La proportion de la **diminution des effectifs de population** s'observe entre 2001 et 2006 surtout chez les 18-24 ans (9 %), au second rang de tous les groupes d'âge, après celle déjà rapportée chez les 6-11 ans.

La **fécondité** pour 1994-1998 est la plus élevée chez les mères de 25-29 ans (taux de 130 pour 1000 femmes).

L'union libre comme **statut matrimonial** est la plus répandue en 1996 chez les adultes de 15-44 ans (21 %) tandis que les couples actuellement mariés présentent la proportion la plus élevée, soit les deux tiers, chez les personnes de 45-64 ans. Les personnes séparées ou divorcées affichent, chez les 45-64 ans également les proportions les plus élevées (respectivement 3 % et 10 %).

Le taux de **bénéficiaires de l'assistance-emploi (aide sociale)** est le plus élevé en mars 2001 chez les 55-64 ans (8,3 %).

Déterminants : comportements et facteurs de risque

En 1998, la **perception des habitudes alimentaires** comme étant « moyenne ou mauvaise », ainsi que la consommation élevée d'alcool sur une base occasionnelle et la consommation de drogues à vie, sont les plus élevés chez les 15-24 ans.

En 1998, la proportion de **fumeurs actuels** est la plus importante chez les 25-44 ans (38 %).

En 1998, l'**excès de poids, la consommation élevée d'alcool sur sept jours et l'absence de confident** sont des phénomènes plus répandus chez les 45-64 ans (respectivement 36 %, 11 % et 13 %).

Les **naissances prématurées et le retard de croissance intra-utérine** pour 1996-1998 s'observent davantage chez les mères de moins de 20 ans (taux respectifs de 9 % et 13 %).

Déterminants : services

En 1998, les personnes de 45-64 ans sont les plus nombreuses à **ne pas connaître le service INFO-SANTÉ CLSC** (34 %). Elles affichent également le taux le plus élevé de tous les groupes d'âge quant à l'insatisfaction relative aux services de santé offerts dans la région (28 %).

Les mères de 35 ans et plus sont celles qui présentent le taux de **césarienne** le plus élevé des mères de tous âges (25 %) en 1997-1999.

État de santé

En 1998, la **perception de son état de santé mentale comme étant « moyenne ou mauvaise »** affiche la proportion la plus élevée chez les 15-24 ans (12 %).

En 2000, les taux de **maladies infectieuses à déclaration obligatoire** les plus élevés de tous les groupes d'âge pour la chlamydie, la campylobacter et l'infection gonococcique se rencontrent chez les 15-29 ans. Les maladies telles que l'hépatite C et le sida sont plus répandues chez les 30-39 ans et l'hépatite B aiguë chez les 40-59 ans.

En 1996-1998, les taux de **suicide**, chez les 25-34 ans et chez les 45-54 ans, sont les deux taux les plus élevés (ex æquo à 21 pour 100 000) de tous les groupes d'âge.

En 1998, l'**insatisfaction face à la vie sociale** est la plus élevée chez les 45-64 ans (14 %).

CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES (60 ANS ET PLUS OU 65 ANS ET PLUS SELON L'INDICATEUR)

Déterminants sociodémographiques et économiques

Au recensement de 1996, les proportions de personnes **sous scolarisées** (53 %), vivant sous le seuil de **faible revenu** (23 %) ou **parlant une autre langue que le français à la maison** (15 %), sont les plus élevées de tous les groupes d'âge chez les 65 ans et plus.

Chez les groupes d'âge dépassant 75 ans et plus on retrouve la valeur la plus élevée de **personnes vivant seules** (36%), tandis que les 85 ans et plus affichent la valeur la plus faible quant aux **personnes vivant en ménages privés** (56 %).

Déterminants : comportements et facteurs de risque

En 1998, le seul comportement à risque où les personnes de 65 ans et plus affichent la proportion la plus élevée des groupes d'âge est celui qui consiste à **pratiquer une activité physique de loisir moins d'une fois par semaine** (55 %).

Déterminants : services

En 1996, la proportion de personnes **vivant en institution de santé** est, comme prévu, évidemment la plus élevée chez les personnes de 85 ans et plus, soit 39 %.

État de santé

En 1998, la proportion de personnes qui **qualifient leur état général de santé de « moyenne ou mauvaise »** est la plus élevée chez les personnes de 65 ans et plus (21 %).

En 2000, au niveau des **maladies infectieuses à déclaration obligatoire**, les personnes de 60 ans et plus affichent les taux les plus élevés de tous les groupes d'âge pour les infections à streptocoque pneumoniae (20 pour 100 000) et la tuberculose (7 pour 100 000).

Finalement, les **taux spécifiques d'hospitalisation, d'incidence des nouveaux cas de cancer et de mortalité** grimpent de façon exponentielle avec l'âge.

Pour les **hospitalisations** en soins physiques de courte durée, le taux brut annuel pour 1998-1999 pour tous les groupes d'âge est de 836 pour 10 000. Mais, il est de 1 819 chez les 65-69 ans et atteint son maximum à 4 093, chez les 85-89 ans (données non présentées).

Pour l'**incidence des nouveaux cas de cancer**, le taux brut pour le total de la population est de 382 pour 100 000, pour la période 1996-1998, mais il atteint 1 604 chez les 65-69 ans et son maximum de 2 334, chez les 85-89 ans (données non présentées).

Finalement, en ce qui a trait au **taux de mortalité**, pour la période 1996-1998, le taux total est de 596 pour 100 000, mais il dépasse 2 600 chez les 65-69 ans et atteint son maximum à près de 22 000, chez les 90 ans et plus (données non présentées).

Profil par sexe

Dans le cadre du présent portrait, un peu plus du tiers seulement des soixante-dix indicateurs ont été calculés sur la base des sexes, il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un tableau complet des faits saillants par sexe pour les 70 indicateurs.

Dans les faits saillants qui suivent, nous allons simplement mettre en évidence le sexe qui présente une valeur considérée « défavorable » par rapport à l'autre sexe. La plupart des comparaisons n'ont pas fait l'objet de tests de différence au plan statistique.

Dans le contexte limité des indicateurs retenus et calculés sur la base des sexes, les femmes affichent un bilan plus défavorable en ce qui a trait aux déterminants sociodémographiques et socioéconomiques tandis que les bilans des comportements et facteurs de risque ainsi que de l'état de santé s'avèrent plus défavorables aux hommes.

DÉTERMINANTS

Déterminants sociodémographiques et économiques

Pour l'ensemble des indicateurs sociodémographiques et économiques pour lesquels des valeurs ont été calculées sur la base des sexes, le bilan s'avère plus défavorable aux femmes, bien qu'un examen plus détaillé des données, sur la base des divers groupes d'âge lorsque disponible à l'intérieur des sexes, vient nuancer ce bilan global.

Pour l'ensemble de la population, le nombre d'hommes est presque équivalent à celui des femmes avec un **rapport de masculinité** de 99 hommes pour 100 femmes estimé en 2001.

Ce rapport, légèrement favorable aux hommes plus jeunes (105 chez les 0-14 ans) leur devient fortement défavorable après 65 ans, où il chute à 74 en 2001, en légère hausse de 2 % par rapport à 1996 où il était de 72.

Chez les femmes, la proportion de **personnes vivant seules** dépasse celle des hommes autant lors du recensement de 1991 que de celui de 1996 où les valeurs sont respectivement de 10 % et de 12 %, bien que la hausse entre les deux années soit de même ampleur chez les deux sexes.

Les **taux d'emploi et de chômage** présentent des valeurs défavorables aux femmes surtout pour les groupes d'âge supérieurs aux 15-24 ans. Les taux d'emploi respectifs pour les femmes et les hommes sont de 52 % et 67 % et les valeurs pour le chômage sont de 9,5 % et de 9,1 %, lors du recensement de mai 1996.

Les proportions de femmes **vivant sous le seuil de faible revenu** sont supérieures à celles des hommes pour 1990 (16,5 % c. 12,9 %) comme pour 1995 (19,5 % c. 16,4 %) bien que l'écart du seuil de faible revenu entre les sexes ait été réduit entre ces deux recensements.

L'écart le plus élevé se retrouve chez les personnes de 65 ans et plus, tandis que chez les jeunes de moins de 18 ans, au contraire ce sont les garçons qui présentent une proportion supérieure à celle estimée pour les filles.

Chez les adultes de 18-64 ans, on rencontre une proportion légèrement supérieure de femmes **bénéficiaires de l'assistance-emploi en mars 2001** (6,6 % c. 5,8 %).

Il en est de même pour celles qui affichent une **durée cumulée de dix ans ou plus comme bénéficiaires de l'assistance-emploi** pour la mars 2001 où les proportions respectives pour les femmes et les hommes sont de 50 % c. 46 %.

Déterminants : comportements et facteurs de risque

En ce qui a trait aux indicateurs de comportements et aux facteurs de risque disponibles sur la base des sexes, le bilan est défavorable aux hommes dans la majorité des cas.

Les **habitudes alimentaires qualifiées de « moyennes ou mauvaises »** sont davantage déclarées par les hommes que par les femmes (14,8 % c. 12,7 %) en 1998.

La **consommation élevée d'alcool** tant sur une base plus régulière de sept jours que sur une base occasionnelle est significativement plus élevée chez les hommes; en 1998, les valeurs respectives sont, pour la consommation sur sept jours, de 13 % c. 4 % et pour la consommation occasionnelle de 34 % c. 12 %.

L'**excès de poids** présente une prévalence supérieure chez les hommes bien que l'augmentation entre les enquêtes de 1987, 1992-1993 et 1998 soit plus rapide chez les femmes. En 1998, 33 % des hommes affichent un excès de poids contre 24 % chez les femmes.

En 2000-2001, les taux de **cas signalés et retenus dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse** et où la sécurité et le développement sont compromis chez les jeunes de 0-17 ans sont légèrement plus élevés chez les garçons en comparaison avec les filles.

La **consommation de drogues à vie** prévaut davantage chez les hommes que chez les femmes avec, en 1998, des proportions respectives de 36 % et 29 %.

En 1998, l'**absence de confident** est un phénomène davantage répandu chez les hommes que chez les femmes avec des valeurs respectives de 15 % et de 8 %.

Au printemps 2000, la **présence d'un élément parmi les trois de l'indice d'insécurité alimentaire** se rencontre presque autant chez les femmes que chez les hommes (7,5 % c. 7,0 %).

Pour les deux habitudes de vie suivantes, le profil est soit davantage mitigé entre les sexes ou en défaveur des femmes.

La proportion de femmes qui **pratiquent une activité physique de loisir moins d'une fois par semaine** dépasse celle des hommes en 1998 affichant 51 % c. 47 %.

En 1998, les proportions de **fumeurs actuels** sont presque identiques pour les deux sexes, soit 32,8 % c. 33,5 % respectivement chez les femmes et chez les hommes. Chez les fumeurs réguliers les valeurs sont aussi voisines, mais cette fois légèrement en défaveur des femmes (30,3 % c. 29,7 %).

Déterminants : services

En 1996, la proportion des **personnes de 65 ans et plus vivant en institution de santé** est supérieure chez les femmes (10 % c. 5 %). En 1998, la proportion de personnes de 15 ans et plus ne connaissant pas le service INFO-SANTÉ CLSC est plus élevée chez les hommes (33 % c. 21 %).

En 1998, l'**insatisfaction face aux services de santé** est légèrement plus élevée chez les hommes (26 % c. 23 %).

État de santé

En ce qui a trait aux indicateurs disponibles sur la base des sexes pour tracer le bilan de l'état de santé, on observe que ce dernier est légèrement plus défavorable pour les hommes, ceci en continuité avec leur profil désavantageux du point de vue des facteurs de risque.

La **proportion de personnes de 15 ans et plus percevant leur santé comme « moyenne ou mauvaise »** est légèrement plus élevée chez les femmes en 1998 (9,5 % c. 8,3 %), bien que depuis 1987 l'écart entre les sexes tend à diminuer.

Il en est de même de la **santé mentale perçue** en 1998 (9 % c. 6 %).

L'**insatisfaction face à la vie sociale** présente des valeurs supérieures chez les femmes pour toutes les trois enquêtes considérées. En 1998, les valeurs respectives sont de 14 % c. 11 %.

Les **taux d'hospitalisations en soins physiques de courte durée** pour la période 1995-1999 sont plus élevés chez les femmes lorsque l'on considère l'ensemble des causes (968 c. 759 pour 10 000). Parmi les causes principales, les taux sont cependant supérieurs chez les hommes pour les appareils circulatoires, respiratoires, digestifs et pour les traumatismes.

Les **taux d'incidence du cancer** sont toujours supérieurs chez les hommes (447 c. 341 pour 100 000 en 1994-1998).

Par contre, parmi les principaux sièges retenus, l'augmentation de l'**incidence du cancer du poumon** affiche la valeur la plus marquée chez les femmes soit 50 % entre 1984-1988 et 1994-1998.

Le **taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire** est plus élevé chez les femmes en 2000 (238 c. 185 pour 100 000), ceci exclusivement à cause des maladies transmises sexuellement.

L'**incapacité de long terme** telle que déclarée à l'occasion des recensements de 1991 et de 1996 présentent des proportions équivalentes entre les sexes (6,5 % chez les femmes c. 6,3 %).

L'**espérance de vie à la naissance** favorise les femmes et ceci pour toutes les périodes depuis 1981-1983 à 1996-1998, affichant une valeur de 81,2 ans c. 75,6 ans pour 1996-1998.

L'**espérance de vie en bonne santé** favorise également les femmes mais à un degré nettement moindre que ce n'est le cas pour l'espérance de vie à la naissance compte tenu de l'impact plus élevé des incapacités chez ces dernières : pour 1998, les valeurs respectives sont de 67,6 ans c. 65,5 ans.

Les **taux bruts de mortalité** sont supérieurs chez les hommes (670 c. 594 pour 100 000 1994-1998) et ceci pour toutes les causes principales retenues particulièrement pour le suicide et pour les maladies de l'appareil respiratoire.

La **mortalité associée au tabagisme** est quatre fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes pour 1996-1998 (129 c. 31 pour 100 000), bien que l'écart se soit considérablement réduit depuis 1981-1983 en défaveur des femmes, l'écart était alors de sept fois entre les sexes.

Les **années de vie perdues prématurément** présentent également des valeurs défavorables aux hommes (taux de 6 566 c 3 693 pour 100 000 pour 1996-1998) et plus particulièrement dans le cas des traumatismes non intentionnels.

Profil évolutif

Pour près des deux tiers des indicateurs, les données étaient disponibles sur une base chronologique et les changements observés pouvaient être qualifiés soit en termes d'amélioration soit en termes de détérioration. Voici une liste des faits saillants sous la forme d'un tableau.

RÉPARTITION DES INDICATEURS SELON LE TYPE D'ÉVOLUTION*

DOMAINES	INDICATEURS	
	AMÉLIORATIONS **	DÉTÉRIORATIONS **
DÉTERMINANTS		
Sociodémo- graphique et économiques	■ Croissance de la population ■ Chômage ■ Assistance-emploi (<i>aide sociale</i>) ■ Sous-scolarisation	■ Vieillesse ■ Fécondité ■ Parents (<i>union libre / parents seuls</i>) ■ Personnes vivant seules ■ Sous le seuil de faible revenu ■ Durée cumulée d'assistance-emploi (<i>10 ans et +</i>) ■ Taux d'emploi
Comportements et facteurs de risque	■ Naissances de faible poids ■ Retard de croissance intra-utérine ■ Mères sous scolarisées ■ Absence de confident	■ Naissances prématurées ■ Sédentaires ■ Excès de poids ■ Alcool : 14 consommations et plus (<i>sur 7 jours</i>) ■ Alcool : 5 consommations et plus (<i>en une même occasion : 5 fois et + sur 12 mois</i>) ■ Insatisfaction quant à la vie sociale

DOMAINES	INDICATEURS	
	AMÉLIORATIONS **	DÉTÉRIORATIONS **
Services	■ Dépendance de la population (<i>hospitalisation</i>) ■ Taux d'occupation des lits (<i>courte durée</i>) ■ Interventions pertinentes ■ Mortalité évitable ■ par les soins ■ par la prévention ■ Mammographie (<i>femmes 50-69 ans</i>)	■ Séjours excessifs à l'urgence (<i>24 / 48 hres</i>) ■ Hospitalisations évitables
État de santé	■ Santé perçue (<i>moyenne / mauvaise</i>) ■ Maladies infectieuses ■ Hospitalisations totales (<i>courte durée</i>) ■ Hospitalisations ■ traumatismes non intentionnels ■ Mortalité infantile ■ Mortalité générale ■ maladies cardiovasculaires ■ tumeurs ■ traumatismes non intentionnels ■ Années de vie perdues (<i>prématurément</i>) ■ Espérance de vie	■ Mortalité liée au tabagisme ■ Espérance de vie en bonne santé

* Ce tableau est construit à partir des données présentées dans les éléments graphiques no 1 des fiches pour les indicateurs pertinents.

** La majorité des comparaisons dans le temps n'ont pas fait l'objet de tests statistiques, sont confondues ici les différences significatives au plan statistique et celles qui manifestent de simples tendances.

NOTE : Le lecteur est prié de se référer aux « Fiches par indicateurs » de la partie 3 pour les populations et les périodes concernées.

2.2 Profil par territoire de CLSC

Introduction

On se rappellera que les objectifs généraux du présent portrait consistent à présenter les principales caractéristiques sociosanitaires de la population de la Montérégie et indirectement à supporter les citoyens et les partenaires qui s'intéressent aux questions de santé et de bien-être dans la région.

Dans le but d'atteindre ces deux objectifs, ce portrait est conçu et organisé en fonction d'un devis précis de recherche.

Le devis d'analyse procède par niveaux successifs de détails et, par les choix qu'il opère, a un impact direct sur le type et la portée des portraits que l'on peut en extraire au niveau des territoires infra régionaux plus restreints comme ceux des CLSC.

Rappelons les éléments essentiels du plan d'analyse. Dans un premier niveau, les données sont fondamentalement compilées et organisées autour de 70 indicateurs sociosanitaires. Ces derniers sont conçus comme autant de représentations de la réalité sociosanitaire de la région. En ce sens, ils constituent le relais privilégié entre les données statistiques et la réalité des déterminants et de l'état de santé des montérégiens.

L'accès aux données requises pour calculer chaque indicateur se fait majoritairement via une seule et même source de données. Au plan pratique, ceci permet de mettre en place un processus de production de statis-

tiques pour le portrait fichier par fichier en tenant compte des caractéristiques techniques particulières à chacun d'entre eux.

Le second niveau de détails vise davantage à rejoindre le second objectif du portrait, à savoir mettre à la disposition des décideurs, des intervenants et des citoyens des données correspondant à leurs besoins. Il consiste, pour presque tous les indicateurs, à reprendre les calculs à un niveau de détail géographique plus fin se rapprochant du lieu de résidence ou de décision des utilisateurs éventuels et ceci pour chacun des indicateurs.

Le niveau pertinent du point de vue des décideurs, des intervenants et des citoyens pour lequel les données sont à la fois disponibles facilement et dont le nombre de personnes est suffisamment élevé correspond dans les faits aux dix-neuf territoires de CLSC de la région.

Un troisième niveau de détails, valable autant pour la région qu'à l'intérieur de chaque territoire de CLSC, permet de regrouper les données selon les grandes catégories démographiques désignant de façon minimale les clientèles cibles (le sexe ou l'âge) ou selon les catégories propres aux indicateurs qui aident à préciser soit les problèmes ou les clientèles cibles (par exemple les principales causes spécifiques de décès pour les taux de mortalité selon la cause ou les principaux sièges pour les cancers ou les catégories « occasionnels » ou « réguliers » de fumeurs pour les fumeurs actuels etc.).

La décision de ventiler ou non les données sur la base de ce troisième niveau de détail se fonde d'abord sur la pertinence et l'importance de tenir compte des sous-catégories pour un indicateur donné en termes de valeur ajoutée quant à l'information supplémentaire relative aux caractéristiques de la population. Elle se prend évidemment aussi sur la base d'une double contrainte technique soit la disponibilité de la donnée et la présence d'un nombre suffisant d'événements ou de personnes qui s'y réfèrent.

Chacune des 70 fiches d'indicateurs reproduites à la section 3 du document présente les données pour quelques uns ou pour tous ces niveaux de détails en conformité avec le plan d'analyse décrit précédemment.

Portée et limites

Les fiches d'indicateurs constituent donc à la fois le principal résultat de l'application du devis de recherche, l'élément central du portrait et présentent les données les plus détaillées et les plus précises sur les caractéristiques de la population.

En ce qui a trait à la donnée sur la base du territoire de CLSC, la fiche d'indicateur de la section 3 fournit, pour la période la plus récente, souvent non seulement des ventilations supplémentaires pour les catégories de l'indicateur lui-même ou pour certains groupes démographiques mais aussi des données chronologiques permettant de calculer dans plusieurs cas l'ampleur des variations dans le temps. Toutes ces données se retrouvent dans un tableau détaillé, la plupart du temps, correspondant à l'élément 4 de la fiche.

Idéalement on pourrait viser à tracer un profil descriptif assez complet pour chacun des territoires de CLSC à partir de ces fiches en examinant les valeurs du total et des sous-catégories pour chaque indicateur figurant dans ce quatrième élément des fiches d'indicateurs et en détaillant et en réorganisant ces données sur la base des sexes ou des divers groupes d'âge à l'intérieur de chaque territoire.

Ce portrait pourrait être complété par un profil évolutif de chaque indicateur pour chaque territoire dans le but de tracer un bilan spécifique en termes d'améliorations ou de détériorations et qualifier ce dernier en termes de points forts et de points faibles autant au niveau des indicateurs, des âges que des sexes.

De tels portraits approfondis par territoire de CLSC ne manquent pas d'intérêt bien au contraire.

Malheureusement, notre plan d'analyse, conçu d'un point de vue plus global et situé davantage au niveau régional nous interdit de tracer des portraits à la fois aussi complets et comparables de chaque territoire ceci dû principalement au fait que nous n'avons pas appliqué pour tous les indicateurs et tous les territoires de CLSC tous les niveaux de détails permettant une telle ventilation et un tel approfondissement des analyses.

En effet, comme résultat de notre plan d'analyse, quelques-uns seulement des indicateurs sont ventilés par sous-catégories, d'autres le sont par sexe tandis que d'autres enfin le sont par groupes d'âge ou par période. On ne pourrait donc détailler, pour certains groupes d'âges, que certains des indicateurs, pour les sexes d'autres indicateurs, pour l'évolution dans le temps d'autres encore etc.

Et même si on avait adopté un plan d'analyse permettant de nous assurer de tracer de tels portraits, des contraintes techniques simples comme la présence de nombres insuffisants pour plusieurs indicateurs ou l'ampleur trop importante des travaux compte tenu des ressources disponibles auraient empêché de mener à bien de telles compilations.

Malgré ses limites, on peut tirer profit de notre portrait régional dans le but de réorganiser les données sur la base non pas des indicateurs mais des territoires de CLSC puisque pour la plupart des 70 indicateurs et pour tous les territoires de CLSC la valeur globale de chaque indicateur pour la période la plus récente est disponible.

Étape d'élaboration du profil comparatif des CLSC

En présentant simplement côte à côte dans un même tableau chacune de ces valeurs on dit très peu sur le profil descriptif d'un CLSC mais on organise les données pour rendre possible un portrait «comparatif» nous permettant de préciser la position « relative » d'un territoire par rapport aux autres CLSC ou à la région.

C'est en se basant sur cette approche particulière, limitée par rapport au scénario idéal évoqué plus haut, que nous avons construit le profil des territoires de CLSC.

Dans les pages qui suivent nous tracerons donc un profil à caractère « comparatif » des territoires en privilégiant la valeur totale la plus récente de l'indicateur et la position qui en découle par rapport aux autres territoires et à la région dans son ensemble.

Le lecteur se rappellera qu'il s'agit d'un type de profil parmi plusieurs, ce profil étant loin à la fois d'épuiser toutes les données calculées sur la base des territoires de CLSC contenues dans le document et loin de constituer un profil descriptif complet et détaillé de chacun de ces territoires.

Résumons succinctement les trois étapes de la démarche préparatoire à la formulation des faits saillants sous la forme du diagramme suivant :

Diagramme des étapes pour élaborer le profil comparatif des CLSC

PRÉREQUIS

Fiches par indicateurs (partie 3)

(le plus souvent l'élément 3)

Pour chacun des indicateurs, chaque territoire de CLSC affiche une valeur exacte (taux, %, etc.) pour la période la plus récente.

Ces valeurs exactes sont comparées avec celle de la région présentées et triées du plus défavorable au plus favorable par rapport à la région.



ÉTAPE 1

Tableau synthèse des indicateurs (partie 2.2)

Ces valeurs exactes sont transformées en rangs (de 1 à 20 incluant la région) allant du plus favorable au plus défavorable.



ÉTAPE 2

Tableau synthèse des positions relatives (partie 2.2)

Partage des rangs entre deux grandes catégories selon leur position par rapport à la région : favorables / défavorables.

- Position pour chacun des trois types de déterminants et pour l'état de santé
 - Pour chaque territoire de CLSC

Somme des rangs favorables / défavorables pour les indicateurs de chacun des trois types de déterminants et de l'état de santé et attribution d'un nouveau rang* correspondant au nombre des rangs « favorables » (le territoire au premier rang = le territoire avec le plus grand nombre d'indicateurs affichant un rang favorable).
- Position pour l'ensemble des 60 indicateurs
 - Pour chaque territoire de CLSC

Somme des rangs favorables / défavorables pour l'ensemble des 60 indicateurs retenus, indépendamment de son appartenance au déterminant et à l'état de santé, et attribution d'un nouveau rang correspondant au nombre des rangs « favorables ».

(le territoire au premier rang = le territoire avec le plus grand nombre d'indicateurs affichant un rang favorable)

(graphique synthèse sous forme de thermomètres) (p. 48)



ÉTAPE 3

Faits saillants (partie 2.2)

Faits saillants comparatifs par territoires de CLSC sur la base de la position relative occupée par ce territoire pour chacun des trois types de déterminants et pour l'état de santé ainsi que pour l'ensemble des 60 indicateurs retenus.

* Plusieurs rangs peuvent être *ex aequo*.

L'approche illustrée a l'avantage de permettre de statuer rapidement sur la position « relative » occupée par un territoire donné par rapport aux autres territoires de la région.

Comme toutes les méthodes, elle présente aussi certaines limites. Les principales limites sont les suivantes :

- 1^{re} l'utilisation des rangs pour ordonner les territoires, comme nous le faisons ici, s'avère une méthode moins précise que l'utilisation des scores exacts (taux, proportions...) caractérisant ces territoires et figurant dans l'élément 3 des fiches;
- 2^e la qualification des rangs des territoires de CLSC par rapport à la région à l'aide des étiquettes favorables / défavorables indépendamment du fait que l'indicateur considéré ait fait l'objet ou non de tests de différence statistique par rapport à la région;
- 3^e le fait qu'une position similaire pour deux territoires peut correspondre à des indicateurs de nature et de portée différente du point de vue sociosanitaire;
- 4^e le fait que selon le choix de l'unité de mesure (par exemple les taux ou les proportions plutôt que les nombres) certains territoires, huit d'entre eux en fait, peuvent passer de la famille des territoires dits « favorables » à celle des territoires dits « défavorables » ou l'inverse.

Selon le contexte de la décision à prendre, il peut être avisé d'alterner entre les deux classements soit celui effectué à l'aide des taux ou proportions ou celui utilisant les nombres, de tenir compte des deux en même temps ou de privilégier l'un par rapport à l'autre, mais aucun des deux ne constitue le seul classement en toutes circonstances.


Pour cette raison, les deux graphiques synthèses suivants présentent pour l'ensemble des soixante indicateurs retenus une mise en ordre des territoires allant du plus « favorisé » au plus « défavorisé ». Le résultat s'avère différent pour une douzaine de territoires selon qu'on utilise les taux ou les proportions d'une part ou les nombres de personnes estimées pour cet indicateur dans la population du territoire d'autre part.

Dans les graphiques synthèses nous avons opté pour des positions basées sur les rangs plutôt que de se fonder sur des scores d'excédents ou de déficits dont nous n'avons pas exploré les propriétés statistiques et qui auraient pu donner une fausse impression de précision. Pour des fins strictement exploratoires, nous avons malgré tout effectué des calculs dans le but de transformer tous les scores exacts des 60 indicateurs pour chaque CLSC en autant d'indices comparatifs par rapport à la région en rapportant le score du CLSC sur celui de la région et en le transformant en pourcentage supérieur (excédent) ou inférieur à celui de la région et avons calculé un score synthèse nous permettant de reclasser les 19 territoires à partir de ces indices.


Dans l'ensemble, le classement selon le degré de défavorisation est assez consistant entre les deux approches pour une corrélation des rangs de 93 %.

Malgré ce résultat général très satisfaisant quatre territoires particuliers modifient de façon plus substantielle leur position : les CLSC Champagnat de la Vallée des Forts et de la Haute-Yamaska améliorent leur position en passant respectivement de la 12^e et de la 14^e position à la 9^e et à la 10^e position tandis que les CLSC Longueuil-Ouest et Jardin du Québec voient leur position se détériorer en passant respectivement du 15^e au 19^e et dernier rang et du 9^e au 13^e rang.


Graphique synthèse des positions des 19 territoires de CLSC
selon les proportions et les taux correspondant à l'indicateur



Graphique synthèse des positions des 19 territoires de CLSC
selon le nombre de personnes correspondant à l'indicateur



CLSC LA PRESQU'ÎLE



CLSC La Presqu'Île

Le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC La Presqu'Île occupe le troisième rang parmi les quatorze rangs attribués, *ex æquo* avec celui de Samuel-de-Champlain. Quarante-six des soixante indicateurs retenus pour tracer le portrait occupent une position favorable par rapport à la région. Le classement est obtenu grâce aux positions favorables obtenues pour les déterminants sociodémographiques et économiques mais aussi pour les services, les indicateurs de l'état de santé, les comportements et facteurs de risque.

Les rangs respectifs occupés pour chacun de ces aspects sont le deuxième (*ex æquo* avec le CLSC des Seigneuries) sur treize rangs attribués pour les déterminants sociodémographiques et économiques, le troisième (*ex æquo* avec plusieurs autres) sur dix pour les services, le quatrième sur douze pour l'état de santé, ainsi que le quatrième (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur dix pour les facteurs de risque.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 104 620 personnes, ce qui lui confère le 3^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Il occupe le second rang pour le taux de croissance projeté entre 2001-2006 de 6,4 %.

Sa population est plus jeune que celle de la région en 2001. Son âge médian est de 38,3 ans lui conférant le 4^e rang.

C'est donc d'abord par rapport aux indicateurs **sociodémographiques et économiques** que le territoire occupe une position favorable par rapport à la région et ceci, pour 14 des 15 indicateurs clés de ce domaine. Notons, par exemple, le taux d'accroissement de sa population et la proportion de personnes qui sont bénéficiaires de l'assistance-emploi, les proportions de personnes en chômage ou sous le seuil de faible revenu.

Le territoire se situe également, bien qu'à un degré moindre, dans les rangs favorables pour 9 des 14 indicateurs de **comportements et facteurs de risque**, soit par exemple : la pratique de l'activité physique de loisir, la qualité perçue des habitudes alimentaires, la prévalence de la sous-scolarisation des mères, le taux de prise en charge des jeunes dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse, etc.

Finalement, le profil du territoire en termes des déterminants liés aux **services**, bien que favorable, est plus mitigé puisque seulement six des dix indicateurs retenus ici témoignent d'une position favorable par rapport à la valeur régionale. Le territoire performe bien, entre autres, en ce qui a trait aux hospitalisations et aux décès évitables par un accès adéquat aux services de première ligne ou pour lesquels des soins appropriés, connus et efficaces existent.

État de santé

Le bilan plutôt positif des déterminants trouve son écho au niveau de l'état de santé de la population du territoire du CLSC La Presqu'Île.

Parmi les 21 indicateurs retenus pour décrire l'**état de santé**, le territoire occupe une position favorable dans 17 cas, ce qui lui confère un 4^e rang en termes de bilan de santé sur les 12 attribués.

Certains indicateurs favorables méritent d'être mis en lumière : les taux ajustés d'hospitalisations de courte durée pour l'ensemble des causes et pour les traumatismes en particulier, le taux de maladies infectieuses à déclaration obligatoire, la proportion de personnes percevant leur état général de santé comme « moyenne ou mauvaise », l'incidence des cancers, l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie en bonne santé.

Positions relatives du CLSC La Presqu'île par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
Saint-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
Saint-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :


Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
Saint-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC La Presqu'île occupe globalement le 3^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC LA PRESOU'ÎLE

Indicateurs

Défavorable ← Favorable

[illegible]

* Calculs effectués sur la base des GLSC officiels

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		La Presqu'île	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	6,4	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 1,0	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	6,0	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	1,4	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	104 620	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	20,8	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	69,5	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	9,8	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	7,4	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	9,4	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	7,8	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	24,6	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	8,6	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	32,3	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	24,8	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	65,6	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	5,8	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	3,1	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	0,9	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	44,0	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	29,9	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	14,0	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	46,9	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	38,3	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	100	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,84	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	22,3	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	50,4	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	16,1	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,7	1,9	2,0
	■ Divorcés %	4,8	5,7	5,8
	■ Veufs %	4,7	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	66,1	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	19,8	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	14,4	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	11,7	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	8,3	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	12,5	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	17,1	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	8,9	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	8,8	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	9,1	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	6,9	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	19,4	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	35,9	35,8	38,7

			La Presqu'Île	Montérégie	Ensemble du Québec	
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)				
		Total (65 ans et plus) %	93,1	90,5	89,4	
		■ Hommes (65 ans et plus) %	95,4	93,7	92,9	
		■ Femmes (65 ans et plus) %	90,5	88,4	87,0	
		■ 65-74 ans %	98,0	96,7	96,1	
		■ 75-84 ans %	88,8	87,3	85,4	
		■ 85 ans et plus %	69,7	56,3	57,6	
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)				
		■ Français %	75,7	88,2	83,7	
		■ Anglais %	23,4	9,4	10,3	
		■ Autres langues %	0,9	2,5	6,0	
10.	12.	Immigrant (1996) %	6,1	6,0	9,3	
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)				
		■ Moins d'une 9 ^e année %	13,0	16,3	18,1	
		■ 9 ^e -13 ^e année %	40,2	41,4	39,4	
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	35,6	31,4	30,3	
		■ Grade universitaire %	11,2	10,8	12,2	
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	64,3	(+)	59,6	55,0
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	7,3	(-)	9,3	11,8
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)				
		Total %	13,2	(-)	18,0	23,4
		■ Hommes %	12,4	(-)	16,4	21,6
		■ Femmes %	13,9	(-)	19,5	25,1
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)				
		■ Propriétaires %	16,4	15,3	16,3	
		■ Locataires %	38,2	40,4	42,3	
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	3,0	6,3	n.c.	
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)				
		■ Moins de 2 ans %	12,7	11,9	13,6	
		■ 2-3 ans %	11,1	10,3	10,4	
		■ 4-9 ans %	30,7	29,7	28,7	
		■ 10 ans et plus %	45,5	48,1	47,3	
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	14,0	(>)	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	16,1		18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)				
		■ 3 fois et plus par semaine %	36,9	(+)	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	32,9		31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	30,2	(<)	35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	34,9		30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 2,8		3,8	n.c.
		■ Réguliers %	32,1	(>)	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	* 6,1		5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)				
		■ Cinq fois et plus %	17,3		15,8	n.c.
		■ Jamais %	24,7		21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	58,0		62,6	n.c.

			La Presqu'île	Montréal	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	9,2	(-)	12,3
		■ 11 ans %	12,0		11,5
		■ 12-13 ans %	26,3		27,5
		■ 14-15 ans %	24,5		22,7
		■ 16 ans et plus %	28,0		26,0
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	* 0,7	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	5,6	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	6,8	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	8,2	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	25,6	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	13,2	16,1	n.c.
		■ Obésité %	12,4	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	3,2	(-)	4,5
		■ Garçons (0-17 ans) %	3,2	(-)	4,9
		■ Filles (0-17 ans) %	3,3		4,2
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	21,4	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 10,1	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 7,8	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	6,2	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	3,5	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	8,2	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	1,5	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	8,8	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	35,3	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	73,7	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	85,8	(-)	96,3

			La Presqu'île	Montréal	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	15,4	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	39,6 (-)	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	46,3	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	76,9	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	23,1	22,4	n.c.
42a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	2 425	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	36,6 (-)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	16,6	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	13,7	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	19,4	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	7,6	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	26,1 (>>)	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	119,1	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	11,6	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	10,1	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	1,5	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 6,9	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	771,1	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	71,3	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	119,6	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	72,8	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	87,9	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	58,3	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	50,6	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	49,3 (-)	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	3,9	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	21,4	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	96	100	n.c.
		■ Estomac.....	85	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	93	100	n.c.
		■ Pancréas.....	114	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	95	100	n.c.
		■ Prostate.....	99	100	n.c.
		■ Poumon.....	102	100	n.c.
		■ Vessie.....	93	100	n.c.

			La Presqu'île	Montérégie	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		<i>Ensemble des principales maladies</i>	114,8	(-)	197,8
		■ Chlamydirose.....	38,4	(-)	69,8
		■ Hépatite C.....	* 12,6		19,8
		■ Infection à campylobacter.....	* 11,4	(-)	36,3
		■ Coqueluche.....	* 17,8		22,6
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		<i>Total %</i>	5,8		6,4
		■ Hommes %.....	6,1		6,3
		■ Femmes %.....	5,4		6,5
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....	78,4		78,3
		■ Hommes.....	75,8		75,3
		■ Femmes.....	81,1		81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....	71,5		71,2
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		<i>Total (taux brut)</i>	559,4	(-)	632,0
		■ 0-4 ans.....	** 87,7		94,0
		■ 5-14 ans.....	** 10,0		14,0
		■ 15-24 ans.....	** 75,9		57,0
		■ 25-44 ans.....	* 75,2		98,0
		■ 45-64 ans.....	500,1		507,0
		■ 65-74 ans.....	2 393,7		2377,0
		■ 75 ans et plus.....	7 923,2		8111,0
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 4,2		4,4
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 2,4		2,3
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 1,2		0,8
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 0,6		1,3
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 6,2		6,3
		Taux de mortinatalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 3,9		4,0
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes</i>	98		100
		■ Tumeurs.....	102		100
		■ Appareil circulatoire.....	97		100
		■ Appareil respiratoire.....	90		100
		■ Appareil digestif.....	88		100
		■ Traumatismes non intentionnels.....	91		100
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de tumeurs</i>	102		100
		■ Estomac.....	113		100
		■ Côlon et rectum.....	79		100
		■ Pancréas.....	113		100
		■ Poumon.....	99		100
		■ Sein chez la femme.....	105		100
		■ Prostate.....	144		100
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de l'appareil circulatoire</i>	97		100
		■ Maladies hypertensives.....	101		100
		■ Cardiopathies ischémiques.....	95		100
		■ Insuffisance cardiaque.....	99		100
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....	100		100
		■ Maladies des artères.....	107		100

			La Presqu'île	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	90	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	90	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	87	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	91	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	110	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	81	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	* 118	100	n.c.
		■ Hommes.....	* 133	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 55	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	5 075 (-)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 664 (-)	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	1 085	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	165	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	111 (-)	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	521 (-)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 5,4	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	73,7	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	94,1	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 53,2 (+)	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	3,07	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total nombre moyen de surfaces par enfant.....	1,19	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC HUNTINGDON



CLSC Huntingdon

Les indicateurs sélectionnés pour décrire le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC Huntingdon classe globalement ce dernier au 12^e rang sur les 14 rangs attribués *ex æquo* avec La Chênaie et Longueuil-Ouest. Quarante-et-un des soixante indicateurs sont positionnés défavorablement par rapport à la région.

Les bilans plutôt négatifs à l'intérieur de chacun des déterminants sociodémographiques et économiques, des comportements et facteurs de risque, surtout l'état de santé confèrent tous au territoire une position désavantageuse par rapport à la région. Le bilan relatif aux indicateurs de services est plus partagé que celui établi pour les trois autres dimensions.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 24 808 personnes, ce qui lui confère le 17^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Avec une diminution de son taux de croissance projeté entre 2001-2006 de 0,2 %, il occupe le 14^e rang.

En 2001, son âge médian est de 40,6 occupant ainsi le 14^e rang.

Sur 9 des 15 indicateurs **sociodémographiques et économiques**, le territoire se positionne de façon défavorable par rapport à la région. Dans ce domaine, il occupe le 8^e rang sur les 13 rangs attribués pour ce domaine.

Parmi les neuf indicateurs défavorables, chez les personnes de 15 ans et plus, notons surtout des proportions élevées en ce qui a trait aux personnes sous-scolarisées et à celles qui perçoivent leur situation économique comme étant « pauvre ou très pauvre » ainsi que chez la population adulte, un taux supérieur de bénéficiaires de l'assistance-emploi pour une durée de dix ans ou plus.

Le bilan des **comportements et facteurs de risque** s'avère également négatif puisque les valeurs sur 9 des 14 indicateurs lui confèrent une position plus défavorable que celle de la région, ce qui lui attribue le 7^e rang (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur un total de 10 rangs attribués à ce chapitre.

Soulignons les indicateurs qui occupent une position particulièrement défavorable : chez les mères, une proportion supérieure qui sont sous scolarisées; chez les personnes de 15 ans et plus, une proportion plus élevée que la région de personnes avec excès de poids ou souffrant d'insécurité alimentaire. Chez les jeunes de 0-17 ans, un taux supérieur à la région en ce qui a trait à la prise en charge dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse.

Le bilan des indicateurs de **services** est partagé. Autant d'indicateurs affichant une position défavorable que d'indicateurs présentant une position favorable par rapport à la région. Ce qui le situe au 4^e rang (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur les 6 rangs attribués pour le classement à ce chapitre.

Les quatre indicateurs les plus défavorables sont le taux supérieur de césariennes, la mortalité évitable par des soins appropriés ou par la prévention et la promotion, ainsi que la proportion inférieure de femmes de 50-69 ans ayant depuis deux ans subi une mammographie de dépistage pour le cancer du sein.

État de santé

Finalement, le bilan au niveau des indicateurs de l'**état de santé** est le plus négatif de la région, avec 18 des 21 indicateurs, lui conférant ainsi le dernier rang à ce chapitre.

Soulignons quelques indicateurs parmi les plus défavorables : tous les taux de mortalité et d'années de vie perdues prématurément qui sont supérieurs à celui de la région et par voie de conséquence les valeurs inférieures au niveau de l'espérance de vie à la naissance et de l'espérance de vie en bonne santé puisque, pour ce dernier indicateur, la prévalence de l'incapacité déclarée au recensement est également supérieure à celle de la région.

Positions relatives du CLSC Huntingdon par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
St-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommerai	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommerai	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
St-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

DÉTERMINANTS :


Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommerai	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
St-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommerai	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC Huntingdon occupe globalement le 12^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC HUNTINGDON

Indicateurs			Défavorable ← → Favorable																								
N°	Noms																										
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES			Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	-0,2	14																								
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	75,2	14																								
2	Âge médian (2001) (années)	40,6	14																								
3	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,88	3																								
4	Divorcés ou séparés (1996) (%)	6,3	4																								
5	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	13,3	2																								
7	Population vivant seule (1996) (%)	11,8	12																								
8	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	93,6	4																								
11	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	23,6	18																								
13	Taux de chômage (1996) (%)	9,3	8																								
14	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	18,9	13																								
14a	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	39,0	9																								
* 15	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	8,5	15																								
* 16	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	52,7	17																								
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	14,9	18																								
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE			Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	17,7	9																								
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	35,9	10																								
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	29,5	7																								
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	6,0	12																								
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	16,8	14																								
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	22,6	20																								
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	5,8	10																								
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	7,5	14																								
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	9,0	14																								
27	Excès de poids (2000) (%)	33,1	18																								
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	7,3	19																								
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	10,3	1																								
30	Aucun confident (2000) (%)	12,0	17																								
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	13,3	19																								
DÉTERMINANTS : SERVICES			Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	5,8	4																								
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	125,5	5																								
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	18,5	14																								
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	59,9	11																								
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	88,7	20																								
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	14,6	1																								
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	40,2	17																								
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	17,4	3																								
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	14,5	2																								
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	182,2	19																								
ÉTAT DE SANTÉ			Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	15,3	15																								
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	5,8	11																								
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	868,8	10																								
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	67,8	15																								
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	99	8																								
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	141,6	2																								
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	8,7	19																								
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	76,2	20																								
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	68,9	20																								
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	897,8	19																								
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	7,9	19																								
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	8,5	19																								
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	112	19																								
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	101	14																								
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	112	17																								
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	113	17																								
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	155	19																								
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	141	20																								
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	757,9	20																								
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	5,6	17																								
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	101,6	16																								

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

□ rang de la Montérégie ■ rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		Huntingdon	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	- 0,2	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 2,3	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	1,3	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	0,8	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	24 808	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	19,5	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	65,8	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	14,7	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	6,5	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	8,6	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	9,3	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	24,4	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	8,9	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	26,6	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	25,3	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	60,9	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	8,0	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	5,1	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	1,5	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	52,0	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	29,7	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	22,3	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	75,2	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	40,6	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	102	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,88	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	23,6	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	48,7	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	14,0	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,6	1,9	2,0
	■ Divorcés %	4,7	5,7	5,8
	■ Veufs %	7,4	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	64,6	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	20,5	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	13,3	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	11,1	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	5,0	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	13,6	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	14,0	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	11,8	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	11,6	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	12,1	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	8,4	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	21,4	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	36,4	35,8	38,7

			Huntingdon	Montréal	Ensemble du Québec
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	93,6	90,5	89,4
		■ Hommes (65 ans et plus) %	93,4	93,7	92,9
		■ Femmes (65 ans et plus) %	95,3	88,4	87,0
		■ 65-74 ans %	97,3	96,7	96,1
		■ 75-84 ans %	94,6	87,3	85,4
		■ 85 ans et plus %	63,6	56,3	57,6
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)			
		■ Français %	63,6	88,2	83,7
		■ Anglais %	35,7	9,4	10,3
		■ Autres langues %	0,8	2,5	6,0
10.	12.	Immigrant (1996) %	4,8	6,0	9,3
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)			
		■ Moins d'une 9 ^e année %	23,6	16,3	18,1
		■ 9 ^e -13 ^e année %	45,8	41,4	39,4
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	24,4	31,4	30,3
		■ Grade universitaire %	5,9	10,8	12,2
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	53,7	(-)	59,6
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	9,3	9,3	11,8
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)			
		Total %	18,9	(+)	18,0
		■ Hommes %	18,1	(+)	16,4
		■ Femmes %	19,7	19,5	25,1
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût du logement (1996)			
		■ Propriétaires %	13,8	15,3	16,3
		■ Locataires %	39,0	40,4	42,3
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	8,5	6,3	n.c.
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)			
		■ Moins de 2 ans %	9,9	11,9	13,6
		■ 2-3 ans %	9,1	10,3	10,4
		■ 4-9 ans %	28,3	29,7	28,7
		■ 10 ans et plus %	52,7	48,1	47,3
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	14,9	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	17,7	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	33,1	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	31,1	31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	35,9	35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	29,5	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 1,1	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	28,4	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 6,0	5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	16,8	15,8	n.c.
		■ Jamais %	26,7	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	56,5	62,6	n.c.

			Huntingdon	Montréal	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	22,6 (+)	12,3	14,7
		■ 11 ans %	19,5 (+)	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	28,9	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	16,6 (-)	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	* 12,4 (-)	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 1,1	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	* 5,8	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	* 7,5	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	9,0	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	33,1	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	16,1	16,1	n.c.
		■ Obésité %	17,0	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	7,3 (+)	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	* 8,0	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	* 6,6	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 10,3 (< <)	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 12,0	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 13,3 (+)	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	5,8	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	3,8	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	7,5	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	1,6	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	6,8	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	31,5	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	26,3	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	125,5 (+)	96,3	n.c.

			Huntingdon	Montréal	Ensemble du Québec	
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....▶	18,5	17,2	n.c.	
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....▶	59,9	56,1	n.c.	
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....▶	* 88,7	51,5	55,3	
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)				
		■ Oui (15 ans et plus) %.....▶	85,4	77,6	n.c.	
		■ Non (15 ans et plus) %.....▶	* 14,6	22,4	n.c.	
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....▶	2 355	3 059	n.c.	
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....▶	40,2	(-)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)				
		Total (15 ans et plus) %.....▶	17,4	15,9	16,2	
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....▶	15,0	13,0	13,3	
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....▶	20,1	18,7	19,1	
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....▶	13,7	7,4	8,2	
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)				
		Total (15 ans et plus) %.....▶	14,5	20,1	n.c.	
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000.....▶	182,2	133,8	n.d.	

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	15,3	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	11,4	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	3,9	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 5,8	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	868,8	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	80,2	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	148,9	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	92,6	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	96,9	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	72,4	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	70,8	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	67,8	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	* 10,5	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	27,7	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	99	100	n.c.
		■ Estomac.....	95	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	108	100	n.c.
		■ Pancréas.....	109	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	102	100	n.c.
		■ Prostate.....	67	100	n.c.
		■ Poumon.....	94	100	n.c.
		■ Vessie.....	103	100	n.c.

			Huntingdon	Montréal	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		<i>Ensemble des principales maladies</i>	* 141,6 (-)	197,8	n.c.
		■ Chlamydiae.....	** 35,4 (-)	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....	* 37,8	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....	** 21,7	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....	** 7,2 (-)	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		<i>Total %</i>	8,7	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....	8,8	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....	8,5	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....	76,2 (-)	78,3	77,9
		■ Hommes.....	73,2 (-)	75,3	74,6
		■ Femmes.....	79,5 (-)	81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....	68,9	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		<i>Total (taux brut)</i>	897,8 (+)	632,0	728
		■ 0-4 ans.....	** 141,9	94,0	119
		■ 5-14 ans.....	** 21,3	14,0	18
		■ 15-24 ans.....	** 65,5	57,0	66
		■ 25-44 ans.....	* 178,9	98,0	116
		■ 45-64 ans.....	723,4	507,0	559
		■ 65-74 ans.....	2 464,5	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....	8 537,3	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 7,9	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 3,6	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 1,4	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 2,9	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 8,5	6,3	7,2
		Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 5,0	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes</i>	112	100	n.c.
		■ Tumeurs.....	101	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	112	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	113	100	n.c.
		■ Appareil digestif.....	96	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	155	100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de tumeurs</i>	101	100	n.c.
		■ Estomac.....	100	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	110	100	n.c.
		■ Pancréas.....	113	100	n.c.
		■ Poumon.....	86	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	124	100	n.c.
		■ Prostate.....	107	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de l'appareil circulatoire</i>	112	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....	109	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....	128	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....	85	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....	78	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....	103	100	n.c.

			Huntingdon	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	113	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	152	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	97	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	155	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	151	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	169	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	** 141	100	n.c.
		■ Hommes.....	** 156	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 57	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	7 579 (+)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	2 127 (+)	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	1 793 (+)	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	209	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	196	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	1 026 (+)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 5,6	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	* 101,6	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	* 125,8	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 76,7	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	5,36	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	2,18	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC SEIGNEURIE DE BEAUHARNOIS



CLSC Seigneurie de Beauharnois

Les indicateurs sélectionnés pour décrire le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC Seigneurie de Beauharnois le classe globalement au dernier rang des 14 attribués. Quarante-neuf des soixante indicateurs sont positionnés défavorablement par rapport à la région.

Les bilans négatifs à l'intérieur de chacun des déterminants surtout ceux portant sur les aspects sociodémographiques et économiques où tous les indicateurs occupent une position défavorable. Mentionnons aussi ceux liés aux comportements et facteurs de risque, celui des services, ainsi que de l'état de santé qui confèrent tous au territoire une position désavantageuse par rapport à la région.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 54 979 personnes, ce qui lui confère le 13^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Avec une diminution de son taux de croissance projeté entre 2001-2006 de 1,8 %, il occupe le 18^e rang.

En 2001, son âge médian est de 44,4 occupant ainsi le 19^e rang.

Pour tous les 15 indicateurs **sociodémographiques et économiques**, le territoire se positionne de façon défavorable par rapport à la région. Dans ce domaine, il occupe le dernier rang sur les 13 attribués.

Certains indicateurs défavorables sont, outre la faiblesse de la croissance de la population, un indice de vieillissement supérieur et un âge médian élevé, une proportion élevée en ce qui a trait aux personnes sous-scolarisées, un taux supérieur de chômage, de familles monoparentales avec enfants de 18 ans et moins, de bénéficiaires de l'assistance-emploi et une proportion plus élevée de personnes vivant sous le seuil de faible revenu ou vivant seules.

Le bilan des **comportements et facteurs de risque** s'avère également négatif, puisque les valeurs sur 11 des 14 indicateurs lui confère une position plus défavorable que celle de la région, ce qui lui donne l'avant-dernier rang sur les 10 attribués.

Soulignons les indicateurs qui occupent une position particulièrement défavorable : chez les mères et les nouveau-nés, une proportion plus élevée de mères sous-scolarisées, de bébés de faible poids ou présentant un retard de croissance intra-utérine; chez les jeunes de 0-17 ans, un taux supérieur à la région en ce qui a trait à la prise en charge dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse et chez les personnes de 15 ans et plus, une proportion plus élevée de fumeurs actuels, de personnes déclarant n'avoir aucun confident ou souffrant d'insécurité alimentaire.

Le bilan des indicateurs de **services** est également négatif, avec 7 des 10 indicateurs concernés conférant au territoire une position défavorable par rapport à la région. Ce qui le situe au dernier rang (*ex æquo* avec La Chênaie) sur les 6 rangs attribués.

Les quatre indicateurs qui lui sont le plus défavorables sont : le taux d'hospitalisations évitables par des soins appropriés de première ligne, la mortalité évitable par des soins appropriés ou par la prévention et la promotion ainsi que la proportion inférieure de personnes de 15 ans et plus qui connaissent le service INFO-SANTÉ CLSC.

État de santé

Finalement, le bilan au niveau des indicateurs de l'**état de santé** est un des plus négatifs de la région, se situant au 10^e rang (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur les 12 rangs attribués, avec 16 des 21 indicateurs occupant une position défavorable par rapport à la région.

Soulignons les trois indicateurs parmi les plus défavorables, soit les taux de mortalité par suicide ou associée au tabagisme et le taux des hospitalisations pour soins physiques de courte durée.

Positions relatives du CLSC Seigneurie de Beauharnois par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
St-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommerai	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seig. de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommerai	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
St-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seig. de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :

Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommerai	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
St-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seig. de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommerai	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seig. de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC Seigneurie de Beauharnois occupe globalement le 14^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC SEIGNEURIE DE BEAUHARNOIS

Indicateurs

N°	Noms	Valeur	Rang	Défavorable ← → Favorable																			
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	-1,8	18																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	95,4	19																				
2	Âge médian (2001) (années)	44,4	19																				
3	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,61	14																				
4	Divorcés ou séparés (1996) (%)	8,5	17																				
5	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	23,7	18																				
7	Population vivant seule (1996) (%)	13,9	19																				
8	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	88,7	15																				
11	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	22,6	17																				
13	Taux de chômage (1996) (%)	13,1	19																				
14	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	22,7	18																				
14a	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	47,3	19																				
* 15	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	10,8	18																				
* 16	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	52,9	18																				
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	14,4	17																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	19,0	12																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	33,4	5																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	35,9	19																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	4,7	6																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	14,8	6																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	21,7	18																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	8,2	20																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	7,5	15																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	12,9	20																				
27	Excès de poids (2000) (%)	28,9	12																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	8,0	20																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	25,8	15																				
30	Aucun confident (2000) (%)	12,2	19																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	10,3	17																				
DÉTERMINANTS : SERVICES				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	9,7	14																				
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	159,2	1																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	18,8	15																				
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	84,4	20																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	60,0	16																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	24,1	16																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	52,6	6																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	18,5	1																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	20,8	12																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	175,4	17																				
ÉTAT DE SANTÉ				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	12,9	4																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	5,3	8																				
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	999	19																				
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	61,3	10																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	102	14																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	171,7	7																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	7,9	17																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	78,0	10																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	70,0	15																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	834	17																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	3,1	1																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	6,6	11																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	100	11																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	101	13																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	99	7																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	101	13																				
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	112	15																				
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	128	19																				
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	5891	14																				
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	4,8	13																				
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	113,2	19																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

rang de la Montérégie rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		Seigneurie-de- Beauharnois	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	-1,8	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 2,3	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	- 0,4	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	0,9	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	54 979	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	16,7	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	67,3	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	16,0	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	5,5	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	7,8	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	7,2	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	20,4	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	9,1	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	27,8	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	26,7	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	63,6	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	8,7	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	5,6	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	1,7	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	48,6	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	24,9	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	23,7	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	95,4	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	44,4	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	95	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,61	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	24,9	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	43,6	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	15,3	15,6	13,9
	■ Séparés %	2,2	1,9	2,0
	■ Divorcés %	6,3	5,7	5,8
	■ Veufs %	7,7	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	51,6	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	24,9	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	23,7	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	20,1	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	16,2	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	22,1	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	21,5	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	13,9	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	11,5	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	16,1	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	11,0	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	23,5	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	39,9	35,8	38,7

			Seigneurie-de- Beauharnois	Montréal	Ensemble du Québec
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	88,7	90,5	89,4
		■ Hommes (65 ans et plus) %	91,1	93,7	92,9
		■ Femmes (65 ans et plus) %	88,5	88,4	87,0
		■ 65-74 ans %	96,8	96,7	96,1
		■ 75-84 ans %	84,4	87,3	85,4
		■ 85 ans et plus %	50,0	56,3	57,6
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)			
		■ Français %	97,7	88,2	83,7
		■ Anglais %	2,0	9,4	10,3
		■ Autres langues %	0,3	2,5	6,0
10.	12.	Immigrant (1996) %	1,5	6,0	9,3
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)			
		■ Moins d'une 9 ^e année %	22,6	16,3	18,1
		■ 9 ^e -13 ^e année %	46,0	41,4	39,4
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	26,1	31,4	30,3
		■ Grade universitaire %	5,3	10,8	12,2
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	51,3	(-)	59,6
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	13,1	(+)	9,3
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)			
		Total %	22,7	(+)	18,0
		■ Hommes %	20,8	(+)	16,4
		■ Femmes %	24,5	(+)	19,5
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)			
		■ Propriétaires %	15,1	15,3	16,3
		■ Locataires %	47,3	40,4	42,3
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	10,8	6,3	n.c.
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)			
		■ Moins de 2 ans %	8,8	11,9	13,6
		■ 2-3 ans %	9,4	10,3	10,4
		■ 4-9 ans %	29,0	29,7	28,7
		■ 10 ans et plus %	52,9	48,1	47,3
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 14,4	(+)	10,4

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	19,0	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	29,4	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	37,2	31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	33,4	35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	35,9	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 2,2	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	33,7	(>)	26,8
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 4,7	5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	14,8	15,8	n.c.
		■ Jamais %	26,1	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	59,1	62,6	n.c.

			Seigneurie-de- Beauharnois	Montérégie	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	21,7 (+)	12,3	14,7
		■ 11 ans %	16,1 (+)	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	28,1	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	19,8	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	14,4 (-)	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,9	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	8,2	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	7,5	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	12,9 (+)	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	28,9	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	20,5	16,1	n.c.
		■ Obésité %	8,4	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	8,0 (+)	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	9,6 (+)	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	* 6,4	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	25,8	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 12,2	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 10,3	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	9,7	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	6,3	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	12,0	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	2,3	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	14,3	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	44,1	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	61,3	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	159,2 (+)	96,3	n.c.

			Seigneurie-de- Beauharnois	Montérégie	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	18,8	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	84,4 (+)	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	* 60,0	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	75,9	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	* 24,1	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	4 440	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	52,6 (+)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	18,5	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	14,9	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	21,8	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	9,7	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	20,8	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	175,4	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	12,9	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	11,2	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	1,7	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 5,3	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	999,2	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	82,3	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	181,2	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	137,0	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	127,7	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	95,1	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	67,9	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	61,3	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	* 4,8	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	27,2	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	102	100	n.c.
		■ Estomac.....	117	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	97	100	n.c.
		■ Pancréas.....	130	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	101	100	n.c.
		■ Prostate.....	96	100	n.c.
		■ Poumon.....	98	100	n.c.
		■ Vessie.....	100	100	n.c.

			Seigneurie-de- Beauharnois	Montérégie	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		<i>Ensemble des principales maladies</i>)	171,7	197,8	n.c.
		■ Chlamydiae.....)	77,9	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....)	* 21,6	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....)	* 22,7	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....)	** 10,1 (-)	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		<i>Total %</i>)	7,9	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....)	8,1	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....)	7,6	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....)	78,0	78,3	77,9
		■ Hommes.....)	74,2 (-)	75,3	74,6
		■ Femmes.....)	81,7	81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....)	70,0	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		<i>Total (taux brut)</i>)	833,7 (+)	632,0	728
		■ 0-4 ans.....)	** 53,1	94,0	119
		■ 5-14 ans.....)	** 20,4	14,0	18
		■ 15-24 ans.....)	** 53,4	57,0	66
		■ 25-44 ans.....)	* 130,4	98,0	116
		■ 45-64 ans.....)	577,1	507,0	559
		■ 65-74 ans.....)	2 463,5	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....)	7 571,6	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 3,1	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 1,0	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 1,0	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 1,0	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....)	** 6,6	6,3	7,2
		Taux de mortinatalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....)	** 5,6	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes</i>)	100	100	n.c.
		■ Tumeurs.....)	101	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....)	99	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....)	101	100	n.c.
		■ Appareil digestif.....)	108	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....)	112	100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de tumeurs</i>)	101	100	n.c.
		■ Estomac.....)	106	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....)	100	100	n.c.
		■ Pancréas.....)	121	100	n.c.
		■ Poumon.....)	106	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....)	102	100	n.c.
		■ Prostate.....)	78	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de l'appareil circulatoire</i>)	99	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....)	140	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....)	95	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....)	131	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....)	91	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....)	88	100	n.c.

			Seigneurie-de- Beauharnois	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	101	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	99	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	103	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	112	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	100	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	133	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	* 128	100	n.c.
		■ Hommes.....	** 127	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 138	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	5 891 (+)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 978 (+)	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	1 169 (+)	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	227 (+)	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	208 (+)	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	620	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 4,8	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	113,2	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	155,5	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 72,5	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	3,68	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	2,39	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse diffèrent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC CHÂTEAUGUAY



CLSC Châteauguay

Les indicateurs sélectionnés servant à décrire le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC Châteauguay classent globalement ce dernier au 7^e rang sur les 14 attribués. Vingt-huit des soixante indicateurs retenus pour tracer le portrait occupent une position favorable par rapport à la région. C'est grâce surtout à la position favorable qu'il occupe au niveau des services et des déterminants socio-démographiques et économiques où il se place respectivement au 3^e (ex æquo avec plusieurs autres territoires) sur les 6 attribués et au 4^e rang (ex æquo avec deux autres territoires) sur les 13 attribués.

Le bilan des comportements et facteurs de risque est plus défavorable lui attribuant le 6^e rang (ex æquo avec deux autres territoires) sur les 10 attribués avec seulement six des quatorze indicateurs où le territoire affiche une position favorable. Au niveau de l'état de santé, le profil est également plus mitigé avec 9 indicateurs favorables sur 21, lui conférant ainsi le 6^e rang (ex æquo avec Jardin du Québec) sur les 12 attribués.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 69 638 personnes, ce qui lui confère le 10^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Il occupe le 11^e rang pour le taux de croissance projeté entre 2001-2006, soit de 0,7 %.

En 2001, sa population est nettement plus jeune que celle de la région. Son âge médian de 37,0 lui confère le second rang.

C'est, entre autres, par rapport aux indicateurs **sociodémographiques et économiques** que le territoire occupe une position favorable par rapport à la région et ceci pour 11 des 15 indicateurs clés de ce domaine. Notons, entre autres, les personnes de 65 ans et plus qui vivent en ménage privé, les personnes vivant seules ainsi que les bénéficiaires de l'assistance emploi qui reçoivent cette aide depuis dix ans et plus.

Les **comportements et facteurs de risque** affichent un bilan moins favorable avec une bonne position pour six des quatorze indicateurs concernés. Soulignons la plus faible proportion de nouveau-nés avec retard de croissance intra utérine ainsi que la faible proportion de personnes de 15 ans et plus présentant une consommation occasionnelle élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours de douze mois.

Le profil du territoire en termes des indicateurs de **services** est légèrement favorable puisque seulement six des dix indicateurs retenus ici témoignent d'une position favorable par rapport à la valeur régionale.

Le territoire affiche un bon portrait surtout en ce qui a trait à la faible proportion des personnes de 65 ans et plus vivant en institution et au taux plus élevé d'hospitalisations pour des interventions dites « pertinentes » susceptibles d'améliorer la qualité de vie.

État de santé

Parmi les 21 indicateurs retenus pour décrire l'**état de santé**, le territoire occupe le 6^e rang (ex æquo avec Jardin du Québec) avec des indicateurs favorables dans 9 des 21 cas.

Certains des indicateurs favorables méritent d'être mis en lumière : l'état de santé mentale perçue comme « moyenne ou mauvaise » ainsi que des taux plus bas de mortalité périnatale, infantile, par traumatismes non intentionnels et par suicide sont également favorables par rapport à la région.

Positions relatives du CLSC Châteauguay par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
Saint-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
Saint-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :

Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
Saint-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC Châteauguay occupe globalement le 7^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC CHÂTEAUGUAY

Indicateurs				Défavorable ← Favorable																			
N°	Noms	Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES																							
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	0,7	11																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	53,8	8																				
3	Âge médian (2001) (années)	37,0	2																				
4	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,59	16																				
5	Divorcés ou séparés (1996) (%)	6,5	7																				
7	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	16,6	9																				
8	Population vivant seule (1996) (%)	7,8	5																				
11	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	94,5	3																				
13	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	14,7	6																				
14	Taux de chômage (1996) (%)	9,1	7																				
14a	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	15,3	6																				
* 15	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	42,2	16																				
* 16	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	4,9	6																				
17	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	44,3	5																				
	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	10,9	11																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE																							
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	19,6	13																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	36,6	12																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	32,7	14																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	6,7	16																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	13,9	4																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	10,8	6																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	5,6	8																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	7,4	12																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	6,8	1																				
27	Excès de poids (2000) (%)	28,3	11																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	5,9	15																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	23,0	9																				
30	Aucun confident (2000) (%)	8,9	8																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	8,2	14																				
DÉTERMINANTS : SERVICES																							
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	5,0	2																				
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	130,3	4																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	21,2	20																				
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	68,0	16																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	48,9	7																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	21,1	9																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	8,2	20																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	15,9	11																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	16,1	6																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	149,9	14																				
ÉTAT DE SANTÉ																							
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	14,0	8																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	7,0	18																				
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	1002	20																				
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	59,4	8																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	105	17																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	180,4	8																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	6,4	9																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	77,5	17																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	70,8	11																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	598	8																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	4,2	7																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	5,2	3																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	107	17																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	113	18																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	107	16																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	107	15																				
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	85	5																				
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	90	5																				
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	5461	11																				
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	3,8	5																				
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	87,7	13																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

rang de la Montérégie rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		Châteauguay	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	0,7	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 3,0	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	1,8	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	1,8	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	69 638	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	20,4	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	68,6	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	11,0	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	6,2	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	9,7	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	9,0	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	24,9	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	9,9	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	29,9	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	24,2	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	64,1	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	7,0	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	3,3	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	0,7	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	45,9	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	29,8	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	16,0	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	53,8	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	37,0	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	99	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,59	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	23,6	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	51,6	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	12,9	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,8	1,9	2,0
	■ Divorcés %	4,7	5,7	5,8
	■ Veufs %	5,4	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	64,3	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	18,9	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	16,6	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	14,5	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	8,7	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	17,4	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	17,6	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	7,8	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	6,8	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	8,8	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	5,7	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	17,3	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	34,2	35,8	38,7

			Châteauguay	Montréal	Ensemble du Québec
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	94,5	90,5	89,4
		■ Hommes (65 ans et plus) %	98,5	93,7	92,9
		■ Femmes (65 ans et plus) %	91,2	88,4	87,0
		■ 65-74 ans %	98,5	96,7	96,1
		■ 75-84 ans %	88,7	87,3	85,4
		■ 85 ans et plus %	76,3	56,3	57,6
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)			
		■ Français %	73,7	88,2	83,7
		■ Anglais %	24,5	9,4	10,3
		■ Autres langues %	1,8	2,5	6,0
10.	12.	Immigrant (1996) %	6,6	6,0	9,3
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)			
		■ Moins d'une 9 ^e année %	14,7	16,3	18,1
		■ 9 ^e -13 ^e année %	45,2	41,4	39,4
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	32,3	31,4	30,3
		■ Grade universitaire %	7,8	10,8	12,2
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	58,0	(-)	59,6
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	9,1	9,3	11,8
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)			
		Total %	15,3	(-)	18,0
		■ Hommes %	13,5	(-)	16,4
		■ Femmes %	17,0	(-)	19,5
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)			
		■ Propriétaires %	15,9	15,3	16,3
		■ Locataires %	42,2	40,4	42,3
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	4,9	6,3	n.c.
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)			
		■ Moins de 2 ans %	14,6	11,9	13,6
		■ 2-3 ans %	11,8	10,3	10,4
		■ 4-9 ans %	29,3	29,7	28,7
		■ 10 ans et plus %	44,3	48,1	47,3
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 10,9	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	19,6	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	34,3	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	29,1	31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	36,6	35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	32,7	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 2,9	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	29,8	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 6,7	5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	13,9	15,8	n.c.
		■ Jamais %	19,5	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	66,6	62,6	n.c.

			Châteauguay	Montréal	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	10,8	12,3	14,7
		■ 11 ans %	18,1 (+)	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	30,8	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	21,3	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	19,0 (-)	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,6	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	5,6	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	7,4	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	6,8 (-)	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	28,3	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	18,5	16,1	n.c.
		■ Obésité %	9,8	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	5,9 (+)	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	5,7	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	6,2	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	23,0	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 8,9	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 8,2	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	5,0	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	2,6	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	6,9	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	1,5	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	8,0	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	29,1	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	71,0	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	130,3 (+)	96,3	n.c.

			Châteauguay	Montréal	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	21,2	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	68,0 (+)	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	* 48,9	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	78,8	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	21,1	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	2 794	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	8,2 (-)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	15,9	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	13,3	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	18,3	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	6,3	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	16,1	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	149,9	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	14,0	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	10,0	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	4,0	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 7,0	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	1 002,3	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	69,8	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	157,8	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	90,9	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	106,4	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	60,8	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	53,5	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	59,4	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	* 4,9	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	28,0	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	105	100	n.c.
		■ Estomac.....	125	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	96	100	n.c.
		■ Pancréas.....	101	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	87	100	n.c.
		■ Prostate.....	101	100	n.c.
		■ Poumon.....	120	100	n.c.
		■ Vessie.....	119	100	n.c.

			Châteauguay	Montréal	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		<i>Ensemble des principales maladies</i>)	180,4	197,8	n.c.
		■ Chlamydie.....)	63,4	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....)	** 7,5	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....)	* 38,5	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....)	* 26,6	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		<i>Total %</i>)	6,4	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....)	6,2	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....)	6,6	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....)	77,5	(-) 78,3	77,9
		■ Hommes.....)	74,7	75,3	74,6
		■ Femmes.....)	80,4	(-) 81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....)	70,8	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		<i>Total (taux brut)</i>)	598,1	632,0	728
		■ 0-4 ans.....)	** 75,8	94,0	119
		■ 5-14 ans.....)	** 15,0	14,0	18
		■ 15-24 ans.....)	** 38,8	57,0	66
		■ 25-44 ans.....)	* 101,9	98,0	116
		■ 45-64 ans.....)	598,2	507,0	559
		■ 65-74 ans.....)	2 507,9	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....)	8 372,5	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 4,2	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 2,1	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 0,5	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 1,6	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....)	** 5,2	6,3	7,2
		Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....)	** 3,1	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes</i>)	107	100	n.c.
		■ Tumeurs.....)	113	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....)	107	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....)	107	100	n.c.
		■ Appareil digestif.....)	114	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....)	85	100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de tumeurs</i>)	113	100	n.c.
		■ Estomac.....)	83	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....)	106	100	n.c.
		■ Pancréas.....)	100	100	n.c.
		■ Poumon.....)	120	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....)	88	100	n.c.
		■ Prostate.....)	88	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de l'appareil circulatoire</i>)	107	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....)	109	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....)	99	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....)	156	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....)	114	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....)	146	100	n.c.

			Châteauguay	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	107	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	119	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	103	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	85	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	78	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	91	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	* 90	100	n.c.
		■ Hommes.....	** 88	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 98	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	5 461 (+)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 887 (+)	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	1 177 (+)	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	248 (+)	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	185 (+)	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	542	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	** 3,8	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	87,7	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	108,8	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 66,8 (+)	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	3,28	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	1,36	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC JARDIN DU QUÉBEC



CLSC Jardin du Québec

Les indicateurs sélectionnés pour décrire le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC Jardin du Québec, classent globalement ce dernier au 8^e rang sur 14 attribués. Trente-quatre des soixante indicateurs retenus pour tracer le portrait occupent une position défavorable par rapport à la région. Les déterminants sociodémographiques et économiques sont les seuls à présenter un bilan positif et occupent le 5^e rang sur 13 attribués. Les autres indicateurs de services, des comportements et facteurs de risque ainsi que de l'état de santé affichent tous des bilans négatifs occupant respectivement les 5^e rang sur 6, 8^e rang sur 10 et 6^e rang sur 12 attribués.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 23 141 personnes, ce qui lui confère le 18^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Avec une diminution de 1,1 %, il occupe le 16^e rang pour le taux d'accroissement projeté entre 2001-2006 et fait partie des cinq territoires où une diminution est enregistrée.

En 2001, son âge médian est de 41,8 occupant ainsi le 17^e rang.

Sur seulement six des quinze indicateurs **sociodémographiques et économiques**, le territoire se positionne de façon défavorable par rapport à la région, ce qui lui donne un bilan légèrement positif. Dans ce domaine, il affiche un 5^e rang sur 13 attribués.

Ses principaux atouts sont sa proportion moindre de familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans, de personnes divorcées ou séparées où dans les deux cas, il occupe le 1^{er} rang, ainsi que les proportions plus faibles de locataires dépensant 30 % ou plus de leur revenu pour se loger et de personnes vivant sous le seuil de faible revenu.

Le bilan des **comportements et facteurs de risque** s'avère assez négatif puisque les valeurs sur 10 des 14 indicateurs lui confère une position plus défavorable que celle de la région, soit le 8^e rang sur 10 attribués, *ex æquo* avec deux autres territoires.

Soulignons les indicateurs qui occupent une position particulièrement défavorable : chez les personnes de 15 ans et plus, une proportion supérieure qui qualifient leurs habitudes alimentaires de « moyennes ou mauvaises », qui est sédentaire, qui déclare une consommation élevée d'alcool sur une base occasionnelle, qui présente un excès de poids ou qui dit souffrir d'insécurité alimentaire. Chez les mères et les nouveau-nés une proportion supérieure de mères sous scolarisées et de bébés de faible poids ou prématurés.

Le bilan des indicateurs de **services** est défavorable mais dans une moindre mesure. Seuls 4 des 10 indicateurs se situent à un niveau favorable par rapport à la région, ce qui confère au territoire un 5^e rang (*ex æquo* avec plusieurs autres) sur les 6 attribués. Certains indicateurs sont plus défavorables que d'autres. Par exemple, la faible proportion de femmes de 50-69 ans qui ont subi une mammographie de dépistage depuis deux ans, le taux élevé de césariennes, le taux supérieur d'hospitalisations évitables par une meilleure utilisation des services de première ligne, la proportion supérieure d'insatisfaction par rapport aux services de santé offerts dans leur région ainsi que la mortalité évitable par des soins efficaces et appropriés.

État de santé

Finalement, le bilan au niveau des indicateurs de l'**état de santé** est aussi plutôt négatif et avec seulement 9 des 21 indicateurs occupant une position favorable par rapport à la région, le territoire occupe le 6^e rang (*ex æquo* avec Châteauguay) sur 12 attribués.

Plusieurs aspects de la mortalité présentent ici une position défavorable par rapport à la région; la mortalité périnatale, infantile et celle pour traumatismes non intentionnels. Il en est de même pour les hospitalisations et pour les traumatismes. Chez les personnes de 15 ans et plus, on observe une proportion supérieure qualifiant leur état de santé de « moyenne ou mauvaise ».

Positions relatives du CLSC Jardin du Québec par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
Saint-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
Saint-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :

Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
Saint-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC Jardin du Québec occupe globalement le 8^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC JARDIN DU QUÉBEC

Indicateurs

N°	Noms	Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES																							
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	-1,1	16																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	68,1	11																				
2	Âge médian (2001) (années)	41,8	17																				
3	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,75	6																				
4	Divorcés ou séparés (1996) (%)	5,7	1																				
5	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	12,5	1																				
7	Population vivant seule (1996) (%)	9,5	8																				
8	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	92,7	7																				
11	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	25,1	19																				
13	Taux de chômage (1996) (%)	10,9	16																				
14	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	13,4	4																				
14a	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	36,1	3																				
* 15	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	5,7	9																				
* 16	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	46,4	9																				
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	13,5	15																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE																							
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	24,2	20																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	42,6	18																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	29,8	10																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	5,8	11																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	17,7	17																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	16,8	15																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	6,5	15																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	7,7	16																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	8,4	8																				
27	Excès de poids (2000) (%)	31,9	17																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	4,7	11																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	20,2	5																				
30	Aucun confident (2000) (%)	8,9	9																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	9,8	16																				
DÉTERMINANTS : SERVICES																							
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	7,8	9																				
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	100,1	11																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	19,3	16																				
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	67,3	15																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	53,0	13																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	17,7	4																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	29,0	19																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	17,2	4																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	22,0	15																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	142,8	12																				
ÉTAT DE SANTÉ																							
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	18,2	19																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	5,0	7																				
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	905	13																				
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	72,7	18																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	92	3																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	181,8	9																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	7,2	15																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	78,0	11																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	71,8	4																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	696	13																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	8,3	20																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	10,5	20																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	100	9																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	92	5																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	99	8																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	86	4																				
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	154	18																				
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	113	13																				
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	5955	15																				
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	2,9	3																				
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	84,2	10																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

■ rang de la Montérégie ■ rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		Jardin du Québec	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	- 1,1	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 2,4	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	0,0	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	1,4	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	23 141	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	19,1	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	68,0	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	13,0	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	6,3	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	8,6	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	8,4	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	23,3	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	9,0	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	29,7	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	25,0	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	63,7	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	7,5	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	4,1	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	1,3	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	47,1	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	28,0	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	19,1	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	68,1	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	41,8	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	106	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,75	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	23,3	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	48,6	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	16,3	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,5	1,9	2,0
	■ Divorcés %	4,2	5,7	5,8
	■ Veufs %	6,1	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	62,0	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	24,7	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	12,5	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	11,4	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	7,8	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	11,2	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	18,4	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	9,5	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	8,3	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	10,5	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	7,2	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	18,6	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	34,4	35,8	38,7

			Jardin du Québec	Montréal	Ensemble du Québec
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	92,7	90,5	89,4
		■ Hommes (65 ans et plus) %	92,3	93,7	92,9
		■ Femmes (65 ans et plus) %	93,0	88,4	87,0
		■ 65-74 ans %	98,3	96,7	96,1
		■ 75-84 ans %	95,2	87,3	85,4
		■ 85 ans et plus %	48,9	56,3	57,6
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)			
		■ Français %	91,5	88,2	83,7
		■ Anglais %	7,4	9,4	10,3
		■ Autres langues %	1,2	2,5	6,0
10.	12.	Immigrant (1996) %	3,7	6,0	9,3
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)			
		■ Moins d'une 9 ^e année %	25,1	16,3	18,1
		■ 9 ^e -13 ^e année %	47,3	41,4	39,4
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	23,0	31,4	30,3
		■ Grade universitaire %	4,5	10,8	12,2
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	58,7	59,6	55,0
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	10,9	(+)	9,3
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)			
		Total %	13,4	(-)	18,0
		■ Hommes %	12,1	(-)	16,4
		■ Femmes %	14,6	(-)	19,5
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)			
		■ Propriétaires %	16,3	15,3	16,3
		■ Locataires %	36,1	40,4	42,3
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	5,7	6,3	9,0
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)			
		■ Moins de 2 ans %	12,9	11,9	13,6
		■ 2-3 ans %	11,2	10,3	10,4
		■ 4-9 ans %	29,5	29,7	28,7
		■ 10 ans et plus %	46,4	48,1	47,3
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	13,5	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	24,2	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	26,2	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	31,3	31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	42,6	35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	29,8	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 2,7	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	27,1	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 5,8	5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	17,7	15,8	n.c.
		■ Jamais %	27,4	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	54,9	62,6	n.c.

			Jardin du Québec	Montréal	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	16,8	12,3	14,7
		■ 11 ans %	15,3	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	34,2	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	19,3	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	* 14,5	26,0	25,1
			(-)		
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,9	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	* 6,5	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	* 7,7	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	8,4	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	31,9	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	18,5	16,1	n.c.
		■ Obésité %	13,4	11,5	n.c.
28.	36.	Taux d'prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	* 4,7	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	* 5,3	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	* 4,1	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	20,2	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 8,9	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 9,8	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	7,8	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	5,3	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	9,4	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	2,0	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	10,8	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	34,0	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	32,6	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	100,1	96,3	n.c.

			Jardin du Québec	Montréal	Ensemble du Québec	
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	19,3	17,2	n.c.	
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	67,3	56,1	n.c.	
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	* 53,0	51,5	55,3	
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)				
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	82,3	77,6	n.c.	
		■ Non (15 ans et plus) %.....	* 17,7	22,4	n.c.	
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	3 039	3 059	n.c.	
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	29,0	(-)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)				
		Total (15 ans et plus) %.....	17,2	15,9	16,2	
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	14,3	13,0	13,3	
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	20,4	18,7	19,1	
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	10,1	7,4	8,2	
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000).....				
		Total (15 ans et plus) %.....	22,0	20,1	n.c.	
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000.....				
		Total.....	* 142,8	133,8	n.d.	

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)					
		Total (15 ans et plus) %	■	18,2	14,0	n.c.	
		■ Moyenne %	■	16,5	11,6	n.c.	
		■ Mauvaise %	■	1,7	2,4	n.c.	
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)					
		Total (15 ans et plus) %	■	* 5,0	5,8	n.c.	
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000					
		Ensemble des causes.....	■	904,9	853,0	n.c.	
		■ Tumeurs.....	■	67,6	72,0	n.c.	
		■ Appareil circulatoire.....	■	146,9	135,0	n.c.	
		■ Appareil respiratoire	■	103,5	89,0	n.c.	
		■ Appareil digestif.....	■	103,7	101,0	n.c.	
		■ Organes génito-urinaire.....	■	59,2	62,0	n.c.	
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements	■	77,2	64,0	n.c.	
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000					
		Ensemble des traumatismes non intentionnels	■	72,7	(+)	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur	■	* 12,5	(+)	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	■	25,0		24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %					
		Ensemble des sièges.....	■	92	100	n.c.	
		■ Estomac.....	■	105	100	n.c.	
		■ Côlon et rectum.....	■	103	100	n.c.	
		■ Pancréas.....	■	94	100	n.c.	
		■ Sein chez la femme.....	■	86	100	n.c.	
		■ Prostate.....	■	88	100	n.c.	
		■ Poumon.....	■	89	100	n.c.	
		■ Vessie.....	■	87	100	n.c.	

			Jardin du Québec	Montérégie	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		Ensemble des principales maladies.....	181,8	197,8	n.c.
		■ Chlamydie.....	* 51,2	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....	** 11,1	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....	* 45,2	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....	** 14,5	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		Total %.....	7,2	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....	7,9	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....	6,6	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....	78,0	78,3	77,9
		■ Hommes.....	76,0	75,3	74,6
		■ Femmes.....	79,7	81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....	71,8	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		Total (taux brut).....	695,8	632,0	728
		■ 0-4 ans.....	** 148,2	94,0	119
		■ 5-14 ans.....	** 41,3	14,0	18
		■ 15-24 ans.....	** 40,1	57,0	66
		■ 25-44 ans.....	** 106,5	98,0	116
		■ 45-64 ans.....	* 561,0	507,0	559
		■ 65-74 ans.....	* 2 156,5	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....	8 157,2	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 8,3	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 3,8	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 2,3	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 2,3	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 10,5	6,3	7,2
		Taux de mortinatalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 6,8	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		Ensemble des causes.....	100	100	n.c.
		■ Tumeurs.....	92	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	99	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	86	100	n.c.
		■ Appareil digestif.....	125	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	154	100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de tumeurs.....	92	100	n.c.
		■ Estomac.....	73	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	102	100	n.c.
		■ Pancréas.....	73	100	n.c.
		■ Poumon.....	91	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	73	100	n.c.
		■ Prostate.....	94	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil circulatoire.....	99	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....	46	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....	92	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....	85	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....	109	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....	116	100	n.c.

			Jardin du Québec	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	86	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	72	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	102	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	154	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	235	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	47	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	** 113	100	n.c.
		■ Hommes.....	** 108	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 119	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	5 955 (+)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 523 (-)	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	1 157	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	170	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	167	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	1 094 (+)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 2,9	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	* 84,2	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	* 92,0	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	** 75,8	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	3,79	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	1,33	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC KATERI



CLSC Kateri

La population résidant sur le territoire du CLSC Kateri présente le quatrième profil parmi les plus favorisés par rapport à la région sur les quatorze attribués. Quarante des soixante indicateurs retenus pour tracer le portrait occupent une position favorable par rapport à la région. C'est grâce surtout aux déterminants sociodémographiques et économiques où il occupe le 1^{er} rang sur les 13 attribués mais aussi ceux liés aux services, où il occupe le second rang (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur les six attribués.

Son bilan de l'état de santé est également favorable. Il occupe le 5^e rang (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur 12 attribués, tandis que les indicateurs de comportements et facteurs de risque présentent un bilan plus défavorable lui conférant un 6^e rang (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur les 10 attribués.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 86 212 personnes, ce qui lui confère le 6^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Il occupe le 1^{er} rang pour le taux de croissance projeté entre 2001-2006 de 6,9 %.

Sa population est plus jeune que celle de la région en 2001. Son âge médian est de 36,8 occupant ainsi le 1^{er} rang.

C'est d'abord sous l'angle des indicateurs **sociodémographiques et économiques** que le territoire occupe une position très favorable par rapport à la région et ceci pour tous les 15 indicateurs de ce domaine.

Outre le taux de croissance projeté, l'indice de vieillesse et l'âge médian plus jeune, ce territoire est favorisé entre autres pour : sa faible proportion de personnes vivant seules, son faible taux de prestataires de l'assistance-emploi (aide sociale) et particulièrement de ceux qui en bénéficient depuis dix ans et plus, ses proportions de personnes percevant leur situation économique comme étant « pauvre ou très pauvre », vivant sous le seuil de faible revenu, en chômage ou sous scolarisées.

Le profil des **comportements et facteurs de risque**, est plus négatif.

Six indicateurs affichent des positions favorables dont quatre occupent les trois premiers rangs, ce sont : chez les jeunes de 0-17 ans, le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse; chez les mères et les nouveau-nés, la proportion de mères sous scolarisées et les bébés de faible poids et ceux accusant un retard de croissance intra-utérine.

Bien qu'à un degré moindre que dans le cas des indicateurs sociodémographiques et économiques, le territoire occupe une position favorable en termes du déterminant des **services**, soit pour sept des dix indicateurs retenus ici.

Soulignons le premier rang occupé par le taux d'hospitalisations évitables. La mortalité évitable par des soins ainsi que la mortalité évitable par la prévention ou la promotion occupent aussi une position favorable.

État de santé

Parmi les 21 indicateurs retenus pour décrire l'**état de santé**, le territoire occupe une position favorable dans 12 cas, ce qui lui confère un 5^e rang sur les 12 attribués, en termes de bilan de santé *ex æquo* avec les CLSC Du Richelieu et Saint-Hubert.

Certains indicateurs favorables méritent d'être mis en lumière : la faible proportion d'incapacité de long terme, le taux brut de mortalité et de mortalité par suicide, ainsi que la mortalité associée au tabagisme.

Positions relatives du CLSC Kateri par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
Saint-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
Saint-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :


Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
Saint-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC Kateri occupe globalement le 4^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



Défavorable

Favorable

CLSC KATERI

Indicateurs

N°	Noms	Valeur	Rang	Défavorable ← → Favorable																			
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	6,9	1																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	30,3	1																				
2	Âge médian (2001) (années)	36,8	1																				
3	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,74	7																				
4	Divorcés ou séparés (1996) (%)	6,4	5																				
5	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	14,9	6																				
7	Population vivant seule (1996) (%)	7,0	2																				
8	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	91,3	10																				
11	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	13,4	5																				
13	Taux de chômage (1996) (%)	8,1	4																				
14	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	15,1	5																				
14a	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	36,5	4																				
* 15	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	3,2	4																				
* 16	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	42,3	3																				
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	7,2	3																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	21,4	18																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	44,4	20																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	33,9	17																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	6,5	15																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	17,5	16																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	7,6	3																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	5,0	2																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	6,8	8																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	7,2	2																				
27	Excès de poids (2000) (%)	36,0	20																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	1,9	1																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	30,1	20																				
30	Aucun confident (2000) (%)	10,4	15																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	6,8	8																				
DÉTERMINANTS : SERVICES				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	6,1	6																				
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	65,4	18																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	19,3	17																				
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	38,5	1																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	44,8	3																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	21,3	10																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	47,9	11																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	15,1	15																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	19,2	7																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	107,4	3																				
ÉTAT DE SANTÉ				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	14,6	11																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	6,1	14																				
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	813	6																				
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	54,8	4																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	108	18																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	164,4	5																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	4,7	2																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	78,0	9																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	71,2	7																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	409	2																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	3,7	6																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	6,2	7																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	103	14																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	114	19																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	103	15																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	120	19																				
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	94	8																				
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	76	2																				
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	5004	4																				
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	5,1	14																				
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	60,4	3																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

rang de la Montérégie

rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		Kateri	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	6,9	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 0,6	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	5,6	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	1,9	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	86 212	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	22,5	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	70,7	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	6,8	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	8,1	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	10,2	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	8,0	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	26,4	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	8,8	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	35,0	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	23,0	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	66,8	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	4,5	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	1,9	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	0,4	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	41,5	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	31,8	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	9,6	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	30,3	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	36,8	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	101	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,74	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	23,0	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	47,8	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	19,2	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,7	1,9	2,0
	■ Divorcés %	4,7	5,7	5,8
	■ Veufs %	3,6	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	60,8	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	24,3	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	14,9	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	13,2	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	8,7	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	14,6	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	19,6	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	7,0	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	6,9	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	7,1	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	6,0	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	17,7	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	23,3	35,8	38,7

			Kateri	Montréal	Ensemble du Québec	
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)				
		Total (65 ans et plus) %	91,3	90,5	89,4	
		■ Hommes (65 ans et plus) %	86,3	93,7	92,9	
		■ Femmes (65 ans et plus) %	95,8	88,4	87,0	
		■ 65-74 ans %	94,9	96,7	96,1	
		■ 75-84 ans %	92,7	87,3	85,4	
		■ 85 ans et plus %	48,3	56,3	57,6	
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)				
		■ Français %	92,0	88,2	83,7	
		■ Anglais %	6,1	9,4	10,3	
		■ Autres langues %	2,0	2,5	6,0	
10.	12.	Immigrant (1996) %	4,6	6,0	9,3	
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)				
		■ Moins d'une 9 ^e année %	13,4	16,3	18,1	
		■ 9 ^e -13 ^e année %	41,7	41,4	39,4	
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	33,7	31,4	30,3	
		■ Grade universitaire %	11,2	10,8	12,2	
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	66,0	(+)	59,6	55,0
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	8,1	(-)	9,3	11,8
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)				
		Total %	15,1	(-)	18,0	23,4
		■ Hommes %	13,9	(-)	16,4	21,6
		■ Femmes %	16,2	(-)	19,5	25,1
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)				
		■ Propriétaires %	15,7	15,3	16,3	
		■ Locataires %	36,5	40,4	42,3	
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	3,2	6,3	n.c.	
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)				
		■ Moins de 2 ans %	13,9	11,9	13,6	
		■ 2-3 ans %	10,9	10,3	10,4	
		■ 4-9 ans %	32,9	29,7	28,7	
		■ 10 ans et plus %	42,3	48,1	47,3	
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	* 7,2	10,4	n.c.	

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)					
		Total (15 ans et plus) %	■	21,4	18,1	n.c.	
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)					
		■ 3 fois et plus par semaine %	■	24,6	(<<)	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	■	31,0		31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	■	44,4	(>>)	35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)					
		Total (15 ans et plus) %	■	33,9		30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	■	* 2,4		3,8	n.c.
		■ Réguliers %	■	31,5	(+)	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)					
		Total (15 ans et plus) %	■	* 6,5		5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)					
		■ Cinq fois et plus %	■	17,5		15,8	n.c.
		■ Jamais %	■	21,6		21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	■	60,9		62,6	n.c.

			Kateri	Montérégie	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	7,6 (-)	12,3	14,7
		■ 11 ans %	11,7	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	26,4	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	25,1	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	29,1	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,6	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	5 0	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	6,8	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	7,2 (-)	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	36,0 (+)	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	25,8	16,1	n.c.
		■ Obésité %	10,2	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans)	1,9 (-)	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans)	* 2,0 (-)	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans)	* 1,7 (-)	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	30,1 (>)	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 10,4	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	** 6,8	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	6,1	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	4,2	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	7,7	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	1,6	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	8,5	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	43,3	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	61,1	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	65,4 (-)	96,3	n.c.

			Kateri	Monterégie	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	19,3	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	38,5 (-)	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	* 44,8	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	78,7	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	* 21,3	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	2 526	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	47,9	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	15,1	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	12,7	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	17,7	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	5,0	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	19,2	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	107,4	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	14,6	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	11,4	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	3,2	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 6,1	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	812,9	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	75,4	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	146,4	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	80,7	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	103,3	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	54,7	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	60,3	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	54,8	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	* 3,6	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	21,3	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	108	100	n.c.
		■ Estomac.....	148	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	131	100	n.c.
		■ Pancréas.....	76	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	98	100	n.c.
		■ Prostate.....	103	100	n.c.
		■ Poumon.....	139 (+)	100	n.c.
		■ Vessie.....	87	100	n.c.

			Kateri	Montréal	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		Ensemble des principales maladies.....	164,4	197,8	n.c.
		■ Chlamydie.....	* 44,9 (-)	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....	** 6,1 (-)	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....	* 30,4	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....	* 24,5	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		Total %.....	4,7	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....	4,8	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....	4,6	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....	78,0	78,3	77,9
		■ Hommes.....	75,4	75,3	74,6
		■ Femmes.....	80,7	81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....	71,2	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		Total (taux brut).....	408,8 (-)	632,0	728
		■ 0-4 ans.....	** 87,2	94,0	119
		■ 5-14 ans.....	** 6,8	14,0	18
		■ 15-24 ans.....	** 46,7	57,0	66
		■ 25-44 ans.....	* 76,7	98,0	116
		■ 45-64 ans.....	497,1	507,0	559
		■ 65-74 ans.....	2 718,5	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....	8 010,4	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 3,7	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 2,3	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 0,4	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 1,1	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 6,2	6,3	7,2
		Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 3,9	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		Ensemble des causes.....	103	100	n.c.
		■ Tumeurs.....	114	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	103	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	120	100	n.c.
		■ Appareil digestif.....	78	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	94	100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de tumeurs.....	114	100	n.c.
		■ Estomac.....	163	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	132	100	n.c.
		■ Pancréas.....	86	100	n.c.
		■ Poumon.....	124	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	84	100	n.c.
		■ Prostate.....	84	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil circulatoire.....	103	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....	105	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....	101	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....	99	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....	107	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....	93	100	n.c.

			Kateri	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	120	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	149	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	109	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes par traumatismes non intentionnels.....	94	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	94	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	111	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	** 76	100	n.c.
		■ Hommes.....	** 78	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 69	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	5 004 (-)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 902 (+)	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	969 (-)	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	135 (-)	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	122	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	531 (-)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 5,1	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	60,4 (-)	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	* 73,1 (-)	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 47,5	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	4,28	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	1,56	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC SAMUEL DE CHAMPLAIN



CLSC Samuel de Champlain

La population résidant sur le territoire du CLSC Samuel de Champlain se situe au troisième rang sur les quatorze attribués (*ex æquo* avec La Presqu'île) affichant un des profils les plus favorisés de la région. Quarante-six des soixante indicateurs retenus pour tracer le portrait occupent une position favorable par rapport à la région. C'est surtout grâce au bilan de l'état de santé de sa population où 19 des 21 indicateurs considérés occupent une position favorable par rapport aux valeurs estimées pour la région.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 114 488 personnes, ce qui lui confère le 1^{er} rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Il occupe le 5^e rang pour le taux de croissance projeté entre 2001-2006 de 3,7 %.

En 2001, avec un âge médian de 40,5 ans, ce territoire présente une population légèrement plus âgée que celle de la région et occupe le 13^e rang.

Le territoire présente sa moins bonne performance et occupe le sixième rang sur les treize attribués quant aux indicateurs **sociodémographiques et économiques**. Il occupe également le second rang à la fois pour sa faible proportion de personnes sous-scolarisées et pour sa proportion élevée de personnes de 65 ans et plus demeurant encore dans un ménage privé.

La position est nettement meilleure en ce qui a trait aux indicateurs des **comportements et facteurs de risque** où le territoire se situe dans une position favorable pour 12 des 14 indicateurs soit, par exemple : chez les personnes de 15 ans et plus, la faible proportion de fumeurs actuels, souffrant d'insécurité alimentaire, présentant un excès de poids, qualifiant leurs habitudes alimentaires de « moyennes ou mauvaises », de naissances de mères sous-scolarisées et de bébés avec un retard de croissance intra utérine. La position occupée pour l'ensemble du domaine est le deuxième rang sur les dix attribués.

Finalement, le profil du territoire en termes des indicateurs de **services** est favorable, bien qu'à un moindre degré que le déterminant précédent, sept des dix indicateurs retenus ici témoignent d'une position favorable par rapport à la valeur régionale. Le territoire performe bien, entre autres, en ce qui a trait à la faible proportion des personnes de 65 ans et plus qui vivent dans une institution de santé, aux hospitalisations et aux décès évitables par un accès adéquat aux services de première ligne ou pour lesquels des soins appropriés, connus et efficaces existent et aux décès évitables par la prévention ou la promotion ainsi qu'au faible taux de césariennes. Le territoire occupe globalement le 2^e rang *ex æquo* avec deux autres territoires, parmi les six attribués.

État de santé

Le bilan plutôt positif des déterminants trouve son écho au niveau de l'état de santé de la population du territoire qui présente ici le second profil le plus favorable de tous les territoires de CLSC.

Parmi les 21 indicateurs retenus pour décrire l'**état de santé**, le territoire occupe une position favorable dans 19 cas.

Le territoire affiche surtout une valeur défavorable par rapport à celle de la région. Il s'agit de la proportion de personnes de 15 ans et plus qui se disent insatisfaites de leur vie sociale où le territoire occupe le 19^e rang sur les 20 attribués.

Positions relatives du CLSC Samuel de Champlain par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS : Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
Saint-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS : Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
Saint-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS : Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
Saint-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC Samuel de Champlain occupe globalement le 3^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC SAMUEL DE CHAMPLAIN

Indicateurs				Défavorable ← → Favorable																			
N°	Noms	Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES																							
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	3,7	5																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	79,2	15																				
3	Âge médian (2001) (années)	40,5	13																				
4	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,37	19																				
5	Divorcés ou séparés (1996) (%)	7,9	15																				
7	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	17,7	12																				
8	Population vivant seule (1996) (%)	11,2	11																				
11	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	94,6	2																				
13	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	10,3	2																				
14	Taux de chômage (1996) (%)	9,3	9																				
15	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	20,9	16																				
16	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	41,7	15																				
17	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	5,2	7																				
18	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	36,9	1																				
19	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	9,2	6																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE																							
20	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	16,1	5																				
21	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	34,9	9																				
22	Fumeurs actuels (2000) (%)	27,0	2																				
23	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	6,8	17																				
24	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	15,5	8																				
25	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	10,8	5																				
26	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	5,7	9																				
27	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	7,4	13																				
28	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	8,0	5																				
29	Excès de poids (2000) (%)	23,9	4																				
30	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	4,1	7																				
31	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	22,3	8																				
32	Aucun confident (2000) (%)	8,2	6																				
33	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	4,8	3																				
DÉTERMINANTS : SERVICES																							
34	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	5,1	3																				
35	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	87,4	14																				
36	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	15,4	5																				
37	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	43,9	4																				
38	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	46,4	5																				
39	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	29,9	20																				
40	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	49,5	10																				
41	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	16,1	10																				
42	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	21,8	13																				
43	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	118,2	5																				
ÉTAT DE SANTÉ																							
44	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	13,0	5																				
45	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	7,9	19																				
46	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	674	1																				
47	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	52,9	3																				
48	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	92	4																				
49	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	151,1	3																				
50	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	6,1	6																				
51	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	79,9	1																				
52	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	72,8	1																				
53	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	626	9																				
54	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	3,5	5																				
55	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	5,3	4																				
56	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	88	2																				
57	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	90	4																				
58	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	86	2																				
59	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	96	8																				
60	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	77	3																				
61	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	79	3																				
62	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	4247	1																				
63	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	4,7	9																				
64	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	80,3	8																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

□ rang de la Montérégie

■ rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		Samuel de Champlain	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	3,7	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 0,8	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	2,2	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	2,3	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	114 488	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	15,4	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	72,5	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	12,2	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	5,0	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	6,8	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	7,3	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	19,2	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	10,8	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	27,9	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	30,0	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	68,7	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	7,2	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	3,7	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	1,2	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	38,0	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	21,2	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	16,8	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	79,2	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	40,5	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	94	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,37	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	28,2	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	48,0	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	10,0	15,6	13,9
	■ Séparés %	2,0	1,9	2,0
	■ Divorcés %	5,9	5,7	5,8
	■ Veufs %	6,0	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	67,7	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	14,6	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	17,7	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	14,7	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	11,8	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	15,2	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	17,6	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	11,2	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	8,1	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	13,9	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	8,3	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	23,0	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	42,2	35,8	38,7

			Samuel de Champlain	Montérégie	Ensemble du Québec
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	94,6	90,5	89,4
		■ Hommes (65 ans et plus) %	96,9	93,7	92,9
		■ Femmes (65 ans et plus) %	92,9	88,4	87,0
		■ 65-74 ans %	97,8	96,7	96,1
		■ 75-84 ans %	92,8	87,3	85,4
		■ 85 ans et plus %	79,5	56,3	57,6
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)			
		■ Français %	62,2	88,2	83,7
		■ Anglais %	23,7	9,4	10,3
		■ Autres langues %	14,1	2,5	6,0
10.	12.	Immigrant (1996) %	21,3	6,0	9,3
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)			
		■ Moins d'une 9 ^e année %	10,3	16,3	18,1
		■ 9 ^e -13 ^e année %	33,2	41,4	39,4
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	35,1	31,4	30,3
		■ Grade universitaire %	21,3	10,8	12,2
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	59,0	59,6	55,0
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	9,3	9,3	11,8
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)			
		Total %	20,9	(+)	18,0
		■ Hommes %	19,6	(+)	16,4
		■ Femmes %	22,2	(+)	19,5
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)			
		■ Propriétaires %	15,4	15,3	16,3
		■ Locataires %	41,7	40,4	42,3
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	5,2	6,3	n.c.
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)			
		■ Moins de 2 ans %	17,6	11,9	13,6
		■ 2-3 ans %	12,8	10,3	10,4
		■ 4-9 ans %	32,7	29,7	28,7
		■ 10 ans et plus %	36,9	48,1	47,3
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 9,2	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	16,1	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	36,6	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	28,5	31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	34,9	35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	27,0	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 4,3	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	22,7	(-)	26,8
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 6,8	5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	15,5	15,8	n.c.
		■ Jamais %	19,6	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	64,9	62,6	n.c.

			Samuel de Champlain	Montérégie	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	10,8	12,3	14,7
		■ 11 ans %	9,9	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	20,7 (-)	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	20,1	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	38,5 (+)	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,8	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	5,7	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	7,4	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	8,0	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	23,9	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	11,9	16,1	n.c.
		■ Obésité %	12,0	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	4,1	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	3,9	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	4,2	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	22,3	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 8,2	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 4,8	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	5,1	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	3,0	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	6,5	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	1,8	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	5,8	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	25,6	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	93,4	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	87,4 (-)	96,3	n.c.

			Samuel de Champlain	Montérégie	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	15,4	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	43,9 (-)	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	46,4	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	70,0 (< <)	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	29,9	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	1 756	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	49,5 (+)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	16,1	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	13,4	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	18,4	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	7,5	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	21,8	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	118,2	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	13,0	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	11,2	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	1,8	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 7,9	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	674,1	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	69,2	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	97,8	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	60,3	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	75,6	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	45,5	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	56,7	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	52,9 (-)	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	* 2,5 (-)	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	23,0	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	92	100	n.c.
		■ Estomac.....	109	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	94	100	n.c.
		■ Pancréas.....	110	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	101	100	n.c.
		■ Prostate.....	82	100	n.c.
		■ Poumon.....	84	100	n.c.
		■ Vessie.....	90	100	n.c.

			Samuel de Champlain	Montérégie	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		<i>Ensemble des principales maladies</i>	151,1	(-)	197,8
		■ Chlamydiae.....	45,6	(-)	69,8
		■ Hépatite C.....	* 20,9		19,8
		■ Infection à campylobacter.....	* 24,7		36,3
		■ Coqueluche.....	* 13,1	(-)	22,6
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		<i>Total %</i>	6,1		6,4
		■ Hommes %.....	5,5		6,3
		■ Femmes %.....	6,8		6,5
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....	79,9	(+)	78,3
		■ Hommes.....	77,2	(+)	75,3
		■ Femmes.....	82,0	(+)	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....	72,8		71,2
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		<i>Total (taux brut)</i>	626,0		632,0
		■ 0-4 ans.....	** 76,0		94,0
		■ 5-14 ans.....	** 4,4		14,0
		■ 15-24 ans.....	** 48,6		57,0
		■ 25-44 ans.....	* 85,2		98,0
		■ 45-64 ans.....	395,7	(-)	507,0
		■ 65-74 ans.....	2 147,8		2377,0
		■ 75 ans et plus.....	7 404,9		8111,0
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 3,5		4,4
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 1,6		2,3
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 0,4		0,8
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 1,6		1,3
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 5,3		6,3
		Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 3,7		4,0
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes</i>	88	(-)	100
		■ Tumeurs.....	90		100
		■ Appareil circulatoire.....	86	(-)	100
		■ Appareil respiratoire.....	96		100
		■ Appareil digestif.....	94		100
		■ Traumatismes non intentionnels.....	77		100
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de tumeurs</i>	90		100
		■ Estomac.....	98		100
		■ Côlon et rectum.....	91		100
		■ Pancréas.....	100		100
		■ Poumon.....	82		100
		■ Sein chez la femme.....	97		100
		■ Prostate.....	83		100
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de l'appareil circulatoire</i>	86	(-)	100
		■ Maladies hypertensives.....	72		100
		■ Cardiopathies ischémiques.....	84	(-)	100
		■ Insuffisance cardiaque.....	109		100
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....	91		100
		■ Maladies des artères.....	71		100

			Samuel de Champlain	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	96	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	105	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	90	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	77	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	55	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	97	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	* 79	100	n.c.
		■ Hommes.....	* 81	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 81	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	4 247 (-)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 569 (-)	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	839 (-)	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	180	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	101 (-)	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	333 (-)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 4,7	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	80,3	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	94,8	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	66,7 (+)	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	2,38	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	1,26	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC LONGUEUIL-OUEST



CLSC Longueuil - Ouest

Les indicateurs sélectionnés pour décrire le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC Longueuil-Ouest, classe globalement ce dernier au 12^e rang (ex æquo avec le territoire de La Chênaie et de Huntingdon) sur les 14 rangs attribués. Quarante et un des soixante indicateurs sont positionnés défavorablement par rapport à la région. Les bilans plutôt négatifs à l'intérieur de chacun des déterminants sociodémographiques et économiques particulièrement, mais aussi ceux liés aux comportements et facteurs de risque, et aux services ainsi que de l'état de santé confèrent tous au territoire une position désavantageuse par rapport à la région.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 64 708 personnes, ce qui lui confère le 12^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Avec une diminution de 2,8 %, il affiche une des moins bonnes performances de la région en termes de croissance projetée entre 2001-2006 et se retrouve à l'avant-dernier rang. En 2001, son âge médian est de 39,3, occupant ainsi le 6^e rang.

Sur 12 des 15 indicateurs **sociodémographiques et économiques**, le territoire se positionne de façon défavorable par rapport à la région. Il occupe ainsi le 11^e rang sur les 13 attribués.

Parmi les indicateurs défavorables, outre la décroissance démographique, notons surtout : les proportions supérieures de familles monoparentales avec enfant de moins de 18 ans, de personnes vivant seules, de personnes sous le seuil de faible revenu et de celles qui se perçoivent comme « pauvres ou très pauvres », d'adultes séparés ou divorcés, de bénéficiaires de l'assistance-emploi, de chômeurs et un taux de fécondité inférieur à la région.

Le bilan des **comportements et facteurs de risque** s'avère négatif bien qu'à un degré moindre que le volet sociodémographique et économique, puisque les valeurs sur 10 des 14 indicateurs lui confère une position plus défavorable que celle de la région, ce qui contribue à le placer au 8^e rang parmi les 10 attribués ex æquo avec deux autres territoires. Soulignons les indicateurs qui occupent une position particulièrement défavorable. Chez les personnes de 15 ans et plus : la proportion de fumeurs actuels, des personnes qualifiant leurs habitudes alimentaires de « moyennes ou mauvaises », l'insécurité alimentaire et l'absence de confident. Chez les mères et les nouveau-nés, une proportion plus élevée de mères sous scolarisées, de bébés de faible poids, prématurés ou avec un retard de croissance intra-utérine.

Le bilan des indicateurs de **services** est légèrement négatif avec six des dix indicateurs concernés conférant ainsi au territoire une position défavorable par rapport à la région. Ce qui le situe au 5^e rang ex æquo avec plusieurs autres sur les six attribués à ce chapitre.

Les indicateurs qui lui sont le plus défavorables sont : la faible proportion de personnes qui prodiguent des soins bénévolement aux personnes âgées de 65 ans et plus, le taux d'hospitalisations évitable par des services appropriés de première ligne, ainsi que la proportion élevée de personnes de 15 ans et plus qui se disent insatisfaite des soins de santé offerts dans leur région.

État de santé

Finalement, le bilan au niveau des indicateurs de l'**état de santé** est négatif mais beaucoup plus mitigé avec 8 des 21 indicateurs occupant ainsi une position favorable par rapport à la région et conférant au territoire le 7^e rang (ex æquo avec des Maskoutains) sur les 12 attribués.

Parmi les 13 indicateurs défavorables, notons : la proportion la plus élevée de personnes de 15 ans et plus qui qualifient leur état de santé en général de « moyenne ou mauvaise », la proportion supérieure de personnes avec une incapacité de long terme, le taux d'incidence des nouveaux cas de cancer, le taux supérieur de maladies infectieuses à déclaration obligatoire, ainsi que le taux supérieur des années de vie perdues de façon prématurée.

Positions relatives du CLSC Longueuil-Ouest par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
St-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
St-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :


Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
St-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil-Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC Longueuil-Ouest occupe globalement le 12^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC LONGUEUIL-OUEST

Indicateurs				Défavorable ← → Favorable																			
N°	Noms	Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES																							
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	-2,8	19																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	92,6	18																				
3	Âge médian (2001) (années)	39,3	6																				
4	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,17	20																				
5	Divorcés ou séparés (1996) (%)	12,1	20																				
7	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	36,2	20																				
8	Population vivant seule (1996) (%)	19,0	20																				
11	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	96,3	1																				
13	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	19,9	12																				
14	Taux de chômage (1996) (%)	12,3	18																				
14a	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	33,5	20																				
* 15	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	41,4	13																				
* 16	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	15,0	20																				
* 17	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	47,4	10																				
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	17,1	20																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE																							
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	21,5	19																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	33,6	7																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	36,9	20																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	3,9	3																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	16,6	13																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	21,9	19																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	7,3	19																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	8,0	19																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	11,1	18																				
27	Excès de poids (2000) (%)	25,6	8																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	4,3	8																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	25,4	13																				
30	Aucun confident (2000) (%)	12,3	20																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	13,7	20																				
DÉTERMINANTS : SERVICES																							
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	2,2	1																				
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	102,9	9																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	16,5	10																				
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	69,2	17																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	54,1	14																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	22,8	14																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	51,4	7																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	14,1	20																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	23,3	17																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	136,7	10																				
ÉTAT DE SANTÉ																							
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	20,5	20																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	9,2	20																				
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	848	8																				
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	62,1	11																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	108	19																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	267,9	18																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	9,2	20																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	78,0	12																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	71,0	9																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	563	6																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	4,3	10																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	7,0	13																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	78	1																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	84	2																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	75	1																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	72	1																				
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	51	1																				
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	110	12																				
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	6301	18																				
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	4,7	10																				
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	84,6	11																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

■ rang de la Montérégie ■ rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		Longueuil-Ouest	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	- 2,8	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 1,3	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	- 2,9	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	1,4	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	64 708	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	16,0	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	69,2	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	14,8	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	6,2	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	6,8	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	6,1	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	19,0	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	8,3	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	31,3	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	26,6	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	66,2	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	8,4	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	5,1	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	1,3	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	44,6	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	23,1	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	21,4	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	92,6	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	39,3	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	92	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,17	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	32,1	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	33,9	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	15,2	15,6	13,9
	■ Séparés %	3,0	1,9	2,0
	■ Divorcés %	9,1	5,7	5,8
	■ Veufs %	6,8	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	40,0	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	23,4	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	36,2	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	32,7	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	27,7	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	34,3	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	38,4	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	19,0	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	17,2	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	20,6	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	16,6	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	30,0	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	37,4	35,8	38,7

			Longueuil-Ouest	Montréal	Ensemble du Québec	
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)				
		Total (65 ans et plus) %	96,3	90,5	89,4	
		■ Hommes (65 ans et plus) %	94,3	93,7	92,9	
		■ Femmes (65 ans et plus) %	97,7	88,4	87,0	
		■ 65-74 ans %	97,3	96,7	96,1	
		■ 75-84 ans %	96,7	87,3	85,4	
		■ 85 ans et plus %	81,5	56,3	57,6	
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)				
		■ Français %	91,0	88,2	83,7	
		■ Anglais %	3,2	9,4	10,3	
		■ Autres langues %	5,7	2,5	6,0	
10.	12.	Immigrant (1996) %	10,0	6,0	9,3	
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)				
		■ Moins d'une 9 ^e année %	19,9	16,3	18,1	
		■ 9 ^e -13 ^e année %	39,5	41,4	39,4	
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	30,1	31,4	30,3	
		■ Grade universitaire %	10,5	10,8	12,2	
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	53,1	(-)	59,6	55,0
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	12,3	(+)	9,3	11,8
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)				
		Total %	33,5	(+)	18,0	23,4
		■ Hommes %	30,2	(+)	16,4	21,6
		■ Femmes %	36,5	(+)	19,5	25,1
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)				
		■ Propriétaires %	21,8	15,3	16,3	
		■ Locataires %	41,4	40,4	42,3	
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	15,0	6,3	n.c.	
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)				
		■ Moins de 2 ans %	11,6	11,9	13,6	
		■ 2-3 ans %	10,2	10,3	10,4	
		■ 4-9 ans %	30,8	29,7	28,7	
		■ 10 ans et plus %	47,4	48,1	47,3	
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	17,1	(>>)	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	21,5	18,1	n.c.	
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)				
		■ 3 fois et plus par semaine %	34,6	32,2	n.c.	
		■ 1 à 2 fois par semaine %	31,8	31,9	n.c.	
		■ Moins d'une fois par semaine %	33,6	35,9	n.c.	
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	36,9	30,6	n.c.	
		■ Occasionnels %	* 4,6	3,8	n.c.	
		■ Réguliers %	32,3	(>)	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	* 3,9	5,2	n.c.	
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)				
		■ Cinq fois et plus %	16,6	15,8	n.c.	
		■ Jamais %	28,2	21,6	n.c.	
		■ Une à quatre fois %	55,2	62,6	n.c.	

			Longueuil-Ouest	Montréal	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	21,9 (+)	12,3	14,7
		■ 11 ans %	14,2	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	24,4	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	18,8	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	20,7 (-)	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,7	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	7,3	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	8,0	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	11,1 (+)	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	25,6	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	16,6	16,1	n.c.
		■ Obésité %	9,0	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	4,3	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	* 5,1	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	* 3,4	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	25,4	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 12,3 (+)	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 13,7 (>>)	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	2,2	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	1,5	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	2,5	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	0,8	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	2,9	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	13,8	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	35,5	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	102,9	96,3	n.c.

			Longueuil-Ouest	Montréal	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	* 16,5	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	69,2 (+)	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	* 54,1	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	78,6	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	22,8	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	3 581	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	51,4 (+)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	14,1	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	11,6	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	16,3	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	8,1	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	23,3	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	136,7	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	20,5 (>>)	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	17,4 (>>)	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	3,1	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 9,2	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	848,5	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	76,4	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	129,3	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	89,6	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	101,6	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	64,2	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	68,3	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	62,1	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	* 3,5	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	24,4	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	108	100	n.c.
		■ Estomac.....	115	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	98	100	n.c.
		■ Pancréas.....	87	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	101	100	n.c.
		■ Prostate.....	88	100	n.c.
		■ Poumon.....	126	100	n.c.
		■ Vessie.....	125	100	n.c.

			Longueuil-Ouest	Montréal	Ensemble du Québec	
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000				
		Ensemble des principales maladies.....	267,9	(+)	197,8	n.c.
		■ Chlamydie.....	110,1	(+)	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....	* 42,2	(+)	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....	* 36,4		36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....	* 18,8		22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)				
		Total %.....	9,2		6,4	n.c.
		■ Hommes %.....	8,8		6,3	n.c.
		■ Femmes %.....	9,6		6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....	78,0		78,3	77,9
		■ Hommes.....	74,5	(-)	75,3	74,6
		■ Femmes.....	81,1		81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....	71,0		71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000				
		Total (taux brut).....	563,3		632,0	728
		■ 0-4 ans.....	** 92,8		94,0	119
		■ 5-14 ans.....	** 5,8		14,0	18
		■ 15-24 ans.....	** 53,4		57,0	66
		■ 25-44 ans.....	* 102,3		98,0	116
		■ 45-64 ans.....	522,7		507,0	559
		■ 65-74 ans.....	1 898,9	(-)	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....	4 947,7	(-)	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 4,3		4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 2,3		2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 0,3		0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 1,7		1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 7,0		6,3	7,2
		Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 4,7		4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %				
		Ensemble des causes.....	78	(-)	100	n.c.
		■ Tumeurs.....	84	(-)	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	75	(-)	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	72		100	n.c.
		■ Appareil digestif.....	92		100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	51		100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %				
		Ensemble des causes de tumeurs.....	84	(-)	100	n.c.
		■ Estomac.....	101		100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	69		100	n.c.
		■ Pancréas.....	53		100	n.c.
		■ Poumon.....	92		100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	89		100	n.c.
		■ Prostate.....	75		100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %				
		Ensemble des causes de l'appareil circulatoire.....	75	(-)	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....	57		100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....	77	(-)	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....	88		100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....	65		100	n.c.
		■ Maladies des artères.....	63		100	n.c.

			Longueuil-Ouest	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	72	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	49	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	80	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	51	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	53	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	68	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	* 110	100	n.c.
		■ Hommes.....	** 106	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 136	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	6 301 (+)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	2 146 (+)	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	1 326 (+)	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	240 (+)	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	249 (+)	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	438 (-)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 4,7	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	84,6	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	* 107,2	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 63,5 (+)	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	5,76	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	1,96	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC LONGUEUIL-EST



CLSC Longueuil - Est

Les indicateurs sélectionnés pour décrire le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC Longueuil-Est, classe globalement ce dernier au 11^e rang (*ex æquo* avec celui de la Haute-Yamaska) sur les 14 attribués. Trente-huit des soixante indicateurs sont positionnés défavorablement par rapport à la région.

Les bilans plutôt négatifs à l'intérieur de chacun des déterminants sociodémographiques et économiques, ceux liés aux comportements et facteurs de risque, aux services et surtout les indicateurs de l'état de santé confèrent tous au territoire une position plutôt désavantageuse par rapport à la région.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 64 985 personnes, ce qui lui confère le 11^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Avec un taux de croissance projeté entre 2001-2006 de 2,2 %, il occupe le 8^e rang. En 2001, son âge médian est de 37,5, occupant ainsi le 3^e rang.

Sur huit des quinze indicateurs sociodémographiques et économiques, le territoire se positionne de façon défavorable par rapport à la région. Dans ce domaine, il occupe le 7^e rang (*ex æquo* avec La Chênaie) sur 13 attribués.

Parmi les indicateurs favorables, notons le taux de fécondité le plus élevé de la région, l'âge médian et une proportion plus faible de personnes de 15 ans et plus percevant leur situation économique comme « pauvre ou très pauvre ».

Le bilan des comportements et facteurs de risque s'avère davantage négatif puisque les valeurs sur neuf des quatorze indicateurs lui confère une position plus défavorable que celle de la région, ce qui le repousse au 7^e rang (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur les 10 rangs attribués.

Soulignons les indicateurs qui occupent une position particulièrement défavorable : chez les personnes de 15 ans et plus, des proportions plus élevées de personnes affichant une consommation élevée d'alcool sur une base de sept jours ou ayant consommé des drogues à vie, chez les mères et les nouveau-nés une proportion plus élevée de mères sous scolarisées, de bébés de faible poids ou prématurés et chez les jeunes de 0-17 ans un taux supérieur à la région en ce qui a trait à la prise en charge dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse.

Le bilan des indicateurs de services est légèrement négatif avec six des dix indicateurs concernés conférant au territoire une position défavorable par rapport à la région. Ce qui le situe au 5^e rang (*ex æquo* avec plusieurs autres) sur les 6 attribués pour ce domaine.

Les indicateurs qui lui sont le plus défavorables sont la proportion de personnes de 65 ans et plus qui vivent en institution de santé, qui est nettement supérieure à celle de la région, ainsi que la mortalité évitable par des soins appropriés et par la prévention ou la promotion, le taux d'hospitalisations évitables par des services appropriés de première ligne et le taux pour des interventions jugées « pertinentes ». Il présente aussi une des plus faibles proportions de personnes prodiguant bénévolement des soins aux personnes âgées de 65 ans et plus.

État de santé

Finalement, le bilan au niveau des indicateurs de l'état de santé figure parmi les plus négatifs. Seulement 6 des 21 indicateurs, occupent une position favorable par rapport à la région, ce qui confèrent au territoire le 9^e rang (*ex æquo* avec La Pommeraie) sur les 12 attribués.

Huit des quinze indicateurs défavorables sur les 21 couvrent presque tout le champ de la mortalité et contribuent à noircir le bilan du territoire puisqu'ils occupent les positions les moins enviables de la région, ce qui transparaît sur les valeurs de l'espérance de vie et de l'espérance de vie en bonne santé qui figurent parmi les plus faibles de la région.

Positions relatives du CLSC Longueuil-Est par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
St-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
St-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :

Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
St-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC Longueuil-Est occupe globalement le 11^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC LONGUEUIL-EST

Indicateurs

N°	Noms	Valeur	Rang	Défavorable ← → Favorable																			
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	2,2	8																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	50,7	6																				
2	Âge médian (2001) (années)	37,5	3																				
3	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,99	1																				
4	Divorcés ou séparés (1996) (%)	10,3	19																				
5	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	28,4	19																				
7	Population vivant seule (1996) (%)	13,1	15																				
8	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	84,5	19																				
11	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	14,9	7																				
13	Taux de chômage (1996) (%)	11,2	17																				
14	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	26,8	19																				
14a	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	42,6	18																				
* 15	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	10,3	17																				
* 16	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	47,9	11																				
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	8,0	4																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	16,7	7																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	33,4	6																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	29,6	8																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	7,1	18																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	14,9	7																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	17,9	16																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	6,6	16																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	7,8	18																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	9,0	13																				
27	Excès de poids (2000) (%)	23,5	1																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	6,9	17																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	28,3	19																				
30	Aucun confident (2000) (%)	9,0	11																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	7,6	12																				
DÉTERMINANTS : SERVICES				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	12,1	20																				
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	75,5	17																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	15,3	3																				
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	67,1	14																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	70,2	18																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	22,2	11																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	55,1	3																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	14,5	18																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	15,7	4																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	166,3	16																				
ÉTAT DE SANTÉ				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	10,8	2																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	4,7	5																				
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	884	12																				
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	55,1	5																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	103	15																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	240,7	16																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	6,9	12																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	76,8	19																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	69,2	19																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	812	16																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	4,4	11																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	5,9	5																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	147	20																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	142	20																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	137	20																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	179	20																				
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	110	14																				
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	124	17																				
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	5561	13																				
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	2,6	2																				
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	105,0	17																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

■ rang de la Montérégie ■ rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		Longueuil-Est	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	2,2	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 0,5	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	0,7	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	2,0	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	64 985	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	18,7	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	71,8	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	9,5	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	7,2	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	8,1	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	7,0	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	22,3	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	9,1	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	32,7	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	26,3	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	68,2	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	5,6	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	3,0	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	0,8	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	39,3	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	26,1	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	13,2	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	50,7	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	37,5	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	96	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,99	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	29,3	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	38,1	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	17,4	15,6	13,9
	■ Séparés %	2,6	1,9	2,0
	■ Divorcés %	7,7	5,7	5,8
	■ Veufs %	4,9	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	48,3	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	23,2	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	28,4	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	24,9	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	21,8	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	26,4	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	27,7	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	13,1	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	12,9	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	13,2	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	11,7	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	21,9	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	36,7	35,8	38,7

			Longueuil-Est	Montréal	Ensemble du Québec
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)			
		■ Total (65 ans et plus) %	84,5	90,5	89,4
		■ Hommes (65 ans et plus) %	88,6	93,7	92,9
		■ Femmes (65 ans et plus) %	81,0	88,4	87,0
		■ 65-74 ans %	94,5	96,7	96,1
		■ 75-84 ans %	79,1	87,3	85,4
		■ 85 ans et plus %	37,8	56,3	57,6
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)			
		■ Français %	93,5	88,2	83,7
		■ Anglais %	2,6	9,4	10,3
		■ Autres langues %	3,8	2,5	6,0
10.	12.	Immigrant (1996) %	8,1	6,0	9,3
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)			
		■ Moins d'une 9 ^e année %	14,9	16,3	18,1
		■ 9 ^e -13 ^e année %	37,5	41,4	39,4
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	32,2	31,4	30,3
		■ Grade universitaire %	15,5	10,8	12,2
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	59,1	59,6	55,0
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	11,2	(+) 9,3	11,8
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)			
		■ Total %	26,8	(+) 18,0	23,4
		■ Hommes %	24,9	(+) 16,4	21,6
		■ Femmes %	28,6	(+) 19,5	25,1
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)			
		■ Propriétaires %	16,4	15,3	16,3
		■ Locataires %	42,6	40,4	42,3
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	10,3	6,3	n.c.
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)			
		■ Moins de 2 ans %	12,1	11,9	13,6
		■ 2-3 ans %	11,0	10,3	10,4
		■ 4-9 ans %	29,0	29,7	28,7
		■ 10 ans et plus %	47,9	48,1	47,3
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)			
		■ Total (15 ans et plus) %	* 8,0	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		■ Total (15 ans et plus) %	16,7	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	36,1	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	30,5	31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	33,4	35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		■ Total (15 ans et plus) %	29,6	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 4,0	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	25,6	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		■ Total (15 ans et plus) %	* 7,1	5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	14,9	15,8	n.c.
		■ Jamais %	23,4	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	61,7	62,6	n.c.

			Longueuil-Est	Montréal	Ensemble du Québec	
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)				
		■ Moins de 11 ans %	17,9	(+)	12,3	14,7
		■ 11 ans %	10,5		11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	24,0		27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	18,4	(-)	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	29,2		26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)				
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	* 1,0		0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	6,6		5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	7,8		7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	9,0		8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)				
		Total (20-64 ans) %	23,5		27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	11,6		16,1	n.c.
		■ Obésité %	11,9		11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000				
		Total (0-17 ans)	6,9	(+)	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans)	8,1	(+)	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans)	5,5		4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	28,3	(+)	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	* 9,0		8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	* 7,6		7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)					
		■ Soins physiques de courte durée %.....	■	S.O.	95,1	n.c.	
		■ Hébergement et soins de longue durée %	■	S.O.	88,1	n.c.	
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours					
		■ Soins physiques de courte durée.....	■	S.O.	6,7	n.c.	
		■ Hébergement et soins de longue durée.....	■	S.O.	191,8	n.c.	
33	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	■	S.O.	38,9	n.c.	
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	■	S.O.	96,4	n.c.	
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)					
		■ 24 heures %	■	S.O.	21,6	n.c.	
		■ 48 heures %	■	S.O.	3,5	n.c.	
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)					
		Total (65 ans et plus) %	■	12,1	7,8	8,3	
		■ Hommes (65 ans et plus) %.....	■	7,9	4,9	5,7	
		■ Femmes (65 ans et plus) %	■	14,6	9,8	10,1	
		■ 65-74 ans %	■	3,5	2,0	2,5	
		■ 75-84 ans %	■	16,0	10,9	11,3	
		■ 85 ans et plus %	■	55,1	39,2	37,3	
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	■	S.O.	34,1	n.c.	
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours.....	■	53,8	44,0	n.c.	
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000.....	■	75,5	(-)	96,3	n.c.
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	■	15,3		17,2	n.c.

			Longueuil-Est	Montréal	Ensemble du Québec	
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000	67,1	(+)	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	70,2		51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)				
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	77,9		77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	22,2		22,4	n.c.
42a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	3 248		3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	55,1	(+)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)				
		Total (15 ans et plus) %	14,5		15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	11,5		13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %	17,3		18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %	5,8		7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	15,7	(-)	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000				
		Total.....	166,3		133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)				
		Total (15 ans et plus) %.....	10,8		14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	9,3		11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	1,5		2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)				
		Total (15 ans et plus) %.....	* 4,7		5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000				
		Ensemble des causes.....	883,5		853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	76,5		72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	137,3		135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	100,4		89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	101,4		101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	62,0		62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	59,5		64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000				
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	55,1		60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	* 2,4	(-)	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	24,7		24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %				
		Ensemble des sièges.....	103		100	n.c.
		■ Estomac.....	87		100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	103		100	n.c.
		■ Pancréas.....	100		100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	110		100	n.c.
		■ Prostate.....	109		100	n.c.
		■ Poumon.....	102		100	n.c.
		■ Vessie.....	120		100	n.c.

			Longueuil-Est	Montréal	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000 <i>Ensemble des principales maladies.....</i>	240,7	197,8	n.c.
		■ Chlamydiae.....	98,4	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....	* 26,3	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....	* 42,6	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....	* 19,4	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996) <i>Total %.....</i>	6,9	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....	6,2	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....	7,6	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....	76,8	(-) 78,3	77,9
		■ Hommes.....	73,9	(-) 75,3	74,6
		■ Femmes.....	79,3	81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....	69,2	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000 <i>Total (taux brut).....</i>	811,8	(+) 632,0	728
		■ 0-4 ans.....	** 120,3	94,0	119
		■ 5-14 ans.....	** 10,3	14,0	18
		■ 15-24 ans.....	** 42,8	57,0	66
		■ 25-44 ans.....	* 130,2	98,0	116
		■ 45-64 ans.....	683,5	(+) 507,0	559
		■ 65-74 ans.....	3 753,1	(+) 2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....	12 567,2	(+) 8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 4,4	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 2,8	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 0,4	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 1,2	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 5,9	6,3	7,2
		Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 3,2	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) % <i>Ensemble des causes.....</i>	147	(+) 100	n.c.
		■ Tumeurs.....	142	(+) 100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	137	(+) 100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	179	(+) 100	n.c.
		■ Appareil digestif.....	159	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	110	100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) % <i>Ensemble des causes de tumeurs.....</i>	142	(+) 100	n.c.
		■ Estomac.....	101	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	162	(+) 100	n.c.
		■ Pancréas.....	173	100	n.c.
		■ Poumon.....	139	(+) 100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	131	100	n.c.
		■ Prostate.....	154	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) % <i>Ensemble des causes de l'appareil circulatoire.....</i>	137	(+) 100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....	136	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....	138	(+) 100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....	119	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....	125	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....	131	100	n.c.

			Longueuil-Est	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	179 (+)	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	162	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	191 (+)	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	110	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	41	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	171	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	* 124	100	n.c.
		■ Hommes.....	* 122	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 138	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	5 561 (+)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 879 (+)	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	1 148	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	248 (+)	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	128	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	387 (-)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	** 2,6 (<)	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	105,0	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	126,1	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 84,7 (+)	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	4,27	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	1,64	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse diffèrent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclues du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC SAINT-HUBERT



CLSC Saint - Hubert

Les indicateurs sélectionnés servant à décrire le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC Saint-Hubert classent globalement ce dernier au 6^e rang sur les 14 attribués. Trente-trois des soixante indicateurs retenus pour tracer le portrait occupent une position favorable par rapport à la région. Son bilan légèrement positif est obtenu grâce surtout à la position favorable qu'il occupe au niveau sociodémographique et économique où il affiche le 4^e rang (ex æquo avec deux autres territoires) sur les 13 rangs attribués.

Le bilan des **comportements et facteurs de risque** occupe le 6^e rang (ex æquo avec deux autres territoires) sur dix et le 5^e rang (ex æquo avec plusieurs autres territoires) sur 6 pour les déterminants liés aux services. En ce qui a trait à l'état de santé, il se situe au 5^e rang (ex æquo avec deux autres territoires) sur les 12 rangs attribués.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 80 171 personnes, ce qui lui confère le 8^e rang parmi les 19, territoires en termes d'effectifs de population. Il occupe un rang médian, soit le 9^e pour un taux de croissance projeté entre 2001-2006 de 2,2 %.

En 2001, sa population est plus jeune que celle de la région. Son âge médian de 38,4 lui confère le 5^e rang.

C'est bien par rapport aux indicateurs **sociodémographiques et économiques** que le territoire occupe une position favorable par rapport à la région et ceci, pour 11 des 15 indicateurs clés de ce domaine. Soulignons par exemple ses valeurs plus faibles pour son indice de vieillesse, sa proportion de personnes vivant seules, son âge médian et sa proportion plus faible de personnes de 15 ans et plus se percevant leur situation économique comme étant « pauvre ou très pauvre ».

Les **comportements et facteurs de risque** affichent un bilan moins favorable avec une bonne position pour six des quatorze indicateurs concernés, particulièrement pour : la plus faible proportion de personnes de 15 ans et plus présentant une consommation occasionnelle élevée d'alcool. Notons également sa faible proportion de personnes souffrant d'insécurité alimentaire, le faible taux de jeunes dont le développement et la sécurité sont compromis dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse, ainsi que pour l'excès de poids.

Le profil du territoire en termes des indicateurs de **services**, est lui aussi mitigé puisque quatre des dix indicateurs retenus ici témoignent d'une position favorable par rapport à la valeur régionale. Le territoire performe bien, entre autres, pour le taux de césariennes, d'hospitalisations évitables par un accès adéquat aux services de première ligne, de mortalité évitable par la prévention et la promotion, ainsi que pour la proportion plus élevée de femmes de 50-69 ans qui ont subi une mammographie de dépistage depuis deux ans.

État de santé

Parmi les 21 indicateurs retenus pour décrire l'**état de santé**, le territoire occupe le 5^e rang sur les 12 attribués avec des indicateurs favorables dans 12 cas des 21 cas.

Certains des indicateurs favorables méritent d'être mis en lumière : la mortalité périnatale qui se classe au 1^{er} rang de la région, la mortalité par traumatismes non intentionnels, le taux brut de mortalité générale ainsi que les décès associés au tabagisme.

Positions relatives du CLSC Saint-Hubert par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
Saint-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
Saint-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :

Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
Saint-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC Saint-Hubert occupe globalement le 6^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC SAINT-HUBERT

Indicateurs				Défavorable ← → Favorable																			
N°	Noms	Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES																							
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	2,2	9																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	40,2	3																				
3	Âge médian (2001) (années)	38,4	5																				
4	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,57	17																				
5	Divorcés ou séparés (1996) (%)	7,2	10																				
7	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	17,5	10																				
8	Population vivant seule (1996) (%)	7,3	3																				
11	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	91,2	11																				
13	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	15,6	8																				
14	Taux de chômage (1996) (%)	9,7	12																				
14a	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	19,2	15																				
* 15	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	42,4	17																				
* 16	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	5,5	8																				
17	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	45,1	7																				
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	8,1	5																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE																							
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	20,1	15																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	44,0	19																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	34,0	15																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	5,1	9																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	12,9	1																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	12,5	9																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	5,9	12																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	7,2	11																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	8,5	9																				
27	Excès de poids (2000) (%)	25,4	6																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	3,8	5																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	27,2	17																				
30	Aucun confident (2000) (%)	10,0	13																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	6,2	5																				
DÉTERMINANTS : SERVICES																							
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	8,1	12																				
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	64,7	20																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	15,4	4																				
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	46,6	6																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	52,1	12																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	22,7	13																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	50,9	8																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	14,3	19																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	21,8	14																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	118,5	6																				
ÉTAT DE SANTÉ																							
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	13,4	7																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	5,6	10																				
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	807	5																				
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	63,1	12																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	101	11																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	189,5	11																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	6,3	7																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	77,6	16																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	69,5	18																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	476	3																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	4,4	12																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	4,2	1																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	109	18																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	104	16																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	117	19																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	119	18																				
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	72	2																				
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	90	6																				
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	5168	7																				
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	4,7	11																				
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	68,5	4																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

rang de la Montérégie rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		Saint-Hubert	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	2,2	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 2,3	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	2,3	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	2,3	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	80 171	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	19,5	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	72,6	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	7,8	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	6,3	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	8,9	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	8,6	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	23,8	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	10,3	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	31,1	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	26,9	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	68,4	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	5,0	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	2,3	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	0,6	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	37,7	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	26,9	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	10,8	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	40,2	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	38,4	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	98	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,57	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	25,9	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	47,7	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	14,8	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,9	1,9	2,0
	■ Divorcés %	5,3	5,7	5,8
	■ Veufs %	4,3	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	62,4	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	20,1	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	17,5	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	15,1	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	11,7	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	16,8	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	16,5	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	7,3	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	6,9	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	7,7	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	6,2	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	17,5	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	29,0	35,8	38,7

			Saint-Hubert	Montréal	Ensemble du Québec	
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)				
		Total (65 ans et plus) %	91,2	90,5	89,4	
		■ Hommes (65 ans et plus) %	90,0	93,7	92,9	
		■ Femmes (65 ans et plus) %	91,4	88,4	87,0	
		■ 65-74 ans %	97,1	96,7	96,1	
		■ 75-84 ans %	84,2	87,3	85,4	
		■ 85 ans et plus %	59,7	56,3	57,6	
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)				
		■ Français %	86,2	88,2	83,7	
		■ Anglais %	10,1	9,4	10,3	
		■ Autres langues %	3,7	2,5	6,0	
10.	12.	Immigrant (1996) %	8,9	6,0	9,3	
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)				
		■ Moins d'une 9 ^e année %	15,6	16,3	18,1	
		■ 9 ^e -13 ^e année %	42,6	41,4	39,4	
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	33,8	31,4	30,3	
		■ Grade universitaire %	8,1	10,8	12,2	
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	62,8	(+)	59,6	55,0
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	9,7	(+)	9,3	11,8
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)				
		Total %	19,2	(+)	18,0	23,4
		■ Hommes %	17,6	(+)	16,4	21,6
		■ Femmes %	20,7	(+)	19,5	25,1
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)				
		■ Propriétaires %	17,4	15,3	16,3	
		■ Locataires %	42,4	40,4	42,3	
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	5,5	6,3	9,0	
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)				
		■ Moins de 2 ans %	12,2	11,9	13,6	
		■ 2-3 ans %	11,4	10,3	10,4	
		■ 4-9 ans %	31,3	29,7	28,7	
		■ 10 ans et plus %	45,1	48,1	47,3	
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	* 8,1	10,4	n.c.	

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	20,1	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	30,4	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	25,5	($<$) 31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	44,0	($>>$) 35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	34,0	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 3,6	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	30,4	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 5,1	5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	12,9	15,8	n.c.
		■ Jamais %	22,9	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	64,2	62,6	n.c.

			Saint-Hubert	Montréal	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	12,5	12,3	14,7
		■ 11 ans %	12,3	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	28,0	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	23,9	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	23,3	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,9	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	5,9	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	7,2	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	8,5	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	25,4	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	15,7	16,1	n.c.
		■ Obésité %	9,7	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	3,8	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	4,5	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	* 3,1	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	27,2	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 10,0	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 6,2	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	8,1	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	4,5	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	10,4	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	2,8	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	13,2	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	41,8	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	93,6	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	64,7	(-)	96,3
					n.c.

			Saint-Hubert	Montréal	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	15,4	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	46,6 (-)	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	52,1	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	77,3	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	* 22,7	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	3 055	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	50,9 (+)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	14,3	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	11,8	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	16,7	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	7,2	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	21,8	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	118,5	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	13,4	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	10,8	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	2,6	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 5,6	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	806,6	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	72,5	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	128,3	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	83,5	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	91,8	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	55,7	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	66,3	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	63,1	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	* 2,3 (-)	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	23,7	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	101	100	n.c.
		■ Estomac.....	113	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	100	100	n.c.
		■ Pancréas.....	116	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	106	100	n.c.
		■ Prostate.....	71	100	n.c.
		■ Poumon.....	125	100	n.c.
		■ Vessie.....	114	100	n.c.

			Saint-Hubert	Montréal	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		Ensemble des principales maladies.....	189,5	197,8	n.c.
		■ Chlamydie.....	76,2	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....	* 19,3	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....	* 29,2	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....	* 20,8	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		Total %.....	6,3	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....	6,3	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....	6,4	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....	77,6	(-)	78,3
		■ Hommes.....	74,7		75,3
		■ Femmes.....	80,1	(-)	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....	69,5		71,2
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		Total (taux brut).....	476,5	(-)	632,0
		■ 0-4 ans.....	** 97,0		94,0
		■ 5-14 ans.....	** 12,0		14,0
		■ 15-24 ans.....	** 40,4		57,0
		■ 25-44 ans.....	* 93,9		98,0
		■ 45-64 ans.....	474,0		507,0
		■ 65-74 ans.....	2 805,1		2377,0
		■ 75 ans et plus.....	8 962,3		8111,0
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 4,4		4,4
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 1,8		2,3
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 0,7		0,8
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 2,0		1,3
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 4,2		6,3
		Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 2,4		4,0
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		Ensemble des causes.....	109		100
		■ Tumeurs.....	104		100
		■ Appareil circulatoire.....	117		100
		■ Appareil respiratoire.....	119		100
		■ Appareil digestif.....	104		100
		■ Traumatismes non intentionnels.....	72		100
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de tumeurs.....	104		100
		■ Estomac.....	120		100
		■ Côlon et rectum.....	65		100
		■ Pancréas.....	110		100
		■ Poumon.....	122		100
		■ Sein chez la femme.....	111		100
		■ Prostate.....	93		100
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil circulatoire.....	117		100
		■ Maladies hypertensives.....	66		100
		■ Cardiopathies ischémiques.....	123		100
		■ Insuffisance cardiaque.....	105		100
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....	114		100
		■ Maladies des artères.....	109		100

			Saint-Hubert	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	119	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	124	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	115	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	72	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	55	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	80	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	* 90	100	n.c.
		■ Hommes.....	** 95	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 74	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	5 168	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 702	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	1 215 (+)	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	174	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	162	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	425 (-)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne/mauvaise, (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 4,7	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	68,5	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	* 86,4 (-)	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 50,7	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	s.o.	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	s.o.	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC DES SEIGNEURIES



CLSC des Seigneuries

La population résidant sur le territoire du CLSC des Seigneuries présente le profil le plus favorisé dans la région sur les 14 attribués. Cinquante et un des soixante indicateurs retenus pour tracer le portrait occupent une position favorable par rapport à la région. C'est grâce surtout aux déterminants relatifs aux comportements et facteurs de risque qui se situent au premier rang sur les dix attribués et aussi aux déterminants sociodémographiques et économiques ainsi que ceux liés aux services où le territoire occupe respectivement les deuxième sur les treize rangs attribués (*ex æquo* avec La Presqu'Île) et troisième rang sur les six attribués (*ex æquo* avec plusieurs autres territoires).

Le bilan de l'état de santé avec un 3^e rang sur les 12 attribués est aussi très favorable par rapport à la région.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 104 775 personnes, ce qui lui confère le second rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Il occupe le 3^e rang avec un taux de croissance projeté entre 2001-2006 de 4 %.

En 2001, sa population est plus jeune que celle de la région. Son âge médian est de 39,4 lui conférant le 7^e rang. Au niveau des indicateurs **sociodémographiques et économiques**, le territoire occupe également une position favorable par rapport à la région et ceci pour 14 des 15 indicateurs clés : par exemple pour le taux d'accroissement de sa population, les proportions de personnes en chômage, sous-scolarisées, sous le seuil de faible revenu, qui perçoivent leur situation économique comme étant « pauvre ou très pauvre », qui sont bénéficiaires de l'assistance-emploi (aide sociale), qui vivent seules, ainsi que pour la proportion la plus faible de locataires pour qui 30 % ou plus du revenu est consacré aux coûts d'habitation.

C'est surtout grâce aux indicateurs de **comportements et facteurs de risque** puisque 13 des 14 indicateurs y occupent une position favorable. Les indicateurs suivants occupent une position particulièrement favorable : la pratique de l'activité physique de loisir, le pourcentage de fumeurs actuels, la consommation élevée d'alcool, l'excès de poids, la prévalence de la sous-scolarisation des mères, le taux de prise en charge des jeunes dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse, etc.

Le profil du territoire en termes des indicateurs de **services**, bien que favorable, est plus mitigé puisque seulement six des dix indicateurs retenus ici témoignent d'une position favorable par rapport à la valeur régionale. Le territoire performe bien, entre autres, en ce qui a trait à la proportion de femmes de 50-69 ans qui ont subi une mammographie de dépistage pour le cancer du sein sur une période de deux ans, aux hospitalisations et aux décès évitables par un accès adéquat aux services de première ligne ou pour lesquels des soins appropriés, connus et efficaces existent ainsi qu'au taux de mortalité évitable par la prévention ou la promotion.

État de santé

Le bilan plutôt positif des déterminants trouve son écho au niveau de l'état de santé. En effet, parmi les 21 indicateurs retenus pour décrire l'état de santé, le territoire occupe une position favorable dans 18 cas. Certains indicateurs favorables méritent d'être mis en lumière comme : la plus faible proportion de personnes percevant leur état de santé général comme « moyenne ou mauvaise », les taux de décès général, de décès par tabagisme, la prévalence des incapacités de long terme, les taux ajustés d'hospitalisations pour l'ensemble des causes et pour les traumatismes non intentionnels en particulier, l'espérance de vie à la naissance et de vie en bonne santé.

Positions relatives du CLSC des Seigneuries par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
Saint-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
Saint-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :


Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
Saint-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC des Seigneuries occupe globalement le 1^{er} rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



Défavorable

Favorable

CLSC DES SEIGNEURIES

Indicateurs			Défavorable ← Favorable																					
N°	Noms																							
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES			Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	4,0	3																					
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	37,8	2																					
2	Âge médian (2001) (années)	39,4	7																					
3	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,67	11																					
4	Divorcés ou séparés (1996) (%)	5,9	2																					
5	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	13,9	4																					
7	Population vivant seule (1996) (%)	6,5	1																					
8	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	86,2	18																					
11	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	10,5	3																					
13	Taux de chômage (1996) (%)	6,8	1																					
14	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	9,9	1																					
14a	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	29,7	1																					
* 15	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	2,0	1																					
* 16	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	44,5	6																					
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	6,3	1																					
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE			Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	14,4	1																					
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	30,8	3																					
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	22,8	1																					
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	3,0	2																					
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	13,4	3																					
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	5,8	2																					
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	5,1	3																					
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	6,5	4																					
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	7,7	3																					
27	Excès de poids (2000) (%)	23,6	2																					
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	2,4	2																					
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	25,4	14																					
30	Aucun confident (2000) (%)	6,1	2																					
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	4,4	1																					
DÉTERMINANTS : SERVICES			Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	10,8	18																					
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	64,8	19																					
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	21,0	19																					
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	38,9	2																					
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	44,8	2																					
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	19,8	6																					
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	58,2	1																					
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	15,5	14																					
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	19,8	8																					
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	92,3	1																					
ÉTAT DE SANTÉ			Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	9,4	1																					
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	4,5	4																					
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	749	2																					
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	50,3	2																					
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	99	9																					
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	171,2	6																					
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	3,8	1																					
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	79,5	2																					
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	72,6	3																					
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	395	1																					
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	6,1	18																					
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	7,4	17																					
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	88	3																					
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	89	3																					
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	91	3																					
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	83	3																					
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionnn. (1994-1998) (%)	80	4																					
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	86	4																					
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	4497	3																					
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	6,1	20																					
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	53,6	1																					

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

■ rang de la Montérégie ■ rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		des Seigneuries	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	4,0	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 1,2	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	3,0	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	2,3	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	104 775	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	20,4	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	71,9	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	7,7	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	7,0	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	9,2	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	8,1	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	24,4	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	9,3	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	32,3	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	26,4	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	67,9	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	5,0	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	2,1	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	0,6	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	39,0	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	28,3	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	10,7	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	37,8	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	39,4	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	101	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,67	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	23,7	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	49,7	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	17,1	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,6	1,9	2,0
	■ Divorcés %	4,3	5,7	5,8
	■ Veufs %	3,6	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	62,7	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	23,5	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	13,9	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	12,3	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	6,9	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	14,1	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	17,5	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	6,5	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	6,4	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	6,6	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	5,5	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	16,2	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	29,2	35,8	38,7

			des Seigneuries	Montréal	Ensemble du Québec	
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)				
		Total (65 ans et plus) %	86,2	90,5	89,4	
		■ Hommes (65 ans et plus) %	90,9	93,7	92,9	
		■ Femmes (65 ans et plus) %	82,1	88,4	87,0	
		■ 65-74 ans %	96,7	96,7	96,1	
		■ 75-84 ans %	76,3	87,3	85,4	
		■ 85 ans et plus %	35,6	56,3	57,6	
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)				
		■ Français %	97,6	88,2	83,7	
		■ Anglais %	1,9	9,4	10,3	
		■ Autres langues %	0,5	2,5	6,0	
10.	12.	Immigrant (1996) %	2,6	6,0	9,3	
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)				
		■ Moins d'une 9 ^e année %	10,5	16,3	18,1	
		■ 9 ^e -13 ^e année %	37,6	41,4	39,4	
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	36,9	31,4	30,3	
		■ Grade universitaire %	14,9	10,8	12,2	
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	67,2	(+)	59,6	55,0
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	6,8	(-)	9,3	11,8
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)				
		Total %	9,9	(-)	18,0	23,4
		■ Hommes %	9,1	(-)	16,4	21,6
		■ Femmes %	10,7	(-)	19,5	25,1
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)				
		■ Propriétaires %	13,1	15,3	16,3	
		■ Locataires %	29,7	40,4	42,3	
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	2,0	6,3	9,0	
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)				
		■ Moins de 2 ans %	13,9	11,9	13,6	
		■ 2-3 ans %	11,3	10,3	10,4	
		■ 4-9 ans %	30,4	29,7	28,7	
		■ 10 ans et plus %	44,5	48,1	47,3	
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	* 6,3	(<)	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	■	14,4	(-)	18,1 n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)				
		■ 3 fois et plus par semaine %	■	34,2		32,2 n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	■	35,0		31,9 n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	■	30,8	(-)	35,9 n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	■	22,8		30,6 n.c.
		■ Occasionnels %	■	* 6,8		3,8 n.c.
		■ Réguliers %	■	16,0	(<<)	26,8 n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	■	** 3,0	(-)	5,2 n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)				
		■ Cinq fois et plus %	■	13,4		15,8 n.c.
		■ Jamais %	■	19,2		21,6 n.c.
		■ Une à quatre fois %	■	67,4		62,6 n.c.

			des Seigneuries	Montérégie	Ensemble du Québec	
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)				
		■ Moins de 11 ans %	5,8	(-)	12,3	14,7
		■ 11 ans %	5,5	(-)	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	23,1	(+)	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	25,8		22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	39,7	(+)	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)				
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,8		0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	5,1		5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	6,5		7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	7,7	(-)	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)				
		Total (20-64 ans) %	23,6		27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	13,8		16,1	n.c.
		■ Obésité %	9,8		11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000				
		Total (0-17 ans)	2,4	(-)	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans)	3,1	(-)	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans)	* 1,7	(-)	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	25,4		23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	* 6,1	(-)	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	* 4,4		7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)				
		■ Soins physiques de courte durée %.....	S.O.	95,1	n.c.	
		■ Hébergement et soins de longue durée %	S.O.	88,1	n.c.	
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours				
		■ Soins physiques de courte durée.....	S.O.	6,7	n.c.	
		■ Hébergement et soins de longue durée.....	S.O.	191,8	n.c.	
33	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	S.O.	38,9	n.c.	
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	S.O.	96,4	n.c.	
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)				
		■ 24 heures %	S.O.	21,6	n.c.	
		■ 48 heures %	S.O.	3,5	n.c.	
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)				
		Total (65 ans et plus) %	10,8	7,8	8,3	
		■ Hommes (65 ans et plus) %.....	5,9	4,9	5,7	
		■ Femmes (65 ans et plus) %	14,3	9,8	10,1	
		■ 65-74 ans %	2,3	2,0	2,5	
		■ 75-84 ans %	18,9	10,9	11,3	
		■ 85 ans et plus %	51,5	39,2	37,3	
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	S.O.	34,1	n.c.	
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours.....	65,2	44,0	n.c.	
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000.....	64,8	(-)	96,3	n.c.

			des Seigneuries		Montréal	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....▶	21,0	(+)	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....▶	38,9	(-)	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....▶	44,8		51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)				
		■ Oui (15 ans et plus) %.....▶	80,2		77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....▶	* 19,8		22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....▶	2 348		3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....▶	58,2	(+)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)				
		Total (15 ans et plus) %.....▶	15,5		15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....▶	12,3		13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....▶	18,5		18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....▶	4,9		7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)				
		Total (15 ans et plus) %.....▶	19,8		20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000				
		Total.....▶	92,3	(-)	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)				
		Total (15 ans et plus) %.....	9,4	(<)	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	8,8		11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	0,6	(<)	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)				
		Total (15 ans et plus) %.....	* 4,5		5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000				
		Ensemble des causes.....	749,2		853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	71,4		72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	121,7		135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	70,1		89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	84,6		101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	53,7		62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	52,7		64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000				
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	50,3	(-)	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	* 3,7		5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	23,8		24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %				
		Ensemble des sièges.....	99		100	n.c.
		■ Estomac.....	73		100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	108		100	n.c.
		■ Pancréas.....	93		100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	114		100	n.c.
		■ Prostate.....	89		100	n.c.
		■ Poumon.....	110		100	n.c.
		■ Vessie.....	96		100	n.c.

			des Seigneuries	Montréal	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		<i>Ensemble des principales maladies</i>	171,2	197,8	n.c.
		■ Chlamydie.....	53,8	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....	* 9,1 (-)	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....	* 35,9	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....	39,9 (+)	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		<i>Total %</i>	3,8	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....	3,8	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....	3,9	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....	79,5 (+)	78,3	77,9
		■ Hommes.....	76,8 (+)	75,3	74,6
		■ Femmes.....	81,9 (+)	81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....	72,6	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		<i>Total (taux brut)</i>	395,0 (-)	632,0	728
		■ 0-4 ans.....	* 126,6	94,0	119
		■ 5-14 ans.....	** 9,7	14,0	18
		■ 15-24 ans.....	** 49,0	57,0	66
		■ 25-44 ans.....	* 68,4	98,0	116
		■ 45-64 ans.....	416,4	507,0	559
		■ 65-74 ans.....	1 897	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....	7 860,7	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 6,1	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 3,1	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 1,2	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 1,8	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	* 7,4	6,3	7,2
		Taux de mortinatalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 4,3	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes</i>	88 (-)	100	n.c.
		■ Tumeurs.....	89	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	91	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	83	100	n.c.
		■ Appareil digestif.....	93	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	80	100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de tumeurs</i>	89	100	n.c.
		■ Estomac.....	65	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	92	100	n.c.
		■ Pancréas.....	91	100	n.c.
		■ Poumon.....	97	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	95	100	n.c.
		■ Prostate.....	91	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de l'appareil circulatoire</i>	91	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....	101	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....	93	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....	101	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....	89	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....	89	100	n.c.

			des Seigneuries	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	83	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	54	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	95	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	80	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	65	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	108	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	* 86	100	n.c.
		■ Hommes.....	* 89	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 73	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	4 497 (-)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 569 (-)	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	840 (-)	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	117 (-)	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	115 (-)	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	402 (-)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 6,1	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	53,6 (-)	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	* 63,2 (-)	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 43,9	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	1,79	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	0,86	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse diffèrent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC CHAMPAGNAT DE LA VALLÉE DES FORTS



CLSC Champagnat de la Vallée des Forts

Les indicateurs sélectionnés servant à décrire le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC Champagnat de la Vallée des Forts attribuent une position moyennement défavorable à ce territoire en le classant globalement au 10^e rang sur les 14 attribués. Trente-sept des soixante indicateurs retenus pour tracer le portrait occupent une position défavorable par rapport à la région.

Les indicateurs sociodémographiques et économiques et surtout ceux relatifs à l'état de santé contribuent à l'aspect plus négatif de son bilan, le situant dans les derniers rangs pour chacune de ces deux dimensions.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 101 268 personnes, ce qui lui confère le 4^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Il occupe le 6^e rang pour le taux de croissance projeté entre 2001-2006, soit 3,1 %.

Sa population affiche un âge médian de 40 ans, plus élevé que celui de la région en 2001, lui conférant le 11^e rang.

Pour la plupart des indicateurs **sociodémographiques et économiques** le territoire occupe une position assez défavorable par rapport à la région, car pour seulement quatre des quinze indicateurs clés de ce domaine, il affiche une position favorable. Du côté des indicateurs qui affichent une position favorable, outre le taux d'accroissement de sa population, soulignons son taux supérieur de fécondité et sa faible proportion de personnes de 15 ans et plus qui perçoivent leur situation économique comme « pauvre ou très pauvre ».

Les **comportements et facteurs de risque** affichent un bilan plus favorable avec une bonne position pour huit des quatorze indicateurs concernés. Notons chez les personnes de 15 ans et plus : la faible proportion de sédentaires où le territoire occupe le 1^{er} rang, la faible proportion de consommation élevée d'alcool sur une base régulière ou occasionnelle, ainsi que l'absence de confident.

Le profil du territoire en termes des indicateurs de **services**, est favorable puisque sept des dix indicateurs retenus ici témoignent d'une position favorable par rapport à la valeur régionale. Le territoire performe très bien, entre autres, quant à la proportion plus élevée de personnes de 15 ans et plus qui disent connaître le service INFO-SANTÉ CLSC et de femmes de 50-69 ans qui ont subi une mammographie de dépistage depuis deux ans.

État de santé

Parmi les 21 indicateurs retenus pour décrire l'**état de santé**, le territoire occupe une position généralement défavorable, puisque dans 17 cas sur 21, les valeurs sont moins bonnes que la valeur régionale, lui conférant le 11^e rang sur les 12 attribués pour cette famille d'indicateurs.

Les deux indicateurs les plus favorables pour le territoire sont la mortalité périnatale et la mortalité infantile.

Positions relatives du CLSC Champagnat de la Vallée des Forts par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
Saint-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
Saint-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :

Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
Saint-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC Champagnat de la Vallée des Forts occupe globalement le 10^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC CHAMPAGNAT DE LA VALLÉE DES FORTS

Indicateurs

Défavorable ←————→ Favorable

N°	Noms	Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES																							
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	3,1	6																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	68,8	12																				
2	Âge médian (2001) (années)	40,0	11																				
3	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,73	8																				
4	Divorcés ou séparés (1996) (%)	8,0	16																				
5	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	19,1	14																				
7	Population vivant seule (1996) (%)	12,7	13																				
8	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé(1996) (%)	91,2	12																				
11	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	18,6	11																				
13	Taux de chômage (1996) (%)	10,7	15																				
14	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	19,0	14																				
14a	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	41,6	14																				
* 15	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	7,9	14																				
* 16	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	50,3	14																				
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre(2000) (%)	9,4	8																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE																							
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	21,0	17																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	27,9	1																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	29,7	9																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	4,0	5																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	13,9	5																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	13,1	12																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	6,0	13																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	7,8	17																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	8,5	10																				
27	Excès de poids (2000) (%)	30,4	14																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	6,6	16																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	22,0	7																				
30	Aucun confident (2000) (%)	7,7	5																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	6,4	7																				
DÉTERMINANTS : SERVICES																							
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	7,4	8																				
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	103,6	8																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	16,1	9																				
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	76,6	19																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	51,1	10																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	15,5	2																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	55,0	4																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	16,2	9																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	23,4	18																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	148,2	13																				
ÉTAT DE SANTÉ																							
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	15,5	16																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale(2000) (%)	5,9	13																				
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	994	17																				
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	71,1	17																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs(1994-1998) (%)	104	16																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	263,0	17																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	7,4	16																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	77,8	15																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	70,2	14																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	724	14																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	3,5	4																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	5,0	2																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	104	15																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	98	9																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	112	18																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	110	16																				
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	110	13																				
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	98	9																				
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	5522	12																				
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	5,2	15																				
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	95,3	15																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		Champagnat de la Vallée des Forts	Montréal	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	3,1	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	-1,8	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	3,3	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	1,5	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	101 268	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	18,9	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	68,2	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	13,0	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	6,3	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	8,6	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	7,9	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	22,8	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	9,5	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	29,5	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	25,2	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	64,2	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	7,5	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	4,4	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	1,1	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	46,7	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	27,7	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	19,0	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	68,8	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	40,0	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	100	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,73	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	24,7	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	44,4	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	16,9	15,6	13,9
	■ Séparés %	2,0	1,9	2,0
	■ Divorcés %	6,0	5,7	5,8
	■ Veufs %	6,0	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	56,9	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	24,1	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	19,1	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	15,9	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	11,6	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	17,3	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	20,3	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	12,7	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	12,4	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	13,0	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	10,4	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	21,4	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	35,3	35,8	38,7

			Champagnat de la Vallée des Forts	Monterégie	Ensemble du Québec
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	91,2	90,5	89,4
		■ Hommes (65 ans et plus) %	95,3	93,7	92,9
		■ Femmes (65 ans et plus) %	88,8	88,4	87,0
		■ 65-74 ans %	97,5	96,7	96,1
		■ 75-84 ans %	89,5	87,3	85,4
		■ 85 ans et plus %	52,4	56,3	57,6
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)			
		■ Français %	95,8	88,2	83,7
		■ Anglais %	3,7	9,4	10,3
		■ Autres langues %	0,5	2,5	6,0
10.	12.	Immigrant (1996) %	3,1	6,0	9,3
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)			
		■ Moins d'une 9 ^e année %	18,6	16,3	18,1
		■ 9 ^e -13 ^e année %	43,7	41,4	39,4
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	30,0	31,4	30,3
		■ Grade universitaire %	7,7	10,8	12,2
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	56,6	(-)	59,6
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	10,7	(+)	9,3
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)			
		Total %	19,0	(+)	18,0
		■ Hommes %	17,4	(+)	16,4
		■ Femmes %	20,6	(+)	19,5
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)			
		■ Propriétaires %	15,8	15,3	16,3
		■ Locataires %	41,6	40,4	42,3
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	7,9	6,3	n.c.
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)			
		■ Moins de 2 ans %	10,6	11,9	13,6
		■ 2-3 ans %	9,7	10,3	10,4
		■ 4-9 ans %	29,4	29,7	28,7
		■ 10 ans et plus %	50,3	48,1	47,3
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)			
		Total (15 et plus) %	* 9,4	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	21,0	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	36,0	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	36,1	31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	27,9	(+) (<<)	35,9
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	29,7	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 3,7	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	26,0	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 4,0	5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	13,9	15,8	n.c.
		■ Jamais %	20,1	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	66,0	62,6	n.c.

			Champagnat de la Vallée des Forts	Montréal	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	13,1	12,3	14,7
		■ 11 ans %	10,3	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	30,7	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	23,9	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	22,0 (-)	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,8	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	6,0	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	7,8	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	8,5	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	30,4	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	19,8	16,1	n.c.
		■ Obésité %	10,6	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	6,6 (+)	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	7,0 (+)	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	6,2 (+)	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	22,0	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 7,7	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 6,4	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	7,4	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	5,2	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	9,1	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	10,5	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	10,5	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	35,8	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	14,1	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	103,6	96,3	n.c.

			Champagnat de la Vallée des Forts	Montréal	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	16,1	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	76,6 (+)	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	51,1	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	84,5 (>)	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	* 15,5	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	3 629	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	55,0	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	16,2	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	13,2	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	18,9	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	8,4	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	23,4	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	148,2	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	15,5	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	11,5	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	4,0 (+)	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 5,9	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	993,8	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	65,5	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	157,8	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	121,9	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	122,5	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	71,7	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	80,0	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	71,1 (+)	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	7,1	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	25,3	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	104	100	n.c.
		■ Estomac.....	86	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	100	100	n.c.
		■ Pancréas.....	94	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	96	100	n.c.
		■ Prostate.....	126	100	n.c.
		■ Poumon.....	97	100	n.c.
		■ Vessie.....	123	100	n.c.

			Champagnat de la Vallée des Forts	Montréal	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		<i>Ensemble des principales maladies</i>	263,0 (+)	197,8	n.c.
		■ Chlamydie.....	123,4 (+)	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....	* 17,5	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....	52,5	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....	* 20,3	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		<i>Total %</i>	7,4	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....	7,5	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....	7,4	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....	77,8 (-)	78,3	77,9
		■ Hommes.....	74,9	75,3	74,6
		■ Femmes.....	80,7	81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....	70,2	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		<i>Total (taux brut)</i>	723,5 (+)	632,0	728
		■ 0-4 ans.....	** 77,0	94,0	119
		■ 5-14 ans.....	** 14,6	14,0	18
		■ 15-24 ans.....	** 71,1	57,0	66
		■ 25-44 ans.....	* 106,0	98,0	116
		■ 45-64 ans.....	528,0	507,0	559
		■ 65-74 ans.....	2376,8	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....	8720,6	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 3,5	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 1,9	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 0,7	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 0,9	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 5,0	6,3	7,2
		Taux de mortinatalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 3,1	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes</i>	104	100	n.c.
		■ Tumeurs.....	98	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	112	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	110	100	n.c.
		■ Appareil digestif.....	108	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	110	100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de tumeurs</i>	98	100	n.c.
		■ Estomac.....	90	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	116	100	n.c.
		■ Pancréas.....	88	100	n.c.
		■ Poumon.....	105	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	87	100	n.c.
		■ Prostate.....	76	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de l'appareil circulatoire</i>	112	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....	66	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....	113	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....	78	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....	136 (+)	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....	116	100	n.c.

		Champagnat de la Vallée des Forts	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %		
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	110	100
		■ Pneumonies et gripes.....	98	100
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	115	100
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %		
		Ensemble des causes par traumatismes non intentionnels.....	110	100
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	142	100
		■ Chutes accidentelles.....	88	100
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %		
		Total.....	* 98	100
		■ Hommes.....	* 98	100
		■ Femmes.....	** 96	100
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000		
		Ensemble des causes.....	5 522 (+)	5 276
		■ Tumeurs.....	1 931 (+)	1 763
		■ Appareil circulatoire.....	1 097	1 071
		■ Appareil respiratoire.....	208 (+)	178
		■ Appareil digestif.....	175 (+)	142
		■ Traumatismes non intentionnels.....	660 (+)	593
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)		
		Total (15 ans et plus).....	* 5,2	4,6
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000		
		Total.....	95,3	82,6
		■ Hommes.....	119,5	126,8
		■ Femmes.....	* 71,3 (+)	29,3
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)		
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	4,93	3,49
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)		
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	1,49	1,32

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse diffèrent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclues du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC VALLÉE DES PATRIOTES



CLSC Vallée des Patriotes

La population résidant sur le territoire du CLSC Vallée des Patriotes présente le second profil le plus favorisé par rapport à la région. Quarante-sept des soixante indicateurs retenus pour tracer le portrait occupent une position favorable par rapport à la région. C'est grâce d'abord aux indicateurs de l'état de santé qui occupent le premier rang sur les douze attribués, puis aux déterminants relatifs aux aspects sociodémographiques et économiques qui se situent au troisième rang sur treize attribués, et enfin, aux comportements et facteurs de risque (*ex æquo* avec deux autres territoires) ainsi qu'aux indicateurs de services qui affichent tous les deux un quatrième rang, sur dix dans le premier cas et sur six dans le second.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 97 623 personnes, ce qui lui confère le 5^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Il occupe le 4^e rang pour le taux de croissance projeté entre 2001-2006 de 3,8 %. Avec un âge médian de 40,6 ans en 2001, la population de ce territoire s'avère légèrement plus vieille que celle de la région lui conférant le 15 rang.

Au niveau des 15 indicateurs **sociodémographiques et économiques** on remarque que 13 d'entre eux sont favorables par rapport à la région. Par exemple, le territoire figure parmi les premiers rangs pour sa faible proportion de personnes sous scolarisées, de celles vivant sous le seuil de faible revenu, en chômage ou percevant leur situation économique comme étant « pauvre ou très pauvre ».

La position du territoire, du point de vue des indicateurs de **comportements et facteurs de risque**, est également favorable par rapport à la région bien que plus mitigée que ce n'est le cas pour les indicateurs décrits précédemment. Le territoire se situe dans les premiers rangs pour 9 des 14 indicateurs considérés. Les indicateurs suivants méritent d'être soulignés : la plus faible proportion de mères sous scolarisées, les bébés de faible poids, les naissances prématurées, le taux de prise en charge des jeunes dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse et la faible proportion de personnes de 15 ans et plus n'ayant aucun confident.

Finalement, le profil du territoire en termes des indicateurs de **services** est partagé à parts égales entre des positions favorables et défavorables puisque seulement cinq des dix indicateurs retenus témoignent d'une position favorable par rapport à la valeur régionale. Le territoire performe bien, en occupant le premier rang, en ce qui a trait aux décès évitables pour lesquels des soins appropriés, connus et efficaces existent et aussi au niveau de la mortalité évitable par la prévention ou la promotion. Il occupe aussi une position favorable, affichant un 5^e rang, en ce qui a trait aux hospitalisations évitables par un accès adéquat aux services de première ligne, à la proportion de femmes de 50-69 ans qui ont subi une mammographie de dépistage pour le cancer du sein sur une période de deux ans ainsi qu'à la faible proportion de personnes de 65 ans et plus vivant en institution de santé.

État de santé

Le bilan plutôt positif des déterminants trouve son écho au niveau de l'état de santé. En effet, parmi les 21 indicateurs retenus pour décrire l'état de santé, le territoire occupe une position favorable sur 20 d'entre eux, ce qui lui confère le premier rang pour cette famille d'indicateurs.

Certains indicateurs favorables méritent d'être mis en lumière : la plus faible proportion de personnes percevant leurs santé mentale comme « moyenne ou mauvaise » ou insatisfaite de leur vie sociale et la mortalité par suicide. Notons aussi, la mortalité associée au tabagisme, la mortalité infantile, l'espérance de vie à la naissance et en bonne santé ainsi qu'un faible taux d'années de vie perdues prématurément qui contribuent à le positionner favorablement.

Positions relatives du CLSC La Vallée des Patriotes par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
Saint-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
Saint-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :

Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
Saint-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ

(21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC La Vallée des Patriotes occupe globalement le 2^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC Vallée des Patriotes

Indicateurs

N°	Noms	Valeur	Rang	Défavorable ← → Favorable																			
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	3,8	4																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	46,1	4																				
2	Âge médian (2001) (années)	40,6	15																				
3	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,60	15																				
4	Divorcés ou séparés (1996) (%)	6,5	8																				
5	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	15,0	7																				
7	Population vivant seule (1996) (%)	7,5	4																				
8	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	92,9	6																				
11	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	10,2	1																				
13	Taux de chômage (1996) (%)	6,9	2																				
14	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	10,8	2																				
14a	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	36,7	5																				
* 15	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	3,0	2																				
* 16	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	42,7	4																				
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	6,4	2																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	16,4	6																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	33,3	4																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	30,6	12																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	7,1	19																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	18,6	18																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	5,6	1																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	4,4	1																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	5,8	2																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	7,9	4																				
27	Excès de poids (2000) (%)	28,1	10																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	2,7	3																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	24,0	12																				
30	Aucun confident (2000) (%)	7,4	3																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	7,3	9																				
DÉTERMINANTS : SERVICES				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	5,9	5																				
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	80,2	16																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	17,9	13																				
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	45,3	5																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	42,8	1																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	27,1	18																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	52,9	5																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	15,7	13																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	22,4	16																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	100,3	2																				
ÉTAT DE SANTÉ				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	13,1	6																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	3,7	1																				
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	778	4																				
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	58,8	6																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	97	6																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	152,5	4																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	5,0	3																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	79,0	3																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	72,7	2																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	491	4																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	3,4	2																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	6,0	6																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	95	4																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	97	7																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	94	5																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	93	7																				
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	108	12																				
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	63	1																				
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	4362	2																				
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	2,3	1																				
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	58,6	2																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

rang de la Montérégie rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		Vallée des Patriotes	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	3,8	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 0,6	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	2,3	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	2,1	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	97 623	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	19,5	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	71,5	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	9,0	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	6,8	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	8,9	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	7,8	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	23,5	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	9,8	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	29,6	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	28,1	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	67,5	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	5,6	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	2,7	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	0,7	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	39,8	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	27,3	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	12,6	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	46,1	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	40,6	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	98	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,60	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	24,5	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	49,5	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	15,3	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,7	1,9	2,0
	■ Divorcés %	4,8	5,7	5,8
	■ Veufs %	4,2	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	63,7	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	21,0	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	15,0	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	12,6	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	7,9	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	13,8	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	16,9	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	7,5	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	6,5	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	8,4	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	5,8	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	18,7	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	30,5	35,8	38,7

			Vallée des Patriotes	Montérégie	Ensemble du Québec	
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)				
		Total (65 ans et plus) %	92,9	90,5	89,4	
		■ Hommes (65 ans et plus) %	97,6	93,7	92,9	
		■ Femmes (65 ans et plus) %	88,2	88,4	87,0	
		■ 65-74 ans %	96,5	96,7	96,1	
		■ 75-84 ans %	89,2	87,3	85,4	
		■ 85 ans et plus %	74,1	56,3	57,6	
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)				
		■ Français %.....	92,8	88,2	83,7	
		■ Anglais %	6,5	9,4	10,3	
		■ Autres langues %.....	0,7	2,5	6,0	
10.	12.	Immigrant (1996) %	5,0	6,0	9,3	
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)				
		■ Moins d'une 9 ^e année %	10,2	16,3	18,1	
		■ 9 ^e -13 ^e année %	37,4	41,4	39,4	
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	36,2	31,4	30,3	
		■ Grade universitaire %	16,2	10,8	12,2	
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	64,3	(+)	59,6	55,0
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	6,9	(-)	9,3	11,8
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)				
		Total %	10,8	(-)	18,0	23,4
		■ Hommes %	9,3	(-)	16,4	21,6
		■ Femmes %.....	12,3	(-)	19,5	25,1
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)				
		■ Propriétaires %	13,7	15,3	16,3	
		■ Locataires %	36,7	40,4	42,3	
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	3,0	6,3	n.c.	
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)				
		■ Moins de 2 ans %.....	13,5	11,9	13,6	
		■ 2-3 ans %	11,2	10,3	10,4	
		■ 4-9 ans %	32,7	29,7	28,7	
		■ 10 ans et plus %	42,7	48,1	47,3	
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	* 6,4	(<)	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)					
		Total (15 ans et plus) %	■	* 16,4	18,1	n.c.	
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)					
		■ 3 fois et plus par semaine %	■	26,3	(<)	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	■	40,4	(>>)	31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	■	33,3		35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)					
		Total (15 ans et plus) %	■	30,6		30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	■	* 3,8		3,8	n.c.
		■ Réguliers %	■	26,8		26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)					
		Total (15 ans et plus) %	■	* 7,1		5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)					
		■ Cinq fois et plus %	■	18,6		15,8	n.c.
		■ Jamais %	■	12,9		21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	■	68,5		62,6	n.c.

			Vallée des Patriotes		Montérégie	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)				
		■ Moins de 11 ans %	5,6	(-)	12,3	14,7
		■ 11 ans %	6,7	(-)	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	24,4		27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	25,2		22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	38,0	(+)	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)				
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,6		0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	4,4		5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	5,8		7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	7,9	(-)	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)				
		Total (20-64 ans) %	28,1		27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	13,6		16,1	n.c.
		■ Obésité %	14,5		11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000				
		Total (0-17 ans) %	2,7	(-)	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	3,1	(-)	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	* 2,3	(-)	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	24,0		23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000) %				
		Total (15 ans et plus) %	* 7,4		8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) %				
		Total (15 ans et plus) %	* 7,3		7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)				
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.		95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.		88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours				
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.		6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.		191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.		38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.		96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)				
		■ 24 heures %	s.o.		21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.		3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)				
		Total (65 ans et plus) %	5,9		7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	3,8		4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	7,6		9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	1,7		2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	8,4		10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	34,3		39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.		34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	31,3		44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	80,2	(-)	96,3	n.c.

			Vallée des Patriotes	Monterégie	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	17,9	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	45,3 (-)	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	* 42,8	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	72,9 (<)	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	* 27,1	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	2 762	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	52,9 (+)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	15,7	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	12,8	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	18,5	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	6,8	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (5 ans et plus) %.....	22,4	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	100,3 (-)	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	13,1	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	11,3	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	1,8	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 3,7	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	777,7	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	90,6	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	151,9	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	91,9	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	110,3	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	68,3	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	76,9	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	58,8	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	5,3	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	24,9	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	97	100	n.c.
		■ Estomac.....	96	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	101	100	n.c.
		■ Pancréas.....	112	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	100	100	n.c.
		■ Prostate.....	103	100	n.c.
		■ Poumon.....	87	100	n.c.
		■ Vessie.....	100	100	n.c.

			Vallée des Patriotes	Montérégie	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		<i>Ensemble des principales maladies</i>	152,5	(-)	197,8
		■ Chlamydirose.....	* 37,2	(-)	69,8
		■ Hépatite C.....	** 9,3	(-)	19,8
		■ Infection à campylobacter.....	* 30,2		36,3
		■ Coqueluche.....	* 31,0		22,6
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		<i>Total %</i>	5,0		6,4
		■ Hommes %.....	4,9		6,3
		■ Femmes %.....	5,0		6,5
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....	79,0	(+)	78,3
		■ Hommes.....	76,4	(+)	75,3
		■ Femmes.....	81,6		81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....	72,7		71,2
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		<i>Total (taux brut)</i>	490,8	(-)	632,0
		■ 0-4 ans.....	** 60,1		94,0
		■ 5-14 ans.....	** 13,6		14,0
		■ 15-24 ans.....	** 58,7		57,0
		■ 25-44 ans.....	* 80,2		98,0
		■ 45-64 ans.....	387,2	(-)	507,0
		■ 65-74 ans.....	2 148,7		2377,0
		■ 75 ans et plus.....	8 479,8		8111,0
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 3,4		4,4
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 2,2		2,3
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 0,8		0,8
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 0,4		1,3
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 6,0		6,3
		Taux de mortinatalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 3,8		4,0
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes</i>	95		100
		■ Tumeurs.....	97		100
		■ Appareil circulatoire.....	94		100
		■ Appareil respiratoire.....	93		100
		■ Appareil digestif.....	106		100
		■ Traumatismes non intentionnels.....	108		100
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de tumeurs</i>	97		100
		■ Estomac.....	116		100
		■ Côlon et rectum.....	96		100
		■ Pancréas.....	112		100
		■ Poumon.....	78		100
		■ Sein chez la femme.....	107		100
		■ Prostate.....	153		100
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de l'appareil circulatoire</i>	94		100
		■ Maladies hypertensives.....	125		100
		■ Cardiopathies ischémiques.....	95		100
		■ Insuffisance cardiaque.....	79		100
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....	98		100
		■ Maladies des artères.....	93		100

			Vallée des Patriotes	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	93	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	103	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	83	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	108	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	112	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	123	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	** 63	100	n.c.
		■ Hommes.....	** 60	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 75	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	4 362 (-)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 543 (-)	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	859 (-)	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	134 (-)	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	101 (-)	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	647 (+)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %s.....	** 2,3 (-)	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	58,6 (-)	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	* 71,7 (-)	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 45,5	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	2,58	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	0,89	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC DU RICHELIEU



CLSC Du Richelieu

La population résidant sur le territoire du CLSC Du Richelieu présente un profil qui le classe globalement au 5^e rang sur les 14 attribués, 39 des 60 indicateurs retenus pour tracer le portrait occupent une position favorable par rapport à la région. C'est grâce surtout aux déterminants comportements et facteurs de risque ainsi que ceux liés aux services où il occupe dans les deux cas le 3^e rang sur 10 attribués dans le premier cas et sur 6 dans le second.

Les indicateurs sociodémographiques et économiques lui octroient un 4^e rang (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur les 13 attribués, tandis que le bilan de l'état de santé s'avère plus partagé et place quand même le territoire au 5^e rang sur les 12 rangs attribués *ex æquo* avec Kateri et Saint-Hubert.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 52 764 personnes, ce qui lui confère le 14^e rang parmi les 19, territoires en termes d'effectifs de population. Il occupe le 17^e rang *ex æquo* avec le territoire du CLSC Seigneurie-de-Beauharnois pour le taux de croissance projeté entre 2001-2006 et figure parmi le groupe de cinq CLSC qui affiche une diminution de leur population avec une baisse de 1,8 %.

En 2001, son âge médian de 40,8 est assez élevé et lui confère le 16^e rang.

Le volet des indicateurs **sociodémographiques et économiques** affiche une position favorable pour 11 des 15 indicateurs. La position est passablement favorable par exemple pour : le taux de bénéficiaires de l'assistance-emploi et celui des bénéficiaires qui reçoivent cette aide depuis dix ans ou plus ainsi que pour le taux de fécondité.

Le territoire se situe dans une position très avantageuse pour dix des quatorze indicateurs de **comportements et facteurs de risque** soit par exemple : la faible proportion de personnes de 15 ans et plus déclarant n'avoir aucun confident, ayant de « moyennes ou mauvaises » habitudes alimentaires, souffrant d'insécurité alimentaire, de fumeurs actuels et de nouveau-nés de faible poids.

Finalement, le profil du territoire en termes des indicateurs de **services**, avec six indicateurs sur dix présentant une position favorable par rapport à la région, contribue lui aussi à la position globale relativement bonne du territoire. Le territoire performe bien, entre autres, en ce qui a trait aux décès évitables par la prévention ou par la promotion, soit par un accès aux services appropriés, connus et efficaces existent, ainsi qu'une proportion plus élevée de personnes connaissant le service INFO-SANTÉ CLSC.

État de santé

Parmi les 21 indicateurs retenus pour décrire l'**état de santé**, le territoire occupe une position favorable dans 12 cas, ce qui lui confère un bon bilan.

Certains des indicateurs les plus favorables méritent d'être mis en lumière : la mortalité infantile, la proportion de personnes avec une incapacité de long terme, le taux des années de vies perdues prématurément ainsi que le taux de mortalité associée au tabagisme.

Positions relatives du CLSC Du Richelieu par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
Saint-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
Saint-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :


Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
Saint-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC Du Richelieu occupe globalement le 5^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC DU RICHELIEU

Indicateurs				Défavorable ← → Favorable																			
N°	Noms	Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES																							
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	-1,8	17																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	51,0	7																				
2	Âge médian (2001) (années)	40,8	16																				
3	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,86	4																				
4	Divorcés ou séparés (1996) (%)	6,8	9																				
5	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	16,5	8																				
7	Population vivant seule (1996) (%)	9,1	7																				
8	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	87,2	17																				
11	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	15,7	9																				
13	Taux de chômage (1996) (%)	8,4	6																				
14	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	16,5	7																				
14a	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	37,1	6																				
* 15	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	4,5	5																				
* 16	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	41,2	2																				
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	11,7	13																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE																							
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	14,6	2																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	39,8	14																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	28,6	5																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	4,8	7																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	15,5	9																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	11,2	7																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	5,5	5																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	6,8	6																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	9,0	12																				
27	Excès de poids (2000) (%)	33,4	19																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	4,3	9																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	27,5	18																				
30	Aucun confident (2000) (%)	4,2	1																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	4,6	2																				
DÉTERMINANTS : SERVICES																							
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	9,5	13																				
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	89,5	13																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	15,7	7																				
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	56,4	9																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	46,8	6																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	18,9	5																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	47,6	12																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	14,9	17																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	20,0	9																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	117,0	4																				
ÉTAT DE SANTÉ																							
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	14,3	10																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	4,8	6																				
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	883	11																				
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	67,5	14																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	101	12																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	192,7	12																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	5,2	4																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	78,3	6																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	70,8	10																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	572	7																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	3,4	3																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	6,3	9																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	101	13																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	98	8																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	103	14																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	98	10																				
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	106	11																				
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	96	8																				
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	5034	5																				
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	4,7	12																				
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	70,1	5																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

□ rang de la Montérégie ■ rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		Du Richelieu	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	- 1,8	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 3,5	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	0,3	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	1,4	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	52 764	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	20,3	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	69,3	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	10,4	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	6,6	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	9,3	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	8,7	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	24,6	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	9,9	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	30,4	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	24,7	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	65,0	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	6,3	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	3,2	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	0,9	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	44,3	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	29,3	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	14,9	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	51,0	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	40,8	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	103	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,86	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	23,1	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	45,8	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	19,5	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,7	1,9	2,0
	■ Divorcés %	5,1	5,7	5,8
	■ Veufs %	4,7	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	56,6	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	26,6	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	16,5	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	14,6	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	9,0	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	16,5	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	21,9	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	9,1	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	9,1	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	9,1	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	7,3	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	17,6	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	35,7	35,8	38,7

			Du Richelieu	Montréal	Ensemble du Québec	
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)				
		Total (65 ans et plus) %	87,2	90,5	89,4	
		■ Hommes (65 ans et plus) %	88,9	93,7	92,9	
		■ Femmes (65 ans et plus) %	85,9	88,4	87,0	
		■ 65-74 ans %	95,3	96,7	96,1	
		■ 75-84 ans %	80,9	87,3	85,4	
		■ 85 ans et plus %	52,3	56,3	57,6	
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)				
		■ Français %	95,3	88,2	83,7	
		■ Anglais %	4,1	9,4	10,3	
		■ Autres langues %	0,6	2,5	6,0	
10.	12.	Immigrant (1996) %	3,0	6,0	9,3	
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)				
		■ Moins d'une 9 ^e année %	15,7	16,3	18,1	
		■ 9 ^e -13 ^e année %	44,3	41,4	39,4	
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	30,7	31,4	30,3	
		■ Grade universitaire %	9,2	10,8	12,2	
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	62,7	(+)	59,6	55,0
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	8,4	(-)	9,3	11,8
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)				
		Total %	16,5	(-)	18,0	23,4
		■ Hommes %	15,6	(-)	16,4	21,6
		■ Femmes %	17,5	(-)	19,5	25,1
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)				
		■ Propriétaires %	16,2	15,3	16,3	
		■ Locataires %	37,1	40,4	42,3	
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	4,5	6,3	n.c.	
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)				
		■ Moins de 2 ans %	12,0	11,9	13,6	
		■ 2-3 ans %	12,2	10,3	10,4	
		■ 4-9 ans %	34,6	29,7	28,7	
		■ 10 ans et plus %	41,2	48,1	47,3	
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)				
		Total (15 ans et plus) %	* 11,7	10,4	n.c.	

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 14,6	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	30,6	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	29,6	31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	39,8	35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	28,6	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 2,9	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	25,7	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	** 4,8	5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	15,5	15,8	n.c.
		■ Jamais %	24,5	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	60,1	62,6	n.c.

			Du Richelieu	Montérégie	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	11,2	12,3	14,7
		■ 11 ans %	9,8	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	28,9	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	24,1	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	26,0	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,7	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	5,5	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	6,8	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	9,0	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	33,4	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	18,0	16,1	n.c.
		■ Obésité %	15,4	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	4,3	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	* 5,0	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	* 3,7	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	27,5	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 4,2 (<)	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)	* 4,6	7,3	n.c.
		Total (15 ans et plus) %			

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	9,5	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	6,2	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	11,8	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	2,4	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	13,0	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	45,0	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	23,3	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	89,5	96,3	n.c.

			Du Richelieu	Montréal	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	15,7	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	56,4	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	* 46,8	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	81,1	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	* 18,9	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	3 981	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	47,6	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	14,9	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	12,9	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	17,0	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	7,4	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 20,0	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	117,0	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	14,3	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	11,1	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	3,2	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	** 4,8	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	883,3	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	45,6	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	100,8	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	57,6	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	73,2	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	45,9	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	46,8	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	67,5	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	* 7,6	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	23,9	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	101	100	n.c.
		■ Estomac.....	117	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	102	100	n.c.
		■ Pancréas.....	109	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	112	100	n.c.
		■ Prostate.....	112	100	n.c.
		■ Poumon.....	99	100	n.c.
		■ Vessie.....	87	100	n.c.

			Du Richelieu	Montérégie	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		<i>Ensemble des principales maladies</i>)	192,7	197,8	n.c.
		■ Chlamydiae.....)	* 66,5	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....)	* 19,0	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....)	* 39,5	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....)	* 21,3	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		<i>Total %</i>)	5,2	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....)	5,2	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....)	5,2	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....)	78,3	78,3	77,9
		■ Hommes.....)	75,3	75,3	74,6
		■ Femmes.....)	81,5	81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....)	70,8	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		<i>Total (taux brut)</i>)	571,6	632,0	728
		■ 0-4 ans.....)	** 79,0	94,0	119
		■ 5-14 ans.....)	** 22,6	14,0	18
		■ 15-24 ans.....)	** 47,6	57,0	66
		■ 25-44 ans.....)	* 85,5	98,0	116
		■ 45-64 ans.....)	495,2	507,0	559
		■ 65-74 ans.....)	2 318,7	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....)	8 985,3	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 3,4	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 2,3	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 0,8	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 1,1	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....)	** 6,3	6,3	7,2
		Taux de mortinatalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....)	** 4,0	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes</i>)	101	100	n.c.
		■ Tumeurs.....)	98	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....)	103	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....)	98	100	n.c.
		■ Appareil digestif.....)	95	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....)	106	100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de tumeurs</i>)	98	100	n.c.
		■ Estomac.....)	136	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....)	93	100	n.c.
		■ Pancréas.....)	105	100	n.c.
		■ Poumon.....)	93	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....)	100	100	n.c.
		■ Prostate.....)	71	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de l'appareil circulatoire</i>)	103	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....)	148	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....)	105	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....)	90	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....)	98	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....)	109	100	n.c.

			Du Richelieu	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	98	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	81	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	109	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	106	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	105	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	121	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	** 96	100	n.c.
		■ Hommes.....	** 98	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 80	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	5 034 (-)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 738	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	1 014	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	110 (-)	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	84 (-)	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	653	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	** 4,7	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	* 70,1	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	* 87,9	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 51,9	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	3,36	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	0,98	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC DU HAVRE



CLSC du Havre

Les indicateurs sélectionnés pour décrire le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC du Havre classe globalement ce dernier au 13^e rang sur 14 attribués. Quarante-quatre des soixante indicateurs sont positionnés défavorablement par rapport à la région.

Les bilans passablement négatifs à l'intérieur de chacun des déterminants sociodémographiques et économiques où le bilan occupe l'avant-dernier rang. Les déterminants relatifs aux comportements et facteurs de risque, ceux des services ainsi que l'état de santé confèrent tous au territoire une position désavantageuse par rapport à la région.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 50 773 personnes, ce qui lui confère le 15^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Avec une diminution de son taux de croissance projeté entre 2001-2006 de 4,7 %, le plus élevé de la région, il occupe le dernier rang.

En 2001, son âge médian, également le plus élevée de la région, est de 47,1. Il occupe ainsi le dernier rang avec la population la plus vieille de la région à ce chapitre.

Sur 13 des 15 indicateurs **sociodémographiques et économiques**, le territoire se positionne de façon défavorable par rapport à la région. Dans ce domaine, il occupe le 12^e rang sur les 13 attribués.

La proportion de personnes de 65 ans et plus vivant en ménages privés et celle des adultes divorcés ou séparés sont les seuls indicateurs favorable du territoire.

Le bilan des **comportements et facteurs de risque** s'avère négatif bien qu'à un moindre degré, puisque les valeurs sur neuf des quatorze indicateurs lui confèrent une position plus défavorable que celle de la région, ce qui lui attribue le 7^e rang (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur les 10 attribués dans ce domaine.

Soulignons les indicateurs qui occupent une position particulièrement défavorable : chez les nouveau-nés, une proportion plus élevée de bébés prématurés ou de faible poids; chez les jeunes de 0-17 ans, un taux supérieur à la région en ce qui a trait à la prise en charge dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse; chez les personnes de 15 ans et plus, une proportion supérieure de sédentaires, qui qualifient leurs habitudes alimentaires de « moyennes ou mauvaises » ou qui rapportent n'avoir aucun confident.

Le bilan des indicateurs de **services** est également négatif bien que moins que ceux affichés dans les deux domaines précédents, avec six des dix indicateurs concernés conférant au territoire une position défavorable par rapport à la région. Ce qui le situe au 5^e rang (*ex æquo* avec plusieurs autres territoires) sur les six rangs attribués.

Les principaux indicateurs qui lui sont le plus défavorables sont la mortalité évitable par la prévention et la promotion ou par des soins appropriés, la proportion inférieure de personnes de 15 ans et plus qui connaissent le service INFO-SANTÉ CLSC, le taux supérieur de césariennes et le taux d'hospitalisations évitable par des services appropriés de première ligne.

État de santé

Finalement, le bilan au niveau des indicateurs de l'**état de santé** figure parmi les plus négatifs de la région, avec 16 des 21 indicateurs occupant une position défavorable par rapport à la région. Ce qui lui confère le 10^e rang sur les 12 attribués *ex æquo* avec deux autres territoires.

Soulignons les indicateurs parmi les plus défavorables : la plupart des taux de mortalité incluant celui associé au tabagisme, ainsi que le taux des années de vie perdues prématurément qui sont supérieurs à celui de la région, et par voie de conséquence, les valeurs inférieures au niveau de l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie en bonne santé.

Positions relatives du CLSC du Havre par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
St-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommerai	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommerai	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
St-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :

Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommerai	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
St-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommerai	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC du Havre occupe globalement le 13^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC DU HAVRE

Indicateurs				Défavorable ← → Favorable																			
N°	Noms	Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DÉTERMINANTS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES																							
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	-4,7	20																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	114,2	20																				
3	Âge médian (2001) (années)	47,1	20																				
4	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,42	18																				
5	Divorcés ou séparés (1996) (%)	7,3	11																				
7	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	19,9	16																				
8	Population vivant seule (1996) (%)	13,0	14																				
11	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	92,0	8																				
13	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	21,0	15																				
14	Taux de chômage (1996) (%)	13,4	20																				
14a	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	21,5	17																				
15	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	47,8	20																				
16	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	12,0	19																				
17	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	55,9	19																				
18	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	10,5	10																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE																							
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	20,7	16																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	41,6	17																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	26,9	4																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	4,8	8																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	16,0	11																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	12,8	11																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	6,7	17																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	9,3	20																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	8,0	6																				
27	Excès de poids (2000) (%)	30,3	13																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	7,0	18																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	18,9	3																				
30	Aucun confident (2000) (%)	10,9	16																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	5,5	4																				
DÉTERMINANTS : SERVICES																							
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	7,8	10																				
38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	131,9	2																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	19,7	18																				
40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	72,1	18																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	62,1	17																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	27,3	19																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	56,3	2																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	17,8	2																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	20,2	11																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	194,6	20																				
ÉTAT DE SANTÉ																							
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	15,1	14																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	5,3	9																				
50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	956	16																				
51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	58,8	7																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	111	20																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	188,1	10																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	6,8	11																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	77,2	18																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	70,3	12																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	847	18																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	5,8	17																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	7,1	14																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	106	16																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	108	17																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	102	12																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	89	5																				
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	173	20																				
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	120	16																				
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	6469	19																				
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	4,5	6																				
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	111,9	18																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

rang de la Montérégie rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		du Havre	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	- 4,7	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 1,9	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	- 4,0	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	1,2	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	50 773	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	14,2	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	69,6	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	16,2	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	4,8	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	6,2	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	6,8	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	17,8	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	9,7	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	25,9	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	30,4	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	66,0	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	9,2	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	5,4	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	1,5	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	43,6	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	20,4	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	23,2	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	114,2	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	47,1	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	97	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,42	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	25,6	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	46,5	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	13,6	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,6	1,9	2,0
	■ Divorcés %	5,7	5,7	5,8
	■ Veufs %	7,0	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	60,0	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	19,8	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	19,9	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	17,5	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	19,5	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	17,0	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	15,7	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	13,0	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	12,4	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	13,7	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	9,7	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	26,3	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	37,0	35,8	38,7

			du Havre	Montréal	Ensemble du Québec
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	92,0	90,5	89,4
		■ Hommes (65 ans et plus) %	93,4	93,7	92,9
		■ Femmes (65 ans et plus) %	91,3	88,4	87,0
		■ 65-74 ans %	96,9	96,7	96,1
		■ 75-84 ans %	93,9	87,3	85,4
		■ 85 ans et plus %	45,0	56,3	57,6
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)			
		■ Français %	99,4	88,2	83,7
		■ Anglais %	0,4	9,4	10,3
		■ Autres langues %	0,1	2,5	6,0
10.	12.	Immigrant (1996) %	1,7	6,0	9,3
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)			
		■ Moins d'une 9 ^e année %	21,0	16,3	18,1
		■ 9 ^e -13 ^e année %	42,7	41,4	39,4
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	30,2	31,4	30,3
		■ Grade universitaire %	6,0	10,8	12,2
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	49,6	(-)	59,6
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	13,4	(+)	9,3
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)			
		Total %	21,5	(+)	18,0
		■ Hommes %	19,0	(+)	16,4
		■ Femmes %	23,9	(+)	19,5
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)			
		■ Propriétaires %	14,1	15,3	16,3
		■ Locataires %	47,8	40,4	42,3
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	12,0	6,3	n.c.
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)			
		■ Moins de 2 ans %	9,4	11,9	13,6
		■ 2-3 ans %	8,1	10,3	10,4
		■ 4-9 ans %	26,7	29,7	28,7
		■ 10 ans et plus %	55,9	48,1	47,3
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)▶			
		Total (15 ans et plus) %	* 10,5	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	20,7	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	32,1	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	26,3	31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	41,6	35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	26,9	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	** 1,4	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	25,5	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 4,8	5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	16,0	15,8	n.c.
		■ Jamais %	19,2	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	64,7	62,6	n.c.

			du Havre	Montérégie	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	12,8	12,3	14,7
		■ 11 ans %	9,9	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	32,6	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	25,6	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	19,1	26,0	25,1
			(-)		
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,7	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	* 6,7	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	9,3	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	8,0	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	30,3	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	17,7	16,1	n.c.
		■ Obésité %	12,6	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	7,0	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	* 6,4	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	* 7,7	4,2	n.c.
			(+)		
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	18,9	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 10,9	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 5,5	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	7,8	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	5,1	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	9,5	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	2,5	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	10,4	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	45,9	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	40,6	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	131,9	96,3	n.c.
			(+)		

			du Havre	Monterégie	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	19,7	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	72,1 (+)	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	* 62,1	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	72,7	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	* 27,3	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	4 445	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	56,3 (+)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	17,8	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	14,5	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	20,7	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	8,0	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	20,2	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	194,6 (+)	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	15,1	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	12,2	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	2,9	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 5,3	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	955,8	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	69,7	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	151,6	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	111,5	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	127,2	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	63,8	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	66,0	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	58,8	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	* 6,3	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	24,7	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	111	100	n.c.
		■ Estomac.....	142	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	100	100	n.c.
		■ Pancréas.....	100	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	96	100	n.c.
		■ Prostate.....	167 (+)	100	n.c.
		■ Poumon.....	100	100	n.c.
		■ Vessie.....	83	100	n.c.

			du Havre	Montérégie	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		<i>Ensemble des principales maladies</i>)	188,1	197,8	n.c.
		■ Chlamydirose.....)	* 60,7	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....)	* 23,7	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....)	* 48,8	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....)	* 18,3	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		<i>Total %</i>)	6,8	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....)	7,0	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....)	6,5	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....)	77,2	(-) 78,3	77,9
		■ Hommes.....)	73,5	(-) 75,3	74,6
		■ Femmes.....)	81,1	81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....)	70,3	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		<i>Total (taux brut)</i>)	847,4	(+) 632,0	728
		■ 0-4 ans.....)	** 141,7	94,0	119
		■ 5-14 ans.....)	** 13,0	14,0	18
		■ 15-24 ans.....)	** 88,5	57,0	66
		■ 25-44 ans.....)	* 141,3	98,0	116
		■ 45-64 ans.....)	556,9	507,0	559
		■ 65-74 ans.....)	2 465,2	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....)	8 132,0	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 5,8	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 3,1	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 0,4	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 2,2	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....)	** 7,1	6,3	7,2
		Taux de mortinatalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....)	** 4,0	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes</i>)	106	100	n.c.
		■ Tumeurs.....)	108	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....)	102	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....)	89	100	n.c.
		■ Appareil digestif.....)	98	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....)	173	(+) 100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de tumeurs</i>)	108	100	n.c.
		■ Estomac.....)	127	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....)	106	100	n.c.
		■ Pancréas.....)	108	100	n.c.
		■ Poumon.....)	108	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....)	123	100	n.c.
		■ Prostate.....)	123	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de l'appareil circulatoire</i>)	102	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....)	167	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....)	85	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....)	139	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....)	109	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....)	121	100	n.c.

			du Havre	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998)			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	89	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	95	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	93	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	173 (+)	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	173	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	126	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	* 120	100	n.c.
		■ Hommes.....	** 118	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 129	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	6 469 (+)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 844	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	1 221 (+)	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	156	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	150	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	1 149 (+)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 4,5	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	111,9	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	153,1	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 71,8 (+)	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	s.o.	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	s.o.	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC DES MASKOUTAINS



CLSC des Maskoutains

Les indicateurs sélectionnés servant à décrire le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC des Maskoutains classent globalement ce dernier au 9^e rang sur les 14 attribués *ex æquo* avec La Pommeraie. Vingt-cinq des soixante indicateurs retenus pour tracer le portrait occupent une position favorable par rapport à la région. Il est le second des 11 territoires de CLSC, après Jardin du Québec, présentant un bilan plutôt négatif avec plus d'indicateurs défavorables que favorables. Sa position résulte du bilan un peu plus favorable qu'il affiche au niveau des comportements et facteurs de risque où il occupe le 5^e rang (*ex æquo* avec le CLSC Champagnat de la Vallée des Forts) sur les 10 attribués. Son bilan est très partagé quant aux déterminants des services où il occupe le 4^e rang (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur les 6 rangs attribués, mais aussi d'un profil défavorable en ce qui a trait aux indicateurs sociodémographiques et économiques où il occupe le 10^e rang (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur les 13 attribués.

Pour l'état de santé, il se situe au 7^e rang (*ex æquo* avec le CLSC Longueuil-Ouest) sur les 12 attribués avec un bilan légèrement négatif.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 79 559 personnes, ce qui lui confère le 9^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Il occupe un rang « défavorable », soit le 15^e rang pour le taux de croissance projeté entre 2001-2006, soit une baisse de 0,4 %, faisant partie des cinq territoires qui présentent une diminution de leur population entre ces années.

En 2001, son âge médian de 39,7 ans, voisin de celui de la région, lui confère le 10^e rang.

C'est par rapport aux indicateurs **sociodémographiques et économiques** que le territoire occupe une moins bonne position, car pour seulement 4 des 15 indicateurs clés de ce domaine, il affiche un rang favorable. Deux de ces indicateurs affichent une position plus favorable encore, soit le taux de chômage et la proportion plus faible de locataires qui doivent consacrer 30 % ou plus de leur revenu pour se loger.

Les **comportements et facteurs de risque** affichent un bilan plus favorable avec une bonne position pour huit des quatorze indicateurs concernés, ceci particulièrement pour : la faible proportion de personnes de 15 ans et plus présentant une consommation occasionnelle élevée d'alcool sur une base régulière ou occasionnelle, ayant pris des drogues durant leur vie et de fumeurs actuels.

Le profil du territoire en termes des indicateurs de **services**, est mitigé puisque cinq des dix indicateurs retenus ici témoignent d'une position favorable par rapport à la valeur régionale. Le territoire performe bien, entre autres, pour le taux de césariennes où il affiche le taux le plus faible de la région, pour la proportion plus élevée de personnes qui prodiguent des soins aux personnes de 65 ans et plus sur une base bénévole ainsi que pour le taux plus faible de personnes de 15 ans et plus se disant insatisfaites des services de santé de leur région.

État de santé

Parmi les 21 indicateurs retenus pour décrire l'**état de santé**, le territoire occupe le 7^e rang sur les 12 attribués, *ex æquo* avec le CLSC Longueuil-Ouest. Huit indicateurs sur vingt-et-un lui sont favorables. Certains de ces derniers méritent d'être mis en lumière : l'incidence plus faible de cancers, la mortalité par maladie cardiovasculaire et l'espérance de vie à la naissance.

Positions relatives du CLSC des Maskoutains par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
Saint-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
Saint-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :

Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
Saint-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC des Maskoutains occupe globalement le 9^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC DES MASKOUTAINS

Indicateurs

Indicateurs				Défavorable ← → Favorable																			
N°	Noms	Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES																							
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	-0,4	15																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	81,0	16																				
3	Âge médian (2001) (années)	39,7	10																				
4	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,62	13																				
5	Divorcés ou séparés (1996) (%)	7,4	12																				
6	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	19,5	15																				
7	Population vivant seule (1996) (%)	13,2	16																				
8	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	82,5	20																				
11	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	22,3	16																				
13	Taux de chômage (1996) (%)	8,3	5																				
14	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	18,0	10																				
14a	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	37,2	7																				
* 15	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	7,5	12																				
* 16	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	49,9	13																				
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	12,1	14																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE																							
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	17,0	8																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	40,8	16																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	27,0	3																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	2,9	1																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	13,1	2																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	15,0	13																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	6,3	14																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	6,6	5																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	9,3	15																				
27	Excès de poids (2000) (%)	30,8	15																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	5,1	12																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	15,1	2																				
30	Aucun confident (2000) (%)	8,4	7																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	6,2	6																				
DÉTERMINANTS : SERVICES																							
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	10,3	16																				
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	100,7	10																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	13,4	1																				
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	65,1	13																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	49,4	8																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	26,3	17																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	43,3	16																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	16,9	5																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	15,7	5																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	140,0	11																				
ÉTAT DE SANTÉ																							
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	16,7	18																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	6,3	15																				
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	948	15																				
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	65,6	13																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	92	2																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	279,3	20																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	6,7	10																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	78,5	4																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	71,2	6																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	811	15																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	4,3	9																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	6,7	12																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	98	6																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	96	6																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	94	4																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	104	14																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

rang de la Montérégie

rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		des Maskoutains	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	- 0,4	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 1,6	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	0,4	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	0,8	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	79 559	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	17,5	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	68,3	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	14,2	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	6,1	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	7,7	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	7,6	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	21,4	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	10,2	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	28,8	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	25,5	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	64,5	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	7,4	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	4,9	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	1,8	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	46,4	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	25,6	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	20,7	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	81,0	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	39,7	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	96	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,62	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	27,1	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	43,0	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	16,4	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,6	1,9	2,0
	■ Divorcés %	5,8	5,7	5,8
	■ Veufs %	6,1	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	56,7	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	23,6	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	19,5	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	16,5	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	11,9	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	18,4	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	19,2	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	13,2	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	11,9	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	14,4	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	10,7	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	23,1	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	35,6	35,8	38,7

			des Maskoutains	Montréal	Ensemble du Québec
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	82,5	90,5	89,4
		■ Hommes (65 ans et plus) %	92,6	93,7	92,9
		■ Femmes (65 ans et plus) %	77,0	88,4	87,0
		■ 65-74 ans %	93,4	96,7	96,1
		■ 75-84 ans %	78,8	87,3	85,4
		■ 85 ans et plus %	38,1	56,3	57,6
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)			
		■ Français %	99,0	88,2	83,7
		■ Anglais %	0,5	9,4	10,3
		■ Autres langues %	0,5	2,5	6,0
10.	12.	Immigrant (1996) %	1,6	6,0	9,3
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)			
		■ Moins d'une 9 ^e année %	22,3	16,3	18,1
		■ 9 ^e -13 ^e année %	44,0	41,4	39,4
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	26,4	31,4	30,3
		■ Grade universitaire %	7,2	10,8	12,2
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	58,0	(-)	59,6
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	8,3	(-)	9,3
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)			
		Total %	18,0	18,0	23,4
		■ Hommes %	16,4	16,4	21,6
		■ Femmes %	19,5	19,5	25,1
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)			
		■ Propriétaires %	14,9	15,3	16,3
		■ Locataires %	37,2	40,4	42,3
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	7,5	6,3	n.c.
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)			
		■ Moins de 2 ans %	11,7	11,9	13,6
		■ 2-3 ans %	10,0	10,3	10,4
		■ 4-9 ans %	28,4	29,7	28,7
		■ 10 ans et plus %	49,9	48,1	47,3
17.		Se percevant pauvre / très pauvre (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	12,1	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	17,0	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	26,3	(-)	32,2
		■ 1 à 2 fois par semaine %	32,9		31,9
		■ Moins d'une fois par semaine %	40,8		35,9
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	27,0	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 4,1	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	22,9	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	** 2,9	(-)	5,2
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	13,1	15,8	n.c.
		■ Jamais %	24,5	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	62,4	62,6	n.c.

			des Maskoutains	Montréal	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	15,0	12,3	14,7
		■ 11 ans %	14,7 (+)	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	29,8	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	23,4	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	17,0 (-)	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,7	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	6,3	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	6,6	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	9,3	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	30,8	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	15,7	16,1	n.c.
		■ Obésité %	15,1	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	5,1	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	5,8	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	4,5	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	15,1 (< <)	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 8,4	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 6,2	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	10,3	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	6,0	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	12,9	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	2,3	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	12,8	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	44,0	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	19,5	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	100,7	96,3	n.c.

			des Maskoutains	Montréal	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	13,4	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	65,1 (+)	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	* 49,4	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	73,7	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	26,3	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	3 876	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	43,3 (-)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	16,9	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	13,6	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	19,9	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	7,1	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	15,7 (-)	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	140,0	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	16,7	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	12,9	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	3,8	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 6,3	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	948,5	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	79,5	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	128,8	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	121,0	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	126,8	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	80,7	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	68,3	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	65,6	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	6,8	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	25,3	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	92	100	n.c.
		■ Estomac.....	71	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	92	100	n.c.
		■ Pancréas.....	87	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	93	100	n.c.
		■ Prostate.....	104	100	n.c.
		■ Poumon.....	78	100	n.c.
		■ Vessie.....	66	100	n.c.

			des Maskoutains	Montréal	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		Ensemble des principales maladies.....	279,3 (+)	197,8	n.c.
		■ Chlamydie.....	87,0	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....	* 25,0	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....	54,8	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....	* 38,3	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		Total %.....	6,7	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....	6,9	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....	6,6	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....	78,5	78,3	77,9
		■ Hommes.....	75,2	75,3	74,6
		■ Femmes.....	81,4	81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....	71,2	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		Total (taux brut).....	811,2 (+)	632,0	728
		■ 0-4 ans.....	** 96,4	94,0	119
		■ 5-14 ans.....	** 18,9	14,0	18
		■ 15-24 ans.....	** 59,5	57,0	66
		■ 25-44 ans.....	* 98,0	98,0	116
		■ 45-64 ans.....	527,5	507,0	559
		■ 65-74 ans.....	2 153,4	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....	8 516,9	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	**4,3	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 0,9	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 1,1	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 2,2	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 6,7	6,3	7,2
		Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 5,8	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		Ensemble des causes.....	98	100	n.c.
		■ Tumeurs.....	96	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	94	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	104	100	n.c.
		■ Appareil digestif.....	100	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	103	100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de tumeurs.....	96	100	n.c.
		■ Estomac.....	71	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	111	100	n.c.
		■ Pancréas.....	112	100	n.c.
		■ Poumon.....	88	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	95	100	n.c.
		■ Prostate.....	113	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil circulatoire.....	94	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....	78	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....	103	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....	64	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....	89	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....	80	100	n.c.

			des Maskoutains	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	104	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	143	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	84	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	103	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	156	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	61	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	* 106	100	n.c.
		■ Hommes.....	** 85	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 198	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	5 400	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 786	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	1 005	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	161	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	130	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	756 (+)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000) Total (15 ans et plus) %	* 4,6	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	92,5	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	117,3	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 68,8 (+)	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995) Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	2,83	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995) Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	1,26	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC LA POMMERAIE



CLSC La Pommeraie

Les indicateurs sélectionnés pour décrire le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC La Pommeraie lui attribuent une position moyennement défavorable et classent globalement ce dernier au 9^e rang sur les 14 attribués *ex æquo* avec le territoire du CLSC des Maskoutains. Trente-cinq des soixante indicateurs retenus pour tracer le portrait occupent une position défavorable par rapport à la région. Les indicateurs de comportements et de facteurs de risque ainsi que ceux des services contribuent à bonifier son profil, avec respectivement un 4^e et 3^e rang (*ex æquo* avec d'autres territoires) sur dix et sur six rangs attribués. Les déterminants sociodémographiques et économiques et de l'état de santé présentent des bilans assez négatifs. Le territoire se situe parmi les quatre derniers rangs pour ces indicateurs.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 50 467 personnes, ce qui lui confère le 16^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Avec un taux de croissance projeté entre 2001-2006 de 0,4 %, il occupe le 13^e rang.

En 2001, son âge médian est de 44,0 occupant ainsi le 18^e rang.

Sur plus des deux tiers des indicateurs **sociodémographiques et économiques**, le territoire se positionne de façon défavorable par rapport à la région. Dans ce domaine, il occupe le 10^e rang sur les 13 attribués.

Une proportion plus faible de personnes vivant sous le seuil de faible revenu et un taux de fécondité plus élevé constituent ses principaux atouts à ce chapitre.

Le bilan des **comportements et facteurs de risque** est, lui, positif puisque les valeurs sur 9 des 14 indicateurs lui confèrent une position plus favorable que celle de la région.

Soulignons les indicateurs favorables : la faible proportion de bébés de faible poids ou de bébés prématurés où dans ce dernier cas le territoire occupe le 1^{er} rang. Les personnes de 15 ans et plus qui qualifient leurs habitudes alimentaires de « moyennes ou mauvaises », qui présentent un excès de poids ou qui disent n'avoir aucun confident.

Le bilan des indicateurs de **services**, où il se classe au 3^e rang sur 6 attribués, est mitigé mais positif puisque 6 des 10 indicateurs confèrent une position favorable au territoire et particulièrement le niveau élevé de satisfaction des services de santé de leur région, la notoriété du services INFO-SANTÉ CLSC et un taux plus élevé en ce qui a trait aux hospitalisations pour des interventions dites « pertinentes ».

État de santé

Finalement, le bilan au niveau des indicateurs de l'**état de santé** s'avère négatif lui conférant un 9^e rang sur 12 attribués. Seulement 6 des 21 valeurs se situent dans une position favorable par rapport à la région. À souligner, du côté des indicateurs favorables, le territoire enregistre le taux d'incidence de nouveaux cas de cancer le plus bas de la région.

Positions relatives du CLSC La Pommeraie par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
Saint-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommeraie	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommeraie	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
Saint-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :

Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommeraie	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
Saint-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommeraie	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC La Pommeraie occupe globalement le 9^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC LA POMMERAIE

Indicateurs

N°	Noms	Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES																							
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	0,4	13																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	92,5	17																				
2	Âge médian (2001) (années)	44,0	18																				
3	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,73	9																				
4	Divorcés ou séparés (1996) (%)	7,8	14																				
5	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	17,5	11																				
7	Population vivant seule (1996) (%)	13,2	17																				
8	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	88,8	14																				
11	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	20,2	13																				
13	Taux de chômage (1996) (%)	9,8	13																				
14	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	16,5	8																				
14a	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	39,3	10																				
* 15	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	7,1	11																				
* 16	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	56,0	20																				
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	11,5	12																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE																							
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	15,6	3																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	34,3	8																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	29,4	6																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	6,0	13																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	19,2	19																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	16,2	14																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	5,4	4																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	5,7	1																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	9,5	17																				
27	Excès de poids (2000) (%)	23,7	3																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	4,0	6																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	23,2	10																				
30	Aucun confident (2000) (%)	7,6	4																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	8,2	15																				
DÉTERMINANTS : SERVICES																							
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	10,6	17																				
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	130,8	3																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	16,0	8																				
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	59,7	10																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	56,1	15																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	16,2	3																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	50,0	9																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	16,5	7																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	9,7	1																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	176,5	18																				
ÉTAT DE SANTÉ																							
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	14,7	12																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	4,4	3																				
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	837	7																				
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	72,9	19																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	91	1																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	239,7	15																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	8,0	18																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	77,8	14																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	69,7	17																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	905	20																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	5,2	15																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	7,6	18																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	101	12																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	100	11																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	100	9																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	98	11																				
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionnn. (1994-1998) (%)	130	17																				
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	124	18																				
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	6188	16																				
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	5,7	18																				
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	118,8	20																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

■ rang de la Montérégie

■ rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		La Pommeraie	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	0,4	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 2,1	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	1,2	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	1,2	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	50 467	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	17,0	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	67,3	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	15,7	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	5,5	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	7,6	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	7,9	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	21,0	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	9,6	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	26,3	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	27,4	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	63,3	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	8,3	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	5,5	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	1,9	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	48,6	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	25,2	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	23,4	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	92,5	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	44,0	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	101	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,73	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	24,7	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	46,2	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	14,2	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,7	1,9	2,0
	■ Divorcés %	6,1	5,7	5,8
	■ Veufs %	7,1	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	59,7	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	23,1	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	17,5	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	15,2	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	11,2	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	16,3	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	18,3	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	13,2	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	12,3	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	14,0	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	9,4	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	24,7	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	40,1	35,8	38,7

			La Pommeraie	Montréal	Ensemble du Québec
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	88,8	90,5	89,4
		■ Hommes (65 ans et plus) %	91,9	93,7	92,9
		■ Femmes (65 ans et plus) %	87,1	88,4	87,0
		■ 65-74 ans %	96,2	96,7	96,1
		■ 75-84 ans %	85,1	87,3	85,4
		■ 85 ans et plus %	58,7	56,3	57,6
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)			
		■ Français %	75,5	88,2	83,7
		■ Anglais %	24,0	9,4	10,3
		■ Autres langues %	0,5	2,5	6,0
10.	12.	Immigrant (1996) %	4,0	6,0	9,3
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)			
		■ Moins d'une 9 ^e année %	20,2	16,3	18,1
		■ 9 ^e -13 ^e année %	46,1	41,4	39,4
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	26,1	31,4	30,3
		■ Grade universitaire %	7,4	10,8	12,2
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	55,4	(-)	59,6
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	9,8	(+)	9,3
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)			
		Total %	16,5	(-)	18,0
		■ Hommes %	15,7	(-)	16,4
		■ Femmes %	17,3	(-)	19,5
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)			
		■ Propriétaires %	12,6	15,3	16,3
		■ Locataires %	39,3	40,4	42,3
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	7,1	6,3	n.c.
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)			
		■ Moins de 2 ans %	8,6	11,9	13,6
		■ 2-3 ans %	7,8	10,3	10,4
		■ 4-9 ans %	27,6	29,7	28,7
		■ 10 ans et plus %	56,0	48,1	47,3
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	11,5	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	15,6	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	37,1	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	28,6	31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	34,3	35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	29,4	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 4,9	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	24,5	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 6,0	5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	19,2	15,8	n.c.
		■ Jamais %	25,1	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	55,6	62,6	n.c.

			La Pommeraie	Montérégie	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	16,2	12,3	14,7
		■ 11 ans %	12,8	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	34,6 (+)	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	18,2	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	18,2 (-)	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,8	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	* 5,4	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	* 5,7	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	9,5	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	23,7	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	14,3	16,1	n.c.
		■ Obésité %	9,4	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	4,0	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	* 3,6	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	* 4,3	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)	23,2	23,6	n.c.
		Total (15 ans et plus) %			
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 7,6	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 8,2	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	10,6	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	6,9	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	13,1	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	2,4	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	13,8	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	45,4	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	35,4	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	130,8 (+)	96,3	n.c.

			La Pommeraie	Montérégie	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	16,0	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000	59,7	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	* 56,1	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	83,8 (+)	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	* 16,2	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	2 647	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	50,0 (+)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %	16,5	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	13,1	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %	19,2	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %	10,2	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 9,7 (<<)	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000	176,5	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	14,7	14,0	n.c.
		■ Moyenne %	12,3	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %	2,4	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 4,4	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	836,8	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	66,3	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	124,0	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire	81,7	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	89,2	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	50,8	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements	73,4	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels	72,9 (+)	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur	9,1 (+)	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	26,2	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	91	100	n.c.
		■ Estomac.....	97	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	91	100	n.c.
		■ Pancréas.....	95	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	91	100	n.c.
		■ Prostate	65	100	n.c.
		■ Poumon.....	94	100	n.c.
		■ Vessie.....	93	100	n.c.

			La Pommeraie	Montérégie	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		<i>Ensemble des principales maladies</i>)	239,7	197,8	n.c.
		■ Chlamydirose.....)	* 71,4	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....)	* 42,9	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....)	* 45,6	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....)	** 16,7	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		<i>Total %</i>)	8,0	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....)	7,9	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....)	8,1	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....)	77,8	78,3	77,9
		■ Hommes.....)	74,9	75,3	74,6
		■ Femmes.....)	80,9	81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....)	69,7	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		<i>Total (taux brut)</i>)	905,0	632,0	728
		■ 0-4 ans.....)	** 109,4	94,0	119
		■ 5-14 ans.....)	** 23,4	14,0	18
		■ 15-24 ans.....)	** 87,6	57,0	66
		■ 25-44 ans.....)	* 125,8	98,0	116
		■ 45-64 ans.....)	550,4	507,0	559
		■ 65-74 ans.....)	2 452,6	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....)	7 981,5	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 5,2	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 3,2	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 0,8	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 1,2	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....)	** 7,6	6,3	7,2
		Taux de mortinatalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....)	** 4,4	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes</i>)	101	100	n.c.
		■ Tumeurs.....)	100	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....)	100	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....)	98	100	n.c.
		■ Appareil digestif.....)	86	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....)	130	100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de tumeurs</i>)	100	100	n.c.
		■ Estomac.....)	86	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....)	103	100	n.c.
		■ Pancréas.....)	72	100	n.c.
		■ Poumon.....)	105	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....)	115	100	n.c.
		■ Prostate.....)	91	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de l'appareil circulatoire</i>)	100	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....)	162	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....)	95	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....)	120	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....)	96	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....)	103	100	n.c.

			La Pommeraie	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	98	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	73	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	115	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	130	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	162	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	124	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	* 124	100	n.c.
		■ Hommes.....	** 135	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 68	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	6 188 (+)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 830	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	1 100	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	225 (+)	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	152	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	1 065 (+)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne/mauvaise, (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 5,7	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	118,8 (+)	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	151,7	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	* 85,3 (+)	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	3,61	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	0,97	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC DE LA HAUTE-YAMASKA



CLSC de la Haute-Yamaska

Les indicateurs sélectionnés pour décrire le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC de la Haute-Yamaska, classe globalement ce dernier au 11^e rang sur 14 attribués *ex æquo* avec celui de Longueuil-Est. Trente-huit des soixante indicateurs sont positionnés défavorablement par rapport à la région.

À l'exception des indicateurs de services dont le bilan s'avère le plus positif de la région, les indicateurs relatifs tant aux aspects sociodémographiques et économiques qu'aux comportements et facteurs de risque et, encore plus, ceux touchant l'état de santé, confèrent tous au territoire une position désavantageuse par rapport à la région.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 84 248 personnes ce qui lui confère le 7^e rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Avec un taux de croissance projeté entre 2001-2006 de 2,6 %, il occupe le 7^e rang.

En 2001, son âge médian est de 40,1 occupant ainsi le 12^e rang.

Pour les deux tiers des indicateurs **sociodémographiques et économiques**, le territoire se positionne de façon défavorable par rapport à la région. Dans ce domaine, il occupe le 9^e rang sur les 13 rangs attribués.

Un taux de croissance projeté de sa population plus élevé que celui de la région, une proportion plus faibles de personnes de 15 ans et plus percevant leur situation économique comme étant « pauvre ou très pauvre » ainsi qu'un taux de fécondité plus élevé viennent améliorer son bilan à ce niveau.

Le bilan des **comportements et facteurs de risque** s'avère, lui aussi, négatif puisque les valeur sur 10 des 14 indicateurs, lui confère une position plus défavorable que celle de la région, ce qui le repousse au 8^e rang (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur les 10 rangs attribués pour ce domaine. Soulignons les indicateurs qui occupent une position particulièrement défavorable : chez les personnes de 15 ans et plus, la consommation élevée d'alcool sur une base occasionnelle ainsi que la consommation de drogues à vie, une proportion plus élevée de fumeurs actuels et de celles qui sont sédentaires. Chez les nouveau-nés, une proportion plus élevée de retard de croissance intra-utérine et chez les jeunes de 0-17 ans un taux supérieur à la région en ce qui a trait à la prise en charge dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse.

Le bilan des indicateurs de **services** est beaucoup plus positif puisque huit des dix indicateurs concernés confèrent au territoire la position la plus favorable par rapport à la région. Ce qui le situe au tout premier rang à ce chapitre sur les six attribués. Les deux seuls indicateurs qui lui sont défavorables sont la proportion de personnes de 65 ans et plus qui vivent en institution de santé, qui est nettement supérieure à celle de la région, ainsi que la proportion plus faible de femmes de 50-69 ans qui ont subi une mammographie de dépistage depuis deux ans.

État de santé

Finalement, le bilan au niveau des indicateurs de l'**état de santé** est le plus négatif des 4 volets avec seulement 5 des 21 indicateurs occupant une position favorable par rapport à la région. Le territoire se classe au 10^e rang (*ex æquo* avec deux autres territoires) sur les 12 attribués pour ce domaine. Les indicateurs favorables sont : la proportion plus faible pour l'insatisfaction face à la vie sociale, la mortalité toutes causes; la mortalité pour maladies de l'appareil respiratoire, pour traumatismes non intentionnels et pour tumeurs.

Positions relatives du CLSC de la Haute-Yamaska par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS :

Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
St-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommerai	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS :

Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommerai	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
St-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

DÉTERMINANTS :


Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommerai	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
St-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommerai	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC de la Haute-Yamaska occupe globalement le 11^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC DE LA HAUTE-YAMASKA

Indicateurs			Défavorable ← Favorable																																
N°	Noms																																		
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES		Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1												
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	2,6	7																																
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	68,9	13																																
2	Âge médian (2001) (années)	40,1	12																																
3	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,68	10																																
4	Divorcés ou séparés (1996) (%)	8,7	18																																
5	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	20,0	17																																
7	Population vivant seule (1996) (%)	13,2	18																																
8	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	87,5	16																																
11	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	20,3	14																																
13	Taux de chômage (1996) (%)	9,3	10																																
14	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	18,4	12																																
14a	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	40,2	11																																
* 15	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	7,7	13																																
* 16	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	52,0	15																																
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	9,3	7																																
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE		Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1												
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	18,8	11																																
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	39,5	13																																
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	32,3	13																																
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	3,9	4																																
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	19,8	20																																
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	12,7	10																																
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	5,6	6																																
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	6,4	3																																
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	9,5	16																																
27	Excès de poids (2000) (%)	24,1	5																																
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	5,8	14																																
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	27,0	16																																
30	Aucun confident (2000) (%)	9,3	12																																
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	7,5	11																																
DÉTERMINANTS : SERVICES		Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1												
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	11,4	19																																
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	112,0	7																																
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	14,5	2																																
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	55,7	7																																
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	50,2	9																																
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	20,5	8																																
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	43,4	15																																
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	16,4	8																																
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	14,8	3																																
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	132,8	8																																
ÉTAT DE SANTÉ		Valeur	Rang	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1												
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	15,0	13																																
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	3,9	2																																
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	932	14																																
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	69,3	16																																
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	102	13																																
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	273,3	19																																
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	7,1	14																																
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	78,2	8																																
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	70,2	13																																
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	678	12																																
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	5,2	14																																
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	7,3	15																																
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	99	8																																
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	99	10																																
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	103	13																																
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	76	2																																
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionnn. (1994-1998) (%)	87	6																																
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	115	14																																
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	5460	10																																
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	5,7	19																																
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	84,7	12																																

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

□ rang de la Montérégie ■ rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		de la Haute- Yamaska	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	2,6	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 1,4	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	2,1	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	1,9	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	84 248	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	18,1	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	69,4	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	12,5	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	6,2	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	8,1	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	7,9	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	22,2	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	9,8	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	30,0	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	25,5	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	65,3	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	7,1	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	4,1	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	1,2	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	44,1	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	26,1	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	18,0	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	68,9	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	40,1	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	100	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,68	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	24,5	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	43,4	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	17,3	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,6	1,9	2,0
	■ Divorcés %	7,1	5,7	5,8
	■ Veufs %	5,9	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	55,0	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	24,7	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	20,0	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	17,1	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	12,1	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	17,9	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	23,4	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	13,2	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	12,9	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	13,6	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	11,1	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	24,1	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	36,3	35,8	38,7

			de la Haute- Yamaska	Montréal	Ensemble du Québec
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	87,5	90,5	89,4
		■ Hommes (65 ans et plus) %	94,2	93,7	92,9
		■ Femmes (65 ans et plus) %	82,3	88,4	87,0
		■ 65-74 ans %	95,9	96,7	96,1
		■ 75-84 ans %	83,7	87,3	85,4
		■ 85 ans et plus %	42,7	56,3	57,6
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)			
		■ Français %	96,2	88,2	83,7
		■ Anglais %	3,5	9,4	10,3
		■ Autres langues %	0,3	2,5	6,0
10.	12.	Immigrant (1996) %	2,1	6,0	9,3
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)			
		■ Moins d'une 9 ^e année %	20,3	16,3	18,1
		■ 9 ^e -13 ^e année %	45,8	41,4	39,4
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	26,5	31,4	30,3
		■ Grade universitaire %	7,3	10,8	12,2
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	60,0	59,6	55,0
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	9,3	9,3	11,8
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)			
		Total %	18,4	(+) 18,0	23,4
		■ Hommes %	16,5	16,4	21,6
		■ Femmes %	20,1	(+) 19,5	25,1
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)			
		■ Propriétaires %	13,2	15,3	16,3
		■ Locataires %	40,2	40,4	42,3
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	7,7	6,3	n.c.
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)			
		■ Moins de 2 ans %	12,4	11,9	13,6
		■ 2-3 ans %	9,6	10,3	10,4
		■ 4-9 ans %	26,1	29,7	28,7
		■ 10 ans et plus %	52,0	48,1	47,3
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 9,3	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	18,8	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	30,2	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	30,3	31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	39,5	35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	32,3	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 5,1	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	27,2	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 3,9	5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	19,8	15,8	n.c.
		■ Jamais %	16,2	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	64,0	62,6	n.c.

			de la Haute- Yamaska	Montréal	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	12,7	12,3	14,7
		■ 11 ans %	10,6	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	32,9 (+)	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	23,9	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	19,9 (-)	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 1,0	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	5,6	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	6,4	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	9,5	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	24,1	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	13,7	16,1	n.c.
		■ Obésité %	10,4	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	5,8	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	5,7	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	6,0	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	27,0	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 9,3	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 7,5	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	11,4	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	7,4	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	14,1	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	2,9	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	17,5	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	48,3	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	26,4	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	112,0 (+)	96,3	n.c.

			de la Haute- Yamaska	Montérégie	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	* 14,5	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	55,7	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	* 50,2	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	79,5	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	* 20,5	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	3 484	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	43,4 (-)	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	16,4	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	13,0	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	19,7	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	6,3	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	14,8 (<)	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	132,8	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	15,0	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	13,2	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	1,8	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 3,9	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	932,5	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	72,1	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	155,7	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	84,7	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	120,7	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	69,0	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	69,5	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	69,3 (+)	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	7,5 (+)	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	29,6 (+)	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	102	100	n.c.
		■ Estomac.....	73	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	105	100	n.c.
		■ Pancréas.....	89	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	103	100	n.c.
		■ Prostate.....	103	100	n.c.
		■ Poumon.....	104	100	n.c.
		■ Vessie.....	104	100	n.c.

			de la Haute- Yamaska	Montréal	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		Ensemble des principales maladies.....	273,3 (+)	197,8	n.c.
		■ Chlamydie.....	104,6 (+)	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....	* 26,3	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....	53,6	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....	* 22,0	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		Total %.....	7,1	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....	7,0	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....	7,2	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....	78,2	78,3	77,9
		■ Hommes.....	75,3	75,3	74,6
		■ Femmes.....	81,0	81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....	70,2	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		Total (taux brut).....	678,0	632,0	728
		■ 0-4 ans.....	** 107,6	94,0	119
		■ 5-14 ans.....	** 15,7	14,0	18
		■ 15-24 ans.....	** 53,0	57,0	66
		■ 25-44 ans.....	* 100,8	98,0	116
		■ 45-64 ans.....	533,0	507,0	559
		■ 65-74 ans.....	2 422,7	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....	7 805,2	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 5,2	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 3,4	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 1,3	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....	** 0,4	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 7,3	6,3	7,2
		Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....	** 3,9	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		Ensemble des causes.....	99	100	n.c.
		■ Tumeurs.....	99	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	103	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	76	100	n.c.
		■ Appareil digestif.....	82	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	87	100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de tumeurs.....	99	100	n.c.
		■ Estomac.....	100	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	94	100	n.c.
		■ Pancréas.....	92	100	n.c.
		■ Poumon.....	98	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	82	100	n.c.
		■ Prostate.....	101	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil circulatoire.....	103	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....	61	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....	108	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....	91	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....	102	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....	116	100	n.c.

		de la Haute- Yamaska	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.			
	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
	Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	76	100	n.c.
	■ Pneumonies et gripes.....	64	100	n.c.
	■ Maladies pulmonaires obstructives.....	80	100	n.c.
64.	90.			
	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
	Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	87	100	n.c.
	■ Accidents de véhicules à moteur.....	93	100	n.c.
	■ Chutes accidentelles.....	77	100	n.c.
65.	91.			
	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
	Total.....	* 115	100	n.c.
	■ Hommes.....	* 109	100	n.c.
	■ Femmes.....	** 139	100	n.c.
66.	92.			
	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
	Ensemble des causes.....	5 460 (+)	5 276	n.c.
	■ Tumeurs.....	1 752	1 763	n.c.
	■ Appareil circulatoire.....	1 174 (+)	1 071	n.c.
	■ Appareil respiratoire.....	174	178	n.c.
	■ Appareil digestif.....	121	142	n.c.
	■ Traumatismes non intentionnels.....	545	593	n.c.
67.				
	Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
	Total (15 ans et plus) %.....	* 5,7	4,6	n.c.
68.				
	Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
	Total.....	84,7	82,6	n.d.
	■ Hommes.....	105,5	126,8	n.d.
	■ Femmes.....	* 64,2 (+)	29,3	n.d.
69.				
	Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
	Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	3,54	3,49	n.c..
	Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
	Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	1,00	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse diffèrent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclues du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montérégie 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de .05.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

CLSC LA CHÉNAIE



CLSC La Chênaie

Les indicateurs sélectionnés pour décrire le profil de la population résidant sur le territoire du CLSC La Chênaie classe globalement ce dernier au 12^e rang sur 14 attribués ex æquo avec Longueuil-Ouest et Huntingdon. Quarante et un des soixante indicateurs sont positionnés défavorablement par rapport à la région.

Le bilan est plutôt négatif à l'intérieur de chacun des déterminants et de l'état de santé : sociodémographiques et économiques, encore beaucoup plus pour les indicateurs de comportements et facteurs de risque, des services ainsi que de l'état de santé. Ces bilans contribuent tous à conférer au territoire une position désavantageuse par rapport à la région.

Déterminants

En 2001, on estime la population du territoire du CLSC à 15 572 personnes, ce qui lui confère le dernier rang parmi les 19 territoires, en termes d'effectifs de population. Avec un taux de croissance projeté entre 2001-2006 de 0,6 %, il occupe le 12^e rang.

En 2001, son âge médian est de 39,6 occupant ainsi le 9^e rang.

Sur huit des quinze indicateurs **sociodémographiques et économiques**, le territoire se positionne de façon défavorable par rapport à la région. Dans ce domaine, il occupe le 7^e rang (ex æquo avec le territoire de Longueuil-Est) sur les 13 rangs attribués pour ce domaine.

Parmi les huit indicateurs défavorables, notons la proportion la plus élevée de la région en ce qui a trait aux personnes sous scolarisées, une proportion de personnes de 15 ans et plus percevant sa situation économique comme « pauvre ou très pauvre » et des taux supérieurs de bénéficiaires de l'assistance-emploi et des bénéficiaires d'une durée de dix ans et plus.

Le bilan des **comportements et facteurs de risque** s'avère le plus négatif, puisque les valeurs sur 12 des 14 indicateurs lui confèrent une position plus défavorable que celle de la région, ce qui le repousse au 10^e et dernier rang.

Soulignons les indicateurs qui occupent une position particulièrement défavorable : chez les personnes de 15 ans et plus la consommation élevée d'alcool sur une base de sept jours ou occasionnelle, l'absence de confident et l'insécurité alimentaire. Chez les mères et les nouveau-nés une proportion plus élevée de mères sous-scolarisées, de bébés de faible poids ou avec un retard de croissance intra-utérine.

Le bilan des indicateurs de **services** est également négatif avec 7 des 10 indicateurs concernés, conférant ainsi au territoire un statut défavorable par rapport à la région. Ce qui le situe au dernier rang, soit le 6^e, ex æquo avec Seigneurie de Beauharnois.

Les deux indicateurs qui lui sont le plus défavorables sont la mortalité évitable par des soins appropriés ainsi que la proportion supérieure de personnes de 15 ans et plus insatisfaites des services de santé offerts dans leur région.

État de santé

Finalement, le bilan au niveau des indicateurs de l'**état de santé** est négatif mais à un moindre degré que celui des services ou des comportements et facteurs de risque. Avec seulement 7 des 21 indicateurs occupant une position favorable par rapport à la région, ils confèrent au territoire le 8^e rang sur les 12 attribués.

Les indicateurs les plus défavorables sont : le taux d'hospitalisations pour soins physiques de courte durée et pour les traumatismes, la proportion plus élevée de personnes de 15 ans et plus qui qualifient leur état de santé en général de « moyenne ou mauvaise » et le taux des années de vie perdues de façon prématurée.

Positions relatives du CLSC La Chênaie par rapport aux autres territoires de CLSC selon les déterminants et l'état de santé

DÉTERMINANTS : Sociodémographiques et économiques (15 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
Kateri	0	15	1
des Seigneuries	1	14	2
La Presqu'île	1	14	2
La Vallée des Patriotes	2	13	3
Du Richelieu	4	11	4
Châteauguay	4	11	4
St-Hubert	4	11	4
Jardin du Québec	6	9	5
Samuel de Champlain	7	8	6
Longueuil-Est	8	7	7
La Chênaie	8	7	7
Huntingdon	9	6	8
de la Haute-Yamaska	10	5	9
des Maskoutains	11	4	10
Ch. de la Vallée des Forts	11	4	10
La Pommerai	11	4	10
Longueuil-Ouest	12	3	11
du Havre	13	2	12
Seigneurie de Beauharnois	15	0	13

DÉTERMINANTS : Services (10 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
de la Haute-Yamaska	2	8	1
Samuel de Champlain	3	7	2
Kateri	3	7	2
Ch. de la Vallée des Forts	3	7	2
des Seigneuries	4	6	3
La Presqu'île	4	6	3
Du Richelieu	4	6	3
Châteauguay	4	6	3
La Pommerai	4	6	3
La Vallée des Patriotes	5	5	4
des Maskoutains	5	5	4
Huntingdon	5	5	4
St-Hubert	6	4	5
Jardin du Québec	6	4	5
Longueuil-Est	6	4	5
Longueuil-Ouest	6	4	5
du Havre	6	4	5
La Chênaie	7	3	6
Seigneurie de Beauharnois	7	3	6

DÉTERMINANTS : Comportements et facteurs de risque (14 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
des Seigneuries	1	13	1
Samuel de Champlain	2	12	2
Du Richelieu	4	10	3
La Presqu'île	5	9	4
La Vallée des Patriotes	5	9	4
La Pommerai	5	9	4
des Maskoutains	6	8	5
Ch. de la Vallée des Forts	6	8	5
Kateri	8	6	6
Châteauguay	8	6	6
St-Hubert	8	6	6
Longueuil-Est	9	5	7
Huntingdon	9	5	7
du Havre	9	5	7
Jardin du Québec	10	4	8
de la Haute-Yamaska	10	4	8
Longueuil-Ouest	10	4	8
Seigneurie de Beauharnois	11	3	9
La Chênaie	12	2	10

ÉTAT DE SANTÉ (21 indicateurs)

CLSC	Indicateurs défavorables	Indicateurs favorables	Rang
La Vallée des Patriotes	1	20	1
Samuel de Champlain	2	19	2
Des Seigneuries	3	18	3
La Presqu'île	4	17	4
Kateri	9	12	5
du Richelieu	9	12	5
St-Hubert	9	12	5
Châteauguay	12	9	6
Jardin du Québec	12	9	6
des Maskoutains	13	8	7
Longueuil- Ouest	13	8	7
La Chênaie	14	7	8
La Pommerai	15	6	9
Longueuil-Est	15	6	9
de la Haute-Yamaska	16	5	10
du Havre	16	5	10
Seigneurie de Beauharnois	16	5	10
Ch. de la Vallée des Forts	17	4	11
Huntingdon	18	3	12

Le CLSC La Chênaie occupe globalement le 12^e rang pour l'ensemble des indicateurs sur les 14 rangs attribués



CLSC LA CHÊNAIE

Indicateurs

N°	Noms	Valeur	Rang	Défavorable ← → Favorable																			
DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Taux d'accroissement de la population (2001-2006) (%)	0,6	12																				
2	Indice de vieillesse (2001) (65 ans et plus / 0-14 ans) (%)	65,8	10																				
2	Âge médian (2001) (années)	39,6	9																				
3	Indice synthétique de fécondité (1994-1998) (nombre enfants par femme)	1,97	2																				
4	Divorcés ou séparés (1996) (%)	6,1	3																				
5	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1996) (%)	13,7	3																				
7	Population vivant seule (1996) (%)	10,7	9																				
8	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996) (%)	91,6	9																				
11	Moins de 9 ans de scolarité (1996) (%)	27,9	20																				
13	Taux de chômage (1996) (%)	10,6	14																				
14	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1996) (%)	16,5	9																				
14a	Ménages locataires consacrant 30 % ou plus au coût d'habitation (1996) (%)	35,7	2																				
* 15	Prestataires assistance-emploi (2001) (%)	8,7	16																				
* 16	Adultes prestataires de l'assistance-emploi durée cumulative 10 ans et plus (2001) (%)	52,7	16																				
17	Population se percevant pauvre ou très pauvre (2000) (%)	16,2	19																				
DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
18	Habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises (2000) (%)	19,7	14																				
19	Activité physique (moins d'une fois par semaine) (2000) (%)	40,6	15																				
20	Fumeurs actuels (2000) (%)	33,8	16																				
21	Alcool : 14 consommations et plus sur 7 jours (2000) (%)	7,3	20																				
22	Alcool : 5 épisodes de consommation élevée (2000) (%)	16,3	12																				
23	Naissances (moins de 11 ans de scolarité de la mère) (1994-1998) (%)	20,0	17																				
24	Naissances de faible poids (1994-1998) (%)	7,1	18																				
25	Naissances prématurées (1994-1998) (%)	6,9	9																				
26	Retard de croissance intra-utérine (1994-1998) (%)	11,2	19																				
27	Excès de poids (2000) (%)	31,4	16																				
28	Taux de prise en charge (2000-2001) (p. 1 000 jeunes de 0-17 ans)	5,8	13																				
29	Consommateurs de drogues illicites à vie (2000) (%)	19,7	4																				
30	Aucun confident (2000) (%)	12,0	18																				
31	Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000) (%)	10,9	18																				
DÉTERMINANTS : SERVICES				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
36	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996) (%)	9,9	15																				
* 38	Taux d'interventions dites pertinentes (1995-1999) (pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)	115,3	6																				
39	Taux de césarienne (1997-1999) (%)	16,5	11																				
* 40	Taux d'hospitalisations évitables (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	62,4	12																				
41	Taux de mortalité évitable par les soins (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	72,4	19																				
42	Population ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (2000) (%)	20,4	7																				
43	Mammographie de dépistage chez les femmes de 50-69 ans (1999-2000) (%)	44,5	14																				
44	Soins prodigués sans rémunération aux 65 ans et plus (1996) (%)	15,0	16																				
46	Population insatisfaite des services de santé offerts dans leur région (2000) (%)	37,7	20																				
47	Taux de mortalité évitable par prévention (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	163,1	15																				
ÉTAT DE SANTÉ				20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
48	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000) (%)	15,7	17																				
49	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000) (%)	6,9	17																				
* 50	Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée (1995-1999) (pour 10 000 pers.)	997	18																				
* 51	Taux ajusté d'hospitalisation pour traumatismes (1995-1999) (pour 10 000 personnes)	90,5	20																				
52	Indice comparatif d'incidence des tumeurs (1994-1998) (%)	99	7																				
53	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (1996-2000) (pour 100 000 personnes)	220,3	14																				
54	Limitation d'activités à long terme (1996) (%)	7,0	13																				
55	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) (années)	77,9	13																				
56	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) (années)	69,8	16																				
57	Taux brut de mortalité (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	677	11																				
58	Taux de mortalité infantile (1994-1998) (pour 1 000 naissances vivantes)	5,3	16																				
59	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) (pour 1 000 naissances totales)	7,4	16																				
60	Indice comparatif de mortalité toutes causes (1994-1998) (%)	96	5																				
61	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) (%)	81	1																				
62	Indice comparatif de mortalité par appareil circulatoire (1994-1998) (%)	101	11																				
63	Indice comparatif de mortalité par appareil respiratoire (1994-1998) (%)	97	9																				
64	Indice comparatif de mortalité par trauma non intentionn. (1994-1998) (%)	127	16																				
65	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) (%)	93	7																				
66	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (1994-1998) (pour 100 000 personnes de 0-74 ans)	6236	17																				
67	Santé mentale perçue moyenne ou mauvaise (2000) (%)	2,9	4																				
68	Taux brut de mortalité par tabagisme (1994-1998) (pour 100 000 personnes)	77,5	7																				

* Calculs effectués sur la base des CLSC officiels.

■ rang de la Montérégie ■ rang du CLSC

Note : Les rangs sont attribués sur la base des proportions et des taux selon le cas et non sur celle des nombres absolus de personnes correspondant à ces valeurs. L'utilisation des nombres absolus pourrait résulter en une attribution différente des rangs pour plusieurs indicateurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

DÉTERMINANTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES ET ÉCONOMIQUES

		La Chênaie	Montérégie	Ensemble du Québec
1. ⁽¹⁾	1. ⁽²⁾			
	Taux d'accroissement (2001 à 2006) %			
	Total.....	0,6	2,1	1,8
	■ 0-14 ans %	- 1,2	-1,5	-1,1
	■ 15-64 ans %	0,4	1,9	1,6
	■ 65 ans et plus %	1,4	1,7	1,3
2.	2. Population (2001)			
	Total N	15 572	1 324 799	7 399 931
	■ 0-14 ans %	18,9	18,7	17,7
	■ 15-64 ans %	68,6	69,9	69,3
	■ 65 ans et plus %	12,4	11,4	13,0
	■ 0-5 ans %	6,9	6,4	6,4
	■ 6-11 ans %	8,0	8,4	7,7
	■ 12-17 ans %	8,7	7,8	7,3
	■ 0-17 ans %	23,7	22,6	21,4
	■ 18-24 ans %	10,3	9,6	9,4
	■ 25-44 ans %	27,9	30,2	30,6
	■ 45-64 ans %	25,8	26,3	25,6
	■ 18-64 ans %	63,9	66,0	65,6
	■ 65-74 ans %	7,3	6,7	7,4
	■ 75-84 ans %	3,9	3,6	4,3
	■ 85 ans et plus %	1,3	1,1	1,3
	Indice de dépendance totale (2001) %	45,7	43,0	44,2
	Indice de dépendance des jeunes (2001) %	27,6	26,7	25,5
	Indice de dépendance des aînés (2001) %	18,1	16,2	18,7
	Indice de vieillesse (2001) %	65,8	60,8	73,4
	Âge médian (2001) ans	39,6	39,5	39,4
	Rapport de masculinité (2001) hommes par 100 femmes	107	99	97
3.	4. Indice synthétique de fécondité (1994-1998) nombre d'enfants par femme	1,97	1,63	1,57
4.	6. État matrimonial de fait (15 ans et plus) (1996)			
	■ Célibataires %	24,2	25,4	28,4
	■ Actuellement mariés %	46,9	46,0	43,7
	■ Partenaires en union libre %	16,9	15,6	13,9
	■ Séparés %	1,5	1,9	2,0
	■ Divorcés %	4,6	5,7	5,8
	■ Veufs %	5,7	5,4	6,2
5.	7. Familles avec enfants de moins de 18 ans (1996)			
	■ Couples actuellement mariés %	60,1	59,4	58,9
	■ Couples vivant en union libre %	26,7	22,1	20,6
	■ Familles monoparentales %	13,7	18,4	20,5
6.	8. Enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (1996)			
	Total (0-17 ans) %	11,5	15,7	17,6
	■ 0-5 ans %	8,1	11,7	13,8
	■ 6-14 ans %	11,4	17,0	18,7
	■ 15-17 ans %	15,9	19,8	21,5
7.	9. Population vivant seule (1996)			
	Total (15 ans et plus) %	10,7	10,8	13,7
	■ Hommes (15 ans et plus) %	11,1	9,9	12,5
	■ Femmes (15 ans et plus) %	10,3	11,7	14,8
	■ 15-64 ans %	8,3	8,6	11,1
	■ 65-74 ans %	19,7	21,7	24,9
	■ 75 ans et plus %	25,2	35,8	38,7

			La Chênaie	Montréal	Ensemble du Québec
8.	10.	Population de 65 ans et plus vivant en ménage privé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	91,6	90,5	89,4
		■ Hommes (65 ans et plus) %	100,0	93,7	92,9
		■ Femmes (65 ans et plus) %	83,2	88,4	87,0
		■ 65-74 ans %	98,0	96,7	96,1
		■ 75-84 ans %	87,5	87,3	85,4
		■ 85 ans et plus %	65,6	56,3	57,6
9.	11.	Population selon la langue parlée à la maison (1996)			
		■ Français %	99,6	88,2	83,7
		■ Anglais %	0,1	9,4	10,3
		■ Autres langues %	0,4	2,5	6,0
10.	12.	Immigrant (1996) %	2,0	6,0	9,3
11.	13.	Population selon le plus haut niveau de scolarité atteint (1996)			
		■ Moins d'une 9 ^e année %	27,9	16,3	18,1
		■ 9 ^e -13 ^e année %	49,4	41,4	39,4
		■ Études postsecondaires inférieures au baccalauréat %	18,9	31,4	30,3
		■ Grade universitaire %	3,7	10,8	12,2
12.	15.	Taux d'emploi (1996) %	56,2	(-)	59,6
13.	16.	Taux de chômage (1996) %	10,6	(+)	9,3
14.	18.	Population vivant sous le seuil de faible revenu (1995)			
		Total %	16,5	(-)	18,0
		■ Hommes %	14,9	(-)	16,4
		■ Femmes %	18,3	(-)	19,5
14.a.		Répartition des ménages privés dont 30 % ou plus du revenu est consacré au coût d'habitation (1996)			
		■ Propriétaires %	14,1	15,3	16,3
		■ Locataires %	35,7	40,4	42,3
15.	19.	Prestataires de l'assistance-emploi (mars 2001) %	8,7	6,3	n.c.
16.	20.	Adultes prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide (mars 2001)			
		■ Moins de 2 ans %	12,7	11,9	13,6
		■ 2-3 ans %	9,3	10,3	10,4
		■ 4-9 ans %	25,3	29,7	28,7
		■ 10 ans et plus %	52,7	48,1	47,3
17.		Population se percevant pauvre / très pauvre (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	16,2	10,4	n.c.

DÉTERMINANTS : COMPORTEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE

18.	22.	Population percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	19,7	18,1	n.c.
19.	23.	Population selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir (15 ans et plus) (2000)			
		■ 3 fois et plus par semaine %	29,8	32,2	n.c.
		■ 1 à 2 fois par semaine %	29,6	31,9	n.c.
		■ Moins d'une fois par semaine %	40,6	35,9	n.c.
20.	24.	Fumeurs actuels (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	33,8	30,6	n.c.
		■ Occasionnels %	* 5,4	3,8	n.c.
		■ Réguliers %	28,4	26,8	n.c.
21.	25.	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 7,3	5,2	n.c.
22.	26.	Population présentant une consommation élevée d'alcool cinq fois ou plus au cours d'une année (15 ans et plus) (2000)			
		■ Cinq fois et plus %	16,3	15,8	n.c.
		■ Jamais %	24,0	21,6	n.c.
		■ Une à quatre fois %	59,7	62,6	n.c.

			La Chênaie	Montérégie	Ensemble du Québec
23.	29.	Naissances vivantes selon la scolarité de la mère (1994-1998)			
		■ Moins de 11 ans %	* 20,0 (+)	12,3	14,7
		■ 11 ans %	* 18,5 (+)	11,5	11,8
		■ 12-13 ans %	32,4	27,5	25,9
		■ 14-15 ans %	* 17,3	22,7	22,4
		■ 16 ans et plus %	* 11,8 (-)	26,0	25,1
24.	30.	Naissances vivantes de faible poids (1994-1998)			
		■ Très faible poids (moins de 1 500 g) %	** 0,8	0,8	0,8
		■ Faible poids (moins de 2 500 g) %	* 7,1	5,8	6,0
25.	31.	Naissances vivantes prématurées (1994-1998) %	* 6,9	7,1	7,2
26.	32.	Naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (1994-1998) %	11,2 (+)	8,7	8,6
27.	34.	Population présentant un excès de poids (2000)			
		Total (20-64 ans) %	31,4	27,6	n.c.
		■ Embonpoint %	21,0	16,1	n.c.
		■ Obésité %	10,4	11,5	n.c.
28.	36.	Taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2000-2001) p. 1 000			
		Total (0-17 ans) %	* 5,8	4,5	n.c.
		■ Garçons (0-17 ans) %	* 5,0	4,9	n.c.
		■ Filles (0-17 ans) %	* 6,7	4,2	n.c.
29.		Consommation de drogues illicites au cours de la vie (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	19,7	23,6	n.c.
30.		Aucun confident (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 12,0	8,9	n.c.
31.		Présence d'un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (2000)			
		Total (15 ans et plus) %	* 10,9	7,3	n.c.

DÉTERMINANTS : SERVICES

32.	40.	Taux d'occupation des lits dressés (1999-2000)			
		■ Soins physiques de courte durée %	s.o.	95,1	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée %	s.o.	88,1	n.c.
		Séjour moyen des usagers (1999-2000) jours			
		■ Soins physiques de courte durée	s.o.	6,7	n.c.
		■ Hébergement et soins de longue durée	s.o.	191,8	n.c.
33.	42.	Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	38,9	n.c.
34.	43.	Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations (1998-1999) %	s.o.	96,4	n.c.
35.	46.	Séjours excessifs à l'urgence (1 ^{er} semestre 2000-2001)			
		■ 24 heures %	s.o.	21,6	n.c.
		■ 48 heures %	s.o.	3,5	n.c.
36.	47.	Population de 65 ans et plus en institution de santé (1996)			
		Total (65 ans et plus) %	9,9	7,8	8,3
		■ Hommes (65 ans et plus) %	7,5	4,9	5,7
		■ Femmes (65 ans et plus) %	12,2	9,8	10,1
		■ 65-74 ans %	2,0	2,0	2,5
		■ 75-84 ans %	12,4	10,9	11,3
		■ 85 ans et plus %	50,0	39,2	37,3
37.	48.	Taux d'admission des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (mars 2001) %	s.o.	34,1	n.c.
		Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (septembre 2001) jours	3,5	44,0	n.c.
38.	49.	Taux d'interventions dites pertinentes (18 ans et plus) (1995-1999) p. 10 000	115,3	96,3	n.c.

			La Chênaie	Montréal	Ensemble du Québec
39.	50.	Taux de césarienne % (1997-1999) p. 100 accouchements.....	16,5	17,2	n.c.
40.	51.	Taux d'hospitalisations jugées évitables (1995-1999) p. 10 000.....	62,4	56,1	n.c.
41.	52.	Taux de mortalité évitable (0-64 ans) (1994-1998) p. 100 000.....	* 72,4	51,5	55,3
42.	56.	Population qui connaît le service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC (2000)			
		■ Oui (15 ans et plus) %.....	79,7	77,6	n.c.
		■ Non (15 ans et plus) %.....	* 20,4	22,4	n.c.
42.a		Taux brut des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC (2000-2001) p. 10 000.....	4 169	3 059	n.c.
43.	59.	Femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de deux ans (1999-2000) %.....	44,5	47,3	n.c.
44.	62.	Personnes prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (1996)			
		Total (15 ans et plus) %.....	15,0	15,9	16,2
		■ Hommes (15 ans et plus) %.....	12,3	13,0	13,3
		■ Femmes (15 ans et plus) %.....	18,0	18,7	19,1
45.	64.	Logements privés nécessitant des réparations majeures (1996) %.....	9,3	7,4	8,2
46.		Insatisfaits des services de santé offerts dans leur région (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	37,7 (>>)	20,1	n.c.
47.		Mortalité évitable par la prévention et la promotion (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000	* 163,1	133,8	n.d.

ÉTAT DE SANTÉ

48.	65.	Population se percevant en moyenne ou en mauvaise santé (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	15,7	14,0	n.c.
		■ Moyenne %.....	11,6	11,6	n.c.
		■ Mauvaise %.....	4,1	2,4	n.c.
49.	69.	Population insatisfaite de sa vie sociale (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	* 6,9	5,8	n.c.
50.	72.	Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des causes.....	997,1	853,0	n.c.
		■ Tumeurs.....	80,3	72,0	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	154,5	135,0	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	119,2	89,0	n.c.
		■ Appareil digestif.....	125,0	101,0	n.c.
		■ Organes génito-urinaire.....	79,4	62,0	n.c.
		■ Lésions traumatiques et empoisonnements.....	93,5	64,0	n.c.
51.	73.	Taux ajusté d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels (1995-1999) p. 10 000			
		Ensemble des traumatismes non intentionnels.....	90,5 (+)	60,4	n.c.
		■ Occupants de véhicules à moteur.....	* 14,5 (+)	5,2	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	32,1	24,8	n.c.
52.	74.	Indice comparatif d'incidence du cancer (1994-1998) %			
		Ensemble des sièges.....	99	100	n.c.
		■ Estomac.....	57	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....	99	100	n.c.
		■ Pancréas.....	70	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....	120	100	n.c.
		■ Prostate.....	98	100	n.c.
		■ Poumon.....	86	100	n.c.
		■ Vessie.....	130	100	n.c.

			La Chênaie	Montérégie	Ensemble du Québec
53.	76.	Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire (1996-2000) p. 100 000			
		<i>Ensemble des principales maladies</i>)	* 220,3	197,8	n.c.
		■ Chlamydirose.....)	* 58,6	69,8	n.c.
		■ Hépatite C.....)	** 47,1	19,8	n.c.
		■ Infection à campylobacter.....)	** 38,2	36,3	n.c.
		■ Coqueluche.....)	** 22,9	22,6	n.c.
54.	78.	Population ayant une limitation d'activités à long terme (1996)			
		<i>Total %</i>)	7,0	6,4	n.c.
		■ Hommes %.....)	7,0	6,3	n.c.
		■ Femmes %.....)	7,0	6,5	n.c.
55.	81.	Espérance de vie à la naissance (1994-1998) ans.....)	77,9	78,3	77,9
		■ Hommes.....)	75,0	75,3	74,6
		■ Femmes.....)	81,1	81,1	81,1
56.	82.	Espérance de vie en bonne santé (1994-1998) ans.....)	69,8	71,2	n.c.
57.	83.	Taux de mortalité selon l'âge (1994-1998) p. 100 000			
		<i>Total (taux brut)</i>)	677,3	632,0	728
		■ 0-4 ans.....)	** 162,3	94,0	119
		■ 5-14 ans.....)	** 8,5	14,0	18
		■ 15-24 ans.....)	** 128,3	57,0	66
		■ 25-44 ans.....)	** 110,0	98,0	116
		■ 45-64 ans.....)	* 511,0	507,0	559
		■ 65-74 ans.....)	* 2 399,2	2377,0	2321
		■ 75 ans et plus.....)	7 260,3	8111,0	7932
58.	84.	Taux de mortalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 5,3	4,4	5,3
		Taux de mortalité néonatale précoce (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 5,3	2,3	3,1
		Taux de mortalité néonatale tardive (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 0,0	0,8	0,7
		Taux de mortalité post-natale (1994-1998) p. 1 000 naissances vivantes.....)	** 0,0	1,3	1,5
59.	85.	Taux de mortalité périnatale (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....)	** 7,4	6,3	7,2
		Taux de mortinatalité infantile (1994-1998) p. 1 000 naissances totales.....)	** 2,1	4,0	4,1
60.	86.	Indice comparatif de mortalité selon la cause (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes</i>)	96	100	n.c.
		■ Tumeurs.....)	81	100	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....)	101	100	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....)	97	100	n.c.
		■ Appareil digestif.....)	107	100	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....)	127	100	n.c.
61.	87.	Indice comparatif de mortalité par tumeurs (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de tumeurs</i>)	81	100	n.c.
		■ Estomac.....)	36	100	n.c.
		■ Côlon et rectum.....)	90	100	n.c.
		■ Pancréas.....)	48	100	n.c.
		■ Poumon.....)	72	100	n.c.
		■ Sein chez la femme.....)	128	100	n.c.
		■ Prostate.....)	69	100	n.c.
62.	88.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire (1994-1998) %			
		<i>Ensemble des causes de l'appareil circulatoire</i>)	101	100	n.c.
		■ Maladies hypertensives.....)	100	100	n.c.
		■ Cardiopathies ischémiques.....)	123	100	n.c.
		■ Insuffisance cardiaque.....)	50	100	n.c.
		■ Maladies vasculaires cérébrales.....)	79	100	n.c.
		■ Maladies des artères.....)	90	100	n.c.

			La Chênaie	Montréal	Ensemble du Québec
63.	89.	Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire (1994-1998) %			
		Ensemble des causes de l'appareil respiratoire.....	97	100	n.c.
		■ Pneumonies et gripes.....	70	100	n.c.
		■ Maladies pulmonaires obstructives.....	112	100	n.c.
64.	90.	Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels (1994-1998) %			
		Ensemble des causes part traumatismes non intentionnels.....	127	100	n.c.
		■ Accidents de véhicules à moteur.....	167	100	n.c.
		■ Chutes accidentelles.....	51	100	n.c.
65.	91.	Indice comparatif de mortalité par suicide (1994-1998) %			
		Total.....	** 93	100	n.c.
		■ Hommes.....	** 90	100	n.c.
		■ Femmes.....	** 91	100	n.c.
66.	92.	Taux ajusté des années potentielles de vie perdues (0-74 ans) (1994-1998) p. 100 000			
		Ensemble des causes.....	6 236 (+)	5 276	n.c.
		■ Tumeurs.....	1 584 (-)	1 763	n.c.
		■ Appareil circulatoire.....	1 283 (+)	1 071	n.c.
		■ Appareil respiratoire.....	243	178	n.c.
		■ Appareil digestif.....	* 154	142	n.c.
		■ Traumatismes non intentionnels.....	1 250 (+)	593	n.c.
67.		Perception de l'état de santé mentale moyenne / mauvaise (2000)			
		Total (15 ans et plus) %.....	** 2,9	4,6	n.c.
68.		Mortalité par tabagisme (1994-1998) p. 100 000			
		Total.....	* 77,5	82,6	n.d.
		■ Hommes.....	** 104,2	126,8	n.d.
		■ Femmes.....	** 49,0	29,3	n.d.
69.		Prévalence de la carie sur les faces temporaires, CLSC (1984-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	4,74	3,49	n.c.
		Prévalence de la carie sur les faces permanentes, CLSC (1994-1995)			
		Total (nombre moyen de surfaces par enfant).....	1,94	1,32	n.c.

(1) Numérotation des indicateurs du présent document.

(2) Numérotation des indicateurs correspondant à ceux du présent document mais présentés dans la publication « Le portrait de santé, Le Québec et ses régions », INSPQ, Édition 2001.

s.o. Sans objet.

n.d. Non disponible.

n.c. Non comparable sous un ou plusieurs aspects :

- dans le cas des enquêtes les protocoles, les outils de cueillette ou les taux de réponse différent;
- dans le cas des données d'hospitalisations (incluant celles sur l'incidence des cancers), les hospitalisations hors Québec sont exclus du présent rapport, les périodes peuvent être différentes et les méthodes d'ajustement ainsi que la population type utilisée pour cet ajustement (population de la Montréal 1996 vs population du Québec 1996) sont différentes;
- dans le cas des données portant sur le taux de prise en charge dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse, un petit nombre de cas sont comptés plus d'une fois, il ne s'agit donc pas de données d'incidence comme celles présentées dans la publication provinciale.
- dans le cas des indicateurs portant sur les maladies infectieuses et sur la proportion de femmes ayant subi une mammographie les registres régionaux ont été utilisés à la place des fichiers provinciaux constitués à cette fin.
- dans d'autres cas enfin, comme celui de l'indicateur portant sur la connaissance du service INFO-SANTÉ CLSC, une autre source de données a été utilisée en plus ou à la place de celle retenue dans la publication provinciale.

+ Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal au seuil de .05.

- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal au seuil de .05.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

Données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000.

>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<-, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montréal aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

2.3 Atlas thématique sur la base des territoires de CLSC

Introduction

L'Atlas thématique présenté dans les pages suivantes transpose pour chacun des 60 indicateurs utilisés lors de l'élaboration des faits saillants par territoire de CLSC, la valeur totale de l'indicateur pour chaque territoire calculée pour la période la plus récente.

Dans la plupart des cas, cette valeur correspond à celle figurant à l'élément graphique no 3 de chacune des fiches d'indicateur correspondante.

Comme en témoigne les éléments graphiques no 3 des fiches individuelles, chaque indicateur présente une distribution de valeurs parmi les territoires de CLSC.

Pour produire les cartes, nous avons d'abord segmenté cette distribution en cinq groupes comprenant des nombres à peu près égaux de territoire et allant du groupe des territoires ayant les valeurs les plus favorisées (représentés sur la carte par la trame la plus pâle), au groupe des territoires affichant les valeurs les plus défavorisées (représentés sur la carte par la trame la plus foncée).

Compte tenu du nombre impair de territoires à distribuer de la sorte soit dix-neuf, il n'est pas possible de créer cinq groupes égaux de quatre territoires chacun, la plupart des cartes affichent donc au moins un groupe de moins de quatre territoires.


Cette approche a l'avantage d'introduire un élément de continuité entre les 60 cartes produites. Par contre, une telle segmentation systématique ne respecte pas toujours la nature spécifique des données propres à chacun des indicateurs qui commanderait dans certains cas de tramer les valeurs en fonction des écarts par rapport à des normes ou des moyennes préétablies. Pour corriger partiellement cette situation, nous avons ajouté sous les valeurs statistiques de chaque territoire un sigle représentant le résultat du test statistique portant justement sur la différence par rapport à la valeur régionale, ceci dans les cas où de tels tests étaient appliqués, soit dans près des deux tiers des cas. La signification de ces sigles est la suivante :

- + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de .05.
- Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de .05.
- *, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence (*) ou simplement à titre indicatif (**) puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.


La signification des sigles pour les données issues de l'Enquête téléphonique régionale SOM, printemps 2000 est la suivante :

- >>, >, + Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.
- <<, <, - Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

1. Taux d'accroissement de la population (%), CLSC, Montérégie, 2001-2006 (données projetées)




2. Indice de vieillesse (%), CLSC, Montérégie, 2001 (65 ans et plus / 0-14 ans) (données projetées)




3. Indice synthétique de fécondité, CLSC, Montérégie, 1994-1998


(nombre moyen d'enfants par femme)




4. État matrimonial de fait (divorcés et/ou séparés) (%), CLSC officiels, Montérégie, 1996




5. Familles monoparentales avec au moins un enfant de moins de 18 ans (%), CLSC, Montérégie, 1996




7. Proportion de la population de 15 ans et plus vivant seule (%), CLSC, Montérégie, 1996




8. Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménages privés (%), CLSC, Montérégie, 1996




11. Population ayant moins de 9 ans de scolarité (%), CLSC, Montérégie, 1996




13. Taux de chômage (%), CLSC, Montérégie, 1996




14. Population vivant sous le seuil de faible revenu (%), CLSC, Montérégie, 1996




14a. Ménages locataires consacrant 30% ou plus du revenu au coût d'habitation (%), CLSC, Montérégie, 1996




15. Prestataires de l'assistance emploi (%) CLSC officiels, Montérégie, mars 2001




16. Prestataires de l'assistance emploi pour une durée cumulative de 10 ans et plus (%)
CLSC officiels, Montérégie, mars 2001




17. Proportion de la population de 15 ans et plus percevant leur situation économique comme pauvre ou très pauvre (%), CLSC, Montérégie, printemps 2000




18. Proportion de la population de 15 ans et plus percevant avoir de moyennes ou mauvaises habitudes alimentaires (%), CLSC, Montérégie, printemps 2000




19. Proportion de la population de 15 ans et plus ayant pratiqué une activité physique de loisir moins d'une fois semaine (%), CLSC, Montérégie, printemps 2000




**20. Proportion de fumeurs actuels de 15 ans et plus (%),
CLSC, Montérégie, printemps 2000**




**21. Proportion de la population de 15 ans et plus ayant pris 14 consommations
d'alcool ou plus au cours d'une période de 7 jours (%),
CLSC, Montérégie, printemps 2000**




22. Proportion de la population de 15 ans et plus ayant eu au moins 5 épisodes de consommation élevée d'alcool au cours d'une période de 12 mois (%), CLSC, Montérégie, printemps 2000




23. Proportion de naissances vivantes de mères ayant moins de 11 ans de scolarité (%), CLSC, Montérégie, 1994-1998




24. Proportion de naissances vivantes de faible poids (%), CLSC, Montérégie, 1994-1998




25. Proportion de naissances vivantes prématurées (%), CLSC, Montérégie, 1994-1998




26. Proportion de naissances vivantes ayant un retard de croissance intra-utérine (%), CLSC, Montérégie, 1994-1998




27. Proportion de la population de 20-64 ans présentant un excès de poids (%), CLSC, Montérégie, printemps 2000




28. Taux de cas signalés et retenus dont la sécurité et le développement sont compromis dans le cadre de la loi sur la protection de la jeunesse, CLSC, Montérégie, 2000-2001
(taux pour 1 000 jeunes de 0-17 ans)




29. Proportion de la population de 15 ans et plus ayant déjà consommé de la drogue au cours de la vie (%), CLSC, Montérégie, printemps 2000




**30. Proportion de la population de 15 ans et plus n'ayant aucun confident (%),
CLSC, Montérégie, printemps 2000**




**31. Proportion de la population de 15 ans et plus rapportant la présence
d'au moins un élément de l'indice d'insécurité alimentaire (%),
CLSC, Montérégie, printemps 2000**



36. Proportion de la population de 65 ans et plus en institution de santé (%), CLSC, Montérégie, 1996




38. Taux d'interventions dites pertinentes, CLSC officiels, Montérégie, 1995-1999 (taux annuel moyen pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)



39. Taux de césarienne, CLSC, Montérégie, 1997-1999

(taux annuel moyen pour 100 accouchements de résidentes montréalaises)




40. Taux d'hospitalisations jugées évitables, CLSC officiels, Montérégie, 1995-1999

(taux annuel moyen pour 10 000)




41. Taux de mortalité évitable par les soins, CLSC, Montérégie, 1994-1998


(taux annuel moyen pour 100 000 personnes de -64 ans)




42. Proportion de la population de 15 ans et plus ne connaissant pas le service Info-Santé CLSC (%), CLSC, Montérégie, printemps 2000




43. Proportion de femmes de 50-69 ans ayant subi une mammographie de dépistage au cours d'une période de 2 ans (%), CLSC, Montérégie, 1999-2000



44. Proportion de personnes de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (%), CLSC, Montérégie, 1996




46. Proportion de la population de 15 ans et plus peu ou pas du tout satisfaite des services de santé offerts dans leur région (%), CLSC, Montérégie, printemps 2000




47. Taux de mortalité évitable par la prévention et la promotion, CLSC, Montérégie, 1994-1998


(taux annuel moyen pour 100 000 personnes de 0-74 ans)



48. Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en moyenne ou mauvaise santé (%), CLSC, Montérégie, printemps 2000




49. Proportion de la population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale (%), CLSC, Montérégie, printemps 2000




50. Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée, CLSC officiels, Montérégie, 1995-1999

(taux annuel moyen pour 10 000)




51. Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée pour traumatismes non intentionnels, CLSC officiels, Montérégie, 1995-1999

(taux annuel moyen pour 10 000)




52. Indice comparatif d'incidence des tumeurs, CLSC, Montérégie, 1994-1998




53. Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire, CLSC, Montérégie, 1996-2000


(taux annuel moyen pour 100 000)




54. Proportion de la population des ménages privés ayant une incapacité de long terme (%), CLSC, Montérégie, 1996




55. Espérance de vie à la naissance (en années), CLSC, Montérégie, 1994-1998



**56. Espérance de vie en bonne santé (en années),
CLSC, Montérégie, 1994-1998**




**57. Taux brut de mortalité,
CLSC, Montérégie, 1994-1998**
(taux annuel moyen pour 100 000)




58. Taux de mortalité infantile, CLSC, Montérégie, 1994-1998

(taux annuel moyen pour 1 000 naissances vivantes)




59. Taux de mortalité périnatale, CLSC, Montérégie, 1994-1998


(taux annuel moyen pour 1 000 naissances vivantes)




60. Indice de mortalité toutes causes, CLSC, Montérégie, 1994-1998




61. Indice comparatif de mortalité par tumeurs, CLSC, Montérégie, 1994-1998




62. Indice comparatif de mortalité pour l'appareil circulatoire, CLSC, Montérégie, 1994-1998
(données projetées)




63. Indice comparatif de mortalité pour l'appareil respiratoire, CLSC, Montérégie, 1994-1998




267



66. Taux ajusté des années potentielles de vie perdues, CLSC, Montérégie, 1994-1998
(taux annuel moyen pour 100 000)




67. Proportion de la population de 15 ans et plus selon la perception de l'état de santé mentale moyenne ou mauvaise (%), CLSC, Montérégie, printemps 2000



68. Taux brut de mortalité associé au tabagisme, CLSC, Montérégie, 1994-1998

(taux annuel moyen pour 100 000)



1. ⁽¹⁾ TAUX D'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION

- En 2001, la population de la Montérégie est estimée à 1 324 799 personnes et en 2006, la population projetée est de 1 352 790.

Ces effectifs totaux sont le résultat d'une croissance qui se caractérise par un rythme et une composition particulière à la région.

- Le **taux de croissance entre 1991-1996**, calculé à partir des populations corrigées pour le sous-dénombrement, dépasse 4 % pour la Montérégie. Il est supérieur au 3 % enregistré pour le Québec pour la même période mais est la moitié moins important que le 9 % établi pour la région durant la période précédente de 1986-1991.

Cette baisse importante de croissance résulte d'une légère diminution de l'accroissement naturel, mais surtout de la chute marquée des autres composantes de croissance qui avaient contribué, pour plus de la moitié, à l'accroissement entre 1986 et 1991.

Les projections de populations élaborées au MSSS, en collaboration avec l'ISQ, envisagent des baisses successives du taux de croissance au cours des années à venir. En Montérégie, les taux de croissance pourraient être encore moins prononcés que ceux déjà présumés de 2,9 et 2,1 respectivement pour 1996-2001 et 2001-2006, puisque les données préliminaires du dernier recensement de mai 2001, montrent une croissance de 1,4 % pour le Québec et de 1,6 % pour la Montérégie entre 1996 et 2001 soit un peu plus de la moitié seulement du 2,9 % présumé pour la même période, pour la région.

- Les taux d'accroissement varient aussi selon les **groupes d'âge** : il est toujours le plus élevé chez les 65 ans et plus et ceci, depuis 1981, tandis qu'il est le plus souvent négatif et devrait baisser davantage dans le futur pour les jeunes de 0-14 ans.


Ce profil d'évolution illustre bien le processus de vieillissement de la population montréalaise, la part des aînés étant appelée à exercer un poids démographique de plus en plus important combinée à un poids de moins en moins appréciable pour les jeunes.

- Les populations localisées dans les **territoires de CLSC** lors du découpage géographique initial de ces derniers, les composantes de l'accroissement, les taux globaux qui en résultent ainsi que le profil de croissance selon l'âge trouvent leur aboutissement dans des effectifs totaux et des compositions par âge très différents pour les divers territoires de CLSC.


Cinq des dix-neuf CLSC comptent plus de 100 000 habitants; à l'opposé trois CLSC comptent moins de 25 000 personnes.

À un extrême, les taux de croissance varient de 14 %, 10 % et 7 % respectivement entre 1991-1996, 1996-2001 et 2001-2006, pour le CLSC Kateri. À l'opposé, le CLSC du Havre affiche une réduction constante de population de 3,6 %, 4,4 % et 4,7 % pour les mêmes périodes.


1. Taux d'accroissement selon la composante, Montérégie, 1981-1986 à 1996-2001




2. Taux d'accroissement de la population selon l'âge, Montérégie, 1981-1986 à 1996-2001



3. Taux d'accroissement projeté, CLSC, Montérégie, 1996-2001



4. Répartition de la population projetée, CLSC, 2001



5. Taux d'accroissement de la population selon l'âge, Montérégie, 1981-1986 à 2001-2006

Âge	Taux d'accroissement					Population					
	1981 -1986	1986 -1991	1991 -1996	1996 -2001 ³	2001-2006 ³	1981 ⁴	1986	1991	1996	2001 ³	2006 ³
	%	%	%	%	%	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
0-14 ans	-2,1	6,4	-0,4	-6,3	-8,2	255 044	249 571	265 590	264 464	247 701	227 489
15-64 ans	5,1	8,7	4,3	3,9	2,8	748 645	787 200	855 365	891 725	926 613	952 189
65 ans et plus	17,7	24,2	15,4	14,9	15,0	77 618	91 395	113 497	130 922	150 485	173 112
0-5 ans	-7,5	7,2	3,5	-20,4	-6,5	104 012	96 174	103 086	106 652	84 910	79 360
6-11 ans	7,0	1,5	-2,8	6,9	-17,5	98 783	105 657	107 253	104 289	111 504	91 965
12-17 ans	-13,6	9,9	2,4	-6,8	8,8	114 097	98 560	108 363	110 985	103 470	112 601
18-24 ans	-10,1	-11,8	-2,1	10,6	-9,0	147 676	132 773	117 052	114 549	126 681	115 235
25-44 ans	12,1	9,6	-2,6	-5,4	-5,3	352 555	395 371	433 488	422 428	399 484	378 414
45-64 ans	11,6	20,9	18,1	17,1	15,5	186 566	208 236	251 713	297 286	348 265	402 103
65-74 ans	13,4	21,1	13,0	9,8	12,1	51 818	58 750	71 151	80 366	88 228	98 907
75-84 ans	1,9	28,5	17,7	21,4	18,0	25 800	26 288	33 787	39 766	48 288	56 994
85 ans et plus	n.d.	34,6	26,1	29,5	23,2	n.d.	6 357	8 559	10 790	13 969	17 211
MONTÉRÉGIE	4,3	9,4	4,3	2,9	2,1	1 081 307	1 128 166	1 234 452	1 287 111	1 324 799	1 352 790
ENSEMBLE DU QUÉBEC	2,5	4,9	2,9	1,7	1,8	6 567 806	6 734 309	7 066 894	7 273 993	7 399 931	7 535 013

6. Taux d'accroissement de la population selon la composante et le groupe d'âge, CLSC, Montérégie, Québec, 1981, 1986-1991 à 2001-2006

CLSC	Taux d'accroissement (%)										Population					
	1981-1986	1986-1991	1991-1996			1996-2001 ³	2001-2006				1981	1986	1991	1996	2001 ³	2006 ³
	Total	Total	Composantes			Âges										
			Naturel	Autre	Total	Total	0-14 ans	15-64 ans	65 ans et plus	Total						
	%	%	%		%	%	%	%	%	%	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
La Presqu'île	7,1	18,7	6,1	5,4	11,5	7,6	-1,0	6,0	1,4	6,4	67 220	72 088	86 583	97 066	104 620	111 458
Huntingdon	0,3	2,0	1,8	0,9	2,7	0,3	-2,3	1,3	0,8	-0,2	23 535	23 608	24 077	24 726	24 808	24 765
Seigneurie de Beauharnois	-0,6	2,7	2,6	-3,1	-0,6	-1,5	-2,3	-0,4	0,9	-1,8	54 983	54 631	56 124	55 803	54 979	53 976
Châteauguay	4,1	4,8	3,9	2,3	6,3	1,4	-3,0	1,8	1,8	0,7	59 115	61 581	64 560	68 688	69 638	70 092
Jardin du Québec	1,4	7,2	4,3	-0,7	3,7	-0,9	-2,4	0,0	1,4	-1,1	20 645	20 937	22 499	23 341	23 141	22 890
Kateri	10,9	29,6	7,6	6,2	13,7	9,8	-0,6	5,6	1,9	6,9	46 035	51 258	68 160	78 230	86 212	92 363
Samuel-de-Champlain	5,5	6,2	3,0	-3,5	-0,6	3,3	-0,8	2,2	2,3	3,7	99 196	104 764	111 459	110 840	114 488	118 823
Longueuil- Ouest	-1,9	-4,2	3,8	-9,5	-5,6	-3,6	-1,3	-2,9	1,4	-2,8	75 605	74 153	71 052	67 101	64 708	62 930
Longueuil-Est	6,7	12,2	5,9	-3,8	2,1	2,5	-0,5	0,7	2,0	2,2	51 453	55 000	62 063	63 388	64 985	66 445
St-Hubert	10,6	10,0	5,7	-2,4	3,3	2,6	-2,3	2,3	2,3	2,2	61 681	68 455	75 615	78 162	80 171	81 961
des Seigneuries	7,7	17,2	6,2	4,1	10,4	7,3	-1,2	3,0	2,3	4,0	68 766	74 182	87 790	97 370	104 775	109 089
Ch. de la Vallée des Forts	3,3	12,6	4,4	-0,2	4,2	3,5	-1,8	3,3	1,5	3,1	80 128	82 793	93 748	97 824	101 268	104 410
La Vallée des Patriotes	5,6	9,2	4,6	-0,2	4,4	4,9	-0,6	2,3	2,1	3,8	76 769	81 186	88 938	93 024	97 623	101 376
du Richelieu	4,2	9,3	6,2	5,6	11,8	2,2	-3,5	0,3	1,4	-1,8	40 243	41 971	46 009	51 613	52 764	51 810
du Havre	-0,8	-0,4	1,0	-4,7	-3,6	-4,4	-1,9	-4,0	1,2	-4,7	55 681	55 258	55 044	53 055	50 773	48 425
des Maskoutains	2,4	12,5	2,9	-1,0	1,9	-0,6	-1,6	0,4	0,8	-0,4	67 825	69 462	78 564	80 056	79 559	79 229
La Pommeraiie	0,2	2,6	2,1	-0,9	1,2	0,8	-2,1	1,2	1,2	0,4	48 105	48 186	49 450	50 056	50 467	50 649
de la Haute-Yamaska	5,0	12,3	4,3	0,0	4,3	3,7	-1,4	2,1	1,9	2,6	65 555	68 906	77 795	81 205	84 248	86 432
La Chênaie	5,1	-27,1	3,7	0,5	4,2	0,1	-1,2	0,4	1,4	0,6	18 767	19 747	14 922	15 563	15 572	15 667
MONTÉRÉGIE	4,3	9,1	4,4	-0,3	4,2	2,9	-1,5	1,9	1,7	2,1	1 081 307	1 128 166	1 234 452	1 287 111	1 324 799	1 352 790
ENSEMBLE DU QUÉBEC	2,5	4,8	2,8	0,1	2,9	1,7	-1,1	1,6	1,3	1,8	6 567 806	6 734 309	7 066 894	7 273 993	7 399 931	7 535 013

Notes


Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 1 présentée dans le document
« Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

- La composante « Accroissement naturel » est le rapport pour une période donnée de la différence entre les naissances et les décès à la population au milieu de la période.
- La composante « Autre » a été calculée pour le présent rapport comme un simple solde entre l'accroissement total et l'accroissement naturel compte tenu que les données pour les deux autres composantes habituellement estimées soit la « migration nette » et le « résidu » n'étaient pas disponibles par territoire de CLSC au moment la production de cette fiche. À titre d'exemple pour la période 1991-1996, les quatre composantes de l'accroissement total de 4,1 % étaient les suivantes : 3,5 % pour l'accroissement naturel et de 0,7 % pour la composante « autre » lui-même ventilé en 3,0 % pour la « Migration nette » et -2,3 % pour le « Résidu ».
- Données projetées : l'accroissement entre les données du recensement de mai 1996 et celui de mai 2001 (données préliminaires) est plus faible soit 1,6 % par rapport au taux projeté prévu de 2,9 % pour la région et 1,4 % pour l'ensemble du Québec par rapport au 1,7 % prévu.
- En 1981, le groupe des 75-84 ans équivalait au groupe des 75 ans et plus compte tenu de l'absence d'une ventilation spécifique pour les 85 ans et plus.


2. (2) RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON L'ÂGE ET LE SEXE

- Tout au long de la période de trente ans, **allant de 1981 à 2011**, le poids des adultes de 15-64 ans demeure inchangé en Montérégie constituant un peu plus des deux tiers de la population totale. Les changements d'importance au niveau du poids démographique se sont produits chez les jeunes et les personnes âgées.
- La composition des indices de dépendance, estimés à partir du profil des personnes dites « dépendantes », soit les **jeunes** de 0-14 ans et les **ainés** de 65 ans et plus, s'est complètement métamorphosée : en 1981 la proportion des jeunes était trois fois plus élevée que celles des personnes de 65 ans et plus (22 % c. 7 %), tandis qu'en 2011, selon les projections, les deux groupes auront un poids démographique équivalent de 15 % chacun.
- La proportion d'ainés chez les **femmes** est supérieure à celle des hommes, ce qui se traduit par un rapport de masculinité défavorable à ces derniers aux âges avancés.
- Les différences dans la direction et l'ampleur de la croissance des effectifs des divers groupes d'âge résultent aussi dans des compositions très variées des populations des **territoires des CLSC** en termes des indices de dépendance.
- Les oppositions les plus frappantes se retrouvent dans deux CLSC qui présenteraient, en se basant sur les projections, les valeurs extrêmes de la région : en 2006 le CLSC Kateri afficherait l'indice de dépendance des jeunes le plus élevé (29 %) combiné à l'indice des aînés le plus faible (12 %). À l'opposé, le territoire du CLSC du Havre présenterait, pour 2006, l'indice de dépendance des jeunes le plus faible (19 %) combiné avec celui des aînés le plus élevé (26 %).
- L'âge médian projeté pour 2006 traduit de façon encore plus concrète cette réalité, le CLSC du Havre affichant un âge médian de 49,4 ans, soit 11 ans de plus que celui du CLSC Kateri, ceci en comparaison avec 40,8 ans projeté pour la région.
- La progression de l'âge médian diffère selon les territoires : le CLSC Samuel de Champlain, qui en 1991 occupait la seconde place pour l'âge médian le plus élevé, juste après du Havre, se retrouve au 11^e rang selon les estimations pour 2006.

1. Répartition de la population selon l'âge, Montérégie, 1981 à 2011



2. Répartition (%) de la population selon l'âge et le sexe, Montérégie, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001 et 2006



3. Répartition de la population selon l'âge, CLSC, Montérégie et Québec, 1991, 1996, 2001¹ et 2006¹

CLSC	0-14 ans						15-64 ans						65 ans et plus					
	1991	1996	2001		2006		1991	1996	2001		2006		1991	1996	2001		2006	
	%	%	Nombre	%	Nombre	%	%	%	Nombre	%	Nombre	%	%	%	Nombre	%	Nombre	%
La Presqu'île	23,0	22,7	21 756	20,8	20 727	18,6	68,3	68,1	72 659	69,5	79 073	70,9	8,8	9,2	10 205	9,8	11 658	10,5
Huntingdon	21,5	21,0	4 843	19,5	4 272	17,3	64,4	64,7	16 324	65,8	16 642	67,2	14,0	14,4	3 641	14,7	3 851	15,6
Seigneurie de Beauharnois	19,5	18,7	9 201	16,7	7 925	14,7	67,5	67,4	36 998	67,3	36 757	68,1	13,0	14,0	8 780	16,0	9 294	17,2
Châteauguay	22,3	21,9	14 238	20,4	12 134	17,3	69,1	67,9	47 740	68,6	49 029	69,9	8,6	10,2	7 660	11,0	8 929	12,7
Jardin du Québec	22,1	21,7	4 409	19,1	3 855	16,8	67,6	67,2	15 730	68,0	15 721	68,7	10,5	11,1	3 002	13,0	3 314	14,5
Kateri	24,3	23,8	19 405	22,5	18 832	20,4	70,2	70,1	60 931	70,7	65 941	71,4	5,4	6,0	5 876	6,8	7 590	8,2
Samuel de Champlain	19,5	17,7	17 581	15,4	16 695	14,1	71,1	71,0	82 987	72,5	85 502	72,0	9,4	11,3	13 920	12,2	16 626	14,0
Longueuil- Ouest	16,8	16,3	10 359	16,0	9 498	15,1	72,7	70,9	44 754	69,2	42 923	68,2	10,6	12,8	9 595	14,8	10 509	16,7
Longueuil-Est	20,1	19,7	12 172	18,7	11 854	17,8	72,7	71,9	46 643	71,8	47 099	70,9	7,2	8,4	6 170	9,5	7 492	11,3
St-Hubert	23,6	22,4	15 661	19,5	13 806	16,8	70,7	71,0	58 217	72,6	60 039	73,3	5,6	6,6	6 293	7,8	8 116	9,9
Des Seigneuries	23,5	22,5	21 330	20,4	20 034	18,4	70,8	71,0	75 373	71,9	78 553	72,0	5,6	6,5	8 072	7,7	10 502	9,6
Ch. de la Vallée des Forts	21,4	21,1	19 093	18,9	17 279	16,5	67,9	67,2	69 032	68,2	72 417	69,4	10,6	11,7	13 143	13,0	14 714	14,1
La Vallée des Patriotes	23,2	21,1	19 036	19,5	18 441	18,2	69,6	70,5	69 808	71,5	72 102	71,1	7,2	8,3	8 779	9,0	10 833	10,7
du Richelieu	23,6	23,7	10 722	20,3	8 868	17,1	67,5	67,3	36 578	69,3	36 747	70,9	9,0	9,1	5 464	10,4	6 195	12,0
du Havre	19,2	16,7	7 198	14,2	6 243	12,9	69,0	69,5	35 358	69,6	33 381	68,9	11,6	13,8	8 217	16,2	8 801	18,2
des Maskoutains	21,4	19,7	13 921	17,5	12 656	16,0	66,0	67,2	54 359	68,3	54 688	69,0	12,6	13,2	11 279	14,2	11 885	15,0
La Pommerai	22,0	20,0	8 574	17,0	7 535	14,9	64,3	65,5	33 959	67,3	34 563	68,2	13,9	14,3	7 934	15,7	8 551	16,9
de la Haute-Yamaska	22,5	20,9	15 256	18,1	14 080	16,3	67,3	68,0	58 475	69,4	60 257	69,7	10,2	11,1	10 517	12,5	12 095	14,0
La Chénaie	24,2	21,7	2 946	18,9	2 755	17,6	64,9	66,9	10 688	68,6	10 755	68,6	10,6	11,3	1 938	12,4	2 157	13,8
MONTÉRÉGIE	21,7	20,7	247 701	18,7	227 489	16,8	69,0	69,0	926 613	69,9	952 189	70,4	9,3	10,3	150 485	11,4	173 112	12,8
ENSEMBLE DU QUÉBEC	20,0	19,2	1 308 416	17,7	1 227 921	16,3	68,8	68,7	5 131 185	69,3	5 249 725	69,7	11,2	12,1	960 330	13,0	1 057 367	14,0

4. Rapport de masculinité selon l'âge, CLSC, Montérégie et Québec, 1996 et 2001¹

CLSC	0-14 ans		15-64 ans		65 ans et plus		Total					
	Rapport de masculinité		Rapport de masculinité		Rapport de masculinité		Hommes		Femmes		Rapport de masculinité	
	1996	2001	1996	2001	1996	2001	1996	2001	1996	2001	1996	2001
	1996	2001	1996	2001	1996	2001	1996	2001	1996	2001	1996	2001
La Presqu'île	104	105	103	102	78	80	48 655	52 435	48 411	52 185	101	100
Huntingdon	105	104	107	107	84	83	12 565	12 544	12 161	12 264	103	102
Seigneurie de Beauharnois	108	104	101	102	66	66	27 335	26 832	28 468	28 147	96	95
Châteauguay	107	106	100	100	80	83	34 230	34 597	34 458	35 041	99	99
Jardin du Québec	107	101	110	112	79	84	11 975	11 885	11 366	11 256	105	106
Kateri	106	106	102	101	82	85	39 454	43 325	38 776	42 887	102	101
Samuel de Champlain	107	105	96	96	65	69	53 615	55 323	57 225	59 165	94	94
Longueuil- Ouest	102	103	96	96	67	67	32 317	31 035	34 784	33 673	93	92
Longueuil-Est	106	106	98	98	64	69	31 099	31 868	32 289	33 117	96	96
St-Hubert	103	102	101	100	69	73	38 821	39 708	39 341	40 463	99	98
Des Seigneuries	106	107	102	101	74	80	48 883	52 558	48 487	52 217	101	101
Ch. de la Vallée des Forts	106	106	103	104	74	76	48 829	50 735	48 995	50 533	100	100
La Vallée des Patriotes	104	103	101	100	77	75	46 401	48 324	46 623	49 299	100	98
du Richelieu	104	105	104	106	80	85	26 038	26 818	25 575	25 946	102	103
du Havre	101	101	102	103	72	71	26 165	24 978	26 890	25 795	97	97
des Maskoutains	104	104	101	103	61	64	39 109	39 059	40 947	40 500	96	96
La Pommerai	105	106	108	108	74	74	25 234	25 408	24 822	25 059	102	101
de la Haute-Yamaska	105	108	102	103	70	72	40 321	42 039	40 884	42 209	99	100
La Chénaie	105	114	112	110	85	87	8 039	8 063	7 524	7 509	107	107
MONTÉRÉGIE	105	105	101	101	72	74	639 085	657 534	648 026	667 265	99	99
ENSEMBLE DU QUÉBEC	105	104	101	102	69	70	3 588 146	3 650 701	3 685 847	3 749 230	97	97

5. Répartition de la population âgée de moins de 18 ans selon l'âge, CLSC, Montérégie et Québec, 2001¹ et 2006¹

CLSC	0-5 ans		6-11 ans		12-17 ans		0-17ans	
	2001	2006	2001	2006	2001	2006	2001	2006
	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
La Presqu'île	7 776	7 123	9 829	8 657	8 152	9 670	25 757	25 450
Huntingdon	1 617	1 524	2 134	1 727	2 305	2 136	6 056	5 387
Seigneurie de Beauharnois	3 001	2 561	4 298	3 281	3 941	4 211	11 240	10 053
Châteauguay	4 332	3 924	6 749	4 827	6 256	6 732	17 337	15 483
Jardin du Québec	1 454	1 377	1 994	1 550	1 942	1 885	5 390	4 812
Kateri	6 989	6 241	8 835	7 950	6 932	8 805	22 756	22 996
Samuel de Champlain	5 777	6 239	7 769	6 397	8 386	8 537	21 932	21 173
Longueuil- Ouest	3 994	3 407	4 371	3 934	3 917	4 446	12 282	11 787
Longueuil-Est	4 669	4 372	5 266	4 770	4 559	5 299	14 494	14 441
St-Hubert	5 084	4 978	7 100	5 256	6 891	7 435	19 075	17 669
Des Seigneuries	7 370	6 809	9 690	8 280	8 470	9 486	25 530	24 575
Ch. de la Vallée des Forts	6 353	5 929	8 703	6 829	8 020	9 172	23 076	21 930
La Vallée des Patriotes	6 644	6 193	8 704	7 690	7 575	8 685	22 923	22 568
du Richelieu	3 498	3 013	4 929	3 610	4 575	4 739	13 002	11 362
du Havre	2 433	2 134	3 149	2 595	3 472	3 082	9 054	7 811
des Maskoutains	4 819	4 717	6 114	4 901	6 062	6 279	16 995	15 897
La Pommeraiie	2 766	2 834	3 836	2 835	3 990	3 967	10 592	9 636
de la Haute-Yamaska	5 259	5 027	6 784	5 671	6 666	6 806	18 709	17 504
La Chênaie	1 075	958	1 250	1 205	1 359	1 229	3 684	3 392
MONTÉRÉGIE	84 910	79 360	111 504	91 965	103 470	112 601	299 884	283 926
ENSEMBLE DU QUÉBEC	471 721	445 912	570 257	494 568	540 347	578 978	1 582 325	1 519 458

6. Proportion de la population âgée de moins de 18 ans selon l'âge, CLSC, Montérégie et Québec, 2001¹ et 2006¹

CLSC	0-5 ans		6-11 ans		12-17 ans		0-17ans	
	2001	2006	2001	2006	2001	2006	2001	2006
	%	%	%	%	%	%	%	%
La Presqu'île	7,4	6,4	9,4	7,8	7,8	8,7	24,6	22,8
Huntingdon	6,5	6,2	8,6	7,0	9,3	8,6	24,4	21,8
Seigneurie de Beauharnois	5,5	4,7	7,8	6,1	7,2	7,8	20,4	18,6
Châteauguay	6,2	5,6	9,7	6,9	9,0	9,6	24,9	22,1
Jardin du Québec	6,3	6,0	8,6	6,8	8,4	8,2	23,3	21,0
Kateri	8,1	6,8	10,2	8,6	8,0	9,5	26,4	24,9
Samuel de Champlain	5,0	5,3	6,8	5,4	7,3	7,2	19,2	17,8
Longueuil- Ouest	6,2	5,4	6,8	6,3	6,1	7,1	19,0	18,7
Longueuil-Est	7,2	6,6	8,1	7,2	7,0	8,0	22,3	21,7
St-Hubert	6,3	6,1	8,9	6,4	8,6	9,1	23,8	21,6
Des Seigneuries	7,0	6,2	9,2	7,6	8,1	8,7	24,4	22,5
Ch. de la Vallée des Forts	6,3	5,7	8,6	6,5	7,9	8,8	22,8	21,0
La Vallée des Patriotes	6,8	6,1	8,9	7,6	7,8	8,6	23,5	22,3
du Richelieu	6,6	5,8	9,3	7,0	8,7	9,1	24,6	21,9
du Havre	4,8	4,4	6,2	5,4	6,8	6,4	17,8	16,1
des Maskoutains	6,1	6,0	7,7	6,2	7,6	7,9	21,4	20,1
La Pommeraiie	5,5	5,6	7,6	5,6	7,9	7,8	21,0	19,0
de la Haute-Yamaska	6,2	5,8	8,1	6,6	7,9	7,9	22,2	20,3
La Chênaie	6,9	6,1	8,0	7,7	8,7	7,8	23,7	21,7
MONTÉRÉGIE	6,4	5,9	8,4	6,8	7,8	8,3	22,6	21,0
ENSEMBLE DU QUÉBEC	6,4	5,9	7,7	6,6	7,3	7,7	21,4	20,2

7. Répartition de la population âgée de 18-64 ans selon l'âge, CLSC, Montérégie et Québec, 2001¹ et 2006¹

CLSC	18-24 ans		25-44 ans		45-64 ans		18-64 ans	
	2001	2006	2001	2006	2001	2006	2001	2006
	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
La Presqu'île	9 001	8 855	33 745	33 210	25 912	32 285	68 658	74 350
Huntingdon	2 215	2 412	6 609	6 030	6 287	7 085	15 111	15 527
Seigneurie de Beauharnois	4 976	4 453	15 295	13 183	14 688	16 993	34 959	34 629
Châteauguay	6 927	6 779	20 837	19 893	16 877	19 008	44 641	45 680
Jardin du Québec	2 094	2 040	6 874	6 176	5 781	6 548	14 749	14 764
Kateri	7 614	7 607	30 133	29 180	19 833	24 990	57 580	61 777
Samuel de Champlain	12 354	10 664	31 921	33 917	34 361	36 443	78 636	81 024
Longueuil- Ouest	5 352	4 393	20 241	17 887	17 238	18 354	42 831	40 634
Longueuil-Est	5 939	5 243	21 265	19 550	17 117	19 719	44 321	44 512
St-Hubert	8 296	7 922	24 959	22 667	21 548	25 587	54 803	56 176
Des Seigneuries	9 702	9 057	33 822	32 123	27 649	32 832	71 173	74 012
Ch. de la Vallée des Forts	9 612	8 978	29 908	28 433	25 529	30 355	65 049	67 766
La Vallée des Patriotes	9 590	8 605	28 929	28 047	27 402	31 323	65 921	67 975
du Richelieu	5 226	4 597	16 050	14 648	13 022	15 008	34 298	34 253
du Havre	4 925	3 761	13 145	11 303	15 432	16 749	33 502	31 813
des Maskoutains	8 117	6 715	22 890	21 719	20 278	23 013	51 285	51 447
La Pommeraiie	4 855	4 303	13 280	12 518	13 806	15 641	31 941	32 462
de la Haute-Yamaska	8 288	7 430	25 244	23 798	21 490	25 605	55 022	56 833
La Chênaie	1 598	1 421	4 337	4 132	4 015	4 565	9 950	10 118
MONTÉRÉGIE	126 681	115 235	399 484	378 414	348 265	402 103	874 430	895 752
ENSEMBLE DU QUÉBEC	698 256	651 447	2 266 813	2 134 181	1 892 207	2 172 560	4 857 276	4 958 188

8. Proportion de la population âgée de 18-64 ans selon l'âge, CLSC, Montérégie et Québec, 2001¹ et 2006¹

CLSC	18-24 ans		25-44 ans		45-64 ans		18-64 ans	
	2001	2006	2001	2006	2001	2006	2001	2006
	%	%	%	%	%	%	%	%
La Presqu'île	8,6	7,9	32,3	29,8	24,8	29,0	65,6	66,7
Huntingdon	8,9	9,7	26,6	24,3	25,3	28,6	60,9	62,7
Seigneurie de Beauharnois	9,1	8,2	27,8	24,4	26,7	31,5	63,6	64,2
Châteauguay	9,9	9,7	29,9	28,4	24,2	27,1	64,1	65,2
Jardin du Québec	9,0	8,9	29,7	27,0	25,0	28,6	63,7	64,5
Kateri	8,8	8,2	35,0	31,6	23,0	27,1	66,8	66,9
Samuel de Champlain	10,8	9,0	27,9	28,5	30,0	30,7	68,7	68,2
Longueuil- Ouest	8,3	7,0	31,3	28,4	26,6	29,2	66,2	64,6
Longueuil-Est	9,1	7,9	32,7	29,4	26,3	29,7	68,2	67,0
St-Hubert	10,3	9,7	31,1	27,7	26,9	31,2	68,4	68,5
Des Seigneuries	9,3	8,3	32,3	29,4	26,4	30,1	67,9	67,8
Ch. de la Vallée des Forts	9,5	8,6	29,5	27,2	25,2	29,1	64,2	64,9
La Vallée des Patriotes	9,8	8,5	29,6	27,7	28,1	30,9	67,5	67,1
du Richelieu	9,9	8,9	30,4	28,3	24,7	29,0	65,0	66,1
du Havre	9,7	7,8	25,9	23,3	30,4	34,6	66,0	65,7
des Maskoutains	10,2	8,5	28,8	27,4	25,5	29,0	64,5	64,9
La Pommeraiie	9,6	8,5	26,3	24,7	27,4	30,9	63,3	64,1
de la Haute-Yamaska	9,8	8,6	30,0	27,5	25,5	29,6	65,3	65,8
La Chênaie	10,3	9,1	27,9	26,4	25,8	29,1	63,9	64,6
MONTÉRÉGIE	9,6	8,5	30,2	28,0	26,3	29,7	66,0	66,2
ENSEMBLE DU QUÉBEC	9,4	8,6	30,6	28,3	25,6	28,8	65,6	65,8

9. Répartition de la population âgée de 65 ans et plus selon l'âge, CLSC, Montérégie et Québec, 2001¹ et 2006¹

CLSC	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et plus		65 ans et plus	
	2001	2006	2001	2006	2001	2006	2001	2006
	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
La Presqu'île	6 093	6 701	3 199	3 765	913	1 192	10 205	11 658
Huntingdon	1 981	2 054	1 276	1 321	384	476	3 641	3 851
Seigneurie de Beauharnois	4 763	4 914	3 095	3 329	922	1 051	8 780	9 294
Châteauguay	4 877	5 401	2 287	2 859	496	669	7 660	8 929
Jardin du Québec	1 730	1 837	960	1 077	312	400	3 002	3 314
Kateri	3 882	4 915	1 636	2 162	358	513	5 876	7 590
Samuel de Champlain	8 221	9 933	4 274	5 058	1 425	1 635	13 920	16 626
Longueuil- Ouest	5 449	5 509	3 287	3 859	859	1 141	9 595	10 509
Longueuil-Est	3 646	4 383	1 976	2 374	548	735	6 170	7 492
St-Hubert	4 033	5 138	1 804	2 391	456	587	6 293	8 116
Des Seigneuries	5 270	6 631	2 210	3 065	592	806	8 072	10 502
Ch. de la Vallée des Forts	7 577	8 003	4 406	5 231	1 160	1 480	13 143	14 714
La Vallée des Patriotes	5 470	6 520	2 630	3 512	679	801	8 779	10 833
du Richelieu	3 309	3 791	1 685	1 839	470	565	5 464	6 195
du Havre	4 682	4 558	2 749	3 267	786	976	8 217	8 801
des Maskoutains	5 910	6 139	3 936	4 180	1 433	1 566	11 279	11 885
La Pommeraie	4 185	4 571	2 791	2 848	958	1 132	7 934	8 551
de la Haute-Yamaska	6 009	6 584	3 487	4 261	1 021	1 250	10 517	12 095
La Chênaie	1 141	1 325	600	596	197	236	1 938	2 157
MONTÉRÉGIE	88 228	98 907	48 288	56 994	13 969	17 211	150 485	173 112
ENSEMBLE DU QUÉBEC	544 788	572 863	318 757	365 982	96 785	118 522	960 330	1 057 367

10. Proportion de la population âgée de 65 ans et plus selon l'âge, CLSC, Montérégie et Québec, 2001¹ et 2006¹

CLSC	65-74 ans		75-84 ans		85 ans et plus		65 ans et plus	
	2001	2006	2001	2006	2001	2006	2001	2006
	%	%	%	%	%	%	%	%
La Presqu'île	5,8	6,0	3,1	3,4	0,9	1,1	9,8	10,5
Huntingdon	8,0	8,3	5,1	5,3	1,5	1,9	14,7	15,6
Seigneurie de Beauharnois	8,7	9,1	5,6	6,2	1,7	1,9	16,0	17,2
Châteauguay	7,0	7,7	3,3	4,1	0,7	1,0	11,0	12,7
Jardin du Québec	7,5	8,0	4,1	4,7	1,3	1,7	13,0	14,5
Kateri	4,5	5,3	1,9	2,3	0,4	0,6	6,8	8,2
Samuel de Champlain	7,2	8,4	3,7	4,3	1,2	1,4	12,2	14,0
Longueuil- Ouest	8,4	8,8	5,1	6,1	1,3	1,8	14,8	16,7
Longueuil-Est	5,6	6,6	3,0	3,6	0,8	1,1	9,5	11,3
St-Hubert	5,0	6,3	2,3	2,9	0,6	0,7	7,8	9,9
Des Seigneuries	5,0	6,1	2,1	2,8	0,6	0,7	7,7	9,6
Ch. de la Vallée des Forts	7,5	7,7	4,4	5,0	1,1	1,4	13,0	14,1
La Vallée des Patriotes	5,6	6,4	2,7	3,5	0,7	0,8	9,0	10,7
du Richelieu	6,3	7,3	3,2	3,5	0,9	1,1	10,4	12,0
du Havre	9,2	9,4	5,4	6,7	1,5	2,0	16,2	18,2
des Maskoutains	7,4	7,7	4,9	5,3	1,8	2,0	14,2	15,0
La Pommeraie	8,3	9,0	5,5	5,6	1,9	2,2	15,7	16,9
de la Haute-Yamaska	7,1	7,6	4,1	4,9	1,2	1,4	12,5	14,0
La Chênaie	7,3	8,5	3,9	3,8	1,3	1,5	12,4	13,8
MONTÉRÉGIE	6,7	7,3	3,6	4,2	1,1	1,3	11,4	12,8
ENSEMBLE DU QUÉBEC	7,4	7,6	4,3	4,9	1,3	1,6	13,0	14,0


3. ⁽⁴⁾ TAUX DE FÉCONDITÉ SELON L'ÂGE

- En 1998, les femmes montréalaises donnent naissance en moyenne à 1,5 enfants. Ce nombre n'est pas suffisant pour assurer le renouvellement des générations, mais est toujours supérieur à celui estimé pour l'ensemble du Québec.
- Ce nombre moyen d'enfants, mesuré par l'**indice synthétique de fécondité**, a légèrement diminué entre 1981 et 1998, passant de 1,7 à 1,5. Après une remontée vers la fin des années 80, il est en baisse depuis le début des années 90.
- Pour la période 1996-1998, le taux annuel moyen de fécondité pour 1 000 femmes de **25-29 ans** est de 127, soit plus de 40 % de la valeur du taux total de femmes de tous âges.
- Entre les périodes 1981-1983 et 1996-1998, lorsqu'on examine les taux annuels moyens de fécondité par **âge des femmes**, la même tendance à la baisse s'observe chez les femmes de 20 à 29 ans tandis que chez les 30-34 ans, une remontée se dessine à partir de la période 1987-1989. Les femmes plus âgées de 35-49 ans affichent au contraire des autres groupes, une remontée presque constante, passant d'un taux de 7,5 en 1981-1983 à 10,1 en 1996-1998.
- Pour la période 1994-1998, les **territoires de CLSC** présentent des indices synthétiques forts différents oscillant de 1,99 pour Longueuil-Est à 1,17 pour le CLSC voisin de Longueuil-Ouest.


Pour la même période, le CLSC La Presqu'île qui se situe au 5e rang du point de vue de son indice synthétique, avec une valeur de 1,84, compte le plus grand nombre de naissances, soit 1 341.

Par rapport à l'âge moyen des mères de l'ensemble de la Montérégie, qui est de 28,3 ans, identique à celui du Québec, les CLSC varient entre un maximum de 29,7 ans dans le territoire du CLSC Samuel de Champlain à un minimum de 26,1 ans pour les mères résidant sur le territoire du CLSC de La Chênaie.


1. Indice synthétique de fécondité, Montérégie, 1981 à 1998



2. Taux de fécondité selon l'âge¹, Montérégie, 1981-1983 à 1996-1998



3. Indice synthétique de fécondité, CLSC, Montérégie et Québec, 1994-1998



4. Taux de fécondité selon l'âge² de la mère, indice synthétique de fécondité et âge moyen des mères à la naissance, CLSC, Montérégie, Québec, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 1 000 femmes)

CLSC	1994-1998						Indice synthétique de fécondité			Âge moyen		
	15-19 ans	20-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-49 ans	Nombre ²	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux		Indice	Indice	Indice	Années	Années	Années
La Presqu'île	* 9,1 (-)	73,5	152,2 (+)	97,9 (+)	13,5 (+)	1 341	1,63	1,86	1,84	27,7	28,6	29,2
Huntingdon	* 30,3 (+)	108,5 (+)	138,5	71,1	* 10,0	280	1,84	2,03	1,88	26,2	26,8	27,2
Seigneurie de Beauharnois	* 18,9	88,6	128,6	65,3 (-)	7,3 (-)	575	1,28	1,66	1,61	26,4	27,0	27,4
Châteauguay	16,0	71,4	125,9	78,9	10,0	769	1,46	1,80	1,59	27,1	27,7	28,1
Jardin du Québec	* 11,6	94,4	143,7	73,4	* 10,0	264	1,61	1,92	1,75	26,6	27,4	28,0
Kateri	* 10,0	72,1	147,8 (+)	92,0	10,3	1 127	1,57	1,86	1,74	27,3	28,0	28,8
Samuel-de-Champlain	* 7,6 (-)	37,1 (-)	93,3 (-)	96,4 (+)	12,2 (+)	1 021	1,38	1,44	1,37	28,5	29,3	29,7
Longueuil-Ouest	21,0	62,6	72,6 (-)	54,9 (-)	7,8	743	1,21	1,55	1,17	26,1	27,0	27,3
Longueuil-Est	35,7 (+)	95,0 (+)	130,6	91,4	15,7 (+)	866	1,40	1,71	1,99	26,4	27,3	27,8
Saint-Hubert	13,2	64,9	128,1	82,2	9,0	911	1,58	1,74	1,57	27,3	27,9	28,4
des Seigneuries	* 5,9 (-)	53,7 (-)	145,7	99,0 (+)	10,7	1 213	1,44	1,75	1,67	27,9	28,4	29,3
Champagnat de la Vallée de Forts	18,0	97,5 (+)	132,9	74,8	8,3	1 151	1,54	1,83	1,73	26,7	27,2	27,6
La Vallée des Patriotes	* 5,9 (-)	51,2 (-)	137,8	95,2 (+)	10,5	1 001	1,46	1,67	1,60	28,1	28,6	29,4
du Richelieu	* 12,0	99,7 (+)	153,1 (+)	82,4	9,8	700	1,70	2,08	1,86	27,1	27,6	28,3
du Havre	* 13,0	67,8	121,9	63,8 (-)	5,7 (-)	447	1,27	1,41	1,42	27,1	27,6	27,5
des Maskoutains	15,0	85,5	131,8	71,4	7,5 (-)	892	1,62	1,72	1,62	26,6	27,0	27,5
La Pommerai	* 16,9	97,6 (+)	130,8	74,7	8,6	499	1,64	1,92	1,73	26,5	27,2	27,7
de la Haute-Yamaska	20,0	98,3 (+)	131,6	64,7 (-)	8,3	930	1,53	1,80	1,68	26,2	26,9	27,3
La Chénaie	* 29,3	131,2 (+)	158,9	* 58,7 (-)	* 5,7 (-)	190	1,30	1,84	1,97	25,8	26,1	26,1
MONTÉRÉGIE	14,4	74,5	129,7	82,2	9,9	14 921	1,47³	1,74	1,63	27,1	27,7	28,3
ENSEMBLE DU QUÉBEC	16,2	70,8	117,3	80,1	10,9	83 641	1,39³	1,62	1,57	27,1	27,7	28,3

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 4 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

- Dans le groupe des 15-19 ans sont incluses au numérateur les naissances des mères de 14 ans et moins, dans le groupe des 35-49 ans sont incluses celles de 50 ans et plus (de 1981 à 1997, respectivement en moyenne moins de 50 et 5 naissances pour l'ensemble du Québec).
 - Nombre annuel moyen de naissances vivantes.
Avant 1988, les naissances de poids inférieurs à 500 grammes ne sont pas comprises dans les données (pour 1988 et les années suivantes moins de 75 naissances en moyenne annuellement pour l'ensemble du Québec).
 - Les données correspondantes dans *Le portrait de santé : Le Québec et ses régions*, p. 167 ont été corrigées depuis la publication.
- (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
(-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
* Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

4. ⁽⁶⁾ RÉPARTITION DE LA POPULATION DE 15 ANS ET PLUS SELON L'ÉTAT MATRIMONIAL DE FAIT

- En 1996, le **statut matrimonial de fait**, pour près des deux tiers des Montérégiens de 15 ans et plus, correspond au fait d'être actuellement marié (46 % soit plus de 485 000 personnes) ou de vivre en union libre (16 % ou 117 000 personnes), le quart est célibataire (jamais mariés), tandis que les autres résidents de la région (13 %) sont par ordre décroissant : divorcés, veufs ou séparés.

La région présente des valeurs légèrement supérieures à celles du Québec pour les personnes mariées ou en union libre mais inférieure en ce qui a trait aux célibataires.


- Entre 1991 et 1996, la proportion des personnes mariées a légèrement baissé (de 52 % à 46 %) tandis que celles vivant en union libre ou divorcées a chacune augmenté d'environ un quart (25 %). La part des célibataires jamais mariés est passée de 24 à 25 %.
- L'âge est directement lié au statut matrimonial de fait : la proportion des personnes vivant en union libre diminue rapidement **avec l'âge** : à titre d'exemple chez les 45-64 ans il y a sept fois plus de personnes mariées que de personnes en union libre; ce rapport, en faveur des gens mariés, n'est plus que de 1,6 chez les 15-44 ans.

Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, c'est une personne sur trois qui se retrouve veuve.


- C'est au niveau de la géographie découpée en **territoires de CLSC** de résidence que se trouvent les écarts les plus considérables entre les diverses proportions de chacun des statuts et ceci autant pour 1991 que pour 1996.

En 1991, la proportion de personnes mariées présente un écart de près de 20 % entre les territoires de Longueuil-Ouest (39 %) et Châteauguay (57 %). L'écart est d'environ du simple au double en ce qui a trait aux personnes en union libre pour les CLSC Longueuil-Est (16 %) et Samuel-de-Champlain (9 %) et pour les personnes divorcées entre Longueuil-Ouest (7 %) et Jardin du Québec (3 %). Entre Kateri (4 %), Seigneurie de Beauharnois (7 %) et La Pommerai (7 %), c'est la proportion de veufs et de veuves qui présente les différences les plus marquées.

1. Répartition de la population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial de fait ¹, Montérégie, 1991 et 1996



2. Répartition de la population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial de fait ¹ et l'âge, Montérégie, 1996



3. Répartition de la population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial de fait ¹, CLSC officiels, Montérégie et Québec, 1991

CLSC officiels	Célibataires (jamais mariés)	Actuellement mariés	Partenaires en union libre	Séparés	Divorcés	Veufs	Population de 15 ans et plus
	%	%	%	%	%	%	Nombre
La Presqu'île	21,2	56,5	12,1	1,6	3,9	4,7	65 105
Huntingdon	22,9	53,2	10,9	1,7	3,7	7,6	17 155
Seigneurie de Beauharnois	23,0	50,4	12,5	2,0	4,8	7,2	47 960
Châteauguay	22,5	57,4	9,8	1,7	3,7	4,9	40 990
Jardin du Québec	22,9	54,6	11,7	1,6	3,1	6,0	17 120
Kateri	21,4	54,8	14,9	1,8	3,6	3,5	49 680
Samuel-de-Champlain	27,2	51,5	8,7	2,0	5,0	5,6	87 595
Longueuil-Ouest	30,1	39,1	14,2	3,0	7,3	6,3	57 585
Longueuil-Est	27,8	42,9	15,8	2,6	6,3	4,7	48 445
Saint-Hubert	24,2	53,8	12,2	1,7	4,0	4,1	56 540
des Seigneuries	22,6	56,5	12,6	1,5	3,2	3,6	65 545
Champagnat de la Vallée de Forts	24,2	50,2	13,4	1,9	4,8	5,6	72 895
La Vallée des Patriotes	22,6	55,4	12,4	1,6	3,7	4,2	80 530
du Richelieu	22,6	52,1	15,2	1,5	3,7	4,9	23 985
du Havre	24,2	52,7	10,3	1,7	4,7	6,5	43 530
des Maskoutains	24,8	49,5	13,0	2,2	4,8	5,8	60 390
La Pommeraie	23,2	51,8	11,4	1,7	4,7	7,2	35 490
de la Haute-Yamaska	22,6	49,9	14,2	1,6	5,8	5,9	56 935
La Chênaie	22,3	54,0	12,5	1,6	3,9	5,7	11 065
MONTÉRÉGIE	24,1	51,7	12,5	1,9	4,6	5,3	938 540
ENSEMBLE DU QUÉBEC	27,2	48,7	11,2	2,0	4,7	6,2	5 517 785

4. Répartition de la population de 15 ans et plus selon l'état matrimonial de fait ¹, CLSC officiels, Montérégie et Québec, 1996

CLSC officiels	Célibataires (jamais mariés)	Actuellement mariés	Partenaires en union libre	Séparés	Divorcés	Veufs	Population de 15 ans et plus
	%	%	%	%	%	%	Nombre
La Presqu'île	22,3	50,4	16,1	1,7	4,8	4,7	73 725
Huntingdon	23,6	48,7	14,0	1,6	4,7	7,4	17 400
Seigneurie de Beauharnois	24,9	43,6	15,3	2,2	6,3	7,7	44 680
Châteauguay	23,6	51,6	12,9	1,8	4,7	5,4	46 960
Jardin du Québec	23,3	48,6	16,3	1,5	4,2	6,1	17 950
Kateri	23,0	47,8	19,2	1,7	4,7	3,6	58 510
Samuel-de-Champlain	28,2	48,0	10,0	2,0	5,9	6,0	89 955
Longueuil-Ouest	32,1	33,9	15,2	3,0	9,1	6,8	55 130
Longueuil-Est	29,3	38,1	17,4	2,6	7,7	4,9	49 830
Saint-Hubert	25,9	47,7	14,8	1,9	5,3	4,3	59 835
des Seigneuries	23,7	49,7	17,1	1,6	4,3	3,6	74 045
Champagnat de la Vallée de Forts	24,7	44,4	16,9	2,0	6,0	6,0	75 885
La Vallée des Patriotes	24,5	49,5	15,3	1,7	4,8	4,2	72 080
du Richelieu	23,1	45,8	19,5	1,7	5,1	4,7	38 735
du Havre	25,6	46,5	13,6	1,6	5,7	7,0	43 580
des Maskoutains	27,1	43,0	16,4	1,6	5,8	6,1	63 170
La Pommeraie	24,7	46,2	14,2	1,7	6,1	7,1	39 365
de la Haute-Yamaska	24,5	43,4	17,3	1,6	7,1	5,9	63 125
La Chênaie	24,2	46,9	16,9	1,5	4,6	5,7	11 960
MONTÉRÉGIE	25,4	46,0	15,6	1,9	5,7	5,4	995 975
ENSEMBLE DU QUÉBEC	28,4	43,7	13,9	2,0	5,8	6,2	5 766 615

Notes


Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 6 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Les catégories « célibataires », « légalement mariés », « divorcés », « séparés » et « veufs » excluent les « partenaires en union libre ».


5. ⁽⁷⁾ RÉPARTITION DES FAMILLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS SELON LA STRUCTURE DE LA FAMILLE

- En 1996, sur les 178 330 familles montréalaises avec enfants de moins de dix-huit ans, on en dénombre plus de huit sur dix qui sont formées de deux parents dont les trois quarts sont actuellement mariés et un peu plus du quart qui vivent en union libre. Un peu moins de une famille sur cinq (18 %) est dirigée par un seul parent. La région se distingue du Québec par ses proportions plus élevées de parents mariés ou en union libre et par sa valeur inférieure de parents seuls.
- La situation diffère de celle qui prévalait en 1991 où la famille dirigée par des parents mariés constituait à elle seule la structure familiale pour près de sept familles sur dix. Depuis, la proportion des familles monoparentales a été multipliée par 1,2 mais surtout les familles dirigées par des parents vivant en union libre ont augmenté de 56 %.
- En 1996, les données témoignent d'une évolution rapide au niveau des structures familiales : dans les familles qui ont au moins un jeune enfant à la maison âgé de moins de six ans, la proportion des familles dirigées par des parents vivant en union libre (34 %) se rapproche progressivement de celle des familles dirigées par des parents mariés (52 %), et ce type de familles est près de trois fois plus répandu que lorsque l'âge du plus jeune enfant est plus avancé, soit entre 15-17 ans.
- La répartition du type de familles diffère beaucoup selon le territoire du CLSC. Les proportions de familles dirigées par deux parents mariés oscillent entre 40 % à Longueuil-Ouest et 68 % à Samuel de Champlain. En ce qui concerne celles dirigées par deux parents vivant en union libre, les proportions oscillent entre 15 % à Samuel de Champlain et 27 % aux CLSC Du Richelieu et La Chênaie.. Les proportions de familles monoparentales présentent des écarts encore plus importants, soit du simple au CLSC Jardin du Québec (13 %) à presque le triple au CLSC Longueuil-Ouest (36 %), et ceci, bien que le nombre de ce type de familles soit le plus élevé au CLSC des Seigneuries, soit 14 930 et que ce dernier n'occupe que le 16^e rang au niveau des pourcentages (14 %).


1. Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, Montréal, 1991 à 1996



2. Répartition (%) des familles avec enfants de moins de 18 ans selon l'âge du plus jeune enfant à la maison et la structure de la famille, Montréal, 1996



3. Proportion des familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans, CLSC, Montérégie et Québec, 1996



4. Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille, CLSC, Montérégie et Québec, 1996

CLSC	Couples actuellement mariés	Couples vivant en union libre	Familles monoparentales	Familles avec enfants de moins de 18 ans
	%	%	%	Nombre
La Presqu'île	66,1	19,8	14,4	14 190
Huntingdon	64,6	20,5	13,3	2 810
Seigneurie de Beauharnois	51,6	24,9	23,7	7 420
Châteauguay	64,3	18,9	16,6	8 690
Jardin du Québec	62,0	24,7	12,5	3 075
Kateri	60,8	24,3	14,9	12 355
Samuel-de-Champlain	67,7	14,6	17,7	14 005
Longueuil-Ouest	40,0	23,4	36,2	7 920
Longueuil-Est	48,3	23,2	28,4	8 830
Saint-Hubert	62,4	20,1	17,5	11 825
des Seigneuries	62,7	23,5	13,9	14 930
Champagnat de la Vallée de Forts	56,9	24,1	19,1	13 520
La Vallée des Patriotes	63,7	21,0	15,0	13 520
du Richelieu	56,6	26,6	16,5	7 715
du Havre	60,0	19,8	19,9	6 675
des Maskoutains	56,7	23,6	19,5	10 740
La Pommeraie	59,7	23,1	17,5	6 445
de la Haute-Yamaska	55,0	24,7	20,0	11 410
La Chênaie	60,1	26,7	13,7	2 230
MONTÉRÉGIE	59,4	22,1	18,4	178 330
ENSEMBLE DU QUÉBEC	58,9	20,6	20,5	947 060

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 7 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

6. ⁽⁸⁾ PROPORTION D'ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS VIVANT AVEC UN SEUL PARENT

- En 1996, les **enfants de moins de dix-huit ans vivant avec un seul parent** représentent 16 % du total des enfants de ce groupe d'âge vivant dans les familles, ce qui correspond à 49 080 Montréalais et un pourcentage légèrement en deçà de celui estimé pour le Québec.
- Leur proportion a augmenté de près de 15 % **entre 1991 et 1996**. L'accroissement le plus élevé s'est produit chez les jeunes de moins de six ans chez qui la valeur a augmenté de près de 20 %. Le changement observé chez les enfants des deux autres groupes plus âgés étant plus faible et d'ampleur équivalente.
- Malgré cet accroissement plus prononcé chez les plus jeunes, on observe en 1996 comme en 1991, une proportion plus élevée d'enfants vivant avec un seul parent **à mesure que l'âge des enfants augmentent** : 20 % chez les 15-17 ans en comparaison à 12 % chez les moins de six ans en 1996.
- Les écarts les plus prononcés s'observent au niveau des **territoires de CLSC**. Pour l'ensemble des enfants de moins de dix-huit ans, les proportions d'entre eux vivant avec un seul parent varient considérablement entre un maximum de 33 % à Longueuil-Ouest (4 170 enfants) et un minimum de 11%, soit trois fois moins à Huntingdon (610 enfants). Dans le cas particulier des jeunes enfants de moins de six ans, c'est près de six fois plus d'enfants qui vivent avec un seul parent à Longueuil-Ouest que dans le CLSC Huntingdon. Le CLSC Longueuil-Ouest présente d'ailleurs les valeurs les plus élevées pour chacun des trois groupes d'âge considérés tandis qu'à l'autre extrême Huntingdon se distingue avec les pourcentages les plus bas chez les 0-5 ans et chez les 15-17 ans.


Chez les 6-14 ans, la valeur la plus faible est enregistrée au CLSC Jardin du Québec avec 11% d'enfants vivant avec un seul parent.

Les pourcentages de variation sur une courte période de cinq ans, soit entre 1991 et 1996, varient de façon encore plus prononcée : ils oscillent entre une augmentation de 48 % à Châteauguay, particulièrement marquée chez les 6-14 ans, et une diminution de 16 % à Huntingdon.


1. Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent, Montréal, 1991 et 1996



2. Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent selon l'âge des enfants, Montréal, 1991 et 1996



3. Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent, CLSC, Montérégie et Québec, 1996



4. Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent selon l'âge des enfants, CLSC, Montérégie et Québec, 1991 et 1996

CLSC	0-5 ans		6-14 ans		15-17 ans		Moins de 18 ans		
	1991	1996	1991	1996	1991	1996	1991	1996	Variation de 1991 à 1996
	%	%	%	%	%	%	%	Nombre ¹ %	%
La Presqu'île	6,3	8,3	11,9	12,5	15,7	17,1	10,5	2 960 11,7	11,4
Huntingdon	9,5	5,0	14,7	13,6	16,6	14,0	13,2	610 11,1	-15,9
Seigneurie de Beauharnois	14,5	16,2	17,2	22,1	20,5	21,5	16,8	2 495 20,1	19,6
Châteauguay	7,7	8,7	10,3	17,4	12,8	17,6	9,8	2 300 14,5	48,0
Jardin du Québec	6,8	7,8	13,1	11,2	13,8	18,4	11,1	675 11,4	2,7
Kateri	8,8	8,7	11,9	14,6	11,5	19,6	10,8	2 815 13,2	22,2
Samuel-de-Champlain	10,2	11,8	14,8	15,2	17,7	17,6	14,1	3 525 14,7	4,3
Longueuil-Ouest	19,3	27,7	30,2	34,3	34,4	38,4	27,5	4 170 32,7	18,9
Longueuil-Est	21,1	21,8	29,5	26,4	28,4	27,7	26,5	3 605 24,9	-6,0
Saint-Hubert	9,0	11,7	13,0	16,8	16,1	16,5	12,2	3 065 15,1	23,8
des Seigneuries	6,1	6,9	10,7	14,1	10,8	17,5	9,3	3 175 12,3	32,3
Champagnat de la Vallée de Forts	10,2	11,6	16,1	17,3	19,2	20,3	14,7	3 845 15,9	8,2
La Vallée des Patriotes	4,7	7,9	12,3	13,8	13,0	16,9	10,2	2 990 12,6	23,5
du Richelieu	7,3	9,0	13,2	16,5	15,8	21,9	11,6	2 050 14,6	25,9
du Havre	12,7	19,5	12,9	17,0	19,9	15,7	14,0	1 905 17,5	25,0
des Maskoutains	9,1	11,9	15,2	18,4	19,6	19,2	14,0	3 140 16,5	17,9
La Pommeraie	10,3	11,2	13,9	16,3	16,6	18,3	13,2	1 845 15,2	15,2
de la Haute-Yamaska	10,2	12,1	16,5	17,9	18,4	23,4	14,7	3 430 17,1	16,3
La Chênaie	8,9	8,1	13,2	11,4	13,5	15,9	12,0	470 11,5	-4,2
MONTÉRÉGIE	9,8	11,7	15,0	17,0	17,5	19,8	13,7	49 080 15,7	14,6
ENSEMBLE DU QUÉBEC	11,6	13,8	16,4	18,7	19,0	21,5	15,3	286 880 17,6	15,0

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 8 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Le nombre d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent.


7.⁽⁹⁾ PROPORTION DE LA POPULATION VIVANT SEULE

- En 1996, 106 085 personnes de 15 ans et plus vivent seules en Montérégie, soit 11 % de la population totale de 15 ans et plus en ménage privé et 3 % de moins que pour l'ensemble du Québec.
- Cette proportion est en hausse constante depuis 1986 pour une croissance totale de plus de 40 % sur seulement dix ans.
- En 1996, la proportion est plus élevée chez les femmes (12 % c. 10 %) et la hausse entre 1991 et 1996 a été d'ampleur équivalente pour les deux sexes.
- Les valeurs augmentent continuellement avec l'âge et de façon particulièrement prononcée après 64 ans.
- La proportion chez les femmes est supérieure à celle des hommes à partir des groupes d'âge plus avancés de 45-64 ans, et l'écart entre les sexes s'accroît à mesure que l'âge avance, passant de près de 3 % chez les 45-64 ans à 31 % chez les 75 ans et plus.
- Les territoires de CLSC présentent des écarts pour le pourcentage total de personnes vivant seules : allant du simple au CLSC des Seigneuries (7 %) à près du triple à Longueuil-Ouest (19 %). Cette opposition entre ces deux CLSC s'observe autant pour les hommes que pour les femmes. L'ampleur des écarts et les CLSC impliqués varient également dans le cas des groupes d'âge : Longueuil-Ouest présentant les valeurs les plus élevées jusqu'à 75 ans, la relève étant prise par le CLSC Samuel de Champlain qui occupe le premier rang avec 42 % de personnes seules chez les 75 ans et plus.


Entre 1991 et 1996, on remarque une augmentation des pourcentages dans tous les CLSC mais d'ampleur très différente, allant du simple dans le CLSC Samuel de Champlain (12 %) au double dans le CLSC Saint-Hubert (26 %).

Le territoire de Longueuil-Ouest compte le nombre le plus élevé de personnes vivant seules, soit 10 400 personnes.


1. Proportion de la population de 15 ans et plus vivant seule selon le sexe, Montérégie, 1986, 1991 et 1996



2. Proportion de la population de 15 ans et plus vivant seule selon l'âge et le sexe, Montérégie, 1996



3. Proportion de la population de 15 ans et plus vivant seule, CLSC, Montérégie et Québec, 1996



4. Proportion de la population vivant seule selon l'âge et le sexe, CLSC, Montérégie et Québec, 1996

CLSC	15-64 ans			65-74 ans			75 ans et plus		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
La Presqu'île	8,2	5,5	6,9	11,5	26,9	19,4	13,6	48,6	35,9
Huntingdon	10,3	6,2	8,4	20,2	21,6	21,4	18,3	48,5	36,4
Seigneurie de Beauharnois	11,4	10,4	11,0	8,0	35,4	23,5	21,3	52,1	39,9
Châteauguay	5,9	5,6	5,7	14,0	20,8	17,3	17,9	46,0	34,2
Jardin du Québec	8,1	6,0	7,2	10,6	24,3	18,6	6,3	50,0	34,4
Kateri	6,8	5,1	6,0	10,7	23,0	17,7	2,1	36,0	23,3
Samuel-de-Champlain	7,4	9,1	8,3	11,4	32,3	23,0	18,8	53,8	42,2
Longueuil-Ouest	17,1	16,1	16,6	18,4	38,0	30,0	15,2	50,0	37,4
Longueuil-Est	12,7	10,6	11,7	12,9	28,6	21,9	9,7	51,1	36,7
Saint-Hubert	6,7	5,7	6,2	8,6	24,3	17,5	15,6	36,6	29,0
des Seigneuries	6,2	4,6	5,5	8,3	23,4	16,2	14,4	37,6	29,2
Champagnat de la Vallée de Forts	11,8	9,1	10,4	14,4	27,8	21,4	17,9	45,8	35,3
La Vallée des Patriotes	5,8	5,4	5,8	10,8	27,5	18,7	13,2	42,5	30,5
du Richelieu	8,7	6,0	7,3	9,2	25,3	17,6	14,4	48,4	35,7
du Havre	11,4	8,2	9,7	17,4	33,7	26,3	22,3	47,2	37,0
des Maskoutains	11,5	9,8	10,7	11,7	32,2	23,1	20,6	45,7	35,6
La Pommeraie	11,1	7,7	9,4	17,9	31,7	24,7	15,1	53,8	40,1
de la Haute-Yamaska	12,3	9,9	11,1	16,3	30,4	24,1	18,7	46,9	36,3
La Chênaie	10,5	6,7	8,3	14,1	24,2	19,7	15,9	39,3	25,2
MONTÉRÉGIE	9,4	7,8	8,6	12,9	29,2	21,7	16,6	47,5	35,8
ENSEMBLE DU QUÉBEC	11,9	10,3	11,1	15,1	32,9	24,9	19,5	50,1	38,7

5. Proportion de la population de 15 ans et plus vivant seule selon le sexe, CLSC, Montérégie et Québec, 1991 et 1996

CLSC	1991	1996				Variation de 1991 à 1996
		Hommes	Femmes	Total		
	%	%	%	Nombre ¹	%	%
La Presqu'île	7,5	8,8	9,1	6 510	8,9	18,7
Huntingdon	10,2	11,6	12,1	2 020	11,8	16,7
Seigneurie de Beauharnois	11,6	11,5	16,1	6 075	13,9	19,8
Châteauguay	6,3	6,8	8,8	3 630	7,8	23,8
Jardin du Québec	7,6	8,3	10,5	1 665	9,5	25,0
Kateri	5,8	6,9	7,1	4 075	7,0	20,7
Samuel-de-Champlain	10,0	8,1	13,9	9 955	11,2	12,0
Longueuil-Ouest	15,6	17,2	20,6	10 400	19,0	22,4
Longueuil-Est	11,0	12,9	13,2	6 380	13,1	19,1
Saint-Hubert	5,8	6,9	7,7	4 340	7,3	25,9
des Seigneuries	5,5	6,4	6,6	4 780	6,5	18,2
Champagnat de la Vallée de Forts	10,9	12,4	13,0	9 455	12,7	16,5
La Vallée des Patriotes	6,3	6,5	8,4	5 335	7,5	19,0
du Richelieu	8,0	9,1	9,1	3 450	9,1	13,8
du Havre	10,7	12,4	13,7	5 555	13,0	21,5
des Maskoutains	11,6	11,9	14,4	8 050	13,2	13,8
La Pommeraie	11,4	12,3	14,0	4 980	13,2	15,8
de la Haute-Yamaska	11,5	12,9	13,6	8 170	13,2	15,7
La Chênaie	9,3	11,1	10,3	1 250	10,7	14,0
MONTÉRÉGIE	9,3	9,9	11,7	106 085	10,8	16,1
ENSEMBLE DU QUÉBEC	12,0	12,5	14,8	769 835	13,7	14,2

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 9 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre de personnes de 15 ans et plus vivant seules.


8. ⁽¹⁰⁾ PROPORTION DE LA POPULATION DE 65 ANS ET PLUS VIVANT EN MÉNAGE PRIVÉ

- En **1996**, neuf personnes sur dix de **65 ans et plus vivaient en ménage privé** en Montérégie, ce qui correspond à 116 710 personnes et à une hausse infime depuis 1991 et d'ampleur équivalente à celle observée dans l'ensemble du Québec.
- En **1996**, les proportions sont plus élevées chez les **hommes** par rapport aux femmes et nettement supérieures chez les **personnes âgées** de 65-74 ans (97 %), par rapport aux 75-84 ans (87 %), et surtout par rapport aux 85 ans et plus (56 %).
- Entre **1991 et 1996**, les valeurs ont très marginalement augmenté chez les moins de 85 ans et diminué chez les personnes âgées de plus de 85 ans.
- Chez ce dernier groupe, en 1996, au niveau des **territoires de CLSC**, des écarts considérables sont enregistrées, par exemple 82 % des personnes de 85 ans et plus de Longueuil-Ouest vivent encore en ménage privé contre 36 % et 38 % respectivement pour les CLSC des Seigneuries d'une part et Longueuil-Est et des Maskoutains d'autre part.


Pour l'ensemble des personnes de 65 ans et plus, certains CLSC présentent des écarts intéressants : 96 % des personnes du CLSC Longueuil-Ouest tandis que 83 % de celles des Maskoutains vivent encore en ménage privé, en 1996.

Certaines valeurs sont le résultat d'évolutions différentes selon le CLSC : tandis qu'en 1996, par rapport à 1991, on retrouve 4 % de plus de personnes de 65 ans et plus vivant en ménage privé dans le territoire du CLSC Châteauguay, c'est une diminution de 3 % qu'on enregistre pour les CLSC Longueuil-Ouest et de la Haute-Yamaska.


1. Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé selon le sexe, Montérégie, 1991 et 1996



2. Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé selon l'âge, Montérégie, 1991 et 1996



3. Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé, CLSC officiels, Montérégie et Québec, 1996



4. Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé selon l'âge, CLSC officiels, Montérégie et Québec, 1991 et 1996

CLSC officiels	65-74 ans		Variation de 1991 à 1996	75-84 ans		Variation de 1991 à 1996	85 ans et plus		Variation de 1991 à 1996
	1991	1996		1991	1996		1991	1996	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
La Presqu'île	94,8	98,0	3,4	95,8	88,8	-7,3	46,9	69,7	48,6
Huntingdon	97,3	97,3	0,0	100,0	94,6	-5,4	47,6	63,6	33,6
Seigneurie de Beauharnois	95,7	96,8	1,1	88,4	84,4	-4,5	44,4	50,0	12,6
Châteauguay	91,6	98,5	7,5	91,9	88,7	-3,5	82,3	76,3	-7,3
Jardin du Québec	96,3	98,3	2,1	94,0	95,2	1,3	76,7	48,9	-36,2
Kateri	100	94,9	-5,1	77,1	92,7	20,2	50,0	48,3	-3,4
Samuel-de-Champlain	97,9	97,8	-0,1	92,1	92,8	0,8	66,7	79,5	19,2
Longueuil-Ouest	100,0	97,3	-2,7	96,9	96,7	-0,2	88,4	81,5	-7,8
Longueuil-Est	94,6	94,5	-0,1	75,2	79,1	5,2	39,7	37,8	-4,8
Saint-Hubert	98,7	97,1	-1,6	83,9	84,2	0,4	69,8	59,7	-14,5
des Seigneuries	93,4	96,7	3,5	81,7	76,3	-6,6	59,5	35,6	-40,2
Champagnat de la Vallée de Forts	98,0	97,5	-0,5	84,8	89,5	5,5	66,2	52,4	-20,8
La Vallée des Patriotes	95,2	96,5	1,4	96,0	89,2	-7,1	53,1	74,1	39,5
du Richelieu	99,4	95,3	-4,1	78,2	80,9	3,5	43,6	52,3	20,0
du Havre	96,4	96,9	0,5	80,9	93,9	16,1	65,0	45,0	-30,8
des Maskoutains	90,7	93,4	3,0	77,3	78,8	1,9	46,0	38,1	-17,2
La Pommeraie	96,4	96,2	-0,2	84,2	85,1	1,1	55,2	58,7	6,3
de la Haute-Yamaska	98,4	95,9	-2,5	81,5	83,7	2,7	54,0	42,7	-20,9
La Chênaie	96,9	98,0	1,1	94,7	87,5	-7,6	53,8	65,6	21,9
MONTÉRÉGIE	96,4	96,7	0,3	86,6	87,3	0,8	56,7	56,3	-0,7
ENSEMBLE DU QUÉBEC	94,9	96,1	1,3	84,3	85,4	1,3	57,0	57,6	1,1

5. Proportion de la population de 65 ans et plus vivant en ménage privé selon le sexe, CLSC officiels, Montérégie et Québec, 1991 et 1996

CLSC officiels	Hommes		Femmes		Total				Variation de 1991 à 1996
	1991	1996	1991	1996	1991		1996		
	%	%	%	%	Nombre ¹	%	Nombre ¹	%	
La Presqu'île	94,3	95,4	89,0	90,5	6 775	91,4	8 125	93,1	1,9
Huntingdon	94,4	93,4	92,1	95,3	2 840	93,1	2 975	93,6	0,5
Seigneurie de Beauharnois	91,9	91,1	88,3	88,5	6 390	89,6	6 820	88,7	-1,0
Châteauguay	92,6	98,5	89,6	91,2	4 515	91,1	5 815	94,5	3,7
Jardin du Québec	100,0	92,3	87,5	93,0	2 155	93,7	2 360	92,7	-1,1
Kateri	94,3	86,3	88,3	95,8	3 225	91,0	4 245	91,3	0,4
Samuel-de-Champlain	93,2	96,9	94,4	92,9	9 605	93,9	11 710	94,6	0,7
Longueuil-Ouest	97,9	94,3	100,0	97,7	7 245	99,2	8 150	96,3	-2,9
Longueuil-Est	86,7	88,6	83,0	81,0	3 685	84,5	4 400	84,5	0,0
Saint-Hubert	92,8	90,0	93,0	91,4	3 885	92,9	4 670	91,2	-1,8
des Seigneuries	92,3	90,9	83,9	82,1	4 210	87,3	5 330	86,2	-1,3
Champagnat de la Vallée de Forts	98,4	95,3	87,1	88,8	8 940	91,8	10 250	91,2	-0,7
La Vallée des Patriotes	91,5	97,6	93,8	88,2	5 805	92,7	7 020	92,9	0,2
du Richelieu	89,6	88,9	86,6	85,9	3 560	87,8	4 020	87,2	-0,7
du Havre	90,1	93,4	89,2	91,3	5 630	89,6	6 655	92,0	2,7
des Maskoutains	91,4	92,6	75,9	77,0	7 915	81,9	8 565	82,5	0,7
La Pommerai	91,5	91,9	86,5	87,1	5 960	88,6	6 245	88,8	0,2
de la Haute-Yamaska	97,2	94,2	84,7	82,3	6 960	90,0	7 730	87,5	-2,8
La Chênaie	100,0	100,0	86,1	83,2	1 440	92,6	1 590	91,6	-1,1
MONTÉRÉGIE	93,5	93,7	88,2	88,4	100 740	90,4	116 710	90,5	0,0
ENSEMBLE DU QUÉBEC	91,8	92,9	86,5	87,0	683 175	88,6	769 585	89,4	0,9

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 10 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).


1. Nombre de personnes de 65 ans et plus vivant en ménage privé.

9. ⁽¹¹⁾ RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LA LANGUE PARLÉE À LA MAISON


- En 1996, la proportion de personnes **parlant le français à la maison** se situe à 88 % en Montérégie, soit 5 % de plus que la valeur québécoise.
- Ce pourcentage est à peu près stable **depuis 1986** contrairement à des variations à la baisse dans le cas de l'anglais (10 %) et à la hausse dans le cas des autres langues (47 %).
- Les proportions de personnes qui parlent le français dans les divers **groupes d'âges** sont assez voisines sauf chez la génération plus âgée des 65 ans et plus où elle est légèrement plus faible.
- Les **territoires de CLSC** se partagent en deux groupes quant au français comme langue parlée à la maison : d'une part treize des dix-neuf CLSC qui présentent des valeurs supérieures à 90 % et d'autre part, six dont deux, soit Huntingdon (64 %) et Samuel de Champlain (62 %) ont une concentration nettement moindre que celle de la région.

La baisse de l'anglais enregistrée au niveau régional se retrouve dans presque tous les CLSC au profit d'une hausse des autres langues parlées.


1. Répartition de la population selon la langue parlée à la maison¹, Montérégie, 1986, 1991 et 1996



2. Répartition (%) de la population selon la langue parlée à la maison¹ et l'âge, Montérégie, 1996



3. Proportion de la population parlant le français à la maison¹, CLSC, Montérégie et Québec, 1996



4. Répartition de la population selon la langue parlée à la maison¹, CLSC, Montérégie et Québec, 1991 et 1996

CLSC	Français		Anglais		Autres langues		Population totale non pensionnaire d'institution ayant déclaré une seule langue parlée à la maison		Variation du français de 1991 à 1996
	1991	1996	1991	1996	1991	1996	1991	1996	
	%	%	%	%	%	%	Nombre	Nombre	%
La Presqu'île	75,2	75,7	23,7	23,4	1,0	0,9	82 570	92 735	0,7
Huntingdon	62,3	63,6	36,5	35,7	1,2	0,8	21 265	21 340	2,1
Seigneurie de Beauharnois	97,4	97,7	2,3	2,0	0,3	0,3	53 780	53 440	0,3
Châteauguay	73,8	73,7	24,1	24,5	2,1	1,8	56 070	58 570	-0,1
Jardin du Québec	89,9	91,5	8,4	7,4	1,6	1,2	21 515	22 525	1,8
Kateri	90,6	92,0	7,6	6,1	1,8	2,0	64 360	75 325	1,5
Samuel-de-Champlain	63,0	62,2	26,4	23,7	10,6	14,1	104 065	104 095	-1,3
Longueuil-Ouest	91,0	91,0	3,8	3,2	5,3	5,7	67 140	63 780	0,0
Longueuil-Est	94,1	93,5	3,1	2,6	2,9	3,8	58 850	59 930	-0,6
Saint-Hubert	85,8	86,2	10,6	10,1	3,5	3,7	72 265	74 555	0,5
des Seigneuries	97,5	97,6	2,0	1,9	0,5	0,5	84 575	94 325	0,1
Champagnat de la Vallée de Fords	95,0	95,8	4,4	3,7	0,6	0,5	89 825	94 145	0,8
La Vallée des Patriotes	90,9	92,8	8,5	6,5	0,6	0,7	84 685	89 620	2,1
du Richelieu	94,7	95,3	4,6	4,1	0,6	0,6	44 235	49 755	0,6
du Havre	99,0	99,4	0,7	0,4	0,2	0,1	53 085	51 245	0,4
des Maskoutains	99,2	99,0	0,4	0,5	0,4	0,5	75 365	77 140	-0,2
La Pommerai	74,2	75,5	25,0	24,0	0,9	0,5	46 410	46 870	1,8
de la Haute-Yamaska	95,5	96,2	4,1	3,5	0,4	0,3	74 245	77 435	0,7
La Chênaie	99,4	99,6	0,5	0,1	0,2	0,4	14 400	15 010	0,2
MONTÉRÉGIE	87,7	88,2	10,1	9,4	2,2	2,5	1 168 710	1 221 865	0,6
ENSEMBLE DU QUÉBEC	83,9	83,7	10,7	10,3	5,4	6,0	6 683 140	6 892 900	-0,2

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 11 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Le calcul de cet indicateur tient uniquement compte des personnes ne rapportant qu'une seule langue parlée à la maison. La proportion de réponses multiples varie selon le recensement, par exemple de 4,3 % en 1986 à 2,3 % en 1996 au niveau de l'ensemble du Québec.


10. ⁽¹²⁾ PROPORTION D'IMMIGRANTS

- En 1996, la proportion d'immigrants est de 6 % en Montérégie (dont 1 % d'immigrants récents), ce qui correspond à 75 480 personnes. La proportion québécoise est de 9 % dont 2 % d'immigrants récents.
- Cette proportion est en hausse d'environ 5 % depuis 1986.
- Si la proportion n'a que légèrement varié en dix ans, la **provenance des immigrants** s'est considérablement modifiée entre 1986 et 1996. La proportion d'immigrants en provenance de l'Asie s'est accrue de près de 60 % pour représenter le quart des immigrants en 1996, tandis que celle originant d'Europe a fléchi de près de 18 % et ne constitue plus que 46 % mais occupe toujours le premier rang.
- L'immigration est une réalité très concentrée dans certains **territoires de CLSC**, le CLSC Samuel de Champlain faisant bande à part avec un cinquième de sa population constituée d'immigrants, suivi de très loin par le CLSC Longueuil-Ouest avec un dixième de sa population composée d'immigrants.
- À l'autre extrême, cinq des dix-neuf CLSC ont 2 % ou moins de population immigrante.


1. Proportion d'immigrants, Montérégie, 1986, 1991 et 1996

CLSC	1991	1996			
	%	Non récents		Total des immigrants	
		%	Récents ¹ %	Nombre	%
La Presqu'île	6,0	5,6	0,4	5 800	6,1
Huntingdon	4,8	4,3	0,2	1 050	4,8
Seigneurie de Beauharnois	1,4	1,1	0,3	825	1,5
Châteauguay	6,7	6,2	0,4	4 000	6,6
Jardin du Québec	3,7	3,5	0,3	850	3,7
Kateri	4,6	3,8	0,7	3 515	4,6
Samuel-de-Champlain	18,7	16,8	4,5	23 305	21,3
Longueuil-Ouest	9,6	7,3	2,6	6 565	10,0
Longueuil-Est	7,0	6,3	1,7	5 005	8,1
Saint-Hubert	8,4	7,7	1,1	6 845	8,9
des Seigneuries	2,6	2,3	0,3	2 530	2,6
Champagnat de la Vallée de Forts	3,4	2,8	0,4	3 025	3,1
La Vallée des Patriotes	4,9	4,5	0,5	4 545	5,0
du Richelieu	2,7	2,6	0,3	1 505	3,0
du Havre	1,8	1,6	0,1	885	1,7
des Maskoutains	1,8	1,3	0,2	1 240	1,6
La Pommeraie	4,3	3,6	0,4	1 985	4,0
de la Haute-Yamaska	2,2	1,8	0,3	1 690	2,1
La Chénuaie	1,9	1,7	0,3	300	2,0
MONTÉRÉGIE	5,8	5,0	1,0	75 480	6,0
ENSEMBLE DU QUÉBEC	8,6	7,2	2,1	664 495	9,3

2. Répartition des immigrants selon le lieu de provenance, Montérégie, 1986, 1991 et 1996



3. Proportion d'immigrants, CLSC, Montérégie et Québec, 1996



4. Proportion d'immigrants selon la période d'immigration (récents ou non récents), CLSC, Montérégie et Québec, 1991 et 1996

Notes


Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 12 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Les immigrants récents sont ceux qui ont immigré entre 1991 et durant les quatre premiers mois de 1996.


11.⁽¹³⁾ RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LE PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ ATTEINT

- En 1996, pour 16 % de la population de quinze ans et plus, le **plus haut niveau de scolarité complété** était inférieur à une neuvième année, ce qui représente plus de 160 300 personnes. À l'autre extrême, 11 % détenaient un grade universitaire. Au Québec, les valeurs respectives étaient de 18 % et de 12 %.
- La proportion des moins de neuf ans de scolarité est en baisse de plus de 10 % **par rapport à 1991**, où près d'une personne sur cinq était alors dans la même situation. À l'inverse, en 1996, la population avec un grade universitaire s'est accrue de plus de 21 % par rapport à 1991.
- Plus on est **jeune** plus on est scolarisé : on observe que chez les personnes de 65 ans et plus, près de dix fois plus de gens n'ont pas complété une neuvième année que ce n'est le cas chez les jeunes de 15-24 ans.
- Au niveau des **territoires de CLSC**, plusieurs écarts importants existent. Chez les personnes affichant moins de neuf ans de scolarité, les valeurs vont du simple à presque le triple, soit entre 10 % à Samuel de Champlain et Vallée des Patriotes, et 28 % à La Chênaie. Chez celles qui ont obtenu un grade universitaire, l'écart est encore plus prononcé : on en recense cinq fois plus dans le CLSC Samuel de Champlain (21 %) que dans celui de La Chênaie (4 %).


1. Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint, Montérégie, 1986, 1991 et 1996



2. Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité atteint et l'âge, Montérégie, 1996



3. Proportion de la population de 15 ans et plus ayant 13 années et moins de scolarité, CLSC, Montérégie et Québec, 1996



4. Répartition de la population de 15 ans et plus selon le plus haut niveau de scolarité, CLSC, Montérégie et Québec, 1991 et 1996

CLSC	Moins d'une 9 ^e année		9 ^e - 13 ^e année		Études postsecondaires inférieures au baccalauréat		Grade universitaire		Population de 15 ans et plus non pensionnaire d'institution
	1991	1996	1991	1996	1991	1996	1991	1996	1996
	%	%	%	%	%	%	%	%	Nombre
La Presqu'île	15,4	13,0	43,2	40,2	31,9	35,6	9,4	11,2	73 040
Huntingdon	25,0	23,6	47,1	45,8	23,1	24,4	4,4	5,9	17 170
Seigneurie de Beauharnois	24,8	22,6	45,9	46,0	24,9	26,1	4,4	5,3	43 750
Châteauguay	15,6	14,7	47,2	45,2	30,6	32,3	6,5	7,8	46 580
Jardin du Québec	27,1	25,1	48,5	47,3	20,1	23,0	4,1	4,5	17 720
Kateri	15,4	13,4	46,5	41,7	29,5	33,7	8,6	11,2	58 310
Samuel-de-Champlain	10,9	10,3	35,7	33,2	35,0	35,1	18,5	21,3	89 175
Longueuil-Ouest	21,5	19,9	42,0	39,5	28,2	30,1	8,2	10,4	54 870
Longueuil-Est	16,0	14,9	39,3	37,5	32,5	32,2	12,1	15,5	49 075
Saint-Hubert	16,7	15,6	46,3	42,6	30,6	33,8	6,4	8,1	59 305
des Seigneuries	11,8	10,5	40,5	37,6	34,9	36,9	12,7	14,9	73 385
Champagnat de la Vallée de Forts	20,6	18,6	45,4	43,7	26,7	30,0	7,2	7,7	74 915
La Vallée des Patriotes	11,8	10,2	41,0	37,4	34,1	36,2	13,0	16,2	71 540
du Richelieu	18,7	15,7	45,2	44,3	28,9	30,7	7,1	9,2	38 165
du Havre	22,9	21,0	43,6	42,7	28,6	30,2	4,7	6,0	42 860
des Maskoutains	24,2	22,3	47,0	44,0	22,9	26,4	5,8	7,2	62 010
La Pommeraie	21,9	20,2	49,1	46,1	22,4	26,1	6,5	7,4	37 955
de la Haute-Yamaska	22,5	20,3	47,9	45,8	23,6	26,5	5,9	7,3	61 930
La Chênaie	31,2	27,9	49,0	49,4	17,3	18,9	2,5	3,7	11 740
MONTÉRÉGIE	18,1	16,3	43,8	41,4	29,1	31,4	8,9	10,8	983 500
ENSEMBLE DU QUÉBEC	20,1	18,1	41,5	39,4	28,0	30,3	10,3	12,2	5 673 465

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 13 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

12. ⁽¹⁵⁾ TAUX D'EMPLOI


- En 1996, le **taux d'emploi** de la population de quinze ans et plus est de 60 % en Montérégie, légèrement supérieur au taux québécois de 55 % et correspond à 585 750 personnes occupées.
- Par rapport à 1986, ce taux a légèrement augmenté de 2 %, mais en comparaison avec celui de 1991, il a diminué de 3 %.
- Le taux est plus élevé **chez les hommes** de 15 % au total par rapport à celui des femmes.

L'avantage en faveur des hommes s'observe à tous les **groupes d'âge** sauf chez les plus jeunes de 15-24 ans où les taux des deux sexes sont presque équivalents.


Pour les deux sexes, il augmente avec l'âge jusqu'au groupe des 45-64 ans où il affiche une baisse.

Un écart marqué de 18 % est observé **entre les territoires de CLSC** avec le taux le plus élevé, soit des Seigneuries (67 %), et celui le plus faible soit du Havre (50 %). La baisse entre 1991 et 1996 s'observe dans dix-huit des dix-neuf CLSC.


1. Taux d'emploi¹ de la population de 15 ans et plus, Montérégie, 1986, 1991 et 1996



2. Taux d'emploi¹ de la population de 15 ans et plus selon l'âge et le sexe, Montérégie, 1996



3. Taux d'emploi¹ de la population de 15 ans et plus, CLSC, Montérégie et Québec, 1996



4. Taux d'emploi¹ de la population de 15 ans et plus, CLSC, Montérégie et Québec, 1991 et 1996

CLSC	1991		1996		Variation de 1991 à 1996
	Nombre ²	%	Nombre ²	%	%
La Presqu'île	41 680	64,5	46 950	64,3	-0,3
Huntingdon	9 190	54,3	9 210	53,7	-1,1
Seigneurie de Beauharnois	23 015	52,8	22 460	51,3	-2,8
Châteauguay	26 965	60,9	27 005	58,0	-4,8
Jardin du Québec	10 325	61,0	10 400	58,7	-3,8
Kateri	33 090	66,9	38 455	66,0	-1,3
Samuel-de-Champlain	54 230	62,4	52 605	59,0	-5,4
Longueuil-Ouest	32 300	56,4	29 155	53,1	-5,9
Longueuil-Est	30 670	64,2	29 000	59,1	-7,9
Saint-Hubert	36 435	64,9	37 245	62,8	-3,2
des Seigneuries	44 670	68,7	49 315	67,2	-2,2
Champagnat de la Vallée de Forts	42 430	59,6	42 415	56,6	-5,0
La Vallée des Patriotes	43 190	65,3	46 040	64,3	-1,5
du Richelieu	21 790	64,0	23 945	62,7	-2,0
du Havre	21 840	51,0	20 815	49,6	-2,7
des Maskoutains	35 650	60,3	35 950	58,0	-3,8
La Pommeraie	21 090	57,6	21 020	55,4	-3,8
de la Haute-Yamaska	34 875	60,0	37 140	60,0	0,0
La Chênaie	6 345	58,2	6 600	56,2	-3,4
MONTÉRÉGIE	569 780	61,4	585 750	59,6	-2,9
ENSEMBLE DU QUÉBEC	3 110 795	57,3	3 119 130	55,0	-4,0

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 15 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).


1. La semaine de référence pour établir l'emploi se rapporte à la semaine précédant la journée du recensement soit la première semaine complète du mois de mai pour le recensement de mai 1996.
2. Nombre de personnes de 15 ans et plus occupées

13.⁽¹⁶⁾ TAUX DE CHÔMAGE


- En 1996, le **taux de chômage se situe** à 9 % et représente 60 245 travailleurs montréalais, il est inférieur au taux québécois estimé à 12 %.
- Depuis 1986, il est le plus bas taux enregistré et il a diminué plus vite qu'il ne l'a fait au Québec au cours de la même période.
- Le taux est légèrement plus élevé **chez les femmes**, mais chez les plus de 25 ans et plus seulement.
- Il est plus élevé de près du double chez les 15-24 ans par rapport à leurs aînés puis assez voisin entre chacun des **groupes d'âge** plus âgés.
- Des écarts s'observent au niveau des **territoires de CLSC**, le taux le plus élevé étant celui du Havre (13 %) et le plus faible celui des Seigneuries (7 %).

L'ampleur des changements, diminution dans 15 cas sur 19, est également très différente et leur direction est même opposée selon le CLSC : le taux ayant diminué de près du quart pour le CLSC Huntingdon et augmenté de 10 % sur le territoire du Jardin du Québec.


1. Taux de chômage¹ de la population de 15 ans et plus, Montréal, 1986, 1991 et 1996



2. Taux de chômage¹ de la population de 15 ans et plus selon l'âge² et le sexe, Montréal, 1996



3. Taux de chômage¹ de la population de 15 ans et plus, CLSC, Montérégie et Québec, 1996



4. Taux de chômage¹ de la population de 15 ans et plus, CLSC, Montérégie et Québec, 1991 et 1996

CLSC	1991		1996		Variation de 1991 à 1996
	Nombre ³	%	Nombre ³	%	%
La Presqu'île	3 940	8,6	3 670	7,3	-15,1
Huntingdon	1 290	12,3	950	9,3	-24,4
Seigneurie de Beauharnois	3 800	14,2	3 395	13,1	-7,7
Châteauguay	3 185	10,6	2 705	9,1	-14,2
Jardin du Québec	1 140	9,9	1 275	10,9	10,1
Kateri	3 245	8,9	3 370	8,1	-9,0
Samuel-de-Champlain	5 670	9,5	5 415	9,3	-2,1
Longueuil-Ouest	4 730	12,8	4 095	12,3	-3,9
Longueuil-Est	4 005	11,6	3 660	11,2	-3,4
Saint-Hubert	3 825	9,5	3 985	9,7	2,1
des Seigneuries	3 915	8,1	3 610	6,8	-16,0
Champagnat de la Vallée de Forts	5 080	10,7	5 100	10,7	0,0
La Vallée des Patriotes	4 075	8,6	3 415	6,9	-19,8
du Richelieu	2 410	10,0	2 205	8,4	-16,0
du Havre	3 880	15,1	3 235	13,4	-11,3
des Maskoutains	3 490	8,9	3 250	8,3	-6,7
La Pommeraie	2 340	10,0	2 280	9,8	-2,0
de la Haute-Yamaska	4 325	11,0	3 830	9,3	-15,5
La Chênaie	755	10,6	785	10,6	0,0
MONTÉRÉGIE	65 100	10,3	60 245	9,3	-9,7
ENSEMBLE DU QUÉBEC	426 850	12,1	417 075	11,8	-2,5

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 16 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. La semaine de référence pour établir l'emploi se rapporte à la semaine précédant la journée du recensement soit la première semaine complète du mois de mai pour le recensement de mai 1996.
2. Les personnes de 65 ans et plus sont incluses dans le total mais compte tenu de leur nombre restreint, les données spécifiques à ce groupe d'âge ne sont pas diffusées en regard des critères de confidentialité.
3. Nombre de personnes de 15 ans et plus en chômage.


14. ⁽¹⁸⁾ PROPORTION DE LA POPULATION VIVANT SOUS LE SEUIL DE FAIBLE REVENU

- En 1995, la proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu était de 18 %, ce qui correspond à 222 810 Montérégiens de tous âges et à une hausse de plus de 22 % par rapport à l'année 1990, où le taux se situait à 15 %. Il se rapproche donc du taux de 17,6 % estimé pour 1985. La valeur correspondante pour le reste du Québec, à l'exclusion de la Montérégie, est de 20 % pour 1990 et de 25 % pour 1995. Les fortes variations des valeurs dans des directions opposées et à l'intérieur de courtes périodes de cinq ans mettent en lumière le caractère partiellement conjoncturel de l'indicateur lié entre autres aux variations de l'emploi.
- En 1995, comme en 1990, les taux sont plus élevés **chez les femmes** que chez les hommes mais entre les deux recensements, l'écart relatif s'est rétréci entre les sexes passant de 27 % à 18 %.
- En 1995, tous les **groupes d'âge** ne sont pas touchés de la même façon : on relève, entre autres, une différence marquée entre le groupe des 65 ans et plus qui présente le taux le plus élevé avec 23 % et les 25-44 ans et 45-64 ans où on obtient les valeurs les plus faibles soit 16 %. Dans tous les groupes d'âge, sauf chez les plus jeunes de 0-17 ans, le pourcentage est plus élevé chez les femmes. Cet écart qui est très prononcé entre les sexes chez les personnes âgées de 65 ans et plus est minime chez les plus jeunes de 0-17 ans où de plus il est en défaveur des hommes.
- Au niveau des **territoires de CLSC**, en 1995, on observe de fortes différences, les valeurs extrêmes allant du simple au triple entre le CLSC le plus défavorisé du point de vue de la prévalence du faible revenu, soit Longueuil-Ouest (34 %) et le moins défavorisé soit des Seigneuries (10 %). Ces CLSC représentent les valeurs extrêmes autant chez les hommes que chez les femmes.


La proportion de personnes vivant avec moins de 50 % du seuil et dits « très pauvres » est la plus élevée à Longueuil-Ouest (14 %) et plus faible dans les CLSC de la Vallée des Patriotes et des Seigneuries (3 %). Au total, ces personnes constituent un peu plus du tiers de toutes les personnes situées sous le seuil de faible revenu au niveau montérégien.

L'ampleur et la direction des changements entre les divers recensements varient encore plus entre les CLSC. Sur dix ans, entre 1985 et 1995, on observe une augmentation relative de 40 % dans le territoire de Samuel de Champlain où on assiste à la plus grande détérioration et 38 % dans Châteauguay qui présente la seconde détérioration en importance. À l'opposé, une amélioration marquée mesurée par une diminution de 21 % pour le CLSC Jardin du Québec est enregistrée.


1. Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu¹, Montérégie, 1985, 1990 et 1995



2. Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu¹ selon l'âge et le sexe, Montérégie, 1995



3. Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu¹, CLSC, Montérégie et Québec, 1995



4. Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu¹ selon l'âge, CLSC, Montérégie et Québec, 1990 et 1995

CLSC	0-5 ans		6-17 ans		18-24 ans		25-44 ans		45-64 ans		65 ans et plus	
	1990	1995	1990	1995	1990	1995	1990	1995	1990	1995	1990	1995
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
La Presqu'île	9,8	14,4	10,7	13,8	11,0	13,8	8,0	11,4	10,2	12,5	19,3	19,1
Huntingdon	22,7	20,4	18,9	24,3	22,6	19,2	16,4	19,9	15,8	17,6	17,5	10,6
Seigneurie de Beauharnois	19,9	31,1	15,8	22,4	17,8	25,7	13,7	21,1	18,3	20,8	28,7	23,7
Châteauguay	11,4	18,3	10,9	19,0	10,8	14,1	8,2	13,8	9,8	12,4	15,3	18,1
Jardin du Québec	12,1	13,7	15,0	11,9	10,9	13,9	11,7	12,0	14,9	15,2	14,6	15,7
Kateri	14,3	15,5	12,3	16,6	11,6	16,0	9,1	12,5	11,0	14,2	26,9	27,8
Samuel-de-Champlain	20,3	28,3	16,4	23,4	14,5	23,9	13,5	20,4	11,3	15,3	28,3	26,1
Longueuil-Ouest	36,2	47,5	31,4	39,5	28,1	38,9	22,9	30,4	23,6	25,6	37,3	38,7
Longueuil-Est	29,2	33,9	26,9	30,4	23,0	34,9	17,0	23,6	15,9	20,8	36,3	33,5
Saint-Hubert	16,1	21,6	15,8	19,9	16,6	20,4	11,6	16,3	15,3	17,3	36,0	34,5
des Seigneuries	7,8	10,9	7,6	10,4	7,9	9,9	6,3	8,7	7,5	8,9	22,9	18,7
Champagnat de la Vallée de Forts	18,6	20,0	15,9	18,0	16,7	23,3	13,2	17,8	14,5	19,5	23,1	19,2
La Vallée des Patriotes	8,4	12,1	9,2	9,7	9,9	9,9	7,8	9,7	8,2	10,4	18,6	18,9
du Richelieu	15,6	17,5	13,6	20,3	14,7	15,9	11,2	14,2	12,6	15,0	25,1	21,8
du Havre	19,4	28,7	14,8	20,5	20,1	23,3	14,6	20,0	17,3	20,1	24,1	24,2
des Maskoutains	15,6	20,1	13,8	17,5	15,0	20,5	12,7	16,3	16,0	18,9	23,6	17,9
La Pommeraie	16,0	23,8	15,1	17,3	19,6	17,5	12,3	17,7	15,5	14,1	15,3	12,0
de la Haute-Yamaska	18,1	19,8	15,6	17,5	18,1	22,3	13,3	16,0	16,1	18,5	21,5	22,6
La Chenaie	15,2	15,8	11,9	16,4	14,8	17,4	11,0	15,1	18,7	20,3	24,0	12,9
MONTÉRÉGIE	16,5	20,9	14,8	18,6	16,0	20,5	12,1	16,2	13,8	16,2	24,5	22,6
RESTE DU QUÉBEC	22,9	29,3	20,0	24,6	20,5	30,4	17,6	23,0	18,8	21,3	29,4	27,7
ENSEMBLE DU QUÉBEC	21,7	27,7	19,0	23,4	22,8	28,7	16,4	21,8	17,9	20,4	28,6	26,9

5. Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu selon le sexe, CLSC, Montérégie et Québec, 1990 et 1995

CLSC	Hommes		Femmes		Total				Variation		
	1990	1995	1990	1995	1985	1990	1995		1985-1990	1990-1995	1985-1995
	%	%	%	%	%	%	Nombre ²	%	%	%	%
La Presqu'île	9,4	12,4	11,1	13,9	14,4	10,2	12 440	13,2	-29	29	-8
Huntingdon	16,6	18,1	19,2	19,7	20,3	17,9	4 095	18,9	-12	6	-7
Seigneurie de Beauharnois	14,9	20,8	20,3	24,5	21,3	17,7	12 215	22,7	-17	28	7
Châteauguay	8,8	13,5	11,4	17,0	11,1	10,1	9 100	15,3	-9	51	38
Jardin du Québec	11,3	12,1	15,1	14,6	17,0	13,2	3 015	13,4	-22	2	-21
Kateri	10,3	13,9	13,1	16,2	13,9	11,7	11 480	15,1	-16	29	9
Samuel-de-Champlain	13,6	19,6	17,1	22,2	14,9	15,4	22 695	20,9	3	36	40
Longueuil-Ouest	24,5	30,2	29,8	36,5	28,6	27,3	21 890	33,5	-4	23	17
Longueuil-Est	19,1	24,9	23,4	28,6	26,5	21,3	16 350	26,8	-20	26	1
Saint-Hubert	13,6	17,6	16,9	20,7	19,3	15,3	14 620	19,2	-21	25	0
des Seigneuries	6,8	9,1	9,0	10,7	11,4	7,9	9 395	9,9	-31	25	-13
Champagnat de la Vallée de Forts	13,6	17,4	17,8	20,6	18,3	15,7	17 990	19,0	-14	21	4
La Vallée des Patriotes	7,9	9,3	10,4	12,3	9,3	9,2	9 795	10,8	-1	17	16
du Richelieu	12,6	15,6	15,0	17,5	16,5	13,8	8 270	16,5	-16	20	0
du Havre	14,5	19,0	19,6	23,9	21,6	17,1	11 035	21,5	-21	26	0
des Maskoutains	13,1	16,4	18,0	19,5	18,6	15,6	13 715	18,0	-16	15	-3
La Pommeraie	13,2	15,7	15,6	17,3	18,6	14,4	7 855	16,5	-22	15	-11
de la Haute-Yamaska	13,6	16,5	18,1	20,1	20,5	15,9	14 355	18,4	-22	16	-10
La Chênaie	14,7	14,9	14,9	18,3	20,4	14,8	2 485	16,5	-27	11	-19
MONTÉRÉGIE	12,9	16,4	16,5	19,5	17,6	14,7	222 810	18,0	-16	22	2
RESTE DU QUÉBEC	18,4	22,8	22,4	26,3	n.d.	20,4	1 408 100	24,6	s.o.	21	s.o.
ENSEMBLE DU QUÉBEC	17,4	21,6	21,4	25,1	22,7	19,4	1 630 915	23,4	-15	21	3

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 18 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Pour être sous le seuil de faible revenu, il fallait, lors de l'Enquête sur les Dépenses des Familles de 1992 qui a servi pour établir les seuils du recensement de 1996, qu'un ménage consacre près de 55 % de son revenu brut total pour satisfaire les besoins de première nécessité comme l'habitation, la nourriture et l'habillement. Les montants en argent varient selon la taille du ménage et la taille de la population de l'unité géographique de résidence du ménage.
 2. Nombre de personnes sous le seuil de faible revenu dans les ménages privés.
- s.o. Sans objet.


14A. RÉPARTITION DES MÉNAGES PRIVÉS DONT 30 % OU PLUS DU REVENU EST CONSACRÉ AU COÛT D'HABITATION

- En 1996, les deux tiers des 473 595 logements privés en Montérégie étaient occupés par des **propriétaires**, cette proportion étant presque identique à celle estimée lors des deux recensements précédents de 1986 et 1991 et plus élevée que celle du Québec (57 %).
- Les 112 770 ménages montréalais où **30 % ou plus du revenu brut est consacré aux coûts d'habitation** représentent des proportions allant du simple chez les **propriétaires** avec seulement 15 % à près du triple chez les **locataires** avec 40 %.


Les proportions respectives pour le Québec étant de 16 % et de 42 %.

- En 1996, les **territoires de CLSC** diffèrent grandement au niveau de leur proportion des ménages qui doivent consacrer 30 % ou plus aux coûts de l'habitation.
- Dans la catégorie des ménages propriétaires, les valeurs oscillent entre un maximum de 22 % au CLSC Longueuil-Ouest et un minimum de 13 % au CLSC La Pommerai. Pour les logements occupés par un locataire, ce sont les CLSC du Havre (48 %) et des Seigneuries (30 %) qui présentent les valeurs extrêmes.


1. Répartition des ménages privés selon le genre, Montérégie, 1986, 1991 et 1996



2. Proportion de ménages privés selon le genre dont 30 % ou plus du revenu est consacré aux coûts d'habitation¹, Montérégie, 1996



3. Proportion de ménages privés locataires dont 30 % ou plus du revenu est consacré aux coûts d'habitation, CLSC, Montérégie et Québec, 1996



4. Proportion de ménages privés selon le genre dont 30 % ou plus du revenu est consacré aux coûts d'habitation, CLSC, Montérégie et Québec, 1996

CLSC	Propriétaires		Locataires		Ménages privés ²		
	30% ou plus consacré aux coûts de l'habitation		30% ou plus consacré aux coûts de l'habitation		Propriétaires	Locataires	Total
	Nombre ¹	%	Nombre ¹	%	Nombre	Nombre	Nombre
La Presqu'île	4 350	16,4	3 140	38,2	26 495	8 210	34 735
Huntingdon	900	13,8	745	39,0	6 500	1 910	8 385
Seigneurie de Beauharnois	1 995	15,1	4 300	47,3	13 230	9 095	22 325
Châteauguay	2 590	15,9	2 135	42,2	16 260	5 060	21 335
Jardin du Québec	1 020	16,3	730	36,1	6 270	2 020	8 290
Kateri	3 205	15,7	2 335	36,5	20 360	6 405	26 755
Samuel de Champlain	4 070	15,4	6 155	41,7	26 425	14 745	41 180
Longueuil- Ouest	2 215	21,8	8 135	41,4	10 140	19 645	29 785
Longueuil-Est	1 890	16,4	5 645	42,6	11 555	13 255	24 810
St-Hubert	3 370	17,4	3 120	42,4	19 350	7 360	26 705
Des Seigneuries	3 480	13,1	1 995	29,7	26 500	6 710	33 220
Champagnat de la Vallée des Forts	3 680	15,8	5 970	41,6	23 220	14 345	37 540
La Vallée des Patriotes	3 545	13,7	2 405	36,7	25 895	6 550	32 440
du Richelieu	2 130	16,2	1 915	37,1	13 110	5 160	18 290
du Havre	2 005	14,1	3 280	47,8	14 260	6 860	21 135
des Maskoutains	2 645	14,9	4 780	37,2	17 805	12 845	30 635
La Pommeraie	1 625	12,6	2 380	39,3	12 920	6 050	18 980
de la Haute-Yamaska	2 375	13,2	5 370	40,2	17 995	13 365	31 385
La Chênaie	575	14,1	570	35,7	4 070	1 595	5 665
MONTÉRÉGIE	47 665	15,3	65 105	40,4	312 360	161 185	473 595
ENSEMBLE DU QUÉBEC	260 480	16,3	518 700	42,3	1 593 600	1 225 310	2 818 910


Notes

1. Nombre de ménages pour lesquels 30 % ou plus du revenu brut total du ménage est consacré à l'habitation.
2. Nombre total de ménages privés.


15. ⁽¹⁹⁾ PROPORTION DE PRESTATAIRES DE L'ASSISTANCE-EMPLOI

- En mars 2001, 6 % des Montérégiens de 64 ans et moins étaient **prestataires de l'assistance-emploi**, pour un total de 73 683 personnes, en baisse de 31 %, **par rapport à août 1996**.
- La proportion, **chez les femmes**, en mars 2001, se situe à 7 % contre 6 % chez les hommes.
L'évolution a été marquée par une tendance continue à la baisse et ceci, autant chez les hommes que chez les femmes.
La baisse sur l'ensemble de la période de 1996 à 2001 a été moins prononcée chez les hommes (-27 %) que chez les femmes (-31 %).
- Au niveau des **groupes d'âge**, ce sont les personnes de 55-64 ans qui affichent le pourcentage le plus élevé avec 8 % en mars 2001 contre 6 % chez les 18-29 ans, la valeur la plus faible.
La baisse depuis 1996 a par ailleurs bénéficié à tous les groupes d'âge, mais davantage aux plus jeunes de 0-29 ans et moins aux 55-64 ans.
- Les **territoires de CLSC** se distinguent fortement, le CLSC Longueuil-Ouest affichant sept fois plus de bénéficiaires (15 %) que le CLSC des Seigneuries (2 %).


1. Proportion de prestataires de l'assistance-emploi¹ selon le sexe¹, Montérégie, 1995 à 2002



2. Proportion de prestataires de l'assistance-emploi¹ selon l'âge¹, Montérégie, 1996 à 2002



3. Proportion de prestataires de l'assistance-emploi¹, CLSC officiels, Montérégie et Québec, mars 2001



4. Proportion de prestataires de l'assistance-emploi¹, CLSC officiels, Montérégie, 1996 à 2001

CLSC officiels	Prestataires 0-64 ans							Variation de 1996 à 2001
	Août 1996	Mars 1997	Mars 1998	Mars 1999	Juin 2000	Mars 2001		
	%	%	%	%	%	Nombre ²	%	%
La Presqu'île	5,3	5,3	4,2	3,7	3,3	2 737	3,0	-44
Huntingdon	12,6	12,5	11,0	10,1	8,9	1 857	8,5	-32
S. de Beauharnois	14,1	14,5	13,6	12,2	11,1	5 582	10,8	-23
Châteauguay	7,1	7,0	6,5	5,8	5,3	2 588	4,9	-31
Jardin du Québec	7,7	7,8	7,0	6,1	5,4	1 199	5,7	-26
Kateri	5,4	5,2	4,4	3,7	3,4	2 652	3,2	-40
Samuel-de-Champlain	7,2	7,0	6,3	5,7	5,3	4 983	5,2	-28
Longueuil-Ouest	19,4	19,4	18,2	16,7	15,3	8 398	15,0	-23
Longueuil-Est	15,1	14,7	13,5	12,3	11,1	6 008	10,3	-32
Saint-Hubert	8,4	8,3	7,4	6,7	5,8	4 049	5,5	-34
des Seigneuries	3,4	3,4	3,0	2,6	2,2	1 940	2,0	-40
Champagnat de la Vallée des Forts	11,4	11,4	10,2	9,2	8,0	7 046	7,9	-30
La Vallée des Patriotes	4,6	4,6	3,9	3,5	3,1	3 247	3,0	-36
du Richelieu	7,3	7,6	6,4	5,7	4,9	1 377	4,5	-39
du Havre	15,4	15,7	14,6	13,5	12,3	5 334	12,0	-22
des Maskoutains	9,8	9,9	9,0	8,3	7,6	5 160	7,5	-23
La Pommeraie	10,4	10,3	9,4	8,4	7,4	2 849	7,1	-31
de la Haute-Yamaska	10,5	10,6	9,6	8,7	7,8	5 472	7,7	-26
La Chênaie	11,3	10,9	10,3	9,6	9,0	1 205	8,7	-23
MONTÉRÉGIE	9,1	9,0	7,7	7,3	6,5	73 476	6,3	-31
ENSEMBLE DU QUÉBEC	12,4	12,4	11,3	10,3	9,4	576 614	9,0	-27

5. Proportion de prestataires de l'assistance-emploi¹ selon l'âge, selon le sexe¹ et selon le type de contraintes à l'emploi, CLSC officiels, Montérégie, mars 2001

CLSC officiels	Population 0-64 ans							Adultes 18-64 ans				
	Âge							Sexe		Type de contrainte		
	0-17 ans	18-24 ans	25-29 ans	30-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	Hommes	Femmes	Aucune	Temporaire	Sévère
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
La Presqu'île	2,6	2,8	2,7	2,6	2,7	3,1	5,3	3,0	3,3	1,1	0,8	1,2
Huntingdon	8,4	7,1	8,4	7,5	8,7	9,8	8,3	8,5	8,5	4,2	2,1	2,2
S. de Beauharnois	11,1	9,2	13,3	9,9	9,5	10,8	12,4	10,1	11,1	4,9	2,6	3,1
Châteauguay	5,0	4,5	6,2	4,3	4,5	4,6	5,2	4,2	5,4	1,9	1,3	1,6
Jardin du Québec	5,5	4,9	6,0	5,1	4,7	6,3	7,8	5,4	6,0	2,4	1,5	1,8
Kateri	3,2	2,9	3,1	2,3	2,8	3,3	5,6	2,8	3,6	1,3	0,9	1,0
Samuel-de-Champlain	6,3	3,4	5,1	5,7	5,0	4,1	5,5	4,4	4,9	2,0	1,3	1,4
Longueuil-Ouest	18,8	10,2	10,9	13,6	14,4	14,4	16,1	12,6	14,5	6,2	3,7	3,7
Longueuil-Est	13,1	8,4	8,4	9,8	8,5	9,0	12,1	7,8	10,6	4,0	2,6	2,6
Saint-Hubert	5,4	4,6	6,6	4,7	5,1	4,7	8,1	4,9	6,0	2,2	1,5	1,7
des Seigneuries	1,8	1,8	2,2	1,9	1,8	2,0	3,3	1,9	2,3	0,8	0,5	0,8
Champagnat de la Vallée des Forts	7,4	7,0	8,1	6,9	7,0	8,8	10,6	7,5	8,5	3,4	2,1	2,6
La Vallée des Patriotes	2,7	2,3	3,4	3,2	2,8	2,9	4,2	2,9	3,2	1,2	0,8	1,1
du Richelieu	4,1	3,6	5,7	4,5	4,0	4,8	5,5	4,5	4,6	1,8	1,5	1,3
du Havre	12,2	10,3	13,6	11,5	11,1	11,2	13,9	11,1	12,4	5,6	2,9	3,2
des Maskoutains	7,0	6,2	7,1	7,2	7,0	7,6	10,5	7,2	7,9	3,1	1,9	2,5
La Pommerai	7,0	4,4	8,2	6,9	6,9	7,4	9,2	6,8	7,5	2,6	1,8	2,7
de la Haute-Yamaska	7,0	6,7	7,2	6,5	6,6	8,8	11,7	7,5	8,3	3,2	1,9	2,7
La Chênaie	7,7	8,2	9,8	9,8	7,8	9,2	10,8	9,6	8,4	3,7	2,8	2,6
MONTÉRÉGIE	6,3	5,2	6,5	5,7	5,6	6,3	8,4	5,8	6,6	2,6	1,6	1,9

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 19 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Les personnes de 65 ans et plus sont prises en compte au numérateur mais pas au dénominateur (1 % des prestataires en mars 2000 pour l'ensemble du Québec). Le sexe n'est pas disponible pour les enfants. Ces derniers représentent 28,1 % des prestataires pour l'ensemble du Québec en mars 2000.
2. Nombre de personnes prestataires de l'assistance-emploi. La sommation des CLSC est inférieure de 207 au total régional.
Comme le code postal inscrit au dossier, nécessaire à l'attribution du territoire de CLSC, est celui correspondant à l'adresse du bénéficiaire trois mois après la réception de l'aide, tous ces cas sont donc des cas de déménagements hors région.

16.⁽²⁰⁾ RÉPARTITION DES ADULTES PRESTATAIRES DE L'ASSISTANCE-EMPLOI SELON LA DURÉE CUMULATIVE DE L'AIDE

- En mars 2001, 53 181 Montérégiens adultes étaient **prestataires de l'assistance-emploi**, soit 6 % de la population adulte de la région, un niveau inférieur au 9 % enregistré pour l'ensemble du Québec.
- Près de la moitié des adultes prestataires de l'aide sociale affichaient une durée cumulative d'aide de dix ans et plus, en hausse relative de 37 % **par rapport à août 1996**. Cette détérioration n'est pas subite, elle s'inscrit dans une tendance continue à la hausse entre chacune des six dernières années, chacune des catégories inférieures à dix ans de durée d'aide représentant au fil des ans des proportions de bénéficiaires de plus en plus faibles contribuant chacune progressivement à l'accroissement de la catégorie la plus longue du maintien de l'aide.


- **Entre les sexes**, on ne relate aucune différence de cette tendance continue à la hausse de la catégorie des dix ans et plus d'aide.

La proportion des femmes s'avère toujours supérieure à celle des hommes mais l'écart entre les deux sexes se réduit constamment passant d'un excédent relatif de 22 % en défaveur des femmes en 1996, à un excédent de seulement 9 % en 2001.


- Les **territoires de CLSC** varient considérablement, quant à leur proportion de bénéficiaires d'aide d'une durée de dix ans et plus, oscillant entre 56 % pour les CLSC La Pommeraie et 37 % pour le CLSC Samuel de Champlain. Dans ce dernier cas, la catégorie de durée la plus courte soit celle de moins de deux ans représente par contre, en nombre de personnes, le double de bénéficiaires que dans celui du CLSC La Pommeraie.

Le CLSC Longueuil-Ouest, qui se situe seulement au 10^e rang quant à la proportion la plus élevée pour la durée d'aide de dix ans et plus, représente le plus gros contingent de bénéficiaires pour cette durée d'aide, soit 2 801.

1. Répartition (%) des adultes (18-64 ans) prestataires¹ de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide², Montérégie, 1996 à 2002



2. Répartition (%) des adultes (18-64 ans) prestataires¹ de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide², et le sexe, Montérégie, 1996 à 2002



3. Répartition (%) des adultes (18-64 ans) prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide², CLSC officiels, Montérégie, mars 2001

La Pommeraie	8,6	7,8	27,6	56,0
du Havre	9,4	8,1	26,7	55,9
S. de Beauharnois	8,8	9,4	29,0	52,9
Huntingdon	9,9	9,1	28,3	52,7
La Chênaie	12,7	9,3	25,3	52,7
de la Haute-Yamaska	12,4	9,6	26,1	52,0
C. de la Vallée des Forts	10,6	9,7	29,4	50,3
des Maskoutains	11,7	10,0	28,4	49,9
MONTÉRÉGIE	11,9	10,3	29,7	48,1
Longueuil-Est	12,1	11,0	29,0	47,9
Longueuil-Ouest	11,6	10,2	30,8	47,4
ENSEMBLE DU QUÉBEC	13,6	10,4	28,7	47,3
Jardin du Québec	12,9	11,2	29,5	46,4
La Presqu'île	12,7	11,1	30,7	45,5
Saint-Hubert	12,2	11,4	31,3	45,1
des Seigneuries	13,9	11,3	30,4	44,5
Châteauguay	14,6	11,8	29,3	44,3
La Vallée des Patriotes	13,5	11,2	32,7	42,7
Kateri	13,9	10,9	32,9	42,3
du Richelieu	12,0	12,2	34,6	41,2
Samuel-de-Champlain	17,6	12,8	32,7	36,9
	Moins de 2 ans	2-3 ans	4-9 ans	10 ans et plus

4. Répartition (%) des adultes (18-64 ans) prestataires de l'assistance-emploi selon la durée cumulative de l'aide², CLSC officiels, Montérégie, 2001

CLSC officiels	Moins de 2 ans		2-3 ans		4-9 ans		10 ans et plus		Adultes prestataires de l'assistance-emploi		
	Nombre ³	%	Nombre ³	%	Nombre ³	%	Nombre ³	%	Nombre ³	Population	%
La Presqu'île	259	12,7	228	11,1	629	30,7	930	45,5	2 046	68 658	3,0
Huntingdon	129	9,9	119	9,1	369	28,3	688	52,7	1 305	15 111	8,6
S. de Beauharnois	359	8,8	382	9,4	1183	29,0	2158	52,9	4 082	34 959	11,7
Châteauguay	264	14,6	213	11,8	528	29,3	799	44,3	1 804	44 641	4,0
Jardin du Québec	112	12,9	97	11,2	256	29,5	403	46,4	868	14 749	5,9
Kateri	260	13,9	204	10,9	614	32,9	790	42,3	1 868	57 580	3,2
Samuel-de-Champlain	611	17,6	444	12,8	1136	32,7	1284	36,9	3 475	78 636	4,4
Longueuil-Ouest	689	11,6	604	10,2	1821	30,8	2801	47,4	5 915	42 831	13,8
Longueuil-Est	491	12,1	445	11,0	1176	29,0	1939	47,9	4 051	44 321	9,1
Saint-Hubert	355	12,2	333	11,4	911	31,3	1315	45,1	2 914	54 803	5,3
des Seigneuries	201	13,9	163	11,3	440	30,4	644	44,5	1 448	71 173	2,0
Champagnat de la Vallée des Forts	549	10,6	505	9,7	1524	29,4	2610	50,3	5 188	65 049	8,0
La Vallée des Patriotes	326	13,5	271	11,2	791	32,7	1033	42,7	2 421	65 921	3,7
du Richelieu	121	12,0	123	12,2	348	34,6	414	41,2	1 006	34 298	2,9
du Havre	380	9,4	326	8,1	1080	26,7	2262	55,9	4 048	33 502	12,1
des Maskoutains	451	11,7	386	10,0	1094	28,4	1920	49,9	3 851	51 285	7,5
La Pommeraie	181	8,6	163	7,8	580	27,6	1178	56,0	2 102	31 941	6,6
de la Haute-Yamaska	510	12,4	395	9,6	1075	26,1	2146	52,0	4 126	55 022	7,5
La Chênaie	114	12,7	84	9,3	228	25,3	475	52,7	901	9 950	9,1
MONTÉRÉGIE	6 584	11,9	5 489	10,3	15 774	29,7	25 572	48,1	53 181	874 430	6,1
ENSEMBLE DU QUÉBEC	57 268	13,6	43 871	10,4	120 397	28,7	198 560	47,3	420 096	4 857 276	8,6

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 20 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Les personnes hébergées sont incluses au numérateur (1,2 % des prestataires en mars 2000).
2. La durée cumulative n'est pas la durée consécutive, elle débute à la dernière demande d'aide faite par un adulte et peut remonter jusqu'à 1975, peu importe s'il y a eu ou non interruption.
3. La sommation du nombre de personnes adultes prestataires de l'assistance-emploi des CLSC est inférieure de 238 au total régional. Comme le code postal inscrit au dossier, nécessaire à l'attribution du territoire de CLSC, est celui correspondant à l'adresse du bénéficiaire trois mois après la réception de l'aide, tous ces cas sont donc des cas de déménagements hors région.

17. PROPORTION DE LA POPULATION SE PERCEVANT PAUVRE OU TRÈS PAUVRE


- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec, un Montréalien de 15 ans et plus sur cinq **perçoit sa situation économique comme « pauvre ou très pauvre »**, par rapport aux gens du même âge, ce qui représente plus de 210 000 personnes.
- Depuis 1992-1993, cette proportion est demeurée pratiquement inchangée.
- Entre les **groupes d'âge**, les valeurs ne diffèrent pas suffisamment pour être significatives au plan statistique, même si la valeur estimée de 25 % pour les 45-64 ans, est plus élevée que pour les autres groupes d'âge.
- Au printemps 2000, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, les **territoires de CLSC** varient du simple (des Seigneuries avec 6 %) à près du triple (Longueuil-Ouest avec 17 %) quant à la proportion de personnes se percevant comme « pauvres ou très pauvres ».

Trois CLSC affichent des valeurs significativement supérieures à celle de la région estimée à 10 %, ce sont dans l'ordre Longueuil-Ouest, Seigneurie de Beauharnois et La Presqu'Île. À l'opposé, deux territoires se distinguent avec des valeurs inférieures à celle de la région : ce sont des Seigneuries et La Vallée des Patriotes.


Le territoire du CLSC La Presqu'Île, qui n'occupe que le 5^e rang pour la proportion, compte le plus grand nombre de personnes qui se perçoivent ainsi, soit plus de 10 000.

Le CLSC Samuel de Champlain affiche la proportion la plus élevée, soit 44 % en ce qui a trait aux personnes qui se perçoivent comme « à l'aise ».


1. Proportion de la population de 15 ans et plus percevant leur situation économique comme pauvre ou très pauvre, Montréal, 1992-1993 et 1998



2. Répartition de la population de 15 ans et plus percevant leur situation économique comme pauvre ou très pauvre selon l'âge, Montréal, 1998



3. Proportion de la population de 15 ans et plus percevant leur situation économique comme pauvre ou très pauvre, CLSC, Montérégie, printemps 2000



4. Répartition de la population de 15 ans et plus selon la perception de leur situation économique, CLSC, Montérégie, printemps 2000

CLSC	À l'aise	Suffisant	Pauvre ou très pauvre	
	%	%	Nombre ¹	%
La Presqu'île	32,3	53,7	10 094	14,0 (>)
Huntingdon	27,7	57,4	2 569	14,9
Seigneurie de Beauharnois	27,5	58,1	6 422	* 14,4 (+)
Châteauguay	37,2	51,9	5 059	* 10,9
Jardin du Québec	29,8	56,7	2 360	13,5
Kateri	37,3 (+)	55,5	4 154	* 7,2
Samuel-de-Champlain	44,0 (>>)	46,8 (<<)	8 115	* 9,2
Longueuil-Ouest	22,5 (<<)	60,4	9 242	17,1 (>>)
Longueuil-Est	38,6 (+)	53,4	3 936	* 8,0
Saint-Hubert	33,4	58,5	4 764	* 8,1
des Seigneuries	34,1	59,7	4 522	* 6,3 (<)
Champagnat de la Vallée de Fots	30,4	60,2	7 085	* 9,4
La Vallée des Patriotes	38,7 (>)	54,9	4 529	* 6,4 (<)
du Richelieu	27,2	61,1	4 406	* 11,7
du Havre	23,4 (<)	66,0 (>)	4 571	* 10,5
des Maskoutains	25,7 (<)	62,2	7 624	12,1
La Pommeraie	30,4	58,1	4 481	11,5
de la Haute-Yamaska	28,1	62,5 (+)	5 879	* 9,3
La Chênaie	19,3 (-)	64,5	1 929	16,2
MONTÉRÉGIE	32,3	57,3	101 740	10,4

Notes

Cet indicateur mesure la proportion de personnes de 15 ans et plus percevant sa situation économique comme « pauvre ou très pauvre », par rapport à la population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés. L'information provient d'un questionnaire autoadministré rempli par les personnes de 15 ans et plus du ménage pour les données originant des Enquêtes sociales et de santé de Santé Québec de 1992-1993 et 1998, et de la même question posée au répondant de 15 ans et plus choisi au hasard dans le ménage, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM du printemps 2000. La question est : « Comment percevez-vous votre situation économique par rapport aux gens de votre âge? : je me considère à l'aise financièrement, je considère mes revenus suffisants pour répondre à mes besoins fondamentaux ou à ceux de ma famille, je me considère pauvre, je me considère très pauvre ».

La question permet de tenir compte de certains éléments complémentaires à la seule mesure du revenu tels l'endettement, l'entraide, le troc, le travail au noir et l'évasion fiscale (Enquête sociale et de santé, Santé Québec, ISQ, 1998).

1. Population estimée de personnes de 15 ans et plus se percevant « pauvre » ou « très pauvre ».

>>, >, (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, <, (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

* Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.


18. ⁽²²⁾ PROPORTION DE LA POPULATION PERCEVANT AVOIR DE MOYENNES OU MAUVAISES HABITUDES ALIMENTAIRES

- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec, environ 140 000 personnes de 15 ans et plus soit 14 % déclaraient avoir de **moyennes ou mauvaises habitudes alimentaires**.
- Les femmes étaient moins nombreuses que les hommes à fournir une telle opinion, soit 13 % contre 15 %.
- La proportion de cette perception négative de ses habitudes alimentaires diminue systématiquement avec **l'âge**, les proportions plus élevées estimées chez les moins de 45 ans présentant même des différences significatives par rapport aux valeurs plus faibles des 65 ans et plus.
- Au printemps 2000, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, les **territoires de CLSC** présentaient des variations, les valeurs oscillant entre un maximum de 24 % pour le CLSC Jardin du Québec et un minimum de 14 % significativement inférieur à la région (18 %) pour le CLSC des Seigneuries.


Bien que situé au 4^e rang, quant à la proportion la plus élevée, le CLSC Vallée des Forts présente le plus fort contingent de personnes disant avoir des habitudes alimentaires moyennes ou mauvaises, soit près de 16 000.

D'autres variations sont présentes si on tient compte des opinions positives exprimées sur les habitudes considérées comme étant « excellentes » ou « très bonnes ». Les CLSC Jardin du Québec, Kateri, du Havre et de la Haute-Yamaska présentent des proportions significativement inférieures à celles de la région (42 %), tandis que Longueuil-Est et Samuel-de-Champlain ont des valeurs significativement plus élevées (48 % et 47 %).


1. Proportion de la population de 15 ans et plus percevant avoir de moyennes ou mauvaises habitudes alimentaires selon le sexe, Montérégie, 1998



2. Répartition (%) de la population de 15 ans et plus selon la perception de la qualité des habitudes alimentaires et l'âge, Montérégie, 1998



3. Proportion de la population de 15 ans et plus percevant avoir de moyennes ou mauvaises habitudes alimentaires, CLSC, Montérégie, printemps 2000



4. Répartition de la population de 15 ans et plus selon la perception de la qualité des habitudes alimentaires, CLSC, Montérégie, printemps 2000

CLSC	Excellentes / très bonnes	Bonnes	Moyennes / mauvaises	
	%	%	Nombre ¹	%
La Presqu'île	40,0	43,9	11 841	16,1
Huntingdon	40,9	41,3	3 069	17,7
Seigneurie de Beauharnois	39,1	41,9	8 475	19,0
Châteauguay	40,4	40,0	9 224	19,6
Jardin du Québec	31,9 (-)	43,9	4 324	24,2
Kateri	35,3 (<)	43,2	12 537	21,4
Samuel-de-Champlain	47,3 (>)	36,6	14 506	16,1
Longueuil-Ouest	43,8	34,8 (-)	11 827	21,5
Longueuil-Est	47,8 (+)	37,4	8 307	16,7
Saint-Hubert	43,8	36,2	12 008	20,1
des Seigneuries	42,6	43,0	10 595	14,4 (-)
Champagnat de la Vallée de Forts	43,1	35,9	15 955	21,0
La Vallée des Patriotes	45,4	38,2	11 804	* 16,4
du Richelieu	42,6	42,8	5 632	* 14,6
du Havre	35,4 (-)	43,8	9 026	20,7
des Maskoutains	39,1	43,9	10 724	17,0
La Pommeraie	46,0	38,5	6 084	15,6
de la Haute-Yamaska	36,0 (-)	45,2	11 858	18,8
La Chênaie	35,9	44,5	2 361	19,7
MONTÉRÉGIE	41,5	40,4	180 157	18,1

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 22 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions (INSPQ, 2001).

1. Population estimée de personnes de 15 ans et plus percevant avoir de moyennes ou de mauvaises habitudes alimentaires.

>, (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .05, .10.

<, (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .05, .10.


* Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

19. ⁽²³⁾ RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LA FRÉQUENCE DE LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES DE LOISIR


- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec, près de la moitié des Montérégiens de quinze ans et plus pratiquaient une activité physique de loisir moins d'une fois par semaine, ce qui représentait environ 487 000 personnes. En hausse significative, depuis 1992-1993, où la proportion n'était que de 44 %.
- Les valeurs chez les **femmes** sont légèrement supérieures à celles estimées chez les hommes, mais l'écart plus important enregistré en 1992-1993, entre les deux sexes en défaveur des femmes, s'est atténuée, grâce à une augmentation plus faible de la proportion chez ces dernières entre les deux enquêtes.
- En 1998, comme en 1992-1993, les plus **jeunes** de 15-24 ans présentent une proportion significativement plus faible de personnes plus sédentaires que celles estimées pour chacun des autres groupes d'âge plus âgés. Tandis que chez les 15-24 ans, les valeurs entre les deux enquêtes sont similaires, on assiste à une détérioration de la situation pour chacun des autres groupes plus âgés, particulièrement chez les 45-64 ans où on note l'augmentation la plus forte de personnes pratiquant moins d'une fois par semaine de l'activité physique de loisir.
- Au printemps 2000, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, les écarts entre les CLSC se sont avérés marqués. Les proportions oscillent entre 44 % pour les CLSC Kateri et Saint-Hubert et 28 % pour le CLSC Vallée des Forts, ces valeurs étant toutes significativement différentes par rapport à celle de la région (36 %). Deux autres territoires présentent des valeurs significativement différentes, ce sont les CLSC La Presqu'île où on estime une population plus importante de personnes plus sédentaires (41 %), et à l'opposé, le CLSC des Seigneuries où seulement 31 % disent pratiquer une activité physique de loisir moins d'une fois par semaine.

Le CLSC Samuel de Champlain, bien que situé seulement au 11^e rang avec une proportion estimée à 35 %, présente le plus fort contingent de sédentaires avec plus de 31 000 personnes.


1. Répartition (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir et le sexe, Montérégie, 1992-1993 et 1998



2. Proportion de la population de 15 ans et plus ayant pratiqué une activité physique de loisir moins d'une fois par semaine selon l'âge, Montérégie, 1992-1993 et 1998



3. Proportion de la population de 15 ans et plus ayant pratiqué une activité physique de loisir moins d'une fois par semaine, CLSC, Montérégie, printemps 2000



4. Répartition de la population de 15 ans et plus selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir, CLSC, Montérégie, printemps 2000

CLSC	Moins d'une fois par semaine		1 à 2 fois par semaine		3 fois et plus par semaine	
	Nombre ¹	%	Nombre ¹	%	Nombre ¹	%
La Presqu'île	22 148	30,2 (<)	24 194	32,9	27 093	36,9 (+)
Huntingdon	6 199	35,9	5 367	31,1	5 715	33,1
Seigneurie de Beauharnois	14 903	33,4	16 553	37,2	13 098	29,4
Châteauguay	17 140	36,6	13 618	29,1	16 093	34,3
Jardin du Québec	7 625	42,6	5 602	31,3	4 684	26,2
Kateri	25 953	44,4 (>>)	18 096	31,0	14 355	24,6 (<<)
Samuel-de-Champlain	31 375	34,9	25 666	28,5	32 925	36,6
Longueuil-Ouest	18 476	33,6	17 518	31,8	19 040	34,6
Longueuil-Est	16 657	33,4	15 185	30,5	18 022	36,1
Saint-Hubert	26 242	44,0 (>>)	15 213	25,5 (<)	18 133	30,4
des Seigneuries	22 630	30,8 (<)	25 768	35,0	25 141	34,2
Champagnat de la Vallée de Forts	21 206	27,9 (<<)	27 392	36,1 (+)	27 298	36,0
La Vallée des Patriotes	24 012	33,3	29 071	40,4 (>>)	18 947	26,3 (<)
du Richelieu	15 421	39,8	11 494	29,6	11 876	30,6
du Havre	18 137	41,6	11 449	26,3	13 978	32,1
des Maskoutains	25 750	40,8	20 749	32,9	16 636	26,3 (<)
La Pommeraie	13 346	34,3	11 109	28,6	14 442	37,1
de la Haute-Yamaska	24 926	39,5	19 152	30,3	19 037	30,2
La Chênaie	4 861	40,6	3 549	29,6	3 575	29,8
MONTÉRÉGIE	357 007	35,9	316 743	31,9	320 087	32,2

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 23 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Population estimée de personnes de 15 ans et plus selon la fréquence de la pratique des activités physiques de loisir.

>>, (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .10.

<<, (<) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.


20. ⁽²⁴⁾ PROPORTION DE FUMEURS ACTUELS

- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec, environ 330 000 Montérégiens déclaraient être des **fumeurs actuels**, soit une personne de quinze ans et plus sur trois. Neuf de ces fumeurs sur dix fumaient régulièrement soit à tous les jours au moins une cigarette.
- Cette proportion est identique à celle de 1992-1993 mais significativement plus faible que celle de 1987.
- Les **femmes** dénotent une légère tendance à la hausse contrairement à celle à la baisse observée chez les hommes rétrécissant ainsi un peu l'écart entre les sexes, mais elles présentent encore en 1998 une proportion légèrement inférieure de fumeurs actuels que celle estimée chez les hommes.
- La proportion de **fumeurs réguliers** est plus élevée chez les **groupes d'âge** plus jeunes particulièrement chez les 15-44 ans par rapport aux 65 ans et plus.
- Au printemps 2000, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, les populations des **territoires de CLSC** présentent des différences marquées quant à la proportion de **fumeurs réguliers**.


Les CLSC Seigneurie de Beauharnois, La Presqu'île, Kateri et Longueuil-Ouest, avec des proportions respectives de 34 %, 32 % et 32 %, se situent au-dessus de la valeur régionale de 27 %, tandis qu'à l'opposé, Samuel de Champlain et surtout des Seigneuries avec respectivement 23 % et 16 % enregistrent des valeurs significativement inférieures à la valeur régionale de 27 %.

Le CLSC La Presqu'île, bien que situé au 3^e rang des CLSC avec la proportion la plus élevée de **fumeurs actuels** présente le plus grand nombre de **fumeurs actuels** avec près de 26 000 personnes.


1. Proportion de fumeurs actuels de 15 ans et plus selon le type de fumeurs et le sexe, Montérégie, 1987, 1992-1993 et 1998



2. Proportion de fumeurs actuels de 15 ans et plus selon le type de fumeurs et l'âge, Montérégie, 1998



3. Proportion de fumeurs actuels de 15 ans et plus, CLSC, Montérégie, printemps 2000



4. Proportion de fumeurs actuels de 15 ans et plus, CLSC, Montérégie, printemps 2000

CLSC	Fumeurs occasionnels	Fumeurs réguliers	Fumeurs actuels	
	%	%	Nombre ³	%
La Presqu'île	* 2,8	32,1 (>) ^z	25 700	34,9
Huntingdon	* 1,1	28,4	5 119	29,5
Seigneurie de Beauharnois	* 2,2	33,7 (>)	16 037	35,9
Châteauguay	* 2,9	29,8	15 385	32,7
Jardin du Québec	* 2,7	27,1	5 351	29,8
Kateri	* 2,4	31,5 (+)	20 012	33,9
Samuel-de-Champlain	* 4,3	22,7 (-)	24 248	27,0
Longueuil-Ouest	* 4,6	32,3 (>)	20 314	36,9
Longueuil-Est	* 4,0	25,6	14 743	29,6
Saint-Hubert	* 3,6	30,4	20 357	34,0
des Seigneuries	* 6,8	16,0 (<<)	16 915	22,8
Champagnat de la Vallée de Forts	* 3,7	26,0	22 530	29,7
La Vallée des Patriotes	* 3,8	26,8	22 133	30,6
du Richelieu	* 2,9	25,7	11 083	28,6
du Havre	** 1,4	25,5	11 753	26,9
des Maskoutains	* 4,1	22,9	17 010	27,0
La Pommerai	* 4,9	24,5	11 471	29,4
de la Haute-Yamaska	* 5,1	27,2	20 366	32,3
La Chênaie	* 5,4	28,4	4 052	33,8
MONTÉRÉGIE	3,8	26,8	304 581	30,6

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 24 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

- Les valeurs significativement plus faibles ou plus élevées que celle de la région ne concernent que les tests statistiques effectués sur chacune des deux sous-catégories des fumeurs actuels, la valeur totale n'ayant pas fait l'objet de tests.
- Les tests statistiques dans le but d'établir la présence d'une différence entre un territoire de CLSC et la région n'ont été effectués que sur la population des fumeurs actuels de 15 ans et plus.
- Population estimée de 15 ans et plus de fumeurs actuels.

>, (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .05, .10.

<<, (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .10.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.


21. ⁽²⁵⁾ PROPORTION DE LA POPULATION PRENANT 14 CONSOMMATIONS D'ALCOOL ET PLUS AU COURS D'UNE SEMAINE

- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec, près de 69 000 montérégiens de quinze ans et plus, soit 8,3 % des buveurs actuels, prenaient 14 consommations et plus sur une période de sept jours.
- Une tendance à la hausse **par rapport à 1992-1993** est dénotée autant pour les hommes que pour les femmes bien qu'en termes relatifs, elle soit plus prononcée dans ce dernier cas.
- Les buveurs actuels **hommes** avec 13 % présentent une valeur trois fois plus élevée et significativement supérieure à celle des femmes chez qui la proportion est estimée à seulement 4 %.
- En 1998, les buveurs actuels de **45-64 ans** présentent la valeur la plus élevée avec 11 % de buveurs actuels prenant 14 consommations et plus. Ils sont d'ailleurs les seuls à présenter une augmentation significative par rapport à 1992-1993. À l'opposé, les buveurs de 25-44 ans ont la valeur la plus faible avec 6 % et la seule baisse significative depuis 1992-1993.
- Au printemps 2000, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, des écarts importants sont signalés entre les **territoires de CLSC**. Dans le cas présent, les proportions ont été estimées non par rapport aux buveurs actuels mais par rapport à l'ensemble des Montérégiens de 15 ans et plus. Certains CLSC affichent des valeurs dépassant 7 %, comme La Chênaie, Longueuil-Est et La Vallée des Patriotes, tandis qu'à l'opposé, certains comme des Maskoutains et des Seigneuries présentent des valeurs la moitié moindre oscillant autour de seulement 3 %. Les proportions de ces deux derniers se révélant d'ailleurs significativement inférieures à celles de la région (5 %).


1. Proportion de buveurs actuels de 15 ans et plus ayant pris 14 consommations d'alcool ou plus au cours d'une période de sept jours selon le sexe, Montérégie, 1987, 1992-1993 et 1998



2. Proportion de buveurs actuels de 15 ans et plus ayant pris 14 consommations d'alcool ou plus au cours d'une période de sept jours selon l'âge, Montérégie, 1987, 1992-1993 et 1998



3. Proportion de la population de 15 ans et plus ayant pris 14 consommations d'alcool ou plus au cours d'une période de sept jours, CLSC, Montérégie, printemps 2000



4. Répartition de la population de 15 ans et plus selon le nombre de consommations d'alcool au cours d'une période de sept jours, CLSC, Montérégie, printemps 2000

CLSC	Aucune consommation	1 à 6 consommations	7 à 13 consommations	14 consommations et plus	
	%	%	%	Nombre ¹	%
La Presqu'île	50,1	33,3	* 10,6	4 354	* 6,1
Huntingdon	63,0 (+)	25,5	* 5,5	1 021	* 6,0
Seigneurie de Beauharnois	54,8	30,9	* 9,6	2 050	* 4,7
Châteauguay	49,2	32,0	* 12,1	3 076	* 6,7
Jardin du Québec	62,1 (+)	24,1	* 7,9	1 016	* 5,8
Kateri	53,2	28,7	* 11,5	3 730	* 6,5
Samuel-de-Champlain	43,7 (<<)	35,3	14,1 (+)	6 027	* 6,8
Longueuil-Ouest	58,7 (>)	26,4 (<)	* 11,0	2 060	* 3,9
Longueuil-Est	53,2	32,2	* 7,5	3 480	* 7,1
Saint-Hubert	54,0	29,5	* 11,4	3 012	* 5,1
des Seigneuries	47,5	36,5 (+)	* 13,0	2 219	** 3,0 (-)
Champagnat de la Vallée de Forts	54,3	29,1	12,6	3 015	* 4,0
La Vallée des Patriotes	45,9 (<)	34,1	* 12,9	5 012	* 7,1
du Richelieu	55,1	32,8	* 7,4	1 843	** 4,8
du Havre	51,3	34,2	* 9,7	2 096	* 4,8
des Maskoutains	55,2	36,1	* 5,8 (<<)	1 815	** 2,9 (-)
La Pommerai	51,2	30,5	* 12,4	2 297	* 6,0
de la Haute-Yamaska	49,3	34,4	* 12,4	2 417	* 3,9
La Chênaie	64,4 (+)	19,4 (-)	* 8,9	858	* 7,3
MONTRÉGIE	51,7	32,1	11,0	51 400	5,2

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 25 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Population estimée de personnes de 15 ans et plus ayant pris 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une période de sept jours.

>, (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .05, .10.


<<, < (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.


22. ⁽²⁶⁾ PROPORTION DE LA POPULATION PRÉSENTANT UNE CONSOMMATION ÉLEVÉE D'ALCOOL CINQ FOIS OU PLUS AU COURS D'UNE ANNÉE

- **En 1998**, lors de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec, près du quart des Montréalais de 15 ans et plus (23 %) rapportent avoir pris au moins cinq fois, au cours des douze derniers mois, cinq consommations et plus en une même occasion. Ce qui représente, lorsque rapportée exclusivement sur les buveurs actuels de 15 ans et plus et non pas sur la population totale du même groupe d'âge, 27 % de ces derniers.
- Ce comportement est significativement plus élevé chez **les hommes** où le tiers rapportent une telle habitude en comparaison avec seulement environ une femme sur dix. Rapportée exclusivement sur la base des buveurs actuels de chaque sexe, ce sont 40 % des hommes qui déclarent avoir eu ce comportement contre seulement 15 % des femmes.
- Au niveau des groupes d'âge, les proportions ont été calculées non pas sur la base de la population totale de chaque groupe d'âge, mais exclusivement sur celle des buveurs de chacun des groupes. La consommation élevée occasionnelle est le lot des **groupes d'âge** plus jeunes, particulièrement des 15-24 ans où 38 % la déclarent.
- Elle est en augmentation **entre 1992-1993 et 1998** dans trois des quatre groupes d'âge, particulièrement chez les 45-64 ans où la croissance s'avère significative au plan statistique.
- **Au printemps 2000**, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, parmi les personnes de 15 ans et plus et non parmi les seuls buveurs actuels, les **territoires de CLSC** affichent des valeurs variables allant de 20 % au CLSC de la Haute-Yamaska à 13 % au CLSC Saint-Hubert. Les CLSC Samuel de Champlain, bien que situé au 12^e rang, comporte le plus grand nombre de personnes de 15 ans et plus, soit près de 14 000 avec une consommation élevée. Si on rapporte les pourcentages exclusivement sur les buveurs actuels de 15 ans et plus de chacun des territoires de CLSC, le territoire de La Pommeraie arrive au premier rang avec une prévalence de 26 %, tandis qu'à l'opposé, les CLSC Châteauguay, des Maskoutains et Vallée des Forts occupent les trois derniers rangs avec des pourcentages voisins de près de 17 % chacun. Dans la majorité des territoires, près de 60 % des buveurs actuels ont manifesté ce comportement au moins une fois au cours des douze derniers mois.


1. Proportion de la population de 15 ans et plus ayant eu au moins cinq épisodes de consommation élevée d'alcool au cours d'une période de 12 mois selon le sexe, Montérégie, 1992-1993 et 1998



2. Proportion de buveurs actuels de 15 ans et plus ayant eu au moins cinq épisodes de consommation élevée d'alcool au cours d'une période de 12 mois selon l'âge, Montérégie, 1992-1993 et 1998



3. Proportion de la population de 15 ans et plus ayant eu au moins cinq épisodes de consommation élevée d'alcool au cours d'une période de 12 mois, CLSC, Montérégie, printemps 2000



4. Répartition de la population de 15 ans et plus et des buveurs actuels de 15 ans et plus selon le nombre d'épisodes de consommation élevée d'alcool au cours d'une période de 12 mois, CLSC, Montérégie, printemps 2000

CLSC	Population de 15 ans et plus				Buveurs actuels de 15 ans et plus		
	Jamais	de 1 à 4 fois	5 fois et plus		Jamais	de 1 à 4 fois	5 fois et plus
	%	%	Nombre ¹	%	%	%	%
La Presqu'île	24,7	58,0	12 674	17,3	37,0	40,0	23,0
Huntingdon	26,7	56,5	2 904	16,8	43,4	33,7	22,9
Seigneurie de Beauharnois	26,1	59,1	6 605	14,8	39,0	41,0	* 20,0
Châteauguay	19,5	66,6	6 492	13,9	41,2	41,6	17,2
Jardin du Québec	27,4	54,9	3 165	17,7	34,8	40,9	24,4
Kateri	21,6	60,9	10 152	17,5	31,7 (<<) ²	46,0 (>)	22,3
Samuel-de-Champlain	19,6	64,9	13 916	15,5	48,2 (>)	32,6 (<)	19,3
Longueuil-Ouest	28,2	55,2	9 080	16,6	43,3	33,6	23,1
Longueuil-Est	23,4	61,7	7 413	14,9	48,2	32,4	19,4
Saint-Hubert	22,9	64,2	7 734	12,9	43,8	39,4	16,8
des Seigneuries	19,2	67,4	9 907	13,4	43,0	40,5	16,6
Champagnat de la Vallée de Forts	20,1	66,0	10 503	13,9	43,5	39,2	17,4
La Vallée des Patriotes	12,9	68,5	13 198	18,6	40,4	38,2	21,3
du Richelieu	24,5	60,1	6 006	15,5	44,4	35,1	* 20,5
du Havre	19,2	64,7	6 980	16,0	36,7	43,5	19,8
des Maskoutains	24,5	62,4	8 261	13,1	41,9	40,8	17,3
La Pommeraie	25,1	55,6	7 525	19,2	43,3	31,0	25,7
de la Haute-Yamaska	16,2	64,0	12 443	19,8	41,2	35,1	23,7
La Chênaie	24,0	59,7	1 949	16,3	39,6	39,0	21,4
MONTÉRÉGIE	21,6	62,6	156 909	15,8	41,7	38,1	20,2

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 26 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).


- Population estimée de personnes de 15 ans et plus ayant eu au moins cinq épisodes de consommation élevée au cours d'une période de douze mois.
 - Les tests statistiques dans le but d'établir la présence d'une différence entre un territoire de CLSC et la région n'ont été effectués que sur la population des buveurs actuels de 15 ans et plus.
- > Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
 <<, < Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05.
 * Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

23. ⁽²⁹⁾ RÉPARTITION DES NAISSANCES VIVANTES SELON LA SCOLARITÉ DE LA MÈRE


- Pour la **période 1996-1998** sur un nombre moyen total de plus de 14 000 mères ayant accouché, un peu plus d'une sur dix n'avaient pas complété une onzième année.
- À ce chapitre, la majeure partie du gain a été enregistrée dans les années 80 où la proportion est passée de 22 % en 1981-1983 à 13 % au début de la décennie 90. Depuis, les valeurs ont peu varié. À l'opposé, les mères ayant complété plus de quinze ans de scolarité ont continuellement accru leur poids dans l'ensemble, leur proportion ayant même triplé entre 1981-1983 et 1996-1998 passant de seulement 9 % à 28 %.
- À une exception près, la scolarité moyenne des mères s'est conséquemment accrue entre chacune des années de 1981 à 1998, passant de 12 ans en 1981 à 13,8 ans en 1998.
- Les **territoires de CLSC** présentent de fortes disparités, certains comme Huntingdon avec le pourcentage le plus élevé (23 %), puis Longueuil-Ouest et Seigneurie de Beauharnois affichant des valeurs de près du double de la proportion montréalaise tandis qu'à l'opposé, d'autres comme la Vallée des Patriotes et des Seigneuries ont des valeurs moitié moins élevées que celle de la région. Sans se situer dans les extrêmes, les CLSC comme Longueuil-Est et La Chênaie d'une part, La Presqu'île et Kateri d'autre part, se distinguent aussi de façon significative de la région : dans le premier cas en affichant une valeur supérieure, dans le second en présentant des valeurs inférieures.

La proportion des mères avec une scolarité inférieure à la 11^e année a diminué de 28 % entre les périodes de 1984-1988 et 1994-1998, mais cette décroissance cache elle aussi de grandes différences au niveau des CLSC. Quatre CLSC affichent des réductions de plus de 40 %, soit dans l'ordre Kateri, des Seigneuries, la Vallée des Patriotes et de la Haute-Yamaska. À l'opposé, trois CLSC ont réduit leur proportion de moins de 10 %, soit Samuel de Champlain mais surtout Longueuil-Ouest et Huntingdon qui étaient déjà défavorisés de ce point de vue en 1984-1988 n'ont diminué respectivement que de 8 % et de 1 %.


1. Répartition (%) des naissances vivantes¹ selon la scolarité de la mère^{2,3}, Montérégie, 1981-1983 à 1996-1998



2. Scolarité moyenne des mères^{2,3}, Montérégie, 1981 à 1998



3. Proportion de naissances vivantes¹ de mères ayant moins de 11 ans de scolarité^{2, 3}, CLSC, Montérégie et Québec, 1994-1998



4. Répartition des naissances vivantes¹ selon la scolarité de la mère^{2, 3}, CLSC, Montérégie et Québec, 1984-1988 à 1994-1998

CLSC	Moins de 11 ans de scolarité			Variation de 1984-1988 à 1994-1998	1994-1998									
	1984-1988	1989-1993	1994-1998		moins de 9 ans	9-10 ans	11 ans	12-13 ans	14-15 ans	16 ans et plus	Scolarité moyenne	Total	Années	Nombre ⁴
	%	%	%		%	%	%	%	%	%	Années	Nombre ⁴		
La Presqu'île	12,7 (-)	9,9 (-)	9,2 (-)	-27	* 2,2	7,1 (-)	12,0	26,3	24,5	28,0	13,8	1 293		
Huntingdon	22,8	21,0 (+)	22,6 (+)	-1	* 4,7	18,0 (+)	19,5 (+)	28,9	16,6 (-)	* 12,4 (-)	12,3	231		
Seigneurie de Beauharnois	18,4	18,8 (+)	21,7 (+)	18	* 5,8 (+)	15,9 (+)	16,1 (+)	28,1	19,8	14,4 (-)	12,5	565		
Châteauguay	13,7 (-)	10,9	10,8	-21	* 1,6	9,2	18,1 (+)	30,8	21,3	19,0 (-)	13,1	731		
Jardin du Québec	23,5 (+)	21,1 (+)	16,8	-29	* 3,8	* 13,0	15,3	34,2	19,3	* 14,5 (-)	12,6	250		
Kateri	14,5	9,6 (-)	7,6 (-)	-48	* 1,8	5,8 (-)	11,7	26,4	25,1	29,1	13,9	1 090		
Samuel-de-Champlain	11,5 (-)	9,2 (-)	10,8	-6	* 3,0	7,8	9,9	20,7 (-)	20,1	38,5 (+)	14,4	974		
Longueuil-Ouest	23,8 (+)	20,0 (+)	21,9 (+)	s.o.	* 6,3 (+)	15,6 (+)	14,2	24,4	18,8	20,7 (-)	12,9	577		
Longueuil-Est	21,7 (+)	17,1 (+)	17,9 (+)	s.o.	* 4,8 (+)	13,1 (+)	10,5	24,0	18,4 (-)	29,2	13,6	981		
Saint-Hubert	16,8	12,5	12,5	-26	* 2,9	9,6	12,3	28,0	23,9	23,3	13,5	881		
des Seigneuries	11,0 (-)	7,4 (-)	5,8 (-)	-47	* 1,4 (-)	4,5 (-)	5,5 (-)	23,1 (+)	25,8	39,7 (+)	14,7	1 194		
Ch. de la Vallée de Forts	19,2	15,2	13,1	-31	* 2,3	10,8	10,3	30,7	23,9	22,0 (-)	13,4	1 003		
La Vallée des Patriotes	9,9 (-)	6,5 (-)	5,6 (-)	-43	* 1,2 (-)	4,4 (-)	6,7 (-)	24,4	25,2	38,0 (+)	14,6	980		
du Richelieu	18,9	14,3	11,2	-41	* 1,7	9,5	9,8	28,9	24,1	26,0	13,7	654		
du Havre	16,3	12,5	12,8	-21	* 3,8	9,0	9,9	32,6	25,6	19,1 (-)	13,3	428		
des Maskoutains	19,4	15,7	15,0	-22	* 2,6	12,4 (+)	14,7 (+)	29,8	23,4	17,0 (-)	13,0	853		
La Pommeraie	19,2	15,0	16,2	-16	* 4,3	11,9	12,8	34,6 (+)	18,2	18,2 (-)	12,9	489		
de la Haute-Yamaska	22,4 (+)	14,8	12,7	-43	* 2,4	10,3	10,6	32,9 (+)	23,9	19,9 (-)	13,3	923		
La Chênaie	30,1 (+)	24,6 (+)	* 20,0 (+)	-33	** 4,3	* 15,8	* 18,5 (+)	32,4	* 17,3	* 11,8 (-)	12,4	183		
MONTÉRÉGIE	17,1	13,1	12,3	-28	2,8	9,5	11,5	27,5	22,7	26,0	13,6	14 278		
ENSEMBLE DU QUÉBEC	19,1	15,2	14,7	-23	4,3	10,5	11,8	25,9	22,4	25,1	13,4	78 975		

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 29 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

- Avant 1988, les naissances de poids inférieurs à 500 grammes ne sont pas comprises dans les données. Pour 1988 et les années suivantes, on trouve en moyenne annuellement pour l'ensemble du Québec 75 naissances vivantes de poids inférieur à 500 grammes.
- Entre 1981 et 1998, la proportion de naissances vivantes dont la scolarité de la mère est inconnue se situe pour l'ensemble du Québec entre 2,6 % et 7,6 %. En 1998, elle est de 5,6 % et varie selon la région.
- Exceptionnellement, en 1984 pour l'ensemble du Québec, ont été exclues les naissances dont la scolarité de la mère était de 0 année. En général, le nombre annuel de naissances dont la scolarité de la mère égale 0 année est inférieur à 100. En 1984, ce nombre dépasse les 3 000 pour le Québec.
- Nombre annuel moyen de naissances vivantes dont la scolarité de la mère est connue.
- Sans objet, pour la période 1984-1988 l'attribution des naissances au CLSC de Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.
- (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
- (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
- *, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

24.⁽³⁰⁾ PROPORTION DE NAISSANCES DE FAIBLE POIDS


- En 1998, 5,9 % des nouveau-nés en Montérégie, soit près de 900 d'entre eux, présentaient à la naissance un faible poids soit moins de 2 500 grammes dont 0,8 % affichaient un très faible poids, soit moins de 1 500 grammes. La valeur régionale s'avère légèrement inférieure à celle obtenue pour l'ensemble du Québec.
- Entre 1981 et 1998, les valeurs ont oscillé, sans suivre une tendance continue dans une direction unique, entre un maximum de 7,0 % en 1982 et 1992 et 5,5 % en 1996.
- Les proportions, autant des faibles poids que des très faibles poids, qui avaient décliné entre 1982 et 1989 ont remonté au début des années 90 pour redescendre, de façon irrégulière, par la suite.
- Chez les divers **groupes d'âge** des mères, pour la période la plus récente de 1996-1998, les moins de 20 ans affichent les proportions les plus élevées, soit respectivement 9,3 % pour les moins de 18 ans et 7,9 % pour les 18-19 ans.

Les mères âgées de 20-34 ans présentent en 1996-1998, comme toujours depuis la période 1981-1983, la valeur la plus faible soit 5,5 %. Tous les groupes d'âge ont suivi des tendances irrégulières mais se retrouvent pour la période la plus récente avec des valeurs plus faibles qu'au début, à l'exception des moins de 18 ans qui en 1996-1998 présentent un pourcentage supérieur à celui enregistré en 1981-1983 (9,3 % c. 9,1 %).


- Les **territoires de CLSC** présentent des différences de pourcentage qui, bien que non significatives statistiquement, vont du simple pour celui de la Vallée des Patriotes (4,4 %) au double pour Seigneurie de Beauharnois (8,2 %).

La variation entre la période de 1984-1988 et celle de 1994-1998 ne présente elle aussi pas la même ampleur entre les CLSC, des écarts importants sont obtenus allant d'une détérioration marquée à La Chênaie (augmentation de 38 %) à une baisse de 18 % pour le CLSC Vallée des Patriotes, la valeur régionale dénotant une faible amélioration avec une baisse de 3 %.


1. Proportion de naissances vivantes¹ de faible poids et de très faible poids², Montérégie, 1981 à 1998



2. Proportion de naissances vivantes¹ de faible poids² selon l'âge de la mère à l'accouchement, Montérégie, 1981-1983 à 1994-1998



3. Proportion de naissances vivantes¹ de faible poids² et de très faible poids, CLSC, Montérégie et Québec, 1994-1998



4. Proportion de naissances vivantes¹ de faible poids² et de très faible poids, CLSC, Montérégie et Québec, 1984-1988 à 1994-1998

CLSC	Très faible poids (1 500 grammes)				Faible poids (2 500 grammes)				Nombre annuel moyen ³ de naissances 1994-1998	
	1984- 1988	1989- 1993	1994- 1998	Variation de 1984-1988 à 1994-1998	1984- 1988	1989- 1993	1994- 1998	Variation de 1984-1988 à 1994-1998		
	%	%	%	%	%	%	Nombre	%		
La Presqu'île	** 0,7	* 0,8	* 0,7	0	6,2	5,3	75	5,6	-10	1 340
Huntingdon	** 0,6	** 0,8	** 1,1	97	* 5,2	5,6	16	* 5,8	12	280
Seigneurie de Beauharnois	** 0,7	** 1,0	** 0,9	29	7,3	* 7,0	47	8,2	13	575
Châteauguay	** 0,7	** 0,9	** 0,6	-8	4,9	5,8	43	5,6	15	766
Jardin du Québec	** 0,9	** 0,7	** 0,9	3	* 6,8	6,7	17	* 6,5	-3	264
Kateri	** 0,6	* 0,8	** 0,6	13	6,0	* 5,8	57	5,0	-15	1 125
Samuel-de-Champlain	** 0,6	* 0,7	** 0,8	24	5,6	5,3	58	5,7	2	1 019
Longueuil-Ouest	** 0,7	* 1,1	** 0,7	s.o.	6,8	7,1	44	7,3	s.o.	599
Longueuil-Est	** 0,7	* 1,1	* 1,0	s.o.	6,9	6,6	67	6,6	s.o.	1 007
Saint-Hubert	** 0,7	** 0,7	** 0,9	21	5,9	5,5	54	5,9	0	910
des Seigneuries	** 0,7	** 0,7	** 0,8	20	5,2	5,1	62	5,1	-2	1 211
Champagnat de la Vallée de Forts	** 0,5	* 0,8	** 0,8	54	6,2	6,0	69	6,0	-3	1 150
La Vallée des Patriotes	** 0,6	** 0,5	** 0,6	5	5,3	4,4	44	4,4	-18	999
du Richelieu	** 0,9	** 0,6	** 0,7	-15	* 5,7	5,4	38	5,5	-5	700
du Havre	** 0,6	** 1,1	** 0,7	23	6,4	7,5	30	* 6,7	5	447
des Maskoutains	** 0,9	** 0,8	** 0,7	-28	5,6	5,6	56	6,3	12	890
La Pommeraie	** 0,5	** 0,8	** 0,8	69	6,0	* 5,4	27	* 5,4	-10	498
de la Haute-Yamaska	* 1,1	* 0,9	** 1,0	-10	6,4	6,2	52	5,6	-13	930
La Chênaie	** 0,4	* 0,6	** 0,8	126	* 5,1	* 6,4	13	* 7,1	38	189
MONTÉRÉGIE	0,7	0,8	0,8	14	6,0	5,8	868	5,8	-3	14 900
ENSEMBLE DU QUÉBEC	0,8	0,8	0,8	17	6,2	5,9	4 973	6,0	-3	83 525

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 30 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

- Avant 1988, les naissances de poids inférieurs à 500 grammes ne sont pas comprises dans les données. Pour 1988 et les années suivantes, on trouve en moyenne annuellement pour l'ensemble du Québec 75 naissances vivantes de poids inférieur à 500 grammes.
- Entre 1985 et 1998, la proportion de naissances vivantes de poids inconnu se situe entre 0,1 % et 1,5 %.
- Nombre annuel moyen de naissances vivantes dont le poids est connu.
- s.o. Sans objet, pour la période 1984-1988 l'attribution des naissances au CLSC de Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.


25. ⁽³¹⁾ PROPORTION DE NAISSANCES PRÉMATURÉES

- En 1998, 7 % des nouveau-nés sont nés avant terme, soit une proportion presque identique à celle enregistrée pour l'ensemble du Québec.
- Entre 1981 et 1998, on assiste à une montée irrégulière de la proportion de bébés prématurés allant de 5,1 % à 7,1 % soit une augmentation, en termes relatifs, de près de 40 %.
- Cette augmentation est observée dans tous les **groupes d'âge** des mères mais à un niveau légèrement moindre chez celles de 35 ans et plus.
- Les **territoires de CLSC** présentent des différences non significatives au plan statistique, mais dignes de mention, allant de 9,3 % au CLSC du Havre à seulement 5,7 % et 5,8 % respectivement pour les CLSC de La Pommeraie et de la Vallée des Patriotes.


Les écarts sont grands entre CLSC quant à l'ampleur de la variation entre 1984-1988 et 1994-1998 : La Chênaie, qui affichait la valeur la plus faible a augmenté de plus de 50 % tandis que Kateri a conservé la même proportion.

Bien que le CLSC La Presqu'Île ne figure qu'au 13^e rang, ce territoire affiche le plus grand nombre de naissances prématurées, soit 1 339 pour la dernière période de 1994-1998.


1. Proportion de naissances vivantes¹ prématurées², Montérégie, 1981 à 1998



2. Proportion de naissances vivantes¹ prématurées² selon l'âge de la mère à l'accouchement, Montérégie, 1981-1983 à 1996-1998



3. Proportion de naissances vivantes¹ prématurées², CLSC, Montérégie et Québec, 1994-1998



4. Proportion de naissances vivantes¹ prématurées², CLSC, Montérégie et Québec, 1984-1988 à 1994-1998

CLSC	1984-1988	1989-1993	1994-1998		Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	%	%	Nombre ³	%	%
La Presqu'île	5,9	5,5	1 339	6,8	16
Huntingdon	* 5,6	* 5,6	280	* 7,5	34
Seigneurie de Beauharnois	6,4	6,8	575	7,5	17
Châteauguay	5,8	6,2	761	7,4	27
Jardin du Québec	* 7,6	* 7,7	264	* 7,7	2
Kateri	6,8	6,6	1 123	6,8	0
Samuel-de-Champlain	6,0	6,3	1 017	7,4	23
Longueuil-Ouest	6,3	7,6	599	8,0	s.o.
Longueuil-Est	6,7	7,4	1 007	7,8	s.o.
Saint-Hubert	6,3	6,8	910	7,2	14
des Seigneuries	6,3	6,5	1 210	6,5	4
Champagnat de la Vallée de Forts	6,1	7,1	1 149	7,8	28
La Vallée des Patriotes	5,1	4,9	998	5,8	14
du Richelieu	6,5	6,6	699	6,8	4
du Havre	7,0	9,1	447	9,3	33
des Maskoutains	5,3	6,0	891	6,6	27
La Pommerai	* 5,1	6,0	498	* 5,7	11
de la Haute-Yamaska	5,4	6,2	930	6,4	17
La Chênaie	* 4,5	* 6,1	190	* 6,9	53
MONTÉRÉGIE	6,0	6,5	14 887	7,1	18
ENSEMBLE DU QUÉBEC	6,2	6,7	83 497	7,2	16

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 31 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Avant 1988, les naissances de poids inférieur à 500 grammes ne sont pas comprises dans les données. Pour 1998 et les années suivantes, on trouve en moyenne annuellement pour l'ensemble du Québec 75 naissances vivantes de poids inférieur à 500 grammes.
 2. De 1985 à 1997, la proportion de naissances vivantes d'âge gestationnel inconnu se situe entre 0,2 % et 4,4 %.
 3. Nombre annuel moyen de naissances vivantes dont la durée de gestation est connue.
- s.o. Sans objet, pour la période 1984-1988 l'attribution des naissances au CLSC de Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.
- * Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

26. ⁽³²⁾ PROPORTION DE NAISSANCES AYANT UN RETARD DE CROISSANCE INTRA-UTÉRINE

- En 1998, 8 % des naissances vivantes en Montérégie présentaient un retard de croissance intra-utérine, ce qui correspondait à plus de mille naissances cette année-là.
- Depuis 1981, cette proportion suit une tendance irrégulière mais prononcée à la baisse de telle sorte que l'ampleur du phénomène représente en 1998 à peine 60 % de la proportion qu'il était en 1981 où 14 % des naissances présentaient un retard de croissance.
- Pour la période de 1996-1998, entre les **groupes d'âge** des mères, les valeurs oscillent entre un minimum de 8 % pour celles âgées de 20-34 ans et un maximum de 13 % pour les 18-19 ans.


Bien que pour 1996-1998, la proportion du groupe des 18-19 ans présente un excédent de plus de 40 % par rapport à celle du groupe des 20-34 ans, cet écart s'est considérablement amoindri depuis la période de 1981-1983. À l'époque, le groupe avec la valeur la plus élevée, les moins de 18 ans, représentait, avec 20 %, près du double de la proportion la plus faible observée alors chez les 35-49 ans, soit 11 %.

Entre 1981-1983 et 1996-1998, la tendance à la baisse s'observe dans tous les groupes d'âge, mais elle est plus prononcée chez les 20-34 ans et les moins de 18 ans.


- Pour la période 1994-1998, les **territoires de CLSC** mettent en lumière des disparités marquées allant de 13 % pour le CLSC Seigneurie de Beauharnois à seulement 7 % pour le territoire de Châteauguay. Les autres territoires qui présentent un excédent significatif par rapport à la valeur régionale de 9 % sont : La Chênaie et Longueuil-Ouest et ceux qui témoignent d'une situation plus favorable que la région sont d'abord Kateri, des Seigneuries puis La Vallée des Patriotes.


Tous les territoires ont amélioré leur situation en diminuant leur proportion entre 1984-1988 et 1994-1998 mais ceci de façon très variable autour d'une moyenne régionale de moins de 25 %. Trois territoires, soit celui de la Haute-Yamaska, Longueuil-Est et du Havre ont vu leur pourcentage diminuer de 31 %, tandis que Seigneurie de Beauharnois n'a connu qu'une réduction de 6 % et est le seul avec Longueuil-Ouest à présenter pour chacune des trois périodes un excédent par rapport à la région.

1. Proportion de naissances vivantes^{1, 2, 3} ayant un retard de croissance intra-utérine⁴, Montérégie, 1981 à 1998



2. Proportion de naissances vivantes^{1, 2, 3} ayant un retard de croissance intra-utérine⁴ selon l'âge de la mère à l'accouchement, Montérégie, 1981-1983 à 1996-1998



3. Proportion de naissances vivantes^{1, 2, 3} ayant un retard de croissance intra-utérine⁴, CLSC, Montérégie, 1994-1998**4. Proportion de naissances vivantes^{1, 2, 3} ayant un retard de croissance intra-utérine⁴, CLSC, Montérégie et Québec, 1984-1988 à 1994-1998**

CLSC	1984-1988	1989-1993	1994-1998		Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	%	%	Nombre ⁵	%	%
La Presqu'île	11,3	9,7	1 331	8,2	-27
Huntingdon	10,8	11,5 (+)	279	9,0	-16
Seigneurie de Beauharnois	13,7 (+)	13,1 (+)	573	12,9 (+)	-6
Châteauguay	9,2 (-)	8,6 (-)	757	6,8 (-)	-27
Jardin du Québec	10,2	9,6	263	8,4	-18
Kateri	10,1 (-)	8,5 (-)	1 117	7,2 (-)	-29
Samuel-de-Champlain	9,7 (-)	8,5 (-)	1 016	8,0	-18
Longueuil- Ouest	13,9 (+)	12,2 (+)	737	11,1 (+)	s.o.
Longueuil-Est	13,1 (+)	10,7	862	9,0	s.o.
St-Hubert	11,2	8,9 (-)	905	8,5	-24
des Seigneuries	10,0 (-)	8,8 (-)	1 205	7,7 (-)	-23
Champagnat de la Vallée des Forts	11,2	9,6	1 145	8,5	-24
La Vallée des Patriotes	10,4 (-)	8,3 (-)	994	7,9 (-)	-24
du Richelieu	12,2	8,4 (-)	696	9,0	-27
du Havre	11,7	8,8	445	8,0	-31
des Maskoutains	11,1	11,4 (+)	886	9,3	-16
La Pommerai	13,4 (+)	11,1 (+)	497	9,5	-29
de la Haute-Yamaska	13,7 (+)	11,3 (+)	927	9,5	-31
La Chênaie	13,5	11,8	189	11,2 (+)	-17
MONTÉRÉGIE	11,5	9,8	14 824	8,7	-25
ENSEMBLE DU QUÉBEC	11,9	9,8	83 071	8,6	-28

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 31 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

- Les naissances autres que simples ou gémellaires sont exclues du calcul. Entre 1981 et 1998, on retrouve au Québec annuellement moins de 70 naissances autres que simples et gémellaires.
- De 1981 à 1998, le nombre de naissances dont la combinaison de poids et de la durée de gestation est improbable varie entre 0,3 % et 1,7 %.
- Avant 1988, les naissances de poids inférieur à 500 grammes ne sont pas comprises dans les données. Pour 1988 et les années suivantes, on trouve en moyenne annuellement pour l'ensemble du Québec 75 naissances vivantes de poids inférieur à 500 grammes.
- De 1981 à 1998, la proportion de naissances vivantes dont le poids ou la durée de gestation est inconnu se situe entre 0,1 % et 5,4 %.
- Nombre annuel moyen de naissances vivantes simples ou gémellaires dont le poids à la naissance et la durée de gestation sont connus.
- s.o. Sans objet, pour la période 1984-1988 l'attribution des naissances au CLSC de Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.
- (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
- (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.


27.⁽³⁴⁾ PROPORTION DE LA POPULATION PRÉSENTANT UN EXCÈS DE POIDS

- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec, 29 % des Montérégiens de quinze ans et plus présentent un excès de poids, ce qui correspond à plus de 285 000 personnes.
- Cette proportion, en hausse constante depuis plus de dix ans, est significativement plus élevée que celle estimée lors de l'enquête de 1987 alors qu'elle n'était que de 20 %.
- Les **hommes** présentent une valeur supérieure à celle des femmes bien que cette dernière augmente de façon plus marquée que celle des hommes entre les enquêtes.
- Dans toutes les enquêtes menées par Santé Québec, la proportion de personnes avec excès de poids augmente avec l'**âge** jusqu'au groupe des 65 ans et plus où on assiste à une baisse des valeurs. L'augmentation est constante pour les moins de 45 ans tandis qu'elle fléchit légèrement lors de la dernière enquête de 1998 chez les 45 ans et plus.
- Au printemps 2000, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, chez les adultes de 20-64 ans, on dénote une bonne variabilité entre les **territoires de CLSC** qui affichent des valeurs allant de 36 % à 24 %, bien qu'un seul, le CLSC Kateri, affiche une proportion significativement supérieure à la région (36 % c. 28 %).


Au niveau des personnes dites « obèses », le CLSC Huntingdon avec 17 % occupe le premier rang tandis que Seigneurie de Beauharnois avec 8 %, présente la plus faible proportion de personnes obèses.

Le CLSC Vallée des Forts, bien que situé au 7^e rang comprend le plus grand nombre de personnes avec excès de poids, soit plus de 21 000 personnes de 20-64 ans.


1. Proportion de la population de 15 ans et plus présentant un excès de poids selon le sexe, Montérégie, 1987, 1992-1993 et 1998



2. Proportion de la population de 15 ans et plus présentant un excès de poids selon l'âge, Montérégie, 1987, 1992-1993 et 1998



3. Proportion de la population de 20-64 ans et plus présentant un excès de poids, CLSC, Montérégie, printemps 2000



4. Proportion de la population de 20-64 ans et plus présentant un excès de poids, CLSC, Montérégie, printemps 2000

CLSC	Embonpoint	Obésité	Excès de poids	
	%	%	Nombre ²	%
La Presqu'île	13,2	12,4	18 979	25,6
Huntingdon	16,1	17,0	5 735	33,1
Seigneurie de Beauharnois	20,5	8,4	12 079	28,9
Châteauguay	18,5	9,8	12 005	28,3
Jardin du Québec	18,5	13,4	5 642	31,9
Kateri	25,8	10,2	19 531	36,0 (+) ¹
Samuel-de-Champlain	11,9	12,0	19 529	23,9
Longueuil-Ouest	16,6	9,0	13 965	25,6
Longueuil-Est	11,6	11,9	11 932	23,5
Saint-Hubert	15,7	9,7	13 849	25,4
des Seigneuries	13,8	9,8	16 863	23,6
Champagnat de la Vallée de Forts	19,8	10,6	21 337	30,4
La Vallée des Patriotes	13,6	14,5	17 848	28,1
du Richelieu	18,0	15,4	11 909	33,4
du Havre	17,7	12,6	11 559	30,3
des Maskoutains	15,7	15,1	16 946	30,8
La Pommerai	14,3	9,4	9 077	23,7
de la Haute-Yamaska	13,7	10,4	15 151	24,1
La Chênaie	21,0	10,4	3 585	31,4
MONTÉRÉGIE	16,1	11,5	257 520	27,6

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 34 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

- Les tests statistiques dans le but d'établir la présence d'une différence entre un territoire de CLSC et la région n'ont été effectués que sur la population de 20-64 ans présentant un excès de poids.
 - Population estimée de 20-64 ans présentant un excès de poids.
- (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .10.

28.⁽³⁶⁾ TAUX DES PRISES EN CHARGE DANS LE CADRE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE


- En 2000-2001, dans le cadre de la Loi de la protection de la jeunesse, le taux global des **cas signalés et retenus** pour 1 000 jeunes Montérégiens de 0-17 ans se situe à 10,5 ce qui correspond au total à 3 200 cas.

Pour un sous-ensemble de 1 396 cas parmi les cas signalés et retenus en 2000-2001, soit pour un taux global de 4,6 pour 1 000 jeunes, on a jugé que le **développement et la sécurité des enfants** étaient même **compromis** : 687 cas pour de la négligence et 11 pour de l'abandon pour des taux respectifs de 2,3 et 0,04 pour 1 000 jeunes. Ces derniers taux sont presque équivalents à ceux calculés pour l'année 1999-2000.


- Les taux augmentent **avec l'âge** passant de 8,9 chez les 0-5 ans à un maximum de 13,1 chez les 12-17 ans.
- Les taux pour la « **négligence** » et les « **abus physiques** » figurent respectivement au 1^{er} et 2^e rang des cas retenus chez les moins de 12 ans tandis que la problématique « **troubles de comportement** » occupe le premier rang chez les 12-17 ans avec le taux le plus élevé d'entre tous les groupes, soit 7,6, supérieur à la somme des taux pour toutes les autres problématiques chez ce groupe d'âge.
- Les **garçons** présentent pour ce genre de cas, un taux légèrement plus élevé que celui des filles (4,9 c. 4,2).
- Plusieurs des **territoires de CLSC** présentent des taux, pour l'ensemble des problématiques, significativement différents du taux moyen de la région en ce qui a trait aux cas signalés retenus et pour lesquels le développement et la sécurité sont compromis.

Six d'entre eux témoignent d'un excédent, soit dans l'ordre décroissant : Seigneurie de Beauharnois (excédent de 77 %), Huntingdon, du Havre et Longueuil-Est qui s'écartent tous de plus de 50 % de la valeur régionale, puis Vallée des Forts et Châteauguay qui s'écartent mais à un moindre degré. À l'opposé, quatre territoires présentent une valeur moindre que le taux régional. Ce sont Kateri (déficit de près de 60 %), des Seigneuries, la Vallée des Patriotes et La Presqu'île.


1. Taux des cas signalés et retenus dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse et dont la sécurité et le développement sont compromis, Montérégie, 1993-1994 à 2000-2001




2. Taux des cas signalés et retenus dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse selon la problématique, Montérégie, 2000-2001



3. Indice comparatif des cas signalés et retenus dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse et dont la sécurité et le développement sont compromis, CLSC, Montérégie, 2000-2001



4. Taux des cas signalés et retenus dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse et dont la sécurité et le développement sont compromis selon la problématique et selon l'âge, CLSC, Montérégie, 2000-2001 (Taux pour 1 000 jeunes de 0-17 ans)



5. Taux des cas signalés et retenus et dont la sécurité et le développement sont compromis dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse selon la problématique et selon le sexe, CLSC, Montérégie, 2000-2001 (Taux pour 1 000 jeunes de 0-17 ans)

CLSC	Négligence	Troubles de comportement	Abus physique	Abus sexuel	Abandon	Garçons		Filles	Total	
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux		Taux	Nombre	Taux
La Presqu'île	* 1,4 (-)	* 1,4	** 0,2	** 0,2	0	3,2 (-)		3,3	84	3,2 (-)
Huntingdon	* 4,1	* 1,8	** 0,6	** 0,8	0	* 8,0	*	6,6	45	7,3 (+)
Seigneurie de Beauharnois	5,2 (+)	* 2,2	** 0,3	** 0,4	0	9,6 (+)	*	6,4	92	8,0 (+)
Châteauguay	3,0	* 1,9	** 0,5	** 0,4	** 0,06	5,7		6,2	105	5,9 (+)
Jardin du Québec	* 2,4	** 1,3	** 0,9	** 0,2	0	* 5,3	*	4,1	26	* 4,7
Kateri	* 0,5 (-)	* 0,9 (-)	** 0,3	** 0,1	0	* 2,0 (-)	*	1,7 (-)	42	1,9 (-)
Samuel de Champlain	* 1,3 (-)	2,2	* 0,5	**	** 0,14	3,9		4,2	90	4,1
Longueuil- Ouest	* 1,9	* 1,3	** 0,7	** 0,2	** 0,08	* 5,1	*	3,4	53	4,3
Longueuil-Est	3,7 (+)	* 2,3	** 0,6	** 0,1	** 0,21	8,1 (+)		5,5	100	6,9 (+)
St-Hubert	* 1,5	1,9	** 0,2	** 0,2	0	4,5	*	3,1	74	3,8
Des Seigneuries	* 0,9 (-)	* 1,3 (-)	** 0,1	** 0,0 (-)	** 0,04	3,1 (-)	*	1,7 (-)	62	2,4 (-)
Champagnat de la Vallée des Forts	3,1 (+)	2,4	* 0,8	** 0,3	0	7,0 (+)		6,2 (+)	155	6,6 (+)
La Vallée des Patriotes	* 1,6	* 0,9 (-)	** 0,3	** 0,1	0	3,1 (-)	*	2,3 (-)	63	2,7 (-)
du Richelieu	* 2,4	* 1,2 (-)	** 0,5	**	** 0,07	* 5,0	*	3,7	58	4,3
du Havre	4,0 (+)	* 2,2	** 0,6	** 0,1	0	* 6,4	*	7,7 (+)	66	7,0 (+)
des Maskoutains	2,5	* 2,0	** 0,3	** 0,2	** 0,06	5,8		4,5	89	5,1
La Pommeraie	* 2,0	* 1,6	** 0,2	** 0,2	0	* 3,6	*	4,3	43	4,0
de la Haute-Yamaska	3,0	2,3	** 0,3	** 0,3	0	5,7		6,0	111	5,8
La Chênaie	* 2,9	** 1,6	** 0,5	** 0,8	0	* 5,0	*	6,7	22	* 5,8
MONTÉRÉGIE	2,3	1,7	0,4	0,2	0,04	4,9		4,2	1 396	4,5

6. Taux des cas signalés et retenus dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse selon l'âge, CLSC, Montérégie, 2000-2001 (Taux pour 1 000 jeunes de 0-17 ans)

CLSC	0-5 ans	6-11 ans	12-17 ans	Total	
	Taux	Taux	Taux	Nombre	Taux
La Presqu'île	* 3,7 (-)	6,2 (-)	11,4	182	7,0 (-)
Huntingdon	** 4,8 (-)	* 13,6	16,0	75	12,2
Seigneurie de Beauharnois	16,8 (+)	15,4 (+)	16,7	186	16,3 (+)
Châteauguay	10,2	10,1	14,8	209	11,8
Jardin du Québec	* 7,9	* 9,6	* 11,4	54	9,8
Kateri	* 2,8 (-)	5,2 (-)	10,4	135	6,0 (-)
Samuel de Champlain	9,0	6,1 (-)	12,4	206	9,3
Longueuil- Ouest	12,0	12,9	15,5	166	13,4 (+)
Longueuil-Est	18,1 (+)	18,7 (+)	31,7 (+)	328	22,6 (+)
St-Hubert	* 5,7 (-)	6,3 (-)	15,7	183	9,4
Des Seigneuries	* 2,0 (-)	* 2,8 (-)	8,8 (-)	116	4,5 (-)
Ch. de la Vallée des Forts	15,1 (+)	12,2	18,0 (+)	352	15,0 (+)
La Vallée des Patriotes	* 3,7 (-)	5,5 (-)	7,7 (-)	131	5,7 (-)
du Richelieu	* 7,8	9,0	13,9	138	10,3
du Havre	16,0 (+)	15,9 (+)	15,2	147	15,7 (+)
des Maskoutains	11,1	6,6 (-)	9,0 (-)	151	8,7 (-)
La Pommeraie	13,3	14,0 (+)	13,2	147	13,5 (+)
de la Haute-Yamaska	10,7	11,2	12,2	217	11,4
La Chênaie	* 15,3	* 11,0	* 10,6	46	12,1
MONTÉRÉGIE	8,9	9,5	13,1	3 200	10,5

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 36 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Comme quelques cas sont comptés plus d'une fois, il est plus exact de parler ici de cas retenus et pris en charge et non pas de nouveaux cas ou d'incidence.

(+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

(-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.


29. PROPORTION DE LA POPULATION AYANT DÉJÀ CONSOMMÉ DES DROGUES ILLICITES

- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec, plus de 300 000 Montérégiens de 15 ans et plus vivant en ménage privé, soit près du tiers de cette population, déclarent avoir déjà **consommé de la drogue au cours de la vie**.
- Les **hommes** présentent une proportion supérieure à celle des femmes, soit 36 % c. 29 %.
- La consommation à vie varie considérablement avec l'**âge**, près de la moitié des personnes de moins de 45 ans sont susceptibles d'avoir été des consommateurs contre seulement 17 % et 4 % respectivement chez les 45-64 ans et chez les 65 ans et plus.
- Au printemps 2000, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, les **territoires de CLSC** présentent des variations marquées entre eux allant du simple (Huntingdon 10 %) au triple (Kateri 30 %).


Les CLSC Huntingdon et des Maskoutains se démarquent de façon significative de la valeur régionale de 24 % en présentant des valeurs inférieures, tandis que les territoires de Kateri et Longueuil-Est affichent des pourcentages de consommateurs à vie significativement plus élevés que la région.

Le CLSC Vallée des Patriotes situé au 9^e rang quant à sa proportion, avec un pourcentage voisin de celui de la région, affiche le second nombre le plus important de consommateurs, soit plus de 17 000 consommateurs de 15 ans et plus.


1. Proportion de la population de 15 ans et plus ayant déjà consommé des drogues illicites au cours de la vie selon le sexe, Montérégie, 1998



2. Répartition de la population de 15 ans et plus ayant déjà consommé des drogues illicites au cours de la vie selon l'âge, Montérégie, 1998



3. Proportion de la population de 15 ans et plus ayant déjà consommé des drogues illicites au cours de la vie, CLSC, Montérégie, printemps 2000



4. Répartition de la population de 15 ans et plus ayant déjà consommé des drogues illicites au cours de la vie, CLSC, Montérégie, printemps 2000

CLSC	Non	Oui	
	%	Nombre ¹	%
La Presqu'île	78,6	15 760	21,4
Huntingdon	89,7	1 778	* 10,3 (<<)
Seigneurie de Beauharnois	74,2	11 502	25,8
Châteauguay	77,0	10 815	23,0
Jardin du Québec	79,8	3 614	20,2
Kateri	69,9	17 477	30,1 (>)
Samuel-de-Champlain	77,7	19 915	22,3
Longueuil-Ouest	74,6	13 967	25,4
Longueuil-Est	71,7	14 079	28,3 (+)
Saint-Hubert	72,8	16 230	27,2
des Seigneuries	74,6	18 827	25,4
Champagnat de la Vallée de Forts	78,0	16 672	22,0
La Vallée des Patriotes	76,0	17 252	24,0
du Richelieu	72,5	10 616	27,5
du Havre	81,1	8 218	18,9
des Maskoutains	84,9	9 534	15,1 (<<)
La Pommeraie	76,8	9 065	23,2
de la Haute-Yamaska	73,0	16 837	27,0
La Chênaie	80,3	2 347	19,7
MONTÉRÉGIE	76,4	234 504	23,6

Notes

Cet indicateur mesure la proportion de personnes de 15 ans et plus ayant déjà consommé des drogues illicites au cours de leur vie, par rapport à la population totale de 15 ans et plus des ménages privés.

L'information provient d'un questionnaire autoadministré rempli par les personnes de 15 ans et plus du ménage pour les données de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec de 1998 et de la même question posée au répondant de 15 ans et plus choisi au hasard dans le ménage lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM du printemps 2000. La question est : « Nous aimerions savoir s'il vous est arrivé de prendre de la drogue sans prescription ou sans ordonnance, au cours de votre vie : oui, non? ».

Les réponses à cette question sont sujettes à un biais de sous-déclaration compte tenu du problème de désirabilité sociale qui lui est associé.

1. Population estimée de 15 ans et plus déclarant avoir déjà consommé des drogues illicites à vie.

>, (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .05, .10.

<< Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .01.

* Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.


30. PROPORTION DE LA POPULATION N'AYANT AUCUN CONFIDENT

- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec, plus de 100 000 Montréalais de 15 ans et plus vivant en ménage privé disent **n'avoir personne à qui se confier ou parler librement de leurs problèmes**, ce qui représente une proportion de 11 % de cette population.
- Les **hommes** affichent une proportion significativement supérieure à celle des femmes (15 % c. 8 %).
- **Par rapport** à la prévalence estimée en 1992-1993 de 14 %, celle de 1998 constitue une baisse significative au plan statistique.
- L'absence de confident est un phénomène qui augmente systématiquement **avec l'âge**, autant en 1992-1993 qu'en 1998 bien que les différences ne soient pas significatives statistiquement. Elles passent de 8 % chez les 15-24 ans à 13 % chez les 45-64 ans.
- **Au printemps 2000**, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, les **territoires de CLSC** affichent des proportions allant du simple (Du Richelieu avec 4 %) au triple (Longueuil-Ouest avec 12 %) quant à la proportion de personnes de 15 ans et plus sans confident.


La valeur élevée estimée sur le territoire du CLSC Longueuil-Ouest constitue un excédent significativement supérieur par rapport à la valeur régionale estimée à 9 %. Tandis que les CLSC des Seigneuries et encore plus Du Richelieu présentent des proportions significativement inférieures à la région, soit respectivement 6 % et 4 %.

Les CLSC La Presqu'île et Samuel de Champlain qui se situent respectivement au 7^e et au 14^e rang, quant à leur pourcentage, comptent les nombres les plus élevés de personnes sans confident, soit près de 7 400.


1. Proportion de la population de 15 ans et plus n'ayant aucun confident selon le sexe, Montérégie, 1992-1993 et 1998



2. Répartition de la population de 15 ans et plus n'ayant aucun confident selon l'âge, Montérégie, 1992-1993 et 1998



3. Proportion de la population de 15 ans et plus n'ayant aucun confident, CLSC, Montérégie, printemps 2000



4. Répartition de la population de 15 ans et plus selon la présence d'un confident, CLSC, Montérégie, printemps 2000

CLSC	Oui	Non	
	%	Nombre ¹	%
La Presqu'île	89,9	7 385	* 10,1
Huntingdon	88,0	2 085	* 12,0
Seigneurie de Beauharnois	87,8	5 415	* 12,2
Châteauguay	91,1	4 162	* 8,9
Jardin du Québec	91,1	1 592	* 8,9
Kateri	89,6	6 059	* 10,4
Samuel-de-Champlain	91,8	7 353	* 8,2
Longueuil-Ouest	87,7	6 764	* 12,3 (+)
Longueuil-Est	91,0	4 482	* 9,0
Saint-Hubert	90,0	6 001	* 10,0
des Seigneuries	93,9	4 485	* 6,1 (-)
Champagnat de la Vallée de Forts	92,3	5 829	* 7,7
La Vallée des Patriotes	92,6	5 344	* 7,4
du Richelieu	95,8	1 621	* 4,2 (<)
du Havre	89,1	4 737	* 10,9
des Maskoutains	91,6	5 251	* 8,4
La Pommeraie	92,4	2 960	* 7,6
de la Haute-Yamaska	90,7	5 890	* 9,3
La Chênaie	88,0	1 435	* 12,0
MONTÉRÉGIE	91,1	88 850	8,9

Notes

Cet indicateur mesure la proportion de personnes de 15 ans et plus rapportant n'avoir aucun confident, par rapport à la population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés.

L'information provient d'un questionnaire autoadministré rempli par les personnes de 15 ans et plus du ménage pour les données des Enquêtes sociales et de santé de Santé Québec de 1992-1993 et 1998 et de la même question posée au répondant de 15 ans et plus choisi au hasard dans le ménage lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM du printemps 2000.

La question est : « Y a-t-il dans votre entourage (vos ami(e)s ou votre famille) quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, parler librement de vos problèmes : oui, non? ».

Cette question constitue un des huit éléments permettant de construire l'indice de soutien social.

1. Population estimée de 15 ans et plus n'ayant aucun confident.

(+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .10.

<, (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .05, .10.


* Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

31. PROPORTION DE LA POPULATION PRÉSENTANT UN DES TROIS ÉLÉMENTS DE L'INDICE D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE


- **Au printemps 2000**, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, 7 % des Montérégiens de 15 ans et plus ou près de 72 000 personnes affirment que pour eux-mêmes ou les membres de leur famille, **il arrive « souvent ou parfois » qu'ils mangent moins qu'ils ne le devraient parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour la nourriture.**
- Les **femmes** et les hommes présentent des valeurs voisines.
- Les valeurs pour les divers **groupes d'âge** varient de 6 % à 9 % mais ne se différencient pas suffisamment pour être significatives.
- **Au printemps 2000**, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, les **territoires de CLSC** présentent de grandes variations allant du simple pour le CLSC des Seigneuries (4 %), Du Richelieu et Samuel de Champlain (5 %), aux environs du triple pour les CLSC Longueuil-Ouest (14 %) et Huntingdon (13 %). Ces CLSC présentent d'ailleurs tous les deux des valeurs statistiquement supérieures à celle de la région.

Dans le cas particulier du CLSC Longueuil-Ouest, 5 % des personnes de 15 ans et plus disent même que la situation de privation alimentaire est « souvent vraie » pour elles.


1. Proportion de la population de 15 ans et plus présentant un des trois éléments de l'indice d'insécurité alimentaire selon le sexe, Montérégie, printemps 2000



2. Répartition de la population de 15 ans et plus présentant un des trois éléments de l'indice d'insécurité alimentaire selon l'âge, Montérégie, printemps 2000



3. Proportion de la population de 15 ans et plus selon la présence d'un des trois éléments de l'indice d'insécurité alimentaire, CLSC, Montérégie, printemps 2000



4. Répartition de la population de 15 ans et plus selon la présence d'un des trois éléments de l'indice d'insécurité alimentaire, CLSC, Montérégie, printemps 2000

CLSC	Oui				Non	
	Souvent vrai	Parfois vrai	Total		Jamais vrai	
	%		Nombre ¹	%	Nombre	%
La Presqu'île	** 1,8	* 6,0	5 691	* 7,8	66 654	92,1
Huntingdon	** 2,3	* 11,0 +	2 286	* 13,3 +	14 894	86,7 -
Seigneurie de Beauharnois	** 2,8	* 7,5	4 625	* 10,3	40 000	89,6
Châteauguay	** 2,4	* 5,8	3 850	* 8,2	43 115	91,8
Jardin du Québec	** 2,2	* 7,6	1 729	* 9,8	15 898	90,2
Kateri	** 3,2 +	** 3,6	3 953	** 6,8	54 151	93,2
Samuel-de-Champlain	** 0,7	* 4,1	4 364	* 4,8	85 462	95,1 +
Longueuil-Ouest	* 5,4 >>	* 8,3 >	7 493	* 13,7 >>	47 144	85,9 <<
Longueuil-Est	** 1,9	* 5,8	3 800	* 7,6	45 980	92,7
Saint-Hubert	** 0,5	* 5,7	3 706	* 6,2	56 039	93,8
des Seigneuries	** 0,7	* 3,7	3 240	* 4,4	70 410	95,6 +
Champagnat de la Vallée de Forts	** 0,9	* 5,5	4 800	* 6,4	71 096	93,7
La Vallée des Patriotes	** 0,8	* 6,5	5 265	* 7,3	66 603	92,7
du Richelieu	** 0,9	* 3,7	1 790	* 4,6	36 892	95,4
du Havre	** 1,3	* 4,2	2 359	* 5,5	40 873	94,5
des Maskoutains	** 1,1	* 5,1	3 830	* 6,2	58 656	93,9
La Pommerai	** 2,5	* 5,7	3 187	* 8,2	35 812	91,8
de la Haute-Yamaska	** 1,2	* 6,3	4 656	* 7,5	58 018	92,6
La Chênaie	** 2,4	* 8,5	1 291	* 10,9	10 623	89,2
MONTÉRÉGIE	1,7	5,6	71 915	7,3	918 320	92,7

Notes

Cet indicateur mesure la proportion de personnes de 15 ans et plus qui rapportent vivre un élément parmi les trois composant l'indice d'insécurité alimentaire soit celui relatif au fait de restreindre son apport alimentaire par manque d'argent, par rapport à la population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés. L'information provient d'un questionnaire rempli par l'intervieweur et s'adressant au répondant-clé du ménage pour les données originant de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec de 1998, et de la même question posée au répondant de 15 ans et plus choisi au hasard dans le ménage lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM du printemps 2000.

La question est : « Dites-moi si l'énoncé suivant est... pour vous et les membres de votre foyer : « Vous mangez moins que vous devriez parce que vous n'avez pas assez d'argent pour la nourriture? Est-ce... souvent vrai, parfois vrai, jamais vrai? »

L'indice ne permet pas d'établir la prévalence de l'insécurité alimentaire essentiellement parce que la valeur de prédiction des éléments qui la composent n'est pas connue dans la population québécoise. L'indice offre cependant une première indication d'un des trois éléments reliés au phénomène de l'insécurité alimentaire.

1. Population estimée de 15 ans et plus présentant un des trois éléments de l'indice de l'insécurité alimentaire.

>>, >, (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<<, (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .10.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.


32.⁽⁴⁰⁾ TAUX D'OCCUPATION DES LITS DRESSÉS SELON L'UNITÉ DE SERVICE

- En 1999-2000, les taux respectifs d'occupation de lits dressés pour les soins physiques de courte durée et pour ceux de l'hébergement et soins de longue durée étaient respectivement de 88 % et de 95 %.
- De 1990-1991 à 1999-2000, on a observé une augmentation totale de 12 % et presque constante dans le premier cas et une stabilité dans le second, ce qui s'est traduit par le rétrécissement marqué de l'écart entre les taux d'occupation des lits des deux univers de soins.
- La croissance des taux pour les lits de **courte durée** est surtout imputable à l'augmentation annuelle pour les années 1995-1996 à 1998-1999, années suivant la transformation du réseau.

Cette croissance des taux s'accompagne d'une diminution à la fois des nombres de lits dressés qui passe d'un nombre moyen de 2 085 pour la période 1991-1995 à 1 739 pour celle de 1996-1999. De même, le séjour moyen passe de 7,2 jours à 6,6 et ceci pour un nombre d'usagers presque équivalent pour les deux périodes.

- En hébergement et soins de **longue durée**, où on compte en moyenne trois fois plus de lits que pour les soins de courte durée en 1996-1999 (5 239 c. 1 739), le séjour moyen a diminué davantage, les taux d'occupation se sont maintenus et le nombre d'usagers a augmenté plus que pour les soins de courte durée.
- Les données pour les soins physiques de courte durée **par centre hospitalier** présentent, entre 1994-1995 et 1999-2000, des diminutions générales des lits dressés, des augmentations des taux d'occupation dans neuf des onze centres et une baisse du séjour moyen sauf dans quatre centres. Les séjours moyens et, à un moindre degré, les taux d'occupation varient d'un centre à l'autre.

1. Taux d'occupation des lits dressés selon l'unité de service, Montérégie, 1990-1991 à 1999-2000



2. Nombre de lits dressés et d'usagers, taux d'occupation et séjour moyen selon l'unité de service, Montérégie, 1991-1992 à 1999-2000

ANNÉE AU 31 MARS	Soins physiques de courte durée				Hébergement et soins de longue durée			
	Lits dressés	Usagers	Taux d'occupation	Séjour moyen	Lits dressés	Usagers	Taux d'occupation	Séjour moyen
	Nombre	Nombre	%	Journées	Nombre	Nombre	%	Journées
1991-1992	2 115	81 195	79,3	7,5	5 577	7 736	96,0	252,6
1992-1993	2 107	81 695	78,6	7,4	5 572	8 096	95,6	240,3
1993-1994	2 153	84 879	81,0	7,5	5 507	8 275	95,6	232,2
1994-1995	2 137	87 030	79,9	7,2	5 531	7 890	95,8	245,1
1995-1996	1 914	86 043	82,3	6,7	5 416	8 422	96,5	226,5
(Moyenne annuelle) 1991-1995 ¹	2 085	84 168	80,2	7,2	5 521	8 084	95,9	239,1
1996-1997	1 748	81 578	83,7	6,5	5 376	8 361	96,1	225,5
1997-1998	1 719	84 687	87,6	6,5	5 112	8 564	96,3	209,7
1998-1999	1 708	84 482	90,2	6,7	5 183	9 346	94,1	190,5
1999-2000	1 779	85 104	88,1	6,7	5 285	9 561	95,1	191,8
(Moyenne annuelle) 1996-1999 ²	1 739	83 963	87,4	6,6	5 239	8 958	95,4	203,6
Variation de 1991-1995 à 1996-1999 %	-17	0	9	-8	-5	11	-1	-15

3. Nombre de lits dressés, taux d'occupation et séjour moyen pour les soins physiques de courte durée, centres hospitaliers, Montérégie, 1994-1995 à 1999-2000

Centres hospitaliers	Lits dressés				Taux d'occupation				Séjour moyen			
	1994-1995	1998-1999	1999-2000	Variation de 1994-1995 à 1999-2000	1994-1995	1998-1999	1999-2000	Variation de 1994-1995 à 1999-2000	1994-1995	1998-1999	1999-2000	Variation de 1994-1995 à 1999-2000
	Lits	Lits	Lits	%	%	%	%	%	Jours	Jours	Jours	Jours
Centre hospitalier Honore-Mercier	294	214	206	-30	73,0	87,9	89,1	22	6,8	6,0	6,0	-0,8
Hopital Barrie Memorial	51	44	45	-12	66,8	79,2	76,5	14	8,9	10,5	10,9	2,0
Hopital Brome-Missisquoi-Perkins	102	74	74	-27	75,9	91,2	86,1	13	6,7	5,6	5,1	-1,6
Hopital du Haut-Richelieu	281	188	245	-13	69,4	99,9	82,6	19	5,2	5,9	6,1	0,9
Centre hospitalier de Granby	154	111	105	-32	78,4	85,8	91,9	17	6,4	5,3	5,3	-1,1
Hopital Charles Lemoyne	360	322	325	-10	84,3	86,8	85,1	1	7,3	7,2	7,4	0,1
Centre hospitalier Régional du Suroit	210	177	179	-15	85,7	82,2	76,1	-11	8,1	7,1	6,8	-1,4
Hotel-dieu de Sorel	198	134	134	-32	87,6	98,0	97,7	11	10,3	8,5	9,0	-1,3
Centre hospitalier Pierre-Boucher	298	276	293	-2	78,3	88,7	92,3	18	7,6	6,9	7,2	-0,5
Centre hospitalier Anna-Laberge	179	158	163	-9	92,5	99,6	99,7	8	7,1	6,6	6,5	-0,6
Centre hospitalier Kateri Memorial	10	10	10	0	94,0	89,7	92,0	-2	13,6	16,9	14,4	0,7
MONTÉRÉGIE	2137	1708	1779	-17	79,9	90,2	88,1	10	7,2	6,7	6,7	-0,5

4. Nombre de lits dressés, taux d'occupation et séjour moyen pour l'hébergement et soins de longue durée, centres hospitaliers, Montérégie, 1998-1999 et 1999-2000

Centres hospitaliers	Lits dressés			Taux d'occupation			Séjour moyen		
	1998-1999	1999-2000	Variation de 1998-1999 à 1999-2000	1998-1999	1999-2000	Variation de 1998-1999 à 1999-2000	1998-1999	1999-2000	Variation de 1998-1999 à 1999-2000
	Lits	Lits	%	%	%	%	Jours	Jours	Jours
CHSLD TREFLE D'OR	271	273	0,7	95,8	95,8	0,0	178,1	180,5	2,4
CLSC-CHSLD DES PATRIOTES	225	225	0,0	95,8	95,8	0,1	192,3	187,8	-4,5
CHSLD DE LA MRC DE CHAMPLAIN	289	295	2,1	87,0	94,3	8,4	194,8	139,0	-55,8
LES CLSC ET CHSLD CH. DE LA VALLEE DES FORTS	107	107	0,0	97,1	96,2	-0,9	155,4	151,4	-3,9
LES CLSC ET CHSLD DE LA POMMERAIE	249	249	0,0	95,6	96,2	0,6	204,0	227,2	23,2
CHSLD DU LITTORAL	229	262	14,4	83,6	92,3	10,4	209,3	202,9	-6,4
CENTRE HOSPITALIER HONORE-MERCIER	433	429	-0,9	93,2	95,8	2,8	211,9	215,6	3,7
L'HOPITAL BARRIE MEMORIAL	5	4	-20,0	98,4	92,6	-5,8	359,0	270,4	-88,6
CENTRE VILLA BONHEUR	182	158	-13,2	85,4	97,7	14,4	168,3	178,9	10,6
HOPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS	10	10	0,0	10,1	10,1	0,0	33,5	33,5	0,0
CENTRE HOSPITALIER RIVE-SUD	30	30	0,0	90,0	93,6	4,0	214,2	205,0	-9,3
CENTRE HOSPITALIER DU COMTE DE HUNTINGDON	60	60	0,0	95,8	95,4	-0,4	133,6	127,4	-6,2
CENTRE GERIATRIQUE COURVILLE	24	24	0,0	99,7	98,9	-0,8	257,0	279,5	22,6
HOPITAL DU HAUT-RICHELIEU	280	280	0,0	97,4	94,3	-3,2	154,3	142,4	-12,0
C.H.S.L.D. JEAN-LOUIS-LAPIERRE INC.	28	64	128,6	99,2	78,9	-20,4	307,3	216,9	-90,3
L'HOPITAL GENERAL DE SOREL	255	245	-3,9	99,0	98,2	-0,8	136,9	139,6	2,7
FOYER DE RIGAUD	331	372	12,4	92,5	90,3	-2,5	183,0	179,7	-3,3
CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY	124	145	16,9	98,5	93,2	-5,4	234,6	232,6	-1,9
HOPITAL CHARLES LEMOYNE	10	12	20,0	84,3	95,0	12,6	307,8	346,6	38,8
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DU SUROIT	68	61	-10,3	92,1	95,6	3,8	228,7	204,7	-24,0
CENTRE D'HEBERGEMENT DE COTEAU-LANDING	42	42	0,0	83,7	83,7	0,0	233,4	233,4	0,0
CENTRE D'ACCUEIL D'ACTON VALE	81	81	0,0	91,2	98,4	7,8	153,2	227,2	74,0
ACCUEIL DU RIVAGE	36	36	0,0	91,7	97,7	6,5	309,1	347,1	38,0
CENTRE HOSPITALIER PIERRE-BOUCHER	17	17	0,0	95,2	95,2	0,0	31,1	31,1	0,0
CHSLD CHEVALIER DE LEVIS	571	630	10,3	94,6	95,1	0,6	248,0	233,9	-14,0
LES CENTRES DU HAUT ST-LAURENT (CHSLD) VALLEYFIE	296	308	4,1	98,0	95,6	-2,5	163,6	178,7	15,1
FLORENCE GROULX INC.	50	50	0,0	86,4	77,6	-10,2	250,4	277,8	27,4
CENTRE HOSPITALIER ANNA-LABERGE	30	25	-16,7	99,7	99,1	-0,6	279,8	291,6	11,8
CENTRE ROUVILLE (RESIDENCE SAINTE-CROIX)	215	215	0,0	96,5	96,8	0,4	187,4	167,3	-20,0
CLSC DES MASKOUTAINS	66	66	0,0	98,0	98,6	0,7	165,1	252,8	87,7
CENTRE D'ACCUEIL MARCELLE FERRON INC.	175	175	0,0	99,2	99,7	0,5	271,9	272,0	0,1
RESIDENCE SOREL-TRACY	64	64	0,0	100,0	98,7	-1,3	265,4	259,1	-6,3
CHSLD ST-FELIX DE LONGUEUIL	54	64	18,5	91,6	88,2	-3,7	196,2	236,9	40,6
CHSLD MONTEREGIE	90	90	0,0	99,1	98,9	-0,2	244,8	251,8	7,0
CENTRE HOSP. KATERI MEMORIAL - TEHSAKOTITSEN : TI	33	33	0,0	98,1	96,5	-1,7	135,9	140,1	4,2
CENTRE D'HEBERGEMENT CHAMPLAIN - CHATEAUGUAY	96	96	0,0	99,4	99,9	0,6	295,1	309,9	14,8
CENTRE D'HEBERGEMENT CHAMPLAIN - BELOEIL	57	57	0,0	94,2	96,3	2,2	242,1	230,4	-11,7
MONTÉRÉGIE	5183	5285	2,0	94,1	95,1	1,1	190,5	191,8	1,3

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 40 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).


1. Taux pour 10 000 personnes de tous âges.
2. Taux pour 10 000 personnes de 5-49 ans.

33. ⁽⁴²⁾ INDICE DE DÉPENDANCE DE LA POPULATION POUR LES HOSPITALISATIONS


- **Pour l'année 1998-1999**, en moyenne 39 % des 109 000 hospitalisations de courte durée des résidents de la Montérégie ont eu lieu dans un C.H. localisé sur le territoire de leur propre CLSC de résidence. Cette valeur moyenne est plutôt théorique. En effet, seuls les résidents de dix territoires de CLSC sur dix-neuf ont un C.H. sur leur territoire, et en conséquence, pour les neuf autres territoires les résidents sont forcément dépendants pour leurs hospitalisations ou bien des C.H. localisés sur d'autres territoires de CLSC en Montérégie que le leur ou d'autres C.H. localisés hors Montérégie.
- À l'intérieur du groupe de dix territoires de CLSC où on retrouve un C.H., on observe une grande variation, du simple au double en fait, de la dépendance allant de 80 % pour les hospitalisations des résidents du CLSC du Havre à seulement 38 % pour les hospitalisations des résidents du CLSC Huntingdon.
- Si on élargit la notion de dépendance et qu'on considère la dépendance des Montérégiens non pas seulement par rapport aux C.H. situés sur leur propre territoire de CLSC, mais par rapport à tous les C.H. de la Montérégie indépendamment des territoires de CLSC montérégiens où ces derniers sont situés, c'est plus de 72 % des hospitalisations des résidents montérégiens qui ont lieu dans un C.H. situé dans la région.
- Les **territoires de CLSC** varient quant à la dépendance de leur population pour les hospitalisations dans un C.H. situé en Montérégie, du simple à plus du double allant de 35 % pour les hospitalisations des résidents du CLSC La Presqu'île à un maximum de 88 % pour ceux du CLSC des Maskoutains.

Entre les années 1994-1995 et 1998-1999 on observe une augmentation de 3 % de la dépendance de la population quant aux hospitalisations dans un C.H. situé sur le territoire de leur CLSC de résidence.


1. Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations, CLSC officiels de résidence (C.H. localisé sur le territoire de CLSC), 1998-1999



2. Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations, Montérégie, 1994-1995 à 1998-1999



3. Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations, CLSC officiels de la Montérégie (celui de résidence et autres CLSC de la Montérégie) (C.H. localisé sur le territoire de CLSC), 1998-1999



4. Indice de dépendance de la population pour les hospitalisations, CLSC officiels, Montérégie, 1994-1995 à 1998-1999

CLSC OFFICIELS DE RÉSIDENCE (C.H. LOCALISÉ SUR LE TERRITOIRE DE CLSC)	Hospitalisations						Variation de 1994-1995 à 1998-1999 ⁶	
	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1998-1999		CLSC de résidence	
	CLSC de résidence	CLSC de résidence	CLSC de résidence	CLSC de résidence	CLSC de résidence	Total		
	%	%	%	%	%	Nombre ⁷ %		
La Presqu'île	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	7 201 6,6	s.o.	
Huntingdon (Hôpital Barrie Memorial)	38,8	38,0	37,6	37,3	37,7	2 290 2,1	-3	
Seigneurie de Beauharnois (C.H. du Suroît)	65,5	64,0	65,0	63,3	66,0	6 225 5,7	1	
Châteauguay (C.H. Anna-Laberge)	53,0	56,1	59,0	64,0	64,8	5 710 5,2	22	
Jardin du Québec	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2 190 2,0	s.o.	
Kateri	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	5 805 5,3	s.o.	
Samuel de Champlain (Hôpital Charles LeMoyne)	38,8	40,0	41,5	45,1	45,6	7 323 6,7	17	
Longueuil- Ouest	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	6 148 5,6	s.o.	
Longueuil-Est (C.H. Pierre-Boucher)	45,8	49,4	52,8	55,7	57,7	5 437 5,0	26	
St-Hubert	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	5 269 4,8	s.o.	
des Seigneuries	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	6 492 6,0	s.o.	
Ch. De la Vallée des Forts (Hôp. du Haut-Richelieu)	79,8	79,9	78,6	77,8	79,8	9 984 9,2	0	
La Vallée des Patriotes	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	8 630 7,9	s.o.	
du Richelieu	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	2 983 2,7	s.o.	
du Havre (Hôtel-Dieu de Sorel)	79,4	78,7	80,8	82,0	80,2	5 478 5,0	1	
des Maskoutains (RSRY)	82,4	83,2	82,1	82,8	81,4	8 355 7,7	-1	
La Pommeraie (Hôpital Brome-Miss-Perkins)	62,6	64,1	66,3	67,3	69,4	4 252 3,9	11	
Haute-Yamaska (C.H. de Granby)	72,9	65,8	68,1	69,0	67,4	7 616 7,0	-7	
La Chênaie	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	1 595 1,5	s.o.	
MONTÉRÉGIE ⁵	37,6	29,3	37,9	38,8	38,9	108 982 100,0	3	

5. Principaux échanges : Proportion des hospitalisations de la population d'un CLSC de résidence donné ayant eu lieu dans un C.H. localisé dans un autre CLSC officiel de la Montérégie ou dans une autre région du Québec, 1998-1999

CLSC DE RÉSIDENCE (OFFICIELS)	Localisation du C.H.								Nombre total d'hospitalisations	
	CLSC de résidence		Autres CLSC de la Montérégie		CLSC de la Montérégie		Région de Montréal-Centre		Ailleurs au Québec	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
La Presqu'île	s.o		2532	35,2	2 532	35,2	4 576	63,5	93	1,3
Huntingdon (Hôpital Barrie Memorial)	863	37,7	800	34,9	1 663	72,6	619	27,0	8	0,3
Seigneurie de Beauharnois (C.H. du Suroît)	4 106	66,0	1 126	18,1	5 232	84,0	954	15,3	39	0,6
Châteauguay (C.H. Anna-Laberge)	3 700	64,8	224	3,9	3 924	68,7	1 745	30,6	41	0,7
Jardin du Québec	s.o		1 608	73,4	1 608	73,4	561	25,6	21	1,0
Kateri	s.o		3 597	62,0	3 597	62,0	2 124	36,6	84	1,4
Samuel de Champlain (Hôpital Charles LeMoyne)	3 337	45,6	691	9,4	4 028	55,0	3 199	43,7	96	1,3
Longueuil- Ouest	s.o		4 432	72,1	4 432	72,1	1 645	26,8	71	1,2
Longueuil-Est (C.H. Pierre-Boucher)	3 137	57,7	942	17,3	4 079	75,0	1 298	23,9	60	1,1
St-Hubert	s.o		3 692	70,1	3 692	70,1	1 515	28,8	62	1,2
des Seigneuries	s.o		4 325	66,6	4 325	66,6	2 056	31,7	111	1,7
Ch. De la Vallée des Forts (Hôp.l du Haut-Richelieu)	7 970	79,8	309	3,1	8 279	82,9	1 628	16,3	77	0,8
La Vallée des Patriotes	s.o		6 079	70,4	6 079	70,4	2 448	28,4	103	1,2
du Richelieu	s.o		2 369	79,4	2 369	79,4	539	18,1	75	2,5
du Havre (Hôtel-Dieu de Sorel)	4 394	80,2	211	3,9	4 605	84,1	746	13,6	127	2,3
des Maskoutains (RSRY)	6 798	81,4	509	6,1	7 307	87,5	965	11,5	83	1,0
La Pommerie (Hôpital Brome-Miss-Perkins)	2 951	69,4	467	11,0	3 418	80,4	514	12,1	320	7,5
Haute-Yamaska (C.H. de Granby)	5 136	67,4	1 041	13,7	6 177	81,1	673	8,8	766	10,1
La Chénuaie	s.o		1 088	68,2	1 088	68,2	181	11,3	326	20,4
MONTÉRÉGIE⁵	42 391	38,9	36 042	33,1	78 433	72,0	27 986	25,7	2 563	2,4
									108 982	100,0

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 42 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

- 38,9 % des hospitalisations des résidents de la Montérégie ont eu lieu dans un C.H. situé dans leur CLSC officiel de résidence en Montérégie.
- 37,7 % des hospitalisations des résidents du CLSC Huntingdon ont eu lieu dans un C.H. situé dans leur territoire de CLSC officiel de résidence (Barrie Memorial).
- 0,0 % des hospitalisations des résidents du CLSC La Chénuaie ont eu lieu dans un C.H. situé dans leur territoire de CLSC officiel de résidence.
- 72,0 % des hospitalisations des résidents de la Montérégie ont eu lieu en Montérégie dans un C.H. situé dans un CLSC de la région.
- Le C.H. Kateri Memorial est exclu du tableau mais est compris dans le total.
- Correspond aux années suivant la transformation du réseau.
- Nombre annuel d'hospitalisations des résidents de la Montérégie.
- Il n'y a pas de C.H. localisé sur le territoire de ces CLSC officiels.

34. ⁽⁴³⁾ INDICE DE DÉPENDANCE DE LA RESSOURCE POUR LES HOSPITALISATIONS


En général, plus l'indice est faible pour un territoire plus ce dernier fournit des services hospitaliers aux personnes ne résidant pas sur ce territoire.

- En 1998-1999, les 81 347 hospitalisations survenues dans les C.H. de la Montérégie originent à plus de 96 % des résidents de la région.
- On observe une variation marquée **entre les CLSC** allant de seulement 24 % et 25 % pour les C.H. Charles-LeMoyne et Pierre-Boucher, à 99 % pour Kateri Memorial où presque toutes les hospitalisations originent des résidents du CLSC Châteauguay.

La variation est beaucoup plus faible entre les **territoires de CLSC ayant un C.H.** quant on considère les hospitalisations originant de l'ensemble des résidents de la région et non exclusivement celles originant des résidents du territoire du CLSC où est situé le C.H. L'écart varie entre 93 % pour le C.H. Brome-Missisquoi-Perkins et 99 % pour Kateri Memorial.

Quant aux échanges inter-CLSC, c'est-à-dire celles qui touchent les hospitalisations d'un C.H. donné originant des résidents d'un territoire de CLSC autre que celui où est situé ce C.H., c'est le C.H. du Suroît situé sur le territoire du CLSC Seigneurie de Beauharnois qui remporte la palme avec 34 % de ses hospitalisations qui originent des résidents d'un autre CLSC, soit La Presqu'île.


1. Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations survenues dans un C.H. de la Montérégie, CLSC officiels (C.H. de traitement), Montérégie, 1998-1999



2. Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations survenues dans un C.H. de la Montérégie, CLSC officiels (C.H. de traitement), Montérégie, 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999

CLSC (C.H) de traitement	1994-1995	1996-1997	1998-1999					Variation de 1994-1995 à 1998-1999 (résidents du CLSC où est le C.H.)
	Hospitalisations des résidents du CLSC où est le C.H.	Hospitalisations des résidents du CLSC où est le C.H.	Hospitalisations des résidents du CLSC où est le C.H.	Hospitalisations des résidents des autres CLSC de la Montérégie	Hospitalisations de l'ensemble des résidents de la Montérégie	Hospitalisations des résidents hors de la Montérégie	Hospitalisations dans le CLSC/CH de traitement	
	%	%	%	%	%	%	Nombre	%
Huntingdon (Hôpital Barrie Memorial)	75,7	78,4	76,0	22,3	98,3	1,7	1 134	0
Seigneurie de Beauharnois (C.H. du Suroît)	60,4	58,4	56,4	41,9	98,3	1,7	7 282	-7
Châteauguay (C.H. Anna-Laberge)	48,6	45,5	44,8	50,4	95,2	4,8	8 260	-8
Ch. De la Vallée des Forts (Hôpital du Haut-Richelieu)	67,5	68,6	70,5	27,9	98,4	1,6	11 306	4
Samuel de Champlain (Hôpital Charles Lemoyne)	22,7	23,0	24,4	71,5	95,9	4,1	13 661	7
Longueuil-Est (C.H. Pierre-Boucher)	24,2	25,3	25,0	71,1	96,1	3,9	12 555	3
La Pommerai (Hôpital Brome-Miss-Perkins)	71,9	71,6	68,1	24,9	93,0	7,0	4 332	-5
Haute-Yamaska (C.H. de Granby)	80,5	81,7	82,5	14,8	97,3	2,7	6 229	2
des Maskoutains (RSRY) ⁵	65,2	64,7	63,2	34,4	97,6	2,4	11 111	-3
du Havre (Hôtel-Dieu de Sorel)	82,7	83,2	82,7	9,9	92,6	7,4	5 314	0
Châteauguay (Kateri Memorial)	98,6	99,1	98,8	0,0	98,8	1,2	163	0
MONTRÉGIE	54,5	53,0	52,6	43,8	96,4	3,6	81 347	-3

3. Indice de dépendance de la ressource pour les hospitalisations survenues dans un C.H. de la Montérégie, CLSC officiels (C.H. de traitement), Montérégie, 1998-1999



4. Principaux échanges inter-CLSC : proportion des hospitalisations survenues dans un CLSC officiel donné (C.H. de traitement) originant de personnes résidant dans un autre CLSC, 1998-1999

CSLC officiels (C.H) de traitement	CLSC de résidence	%	Nombre d'hospitalisations impliqués dans les échanges
des Maskoutains (RSRY)	Vallée des Patriotes	20,3	2175
La Pommerai (Hôpital Brome-Miss-Perkins)	Haute-Yamaska	19,8	857
Samuel de Champlain (Hôpital Charles Lemoyne) ¹	St-Hubert	19,4 ⁶	2644
	Longueuil-Ouest	14,2	1946
	Vallée des Patriotes	10,1	1386
	Kateri	9,2	1261
Seigneurie de Beauharnois (C.H. du Suroît)	La Presqu'île	33,7	2457
Longueuil-Est (C.H. Pierre-Boucher)	Des Seigneuries	23,2	2910
	Longueuil-Ouest	19,3	2419
	Vallée des Patriotes	12,3	1544
Huntingdon (Hôpital Barrie Memorial)	Jardin du Québec	11,2	127
	Seig. De Beauharnois	9,3	106
Châteauguay (C.H. Anna-Laberge)	Kateri	24,6	2032
	Seig. De Beauharnois	11,9	986
Ch. De la Vallée des Forts (Hôpital du Haut-Richelieu)	du Richelieu	10,1	1144
	Vallée des Patriotes	6,8	772
Haute-Yamaska (C.H. de Granby)	du Richelieu	8,2	509
du Havre (Hôtel-Dieu de Sorel)	Des Seigneuries	7,6	402

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 43 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

- 93 % des hospitalisations ayant eu lieu dans le C.H. Brome-Missiquoi-Perkins situé sur le territoire du CLSC La Pommerai originent des résidents de la Montérégie.
 - Pour la Montérégie, 96,4 % des hospitalisations qui y sont survenues provenaient des résidents de la région.
 - 52,6 % des hospitalisations survenues dans un C.H. situé en Montérégie originaient des résidents du territoire du CLSC où est localisé le C.H.
 - 24,4 % des 13 661 hospitalisations survenues dans le C.H. Charles-LeMoyne situé sur le territoire du CLSC Samuel de Champlain originaient des résidents de ce territoire de CLSC.
 - RSRY – Réseau-Santé-Richelieu-Yamaska.
En 1998-1999, le Réseau-Santé-Richelieu-Yamaska inclut le pavillon Réseau-Santé-Richelieu-Yamaska Hôtel-Dieu (n=382 hospitalisations).
 - 19,4 % de toutes les hospitalisations survenues dans le C.H. Charles-LeMoyne localisé sur le territoire du CLSC Samuel de Champlain, soit 2 644 hospitalisations originaient des résidents du CLSC Saint-Hubert.
- s.o. Il n'y a pas de C.H. sur le territoire de ces CLSC officiels.

35. ⁽⁴⁶⁾ POURCENTAGE DE SÉJOURS EXCESSIFS À L'URGENCE


- Au **second semestre de l'année 2000-2001**, une personne sur quatre ayant occupé une civière à l'urgence dans un C.H. de la Montérégie y a séjourné durant 24 heures ou plus. Seulement 4 % des personnes y ont séjourné 48 heures ou plus.
- **L'évolution** des proportions entre le premier semestre 1995-1996 et le second de 2000-2001 se comporte de façon irrégulière accusant tantôt des baisses et tantôt des hausses, ces dernières étant cependant continues depuis le premier semestre de 1999-2000.
- La proportion pour les séjours de 24 heures ou plus représente une augmentation de 29 % par rapport à la même valeur au premier semestre de 1995-1996.

Pour les séjours de 48 heures ou plus l'augmentation est de 67 % et la tendance à la hausse est constante depuis le second semestre de 1998-1999.


- En 2000-2001, pour les séjours de 24 heures ou plus, parmi les **C.H. situés sur les divers territoires de CLSC** on observe des variations énormes allant du simple au quadruple, soit de 8 % pour l'hôpital Barrie Memorial et de 34 % pour l'Hôtel-Dieu de Sorel.

Les pourcentages de variations calculés au niveau de chacun des C.H. de la région entre les seconds semestres de 1995-1996 à 2000-2001 présentent des différences spectaculaires tant pour les séjours de 24 heures ou plus que pour ceux de 48 heures ou plus, oscillant de plus 594 % à moins 53 % dans le premier cas et de plus 831 % à moins 91 % dans le second, les C.H. Barrie Memorial et Charles-LeMoine présentant les valeurs maximales respectivement pour le séjour de 24 heures et celui de 48 heures ou plus.


1. Pourcentage de personnes ayant occupé une civière à l'urgence durant 24 heures ou plus, Montérégie, 1995-1996 à 2000-2001



2. Pourcentage de personnes ayant occupé une civière à l'urgence durant 48 heures ou plus, Montérégie, 1995-1996 à 2000-2001



3. Pourcentage de personnes ayant occupé une civière à l'urgence durant 24 heures ou plus, Montérégie, 2000-2001, 2^e semestre



4. Pourcentage de personnes ayant occupé une civière à l'urgence durant 24 heures ou plus et 48 heures ou plus, Montérégie, 1995-1996 à 2000-2001

Centres hospitaliers ¹	1 ^{er} semestre				2 ^e semestre								Variation de 1995-1996 à 2000-2001	
	1995-1996	1999-2000	2000-2001	Variation de 1995-1996 à 2000-2001	1995-1996	1995-1996	1999-2000		2000-2001					
	24 heures	24 heures	24 heures	24 heures	24 heures	48 heures	24 heures	48 heures	24 heures	48 heures	24 heures	48 heures		
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Centre hospitalier Honoré-Mercier	25,2	25,8	20,8	-17	26,5	6,9	18,2	1,0	19,7	0,9	-26	-87		
L'hôpital Barrie Memorial	1,9	8,9	7,6	300	1,6	0,2	12,9	0,9	11,1	0,4	594	100		
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins	23,6	12,5	24,0	2	21,5	0,0	19,2	0,3	22,7	2,9	6			
Hôpital du Haut-Richelieu	7,5	23,9	27,4	265	14,6	5,0	25,7	0,7	20,9	0,9	43	-82		
Centre hospitalier de Granby	18,5	8,2	10,0	-46	26,0	7,0	11,3	0,1	17,6	0,6	-32	-91		
Hôpital Charles Lemoyne	26,6	27,8	32,7	23	25,2	1,6	30,4	10,7	35,5	14,9	41	831		
Centre Hospitalier régional du Suroit	16,5	11,4	12,8	-22	16,1	1,1	12,1	0,5	18,1	1,3	12	18		
Hôtel-Dieu de Sorel	23,9	24,7	34,0	42	30,8	6,2	34,3	5,1	39,4	10,5	28	69		
Centre Hospitalier Pierre-Boucher	20,8	11,1	16,1	-23	15,8	0,4	13,0	0,4	25,9	1,6	64	300		
Centre Hospitalier Anna-Laberge	29,8	11,0	14,8	-50	36,0	1,8	14,8	0,3	16,8	1,5	-53	-17		
MONTÉRÉGIE	18,7	18,2	21,6	16	19,8	2,9	19,9	2,2	24,1	4,0	22	38		

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 46 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Kateri Memorial non disponible.

36.⁽⁴⁷⁾ PROPORTION DE LA POPULATION DE 65 ANS ET PLUS EN INSTITUTION DE SANTÉ

- En 1996, la proportion des personnes de 65 ans et plus vivant en institution de santé était de 8 % en Montérégie plus faible que celle estimée pour l'ensemble du Québec et **en baisse** très légère par rapport à la valeur de 1991. Cette baisse est exclusivement due aux hommes qui ont vu leur proportion passer de 5,5 % à 4,9 %, tandis que celle des femmes a légèrement cru.
- En 1996, **les femmes** de 65 ans et plus présentent une proportion double de celle des hommes de personnes vivant en institution de santé.
- La valeur de 8 % pour l'ensemble des personnes de 65 ans et plus cache des différences très marquées selon le **groupe d'âge** : chez les 65-74 ans le phénomène est marginal, c'est seulement 2 % des personnes qui vivent en institution de santé. À l'opposé, chez les 85 ans et plus c'est le cas de près de quatre personnes sur dix.

L'évolution entre les deux recensements de 1991 et 1996 est faible chez les trois groupes d'âge sauf en ce qui a trait aux 75-84 ans où on a observé une chute relative de 10 %.


- Les **territoires de CLSC** se distinguent fortement : les valeurs maximales et minimales étant de 2 % pour le CLSC Longueuil-Ouest et de 12 % pour le CLSC voisin de Longueuil-Est. Ces deux territoires présentent également les valeurs extrêmes allant du simple au quadruple en ce qui a trait aux 85 ans et plus, le groupe le plus susceptible de vivre dans une institution de santé : les valeurs respectives sont de 14 % pour le premier et de 55 % pour le second.

Les femmes de 65 ans et plus du CLSC Longueuil-Est affichent également la proportion la plus élevée avec 14,6 %


Bien que présentant des pourcentages moindres que Longueuil-Est, les CLSC des Maskoutains et de la Haute-Yamaska sont les seuls à compter tous les deux des effectifs supérieurs à 1 000 personnes toujours chez les 65 ans et plus vivant en institution de santé.

Toujours chez les 65 ans et plus, les territoires de CLSC se distinguent aussi en ce qui a trait au pourcentage de variation entre les deux recensements : la diminution de 2,5 % calculé pour la région se situe très loin du moins 45 % pour le CLSC Longueuil-Ouest et au plus 21 % pour les CLSC de la Haute-Yamaska.


1. Proportion de la population de 65 ans et plus en institution de santé selon le sexe, Montérégie, 1991 et 1996



2. Proportion de la population de 65 ans et plus en institution de santé selon l'âge, Montérégie, 1991 et 1996



3. Proportion de la population de 65 ans et plus en institution de santé, CLSC, Montérégie et Québec, 1996



4. Proportion de la population de 65 ans et plus en institution de santé selon l'âge et selon le sexe, CLSC, Montérégie et Québec, 1991 et 1996

CLSC	1996					Population de 65 ans et plus en institution de santé				
	Sexe		Groupe d'âge							
	65 ans et plus		65-74 ans	75-84 ans	85 ans et plus	1991		1996		Variation de 1991-1996
	Hommes	Femmes				Nombre	%	Nombre	%	
	%	%	%	%	%					%
La Presqu'île	3,5	8,2	1,5	8,8	35,3	465	6,3	545	6,2	-1,6
Huntingdon	3,8	7,5	1,6	6,8	31,5	170	5,6	185	5,8	3,6
Seigneurie de Beauharnois	6,3	12,0	2,3	14,3	44,1	600	8,4	745	9,7	15,5
Châteauguay	2,6	6,9	1,5	8,0	29,1	290	5,9	305	5,0	-15,3
Jardin du Québec	5,3	9,4	2,0	10,8	34,0	170	7,5	200	7,8	4,0
Kateri	4,2	7,7	1,6	8,5	43,3	245	6,9	285	6,1	-11,6
Samuel-de-Champlain	3,0	6,5	1,8	5,8	25,6	600	5,9	630	5,1	-13,6
Longueuil-Ouest	1,5	2,5	0,8	2,9	13,8	295	4,0	185	2,2	-45,0
Longueuil-Est	7,9	14,6	3,5	16,0	55,1	570	13,1	630	12,1	-7,6
Saint-Hubert	4,5	10,4	2,8	13,2	41,8	340	8,1	415	8,1	0,0
des Seigneuries	5,9	14,3	2,3	18,9	51,5	475	9,9	665	10,8	9,1
Champagnat de la Vallée de Forts	5,2	9,1	10,5	10,5	35,8	645	6,6	830	7,4	12,1
La Vallée des Patriotes	3,8	7,6	1,7	8,4	34,3	385	6,1	450	5,9	-3,3
du Richelieu	6,2	11,8	2,4	13,0	45,0	455	11,3	435	9,5	-15,9
du Havre	5,1	9,5	2,5	10,4	45,9	555	8,8	565	7,8	-11,4
des Maskoutains	6,0	12,9	2,3	12,8	44,0	1 085	11,2	1 070	10,3	-8,0
La Pommerai	6,9	13,1	2,4	13,8	45,4	655	9,8	745	10,6	8,2
de la Haute-Yamaska	7,4	14,1	2,9	17,5	48,3	735	9,4	1 005	11,4	21,3
La Chênaie	7,5	12,2	2,0	12,4	50,0	130	8,3	170	9,9	19,3
MONTÉRÉGIE	4,9	9,8	2,0	10,9	39,2	8 870	8,0	10 040	7,8	-2,5
ENSEMBLE DU QUÉBEC	5,7	10,1	2,5	11,3	37,3	63 600	8,2	71 320	8,3	1,2

Notes


Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 47 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

37.⁽⁴⁸⁾ TAUX D'ADMISSION ET DURÉE MOYENNE D'ATTENTE DES PERSONNES ADMISES DANS UN CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE


- En mars 2000, pour la Montérégie, le **taux d'admission dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée** pour 100 lits était de 39.
- Depuis mars 1995, où la valeur était de 29, le taux n'a cessé de grimper pour une augmentation totale de 36 % entre 1995 et 2000.
- La **durée moyenne d'attente** des personnes admises était de 44 jours en septembre 2001, en remontée de près de 60 % par rapport au creux historique de 28 obtenu en septembre 1999, mais plus bas de 17 % en comparaison du 54 jours calculé pour septembre 1995.
- En septembre 2001, les durées moyennes d'attente sont fortement différentes pour les bénéficiaires résidant sur les divers **territoires de CLSC**, allant de 94 et 93 jours respectivement pour les CLSC de Saint-Hubert et de Samuel de Champlain à 4 jours pour le CLSC La Chênaie. Cette dernière durée d'attente étant dix fois moins élevée que celle observée pour la région.

En septembre 2001, pour trois CLSC le nombre d'admissions dépassait 200 personnes soit, dans l'ordre décroissant, Vallée des Forts, des Maskoutains et Longueuil-Est. À l'autre extrême, Longueuil-Ouest n'admettait que six personnes.


1. Taux d'admission dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, Montérégie, mars 1995 à mars 2001



2. Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, Montérégie, septembre 1995 à septembre 2001



3. Durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, CLSC, Montérégie, septembre 2001



4. Taux d'admission et durée moyenne d'attente des personnes admises dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, CLSC, Montérégie, septembre 1995 à septembre 2001

CLSC	Personnes admises						Durée moyenne d'attente					
	Sept. 1995	Sept. 1999	Variation de 1995 à 1999	Sept. 2000	Sept. 2001	Variation de 1995 à 2001	Sept. 1995	Sept. 1999	Variation absolue de 1995 à 1999	Sept. 2000	Sept. 2001	Variation absolue de 1995 à 2001
	Nombre	Nombre	%	Nombre	Nombre	%	Jrs	Jrs	%	Jrs	Jrs	%
La Presqu'île	75	79	5	80	107	43	59	87	28	42	74	14
Huntingdon	42	40	-5	33	45	7	28	37	9	57	26	-2
Seigneurie de Beauharnois	104	113	9	90	165	59	70	36	-34	37	61	-9
Châteauguay	60	60	0	39	58	-3	72	46	-26	87	71	0
Jardin du Québec	25	25	0	32	31	-24	34	46	12	45	33	-1
Kateri	37	82	122	61	68	84	56	26	-30	29	61	5
Samuel-de-Champlain	106	159	50	121	109	3	120	35	-85	56	93	-27
Longueuil-Ouest	4	3	-25	5	6	50	0	5	5	12	36	36
Longueuil-Est	141	213	51	171	203	44	103	35	-68	54	54	-49
Saint-Hubert	66	85	29	91	66	0	160	32	-128	43	94	-66
des Seigneuries	59	146	147	93	77	31	59	34	-24	32	65	6
Champagnat de la Vallée de Forts	140	169	21	203	217	55	16	11	-6	5	14	-2
La Vallée des Patriotes	76	106	39	100	104	37	51	15	-36	28	31	-20
du Richelieu	79	74	-6	62	55	-30	10	12	2	18	23	13
du Havre	90	115	28	115	94	4	74	37	-36	33	41	-33
des Maskoutains	153	206	35	204	215	41	17	3	-13	14	20	3
La Pommerai	89	87	-2	77	88	-1	24	9	-15	21	35	11
de la Haute-Yamaska	108	124	15	128	156	44	25	29	5	27	26	2
La Chênaie	19	33	74	15	24	26	8	2	-6	21	4	-4
MONTÉRÉGIE	1473	1919	30	1720	1888	28	54	28	-26	32	44	-10

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 48 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Année couvrant dix périodes financières.

38.⁽⁴⁹⁾ TAUX D'INTERVENTIONS DITES PERTINENTES

- Pour la **période de 1995-1999**, le taux montréalais pour l'ensemble des **interventions dites pertinentes** était de 96 pour 10 000 personnes de 18 ans et plus.


En 1997-1999 leur nombre annuel moyen équivalait à près de 11 000 interventions en Montréal.

Les taux varient grandement selon le type d'interventions.

En 1998-1999, le taux le plus élevé, soit 76 pour 10 000, est celui relatif aux « **traitements de la cataracte et de la rétinopathie** » qui explique à lui seul près de 80 % du taux total.

- Ce taux particulier est en progression constante **depuis les années 1989-1990** où il n'était que de 6 pour 10 000, ceci pour une augmentation globale de plus de 1 000 %. Pour l'ensemble des interventions, les taux se sont accrus de 105 % au cours des années précédant la transformation du réseau (1991-1995) et de seulement 8 % dans les années suivant la transformation du réseau (1995-1999).
- Les **territoires de CLSC** présentent des différences significatives allant d'un taux global de 165 pour le CLSC Seigneurie de Beauharnois et autour de 67 et 68 pour les CLSC Saint-Hubert, des Seigneuries et Kateri. Les mêmes territoires présentent des valeurs opposées en ce qui a trait au taux spécifique pour le traitement de la cataracte.


1. Taux de certaines interventions dites pertinentes, Montréal, 1989-1990 à 1998-1999



2. Taux de certaines interventions dites pertinentes, Montréal, 1989-1991 à 1997-1999 (Taux annuel moyen pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)

Interventions	1989-1991	1991-1993	1993-1995	Variation de 1989-1991 à 1993-1995	1995-1997	1997-1999	Variation de 1993-1995 à 1997-1999	1989-1991	1993-1995	1997-1999
	Taux	Taux	Taux	%	Taux	Taux	%	Nombre	Nombre	Nombre
Traitement pour cataracte	6,8	14,8	30,4	346	47,8	64,6	113	615	2883	6397
Traitement de la rétinopathie	1,2	1,2	1,7	38	1,6	2,1	23	111	161	207
Angioplastie	6,0	8,0	9,6	59	11,5	13,2	38	543	909	1311
Pontage coronarien	6,6	8,8	9,1	40	9,4	10,2	11	592	869	1006
Implantation d'un pacemaker	4,0	4,9	5,2	31	4,9	6,7	28	360	495	660
Remplacement total de la hanche	3,4	4,0	4,1	19	4,2	4,5	11	310	390	449
Remplacement de la tête du fémur	2,3	2,5	2,6	10	2,8	2,6	2	211	243	260
Remplacement total du genou	1,9	2,8	3,5	82	3,8	4,4	27	172	329	434
TOTAL DES INTERVENTIONS PERTINENTES	32,3	47,0	66,1	105	86,0	108,3	64	2912	6277	10722

3. Indice comparatif des interventions dites pertinentes, CLSC officiels, Montérégie, 1995-1999



4. Taux de certaines interventions dites pertinentes, CLSC officiels, Montérégie, 1991-1995 à 1995-1999 (Taux annuel moyen pour 10 000 personnes de 18 ans et plus)

CLSC officiels	1991-1995	1995-1999								Total des interventions pertinentes		Variation de 1991-1995 à 1995-1999
	Total des interventions pertinentes	Traitement pour cataracte	Traitement de la rétinopathie	Angio-plastie	Pontage coronarien	Implantation d'un pacemaker	Remplacement total de la hanche	Remplacement de la tête du fémur	Remplacement total du genou	Nombre ¹	Taux	%
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux			
La Presqu'île	48,5 (-)	48,6 (-)	* 2,1	11,7	9,0	5,7	* 4,2	* 2,6	* 3,1	624	85,8 (-)	77
Huntingdon	86,0 (+)	80,5 (+)	** 2,9	* 10,4	* 9,1	* 5,7	* 7,9	** 4,5	* 5,9	230	125,5 (+)	46
Seigneurie de Beauharnois	95,0 (+)	107,6 (+)	* 2,1	13,7	12,6	8,0	* 6,5	* 4,0	* 5,9	748	159,2 (+)	68
Châteauguay	85,3 (+)	70,3 (+)	* 3,2	19,4 (+)	14,3 (+)	12,2 (+)	* 4,4	* 3,1	* 5,3	570	130,3 (+)	53
Jardin du Québec	64,6	58,2	** 1,4	* 13,7	* 8,5	** 4,3	* 6,0	** 2,8	* 6,0	176	100,1	55
Kateri	38,4 (-)	32,5 (-)	** 1,2	12,5	9,1	* 4,2	* 2,3 (-)	** 1,3 (-)	* 3,0	397	65,4 (-)	71
Samuel-de-Champlain	52,6	50,6	* 2,1	10,1	9,3	4,9	4,4	* 2,9	* 4,1	761	87,4 (-)	66
Longueuil-Ouest	55,9	61,8	* 1,8	11,4	10,8	6,9	* 4,6	* 2,0	* 4,5	552	102,9	84
Longueuil-Est	45,7 (-)	40,5 (-)	** 1,8	12,0	7,9	* 6,1	* 3,3	* 1,9	* 2,7	371	75,5 (-)	65
Saint-Hubert	36,1 (-)	33,9 (-)	** 1,5	10,5	9,0	* 3,8	* 2,8	* 1,8	* 2,2 (-)	376	64,7 (-)	79
des Seigneuries	39,1 (-)	32,6 (-)	** 1,1	11,4	8,3	* 4,4	* 3,5	* 1,4 (-)	* 2,5	474	64,8 (-)	65
Ch. de la Vallée de Forts	40,1 (-)	58,0	* 2,0	13,1	12,4	* 4,2	* 4,6	* 3,0	7,2 (+)	779	103,6	158
La Vallée des Patriotes	46,2 (-)	43,4 (-)	* 1,5	12,1	8,3	5,1	4,4	* 2,9	* 3,5	697	80,2 (-)	73
du Richelieu	42,2 (-)	52,6	** 1,2	* 12,9	* 10,4	** 3,5	* 4,5	** 2,4	** 3,4	224	89,5	112
du Havre	62,9	80,0 (+)	** 2,1	18,8 (+)	10,6	* 7,6	* 5,2	* 3,4	* 5,4	554	131,9 (+)	110
des Maskoutains	63,5 (+)	62,8	** 1,1	9,8	8,4	7,1	* 4,9	* 4,1	* 3,0	614	100,7	58
La Pommeraie	89,3 (+)	84,5 (+)	** 2,3	11,7	* 9,2	* 7,3	* 6,6	* 4,1	* 6,5	468	130,8 (+)	46
de la Haute-Yamaska	64,0 (+)	73,5 (+)	* 2,5	12,4	9,9	* 5,0	* 4,0	* 2,4	* 3,2	670	112,0 (+)	75
La Chênaie	70,5	69,3	** 1,1	* 14,7	* 11,0	* 9,3	** 4,7	** 2,8	** 3,9	134	115,3	64
MONTÉRÉGIE	55,5	56,3	1,8	12,4	9,8	5,8	4,4	2,7	4,1	9416	96,3	74

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 49 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre annuel moyen d'interventions dites pertinentes.

(+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

(-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.


39. ⁽⁵⁰⁾ TAUX DE CÉSARIENNE

- En 1999-2000 le **taux de césarienne** pour les mères résidant en Montérégie est de 17 pour 100 accouchements, les valeurs oscillant entre un maximum de 18,5 en 1989-1990 et un minimum de 16,6 en 1997-1998.
- Avec un taux de 24,6 pour la période 1997-1999, les **mères de 35 ans et plus** présentent le taux le plus élevé, position qu'elles occupent d'ailleurs depuis 1989-1991. Les taux étant directement reliés à l'âge, dans l'ordre décroissant suivent les taux des mères de 30-34 ans avec 18, puis celui des 25-29 ans, des 20-24 ans et des 15-19 ans avec le taux le plus faible à 10,8. Les taux ont aussi baissé dans tous les groupes d'âge pour un fléchissement total de 3 % au niveau régional, la baisse la plus prononcée se retrouvant chez les 15-19 ans.
- Les populations de mères des divers **territoires de CLSC** présentent des taux de césarienne très différents oscillant, pour la période de 1997-1999, entre des excédents, par rapport au taux régional, de plus de 20 % dans le cas des CLSC Châteauguay et des Seigneuries. À l'opposé, on enregistre un déficit de plus de 20 % pour le CLSC des Maskoutains.


Bien que le CLSC Seigneurie de Beauharnois n'occupe que le 6^e rang du point de vue des taux, ce territoire affiche le plus grand nombre annuel moyen de césariennes pour la période de 1997-1999, soit 220.

L'ampleur des diminutions est presque similaire pour les périodes situées avant et après la transformation du réseau, soit de 4 % à 3 %, mais des différences existent entre les CLSC : entre 1993-1995 et 1997-1999, le CLSC des Maskoutains a vu son taux fondre de près de 30 % tandis que la population de mères du territoire du CLSC Kateri augmentait la valeur de son taux de césarienne de 32 %.


1. Taux de césarienne des résidentes montréalaises, Montérégie, 1989-1990 à 1998-1999



2. Taux de césarienne des résidentes montréalaises, selon l'âge des mères, Montérégie, 1989-1991 à 1997-1999



3. Indice comparatif de césarienne des résidentes montérégiennes, CLSC, Montérégie, 1997-1999



4. Taux de césarienne des résidentes montérégiennes, CLSC, Montérégie, 1989-1991 à 1997-1999 (Taux annuel moyen pour 100 accouchements)

CLSC	1989-1991	1991-1993	1993-1995	Variation de 1989-1991 à 1993-1995	1995-1997	1997-1999		Variation de 1993-1995 à 1997-1999
	Taux	Taux	Taux	%	Taux	Nombre ¹	Taux	%
La Presqu'île	17,9	17,0	16,6	-7	17,7	96	15,4	-7
Huntingdon	18,8	21,6	19,2	2	25,6 (+)	40	18,5	-4
Seig. De Beauharnois	21,4	21,0 (+)	23,1 (+)	8	18,8	220	18,8	-19
Châteauguay	22,8 (+)	20,8	20,8	-9	21,6 (+)	112	21,2	2
Jardin du Québec	18,9	18,7	16,5	-13	14,1	75	19,3	17
Kateri	14,5 (-)	12,8 (-)	14,7	1	16,8	160	19,3	32
Samuel-de-Champlain	18,3	16,8	16,8	-9	16,4	196	15,4	-8
Longueuil- Ouest	14,0	* 10,3 (-)	* 15,1	s.o.	* 15,2	28	* 16,5	9
Longueuil-Est	13,4	13,3 (-)	15,8	s.o.	14,2	126	15,3	-3
St-Hubert	17,5	18,3	15,9	-9	15,8	170	15,4	-4
des Seigneuries	20,5	21,4 (+)	20,7	1	18,6	192	21,0 (+)	2
Ch. de la Vallée des Forts	19,3	16,3	15,9	-18	16,4	166	16,1	2
La Vallée des Patriotes	19,8	19,7	17,9	-10	16,7	144	17,9	0
du Richelieu	18,9	18,2	18,4	-3	16,9	121	15,7	-15
du Havre	21,0	19,7	19,3	-8	18,2	132	19,7	2
des Maskoutains	17,7	16,1	18,6	5	14,9	56	13,4	-28
La Pommeraie	15,4	13,7	16,2	5	16,7	55	16,0	-1
de la Haute-Yamaska	18,3	16,4	16,6	-10	18,3	34	* 14,5	-13
La Chênaie	17,0	15,8	15,3	-10	15,3	175	16,5	8
MONTÉRÉGIE	18,3	17,6	17,7	-4	17,0	2291	17,2	-3

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 50 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre annuel moyen de césariennes.

(+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

(-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

* Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

s.o. Sans objet, pour la période 1989-1991 l'attribution des naissances au CLSC de Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.

40. ⁽⁵¹⁾ TAUX D'HOSPITALISATIONS JUGÉES ÉVITABLES

- Pour l'année 1998-1999, le taux montréalais d'hospitalisations jugées évitables pour certaines conditions médicales pour lesquelles un traitement existe dans un contexte de première ligne est de 55,5 pour 10 000 personnes.

Ce taux est en progression de plus de 20 % depuis 1989-1990, contrairement à une légère tendance à la baisse observée pour l'ensemble du Québec.


Pour la période précédant la transformation du réseau, soit de 1989-1991 à 1993-1995 on calcule une augmentation du taux de 24 % pour l'ensemble des conditions médicales, beaucoup plus élevée que celle estimée pour la période après la transformation, soit 3 % (1993-1995 à 1997-1999).

- À lui seul, le taux pour l'insuffisance cardiaque explique plus de 40 % du taux global montréalais et se situe en 1997-1999 à 23,5 pour 10 000 personnes. Cette condition médicale correspond également au nombre annuel moyen le plus important d'hospitalisations, soit 2 330 pour la même période.

L'ampleur des variations diffère aussi beaucoup selon la condition : tandis qu'une augmentation de 58 % du taux pour les maladies évitables par immunisation est notée, entre 1995-1997 et 1997-1999, une baisse de 36 % pour l'hypertension maligne est enregistrée.

- Pour 1995-1999, les résidents des territoires de CLSC présentent également des taux et des variations de taux très différents : les taux extrêmes sont 38,9 et 38,5 respectivement pour les CLSC des Seigneuries et Kateri contre 84,4 pour Seigneurie de Beauharnois et 76,6 pour Vallée des Forts. Entre 1991-1995 et 1995-1999, l'augmentation la plus marquée est enregistrée à Longueuil-Est (23 %). À l'opposé, on observe une diminution de 5 % pour les CLSC Samuel de Champlain, Saint-Hubert et Du Richelieu.


1. Taux brut total d'hospitalisations jugées évitables¹, Montérégie, 1989-1990 à 1998-1999



2. Taux d'hospitalisations jugées évitables selon la condition médicale, Montérégie, 1989-1991 à 1997-1999 (Taux annuel moyen pour 10 000)

Condition médicale	1989-1991	1991-1993	1993-1995	Variation de 1989-1991 à 1993-1995	1995-1997	1997-1999	Variation de 1993-1995 à 1997-1999	1989-1991	1993-1995	1997-1999
	Taux	Taux	Taux	%	Taux	Taux	%	Nombre	Nombre	Nombre
Appendice rompu ¹	2,5	2,9	2,0	-23	2,0	2,5	28	310	251	328
Asthme ²	10,4	10,4	12,1	17	10,5	8,9	-27	898	1062	775
Pneumonie ²	5,1	3,7	6,1	20	5,2	6,2	3	438	532	544
Cellulite ³	5,5	5,8	8,0	44	8,4	8,2	2	501	757	809
Insuffisance cardiaque ³	14,9	18,5	20,5	38	22,1	23,5	15	1342	1946	2330
Diabète ³	10,1	10,7	11,3	11	9,5	8,9	-21	916	1074	881
Gangrène ³	0,9	1,0	1,0	13	1,0	1,0	-5	80	96	95
Hypokaliémie ³	0,2	0,2	0,2	14	0,2	0,2	-15	15	18	16
Maladies évitables par immunisation ³	0,2	0,3	0,2	7	0,1	0,4	58	20	23	37
Hypertension maligne ³	0,2	0,2	0,1	-12	0,1	0,1	-36	15	14	9
Pyélonéphrite ³	4,3	5,0	6,7	54	6,9	6,4	-4	390	633	633
Ulcère perforé ou avec hémorragie ³	3,5	3,7	3,7	7	3,1	2,6	-30	315	355	257
Hernie abdominale en occlusion ³	1,7	1,7	1,7	0	1,4	1,5	-12	151	159	146
Phlébite sans embolie pulmonaire ³	3,1	3,7	4,7	50	5,5	4,5	-3	282	444	448
ENSEMBLE DES CAUSES JUGÉES ÉVITABLES ¹	46,7	50,4	57,7	24	56,3	56,0	3	5669	7360	7305

3. Indice comparatif des hospitalisations jugées évitables¹, CLSC officiels, Montérégie, 1995-1999



4. Taux d'hospitalisations jugées évitables selon certaines conditions médicales, CLSC officiels, Montérégie, 1991-1995 à 1995-1999 (Taux annuel moyen pour 10 000)

CLSC officiels	1991-1995 ⁵	1995-1999 ⁶										Ensemble des causes jugées évitables		Variation de 1991-1995 à 1995-1999
	Ensemble des causes jugées évitables	Appendice rompu ¹	Asthme ²	Pneumonie ²	Cellulite ³	Insuffisance cardiaque ³	Diabète ³	Pyélo-néphrite ³	Ulcère perforé ³	Phlébite sans embolie pulmonaire ³				
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Nombre ⁴	Taux	%	
La Presqu'île	36,0 (-)	* 1,9	6,6 (-)	* 4,3	6,8	15,6 (-)	6,4 (-)	* 4,1 (-)	* 1,8	* 4,0	390	39,6 (-)	10	
Huntingdon	52,6	** 1,9	4,7 (-)	* 8,8	* 10,9	26,0	* 12,1	* 6,9	** 3,7	** 4,6	149	59,9	14	
Seigneurie de Beauharnois	70,5 (+)	* 2,8	** 16,4 (+)	9,8 (+)	12,0 (+)	39,0 (+)	13,4 (+)	8,8	* 2,5	* 6,2	512	84,4 (+)	20	
Châteauguay	60,6	* 2,2	13,9	* 5,6	10,3	28,1	13,3 (+)	8,8	* 3,0	* 4,3	404	68,0 (+)	12	
Jardin du Québec	59,4	** 2,7	** 12,8	* 6,9	* 12,2	31,3	* 11,4	* 6,1	** 2,0	** 3,6	159	67,3	13	
Kateri	39,9 (-)	* 2,6	7,9	* 3,9	* 4,9 (-)	14,6 (-)	* 5,8 (-)	* 5,0	* 1,9	* 3,5	326	38,5 (-)	-3	
Samuel-de-Champlain	46,1 (-)	* 2,0	9,0	* 3,4 (-)	4,9 (-)	16,2	6,1 (-)	5,3	* 3,6	4,3	487	43,9 (-)	-5	
Longueuil-Ouest	66,2 (+)	* 2,2	12,4	* 6,4	9,4	28,7 (+)	10,0	8,7	* 3,0	* 5,4	461	69,2 (+)	4	
Longueuil-Est	54,5	* 2,1	10,9	* 5,3	9,9	27,2	12,7	* 7,3	* 4,2	* 4,8	428	67,1 (+)	23	
Saint-Hubert	49,2	* 2,1	9,9	* 4,7	* 5,3 (-)	16,0	8,0	6,5	* 3,1	* 4,1	367	46,6 (-)	-5	
des Seigneuries	40,4 (-)	* 1,8	5,9	* 4,0	6,8	15,5 (-)	5,5 (-)	5,6	* 2,0	* 3,4	386	38,9 (-)	-4	
Ch.de la Vallée de Forts	75,3 (+)	* 1,7	14,9 (+)	8,1	10,6	34,1 (+)	12,4 (+)	8,8	* 4,5	5,0	767	76,6 (+)	2	
La Vallée des Patriotes	40,1 (-)	* 2,2	8,5	* 4,0	7,7	19,2	5,6 (-)	5,0	* 2,3	4,4	531	45,3 (-)	13	
du Richelieu	59,4	** 2,4	* 7,2	* 7,1	* 9,4	21,6	* 8,5	* 8,3	** 3,3	* 5,9	192	56,4	-5	
du Havre	71,9 (+)	* 2,0	* 10,9	* 9,1	11,1	32,6 (+)	13,1	* 4,9	** 1,8	* 5,6	381	72,1 (+)	0	
des Maskoutains	62,5 (+)	* 2,9	9,3	* 6,6	11,0	26,0	9,8	8,6	* 2,1	7,0	520	65,1 (+)	4	
La Pommerai	57,0	* 2,8	* 6,4	* 7,8	* 6,8	24,4	12,9	* 4,5	* 3,4	* 7,2	280	59,7	5	
de la Haute-Yamaska	55,8	* 2,9	9,1	* 6,4	7,7	15,0 (-)	10,5	8,2	* 3,4	7,8 (+)	442	55,7	0	
La Chénale	58,4	** 3,7	** 5,3	** 8,0	* 9,1	* 28,7	* 9,3	* 9,1	** 2,8	** 7,1	98	62,4	7	
MONTÉRÉGIE	54,0	2,3	9,7	5,7	8,3	22,8	9,2	6,6	2,8	5,0	7277	56,1	4	

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 51 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Taux pour 10 000 personnes de tous âges.
2. Taux pour 10 000 personnes de 5-49 ans.
3. Taux pour 10 000 personnes de 18 ans et plus.
4. Nombre annuel moyen d'hospitalisations jugées évitables.

5. Correspond aux années précédant la transformation du réseau.
6. Correspond aux années suivant la transformation du réseau.

(+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

(-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

41.⁽⁵²⁾ TAUX DE MORTALITÉ ÉVITABLE


- Le taux annuel moyen de **mortalité évitable par des interventions médicales appropriées** dispensées en temps utile est de 50 pour 100 000 personnes en Montérégie pour la **période 1996-1998**. Pour toutes les périodes de trois ans, allant de 1981-1983 à 1996-1998, il décroît régulièrement pour une baisse totale de près de 40 %.
- Plus de 50 % de ces décès sont associés aux **cardiopathies ischémiques** pour toutes les périodes.

Même si dans l'ensemble, on observe une réduction de 28 % au niveau régional, entre 1984-1988 et 1994-1998, certaines causes de décès ont vu croître leur taux durant la même période : c'est le cas de l'appendicite avec une hausse de 79 %. D'autres causes ont décliné davantage que la baisse d'ensemble; c'est le cas pour la tuberculose qui a diminué de 74 %.

- Pour la période 1994-1998, les **territoires de CLSC** diffèrent grandement du point de vue de leur taux de mortalité évitable : aux extrêmes, on retrouve le CLSC Huntingdon avec un excédent par rapport à la région de 72 % et à l'opposé La Vallée des Patriotes présente un déficit de 17 %.

La variation des taux entre 1984-1988 et 1994-1998 présente également une ampleur différente par rapport à la baisse régionale de 28 %. Le CLSC des Maskoutains enregistre une baisse de 39 % tandis qu'à l'opposé le CLSC La Chênaie voit son taux augmenter de 63 %.


1. Taux brut total de mortalité évitable¹ par les soins, population de 0-64 ans, Montérégie, 1981-1983 à 1996-1998



2. Taux de mortalité évitable¹ par les soins selon la cause, population de 0-64 ans, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

Cause de décès évitable	Nombre annuel moyen				Taux annuel moyen			
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	Variation de 1984-1988 à 1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	nombre	nombre	nombre	%	taux	taux	taux	%
Tuberculose ²	1	1	0	-71	0,1	0,1	0,0	-74
Cancer du col de l'utérus ³	6	7	7	17	0,7	0,8	0,8	3
Cancer du col et du corps de l'utérus ⁴	7	8	9	29	1,0	1,0	1,1	15
Maladie de Hodgkin ²	7	6	4	-47	0,7	0,5	0,3	-53
Cardiopathies rhumatismales chroniques ⁵	1	1	1	20	0,2	0,2	0,2	-10
Maladies respiratoires des enfants ⁶	2	2	1	-67	1,0	0,6	0,3	-69
Asthme ⁵	3	4	1	-59	0,6	0,8	0,3	-51
Appendicite ²	0,2	0,0	0,4	100	0,02	0,00	0,04	79
Hernie abdominale ²	1	1	1	0	0,1	0,1	0,1	-10
Cholélithiase et cholécystite ²	1	1	1	75	0,1	0,1	0,1	57
Maladies hvpertensives et MCV ⁷	71	64	59	-17	17,8	13,8	11,1	-38
Mortalité maternelle ⁸	0	0	1	-	0,0	1,1	3,9	-
Mortalité périnatale ⁸	134	126	94	-30	915,0	698,2	620,1	-32
Cancer du sein ⁹	84	90	95	14	13,9	13,2	13,3	-5
Cardiopathies ischémiques ⁷	422	363	322	-24	106,6	78,3	61,2	-43
Ulcères peptiques ¹⁰	4	3	3	-24	0,7	1,5	0,4	-36
ENSEMBLE DES CAUSES ^{1,11}	740	674	596	-19	71,4	60,1	51,5	-28

3. Indice comparatif de mortalité évitable¹ par les soins, population de 0-64 ans, Montérégie, 1994-1998



4. Taux de mortalité évitable¹ par les soins, population de 0-64 ans, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

CLSC	Nombre annuel moyen				Taux annuel moyen			
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	Variation de 1984-1988 à 1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	Nombre	Nombre	Nombre	%	Taux	Taux	Taux	%
La Presqu'île	47	40	41	-13	71,4	50,1	46,3	-35
Huntingdon	22	16	19	-14	* 107,6	* 78,4	* 88,7	-18
Seigneurie de Beauharnois	45	41	29	-36	91,7	83,2	* 60,0	-35
Châteauguay	43	34	30	-30	75,7	* 56,9	* 48,9	-35
Jardin du Québec	13	13	11	-13	* 66,6	* 64,4	* 53,0	-20
Kateri	29	32	33	12	* 60,5	* 50,2	* 44,8	-26
Samuel-de-Champlain	63	60	46	-28	65,1	59,5	46,4	-29
Longueuil-Ouest	55	49	32	-42	80,9	77,4	* 54,1	s.o.
Longueuil-Est	35	38	41	16	* 67,6	66,2	70,2	s.o.
Saint-Hubert	48	37	38	-21	73,5	52,5	52,1	-29
des Seigneuries	43	39	41	-5	60,5	46,6	44,8	-26
Champagnat de la Vallée de Forts	59	59	44	-25	78,1	69,9	51,1	-35
La Vallée des Patriotes	39	37	37	-6	51,4	44,9	* 42,8	-17
du Richelieu	25	24	22	-11	* 63,9	* 56,4	* 46,8	-27
du Havre	42	36	28	-32	83,5	* 74,0	* 62,1	-26
des Maskoutains	49	43	34	-30	80,5	62,3	* 49,4	-39
La Pommeraie	31	23	24	-23	* 73,8	* 53,9	* 56,1	-24
de la Haute-Yamaska	45	44	36	-19	71,0	63,3	* 50,2	-29
La Chênaie	8	8,6	10	25	** 44,4	** 64,5	* 72,4	63
MONTÉRÉGIE	740	674	596	-19	71,4	60,1	51,5	-28

Notes


Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 52 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Taux pour 100 000 personnes de 0-64 ans.
2. Taux pour 100 000 personnes de 5-64 ans.
3. Taux pour 100 000 femmes de 15-64 ans.
4. Taux pour 100 000 femmes de 15-54 ans.
5. Taux pour 100 000 personnes de 5-44 ans.
6. Taux pour 100 000 personnes de 1-14 ans.
7. Taux pour 100 000 personnes de 35-64 ans.
8. Taux pour 100 000 naissances totales (naissances vivantes et mortinaissances).
9. Taux pour 100 000 femmes de 25-64 ans.
10. Taux pour 100 000 personnes de 25-64 ans.
11. Puisque certaines causes ne sont pas mutuellement exclusives, le total ne correspond pas à la somme des causes.
- s.o. Sans objet, pour la période 1984-1988 l'attribution des décès au CLSC de Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.
- *, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.


42. ⁽⁵⁶⁾ PROPORTION DE LA POPULATION NE CONNAISSANT PAS LE SERVICE TÉLÉPHONIQUE INFO-SANTÉ CLSC

- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de santé Québec, 27 % des Montréalais de 15 ans et plus, soit 223 479 personnes, ne connaissaient pas l'existence du **Service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC**, les **hommes** étant beaucoup plus nombreux que les femmes à afficher cette ignorance (33 % c. 21 %).
- La proportion pour l'ensemble du Québec est de 25 %.
- Certaines différences significatives existent aussi **entre les groupes d'âge**. Les 15-24 ans, 45-64 ans et les 65 ans et plus présentent une proportion plus élevée de personnes ne connaissant pas le service que celle estimée pour les 25-44 ans.
- Au printemps 2000, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, les **territoires de CLSC** révèlent des différences, les proportions variant de 30 % pour le CLSC Samuel de Champlain à 15 % pour Huntingdon. Les autres CLSC qui se démarquent par leurs valeurs inférieures à celle de la région sont Champagnat de la Vallée des Forts et La Pommeraië.


1. Proportion de la population de 15 ans et plus ne connaissant pas le service INFO-SANTÉ CLSC selon le sexe, Montréal, 1998



2. Répartition de la population de 15 ans et plus ne connaissant pas le service INFO-SANTÉ CLSC selon l'âge, Montréal, 1998



3. Proportion de la population de 15 ans et plus ne connaissant pas le service INFO-SANTÉ CLSC, CLSC, Montérégie, printemps, 2000



4. Répartition de la population de 15 ans et plus selon la connaissance du service téléphonique INFO-SANTÉ CLSC, CLSC, Montérégie, printemps 2000

	Oui	Non	
	%	Nombre ¹	%
La Presqu'île	76,9	16 991	23,1
Huntingdon	85,4	2 528	* 14,6
Seigneurie de Beauharnois	75,9	10 771	* 24,1
Châteauguay	78,8	9 939	21,1
Jardin du Québec	82,3	3 167	* 17,7
Kateri	78,7	12 462	* 21,3
Samuel-de-Champlain	70,0 <<	26 945	29,9
Longueuil-Ouest	78,6	12 553	22,8
Longueuil-Est	77,9	11 062	22,2
Saint-Hubert	77,3	13 562	* 22,7
des Seigneuries	80,2	14 655	* 19,8
Champagnat de la Vallée de Forts	84,5 >>	11 728	* 15,5
La Vallée des Patriotes	72,9 <	19 577	* 27,1
du Richelieu	81,1	7 339	* 18,9
du Havre	72,7	11 876	* 27,3
des Maskoutains	73,7	16 591	26,3
La Pommerai	83,8 +	6 340	* 16,2
de la Haute-Yamaska	79,5	12 956	* 20,5
La Chênaie	79,7	2 435	* 20,4
MONTÉRÉGIE	77,6	223 479	22,4

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 56 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Population estimée de 15 ans et plus qui ne connaît pas l'existence du service INFO-SANTÉ CLSC. Les « non » incluent les « ne sait pas ».

>>, (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .10.

<<, < Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05.

* Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.


42A. TAUX DES APPELS RÉPONDUS PAR LE SERVICE INFO-SANTÉ CLSC ET TAUX DE CERTAINS SERVICES DISPENSÉS EN CLSC

- Entre 1996-1997 et 2000-2001, le nombre annuel total d'appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC a progressé de 21 % en Montérégie passant de 335 704 appels à 406 775.
- Un autre changement marquant de l'évolution des appels concerne la répartition entre les appels assumés par la centrale et par le service local. En 1999-2000, il y a eu changement dans l'organisation du service par la centrale, cette dernière couvrant maintenant les appels de 16 h le soir à 8 h le lendemain. La centrale, qui ne représentait que 45 % des appels en 1996-1997, accapare maintenant 58 % du total en 2000-2001.
- Pour l'année 2000-2001, si on exclut plusieurs données importantes sur les services médicaux, les services en milieux scolaires et les interventions de groupe, on observe que ce sont les **groupes d'âge** situés aux deux extrêmes qui présentent les taux les plus élevés d'utilisateurs différents rencontrés pour des interventions individualisées : d'abord les moins de un an qui affichent un taux total de 8 865 par 10 000 et à un moindre degré, les personnes de 85 ans et plus chez qui le taux est estimé à 4 673 pour 10 000. Le taux le plus faible d'utilisateurs se retrouve chez les adultes de 30-49 ans (taux de 1 192).
- Le taux total est supérieur chez les **femmes** par rapport à celui des hommes (2 362 c. 1 784) dû à une plus grande fréquentation des services par ces dernières dans six des dix groupes d'âge et particulièrement chez les 18-29 ans.
- Pour l'année 2000-2001, entre les **territoires de CLSC**, il existe un écart de plus du double entre le territoire du CLSC du Havre qui affiche un taux de 4 445 pour 10 000 et à l'opposé, le CLSC Samuel de Champlain où le même taux brut des appels répondus est de 1 756.


Au niveau des services individualisés, les taux varient également grandement, oscillant entre 763 pour le territoire de la Vallée des Patriotes à près de huit fois plus sur le territoire de Jardin du Québec (6 010); les profils différents de services de santé disponibles sur chacun des territoires ayant sans doute un rôle à jouer dans ces différences de consommation.

Le profil des services selon le type (infirmiers courants, soutien à domicile et autres) varie également beaucoup selon le territoire. À titre d'exemple, les services infirmiers courants qui représentent 9 % du total sur le territoire du CLSC Samuel de Champlain accapare 68 % des services sur le territoire du CLSC Jardin du Québec. Pour le service de soutien à domicile, les valeurs oscillent entre 8 % au CLSC Du Richelieu et 34 % aux CLSC Vallée des Patriotes et des Maskoutains. Encore une fois, les profils différents de services de santé disponibles sur chacun des territoires ayant sans doute un rôle à jouer dans ces différences de consommation.


1. Nombre annuel d'appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC, Montérégie, 1996-1997 à 2000-2001



2. Taux d'utilisateurs différents rencontrés pour certaines interventions individualisées² selon l'âge et le sexe, Montérégie, 2000-2001 (Taux pour 10 000)



3. Taux des appels répondus par le service INFO-SANTÉ CLSC, CLSC, Montérégie, 2000-2001 (Taux annuel pour 10 000)



4. Répartition de certains services selon le type et appels répondus par INFO-SANTÉ CLSC local, CLSC, Montérégie, 2000-2001

CLSC	Services ³						Info-Santé	
	Infirmiers courants	Soutien à domicile	Autres			Total		
	%	%	%	Nombre	Taux		Nombre	Taux
La Presqu'île	16,2	17,3	66,4	18 532	1 798		24 994	2 425
Huntingdon	15,9	31,2	52,9	4 006	1 612		5 851	2 355
Seigneurie de Beauharnois	21,5	17,2	61,3	17 306	3 139		24 479	4 440
Châteauguay	18,3	17,3	64,4	15 275	2 198		19 419	2 794
Jardin du Québec	68,2	9,9	21,9	13 979	6 010		7 068	3 039
Kateri	66,6	8,6	24,7	24 970	2 947		21 405	2 526
Samuel-de-Champlain	9,1	18,4	72,5	18 106	1 596		19 922	1 756
Longueuil-Ouest	26,5	28,3	45,2	14 191	2 181		23 297	3 581
Longueuil-Est	30,1	26,4	43,5	8 984	1 391		20 972	3 248
Saint-Hubert	58,7	8,6	32,7	25 809	3 239		24 343	3 055
des Seigneuries	34,1	16,7	49,2	19 299	1 861		24 350	2 348
Champagnat de la Vallée de Forts	33,1	17,0	49,9	25 693	2 552		36 539	3 629
La Vallée des Patriotes	26,2	33,7	40,2	7 373	763		26 698	2 762
du Richelieu	66,9	7,7	25,3	26 506	5 009		21 063	3 981
du Havre	24,5	23,7	51,8	15 648	3 046		22 836	4 445
des Maskoutains	29,7	33,6	36,6	11 211	1 407		30 892	3 876
La Pommerai	40,7	13,1	46,2	28 177	5 580		13 368	2 647
de la Haute-Yamaska	11,6	18,0	70,4	26 108	3 113		29 220	3 484
La Chênaie	24,4	11,5	64,1	5 448	3 486		6 516	4 169
MONTÉRÉGIE	35,9	16,6	47,5	326 621	2 478		403 232	3 059

Notes


- En 1999-2000, il y a eu un changement dans l'organisation du service par la centrale. La centrale couvre maintenant de 16 heures à 8 heures.
- Les interventions individualisées incluent : maintien à domicile, périnatalité, vaccination, famille-enfance-jeunesse, services psychosociaux et excluent : services médicaux, services en milieu scolaire, interventions de groupes (scolaire, cours prénataux) (données non comparables).
- Ne comprennent pas tous les services offerts et sont d'ailleurs influencés par l'offre de service existant sur le territoire par d'autres fournisseurs que par le CLSC.

43. ⁽⁵⁹⁾ PROPORTION DE FEMMES DE 50 À 69 ANS AYANT SUBI UNE MAMMOGRAPHIE AU COURS D'UNE PÉRIODE DE DEUX ANS


- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de santé Québec, près des deux tiers des femmes, soit environ 84 000 femmes de 50 à 69 ans, déclaraient avoir **subi une mammographie**, cet examen pouvait cependant avoir servi pour le dépistage ou avoir été mené pour d'autres fins, comme la confirmation d'un diagnostic ou le suivi suite à un diagnostic de cancer du sein, etc.
- La proportion québécoise est presque identique à la valeur régionale.
- La proportion de femmes de 50-69 ans qui déclarent avoir subi une mammographie augmente sans cesse depuis l'enquête de 1987. Il en est de même pour les **groupes d'âge** des 50-59 ans et à un moindre degré pour les 60-69 ans.
- Les données régionales du suivi du **Programme québécois de dépistage du cancer du sein** en Montérégie peuvent être compilées sur la base des mammographies menées pour seule fin de dépistage et à ce chapitre elles révèlent que pour le **cumul des années 1999-2000** près d'une femme sur deux de 50-69 ans, soit 47 % d'entre elles ont subi une mammographie de dépistage. Ces données précisent que c'est chez le groupe plus jeune des 50-54 ans que la proportion est la plus élevée, soit 50 %.
- Pour la somme des années 1999-2000, et sur la base des mêmes données du programme québécois de dépistage, les **territoires de CLSC** présentent des variations importantes, significatives dans 16 cas sur 19, les valeurs oscillant entre seulement 8 % pour le territoire du CLSC Châteauguay et 58 % pour celui des Seigneuries. Notons que le centre désigné de dépistage de la région de Châteauguay n'a été accrédité que plus tardivement, soit en novembre 2000.

Bien que le CLSC Samuel de Champlain ne se situe qu'au 10^e rang quant à sa proportion de femmes mammographiées (50 %), c'est dans ce territoire que l'on retrouve le plus grand nombre de femmes qui en 1999 ou en 2000 ont subi l'examen, soit plus de 7 100 femmes pour les deux années.


1. Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie¹ au cours d'une période de deux ans, Montérégie, 1987, 1992-1993 et 1998



2. Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie¹ au cours d'une période de deux ans selon l'âge, Montérégie, 1987, 1992-1993 et 1998



3. Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie² de dépistage au cours d'une période de deux ans, CLSC, Montérégie, 1999 et 2000 cumulées



4. Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie² de dépistage au cours d'une période de deux ans selon l'âge, CLSC, Montérégie, 1999 et 2000 cumulées

CLSC	1999-2000				50-69 ans	
	50-54 ans	55-59 ans	60-64 ans	65-69 ans	Nombre	%
	%	%	%	%		
La Presqu'île	37,5 (-)	37,7 (-)	38,2 (-)	31,4 (-)	3 449	36,6 (-)
Huntingdon	41,7 (-)	40,1 (-)	44,6	33,2 (-)	1 051	40,2 (-)
Seigneurie de Beauharnois	55,8 (+)	51,3 (+)	53,4 (+)	48,5 (+)	3 420	52,6 (+)
Châteauguay ³	9,4 (-)	8,1 (-)	8,3 (-)	6,3 (-)	583	8,2 (-)
Jardin du Québec	31,7 (-)	32,3	30,0	19,7 (-)	668	29,0 (-)
Kateri	49,3	48,3	50,7	39,9	3 380	47,9
Samuel-de-Champlain	51,2	47,7	50,0	48,2 (+)	7 158	49,5 (+)
Longueuil-Ouest	53,9 (+)	52,3 (+)	48,9	48,9 (+)	4 147	51,4 (+)
Longueuil-Est	56,8 (+)	54,3 (+)	57,5 (+)	49,9 (+)	3 721	55,1 (+)
Saint-Hubert	54,7 (+)	48,2	51,6	44,4	4 057	50,9 (+)
des Seigneuries	59,7 (+)	57,1 (+)	62,5 (+)	51,3 (+)	5 865	58,2 (+)
Champagnat de la Vallée de Forts	60,0 (+)	53,8 (+)	54,2 (+)	49,2 (+)	5 596	55,0 (+)
La Vallée des Patriotes	56,0 (+)	52,3 (+)	55,1 (+)	43,6	5 498	52,9 (+)
du Richelieu	52,3	47,0	46,9	39,9	2 306	47,6
du Havre	60,5 (+)	57,3 (+)	58,2 (+)	46,4 (+)	3 660	56,3 (+)
des Maskoutains	44,3 (-)	45,5	43,6 (-)	38,6	3 643	43,3 (-)
La Pommerai	52,0	52,9 (+)	49,5	43,3	2 770	50,0 (+)
de la Haute-Yamaska	45,8 (-)	44,2	45,0	36,3 (-)	3 735	43,4 (-)
La Chênaie	48,3	41,4	46,3	39,7	713	44,5
MONTÉRÉGIE	50,0	47,2	47,9	41,3	65 420	47,3

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 59 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).


1. Peut comprendre des mammographies subies pour d'autres fins que le dépistage.
 2. Ne comprend que des mammographies subies pour fins de dépistage. Les proportions sont calculées sur la base de la population moyenne des deux années.
 3. Le Centre de dépistage de Châteauguay a été accrédité en novembre 2000 seulement.
- (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
(-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

44. ⁽⁶²⁾ PROPORTION DE PERSONNES PRODIGUANT SANS RÉMUNÉRATION DES SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES


- En 1996, 16 % des Montérégiens de quinze ans et plus auraient **prodigué sans rémunération des soins aux personnes âgées** ce qui représente plus de 156 700 personnes qui se seraient impliquées bénévolement dans ce genre d'activité.
- Pour près des trois quarts d'entre elles, **moins de cinq heures** ont été consacrées sur une période d'une semaine.
- Les proportions des **femmes** impliquées sont plus élevées au total (19 % c. 13 %) et pour chacune des catégories de temps consacré, particulièrement en ce qui concerne la catégorie « cinq heures et plus » où la proportion des femmes est le double de celle des hommes (6 % c. 3 %).
- Les **territoires de CLSC** présentent certaines différences, les proportions oscillant entre 14 % pour le CLSC Longueuil-Ouest et près de 19 % pour le CLSC Seigneurie de Beauharnois. Ce dernier CLSC affiche non seulement la valeur la plus élevée en ce qui a trait aux personnes qui ont consacré cinq heures et plus sur une période de sept jours, soit 5,4 %, mais ses proportions pour cette même catégorie d'heures consacrées, tant pour les hommes que pour les femmes, sont les plus élevées de la région.

À l'opposé, toujours pour cette même catégorie d'heures consacrées de cinq heures et plus par semaine, le CLSC Jardin du Québec affiche la valeur la plus faible chez les hommes tandis que dans le cas du CLSC La Chênaie on y obtient la valeur la plus faible de la région chez les femmes. Le CLSC Samuel de Champlain qui ne se situe qu'au dixième rang pour sa proportion totale représente le plus gros contingent de bénévoles avec près de 14 300 personnes.

1. Proportion de personnes de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées selon le sexe et le temps consacré sur une période de une semaine, Montérégie, 1996



2. Proportion de personnes de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées selon le temps consacré sur une période de une semaine, CLSC, Montérégie et Québec, 1996



3. Proportion de personnes de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées selon le sexe et le temps consacré sur une période de une semaine, CLSC, Montérégie et Québec, 1996

CLSC	Hommes			Femmes			Total			
	Moins de 5 heures	5 heures et plus	Ayant consacré quelques heures	Moins de 5 heures	5 heures et plus	Ayant consacré quelques heures	Moins de 5 heures	5 heures et plus	Ayant consacré quelques heures	
	%	%	%	%	%	%	%	%	Nombre ¹	%
La Presqu'île	10,3	3,4	13,7	13,8	5,6	19,4	12,0	4,6	12 125	16,6
Huntingdon	10,4	4,6	15,0	13,7	6,4	20,1	12,1	5,3	2 990	17,4
Seigneurie de Beauharnois	11,3	3,6	14,9	14,8	7,0	21,8	13,1	5,4	8 085	18,5
Châteauguay	10,2	3,1	13,3	12,5	5,8	18,3	11,4	4,5	7 400	15,9
Jardin du Québec	12,0	2,3	14,3	14,5	5,9	20,4	13,1	4,1	3 060	17,2
Kateri	10,2	2,5	12,7	12,9	4,8	17,7	11,5	3,6	8 840	15,1
Samuel de Champlain	10,2	3,2	13,4	13,0	5,4	18,4	11,7	4,4	14 295	16,1
Longueuil- Ouest	8,2	3,4	11,6	11,4	4,9	16,3	9,9	4,2	7 750	14,1
Longueuil-Est	8,5	3,0	11,5	12,5	4,8	17,3	10,6	3,9	7 100	14,5
St-Hubert	8,7	3,1	11,8	11,7	5,0	16,7	10,2	4,1	8 490	14,3
des Seigneuries	9,9	2,4	12,3	13,6	4,9	18,5	11,8	3,7	11 335	15,5
Champagnat de la Vallée des Forts	10,4	2,8	13,2	13,0	5,9	18,9	11,8	4,4	12 120	16,2
La Vallée des Patriotes	10,1	2,7	12,8	13,2	5,3	18,5	11,6	4,1	11 235	15,7
du Richelieu	10,0	2,9	12,9	12,1	4,9	17,0	11,1	3,8	5 695	14,9
du Havre	11,0	3,5	14,5	14,3	6,4	20,7	12,7	5,1	7 655	17,8
des Maskoutains	10,4	3,2	13,6	13,2	6,7	19,9	11,8	5,1	10 470	16,9
La Pommerai	9,7	3,4	13,1	12,5	6,7	19,2	11,2	5,3	6 260	16,5
de la Haute-Yamaska	10,2	2,8	13,0	14,1	5,6	19,7	12,2	4,2	10 105	16,4
La Chênaie	9,7	2,6	12,3	13,5	4,5	18,0	11,5	3,5	1 750	15,0
MONTÉRÉGIE	10,0	3,0	13,0	13,1	5,6	18,7	11,6	4,3	156 760	15,9
ENSEMBLE DU QUÉBEC	10,0	3,3	13,3	13,0	6,1	19,1	11,5	4,7	921 220	16,2

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 62 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre de personnes de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées.


45. ⁽⁶⁴⁾ PROPORTION DES LOGEMENTS PRIVÉS NÉCESSITANT DES RÉPARATIONS MAJEURES

- En 1996, 7 % des **logements privés** occupés de la Montérégie **nécessitaient des réparations majeures** en comparaison avec 8 % pour l'ensemble du Québec, ce qui représente plus de 35 000 logements pour la région.
- Les proportions sont légèrement plus élevées pour les **logements possédés** que pour ceux **loués** (8 % c. 7 %).
- Entre les recensements de **1991 et de 1996**, on observe une légère augmentation de la proportion des logements nécessitant des réparations majeures.
- Les **territoires de CLSC** présentent de grandes différences en 1996 allant du simple dans le cas du CLSC des Seigneuries (5 %) à presque le triple dans celui de Huntingdon (14 %).


Les variations des proportions entre les deux recensements sont également d'ampleur différente selon le CLSC. Le CLSC Samuel de Champlain a vu sa valeur croître de 34 % tandis qu'à l'opposé, les logements situés sur le territoire du CLSC Kateri auraient vu la proportion de réparations majeures nécessaires chuter de 17 %.

Bien que les CLSC Vallée des Forts et Samuel de Champlain ne se situent respectivement qu'au 6^e et qu'au 10^e rang quant à leur proportion de logements à réparer, ces territoires comprennent chacun plus de 3 000 logements nécessitant des réparations majeures en 1996 ce qui constituent les nombres les plus élevés parmi l'ensemble des territoires de CLSC.


1. Proportion des logements privés occupés nécessitant des réparations majeures selon le mode d'occupation, Montérégie, 1991 et 1996



2. Répartition (%) des logements privés occupés selon l'état du logement, Montérégie, 1991 et 1996



3. Répartition (%) des logements privés occupés selon l'état du logement, CLSC, Montérégie et Québec, 1996



4. Proportion de logements privés occupés nécessitant des réparations majeures, CLSC, Montérégie et Québec, 1991 et 1996

CLSC	Total			
	1991	1996		Variation de 1991 à 1996
	%	Nombre ¹	%	%
La Presqu'île	7,8	2 655	7,6	-2,6
Huntingdon	13,3	1 155	13,7	3,0
Seigneurie de Beauharnois	9,0	2 170	9,7	7,8
Châteauguay	5,7	1 350	6,3	10,5
Jardin du Québec	10,1	840	10,1	0,0
Kateri	6,0	1 330	5,0	-16,7
Samuel-de-Champlain	5,6	3 095	7,5	33,9
Longueuil-Ouest	7,9	2 425	8,1	2,5
Longueuil-Est	5,2	1 440	5,8	11,5
Saint-Hubert	6,0	1 915	7,2	20,0
des Seigneuries	4,6	1 630	4,9	6,5
Champagnat de la Vallée de Forts	7,0	3 165	8,4	20,0
La Vallée des Patriotes	5,9	2 210	6,8	15,3
du Richelieu	7,6	1 360	7,4	-2,6
du Havre	8,7	1 700	8,0	-8,0
des Maskoutains	6,4	2 165	7,1	10,9
La Pommeraie	10,1	1 935	10,2	1,0
de la Haute-Yamaska	5,2	1 980	6,3	21,2
La Chênaie	8,4	525	9,3	10,7
MONTÉRÉGIE	6,9	35 055	7,4	7,2
ENSEMBLE DU QUÉBEC	8,0	230 945	8,2	2,5

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 64 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).


46. PROPORTION DE LA POPULATION INSATISFAITE DES SERVICES DE SANTÉ OFFERTS DANS LEUR RÉGION

- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec, un Montréalien de 15 ans et plus sur quatre, soit plus de 210 000 personnes se dit **peu ou pas du tout satisfait des services de santé offerts dans leur région**.
- Les **hommes** présentent une proportion légèrement supérieure à celle des femmes sans être significativement différente (26 % c. 23 %).
- Parmi les **groupes d'âge**, ce sont les 25-44 ans et les 45-64 ans qui présentent des proportions plus élevées que celles estimées chez les 15-24 ans. Les personnes de 65 ans et plus se disant insatisfaites dans la même proportion que les 15-24 ans.
- Au printemps 2000, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, les **territoires de CLSC** se distinguent quant à leur proportion d'insatisfaits relativement aux services de santé dans leur région. Deux CLSC affichent des proportions significativement plus élevées que celle de la région estimée à 20 %, soit La Chênaie avec 38 % et La Presqu'Île avec 26 %.


À l'opposé, par ordre décroissant, les territoires des CLSC des Maskoutains (16 %), Longueuil-Est (16 %), de la Haute-Yamaska (15 %), Huntingdon (15 %) et La Pommerai (10 %) affichent les valeurs les plus faibles.

Les CLSC La Presqu'Île, au second rang quant à la prévalence de l'insatisfaction, et Samuel de Champlain, au 7^e rang, comptent chacun plus de 17 500 personnes insatisfaites des services.


1. Proportion de la population de 15 ans et plus étant peu ou pas du tout satisfaite des services de santé offerts dans leur région selon le sexe, Montérégie, 1998



2. Répartition de la population de 15 ans et plus étant peu ou pas du tout satisfaite des services de santé offerts dans leur région selon l'âge, Montérégie, 1998



3. Proportion de la population de 15 ans et plus étant peu ou pas du tout satisfaite des services de santé offerts dans leur région, CLSC, Montérégie, printemps 2000



4. Répartition de la population de 15 ans et plus selon la satisfaction des services de santé offerts dans leur région, CLSC, Montérégie, printemps 2000

	Très satisfait	Assez satisfait	Peu ou pas du tout satisfait	
	%	%	Nombre ¹	%
La Presqu'île	25,3 (-)	48,5	17 763	26,1 (>>)
Huntingdon	42,5 (>)	43,0	2 358	14,5
Seigneurie de Beauharnois	30,4	48,9	8 699	20,8
Châteauguay	33,2	50,6	6 995	16,1
Jardin du Québec	30,4	47,6	3 647	22,0
Kateri	33,4	47,4	10 455	19,2
Samuel-de-Champlain	29,3	48,9	17 689	21,8
Longueuil-Ouest	22,8 (<)	53,9	11 988	23,3
Longueuil-Est	32,8	51,5	7 299	15,7 (-)
Saint-Hubert	29,1	49,0	12 160	21,8
des Seigneuries	28,8	51,4	13 630	19,8
Champagnat de la Vallée de Forts	27,7	48,8	16 527	23,4
La Vallée des Patriotes	25,4 (-)	52,3	15 040	22,4
du Richelieu	28,1	51,9	7 052	* 20,0
du Havre	25,2	54,6	8 282	20,2
des Maskoutains	34,7	49,6	9 490	15,7 (-)
La Pommeraie	48,9	41,4 (<)	3 516	* 9,7 (<<)
de la Haute-Yamaska	32,9	52,3	9 179	14,8 (<)
La Chênaie	27,9	34,4 (<)	4 331	37,7 (>>)
MONTÉRÉGIE	30,2	49,7	186 099	20,1

Notes

Cet indicateur mesure la proportion de personnes de 15 ans et plus qui, de façon générale, se dit insatisfaite des services de santé offerts dans la région par rapport à la population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés.

L'information provient d'un questionnaire autoadministré et répondu par les personnes de 15 ans et plus des ménages pour les données originant de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec de 1998 et de la même question posée au répondant de 15 ans et plus choisi au hasard dans le ménage lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM du printemps 2000.

La question est : « De façon générale, diriez-vous que vous êtes... satisfait(e) des services de santé offerts dans votre région : très, assez, peu, pas du tout? »

1. Population estimée de 15 ans et plus se disant peu ou pas du tout satisfaite des services de santé offerts dans la région du répondant.

>>, > Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05.

<<, < (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

* Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

47. TAUX DE MORTALITÉ ÉVITABLE PAR LA PRÉVENTION ET PROMOTION

- Pour la période de 1996-1998, le taux de mortalité évitable par la prévention et la promotion est de 135 pour 100 000 Montérégiens. Ce taux est en baisse presque constante depuis la période 1981-1983 pour un gain total de près de 20 % sur ce type de mortalité.
- Pour les trois périodes de cinq ans entre 1984-1988 et 1994-1998, ce sont les **causes** comme les cancers du poumon, de la trachée et des bronches ainsi que les cardiopathies ischémiques qui, avec des parts combinées selon la période variant entre 59 % et 63 % de l'ensemble des causes, occupent ensemble le premier rang.


Une réduction de plus de 40 % de la mortalité évitable pour les catégories de traumatismes retenues a contribué indirectement à cette augmentation du poids des deux causes précédentes dans l'ensemble de la mortalité évitable.

À l'intérieur des deux causes principales, les cancers du poumon, de la trachée et des bronches ont crû de 20 % et occupent maintenant le premier rang au niveau du taux devant les maladies ischémiques qui elles ont diminué de 34 % entre les mêmes périodes de 1984-1988 et 1994-1998.

- Pour la période de 1994-1998, les taux et écarts par rapport à la région au chapitre de la mortalité évitable par la prévention varient selon les **territoires de CLSC** allant du simple (des Seigneuries avec un taux de 92 correspondant à un déficit de 31 % par rapport à la région), au double (du Havre avec un taux de 195 correspondant à un excédent de 45 %).

Les variations de taux présentent également des profils différents par CLSC. Seize des dix-sept CLSC concernés présentent une réduction de taux, mais l'ampleur de cette dernière oscille entre 31 % pour le CLSC La Presqu'île et 8 % pour les CLSC Châteauguay et du Havre. À l'opposé, le CLSC La Chênaie a vu son taux croître de 32 %.


1. Taux de mortalité évitable par la prévention et la promotion, population 0-74 ans, Montérégie, 1981-1983 à 1996-1998



2. Taux de mortalité évitable par la prévention et promotion selon la cause des décès, population 0-74 ans, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

Cause de décès évitable	Nombre annuel moyen				Taux annuel moyen			
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	Variation de 1984-1988 à 1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	Nombre	Nombre	Nombre	%	Taux	Taux	Taux	%
Tumeurs								
Lèvres et cavité buccale	13	14	14	9	1,2	1,1	1,1	-3
Larynx	18	17	24	30	1,7	1,4	1,9	15
Trachée, bronches, poumon	389	483	528	36	35,5	40,5	42,7	20
Plèvre	6	8	9	47	0,5	0,7	0,7	30
Peau (sauf mélanome)	3	3	5	100	0,2	0,3	0,4	77
Vessie	20	22	22	8	1,8	1,8	1,8	-4
Leucémie myéloïde chronique	5	7	7	31	0,5	0,6	0,5	16
Maladies cardiovasculaires								
Cardiopathies ischémiques	672	546	504	-25	61,4	45,8	40,8	-34
Maladies vasculaires cérébrales	160	144	145	-9	14,6	12,1	11,7	-20
Maladies respiratoires								
Obstruction chronique des voies respiratoires	74	88	96	29	6,8	7,3	7,7	14
Emphysème	27	32	28	1	2,5	2,7	2,2	-10
Traumatismes								
Impliquant des véhicules à moteur	187	169	108	-42	17,1	14,2	8,7	-49
Autres formes de traumatismes	125	106	94	-25	11,4	8,9	7,6	-34
Autres causes								
Cirrhose alcoolique du foie	26	21	27	2	2,4	1,8	2,2	-10
Mortalité infantile	44	40	25	-45	4,1	3,3	2,0	-51
Autres causes non spécifiques	18	23	21	14	1,7	1,9	1,7	1
ENSEMBLE DES CAUSES	1789	1720	1654	-8	163,3	144,3	133,8	-18

3. Indice comparatif de mortalité évitable par la prévention et la promotion, population 0-74 ans, CLSC, Montérégie, 1994-1998



4. Taux de mortalité évitable par la prévention et la promotion, population 0-74 ans, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

CLSC	Nombre annuel moyen			Variation de 1984-1988 à 1994-1998	Taux annuel moyen			Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	1984-1988	1989-1993	1994-1998		1984-1988	1989-1993	1994-1998	
	Nombre	Nombre	Nombre		Taux	Taux	Taux	
La Presqu'île	120	115	112	-7	171,7	136,7	119,1	-31
Huntingdon	54	40	43	-21	239,8 (+)	174,2	182,2	-24
Seigneurie de Beauharnois	106	101	92	-13	202,3	189,8 (+)	175,4	-13
Châteauguay	98	94	100	2	163,2	149,7	149,9	-8
Jardin du Québec	37	39	32	-13	* 181,4	182,8	* 142,8	-21
Kateri	66	70	82	26	130,2	104,5 (-)	107,4	-18
Samuel-de-Champlain	139	137	125	-10	135,9	127,2	118,2	-13
Longueuil-Ouest	121	119	87	-28	168,0	173,8	136,7	s.o.
Longueuil-Est	83	81	102	23	153,2	134,5	166,3	s.o.
Saint-Hubert	94	89	91	-4	140,0	119,4	118,5	-15
des Seigneuries	81	84	88	8	111,1 (-)	97,2 (-)	92,3 (-)	-17
Champagnat de la Vallée de Forts	155	154	139	-10	193,4	170,6	148,2	-23
La Vallée des Patriotes	89	90	91	2	112,4 (-)	103,6 (-)	100,3 (-)	-11
du Richelieu	67	59	58	-13	164,8	132,9	117,0	-29
du Havre	113	110	98	-13	211,6 (+)	208,5 (+)	194,6 (+)	-8
des Maskoutains	129	110	106	-18	194,6	147,8	140,0	-28
La Pommerai	98	87	83	-16	214,6 (+)	186,2	176,5	-18
de la Haute-Yamaska	116	118	103	-11	173,7	157,3	132,8	-24
La Chênaie	24	25	24	3	* 123,4	* 173,2	* 163,1	32
MONTÉRÉGIE	1789	1720	1654	-8	163,3	144,3	133,8	-18

Notes

Cet indicateur mesure les décès qui auraient pu être évités grâce à l'application de mesures appropriées de prévention ou de promotion de la santé.

(+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

(-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

* Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

s.o. Sans objet, pour la période 1984-1988 l'attribution des décès au CLSC de Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.

48. ⁽⁶⁵⁾ PROPORTION DE LA POPULATION SE PERCEVANT EN MOYENNE OU EN MAUVAISE SANTÉ

- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec, 9 % des personnes de 15 ans et plus de la Montérégie, soit près de 87 000 personnes **percevaient leur état de santé comme étant « moyenne ou mauvaise »**. La proportion de 11 %, enregistrée pour le Québec, est significativement supérieure à celle de la région.
- Cette proportion est en baisse lente mais constante au cours des trois enquêtes menées entre **1987 et 1998**.
- La proportion s'avère légèrement plus élevée chez les **femmes** en comparaison de celle des hommes.


Ce rapprochement des valeurs en 1998 entre les sexes est le résultat d'évolutions différentes selon le sexe, les femmes ayant amélioré leur profil plus désavantagé au départ en 1987 de façon plus marquée que ce ne fut le cas chez les hommes.

- L'examen des valeurs au niveau des **groupes d'âge** montre qu'à partir des 45-64 ans les pourcentages augmentent considérablement passant de 5 % (15-24 ans) et 6 % (25-44 ans) à 10 % (45-64 ans) puis à 21 % (65 ans et plus). L'amélioration de la situation, telle qu'indiquée par la baisse des pourcentages entre les enquêtes, est cependant beaucoup plus prononcée pour les groupes plus âgés de 45-64 ans et 65 ans et plus.
- Au printemps 2000, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, les **territoires de CLSC** présentent des variations marquées bien que seuls deux d'entre eux se démarquent de la valeur régionale au plan statistique : ce sont, aux extrêmes, le CLSC Longueuil-Ouest affichant une proportion de plus du double de celle estimée pour le CLSC des Seigneuries (21 % c. 9 %).


Le CLSC des Seigneuries se distingue des autres en présentant des proportions significativement supérieures de personnes déclarant avoir une « excellente ou très bonne » santé.

Bien que figurant respectivement au 5^e et au 15^e rang quant à leur proportion, les CLSC Vallée des Forts et Samuel de Champlain comptent plus de 11 000 personnes déclarant avoir une « moyenne ou mauvaise » santé, rejoins en cela par le CLSC Longueuil-Ouest qui lui occupe le premier rang.


1. Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en moyenne ou en mauvaise santé selon le sexe, Montérégie, 1987, 1992-1993 et 1998



2. Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en moyenne ou en mauvaise santé selon l'âge, Montérégie, 1987, 1992-1993 et 1998



3. Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en moyenne ou en mauvaise santé, CLSC, Montérégie, printemps 2000



4. Répartition de la population de 15 ans et plus selon la perception de l'état de santé, CLSC, Montérégie, printemps 2000

	Excellente	Très bonne	Bonne	Moyenne	Mauvaise	Moyenne ou mauvaise	
	%	%	%	%	%	Nombre ¹	%
La Presqu'île	26,7	33,9	27,8	10,1	1,5	8 545	11,6
Huntingdon	21,8	30,1	32,8	11,4	3,9	2 650	15,3
Seigneurie de Beauharnois	29,3	24,1 (<)	33,8	11,2	1,7	5 711	12,9
Châteauguay	21,9	33,2	30,9	10,0	4,0	6 546	14,0
Jardin du Québec	24,1	29,6	28,1	16,5	1,7	3 230	18,2
Kateri	24,3	31,4	29,7	11,4	3,2	8 537	14,6
Samuel-de-Champlain	24,1	29,4	33,5	11,2	1,8	11 692	13,0
Longueuil-Ouest	21,2	32,0	26,3	17,4 (>>)	3,1	11 291	20,5 (>>)
Longueuil-Est	24,0	36,2	29,0	9,3	1,5	5 386	10,8
Saint-Hubert	22,7	36,7	27,3	10,8	2,6	7 973	13,4
des Seigneuries	28,2 (+)	36,7 (+)	25,7	8,8	0,6 (<)	6 953	9,4 (<)
Champagnat de la Vallée de Forts	23,3	30,8	30,3	11,5	4,0 (+)	11 784	15,5
La Vallée des Patriotes	23,0	38,6 (>)	25,2 (-)	11,3	1,8	9 463	13,1
du Richelieu	26,8	27,5	31,4	11,1	3,2	5 537	14,3
du Havre	21,0	29,4	34,5	12,2	2,9	6 594	15,1
des Maskoutains	23,8	29,8	29,7	12,9	3,8	10 479	16,7
La Pommeraie	21,7	26,5	37,2 (>)	12,3	2,4	5 721	14,7
de la Haute-Yamaska	24,5	33,3	27,3	13,2	1,8	9 376	15,0
La Chênaie	20,0	29,7	34,7	11,6	4,1	1 871	15,7
MONTÉRÉGIE	24,1	32,1	29,7	11,6	2,4	139 340	14,0

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 65 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Population estimée de personnes de 15 ans et plus se percevant en moyenne ou en mauvaise santé.


>>, >, (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .01, .05, .10.

<, (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .05, .10.


49. ⁽⁶⁹⁾ PROPORTION DE LA POPULATION INSATISFAITE DE SA VIE SOCIALE

- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec, 13 % soit plus de 128 000 Montérégiens de 15 ans et plus disaient **ne pas être satisfaits quant à leur vie sociale**. Cette proportion est presque équivalente à celle estimée pour le Québec.
- L'augmentation est significative au plan statistique par rapport à chacune des deux autres enquêtes de **1987 et 1992-1993**.
- Les **femmes** sont légèrement plus nombreuses à évaluer leur vie sociale comme insatisfaisante.
- Les différences ne sont pas significatives entre les **groupes d'âge**, bien que les personnes de 65 ans et plus affichent une valeur moindre que les autres groupes.
- Depuis 1992-1993, tous les groupes d'âge ont affiché une augmentation, mais d'ampleur différente.
- Au printemps 2000, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, les **territoires de CLSC** présentent une variabilité allant du simple (La Vallée des Patriotes, à 4 %) à plus du double (Longueuil-Ouest à 9 %) sans pour autant dénoter de différences significatives au plan statistique. Parmi la catégorie « très satisfait », le CLSC Huntingdon obtient la valeur la plus élevée avec 59 % et à l'opposé le CLSC Saint-Hubert avec 35 % seulement, occupe le dernier rang à ce chapitre. Le CLSC Samuel de Champlain, qui occupe le second rang, en termes de personnes insatisfaites, compte en fait le contingent le plus important de personnes insatisfaites de leur vie sociale soit plus de 7 000 personnes.


1. Proportion de la population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale selon le sexe, Montérégie, 1987, 1992-1993 et 1998



2. Répartition de la population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale selon l'âge, Montérégie, 1987, 1992-1993 et 1998



3. Proportion de la population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale, CLSC, Montérégie, printemps 2000



4. Répartition de la population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale, CLSC, Montérégie, printemps 2000

CLSC	Très satisfait	Plutôt satisfait	Très ou plutôt insatisfait	
	%	%	Nombre ¹	%
La Presqu'île	46,3	46,8	5 048	* 6,9
Huntingdon	59,0	35,2	993	* 5,8
Seigneurie de Beauharnois	47,3	47,4	2 355	* 5,3
Châteauguay	47,0	46,0	3 260	* 7,0
Jardin du Québec	47,6	47,4	891	* 5,0
Kateri	49,2	44,6	3 546	* 6,1
Samuel-de-Champlain	44,3	47,8	7 094	* 7,9
Longueuil-Ouest	37,9	52,9	5 006	* 9,2
Longueuil-Est	46,7	48,7	2 307	* 4,7
Saint-Hubert	35,4	58,9	3 349	* 5,6
des Seigneuries	50,7	44,7	3 325	* 4,5
Champagnat de la Vallée de Forts	45,7	48,4	4 419	* 5,9
La Vallée des Patriotes	43,7	52,7	2 617	* 3,7
du Richelieu	55,3	39,9	1 861	** 4,8
du Havre	46,6	48,1	2 290	* 5,3
des Maskoutains	43,3	50,4	3 967	* 6,3
La Pommeraie	43,0	52,6	1 710	* 4,4
de la Haute-Yamaska	50,7	45,4	2 440	* 3,9
La Chênaie	45,8	47,3	823	* 6,9
MONTÉRÉGIE	46,0	48,2	57 300	5,8

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 69 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Population estimée de personnes de 15 ans et plus insatisfaites de leur vie sociale.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

50.⁽⁷²⁾ TAUX D'HOSPITALISATION EN SOINS PHYSIQUES DE COURTE DURÉE SELON LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL

- Pour l'année 1998-1999, le taux ajusté des quelques 110 000 hospitalisations en soins physiques de courte durée en Montérégie est de 828 pour 10 000 personnes, soit 929 pour les femmes et 747 pour les hommes.

Pour 1995-1999, parmi les diagnostics retenus, les **maladies de l'appareil circulatoire et celles de l'appareil digestif** arrivent respectivement au 1^{er} rang et au second rang.

- Entre l'année 1989-1990 et 1998-1999, le taux a oscillé tantôt à la hausse, avant la transformation du réseau (1994-1995), tantôt à la baisse.


Au total, lorsqu'on compare les taux pour la période avant la transformation (1991-1995) avec ceux calculés pour la période après la transformation (1995-1999) on obtient une baisse de 9 %.

- Tous les **diagnostics médicaux** ne connaissent pas la même évolution entre ces deux périodes. Le taux des hospitalisations pour « organes génito-urinaires » a chuté de 22 %, tandis qu'à l'opposé celui pour « l'appareil respiratoire » s'est accru de 3 %. Des différences ressortent également quant à l'évolution entre les deux sexes, les femmes diminuant davantage que les hommes leur taux d'hospitalisation (10 % c. 7 %).
- Pour la période 1995-1999, les **territoires officiels de CLSC** divergent quant au taux d'hospitalisations, oscillant entre des excédents par rapport au taux régional de 17 % dans le cas de Châteauguay, Seigneurie de Beauharnois et La Chênaie et un déficit de plus de 20 % dans le cas du CLSC Samuel de Champlain.

Tous les territoires affichent une diminution des taux entre la période pré et post-transformation mais à des degrés divers. Ils oscillent entre moins 19 % pour le CLSC de la Haute-Yamaska et moins 3 % pour le CLSC Huntingdon et Longueuil-Est.

Le CLSC Vallée des Forts, bien qu'il occupe le 4^e rang en termes de taux pour 1995-1999, compte le plus grand nombre d'hospitalisations, soit près de 10 300.


1. Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée selon le sexe, Montérégie, 1989-1990 à 1998-1999



2. Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée selon le sexe et le diagnostic principal, Montérégie, 1991-1995 et 1995-1999 (Taux annuel moyen pour 10 000)

Causes retenues	Hommes				Femmes				Total			
	1991-1995		1995-1999		1991-1995		1995-1999		1991-1995		1995-1999	
	Taux	Nombre ¹	Taux	Variation de 1991-1995 ² à 1995-1999 ³	Taux	Nombre ¹	Taux	Variation de 1991-1995 ² à 1995-1999 ³	Taux	Nombre ¹	Taux	Variation de 1991-1995 ² à 1995-1999 ³
Tumeurs	82	4 176	70	-15	85	5 405	78	-8	81	9 581	73	-10
Appareil circulatoire	176	10 505	177	1	105	7 550	101	-4	138	18 055	136	-1
Appareil respiratoire	102	6 093	104	2	76	5 451	79	4	87	11 543	89	3
Appareil digestif	128	6 567	107	-16	110	6 760	99	-10	118	13 326	102	-13
Organes génito-urinaires	54	2 594	43	-21	108	5 521	83	-22	80	8 114	62	-22
Lésions traumatiques et empoisonnement	84	4 788	76	-9	50	3 534	50	0	68	8 322	64	-6
ENSEMBLE DES CAUSES	819	45 858	759	-7	1070	65 131	968	-10	935	110 989	853	-9


3. Indice comparatif d'hospitalisation en soins physiques de courte durée sexes réunis, CLSC, Montérégie, 1995-1999



4. Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée selon le diagnostic principal, sexes réunis, CLSC officiels, Montérégie, 1991-1995 et 1995-1999 (Taux annuel moyen pour 10 000)

CLSC officiels	1991-1995 ²	1995-1999 ³							Variation de 1991-1995 à 1995-1999	
	Ensemble des diagnostics	Tumeurs	Appareil circulatoire	Appareil respiratoire	Appareil digestif	Organes génito-urinaires	Lésions traumatiques et empoisonnement	Ensemble des diagnostics		
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Nombre ¹ Taux		%
La Presqu'île	854	71	120	73	88	58	51	7 401	771	-10
Huntingdon	900	80	149	93	97	72	71	2 321	869	-3
Seigneurie de Beauharnois	1 057	82	181	137	128	95	68	6 619	999	-5
Châteauguay	1 062	70	158	91	106	61	53	5 842	1 002	-6
Jardin du Québec	957	68	147	104	104	59	77	2 191	905	-5
Kateri	896	75	146	81	103	55	60	6 030	813	-9
Samuel-de-Champlain	777	69	98	60	76	46	57	7 734	674	-13
Longueuil-Ouest	907	76	129	90	102	64	68	6 224	848	-6
Longueuil-Est	912	77	137	100	101	62	59	5 466	884	-3
Saint-Hubert	918	73	128	83	92	56	66	5 687	807	-12
des Seigneuries	818	71	122	70	85	54	53	6 626	749	-8
Champagnat de la Vallée de Forts	1 046	66	158	122	122	72	80	10 287	994	-5
La Vallée des Patriotes	834	91	152	92	110	68	77	8 533	778	-7
du Richelieu	977	46	101	58	73	46	47	2 940	883	-10
du Havre	1 026	70	152	112	127	64	66	5 480	956	-7
des Maskoutains	994	80	129	121	127	81	68	8 116	948	-5
La Pommeraie	915	66	124	82	89	51	73	4 313	837	-9
de la Haute-Yamaska	1 154	72	156	85	121	69	70	7 582	932	-19
La Chênaie	1 042	80	155	119	125	79	94	1 599	997	-4
MONTÉRÉGIE	935	72	135	89	101	62	64	110 989	853	-9


5. Indice comparatif d'hospitalisations en soins physiques de courte durée chez les hommes, CLSC officiels, Montérégie, 1995-1999



6. Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée selon le diagnostic principal chez les hommes, CLSC officiels, Montérégie, 1991-1995 et 1995-1999 (Taux annuel moyen pour 10 000)

CLSC officiels	1991-1995 ²	1995-1999 ³							Variation de 1991-1995 à 1995-1999	
	Ensemble des diagnostics	Tumeurs	Appareil circulatoire	Appareil respiratoire	Appareil digestif	Organes génito-urinaires	Lésions traumatiques et empoisonnement	Ensemble des diagnostics		
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Nombre ¹	Taux	%
La Presqu'île	709	70	140	87	88	34	62	2 871	645	-9
Huntingdon	769	65	182	107	98	40	87	1 016	760	-1
Seigneurie de Beauharnois	951	77	179	144	123	46	80	2 786	903	-5
Châteauguay	913	75	184	113	119	43	72	2 382	859	-6
Jardin du Québec	842	64	169	111	108	32	93	927	785	-7
Kateri	763	69	160	86	98	38	70	2 289	694	-9
Samuel-de-Champlain	655	62	103	70	81	64	63	3 058	579	-12
Longueuil-Ouest	793	72	128	104	103	44	81	2 501	756	-5
Longueuil-Est	800	79	138	116	116	43	71	2 102	808	1
Saint-Hubert	813	73	134	100	96	37	77	2 211	704	-13
des Seigneuries	707	66	135	82	87	38	59	2 583	646	-9
Champagnat de la Vallée de Forts	917	61	174	142	119	51	94	4 472	908	-1
La Vallée des Patriotes	727	67	131	89	99	42	73	3 498	689	-5
du Richelieu	860	64	169	104	118	49	88	1 320	806	-6
du Havre	1002	70	173	137	131	48	82	2 562	937	-7
des Maskoutains	925	78	132	140	139	57	85	3 400	875	-5
La Pommeraie	791	69	150	101	100	44	92	1 914	756	-4
de la Haute-Yamaska	1026	75	174	105	132	50	88	3 233	859	-16
La Chênaie	955	74	176	148	142	60	114	733	905	-5
MONTÉRÉGIE	819	69	175	104	105	42	76	45 858	759	-7

7. Indice comparatif d'hospitalisations en soins physiques de courte durée chez les femmes, CLSC officiels, Montérégie, 1995-1999



8. Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée selon le diagnostic principal chez les femmes, CLSC officiels, Montérégie, 1991-1995 et 1995-1999 (Taux annuel moyen pour 10 000)

CLSC officiels	1991-1995 ²	1995-1999 ³							Variation de 1991-1995 à 1995-1999	
	Ensemble des diagnostics	Tumeurs	Appareil circulatoire	Appareil respiratoire	Appareil digestif	Organes génito-urinaires	Lésions traumatiques et empoisonnement	Ensemble des diagnostics		
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Nombre ¹ Taux	%	
La Presqu'île	1 012	76	85	62	89	84	38	4 530 914	-10	
Huntingdon	1 057	98	109	80	98	108	52	1 305 1 001	-5	
Seigneurie de Beauharnois	1 192	81	127	116	115	131	43	3 833 1 127	-5	
Châteauguay	1 221	84	140	94	124	96	49	3 460 1 153	-6	
Jardin du Québec	1 100	73	112	98	101	90	59	1 264 1 050	-5	
Kateri	1 041	77	106	71	100	69	44	3 741 939	-10	
Samuel-de-Champlain	909	76	68	53	72	57	49	4 676 782	-14	
Longueuil-Ouest	1 044	83	101	77	101	84	55	3 723 961	-8	
Longueuil-Est	1 056	79	103	97	93	82	48	3 364 1 006	-5	
Saint-Hubert	1 063	77	98	74	88	75	55	3 475 926	-13	
des Seigneuries	943	78	88	63	83	71	44	4 043 863	-8	
Champagnat de la Vallée de Forts	1 197	70	114	105	122	92	63	5 815 1 099	-8	
La Vallée des Patriotes	951	81	90	61	79	69	47	5 034 881	-7	
du Richelieu	1 104	72	113	72	101	91	53	1 620 974	-12	
du Havre	1 075	73	107	89	125	81	48	2 918 999	-7	
des Maskoutains	1 098	85	96	107	117	107	50	4 716 1 055	-4	
La Pommeraie	1 069	76	100	78	95	69	64	2 399 949	-11	
de la Haute-Yamaska	1 313	77	117	76	120	97	54	4 349 1 038	-21	
La Chênaie	1 137	91	128	95	108	103	72	866 1 109	-2	
MONTÉRÉGIE	1 070	78	100	78	98	83	50	65 131 968	-10	

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 72 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre annuel moyen d'hospitalisations.
2. Correspond aux années précédant la transformation du réseau.
3. Correspond aux années suivant la transformation du réseau.


51.⁽⁷³⁾ TAUX D'HOSPITALISATION POUR TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS

- Pour l'année **1998-1999**, le taux ajusté pour les quelques 7 000 **hospitalisations pour traumatismes non intentionnels** est de 58 pour 10 000 Montérégiens, soit 46 chez les femmes et 69 chez les **hommes**.
- Ce taux est **en baisse** de façon irrégulière depuis 1989-1990, ceci grâce presque exclusivement à la diminution observée chez les hommes, le taux des femmes étant plus ou moins stable depuis 1989-1990.

Entre la période 1991-1995, prétransformation du réseau et 1995-1999 post-transformation, le taux global montréalais a diminué de 6 % exclusivement à cause de la réduction de 10 % enregistrée chez les hommes.

- Pour 1995-1999, les **catégories de traumatismes** ne présentent pas la même importance au niveau des hospitalisations. Les chutes accidentelles avec un taux de 25 pour 10 000 représentent à elles seules plus de 40 % du taux total. Les taux n'ont également pas évolué de la même façon entre les deux périodes précitées. Le taux pour les traumatismes pour les occupants de véhicules à moteur a baissé de 13 % tandis qu'à l'opposé, celui pour les intoxications accidentelles a grimpé de 32 %.
- Pour la période 1995-1999, les taux mesurés pour les divers **territoires officiels de CLSC** diffèrent grandement oscillant entre un excédent de 50 % pour le CLSC La Chênaie et un déficit de plus de 15 % pour les CLSC La Presqu'île et des Seigneuries.


1. Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée pour traumatismes non intentionnels selon le sexe, Montérégie, 1989-1990 à 1998-1999



2. Taux ajusté d'hospitalisation en soins physiques de courte durée pour traumatismes non intentionnels selon le sexe et la catégorie de traumatismes, Montérégie, 1991-1995 et 1995-1999 (Taux annuel moyen pour 10 000)

Certains traumatismes non intentionnels	Hommes				Femmes				Total			
	1991-1995 ²		1995-1999 ³		1991-1995 ²		1995-1999 ³		1991-1995 ²		1995-1999 ³	
	Taux	Nombre ¹	Taux	Variation de 1991-1995 ² à 1995-1999 ³	Taux	Nombre ¹	Taux	Variation de 1991-1995 ² à 1995-1999 ³	Taux	Nombre ¹	Taux	Variation de 1991-1995 ² à 1995-1999 ³
Occupants de véhicules à moteur	7,2	391	6,1	-15	4,8	284	4,3	-9	6,0	675	5,2	-13
Cyclistes	2,3	140	2,2	-7	1,3	70	1,1	-16	1,8	210	1,6	-11
Intoxications accidentelles	0,9	79	1,3	37	0,8	63	1,0	26	0,8	142	1,1	32
Chutes accidentelles	23,3	1498	24,9	7	22,6	1762	23,5	4	23,6	3260	24,8	5
Incendies et brûlures	1,0	62	1,0	2	0,4	27	0,4	11	0,7	88	0,7	5
ENSEMBLE DES TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS	80,3	4530	72,3	-10	47,2	3343	47,2	0	64,4	7872	60,4	-6

3. Indice comparatif d'hospitalisations en soins physiques de courte durée pour traumatismes non intentionnels, CLSC officiels, Montérégie, 1995-1999



4. Taux ajusté d'hospitalisations en soins physiques de courte durée pour traumatismes non intentionnels selon la catégorie de traumatismes, CLSC officiels, Montérégie, 1991-1995 et 1995-1999 (Taux annuel moyen pour 10 000)

CLSC officiels	1991-1995 ²		1995-1999 ³									Variation de 1991-1995 ² à 1995-1999 ³	
	Ensemble des traumatismes non intentionnels		Occupants de véhicules à moteur			Chutes accidentelles			Ensemble des traumatismes non intentionnels				
	Taux	ICM	Nombre ¹	Taux	ICM	Nombre ¹	Taux	ICM	Nombre ¹	Taux	ICM	%	
La Presqu'île	58,2	90	37	3,9	75	205	21,4	86	478	49,3 (-)	82	-15	
Huntingdon	65,2	101	26	* 10,5 (+)	202	83	27,7	112	181	67,8	112	4	
Seigneurie de Beauharnois	67,1	104	30	* 4,8	93	187	27,2	110	393	61,3	102	-9	
Châteauguay	66,8	104	28	* 4,9	94	161	28,0	113	347	59,4	98	-11	
Jardin du Québec	79,4 (+)	123	29	* 12,5 (+)	241	62	25,0	101	174	72,7 (+)	120	-8	
Kateri	65,0	101	30	* 3,6	70	142	21,3	86	406	54,8	91	-16	
Samuel-de-Champlain	53,5 (-)	83	29	* 2,5 (-)	48	281	23,0	93	625	52,9 (-)	88	-1	
Longueuil-Ouest	64,6	100	25	* 3,5	67	176	24,4	99	434	62,1	103	-4	
Longueuil-Est	61,4	95	15	* 2,4 (-)	45	148	24,7	100	341	55,1	91	-10	
Saint-Hubert	67,6	105	19	* 2,3 (-)	45	156	23,7	96	446	63,1	104	-7	
des Seigneuries	55,1 (-)	86	37	* 3,7	72	202	23,8	96	462	50,3 (-)	83	-9	
Ch. de la Vallée de Forts	62,2	97	71	7,1	137	269	25,3	102	728	71,1 (+)	118	14	
La Vallée des Patriotes	59,4	92	62	5,3	101	266	24,9	101	659	58,8	97	-1	
du Richelieu	75,1	117	26	* 7,6	146	81	23,9	96	229	67,5	112	-10	
du Havre	67,1	104	33	* 6,3	121	147	24,7	100	322	58,8	97	-12	
des Maskoutains	66,8	104	56	6,8	131	241	25,3	102	567	65,6	109	-2	
La Pommeraie	73,0	113	42	9,1 (+)	175	155	26,2	106	378	72,9 (+)	121	0	
de la Haute-Yamaska	87,6 (+)	136	60	7,5 (+)	145	247	29,6 (+)	119	561	69,3 (+)	115	-21	
La Chênaie	84,3 (+)	131	23	* 14,5 (+)	279	54	32,1	130	145	90,5 (+)	150	7	
MONTÉRÉGIE	64,4	100	675	5,2	100	3260	24,8	100	7872	60,4	100	-6	

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 73 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).


1. Nombre annuel moyen d'hospitalisations pour traumatismes non intentionnels.
 2. Correspond aux années pré-cédant la transformation du réseau.
 3. Correspond aux années suivant la transformation du réseau.
- (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
 (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
 * Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

52. ⁽⁷⁴⁾ TAUX D'INCIDENCE DU CANCER

- Pour la période **1996-1998**, les quelques 4 500 nouveaux cas de tumeurs malignes en Montérégie correspondent à un **taux d'incidence du cancer** de 373 par 100 000 personnes, soit 340 pour les **femmes** et 429 pour les **hommes**, en légère diminution par rapport à la période 1984-1986 où le taux était de 382 pour les deux sexes réunis.
- Pour la période de 1994-1998, au niveau du total des sexes, les taux diffèrent grandement selon le **siège de cancer** parmi ceux retenus pour l'étude; de 66 pour le poumon à 8 pour l'estomac. Chez les hommes et chez les femmes, les cancers de l'estomac et du pancréas occupent *ex æquo* la dernière position.
- Les **variations entre 1984-1988 et 1994-1998** diffèrent également entre les sièges : le cancer de l'estomac ayant diminué de 32 % contre une augmentation de 9 % pour le cancer de la prostate.
- Pour la période 1994-1998 sur la base d'un nombre annuel moyen de 4 909 nouveaux cas de cancer, les **territoires de CLSC** présentent certaines différences allant d'un excédent par rapport à la région de 11 % pour le CLSC du Havre à un déficit de près de 10 % pour le CLSC La Pommeraiie, aucun territoire n'étant significativement différent de la région pour l'ensemble des sièges.
- Au niveau des sièges particuliers de cancer, plusieurs variations aléatoires s'observent entre les territoires de CLSC mais seules deux différences significatives ressortent, soit Kateri avec un excédent de 39 % pour le cancer du poumon et du Havre avec un excédent de 67 % pour le cancer de la prostate.

De plus, le CLSC Kateri présente les excédents les plus élevés pour trois des sept sièges considérés, soit l'estomac, le côlon-rectum et le poumon. À l'opposé, le CLSC des Maskoutains affiche les trois valeurs les plus faibles de l'indice comparatif pour l'estomac, le poumon et la vessie.


1. Taux ajusté d'incidence du cancer selon le sexe, Montérégie, 1984-1986 à 1996-1998



2. Taux ajusté d'incidence du cancer selon le siège et le sexe, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

Siège de cancer	Hommes			Femmes			Total			Variation de 1984-1988 à 1994-1998 %
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	
Estomac	18	13	12	8	7	5	12	9	8	-32
Côlon-rectum	64	60	64	48	42	42	54	50	51	-5
Pancréas	13	11	12	8	7	9	10	9	10	3
Poumon	109	106	95	30	37	45	64	67	66	3
Sein chez la femme	s.o.	s.o.	s.o.	95	93	101	s.o.	s.o.	s.o.	6
Prostate	84	107	92	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	9
Vessie	35	33	32	9	8	10	20	19	19	-3
ENSEMBLE DES SIÈGES	463	471	447	329	318	341	380	378	381	0

3. Indice comparatif d'incidence du cancer, CLSC, Montérégie, 1994-1998



4. Indice comparatif d'incidence du cancer selon le siège, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998

CLSC	1984-1988	1989-1993	1994-1998								Ensemble des sièges	
	Ensemble des sièges	Ensemble des sièges	Estomac	Côlon-rectum	Pancréas	Sein	Prostate	Poumon	Vessie			
	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM			ICM	ICM		Nombre ²	ICM
La Presqu'île	98	95	85	93	114	95	99	102	93		327	96
Huntingdon	90	79 (-)	95	108	109	102	67	94	103		110	99
Seigneurie de Beauharnois	97	99	117	97	130	101	96	98	100		267	102
Châteauguay	102	103	125	96	101	87	101	120	119		262	105
Jardin du Québec	92	98	105	103	94	86	88	89	87		86	92
Kateri	105	112	148	131	76	98	103	139 (+)	87		232	108
Samuel-de-Champlain	100	96	109	94	110	101	82	84	90		438	92
Longueuil- Ouest ²	83 (-)	62 (-)	115	98	87	101	88	126	125		325	108
Longueuil-Est ²	173 (+)	166 (+)	87	103	100	110	109	102	120		221	103
St-Hubert	102	105	113	100	116	106	71	125	114		237	101
des Seigneuries	99	95	73	108	93	114	89	110	96		290	99
Ch. de la Vallée des Forts	102	109	86	100	94	96	126	97	123		414	104
La Vallée des Patriotes	101	100	96	101	112	100	103	87	100		311	97
du Richelieu	101	105	117	102	109	112	112	99	87		177	101
du Havre	99	105	142	100	100	96	167 (+)	100	83		281	111
des Maskoutains	96	90	71	92	87	93	104	78	66		324	92
La Pommerai	91	97	97	91	95	91	65	94	93		218	91
de la Haute-Yamaska	99	101	73	105	89	103	103	104	104		327	102
La Chênaie	77	92	57	99	70	120	98	86	130		62	99
MONTÉRÉGIE	100	100	100	100	100	100	100	100	100		4909	100

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 74 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

- De 1992 à 1996 seulement les cas traités en Ontario sont inclus au fichier.
- Nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer.
- Pour la période 1984-1988, l'attribution des nouveaux cas de cancer au CLSC Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.

s.o. Sans objet.

(+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

(-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

53. ⁽⁷⁶⁾ TAUX D'INCIDENCE DES PRINCIPALES MALADIES INFECTIEUSES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

- En 2000, près de 2 800 nouveaux cas ont été déclarés en Montérégie pour les principales **maladies infectieuses** correspondant à un taux de 212 pour 100 000 personnes pour l'ensemble des maladies principales retenues. Pour la période de 1995-1999, les taux calculés pour la région étaient presque tous significativement inférieurs à ceux de l'ensemble du Québec (données non présentées).
- En 2000, les maladies transmises sexuellement et plus spécifiquement la chlamydiose représentent à elles seules près de 60 % des nouveaux cas avec des taux respectifs de 126 et de 88 pour 100 000. Ce taux est le plus élevé de l'ensemble tandis que les cas d'infections à méningocoque avec seulement six nouveaux cas et un taux de 0,5 affichent le taux le plus faible.
- Entre 1990 et 2000, le taux global a diminué de 14 % mais une grande variation entre les maladies a été observée à ce chapitre. Le taux des cas de giardiase ayant augmenté de 55 % tandis qu'à l'opposé, celui des infections à méningocoque a chuté de 75 %.
- En 2000, les **femmes** présentent un taux global plus élevé que celui des hommes presque exclusivement à cause du fait qu'elles enregistrent un taux triple de celui des hommes pour la chlamydiose (132 c. 43).

Chez le **groupe d'âge des 0-14 ans** ce sont les infections digestives qui accaparent plus de 55 % des cas. Les maladies transmises sexuellement accaparent la majorité des cas chez les 15-59 ans (85 %), chez les 15-29 ans (65 %), chez les 30-39 ans et chez les 40-59 ans (52 %). Chez les 60 ans et plus les infections digestives occupent la première place avec 51 % des cas.

- Pour la période 1996-2000, les **territoires de CLSC** affichent des valeurs très différentes en ce qui a trait à l'ensemble des maladies.

Dans l'ordre décroissant, les CLSC des Maskoutains, de la Haute-Yamaska, Longueuil-Ouest et Vallée des Forts présentent des taux significativement supérieurs au taux moyen régional de 198 pour 100 000 pour l'ensemble des principales maladies retenues, avec des excédents allant de 41 % à 33 %.

À l'opposé, les territoires des CLSC Vallée des Patriotes, Samuel de Champlain, Huntingdon et surtout La Presqu'île montrent des taux significativement inférieurs avec des déficits par rapport à la région allant de 23 % à 42 %.


Plusieurs variations entre territoires existent également pour chacune des familles de maladies : des Seigneuries se démarque du taux régional en ce qui a trait aux maladies préventibles par la vaccination; Longueuil-Ouest, Vallée des Forts, Longueuil-Est et de la Haute-Yamaska pour les maladies transmises sexuellement; de la Haute-Yamaska et des Maskoutains pour les infections digestives. Ces écarts vont tous dans le sens de taux significativement supérieurs aux taux régionaux (données non présentées).

Au niveau des maladies spécifiques à l'intérieur des familles de maladies, des différences existent aussi, mais à ce chapitre les petits nombres de cas pour la presque totalité des CLSC et des maladies nous incitent à la prudence dans les comparaisons.


1. Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon le sexe et selon l'âge, Montérégie, 1990, 1996 et 2000 (Taux annuel pour 100 000)

MALADIES	1990	1996	2000 ¹										Variation de 1990 à 2000			
	Total	Total	Hommes	Femmes	0-14 ans	15-29 ans	30-39 ans	40-59 ans	60 ans et plus	Total						
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Nombre	Taux					
												%				
Maladies préventibles par la vaccination	28,8	17,6	15,1	12,0	51,0	*	3,9	*	6,3	*	5,5	**	3,0	179	13,6	-53
Coqueluche	21,0	13,4	10,7	10,7	49,8	**	1,6	**	2,9	**	1,5	0,0	141	10,7	-49	
Hépatite B aiguë	6,0	3,4	* 4,1	** 0,8	0,0	** 2,0	** 3,4	*	4,0	** 2,0	32	*	2,4	-60		
Infection à méningocoque	* 1,8	* 0,8	** 0,3	** 0,6	** 1,2	** 0,4	0,0	0,0	** 1,0	6	** 0,5	-75				
Infections pulmonaires	* 2,1	6,4	11,5	10,1	15,9	**	3,5	*	4,8	*	7,0	27,1	142	10,8	414	
Infection à streptocoque pneumoniae	N.D.	4,3	9,5	8,7	15,9	** 2,7	** 3,9	*	6,0	20,2	120	9,1	s.o.			
Tuberculose	* 2,1	* 2,1	* 2,0	** 1,4	0,0	** 0,8	** 1,0	** 1,0	* 6,9	22	*	1,7	-22			
Maladies Transmissibles Sexuellement	153,5	73,0	97,2	154,8	* 6,8	432,6	126,1	56,8	24,7	1 667	126,4	-18				
Chlamydiose	142,4	60,9	43,1	131,8	* 6,4	401,0	41,1	* 6,5	** 0,5	1 158 ¹	87,8	-38				
Hépatite C	** 0,1	* 2,8	47,4	21,1	** 0,4	21,5	75,4	47,6	23,7	451	34,2	s.o.				
Infection gonococcique	9,2	3,7	* 5,5	* 1,7	0,0	* 10,1	* 7,2	** 1,5	** 0,5	48	3,6	-60				
Sida	* 1,8	5,5	** 1,2	** 0,3	0,0	0,0	** 2,4	** 1,2	0,0	10	* 0,8	-58				
Infections digestives	63,0	72,6	61,4	61,2	93,2	69,4	58,5	39,4	57,7	808	61,3	-3				
Campylobacter	30,0	37,4	32,5	29,1	28,3	44,9	37,2	20,9	29,1	406	30,8	3				
Salmonellose	19,2	20,0	12,8	11,0	23,1	* 9,8	* 7,7	9,7	* 9,4	157	11,9	-38				
Giardiase	6,8	10,9	9,5	11,7	27,1	* 7,4	* 9,2	* 4,5	* 7,9	140	10,6	55				
E.Coli O157:H7	7,0	4,4	6,6	9,3	14,7	* 7,4	** 4,3	* 4,2	* 11,3	105	8,0	14				
ENSEMBLES DES PRINCIPALES CAUSES	247,5	169,6	185,2	238,1	166,9	509,5	195,7	108,7	112,5	2 796	212,1	-14				

2. Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon l'âge, CLSC, Montérégie, 1996-2000 (Taux annuel moyen pour 100 000)



3. Indice comparatif de l'ensemble des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire, CLSC, Montérégie, 1996-2000



Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 76 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Comprend deux cas dont le sexe et l'âge sont inconnus.

N.D. Non disponible.

s.o. Sans objet.

(+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

(-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

54.⁽⁷⁸⁾ POPULATION AYANT UNE LIMITATION D'ACTIVITÉS À LONG TERME


- En 1996, lors du recensement, 6 % de la population des ménages privés montréalais ou 79 000 personnes de tous âges présentaient une **incapacité de longue durée** (six mois ou plus). La valeur québécoise correspondante était de 7 %. Entre les recensements de 1991 et 1996 on assiste à une augmentation des proportions de 16 %. Cette estimation est obtenue à partir d'une question figurant dans le questionnaire du recensement de 1996 et non pas dans le cadre d'une enquête générale sociale et de santé ni d'une enquête thématique approfondie portant spécifiquement sur les limitations d'activités.

En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de 1998 de Santé Québec, près de 10 % des personnes en ménage privé soit près de 124 000 affichaient une telle limitation dans leurs activités (données non présentées). Dans l'enquête thématique sur les limitations d'activité, conduite la même année par Santé Québec, 16 % des Montréalais en ménage privé présentaient une limitation (donnée non présentée). Les valeurs varient donc selon les définitions, les mesures et les protocoles d'enquête.


- Les **femmes**, tant au recensement de 1991 qu'en 1996, affichent des valeurs presque identiques à celles des hommes.
- Les proportions estimées au recensement de 1996 de personnes avec incapacité croissent systématiquement avec l'**âge** particulièrement après 24 ans et à un rythme de plus en plus accéléré pour atteindre son sommet chez les 85 ans et plus avec près d'une personne sur deux présentant une incapacité. Entre 1991 et 1996, on observe une augmentation dans tous les groupes d'âge, la plus forte étant celle chez les personnes de 85 ans et plus.
- Lors du recensement de 1996 (seule source disposant de données relatives aux incapacités sur la base des territoires de CLSC), les **territoires de CLSC** présentent des différences de proportions allant du simple pour le CLSC des Seigneuries (4 %) à plus du double pour celui de Longueuil-Ouest (9 %).

Les femmes qui affichent une valeur légèrement supérieure pour la région ont en fait des pourcentages légèrement inférieurs à ceux des hommes dans huit des dix-neuf CLSC. L'ampleur des augmentations entre 1991 et 1996 diffère considérablement d'un CLSC à l'autre oscillant entre 44 % pour le CLSC Jardin du Québec à seulement 0,1 % pour le CLSC Du Richelieu. Le territoire du CLSC Vallée des Forts qui occupe le 5^e rang en termes de proportion compte en fait le plus grand nombre de personnes avec incapacité, soit plus de 7 000.


1. Proportion de la population des ménages privés ayant une incapacité à long terme selon le sexe, Montréal, 1991 et 1996



2. Proportion de la population des ménages privés ayant une incapacité à long terme selon l'âge, Montréal, 1991 et 1996



3. Proportion de la population des ménages privés ayant une incapacité à long terme, CLSC, Montérégie, 1996



4. Proportion de la population des ménages privés ayant une incapacité à long terme, CLSC, Montérégie, 1991 et 1996

CLSC	1991	1996				Variation de 1991 à 1996
		Hommes	Femmes	Total		
	%	%	%	Nombre ²	%	
La Presqu'île	5,1	6,1	5,4	5 445	5,8	13,3
Huntingdon	7,2	8,8	8,5	1 880	8,7	19,6
Seigneurie De Beauharnois	7,0	8,1	7,6	4 225	7,9	12,0
Châteauguay	5,3	6,2	6,6	3 820	6,4	20,7
Jardin Du Québec	5,0	7,9	6,6	1 630	7,2	44,4
Katéri	4,5	4,8	4,6	3 585	4,7	4,4
Samuel De Champlain	5,2	5,5	6,8	6 655	6,1	17,6
Longueuil-Ouest	6,8	8,8	9,6	6 020	9,2	36,4
Longueuil-Est	5,6	6,2	7,6	4 220	6,9	22,6
St-Hubert	5,1	6,3	6,4	4 825	6,3	24,0
Des Seigneuries	3,4	3,8	3,9	3 625	3,8	12,5
Champagnat De La Vallée Des Forts	6,4	7,5	7,4	7 040	7,4	16,8
De La Vallée Du Richelieu	4,2	4,9	5,0	4 505	5,0	17,1
Du Richelieu	5,2	5,2	5,2	2 590	5,2	0,1
Du Havre	5,9	7,0	6,5	3 470	6,8	15,1
Des Maskoutains	5,8	6,9	6,6	5 145	6,7	17,2
La Pommerai	6,9	7,9	8,1	3 825	8,0	16,8
De La Haute-Yamaska	5,9	7,0	7,2	5 530	7,1	20,3
La Chenaie	6,3	7,0	7,0	1 055	7,0	11,0
MONTÉRÉGIE	5,5	6,3	6,5	79 095	6,4	16,4

Notes

Pour en savoir plus sur des éléments apparentés à cette fiche mais originant d'une source différente, soit les Enquêtes sociale et de santé de Santé Québec, pour la définition et la méthode de calcul, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 78 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

- La présente fiche est basée exclusivement sur les données issues des recensements de 1991 et de 1996, les seules disponibles sur la base des territoires de CLSC. L'information provient d'un questionnaire autoadministré répondu dans la mesure du possible et selon les recommandations du guide par chaque adulte du ménage et par le père, la mère ou le tuteur pour les personnes de moins de 15 ans. Une première question concerne chaque membre du ménage et vise à établir la présence d'une limitation d'activités pour chacun d'entre eux. La question est : « Cette personne est-elle limitée dans ses activités à cause d'une incapacité physique, d'une incapacité mentale ou d'un problème de santé chronique; à la maison, à l'école ou au travail, dans d'autres activités, par exemple, dans ses trajets entre la maison et son lieu de travail ou dans ses loisirs; oui, non? ». Une seconde question, également adressée à chaque membre du ménage, vise à établir si l'incapacité en cause est ou n'est pas de longue durée. La question est : « Cette personne a-t-elle des incapacités ou handicaps de longue durée : oui, non? ». La longue durée est définie dans le guide comme un problème de santé ou un handicap qui a duré ou doit durer six mois ou plus. L'évaluation de la période se fait à partir du moment où l'incapacité ou le problème a commencé.
- Population estimée de personnes ayant une limitation d'activités à long terme e.


55. ⁽⁸¹⁾ ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

- En 1998, l'espérance de vie à la naissance des Montérégiens est de 78,4 ans, identique à celle estimée pour l'ensemble du Québec. Les **hommes** peuvent espérer vivre 75,5 ans et les femmes 81,1 ans. **Par rapport à 1981**, il s'agit d'un gain de trois ans au total, soit de 3,5 ans pour les hommes et de 2,3 ans chez les femmes.
- Lorsque l'on compare les valeurs **entre les périodes de 1984-1988 et 1994-1998**, le gain des hommes représente le double de celui des femmes soit 3 ans contre 1,4 ans. L'espérance de vie montre une tendance presque constante à l'amélioration au cours des seize dernières années, à l'exception de quatre années.
- Pour la période de 1996-1998, l'espérance de vie des Montérégiens est de 78,5 ans **à la naissance**, de 64 ans **à 15 ans**, de 35,1 ans **à 45 ans**, de 17,8 ans **à 65 ans** et de 11,1 **à 75 ans**. Le gain absolu en années oscille entre 2,9 ans à la naissance et 0,7 ans pour les personnes de 75 ans et plus. En termes relatifs, les gains augmentent avec l'âge : il représente un peu plus de 3 % à la naissance mais plus de 6 % pour les 75 ans et plus. **Les gains absolus** en années sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes et ceci à tous les groupes d'âge.
- Pour la période de 1994-1998, les **territoires de CLSC** affichent plusieurs valeurs d'espérance de vie significativement différentes au plan statistique de celle de la région.

Une espérance de vie plus faible que celle de la région est estimée pour les CLSC Huntingdon, Longueuil-Est, du Havre, Châteauguay, Saint-Hubert et Vallée des Forts. À l'opposé, les CLSC Samuel de Champlain, des Seigneuries et Vallée des Patriotes, affichent une espérance de vie supérieure à celle de 78,3 ans estimée pour la région.

Chez les hommes, les espérances de vie inférieures à la région pour la période de 1994-1998 se retrouvent dans les CLSC Huntingdon, du Havre, Longueuil-Est, Seigneurie de Beauharnois et Longueuil-Ouest. Chez les femmes, les CLSC suivants présentent également des déficits en espérance de vie par rapport aux femmes de la région : Huntingdon, Jardin du Québec, Saint-Hubert et Châteauguay.


1. Espérance de vie à la naissance selon le sexe, Montérégie, 1981 à 1998



2. Espérance de vie selon le sexe et l'âge, Montérégie, 1981-1983 à 1996-1998

Sexe	Âge	1981-1983	1984-1986	1987-1989	1990-1992	1993-1995	1996-1998	Variation absolue de 1981-1983 à 1996-1998
		Ans	Ans	Ans	Ans	Ans	Ans	Années
Hommes	0 an	72,2	72,5	72,8	74,2	74,7	75,6	3,3
	15 ans	58,1	58,3	58,7	59,8	60,3	61,1	3,0
	45 ans	30,0	30,1	30,5	31,6	31,9	32,5	2,5
	65 ans	14,2	14,2	14,4	15,2	15,2	15,6	1,4
	75 ans	8,8	8,6	8,9	9,3	9,1	9,6	0,8
Femmes	0 an	79,0	79,8	80,0	80,7	80,9	81,2	2,2
	15 ans	64,8	65,3	65,7	66,3	66,3	66,7	1,9
	45 ans	35,8	36,2	36,5	37,1	37,2	37,4	1,6
	65 ans	18,6	18,8	19,1	19,4	19,4	19,6	1,0
	75 ans	11,6	11,6	12,0	12,1	12,1	12,1	0,6
Total	0 an	75,6	76,1	76,4	77,5	77,8	78,5	2,9
	15 ans	61,4	61,8	62,2	63,1	63,4	64,0	2,5
	45 ans	32,9	33,2	33,6	34,4	34,6	35,1	2,1
	65 ans	16,5	16,6	16,9	17,5	17,5	17,8	1,3
	75 ans	10,4	10,3	10,7	11,0	10,9	11,1	0,7

3. Espérance de vie à la naissance, CLSC, Montérégie, 1994-1998



4. Espérance de vie à la naissance selon le sexe, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998

CLSC	Hommes				Femmes				Total				
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	Variation absolue de 1984-1988 à 1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	Variation absolue de 1984-1988 à 1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	Variation absolue de 1984-1988 à 1994-1998	
	Ans	Ans	Ans	Années	Ans	Ans	Ans	Années	Ans	Ans	Ans	Nombre ¹	Années
La Presqu'île	72,3	74,5	75,8	3,4	80,2	81,6 (+)	81,1	0,9	76,0	77,9 (+)	78,4	543	2,4
Huntingdon	70,0 (-)	73,3	73,2 (-)	3,2	78,6	80,3	79,5 (-)	1,0	73,9 (-)	76,6	76,2 (-)	222	2,3
Seigneurie de Beauharnois	71,3 (-)	72,1 (-)	74,2 (-)	2,9	79,5	79,8 (-)	81,7	2,2	75,4 (-)	76,0 (-)	78,0	465	2,6
Châteauguay	72,9	74,4	74,7	1,7	79,4	79,7 (-)	80,4 (-)	1,1	76,1	77,1	77,5 (-)	411	1,4
Jardin du Québec	72,1	71,9 (-)	76,0	4,0	80,6	82,0 (+)	79,7 (-)	-0,9	76,0	76,5	78,0	162	1,9
Kateri	73,4 (+)	73,8	75,4	2,0	79,0	79,8 (-)	80,7	1,7	76,1	76,7 (-)	78,0	320	1,9
Samuel-de-Champlain	73,4 (+)	75,5 (+)	77,2 (+)	3,8	80,8 (+)	81,3 (+)	82,0 (+)	1,2	77,3 (+)	78,7 (+)	79,9 (+)	694	2,6
Longueuil-Ouest	72,9	74,4	74,5 (-)	s.o.	81,1 (+)	81,0	81,1	s.o.	77,2 (+)	77,9 (+)	78,0	482	s.o.
Longueuil-Est	69,2 (-)	72,6 (-)	73,9 (-)	s.o.	76,7 (-)	78,9 (-)	79,3	s.o.	72,9 (-)	75,9 (-)	76,8 (-)	410	s.o.
Saint-Hubert	71,3 (-)	73,4	74,7	3,4	78,2 (-)	79,0 (-)	80,1 (-)	1,9	72,8 (-)	76,3 (-)	77,6 (-)	372	4,8
des Seigneuries	73,3 (+)	75,7 (+)	76,8 (+)	3,5	79,6	81,6 (+)	81,9 (+)	2,4	76,5	78,7 (+)	79,5 (+)	385	3,0
Ch. de la Vallée de Forts	72,1	73,5	74,9	2,8	79,1 (-)	80,8	80,7	1,6	75,6	77,1	77,8 (-)	708	2,3
La Vallée des Patriotes	74,2 (+)	75,7 (+)	76,4 (+)	2,2	80,7 (+)	81,3 (+)	81,6	0,9	77,4 (+)	78,5 (+)	79,0 (+)	457	1,6
du Richelieu	72,0	73,7	75,3	3,2	79,6	79,9	81,5	1,9	75,6	76,7 (-)	78,3	295	2,7
du Havre	71,6	72,5 (-)	73,5 (-)	1,9	79,2	80,2	81,1	1,8	75,3 (-)	76,3 (-)	77,2 (-)	450	1,9
des Maskoutains	70,9 (-)	73,9	75,2	4,3	79,3	81,4 (+)	81,4	2,2	75,3 (-)	77,7	78,5	649	3,2
La Pommerai	72,0	73,8	74,9	2,9	80,3	80,5	80,9	0,5	73,1 (-)	77,1	77,8	453	4,8
de la Haute-Yamaska	71,9	73,1 (-)	75,3	3,3	79,7	80,5	81,0	1,4	76,2	76,8 (-)	78,2	551	2,0
La Chênaie	76,9 (+)	72,7	75,0	-1,9	80,6	80,8	81,1	0,5	79,3 (+)	76,5	77,9	105	-1,4
MONTÉRÉGIE	72,4	74,0	75,3	3,0	79,8	80,7	81,1	1,4	76,0	77,4	78,3	8 134	2,3

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 81 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre annuel moyen de décès.

s.o. Sans objet, pour la période 1984-1988 l'attribution des décès au CLSC de Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.

(+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

(-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

56. ⁽⁸²⁾ ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ

- En 1998, l'espérance de vie en bonne santé pour la Montérégie est de 66,2 ans, voisine de celle estimée pour l'ensemble du Québec de 66,8 ans.
- Par rapport à l'espérance de vie à la naissance, qui est de 78,4 ans, l'ampleur des limitations d'activités utilisées dans le calcul de l'espérance de vie en bonne santé est telle qu'elle retranche plus de 12 années à la valeur originale de l'espérance de vie à la naissance.
- Les **femmes** bénéficient d'une espérance de vie sans incapacité de 67,6 ans et les hommes de 65,5 ans.

En ce qui concerne l'espérance de vie à la naissance, estimée pour la période voisine de 1996-1998, l'écart était de 5,6 ans en faveur des femmes. Lorsqu'on retranche à cette espérance de vie, les années d'incapacité vécues, l'écart se rétrécit considérablement et n'est plus que de 2,1 ans en faveur des femmes.

- L'espérance de vie sans incapacité, contrairement à l'espérance de vie à la naissance, **a diminué** en Montérégie. Par rapport aux valeurs estimées pour 1992-1993 de 69,1 ans on observe, en 1998, une baisse absolue de 2,9 ans et de 1,5 ans par rapport à la valeur de 1987 qui était de 67,7 ans.


En 1998, l'espérance de vie à **65 ans** est de 17,7 ans, soit 19,5 ans pour les femmes et 15,5 ans pour les hommes. Lorsqu'on retranche de ces valeurs les années d'incapacité on obtient 10,8 ans d'espérance de vie en bonne santé au total, soit 11,5 ans pour les femmes et 9,8 ans pour les hommes. L'écart qui était donc de 4 ans est réduit à seulement 1,7 ans quand on tient compte des années d'incapacité plus nombreuses chez les femmes.

- Les calculs précédents utilisent dans leurs estimations entre autre chose des proportions d'incapacité obtenues à partir des enquêtes sociales et de santé menées par Santé Québec.

Lorsqu'on substitue à ces données les proportions, plus faibles, d'incapacité estimées dans le cadre du recensement de 1996, seule estimation de la prévalence des incapacités disponible au niveau géographique des **territoires de CLSC**, des différences s'observent et méritent d'être relevées, bien qu'aucun test statistique n'ait été appliqué sur ces mesures.

Pour la période de 1994-1998, les valeurs oscillent entre un maximum de 72,8 ans pour la population du territoire du CLSC Samuel de Champlain et un minimum de 68,9 ans pour le CLSC Huntingdon qui affiche 2,3 ans de moins en espérance de vie en bonne santé que le 71,2 ans estimé selon cette méthode pour l'ensemble de la Montérégie.


1. Espérance de vie en bonne santé selon le sexe, Montérégie, 1987, 1992-1993 et 1998



2. Espérance de vie en bonne santé à la naissance et à 65 ans selon la limitation d'activités et le sexe, Montérégie, 1987, 1992-1993 et 1998

	Hommes				Femmes				Total			
	1987	1992-1993	1998	Variation absolue de 1987 à 1998	1987	1992-1993	1998	Variation absolue de 1987 à 1998	1987	1992-1993	1998	Variation absolue de 1987 à 1998
	Ans	Ans	Ans	Années	Ans	Ans	Ans	Années	Ans	Ans	Ans	Années
Espérance de vie à la naissance	72,4	74,0	75,3	2,9	79,8	80,7	81,1	1,3	76,0	77,4	78,3	2,3
Sans limitations d'activités (en bonne santé)	64,9	67,3	65,5	0,6	70,4	72,0	67,6	-2,8	67,7	69,1	66,2	-1,5
Avec limitations d'activités	7,5	6,7	9,8	2,3	9,4	8,7	13,5	4,1	8,3	8,2	12,1	3,7
En institution	0,7	0,9	0,9	0,1	1,9	1,9	2,1	0,2	1,3	1,5	1,5	0,2
De longue durée	5,6	4,6	7,8	2,2	6,2	5,8	10,1	3,9	5,8	5,3	9,0	3,1
De courte durée	1,2	1,2	1,2	0,0	1,3	1,0	1,2	-0,1	1,2	1,4	1,6	0,4
Espérance de vie à 65 ans	14,1	15,0	15,5	1,4	18,8	19,4	19,5	0,7	16,6	17,4	17,7	1,1
Sans limitations d'activités (en bonne santé)	10,5	11,8	9,8	-0,7	12,9	14,6	11,5	-1,4	11,9	13,1	10,8	-1,0
Avec limitations d'activités	3,6	3,3	5,6	2,1	5,9	4,8	8,0	2,1	4,7	4,3	6,8	2,1
En institution	0,8	1,0	0,9	0,1	2,0	2,0	2,2	0,3	1,4	1,7	1,7	0,2
De longue durée	2,4	2,2	4,4	2,0	3,5	2,8	5,4	1,9	2,9	2,4	4,9	2,0
De courte durée	0,3	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,1	0,3	-0,1

3. Espérance de vie en bonne santé (mesurée à partir du recensement de 1996), CLSC, Montérégie, 1994-1998



4. Espérance de vie selon la présence ou non d'incapacité (mesurée à partir des recensements de 1991 et 1996), CLSC, Montérégie, 1989-1993 et 1994-1998

CLSC	1989-1993			1994-1998			Variation absolue de 1989-1993 à 1994-1998		
	Espérance de vie totale	Espérance de vie avec incapacité	Espérance de vie sans incapacité	Espérance de vie totale	Espérance de vie avec incapacité	Espérance de vie sans incapacité	Espérance de vie totale	Espérance de vie avec incapacité	Espérance de vie sans incapacité
	Ans	Ans	Ans	Ans	Ans	Ans	Ans	Ans	Ans
La Presqu'île	77,9	6,8	71,1	78,4	6,9	71,5	0,5	0,1	0,4
Huntingdon	76,6	7,5	69,1	76,2	7,3	68,9	-0,4	-0,1	-0,3
Seigneurie de Beauharnois	76,0	7,4	68,6	78,0	8,0	70,0	2,0	0,6	1,4
Châteauguay	77,1	6,8	70,3	77,5	6,7	70,8	0,4	-0,1	0,5
Jardin du Québec	76,5	5,9	70,6	78,0	6,2	71,8	1,5	0,3	1,1
Kateri	76,7	6,6	70,1	78,0	6,8	71,2	1,3	0,2	1,1
Samuel-de-Champlain	78,7	6,9	71,8	79,9	7,0	72,8	1,2	0,1	1,0
Longueuil-Ouest	77,9	7,3	70,6	78,0	7,0	71,0	s.o.	s.o.	s.o.
Longueuil-Est	75,9	7,5	68,4	76,8	7,6	69,2	s.o.	s.o.	s.o.
Saint-Hubert	76,3	7,7	68,7	77,6	8,1	69,5	1,2	0,4	0,8
des Seigneuries	78,7	6,5	72,2	79,5	6,9	72,6	0,8	0,4	0,4
Champagnat de la Vallée de Forts	77,1	7,5	69,6	77,8	7,6	70,2	0,8	0,1	0,7
La Vallée des Patriotes	78,5	6,3	72,2	79,0	6,3	72,7	0,5	0,0	0,5
du Richelieu	76,7	7,3	69,5	78,3	7,5	70,8	1,6	0,2	1,4
du Havre	76,3	6,9	69,4	77,2	7,0	70,3	1,0	0,1	0,9
des Maskoutains	77,7	7,3	70,4	78,5	7,3	71,2	0,8	-0,1	0,8
La Pommeraie	77,1	8,0	69,1	77,8	8,2	69,7	0,7	0,2	0,5
de la Haute-Yamaska	76,8	7,4	69,4	78,2	8,0	70,2	1,5	0,6	0,8
La Chênaie	76,5	7,5	69,1	77,9	8,1	69,8	1,4	0,7	0,7
MONTÉRÉGIE	77,4	6,9	70,4	78,3	7,1	71,2	0,9	0,1	0,8

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 82 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001). Cependant, pour la présente fiche, nous avons dû utiliser les données sur les limitations d'activité issues des recensements de 1991 et de 1996. Le lecteur a donc avantage à consulter la note 1 de la fiche no 54.

1. Pour 1987, l'espérance de vie en bonne santé a été calculée à partir des tables de mortalité de la période 1984-1988, des taux d'institutionnalisation du recensement de 1986 et des données sur les limitations d'activités de l'Enquête de Santé Québec de 1987. Pour 1992-1993, les tables de mortalité utilisées sont celles de la période 1989-1993, les taux d'institutionnalisation proviennent du recensement de 1991 et les données sur les limitations d'activités sont tirées de l'Enquête sociale et de santé de 1992-1993. Enfin, les valeurs de l'espérance de vie en bonne santé de 1998 sont obtenues des tables de mortalité de la période 1994-1998, des taux d'institutionnalisation du recensement de 1996 et des données sur les limitations d'activités de l'Enquête sociale et de santé de 1998.

57. ⁽⁸³⁾ TAUX DE MORTALITÉ SELON L'ÂGE

- Pour la période 1994-1998, le **taux brut** annuel moyen de mortalité, calculé sur la base d'un nombre annuel moyen de plus de 8 000 décès pour la Montérégie, est de 632 pour 100 000 personnes, inférieur au taux québécois. Ce taux représente une augmentation de 6 % par rapport au même taux mesuré dix ans auparavant pour la période de 1984-1988 qui était de 596.
- L'**âge** est fortement associé à la valeur du taux qui monte de façon de plus en plus prononcée surtout à partir de 45 ans.

Au niveau des groupes d'âge, le taux de mortalité baisse entre 1984-1988 et 1994-1998 dans tous les groupes d'âge; entre 41 % chez les 5-14 ans et 6 % chez les 75 ans et plus. On remarque, entre les mêmes périodes, une baisse chez les hommes et augmentation chez les femmes. Le taux est plus élevé chez les **hommes** que chez les femmes dans tous les groupes d'âge également, le plus grand écart entre les sexes étant observé chez les 15-24 ans.

- Les **territoires de CLSC** se distinguent quant à leurs taux par rapport au taux régional et quant à l'ampleur et à la direction de l'évolution de leur taux brut entre les deux périodes de 1984-1988 à 1994-1998.


Pour 1994-1998, sept CLSC présentent des taux bruts significativement supérieurs à celui de la région, le plus élevé étant celui de La Pommeraiie qui, à 905, excède de plus de 40 % celui de la région.

Après ajustement, pour tenir compte de l'âge de la population, c'est le CLSC Longueuil-Est qui affiche le seul taux significativement plus élevé et ceci de près de 50 % de plus que le taux montérégien.

Seize des dix-sept CLSC ont amélioré leur situation en diminuant leur taux ajusté entre les deux périodes.

En 1984-1988, le CLSC La Chênaie qui présentait le taux le plus faible, a augmenté son taux de 11 %.

1. Taux de mortalité selon l'âge, Montérégie, 1984-1988 et 1994-1998




2. Taux de mortalité selon l'âge et le sexe, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

	Hommes			Femmes			Total			Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	
0-4 ans	184	155	108	123	118	80	154	137	94	-39
5-14 ans	31	19	14	14	16	13	23	18	14	-41
15-24 ans	125	116	85	35	35	27	81	77	57	-30
25-44 ans	151	140	129	69	71	67	110	105	98	-11
45-64 ans	946	773	635	498	414	379	720	594	507	-30
65-74 ans	4006	3425	3184	1883	1706	1697	2819	2469	2377	-16
75 ans et plus	11138	10054	9860	7270	6978	7153	8662	8087	8111	-6
Taux brut	683	666	670	510	536	594	596	601	632	6
Taux ajusté ¹	1005	893	825	550	505	493	743	668	632	-15

3. Taux de mortalité selon l'âge, CLSC, Montérégie, 1984-1988 et 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

		0-4 ans	5-14 ans	15-24 ans	25-44 ans	45-64 ans	65-74 ans	75 ans et plus	Taux brut	Taux ajusté
La Presqu'île	1984-1988	** 131	** 25	* 100	* 108	759	2815	8552	623	748
	1994-1998	** 88	** 10	** 76	* 75	500	2394	7923	559 (-)	618
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-33	-60	-24	-30	-34	-15	-7	-10	-17
Huntingdon	1984-1988	** 213	** 24	** 183	* 163	961	3113	9277	986	876 (+)
	1994-1998	** 142	** 21	** 65	* 179	723	2465	8537	898 (+)	736
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-33	-12	-64	10	-25	-21	-8	-9	-16
Seigneurie de Beauharnois	1984-1988	** 175	** 27	** 83	* 142	816	2875	8033	735 (+)	757
	1994-1998	** 53	** 20	** 53	* 130	577	2463	7572	834 (+)	641
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-70	-24	-36	-8	-29	-14	-6	13	-15
Châteauguay	1984-1988	** 192	** 26	** 81	* 90	682	2739	8754	527	729
	1994-1998	** 76	** 15	** 39	* 102	598	2508	8373	598	669
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-61	-42	-52	14	-12	-8	-4	13	-8
Jardin du Québec	1984-1988	** 189	** 37	** 127	** 127	* 653	* 2898	8127	672	727
	1994-1998	** 148	** 41	** 40	** 107	* 561	* 2156	8157	696	641
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-22	12	-68	-16	-14	-26	0	4	-12
Kateri	1984-1988	** 146	** 38	** 46	* 84	675	2768	9169	422 (-)	738
	1994-1998	** 87	** 7	** 47	* 77	497	2719	8010	409 (-)	637
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-40	-82	1	-9	-26	-2	-13	-3	-14
Samuel-de-Champlain	1984-1988	** 106	** 9	* 57	* 97	629	2654	8147	510	679
	1994-1998	** 76	** 4	** 49	* 85	396 (-)	2148	7405	626	557 (-)
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-28	-51	-15	-12	-37	-19	-9	23	-18
Longueuil-Ouest	1984-1988	** 175	** 23	* 72	* 121	715	2564	7553	569	686
	1994-1998	** 93	** 6	** 53	* 102	523	1899 (-)	4948 (-)	563	481 (-)
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Longueuil-Est	1984-1988	** 201	** 13	** 69	* 132	792	3634	11462 (+)	533	928 (+)
	1994-1998	** 120	** 10	** 43	* 130	683 (+)	3753 (+)	12567 (+)	812 (+)	944 (+)
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Saint-Hubert	1984-1988	** 152	** 18	** 65	* 101	756	3301	10058	440 (-)	830
	1994-1998	** 97	** 12	** 40	* 94	474	2805	8962	476 (-)	681
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-36	-32	-38	-7	-37	-15	-11	8	-18
des Seigneuries	1984-1988	** 114	** 12	** 70	* 87	651	2903	8305	390 (-)	705
	1994-1998	** 127	** 10	** 49	* 68	416	1897	7861	395 (-)	562
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		11	-20	-30	-21	-36	-35	-5	1	-20
Champagnat de la Vallée de Forts	1984-1988	** 135	** 30	* 95	* 134	789	2796	8722	683 (+)	769
	1994-1998	** 77	** 15	** 71	* 106	528	2377	8721	724 (+)	664
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-43	-52	-25	-21	-33	-15	0	6	-14
La Vallée des Patriotes	1984-1988	** 108	** 21	** 65	* 79	544	2641	8291	444 (-)	661
	1994-1998	** 60	** 14	** 59	* 80	387 (-)	2149	8480	491 (-)	597
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-44	-36	-10	2	-29	-19	2	11	-10
du Richelieu	1984-1988	** 159	** 23	** 113	* 122	627	2891	10051	604	789
	1994-1998	** 79	** 23	** 48	* 86	495	2319	8985	572	655
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-50	-1	-58	-30	-21	-20	-11	-5	-17
du Havre	1984-1988	** 166	** 15	** 76	* 105	789	3149	8904	725 (+)	786
	1994-1998	** 142	** 13	** 88	* 141	557	2465	8132	847 (+)	672
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-15	-16	17	35	-29	-22	-9	17	-15
des Maskoutains	1984-1988	* 198	** 41	* 85	* 127	834	2880	8683	851	786
	1994-1998	** 96	** 19	** 60	* 98	528	2153	8517	811 (+)	640
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-51	-53	-30	-23	-37	-25	-2	-5	-19
La Pommerai	1984-1988	** 127	** 26	** 102	* 137	771	2608	9025	860	766
	1994-1998	** 109	** 23	** 88	* 126	550	2453	7982	905 (+)	657
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-14	-8	-14	-8	-29	-6	-12	5	-14
de la Haute-Yamaska	1984-1988	* 223	** 18	* 93	* 112	734	2747	8372	644	737
	1994-1998	** 108	** 16	** 53	* 101	533	2423	7805	678	631
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-52	-11	-43	-10	-27	-12	-7	5	-14
La Chênaie	1984-1988	** 87	** 42	** 91	** 78	* 585	* 1770 (-)	6688	464 (-)	558 (-)
	1994-1998	** 162	** 8	** 128	** 110	* 511	* 2399	7260	677	618
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		87	-80	41	41	-13	36	9	46	11
Montérégie	1984-1988	154	23	81	110	720	2819	8664	596	742
	1994-1998	94	14	57	98	507	2377	8111	632	632
Variation de 1984-1988 à 1994-1998		-39	-39	-30	-11	-30	-16	-6	6	-15

4. Indice comparatif de mortalité, CLSC, Montérégie, 1994-1998



Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 83 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

s.o. Sans objet, pour la période 1984-1988 l'attribution des décès au CLSC de Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.

(+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

(-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

58. ⁽⁸⁴⁾ TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE

- **Pour la période 1996-1998**, le taux de **mortalité infantile** montréalais se situe à 4,3 pour 1 000 naissances vivantes, significativement inférieur à celui de 5,2 estimé pour l'ensemble du Québec pour la même période.


La mortalité néonatale précoce (décès de moins de sept jours suivant la naissance), avec un taux de 2,4, rend compte à lui seul de plus de la moitié du taux. Les taux respectifs des autres composantes, soit les taux de la mortalité postnéonatale et néonatale tardive, sont respectivement de 1,2 et 0,7.

- **En comparaison avec la période 1981-1983**, le taux de mortalité infantile a décliné de près de 40 %. Sa composante la plus importante, la mortalité néonatale précoce, a diminué de près de 50 %; la mortalité postnéonatale de plus du quart tandis que la mortalité néonatale tardive s'est maintenue au même niveau.
- Pour toutes les périodes de trois ans entre 1981-1983 et 1996-1998, les **anomalies congénitales** et les **autres affections périnatales** présentent dans l'ordre décroissant, les premières et secondes causes de mortalité infantile, parmi les principales retenues, avec des taux respectifs de 1,4 et 0,8 pour 1996-1998.


Par contre, tandis que les deux premières causes ont respectivement chuté de 36 % et de 52 %, c'est la détresse respiratoire qui a présenté la baisse la plus importante parmi les causes entre 1981-1983 et 1996-1998 avec une chute des deux tiers du taux qui est passé de 1,1 à 0,4.


- Les **territoires de CLSC** affichent des taux différents allant de 8,3 pour le CLSC Jardin du Québec et à 3,1 pour le CLSC Seigneurie de Beauharnois. Compte tenu des très petits nombres impliqués, aucun des taux des CLSC ne diffère de celui de la région au plan statistique. Les écarts importants au niveau de l'ampleur des variations doivent également être interprétés avec prudence ou simplement à titre indicatif compte tenu des petits nombres.

1. Taux de mortalité infantile selon ses composantes, Montréal, 1981-1983 à 1996-1998



2. Taux de mortalité infantile selon la cause, Montréal, 1981-1983 à 1996-1998



3. Taux de mortalité infantile, CLSC, Montérégie et Québec, 1994-1998**4. Taux de mortalité infantile selon la composante, CLSC, Montérégie et Québec, 1984-1988 à 1994-1998
(Taux annuel moyen pour 1 000 naissances vivantes)**

CLSC	1984-1988	1989-1993	1994-1998					Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	Infantile	Infantile	Néonatale précoce	Néonatale tardive	Post-néonatale	Infantile		%
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Nombre ¹	Taux	
La Presqu'île	** 5,6	** 5,6	** 2,4	** 1,2	** 0,6	6	** 4,2	-26
Huntingdon	** 8,1	** 3,5	** 3,6	** 1,4	** 2,9	2	** 7,9	-3
Seigneurie de Beauharnois	** 8,0	** 7,1	** 1,0	** 1,0	** 1,0	2	** 3,1	-61
Châteauguay	** 8,6	** 7,3	** 2,1	** 0,5	** 1,6	3	** 4,2	-51
Jardin du Québec	** 8,1	** 7,0	** 3,8	** 2,3	** 2,3	2	** 8,3	3
Kateri	** 6,6	** 5,5	** 2,3	** 0,4	** 1,1	4	** 3,7	-44
Samuel-de-Champlain	** 4,6	** 4,5	** 1,6	** 0,4	** 1,6	4	** 3,5	-23
Longueuil-Ouest	** 6,5	** 5,5	** 2,3	** 0,3	** 1,7	3	** 4,3	S.O.
Longueuil-Est	** 8,4	** 8,0	** 2,8	** 0,4	** 1,2	4	** 4,4	S.O.
Saint-Hubert	** 6,1	** 3,6	** 1,8	** 0,7	** 2,0	4	** 4,4	-28
des Seigneuries	** 4,5	** 6,3	** 3,1	** 1,2	** 1,8	7	** 6,1	37
Champagnat de la Vallée de Forts	** 4,9	** 5,5	** 1,9	** 0,7	** 0,9	4	** 3,5	-30
La Vallée des Patriotes	** 4,4	** 4,2	** 2,2	** 0,8	** 0,4	3	** 3,4	-23
du Richelieu	** 6,0	** 5,3	** 2,3	** 0,8	** 1,1	2	** 3,4	-43
du Havre	** 6,5	** 6,1	** 3,1	** 0,4	** 2,2	3	** 5,8	-10
des Maskoutains	** 6,6	** 5,4	** 0,9	** 1,1	** 2,2	4	** 4,3	-35
La Pommeraie	** 4,4	** 6,7	** 3,2	** 0,8	** 1,2	3	** 5,2	20
de la Haute-Yamaska	* 10,3	** 6,8	** 3,4	** 1,3	** 0,4	5	** 5,2	-50
La Chênaie	** 3,7	** 8,2	** 5,3	** 0,0	** 0,0	1	** 5,3	41
MONTÉRÉGIE	6,3	5,7	2,3	0,8	1,3	66	4,4	-30
ENSEMBLE DU QUÉBEC	7,1	6,1	3,1	0,7	1,5	445	5,3	-25

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 84 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre annuel moyen de décès infantiles.

s.o. Sans objet, pour la période 1984-1988 et 1989-1993 l'attribution des naissances au CLSC de Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.


59. ⁽⁸⁵⁾ TAUX DE MORTALITÉ PÉRINATALE

- Pour la période de 1996-1998, le taux de **mortalité périnatale** montréalais est de 6,7 pour 1 000 naissances totales, légèrement inférieur au 7,1 de l'ensemble du Québec.


Sa **composante principale**, le taux de mortinatalité, est de 4,3 près du 4,1 Québécois; ce dernier rend compte de près des deux tiers du taux global.


- Les deux taux ont baissé régulièrement pour remonter entre 1993-1995 et 1996-1998.
- Parmi les **principales causes** individuelles retenues, les anomalies congénitales, l'hypoxie et asphyxie et la détresse respiratoire avec des taux respectifs de 1,4, 0,7 et 0,4 occupent les trois premiers rangs.
- Pour la période de 1994-1998, les **territoires de CLSC** affichent des valeurs différentes allant du simple pour le CLSC Saint-Hubert (4,2) à un peu plus du double pour le CLSC Jardin du Québec (10,5). Mais, autant au niveau des taux que de leur variation entre les périodes, les très petits nombres d'événements nous commandent la prudence dans les interprétations.

1. Taux de mortalité périnatale et de mortinatalité, Montréal, 1981-1983 à 1996-1998



2. Taux de mortalité périnatale selon la cause, Montréal, 1984-1986 à 1996-1998



3. Taux de mortalité périnatale, CLSC, Montérégie et Québec, 1994-1998**4. Taux de mortalité périnatale et de mortinatalité, CLSC, Montérégie et Québec, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 1 000 naissances totales)**

CLSC	Mortinatalité					Mortalité périnatale				
	1984-1988	1989-1993	1994-1998		Variation de 1984-1988 à 1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998		Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	Taux	Taux	Nombre ¹	Taux	%	Taux	Taux	Nombre ²	Taux	%
La Presqu'île	** 3,9	** 2,5	5	** 3,9	0	** 7,6	** 5,8	8	** 6,2	-18
Huntingdon	** 2,9	** 4,7	1	** 5,0	73	** 6,9	** 5,8	2	** 8,5	23
Seigneurie de Beauharnois	** 5,1	** 3,3	3	** 5,6	9	** 8,9	** 8,2	4	** 6,6	-26
Châteauguay	** 4,0	** 2,6	2	** 3,1	-22	** 10,0	** 6,0	4	** 5,2	-48
Jardin du Québec	** 3,4	** 2,3	2	** 6,8	102	** 9,4	** 7,6	3	** 10,5	12
Kateri	** 3,8	** 4,6	4	** 3,9	1	** 7,1	* 8,0	7	** 6,2	-13
Samuel-de-Champlain	** 4,8	** 4,5	4	** 3,7	-22	* 7,5	* 7,7	5	** 5,3	-30
Longueuil-Ouest	** 6,5	** 4,5	3	** 4,7	-29	* 10,4	** 7,9	4	** 7,0	s.o.
Longueuil-Est	** 4,0	** 5,2	3	** 3,2	-20	** 9,4	** 8,9	6	** 5,9	s.o.
Saint-Hubert	** 3,8	** 3,5	2	** 2,4	-36	** 8,1	** 5,7	4	** 4,2	-49
des Seigneuries	** 4,9	** 3,3	5	** 4,3	-12	** 6,5	** 6,5	9	* 7,4	13
Champagnat de la Vallée de Forts	** 5,6	** 4,2	4	** 3,1	-45	* 8,4	* 7,4	6	** 5,0	-40
La Vallée des Patriotes	** 6,3	** 3,8	4	** 3,8	-40	** 9,4	** 5,5	6	** 6,0	-37
du Richelieu	** 5,0	** 4,8	3	** 4,0	-20	** 8,6	** 7,1	4	** 6,3	-28
du Havre	** 5,8	** 5,4	2	** 4,0	-31	** 9,2	** 8,6	3	** 7,1	-22
des Maskoutains	** 6,8	** 4,0	5	** 5,8	-14	* 10,0	** 7,4	6	** 6,7	-33
La Pommeraie	** 9,0	** 2,7	2	** 4,4	-51	** 12,0	** 6,1	4	** 7,6	-37
de la Haute-Yamaska	** 6,1	** 5,1	4	** 3,9	-36	* 12,8	* 9,9	7	** 7,3	-43
La Chênaie	** 0,9	** 1,0	0	** 2,1	126	** 2,8	** 6,1	1	** 7,4	163
MONTÉRÉGIE	5,1	3,9	59	4,0	-22	9,0	7,2	94	6,3	-30
ENSEMBLE DU QUÉBEC	5,1	4,4	342	4,1	-20	9,4	7,9	602	7,2	-23

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 85 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre annuel moyen de mortinaissances.

2. Nombre annuel moyen de mortinaissances et de décès d'enfants de moins de sept jours.

s.o. Sans objet, pour la période 1984-1988 et 1989-1993 l'attribution des naissances au CLSC de Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

60. ⁽⁸⁶⁾ TAUX DE MORTALITÉ SELON LA CAUSE

- **Pour la période de 1996-1998**, le **taux** annuel moyen **ajusté de mortalité** montréalais est de 624 pour 100 000, soit 488 chez les femmes et 811 chez les hommes. Celui des **hommes** étant plus élevé que celui des femmes de près des deux tiers.

Le taux global a chuté de façon régulière pour une baisse totale de 19 % entre 1981-1983 et 1996-1998, celui des femmes ayant baissé de 16 % et celui des hommes de 19 %.

- Les **maladies de l'appareil circulatoire** occupent, pour toutes les périodes, toujours le premier rang avec un taux global pour 1994-1998 de 230, suivies par les tumeurs avec un taux de 193.

L'écart entre les taux de ces deux maladies se rétrécit considérablement depuis 1984-1988 : de 60 % qu'il était en défaveur des maladies cardiaques, il n'est plus que de 20 %; le rapprochement des taux ayant été un peu plus prononcé chez les femmes.


Dans l'ordre, ce sont les décès dus aux **causes** comme les traumatismes non intentionnels suivis des maladies de l'appareil circulatoire et de l'appareil digestif qui, parmi les causes principales retenues, ont connu les meilleurs gains. Les décès dus aux maladies de l'appareil respiratoire ont augmenté, une hausse exclusivement due à une augmentation de près du quart observée chez les femmes.

- **Pour la période 1994-1998**, les **territoires de CLSC** affichent des différences, dont quatre significatives au plan statistique, par rapport au taux régional. Du côté excédentaire et pour les deux sexes réunis, le CLSC Longueuil-Est se démarque de tous les autres territoires par un excédent marqué de près de 50 % par rapport à la région.

À l'opposé, trois CLSC présentent un déficit par rapport à la région soit dans l'ordre 12 % pour les CLSC des Seigneuries et Samuel de Champlain et 22 % pour le territoire du CLSC Longueuil-Ouest.


Les situations respectives des hommes et des femmes ressemblent au profil pour les sexes réunis; l'ampleur des excédents et déficits par rapport à la région étant presque semblable; dans le cas des femmes les valeurs opposées sont davantage éloignées les unes des autres.

1. Taux ajusté de mortalité selon le sexe, Montréal, 1981-1983 à 1996-1998




2. Taux ajusté de mortalité selon la cause et le sexe, Montréal, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

CAUSES	Hommes			Femmes			Total			Variation de 1984-1988 à 1994-1998 %
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	
Tumeurs	271	268	249	154	155	156	202	201	193	-4
Appareil circulatoire	431	346	301	242	198	178	324	262	230	-29
Appareil respiratoire	85	80	81	31	33	38	51	51	54	5
Appareil digestif	34	31	27	19	19	19	26	24	23	-12
Traumatismes non intentionnels	52	42	31	21	18	15	36	30	23	-37
ENSEMBLE DES CAUSES	1005	893	825	550	505	493	743	668	632	-15

3. Indice comparatif de mortalité, sexes réunis, CLSC, Montérégie, 1994-1998**4. Indice comparatif de mortalité selon la cause, sexes réunis, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998**


CLSC	1984-1988	1989-1993	1994-1998					Ensemble des causes	
	Ensemble des causes	Ensemble des causes	Tumeurs	Appareil circulatoire	Appareil respiratoire	Appareil digestif	Traumatismes non intentionnels		
	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	Nombre ¹	ICM
La Presqu'île	100	94	102	97	90	88	91	543	98
Huntingdon	110	103	101	112	113	96	155	222	112
Seigneurie de Beauharnois	102	109	101	99	101	108	112	465	100
Châteauguay	99	106	113	107	107	114	85	411	107
Jardin du Québec	99	104	92	99	86	125	154	162	100
Kateri	98	104	114	103	120	78	94	320	103
Samuel-de-Champlain	91 (-)	89 (-)	90	86 (-)	96	94	77	694	88 (-)
Longueuil- Ouest ²	95	100	84 (-)	75 (-)	72	92	51	378	78 (-)
Longueuil-Est ²	124 (+)	107	142 (+)	137 (+)	179 (+)	159	110	515	147 (+)
Saint-Hubert	114 (+)	112 (+)	104	117	119	104	72	372	109
des Seigneuries	95	86 (-)	89	91	83	93	80	385	88 (-)
Ch. de la Vallée des Forts	102	101	98	112	110	108	110	708	104
La Vallée des Patriotes	88 (-)	92	97	94	93	106	108	457	95
du Richelieu	105	107	98	103	98	95	106	295	101
du Havre	107	111 (+)	108	102	89	98	173 (+)	450	106
des Maskoutains	102	96	96	94	104	100	103	649	98
La Pommeraie	101	98	100	100	98	86	130	453	101
de la Haute-Yamaska	99	104	99	103	76	82	87	551	99
La Chênaie	77 (-)	102	81	101	97	107	127	105	96
MONTÉRÉGIE	100	100	100	100	100	100	100	8134	100

5. Indice comparatif de mortalité chez les hommes, CLSC, Montérégie, 1994-1998



6. Indice comparatif de mortalité chez les hommes selon la cause, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998

CLSC	1984-1988	1989-1993	1994-1998					Ensemble des causes	
	Ensemble des causes	Ensemble des causes	Tumeurs	Appareil circulatoire	Appareil respiratoire	Appareil digestif	Traumatismes non intentionnels		
	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	Nombre ¹	ICM
La Presqu'île	98	95	102	93	89	74	90	293	96
Huntingdon	109	103	91	121	104	106	146	120	109
Seigneurie de Beauharnois	106	113	109	105	113	122	112	255	110
Châteauguay	93	98	107	108	118	101	87	226	105
Jardin du Québec	100	112	84	88	79	116	153	84	93
Kateri	92	103	110	98	107	85	97	180	100
Samuel-de-Champlain	92	88 (-)	85	84	95	92	74	337	86 (-)
Longueuil- Ouest ²	99	101	84	75 (-)	75	102	52	205	80 (-)
Longueuil-Est	125 (+)	107	153 (+)	134 (+)	200 (+)	182	88	250	149 (+)
Saint-Hubert	112	107	107	115	123	97	73	195	108
des Seigneuries	91	85 (-)	86	92	82	89	67	204	86 (-)
Ch. de la Vallée des Forts	101	101	97	113	102	109	105	372	102
La Vallée des Patriotes	86 (-)	87 (-)	97	89	90	94	107	239	91
du Richelieu	104	103	96	99	100	102	108	163	100
du Havre	108	114 (+)	114	112	98	102	169	253	113
des Maskoutains	108	100	100	96	102	105	120	315	101
La Pommeraie	101	95	96	101	106	80	139	245	103
de la Haute-Yamaska	102	108	104	101	72	93	99	288	99
La Chênaie	69 (-)	102	76	108	82	67	163	60	94
MONTÉRÉGIE	100	100	100	100	100	100	100	4284	100

7. Indice comparatif de mortalité chez les femmes, CLSC, Montérégie, 1994-1998**8. Indice comparatif de mortalité chez les femmes selon la cause, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998**

CLSC	1984-1988	1989-1993	1994-1998					Ensemble des causes	
	Ensemble des causes	Ensemble des causes	Tumeurs	Appareil circulatoire	Appareil respiratoire	Appareil digestif	Traumatismes non intentionnels		
	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	Nombre ¹	ICM
La Presqu'île	97	92	101	100	89	103	91	250	100
Huntingdon	105	100	111	100	122	85	170	102	113
Seigneurie de Beauharnois	98	105	93	93	89	97	110	211	91
Châteauguay	106	114	119	104	90	128	82	185	108
Jardin du Québec	92	90	100	110	91	132	151	79	106
Kateri	105	104	116	107	132	69	85	140	104
Samuel-de-Champlain	93	93	96	89	100	96	80	357	91
Longueuil- Ouest ²	93	99	84	77 (-)	67	84	50	173	76 (-)
Longueuil-Est ²	126 (+)	113	136 (+)	149 (+)	180 (+)	145	153	265	153 (+)
Saint-Hubert	117	121 (+)	102	118	116	110	69	178	111
des Seigneuries	101	87	94	90	87	97	103	181	90
Ch. de la Vallée des Forts	103	99	99	111	118	107	118	336	106
La Vallée des Patriotes	91	96	95	99	98	118	110	217	99
du Richelieu	103	111	99	104	91	87	99	132	100
du Havre	105	104	100	92	77	94	178	196	97
des Maskoutains	100	94	95	94	113	98	83	335	98
La Pommeraie	99	100	102	96	83	92	114	208	96
de la Haute-Yamaska	95	100	92	103	79	71	68	262	98
La Chênaie	86	96	84	90	112	151	58	45	94
MONTÉRÉGIE	100	100	100	100	100	100	100	3850	100

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 86 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre annuel moyen de décès.
 2. Pour la période 1984-1988, l'attribution des décès aux CLSC Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'étaient pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.
- (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
 (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

61. ⁽⁸⁷⁾ TAUX DE MORTALITÉ PAR TUMEURS

- **Pour la période de 1996-1998**, le taux annuel moyen ajusté montréalais de **mortalité par tumeurs**, estimé sur la base d'un nombre annuel moyen de 2 500 décès, est de 191 par 100 000, soit 154 chez les **femmes** et 245 chez les **hommes**.
- **Par rapport au taux de 1981-1983**, le taux global calculé pour 1996-1998, est légèrement en hausse, particulièrement à cause de la hausse observée chez les femmes (148 c. 154) puisque le taux des hommes lui, baissait légèrement (251 c. 245).

L'écart entre les deux sexes qui était de 79 % en défaveur des hommes n'est plus que de 60 %.


- Pour toutes les périodes, le **cancer du poumon** et celui du côlon-rectum sont, dans l'ordre, les deux causes de mortalité par cancer les plus répandues, leur taux respectif étant de 57 et 25 par 100 000 pour 1994-1998.
- L'évolution entre 1984-1988 et 1994-1998 dénote des gains pour les principales causes retenues et en premier lieu pour le cancer de l'estomac, où le gain est exclusivement dû à la baisse observée chez les hommes.

Le cancer du poumon présente, au contraire, une détérioration de 7 % exclusivement due à la hausse spectaculaire de plus de 35 % observée chez les femmes combinées à une diminution de 8 % estimée chez les hommes.

- Les **territoires de CLSC** affichent, pour la période 1994-1998, des taux de décès par cancer différents allant d'un excédent significatif de 42 % pour le CLSC Longueuil-Est à un déficit de 19 % et 16 % respectivement pour les CLSC La Chênaie et Longueuil-Ouest, significatif statistiquement dans ce dernier cas.


Les taux varient du simple à près du double entre les territoires pour chacun des sièges de cancer mais seuls les taux de décès par cancer du poumon et du côlon-rectum présentent des excédents significatifs statistiquement par rapport à la valeur régionale, et dans les deux cas, ces valeurs se situent sur le territoire du CLSC Longueuil-Est.

1. Taux ajusté de mortalité par tumeurs selon le sexe, Montréal, 1981-1983 à 1996-1998



2. Taux ajusté de mortalité par tumeurs selon la cause et le sexe, Montréal, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

CAUSES	Hommes			Femmes			Total			Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	
Cancer de l'estomac	13	10	9	5	4	5	8	7	7	-22
Cancer du côlon et du rectum	30	30	32	22	20	20	25	24	25	-2
Cancer du pancréas	13	11	12	8	7	8	10	9	10	-5
Cancer du poumon	93	95	86	23	30	35	53	57	57	7
Cancer du sein chez la femme	s.o.	s.o.	s.o.	32	31	30	s.o.	s.o.	s.o.	-9
Cancer de la prostate	30	33	27	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	-11
ENSEMBLE DES CAUSES	271	268	249	154	155	156	202	201	193	-4

3. Indice comparatif de mortalité par tumeurs, CLSC, Montérégie, 1994-1998**4. Indice comparatif de mortalité par tumeurs selon la cause, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998**

CLSC	1984-1988	1989-1993	1994-1998						Ensemble des tumeurs	
	Ensemble des tumeurs	Ensemble des tumeurs	Cancer de l'estomac	Cancer du côlon et du rectum	Cancer du pancréas	Cancer du poumon	Cancer du sein chez la femme	Cancer de la prostate		
	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	Nombre ¹	ICM
La Presqu'île	105	96	113	79	113	99	105	144	174	102
Huntingdon	104	87	100	110	113	86	124	107	60	101
Seigneurie de Beauharnois	95	108	106	100	121	106	102	78	140	101
Châteauguay	96	102	83	106	100	120	88	88	140	113
Jardin du Québec	87	96	73	102	73	91	73	94	45	92
Kateri	96	119	163	132	86	124	84	84	114	114
Samuel-de-Champlain	93	90	98	91	100	82	97	83	217	90
Longueuil- Ouest	98	106	101	69	53	92	89	75	129	84 (-)
Longueuil-Est	128 (+)	105	101	162 (+)	173	139 (+)	131	154	151	142 (+)
Saint-Hubert	112	124 (+)	120	65	110	122	111	93	115	104
des Seigneuries	101	89	65	92	91	97	95	91	124	89
Ch. de la Vallée des Forts	99	100	90	116	88	105	87	76	202	98
La Vallée des Patriotes	101	93	116	96	112	78	107	153	150	97
du Richelieu	110	107	136	93	105	93	100	71	86	98
du Havre	105	113	127	106	108	108	123	123	141	108
des Maskoutains	104	89	71	111	112	88	95	113	181	96
La Pommerai	91	92	86	103	72	105	115	91	129	100
de la Haute-Yamaska	96	103	100	94	92	98	82	101	164	99
La Chênaie	77	96	36	90	48	72	128	69	27	81
MONTÉRÉGIE	100	100	100	100	100	100	100	100	2488	100

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 87 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre annuel moyen de décès par tumeurs.
 2. Pour la période 1984-1988, l'attribution des décès aux CLSC Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'étaient pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.
- s.o. Sans objet.
- (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
- (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.


62. ⁽⁸⁸⁾ TAUX DE MORTALITÉ PAR MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

- Pour la période 1996-1998, le taux annuel moyen ajusté montréalais de **décès par maladies de l'appareil circulatoire**, estimé sur la base d'un nombre annuel moyen de 3 000 décès, pour les sexes réunis est de 224 pour 100 000, soit de 292 chez les **hommes** et de 173 chez les femmes.
- Ces taux baissent régulièrement et représentent des réductions de près de 40 % par rapport aux mêmes taux calculés pour la **période 1981-1983**, et ceci, pour chacun des deux sexes.
- Parmi les diverses **causes**, les cardiopathies ischémiques avec un taux moyen de 137 pour 100 000 pour la période de 1994-1998, rendent compte de plus de 50 % des décès de cette famille de maladies, autant pour les hommes que pour les femmes.

Les maladies hypertensives présentent la réduction la plus élevée de taux en pourcentage avec une baisse de 44 % bien qu'il est de mise de demeurer prudent avec cette valeur compte tenu des nombres restreints d'événements, entre 1984-1988 et 1994-1998. Les maladies ischémiques ont chuté de 29 % et ceci davantage chez les hommes que chez les femmes.


- Pour la période 1994-1998, les **territoires de CLSC** diffèrent beaucoup quant à leur taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire, trois affichant même des différences significatives au plan statistique; Longueuil-Est avec un excédent de 37 % et à l'opposé, Longueuil-Ouest et Samuel de Champlain avec des déficits respectifs de 25 % et de 14 % par rapport à la région. On retrouve ces mêmes oppositions spécifiquement pour les cardiopathies ischémiques, tandis que le CLSC Vallée des Forts est le seul autre territoire où on observe un autre excédent significatif de 36 % et ceci, en ce qui a trait aux maladies vasculaires cérébrales.

1. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire selon le sexe, Montréal, 1981-1983 à 1996-1998



2. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire selon la cause et le sexe, Montréal, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

CAUSES	Hommes			Femmes			Total			Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	
Maladies hypertensives	6	4	3	6	4	3	6	4	3	-44
Cardiopathies ischémiques	275	222	189	130	110	98	193	158	137	-29
Insuffisance cardiaque	22	16	16	15	13	11	18	14	13	-26
Maladies vasculaires cérébrales	60	50	42	50	39	35	55	44	38	-30
Maladies des artères	27	23	18	13	11	9	19	16	12	-33
ENSEMBLE DES CAUSES	431	346	301	242	198	178	324	262	230	-29

3. Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire, CLSC, Montérégie, 1994-1998**4. Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire selon la cause, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998**

CLSC	1984-1988	1989-1993	1994-1998						
	Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire	Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire	Maladies hyper- tensives	Cardiopathies ischémiques	Insuffisance cardiaque	Maladies vasculaires cérébrales	Maladies des artères	Ensemble des maladies de l'appareil circulatoire	
	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	Nombre ¹	ICM
La Presqu'île	95	88	101	95	99	100	107	192	97
Huntingdon	108	102	109	128	85	78	103	83	112
Seigneurie de Beauharnois	106	107	140	95	131	91	88	172	99
Châteauguay	102	106	109	99	156	114	146	145	107
Jardin du Québec	101	106	46	92	85	109	116	60	99
Kateri	104	103	105	101	99	107	93	107	103
Samuel-de-Champlain	94	94	72	84 (-)	109	91	71	251	86 (-)
Longueuil- Ouest ²	92	100	57	77 (-)	88	65	63	133	75 (-)
Longueuil-Est ²	125 (+)	104	136	138 (+)	119	125	131	172	137 (+)
Saint-Hubert	123 (+)	117	66	123	105	114	109	135	117
des Seigneuries	99	87	101	93	101	89	89	136	91
Ch. de la Vallée des Forts	105	102	66	113	78	136 (+)	116	281	112
La Vallée des Patriotes	88	94	125	95	79	98	93	159	94
du Richelieu	95	101	148	105	90	98	109	108	103
du Havre	109	112	167	85	139	109	121	162	102
des Maskoutains	98	97	78	103	64	89	80	237	94
La Pommeraie	98	96	162	95	120	96	103	172	100
de la Haute-Yamaska	96	104	61	108	91	102	116	211	103
La Chênaie	79	104	100	123	50	79	90	41	101
MONTÉRÉGIE	100	100	100	100	100	100	100	2958	100

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 88 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre annuel moyen de décès par maladies de l'appareil circulatoire.
 2. Pour la période 1984-1988, l'attribution des décès aux CLSC Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.
- (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
 (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.


63. ⁽⁸⁹⁾ TAUX DE MORTALITÉ PAR MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

- Pour la période **1996-1998**, le taux ajusté annuel moyen montréalais pour les **décès dus à l'appareil respiratoire** est de 54 pour 100 000 personnes des deux sexes réunis.
- Il est de 82 chez les **hommes** et de 39 chez les femmes. Chez ces dernières, il est, en hausse presque constante **depuis 1981-1983** passant de 28 à 39, soit une augmentation de 39 %.
- Pour 1994-1998, les **maladies pulmonaires obstructives** rendent compte de près de 60 % du nombre annuel moyen de 690 décès. Elles sont en hausse de 50 % chez les femmes par rapport à 1984-1988 tandis qu'au contraire elles affichent une légère baisse chez les hommes.
- Pour la période 1994-1998, les **territoires de CLSC** présentent une bonne variation au niveau des indices comparatifs par rapport à la région avec des valeurs d'excédents et de déficits oscillant entre un surplus de 78 % et un déficit de 28 %. Un seul territoire se démarque avec un excédent statistiquement significatif de 79 % pour cette famille de maladie; il s'agit du CLSC Longueuil-Est.

Le CLSC Longueuil-Ouest occupe, à l'opposé, la position la plus avantageuse avec un déficit de 28 % pour l'ensemble des maladies de l'appareil respiratoire.


La différence entre les deux CLSC est surtout due aux maladies pulmonaires obstructives pour lesquelles le CLSC Longueuil-Est enregistre un excédent de 91 %.

1. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire selon le sexe, Montréal, 1981-1983 à 1996-1998



2. Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire selon la cause et le sexe, Montréal, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

	Hommes			Femmes			Total			Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	
Pneumonies et gripes	22	20	20	13	10	13	16	14	15	-4
Maladies pulmonaires obstructives	54	52	52	14	19	21	29	30	31	8
ENSEMBLE DES CAUSES	85	80	81	31	33	38	51	51	54	5

3. Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire, CLSC, Montérégie, 1994-1998**4. Indice comparatif de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire selon la cause, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998**

CLSC	1984-1988	1989-1993	1994-1998			
	Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire	Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire	Pneumonies et gripes	Maladies pulmonaires obstructives	Ensemble des maladies de l'appareil respiratoire	
	ICM	ICM	ICM	ICM	Nombre ¹	ICM
La Presqu'île	109	108	90	87	41	90
Huntingdon	125	108	152	97	20	113
Seigneurie de Beauharnois	89	96	99	103	42	101
Châteauguay	104	102	119	103	33	107
Jardin du Québec	119	115	72	102	12	86
Kateri	102	132	149	109	28	120
Samuel-de-Champlain	86	90	105	90	65	96
Longueuil- Ouest	110	96	49	80	30	72
Longueuil-Est	117	128	162	191 (+)	52	179 (+)
Saint-Hubert	122	111	124	115	31	119
des Seigneuries	79	78	54	95	28	83
Ch. de la Vallée des Forts	97	107	98	115	65	110
La Vallée des Patriotes	76	87	103	83	35	93
du Richelieu	113	109	81	109	24	98
du Havre	106	102	95	93	33	89
des Maskoutains	99	94	143	84	64	104
La Pommeraie	126	95	73	115	41	98
de la Haute-Yamaska	82	93	64	80	37	76
La Chênaie	50	87	70	112	9	97
MONTÉRÉGIE	100	100	100	100	690	100

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 89 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre annuel moyen de décès par maladies de l'appareil respiratoire.

2. Pour la période 1984-1988, l'attribution des décès aux CLSC Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.


(+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

64.⁽⁹⁰⁾ TAUX DE MORTALITÉ PAR TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS

- **Pour la période 1996-1998**, le taux annuel moyen de **mortalité**, sexes réunis, pour la Montérégie en ce qui a trait aux **traumatismes non intentionnels** se situe à 23 pour 100 000 personnes.
 - Le taux des **hommes** se situe à 31 et celui des femmes à 16.
 - **Par rapport à 1981-1983**, le taux global de 1996-1998 représente une réduction du tiers, due en grande partie à la baisse de 37 % observée chez les hommes, tandis que pour sa part, le taux des femmes ne diminuait que de 16 %.
- L'écart entre les sexes s'est rétréci au cours de la période : au début de la période, le taux des hommes équivalait à 2,6 fois celui des femmes, il ne représente plus que le double de ce dernier (31 c. 16).
- Entre 1984-1988 et 1994-1998, parmi les **causes** principales retenues, on observe que ce sont les accidents de véhicules à moteur avec une baisse de 47 % de leur taux qui ont contribué à diminuer le taux global, les chutes accidentelles ayant pour leur part subi une tendance contraire avec une croissance de 10 %.
 - De fortes différences s'observent entre les **territoires de CLSC** mais, compte tenu du nombre annuel moyen assez faible de 292 pour l'ensemble de la région en 1994-1998, un seul d'entre eux, le CLSC du Havre, affiche une différence significative au plan statistique avec un excédent de 73 % par rapport à la valeur régionale.


Les CLSC Huntingdon, Jardin du Québec et La Pommeraie ont pour toutes les périodes présenté des excédents par rapport à la région bien que, compte tenu des petits nombres de décès impliqués, l'ampleur de leurs excédents n'ait pas été assez grande pour les considérer significatifs au plan statistique.

1. Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels selon le sexe, Montérégie, 1981-1983 à 1996-1998



2. Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels selon la cause et le sexe, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

	Hommes			Femmes			Total			Variation de 1984-1988 à 1994-1998 %
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	
Accidents de véhicules à moteur	25	21	13	9	8	5	17	15	9	-47
Chutes accidentelles	7	8	7	5	5	6	7	7	8	10
ENSEMBLE DES CAUSES	52	42	31	21	18	15	36	30	23	-37

3. Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels, CLSC, Montérégie, 1994-1998**4. Indice comparatif de mortalité par traumatismes non intentionnels selon la cause, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998**

CLSC	1984-1988	1989-1993	1994-1998			
	Ensemble des traumatismes non intentionnels	Ensemble des traumatismes non intentionnels	Accidents de véhicules moteur	Chutes accidentelles	Ensemble des traumatismes non intentionnels	
	ICM	ICM	ICM	ICM	Nombre ¹	ICM
La Presqu'île	117	100	110	81	19	91
Huntingdon	137	110	151	169	10	155
Seigneurie de Beauharnois	103	106	100	133	16	112
Châteauguay	101	97	78	91	12	85
Jardin du Québec	132	154	235	47	9	154
Kateri	92	51 (-)	94	111	14	94
Samuel-de-Champlain	75	66 (-)	55	97	21	77
Longueuil- Ouest ²	78	71	53	68	8	51
Longueuil-Est ²	90	91	41	171	15	110
Saint-Hubert	89	70	55	80	11	72
des Seigneuries	88	112	65	108	15	80
Ch. de la Vallée des Forts	121	109	142	88	26	110
La Vallée des Patriotes	76	93	112	123	21	108
du Richelieu	133	137	105	121	12	106
du Havre	123	152	173	126	23	173 (+)
des Maskoutains	120	108	156	61	22	103
La Pommeraie	144	129	162	124	18	130
de la Haute-Yamaska	111	111	93	77	17	87
La Chênaie	97	143	167	51	5	127
MONTÉRÉGIE	100	100	100	100	292	100

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 90 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre annuel moyen de décès par traumatismes non intentionnels.
 2. Pour la période 1984-1988, l'attribution des décès aux CLSC Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.
- (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
 (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

65. ⁽⁹¹⁾ TAUX DE MORTALITÉ PAR SUICIDE

■ **Pour la période de 1996-1998**, le taux annuel moyen de **mortalité par suicide** pour 100 000 personnes, sexes réunis, est de 15, calculé à partir d'un nombre annuel moyen pour la région de près de 200 décès.

■ Les **hommes** affichent un taux quatre fois plus élevé que celui des femmes, soit 25 contre 6.

Le taux global est inférieur au taux québécois grâce surtout au taux inférieur estimé chez les hommes (1994-1998) (données non présentées).

■ **Par rapport à la période de 1981-1983**, l'augmentation du taux global a été de 7 %, ce résultat cache cependant des tendances opposées au niveau des sexes, les hommes ayant augmenté leur taux de 25 % tandis que les femmes ont diminué le leur.

■ Les **groupes d'âge** qui affichent les taux les plus élevés sont les 25-34 ans et les 45-54 ans avec un taux annuel moyen similaire pour la période de 1996-1998 de 21,1 pour 100 000, suit de près le groupe des 35-44 ans avec un taux de 20,6.


L'évolution entre les périodes de 1984-1986 et 1996-1998 présente une tendance continue à la hausse chez les 45-54 ans et surtout chez les 75 ans et plus. Une baisse régulière est observée chez les 20-24 ans.

■ Pour la période de 1994-1998, les **territoires de CLSC** présentent des différences marquées en termes d'excédent (41 %) pour le CLSC Huntingdon ou de déficit (37 %) pour le CLSC de la Vallée des Patriotes.


Compte tenu des petits nombres de décès au niveau des CLSC, aucune de ces valeurs ne se révèle significative au plan statistique et toutes doivent être interprétées avec prudence.


Pour chacune des trois périodes de cinq ans, allant de 1984-1988 à 1994-1998, sept CLSC présentent toujours des excédents non significatifs au plan statistique par rapport à la région, ce sont : Huntingdon, Seigneurie de Beauharnois, La Presqu'île, Jardin du Québec, des Maskoutains, La Pommerai et de la Haute-Yamaska.

1. Taux ajusté de mortalité par suicide selon le sexe, Montérégie, 1981-1983 à 1996-1998



2. Taux de mortalité par suicide selon l'âge, Montérégie, 1984-1986, 1990-1992 et 1996-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)



3. Indice comparatif de mortalité par suicide, CLSC, Montérégie, 1994-1998**4. Indice comparatif de mortalité par suicide selon le sexe, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998**

CLSC	Hommes			Femmes			Total			
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	
	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	ICM	Nombre ¹	ICM
La Presqu'île	99	111	133	123	61	55	105	103	17	118
Huntingdon	142	127	156	76	66	57	131	118	5	141
Seigneurie de Beauharnois	126	123	127	132	144	138	126	126	11	128
Châteauguay	73	68	88	66	57	98	71	66	9	90
Jardin du Québec	178	131	108	87	105	119	162	130	4	113
Kateri	59	90	78	48	67	69	84	87	9	76
Samuel-de-Champlain	92	69	81	68	128	81	85	79	14	79
Longueuil- Ouest	101	69	106	65	195	136	92	91	12	110
Longueuil-Est	133	72	122	147	34	138	134	64	12	124
Saint-Hubert	86	72	95	98	125	74	88	82	11	90
des Seigneuries	88	90	89	139	82	73	99	89	13	86
Ch. de la Vallée des Forts	94	132	98	106	73	96	97	122	15	98
La Vallée des Patriotes	77	80	60	59	74	75	74	80	9	63
du Richelieu	144	117	98	58	82	80	127	112	7	96
du Havre	73	141	118	41	91	129	67	132	10	120
des Maskoutains	99	114	85	211	96	198	123	110	13	106
La Pommeraie	119	129	135	73	126	68	110	131	10	124
de la Haute-Yamaska	124	120	109	152	176	139	130	131	14	115
La Chênaie	92	172	90	130	53	91	102	153	2	93
MONTÉRÉGIE	100	100	100	100	100	100	100	100	199	100

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 91 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

1. Nombre annuel moyen de décès par suicide.

2. Pour la période 1984-1988, l'attribution des décès aux CLSC Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.

*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

66. ⁽⁹²⁾ TAUX DES ANNÉES POTENTIELLES DE VIE PERDUES

- **Pour la période tri-annuelle de 1996-1998**, le taux annuel moyen ajusté des années potentielles de vie perdues pour la Montérégie, indicatif de la mortalité prématurée, est de 5 120 pour 100 000 personnes.
- Ce taux est en **baisse continue** et représente une diminution de plus de 30 % par rapport au taux de 7 396 estimé quinze ans auparavant pour la période de 1981-1983.
- Le taux des **femmes** ne représente qu'un peu plus de la moitié de celui des hommes (3 693 c. 6 566).
- **Pour la période de cinq ans de 1994-1998**, le taux le plus élevé, tant chez les hommes que chez les femmes, se retrouve au niveau des **tumeurs** (1 763 pour les deux sexes réunis) tandis que les **maladies de l'appareil circulatoire** avec un taux de 1 071 arrivent au second rang. Les tumeurs et les maladies de l'appareil circulatoire expliquent à elles seules plus de la moitié du taux des années potentielles de vie perdues (54 %).

L'amélioration entre les périodes de cinq ans allant de 1984-1988 à 1994-1998 se traduit par une diminution de 24 % au total et est de même ampleur pour les deux sexes.


Les traumatismes ont témoigné de la baisse la plus importante avec une réduction de 41 %, tandis que les tumeurs avec une baisse de seulement 10 % ont affiché la diminution la plus faible parmi les cinq grandes catégories de maladies retenues.

- **Pour la période de 1994-1998**, onze **territoires de CLSC** présentent des valeurs significativement supérieures à celle de la région, le CLSC Huntingdon affichant le taux le plus élevé avec un excédent de 44 % par rapport au taux montérégien.

À l'opposé, six CLSC présentent des valeurs significativement inférieures à la région, la valeur la plus faible se situant sur le territoire du CLSC Samuel de Champlain qui affiche un déficit de 19 % par rapport à la valeur régionale.


Plusieurs faits saillants ressortent de l'examen des pourcentages de variation entre les taux des deux périodes extrêmes. Par rapport à la valeur estimée pour la période de 1984-1988, les taux de 1994-1998 sont en baisse dans tous les territoires à l'exception de celui de La Chénuaie qui affiche une hausse de 13 %. Le territoire du CLSC des Maskoutains présente la réduction la plus prononcée avec une baisse de 33 % et passe d'un taux supérieur à la région à un taux voisin de cette dernière. Le territoire du CLSC des Seigneuries affiche la meilleure performance en présentant des taux significativement inférieurs à la région pour toutes les périodes de cinq ans retenues et pour toutes les causes pour la dernière période de 1994-1998, ceci en plus d'enregistrer une baisse de 27 % sur l'ensemble de la période à l'étude.

1. Taux ajusté des années potentielles de vie perdues selon le sexe, Montérégie, 1981-1983 à 1996-1998



2. Taux ajusté des années potentielles de vie perdues selon la cause, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

Cause	Hommes			Femmes			Total			Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	1984-1988	1989-1993	1994-1998	
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	
Tumeurs	2 247	2 099	1 886	1 714	1 703	1 655	1 964	1 888	1 763	-10
Appareil circulatoire	2 549	1 904	1 524	898	696	634	1 700	1 287	1 071	-37
Appareil respiratoire	305	268	222	173	154	137	235	209	178	-24
Appareil digestif	271	197	194	111	93	92	190	144	142	-25
Traumatismes non intentionnels	1 538	1 261	872	465	428	305	1 009	851	593	-41
ENSEMBLE DES CAUSES	9 359	8 004	6 789	4 559	4 180	3 782	6 925	6 075	5 276	-24

3. Indice comparatif des années potentielles de vie perdues, CLSC, Montérégie, 1994-1998**4. Taux ajusté des années potentielles de vie perdues selon la cause, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)**

CLSC	1984-1988	1989-1993	1994-1998					Ensemble des causes		Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	Ensemble des causes	Ensemble des causes	Tumeurs	Appareil circulatoire	Appareil respiratoire	Appareil digestif	Traumatismes non intentionnels			
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Nombre ¹	Taux	%
La Presqu'île	7 090 (+)	5 680 (-)	1 664 (-)	1 085	165	111 (-)	521 (-)	4 587	5 075 (-)	-28
Huntingdon	9 474 (+)	7 099 (+)	2 127 (+)	1 793 (+)	209	196	1 026 (+)	1 792	7 579 (+)	-20
Seigneurie de Beauharnois	7 865 (+)	7 521 (+)	1 978 (+)	1 169 (+)	227 (+)	208 (+)	620	3 242	5 891 (+)	-25
Châteauguay	6 680 (-)	5 860 (-)	1 887 (+)	1 177 (+)	248 (+)	185 (+)	542	3 579	5 461 (+)	-18
Jardin du Québec	7 509 (+)	6 998 (+)	1 523 (-)	1 157	170	167	1 094 (+)	1 336	5 955 (+)	-21
Kateri	6 320 (-)	5 786 (-)	1 902 (+)	969 (-)	135 (-)	122	531 (-)	3 471	5 004 (-)	-21
Samuel-de-Champlain	5 810 (-)	5 091 (-)	1 569 (-)	839 (-)	180	101 (-)	333 (-)	4 727	4 247 (-)	-27
Longueuil-Ouest ²	6 968	6 205	2 146 (+)	1 326 (+)	240 (+)	249 (+)	438 (-)	4 285	6 301 (+)	s.o.
Longueuil-Est ²	8 183 (+)	6 265 (+)	1 879 (+)	1 148	248 (+)	128	387 (-)	3 329	5 561 (+)	s.o.
Saint-Hubert	7 092 (+)	5 947	1 702	1 215 (+)	174	162	425 (-)	3 684	5 168	-27
des Seigneuries	6 154 (-)	5 189 (-)	1 569 (-)	840 (-)	117 (-)	115 (-)	402 (-)	4 099	4 497 (-)	-27
Champagnat de la Vallée de Forts	7 528 (+)	6 603 (+)	1 931 (+)	1 097	208 (+)	175 (+)	660 (+)	5 175	5 522 (+)	-27
La Vallée des Patriotes	5 416 (-)	5 142 (-)	1 543 (-)	859 (-)	134 (-)	101 (-)	647 (+)	3 872	4 362 (-)	-19
du Richelieu	7 080 (+)	6 503 (+)	1 738	1 014	110 (-)	84 (-)	653	2 387	5 034 (-)	-29
du Havre	7 232 (+)	6 867 (+)	1 844	1 221 (+)	156	150	1 149 (+)	3 459	6 469 (+)	-11
des Maskoutains	8 026 (+)	6 193	1 786	1 005	161	130	756 (+)	4 118	5 400	-33
La Pommerai	7 114 (+)	6 904 (+)	1 830	1 100	225 (+)	152	1 065 (+)	2 972	6 188 (+)	-13
de la Haute-Yamaska	7 437 (+)	6 609 (+)	1 752	1 174 (+)	174	121	545	4 191	5 460 (+)	-27
La Chênaie	5 510 (-)	7 487 (+)	1 584 (-)	1 283 (+)	243	*154	1 250 (+)	934	6 236 (+)	13
MONTÉRÉGIE	6 925	6 075	1 763	1 071	178	142	593	65 237	5 276	-24

Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 92 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).


1. Nombre annuel moyen d'années potentielles de vie perdues.
 2. Pour la période 1984-1988, l'attribution des décès aux CLSC Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.
- (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
 (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.

67. PROPORTION DE LA POPULATION SE PERCEVANT EN MOYENNE OU EN MAUVAISE SANTÉ MENTALE


- En 1998, lors de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec, 8 % des Montérégiens de 15 ans et plus vivant en ménage privé **perçoivent leur santé mentale comme étant « moyenne ou mauvaise »**, par comparaison avec celle des autres personnes du même âge, ce qui représente près de 80 000 personnes.
- Les **femmes** affichent une proportion supérieure à celle estimée pour les hommes (9 % c. 6%), mais cette différence n'est pas significative au plan statistique.
- Entre les **groupes d'âge**, les valeurs estimées sont très voisines, sauf en ce qui a trait aux 15-24 ans où le pourcentage de 12 % dépasse, sans être significativement différent, celui des autres groupes d'âge qui oscille autour de 7 %.
- Au printemps 2000, lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM, les **territoires de CLSC** affichent des valeurs différentes allant du simple (La Vallée des Patriotes avec 2 %) à presque le triple (des Seigneuries avec 6 %). Mais, seuls les deux CLSC présentant les valeurs les plus faibles, soit La Vallée des Patriotes et Longueuil-Est (3 %) se distinguent significativement de la région.


Le territoire du CLSC Samuel de Champlain, affiche la valeur la plus élevée quant à la proportion de personnes qualifiant leur état de santé mentale d'« excellent ». Il se situe loin, au 11^e rang quant à la proportion de celles qui qualifient ce dernier de « moyen ou mauvais ». La valeur du territoire du CLSC des Seigneuries correspond à près de 4 500 personnes, soit le nombre de personnes le plus élevé de tous les territoires de CLSC.

1. Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en moyenne ou en mauvaise santé mentale selon le sexe, Montérégie, 1998



2. Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en moyenne ou en mauvaise santé mentale selon l'âge, Montérégie, 1998



3. Proportion de la population de 15 ans et plus se percevant en moyenne ou en mauvaise santé mentale, CLSC, Montérégie, printemps 2000**4. Répartition de la population de 15 ans et plus selon la perception de l'état de santé mentale, CLSC, Montérégie, printemps 2000**

CLSC	Excellente	Très bonne	Bonne	Moyenne / mauvaise	
	%	%	%	Nombre ¹	%
La Presqu'île	45,1	31,4	18,2	3 945	* 5,4
Huntingdon	40,1	37,2	17,0	975	* 5,6
Seigneurie de Beauharnois	38,0	41,6 (+)	15,7	2 131	* 4,8
Châteauguay	40,1	40,1	16,0	1 776	** 3,8
Jardin du Québec	41,0	34,4	21,8	523	* 2,9
Kateri	46,8	30,4 (-)	17,7	2 958	* 5,1
Samuel-de-Champlain	49,8 (>)	30,3 (>)	15,2	4 176	* 4,7
Longueuil-Ouest	41,2	35,3	18,9	2 548	* 4,7
Longueuil-Est	44,1	38,9	14,5	1 269	** 2,6 (<)
Saint-Hubert	43,1	36,1	16,1	2 795	* 4,7
des Seigneuries	41,6	37,6	14,7	4 493	* 6,1
Champagnat de la Vallée de Forts	44,3	33,1	17,4	3 969	* 5,2
La Vallée des Patriotes	48,3	38,3	11,1 (<)	1 672	** 2,3 (-)
du Richelieu	49,5	32,1	13,7	1 830	** 4,7
du Havre	43,0	35,8	16,7	1 950	* 4,5
des Maskoutains	42,7	37,7	15,0	2 894	* 4,6
La Pommerai	38,8	37,4	18,2	2 213	* 5,7
de la Haute-Yamaska	41,8	37,2	15,3	3 584	* 5,7
La Chênaie	40,8	38,4	17,9	344	** 2,9
MONTÉRÉGIE	43,8	35,5	16,0	46 043	4,6

Notes

Cet indicateur mesure la proportion de personnes de 15 ans et plus percevant leur état de santé mentale comme moyenne ou mauvaise, par rapport à la population totale de 15 ans et plus des ménages privés. L'information provient d'un questionnaire autoadministré rempli par les personnes de 15 ans et plus du ménage pour les données originant de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec de 1998, et de la même question posée au répondant de 15 ans et plus choisi au hasard dans le ménage lors de l'Enquête téléphonique régionale SOM du printemps 2000.

La question est : « Si vous comparez votre santé mentale à celle des autres personnes de votre âge, diriez-vous qu'elle est en général : excellente, très bonne, bonne, moyenne, mauvaise? ».

Pour la première fois utilisé au Québec dans le cadre de l'Enquête sociale et de santé de Santé Québec de 1998, cet indicateur d'autoévaluation de l'état de santé s'apparente à celui portant sur la perception de l'état de santé général (voir indicateur 48) réputé être associé à la morbidité déclarée, à l'utilisation de services, à la consommation de médicaments et à l'incapacité fonctionnelle.

1. Population estimée de 15 ans et plus percevant son état de santé mentale comme moyenne ou mauvaise.

>, (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .05, .10.

<, (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie aux seuils respectifs de : .05, .10.


*, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

68. TAUX DE MORTALITÉ ASSOCIÉE AU TABAGISME

- **Pour la période 1996-1998**, le taux pour 100 000 Montérégiens en ce qui a trait à la **mortalité due au tabagisme** est de 85 ce qui correspond à un nombre annuel moyen de plus de 1 000 décès.
- Le taux chez les **hommes** est de 129 soit quatre fois plus élevé que celui des femmes estimé à 31.
- **Depuis la période de 1981-1983**, ce taux total a cru de 42 %, soit une augmentation de 118 % chez les femmes, nettement supérieure à celle de 20 % estimée chez les hommes. Au départ, le taux des hommes était de plus de sept fois supérieur à celui des femmes, il n'est plus maintenant que de quatre fois supérieur. La croissance des taux a été ininterrompue, à une exception près, chez les hommes, pour la période 1990-1992. Les nombres annuels moyens, entre les périodes 1984-1988 et 1994-1998, ont connu une croissance de 36 % passant de 781 par année à 1 063.
- Les trois **causes** que sont les tumeurs du poumon, les maladies de l'appareil circulatoire et de l'appareil respiratoire telles la bronchite, l'emphysème et l'asthme comptent à elles seules pour près de 85 % des causes de décès depuis 1984-1988. Les autres maladies de l'appareil respiratoire ont connu la plus forte croissance parmi les causes spécifiques de décès, soit 58 %.
- **Pour 1994-1998**, une grande variation s'observe entre les **territoires de CLSC** allant d'un excédent significatif de 44 % par rapport à la région pour La Pommeraie, à un déficit tout aussi significatif de 35 % pour des Seigneuries.


La variation, entre la période de 1984-1988 et de 1994-1998, est également très différente entre les territoires, oscillant entre une augmentation 54 % sur le territoire du CLSC La Chênaie à une baisse de 5 % sur les territoires des CLSC Du Richelieu et Huntingdon.

1. Taux brut de mortalité par tabagisme selon le sexe, Montérégie, 1981-1983 à 1996-1998



2. Taux brut de mortalité par tabagisme selon la cause, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)

Mortalité par tabagisme	Nombre annuel moyen de décès				Taux brut annuel moyen			
				Variation de 1984-1988 à 1994-1998				Variation de 1984-1988 à 1994-1998
	1984-1988 Nombre	1989-1993 Nombre	1994-1998 Nombre		1984-1988 Taux	1989-1993 Taux	1994-1998 Taux	
Tumeur maligne de la cavité buccale et du pharynx	20,4	24,5	21,9	7	1,8	2,0	1,7	-6
Tumeur maligne de l'œsophage	9,7	11,2	12,7	31	0,9	0,9	1,0	15
Tumeur maligne du larynx	9,7	11,4	12,8	31	0,9	0,9	1,0	15
Tumeur maligne de la trachée, des bronches et poumon	380,0	493,7	562,4	48	33,7	40,0	43,7	30
Tumeur maligne du pancréas	23,7	24,7	31,9	35	2,1	2,0	2,5	18
Tumeur maligne de la vessie	20,3	20,7	22,0	8	1,8	1,7	1,7	-5
Tumeur maligne du rein	12,3	14,3	17,6	43	1,1	1,2	1,4	26
Tumeur maligne de l'estomac	5,0	5,0	5,6	12	0,4	0,4	0,4	-2
Tumeur maligne primitive du foie	1,6	2,2	2,5	56	0,1	0,2	0,2	36
Tumeur maligne du foie non précisé primitive ou secondaire	1,2	1,0	1,1	-4	0,1	0,1	0,1	-15
Tumeur maligne du col utérin	0,5	0,7	0,6	7	0,0	0,1	0,0	-6
Tumeur maligne de siège mal défini	10,7	15,8	17,8	67	0,9	1,3	1,4	46
Abus de tabac	0,4	0,0	0,2	-50	0,0	0,0	0,0	-56
Maladies de l'appareil circulatoire	166,8	168,1	174,5	5	14,8	13,6	13,6	-8
Bronchite chronique, emphysème, asthme et autres	102,6	132,4	159,8	56	9,1	10,7	12,4	36
Pneumonie et chrono-pneumonie	8,3	8,9	11,7	42	0,7	0,7	0,9	25
Tuberculose de l'appareil respiratoire	0,5	0,3	0,3	-38	0,0	0,0	0,0	-45
Autres maladies de l'appareil respiratoire	1,5	2,0	2,7	81	0,1	0,2	0,2	58
Ulcère digestif	0,4	0,5	0,3	-28	0,0	0,0	0,0	-37
Accidents provoqués par le feu	2,5	1,5	1,3	-49	0,2	0,1	0,1	-56
États morbides mal définis	2,9	3,8	2,8	-5	0,3	0,3	0,2	-17
Ensemble des causes	781,2	942,7	1062,6	36	69,2	76,4	82,6	19

3. Indice comparatif de mortalité par tabagisme, CLSC, Montérégie, 1994-1998**4. Taux brut de mortalité par tabagisme selon le sexe, CLSC, Montérégie, 1984-1988 à 1994-1998 (Taux annuel moyen pour 100 000)**

	1984-1988	1989-1993	1994-1998						Variation de 1984-1988 à 1994-1998
			Tumeurs	Autre que tumeur	Hommes	Femmes	Total		
	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Taux	Nombre ¹	Taux	%
La Presqu'île	74,7	72,2	51,1	* 22,6	94,1	* 53,2 (+)	72	73,7	-1
Huntingdon	106,9	* 95,3	* 61,9	* 39,8	* 125,8	* 76,7	25	* 101,6	-5
Seigneurie de Beauharnois	83,6	106,5	75,1	* 38,1	155,5	* 72,5	63	113,2	35
Châteauguay	62,2	71,0	63,0	* 24,7	108,8	* 66,8 (+)	60	87,7	41
Jardin du Québec	* 67,8	* 87,8	* 53,3	** 30,9	* 92,0	** 75,8	14	* 84,2	24
Kateri	* 49,6	59,9	* 43,9	* 16,5	* 73,1 (-)	* 47,5	47	60,4 (-)	22
Samuel-de-Champlain	58,3	69,6	52,5	* 27,8	94,8	66,7 (+)	89	80,3	38
Longueuil-Ouest ²	* 25,3 (-)	58,6	60,1	* 24,4	* 107,2	* 63,5 (+)	57	84,6	s.o.
Longueuil-Est ²	139,1 (+)	112,7 (+)	66,9	* 38,1	126,1	* 84,7 (+)	67	105,0	s.o.
Saint-Hubert	* 52,8	66,2	48,3	* 20,1	* 86,4 (-)	* 50,7	54	68,5	30
des Seigneuries	* 43,3 (-)	42,4 (-)	* 37,5 (-)	* 16,1 (-)	* 63,2 (-)	* 43,9	52	53,6 (-)	24
Champagnat de la Vallée de Forts	81,8	89,6	60,9	* 34,4	119,5	* 71,3 (+)	93	95,3	17
La Vallée des Patriotes	50,4	54,0 (-)	39,7	* 18,9	* 71,7 (-)	* 45,5	55	58,6 (-)	16
du Richelieu	* 73,7	* 71,4	* 44,9	* 25,2	* 87,9	* 51,9	36	* 70,1	-5
du Havre	85,6	106,8	76,9	* 35,0	153,1	* 71,8 (+)	59	111,9	31
des Maskoutains	86,8	86,0	58,0	* 34,5	117,3	* 68,8 (+)	74	92,5	7
La Pommeraiie	96,7	103,5	74,6	* 44,2	151,7	* 85,3 (+)	60	118,8 (+)	23
de la Haute-Yamaska	72,9	78,7	56,8	* 27,9	105,5	* 64,2 (+)	69	84,7	16
La Chênaie	* 50,4	* 72,2	** 43,8	** 33,7	** 104,2	** 49,0	12	* 77,5	54
MONTÉRÉGIE	69,2	76,4	55,1	27,5	126,8	29,3	1 057	82,6	19

Notes

Cet indicateur mesure les décès présumés associés au tabagisme et qui auraient pu être évités en l'absence de cette habitude de vie. Les causes médicales précises de décès associées sont listées dans le second élément graphique de la fiche. La méthode d'estimation utilisée ici devrait constituer une sous-estimation par rapport aux calculs effectués avec des méthodes plus perfectionnées mais pour lesquelles les données n'étaient pas disponibles dans le cadre du présent portrait.

1. Nombre annuel moyen de décès associés au tabagisme.
 2. Pour la période 1984-1988, l'attribution des décès aux CLSC Longueuil-Ouest et Longueuil-Est n'était pas parfaitement conforme au découpage de CLSC.
- (+) Indiquent une valeur significativement plus élevée que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
 (-) Indiquent une valeur significativement plus faible que celle de la Montérégie au seuil de : .05.
 *, ** Ces valeurs doivent être interprétées avec prudence ou simplement à titre indicatif puisqu'elles sont calculées à partir de nombres restreints.

69. ⁽⁶⁷⁾ INDICES DE SURFACES, DE DENTS CARIÉES, ABSENTES OU OBTURÉES (CAOF)

■ En 1994-1995, en dentition temporaire, chez les écoliers de 2^e et de 6^e année fréquentant les écoles localisées sur 17 des 19 CLSC, sur un nombre moyen de 51 faces présentes en bouche, 3,5 faces en moyenne par enfant présentaient une **attaque carieuse**. Pour 80 % de l'attaque carieuse, elle se traduisait par une face obturée (en moyenne 2,8 faces obturées par enfant). En moyenne, 0,5 face par enfant était toujours cariée et non traitée au moment de l'examen.

■ Au niveau des **territoires de CLSC**, le nombre moyen par enfant de faces cariées, absentes ou obturées le plus faible se retrouvait chez les enfants des écoles du territoire du CLSC des Seigneuries (1,8). À l'opposé, des nombres moyens environ trois fois plus élevés sont estimés pour les enfants des territoires des CLSC de Longueuil-Ouest (5,8) et de Huntingdon (5,4).

En ce qui a trait aux faces cariées au moment de l'examen, le nombre moyen estimé pour Longueuil-Ouest est de près de six fois celui de des Seigneuries (1,09 c. 0,19). Les mêmes territoires présentaient les valeurs extrêmes en ce qui a trait également aux faces obturées.

■ Pour la même année, en dentition permanente et chez les mêmes écoliers, sur un nombre moyen par enfant de 55 faces examinées, 1,3 faces témoignaient d'une attaque carieuse. Près de 90 % de ce nombre moyen de faces attaquées correspondait aux obturations, ce qui représente 1,2 faces obturées par enfant, tandis que 0,15 faces en moyenne par enfant se révélaient cariées et non traitées lors de l'examen.

■ Au niveau des **territoires de CLSC** et en ce qui a trait à la dentition permanente, le nombre moyen par enfant de faces cariées, absentes ou obturées le plus faible se retrouve ici encore chez les enfants des écoles du territoire du CLSC des Seigneuries (0,86) tandis qu'à l'opposé, les écoliers du territoire du CLSC Seigneurie de Beauharnois affichent la valeur la plus élevée (2,4).

L'écart étant ici légèrement moindre entre les extrêmes que dans le cas de la dentition temporaire. Les deux mêmes territoires présentent aussi les valeurs opposées en ce qui a trait aux faces obturées.


1. Indice de surfaces, de dents cariées, absentes ou obturées (CAOF), DENTITION TEMPORAIRE, chez les enfants de 2^e et 6^e année, CLSC, Montérégie, 1994-1995 (Nombre moyen de surfaces par enfant)

	Nombre moyen de surface par enfant				
	Faces présentes	caof sur les faces temporaires			
		Cariées	Absentes	Obturées	caof
La Presqu'île	51,83	0,40	0,03	2,64	3,07
Huntingdon	48,95	0,75	0,27	4,34	5,36
Seigneurie de Beauharnois	49,91	0,57	0,24	2,88	3,68
Châteauguay	51,07	0,64	0,07	2,57	3,28
Jardin du Québec	50,85	0,53	0,25	3,01	3,79
Kateri	51,48	0,74	0,17	3,38	4,28
Samuel-de-Champlain	48,86	0,28	0,00	2,11	2,38
Longueuil- Ouest	50,48	1,09	0,39	4,28	5,76
Longueuil-Est	52,74	0,93	0,09	3,25	4,27
Saint-Hubert	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
des Seigneuries	51,15	0,19	0,00	1,60	1,79
Ch. de la Vallée des Forts	48,74	0,55	0,41	3,97	4,93
La Vallée des Patriotes	52,23	0,26	0,02	2,29	2,58
du Richelieu	53,10	0,70	0,12	2,54	3,36
du Havre	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
des Maskoutains	49,06	0,48	0,10	2,25	2,83
La Pommeraie	47,79	0,89	0,23	2,49	3,61
de la Haute-Yamaska	49,72	0,40	0,11	3,03	3,54
La Chênaie	48,93	1,05	0,23	3,46	4,74
MONTÉRÉGIE	50,50	0,54	0,14	2,81	3,49


2. Indice de surfaces, de dents cariées, absentes ou obturées (CAOF), DENTITION PERMANENTE, chez les enfants de 2^e et 6^e année, CLSC, Montérégie, 1994-1995 (Nombre moyen de surfaces par enfant)

	Faces présentes	Nombre moyen de surface par enfant			
		caof sur les faces permanentes			
		Cariées	Absentes	Obturées	caof
La Presqu'île	54,06	0,15	0,10	0,94	1,19
Huntingdon	57,93	0,36	0,06	1,76	2,18
Seigneurie de Beauharnois	57,09	0,44	0,12	1,84	2,39
Châteauguay	52,99	0,16	0,03	1,17	1,36
Jardin du Québec	54,72	0,12	0,00	1,21	1,33
Kateri	54,09	0,07	0,00	1,48	1,56
Samuel-de-Champlain	57,00	0,18	0,00	1,08	1,26
Longueuil- Ouest	54,71	0,19	0,03	1,74	1,96
Longueuil-Est	52,33	0,15	0,03	1,45	1,64
Saint-Hubert des Seigneuries	53,88	0,07	0,00	0,79	0,86
Ch. de la Vallée des Forts	56,58	0,23	0,03	1,23	1,49
La Vallée des Patriotes	53,68	0,03	0,00	0,86	0,89
du Richelieu	51,59	0,08	0,00	0,90	0,98
du Havre					
des Maskoutains	56,68	0,06	0,00	1,21	1,26
La Pommeraie	59,69	0,22	0,00	0,75	0,97
de la Haute-Yamaska	55,80	0,12	0,00	0,87	1,00
La Chênaie	56,77	0,18	0,00	1,76	1,94
MONTÉRÉGIE	55,10	0,15	0,02	1,15	1,32

3. Indice de surfaces (CAOF), DENTITION TEMPORAIRE, chez les enfants de 2^e et 6^e année, CLSC, Montérégie, 1994-1995 (Nombre moyen de surfaces par enfant)



4. Indice de surfaces (CAOF), DENTITION PERMANENTE, chez les enfants de 2^e et 6^e année, CLSC, Montérégie, 1994-1995
(Nombre moyen de surfaces par enfant)



Notes

Pour en savoir plus sur la définition, la méthode de calcul et les sources, le lecteur peut consulter ces rubriques au début de la fiche no 92 présentée dans le document « Le portrait de santé, le Québec et ses régions » (INSPQ, 2001).

Les données de la présente fiche proviennent d'une enquête régionale effectuée en milieu scolaire en 1994-1995 à l'aide d'un échantillon aléatoire de classes d'élèves du secteur primaire des écoles de 17 des 19 CLSC de la région, menée par le Dr Pierre Corbeil avec la collaboration de Madame Manon Noisieux.

n.d. Non disponible.