

PARTIE

6

CONCLUSION

Résumé des
PRINCIPAUX RÉSULTATS
pour les décès et les hospitalisations

CHAPITRE 22 : Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999, dans chacune des régions sociosanitaires du Québec

Les tableaux qui suivent offrent une synthèse des principaux résultats par région présentés dans les parties précédentes. Dans une catégorie donnée de traumatismes, nous donnons le rang qu'occupe chacune des régions en termes de taux de mortalité et d'hospitalisation. Pour une comparaison plus complète, par exemple le test du rapport de taux, nous invitons le lecteur à consulter les tableaux appropriés dans les chapitres précédents.

Tableau 22.1
Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999, selon la catégorie de traumatismes, Bas-Saint-Laurent

Nombre annuel moyen et taux ajusté annuel moyen par 100 000 personnes

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	134	61,4	129	4	1 971	902,1	124	4
Traumatismes non intentionnels	76	34,3	130	6	1 832	835,0	123	4
Occupants de véhicule à moteur	30	14,1	189	3	205	98,1	195	1
Motocyclistes ⁵	1	0,2			29	14,0	166	2
Cyclistes ⁵	2	0,7			28	13,3	84	14
Piétons ⁵	3	1,2			18	8,3	87	8
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	5	2,4			1	0,7		
Intoxications accidentelles ⁵	3	1,2			19	9,3	90	12
Chutes non intentionnelles	16	6,1	76	14	710	308,0	111	7
Incendie et brûlures ⁵	3	1,3			13	6,5	96	9
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	7	3,3			130	64,1	131	5
Traumatismes intentionnels	56	26,4	129	2	119	57,3	138	6
Suicides ou tentatives	54	25,4	135	2	104	50,2	185	2
Homicides ou attentats ⁵	2	0,8			14	6,6	46	15

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.2**Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999, selon la catégorie de traumatismes, Saguenay – Lac-Saint-Jean**

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	165	59,5	126	6	2 280	809,3	112	11
Traumatismes non intentionnels	107	39,7	150	4	2 170	772,0	114	10
Occupants de véhicule à moteur	36	12,4	167	5	190	66,1	132	7
Motocyclistes ⁵	3	0,9			28	9,4	111	8
Cyclistes ⁵	2	0,5			50	16,5	104	6
Piétons ⁵	9	3,0			22	7,7	81	11
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	7	2,1			2	0,8		
Intoxications accidentelles ⁵	5	1,6			39	14,6	142	6
Chutes non intentionnelles	29	12,3	153	2	749	277,1	100	10
Incendie et brûlures ⁵	2	0,7			16	5,5	81	13
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	7	2,2			177	58,1	119	7
Traumatismes intentionnels	57	19,5	96	11	101	34,7	83	11
Suicides ou tentatives	56	19,0	102	11	65	22,3	82	11
Homicides ou attentats ⁵	2	0,5			36	12,4	86	9

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.3
Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999,
selon la catégorie de traumatismes, Québec

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	331	49,2	104	11	4 590	684,6	94	12
Traumatismes non intentionnels	158	22,9	86	13	4 282	637,0	94	12
Occupants de véhicule à moteur	33	5,0	67	13	214	32,5	65	14
Motocyclistes ⁵	2	0,2			45	7,0	83	13
Cyclistes ⁵	2	0,3			113	18,1	114	5
Piétons ⁵	11	1,6			51	7,8	82	10
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	7	1,1			4	0,6		
Intoxications accidentelles ⁵	12	1,8			40	6,5	63	13
Chutes non intentionnelles	57	7,7	96	10	1 983	287,9	103	8
Incendie et brûlures ⁵	4	0,5			41	6,4	95	10
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	8	1,2			319	52,0	106	10
Traumatismes intentionnels	168	25,5	125	4	267	41,3	99	9
Suicides ou tentatives	154	23,4	125	5	177	27,2	101	9
Homicides ou attentats ⁵	14	2,1			89	14,0	97	6

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisation pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.4**Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999, selon la catégorie de traumatismes, Mauricie et Centre-du-Québec**

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	301	59,9	126	5	4 137	817,9	113	10
Traumatismes non intentionnels	182	35,2	133	5	3 908	769,0	113	11
Occupants de véhicule à moteur	64	13,0	175	4	323	67,2	134	6
Motocyclistes ⁵	5	1,0			63	13,5	160	3
Cyclistes ⁵	3	0,6			95	19,4	122	4
Piétons ⁵	6	1,2			45	9,1	95	4
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	6	1,1			8	1,9		
Intoxications accidentelles ⁵	6	1,1			64	14,2	137	7
Chutes non intentionnelles	51	8,8	110	7	1 513	284,3	102	9
Incendie et brûlures ⁵	7	1,4			32	6,7	98	7
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	10	2,1			287	59,8	122	6
Traumatismes intentionnels	118	24,4	120	6	212	45,4	109	8
Suicides ou tentatives	114	23,6	126	4	157	33,7	125	7
Homicides ou attentats ⁵	4	0,8			54	11,6	81	11

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.5
Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999,
selon la catégorie de traumatismes, Estrie

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	161	54,2	114	7	2 464	827,6	114	9
Traumatismes non intentionnels	90	29,5	111	8	2 316	775,0	114	9
Occupants de véhicule à moteur	31	10,6	143	8	247	85,4	170	3
Motocyclistes ⁵	1	0,2			34	11,7	139	4
Cyclistes ⁵	3	0,9			57	19,8	125	2
Piétons ⁵	6	1,8			28	9,4	98	3
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	4	1,2			4	1,5		
Intoxications accidentelles ⁵	6	1,4			27	9,5	92	10
Chutes non intentionnelles	27	7,6	95	11	1 069	339,4	122	2
Incendie et brûlures ⁵	3	0,9			24	8,6	126	3
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	6	2,1			200	70,2	144	2
Traumatismes intentionnels	70	24,6	121	5	129	46,0	110	7
Suicides ou tentatives	64	22,5	120	6	87	31,0	115	8
Homicides ou attentats ⁵	6	2,1			41	14,7	102	5

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.6**Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999, selon la catégorie de traumatismes, Montréal-Centre**

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	727	36,5	77	14	11 000	559,1	77	14
Traumatismes non intentionnels	417	19,5	74	14	10 286	519,0	76	15
Occupants de véhicule à moteur	45	2,3	31	15	502	26,7	53	15
Motocyclistes ⁵	2	0,1			68	3,7	44	15
Cyclistes ⁵	5	0,3			231	13,4	85	12
Piétons ⁵	36	1,8			275	14,9	156	1
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	16	0,9			11	0,6		
Intoxications accidentelles ⁵	38	2,1			92	5,1	50	14
Chutes non intentionnelles	181	7,3	91	12	5 240	249,1	89	14
Incendie et brûlures ⁵	15	0,7			130	7,1	105	6
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	14	0,8			548	32,3	66	15
Traumatismes intentionnels	294	16,1	79	15	665	37,6	90	10
Suicides ou tentatives	256	14,0	75	15	305	17,2	64	13
Homicides ou attentats ⁵	38	2,1			354	20,0	139	1

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.7
Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999,
selon la catégorie de traumatismes, Outaouais

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	144	49,4	104	10	2 989	1 010,3	139	2
Traumatismes non intentionnels	74	27,3	103	9	2 786	940,0	138	2
Occupants de véhicule à moteur	23	7,6	102	10	139	45,4	90	12
Motocyclistes ⁵	1	0,3			25	7,9	94	12
Cyclistes ⁵	1	0,2			46	13,7	86	10
Piétons ⁵	4	1,3			15	4,9	51	15
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	3	1,0			2	0,8		
Intoxications accidentelles ⁵	6	1,8			34	11,1	108	9
Chutes non intentionnelles	21	8,9	111	6	904	318,6	114	5
Incendie et brûlures ⁵	2	0,8			19	6,2	92	11
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	4	1,2			152	46,3	95	12
Traumatismes intentionnels	70	22,1	108	9	203	63,0	151	3
Suicides ou tentatives	65	20,6	110	9	158	49,1	182	4
Homicides ou attentats ⁵	5	1,5			44	13,7	96	7

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100..

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.8**Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999, selon la catégorie de traumatismes, Abitibi-Témiscamingue**

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	107	72,6	153	2	1 305	874,8	121	6
Traumatismes non intentionnels	56	39,8	150	3	1 194	805,0	119	7
Occupants de véhicule à moteur	19	12,0	161	6	113	73,6	147	4
Motocyclistes ⁵	0	—			14	8,6	102	10
Cyclistes ⁵	2	0,8			20	11,6	73	15
Piétons ⁵	1	0,6			12	7,5	78	12
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	6	3,7			2	1,1		
Intoxications accidentelles ⁵	2	1,3			29	18,6	180	2
Chutes non intentionnelles	15	12,1	151	3	485	347,9	125	1
Incendie et brûlures ⁵	0	—			14	9,2	136	2
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	7	3,9			113	67,9	139	4
Traumatismes intentionnels	50	32,5	159	1	105	65,7	158	2
Suicides ou tentatives	46	29,5	157	1	81	50,7	188	1
Homicides ou attentats ⁵	5	3,0			24	15,0	104	4

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.9
Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999,
selon la catégorie de traumatismes, Côte-Nord

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	79	80,2	169	1	910	945,8	130	3
Traumatismes non intentionnels	55	56,9	215	1	819	862,0	127	3
Occupants de véhicule à moteur	17	15,9	214	2	67	63,5	126	8
Motocyclistes ⁵	1	1,0			9	8,1	96	11
Cyclistes ⁵	1	0,4			16	14,5	92	9
Piétons ⁵	3	2,3			9	8,2	86	9
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	7	6,4			1	0,6		
Intoxications accidentelles ⁵	2	1,8			18	18,6	180	3
Chutes non intentionnelles	8	12,8	159	1	269	309,9	111	6
Incendie et brûlures ⁵	4	3,2			9	8,5	126	4
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	6	4,9			92	85,5	175	1
Traumatismes intentionnels	25	23,3	114	7	75	68,8	165	1
Suicides ou tentatives	23	21,0	112	8	54	49,4	183	3
Homicides ou attentats ⁵	2	2,2			21	19,4	135	2

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.10**Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999, selon la catégorie de traumatismes, Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine**

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	56	50,9	107	8	1 186	1 087,2	150	1
Traumatismes non intentionnels	37	33,1	125	7	1 115	1 016,0	150	1
Occupants de véhicule à moteur	12	10,8	145	7	97	92,1	183	2
Motocyclistes ⁵	1	1,0			12	11,4	135	5
Cyclistes ⁵	1	0,5			21	19,8	125	3
Piétons ⁵	2	1,7			11	10,6	111	2
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	5	4,7			1	0,7		
Intoxications accidentelles ⁵	2	1,4			22	22,1	214	1
Chutes non intentionnelles	8	6,1	76	13	371	320,7	115	4
Incendie et brûlures ⁵	3	2,6			11	10,0	147	1
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	2	1,9			71	69,5	142	3
Traumatismes intentionnels	19	17,9	88	12	62	62,4	150	4
Suicides ou tentatives	16	15,1	80	13	45	45,2	167	6
Homicides ou attentats ⁵	3	2,8			17	17,2	119	3

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.11
Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999,
selon la catégorie de traumatismes, Chaudière-Appalaches

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	267	68,2	144	3	3 289	837,0	115	8
Traumatismes non intentionnels	166	42,0	159	2	3 129	795,0	117	8
Occupants de véhicule à moteur	81	20,7	278	1	274	70,0	139	5
Motocyclistes ⁵	6	1,5			56	14,2	169	1
Cyclistes ⁵	1	0,1			54	13,3	84	13
Piétons ⁵	5	1,3			35	8,7	91	6
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	3	0,6			4	1,1		
Intoxications accidentelles ⁵	4	0,9			36	9,4	91	11
Chutes non intentionnelles	41	10,2	125	5	1 075	269,3	97	13
Incendie et brûlures ⁵	3	0,8			23	6,0	88	12
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	7	1,8			211	53,4	109	9
Traumatismes intentionnels	100	25,8	126	3	131	34,0	82	12
Suicides ou tentatives	98	25,2	135	3	102	26,6	98	10
Homicides ou attentats ⁵	2	0,6			27	7,0	49	14

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.12**Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999, selon la catégorie de traumatismes, Laval**

	Décès 1997-1998				Hospitalisations 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	110	33,0	70	15	1 871	549,9	76	15
Traumatismes non intentionnels	52	15,9	60	15	1 772	521,0	77	14
Occupants de véhicule à moteur	11	3,3	44	14	114	33,5	67	13
Motocyclistes ⁵	1	0,1			21	6,3	75	14
Cyclistes ⁵	1	0,3			47	13,6	86	11
Piétons ⁵	2	0,4			29	8,6	90	7
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	2	0,5			3	0,8		
Intoxications accidentelles ⁵	3	0,9			17	5,1	50	15
Chutes non intentionnelles	18	5,7	70	15	803	238,6	86	15
Incendie et brûlures ⁵	2	0,6			15	4,5	67	15
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	3	0,7			122	36,2	74	14
Traumatismes intentionnels	57	16,7	82	14	91	27,2	65	14
Suicides ou tentatives	51	14,8	79	14	48	14,3	53	15
Homicides ou attentats ⁵	6	1,8			43	12,7	89	8

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.13
Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999,
selon la catégorie de traumatismes, Lanaudière

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	180	50,2	106	9	3 097	841,5	116	7
Traumatismes non intentionnels	90	26,4	100	10	2 989	814,0	120	6
Occupants de véhicule à moteur	28	7,9	106	9	223	59,4	118	10
Motocyclistes ⁵	3	0,7			39	10,4	124	7
Cyclistes ⁵	1	0,3			65	15,5	98	8
Piétons ⁵	6	1,4			21	5,2	54	14
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	4	1,0			3	0,8		
Intoxications accidentelles ⁵	8	2,0			62	16,9	164	4
Chutes non intentionnelles	23	7,8	97	9	954	270,7	97	11
Incendie et brûlures ⁵	2	0,6			19	5,1	74	14
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	3	0,8			193	47,8	98	11
Traumatismes intentionnels	88	23,2	114	8	101	26,2	63	15
Suicides ou tentatives	81	21,3	114	7	65	16,8	62	14
Homicides ou attentats ⁵	7	1,9			36	9,4	65	13

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.14**Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999, selon la catégorie de traumatismes, Laurentides**

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	191	45,9	97	12	3 844	887,5	122	5
Traumatismes non intentionnels	92	23,7	90	12	3 548	823,0	121	5
Occupants de véhicule à moteur	23	5,2	70	12	273	62,3	124	9
Motocyclistes ⁵	1	0,1			49	11,1	132	6
Cyclistes ⁵	2	0,5			94	19,8	125	1
Piétons ⁵	3	0,7			40	9,0	94	5
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	6	1,3			4	0,7		
Intoxications accidentelles ⁵	7	1,7			72	16,0	155	5
Chutes non intentionnelles	34	10,2	127	4	1 353	325,5	117	3
Incendie et brûlures ⁵	6	1,3			32	7,1	105	5
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	5	1,0			266	57,0	117	8
Traumatismes intentionnels	97	21,8	107	10	262	57,4	138	5
Suicides ou tentatives	89	20,0	107	10	208	45,5	168	5
Homicides ou attentats ⁵	8	1,8			53	11,8	82	10

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

Tableau 22.15
Résumé des principaux résultats pour les décès, 1997-1998, et pour les hospitalisations, 1997-1999,
selon la catégorie de traumatismes, Montérégie

	Décès 1997-1998				Hospitalisation 1997-1999			
	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴	Nombre ¹	Taux ajusté ²	Indice ³	Rang ⁴
Ensemble des traumatismes	520	41,6	88	13	8 282	651,8	90	13
Traumatismes non intentionnels	301	24,6	93	11	7 846	618,0	91	13
Occupants de véhicule à moteur	89	7,0	94	11	666	52,1	104	11
Motocyclistes ⁵	7	0,5			120	9,3	110	9
Cyclistes ⁵	4	0,3			215	16,1	101	7
Piétons ⁵	11	0,8			93	7,2	75	13
Noyades ou quasi-noyades ^{5,6}	10	0,8			14	1,1		
Intoxications accidentelles ⁵	17	1,4			150	11,9	115	8
Chutes non intentionnelles	90	7,9	98	8	3 365	270,2	97	12
Incendie et brûlures ⁵	14	1,0			84	6,6	97	8
Blessures liées aux activités sportives et récréatives ⁵	9	0,7			593	44,7	91	13
Traumatismes intentionnels	216	16,8	82	13	409	31,6	76	13
Suicides ou tentatives	199	15,5	83	12	268	20,7	76	12
Homicides ou attentats ⁵	17	1,3			138	10,7	75	12

1. Nombre annuel moyen.

2. Taux ajustés de mortalité selon la structure de l'âge de la population du Québec en 1996.

3. Indice comparatif de mortalité ou d'hospitalisation calculé à partir des taux ajustés. Pour l'ensemble du Québec : indice = 100.

4. Rang parmi les régions du Québec (1 à 15). Le rang 1 indique que la région présente le taux le plus élevé de mortalité ou d'hospitalisation.

5. Le nombre de décès pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

6. Le nombre d'hospitalisations pour ces catégories est trop faible pour permettre des comparaisons entre les régions et n'est alors présenté qu'à titre indicatif.

Source : MSSS, Fichier des décès de 1997 à 1998,

MSSS, Fichier des hospitalisations de MED-ÉCHO, de 1991 à 1999,

ICIS, Base de données sur la morbidité hospitalière, 1996-1997 et 1997-1998, et

MSSS, Perspectives démographiques d'après le recensement de 1996.

