

Agence de la santé  
et des services  
sociaux de l'Abitibi-  
Témiscamingue

Québec 

## Étude sur l'allaitement maternel en Abitibi-Témiscamingue en 2005-2006

**JUIN 2008**



**Ce document a été réalisé par :**

Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue  
1, 9<sup>e</sup> Rue  
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9

Téléphone : 819 764-3264

Télécopieur : 819 797-1947

Site Web : [www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca](http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca)

**Rédaction**

Sylvie Bellot, agente de recherche  
Direction de santé publique

**Mise en page**

Annette Picard, agente administrative  
Direction de santé publique

ISBN : 978-2-89391-342-1 (version imprimée)

978-2-89391-343-8 (version pdf)

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2008

Prix : 8,00 \$ + frais de manutention

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à condition que la source soit mentionnée.

Note : Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. Il désigne tant les hommes que les femmes.

<b>1. SOMMAIRE DE L'ÉTUDE.....</b>	<b>3</b>
1.1 Informations techniques .....	3
1.2 Principaux résultats pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue.....	7
<b>2. TABLEAUX DE DONNÉES</b>	
• Partie 1 : Information complétée dans les unités de maternité.....	11
• Partie 2 : Information complétée lors des visites de vaccination.....	13
<b>3. FIGURES</b>	
• <b>Données régionales seulement</b>	
○ Figure 1 : Type d'alimentation du bébé à l'hôpital, Abitibi-Témiscamingue, année 2005-2006.....	25
○ Figure 2 : Type d'alimentation du bébé à 2 mois, Abitibi-Témiscamingue, année 2005-2006.....	25
○ Figure 3 : Type d'alimentation du bébé à 4 mois, Abitibi-Témiscamingue, année 2005-2006.....	26
○ Figure 4 : Type d'alimentation du bébé à 6 mois, Abitibi-Témiscamingue, année 2005-2006.....	26
○ Figure 5 : Type d'alimentation du bébé à 12 mois, Abitibi-Témiscamingue, année 2005-2006.....	27
○ Figure 6 : Taux d'allaitement (exclusif, prédominant ou mixte) à différents âges, Abitibi-Témiscamingue, année 2005-2006 .....	27
○ Figure 7 : Taux d'allaitement à différents âges selon deux sources d'information, Abitibi-Témiscamingue, année 2005-2006 .....	28
○ Figure 8 : Taux d'allaitement à différents âges, Abitibi-Témiscamingue, années 2004-2005 et 2005-2006 .....	28
○ Figure 9 : Type d'allaitement selon l'âge du bébé chez les bébés allaités seulement, Abitibi-Témiscamingue, année 2005-2006.....	29

## TABLE DES MATIÈRES (SUITE)

- **Données régionales et locales (par territoire de CSSS)**
  - Figure 10 : Taux d'allaitement à l'hôpital, CSSS de la région Abitibi-Témiscamingue, année 2005-2006 ..... 30
  - Figure 11 : Taux d'allaitement à 2 mois, CSSS de la région Abitibi-Témiscamingue, année 2005-2006 ..... 30
  - Figure 12 : Taux d'allaitement à 4 mois, CSSS de la région Abitibi-Témiscamingue, année 2005-2006 ..... 31
  - Figure 13 : Taux d'allaitement à 6 mois, CSSS de la région Abitibi-Témiscamingue, année 2005-2006 ..... 31
  - Figure 14 : Taux d'allaitement à 12 mois, CSSS de la région Abitibi-Témiscamingue, année 2005-2006 ..... 32
- 4. MODÈLE DE GRILLE DE COLLECTE DES DONNÉES ..... 35**

# 1. Sommaire de l'étude



## 1. SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

### 1.1 Informations techniques

Cette étude a été réalisée en collaboration avec les infirmières des unités de maternité des cinq hôpitaux de la région et les infirmières en charge de la vaccination des bébés âgés de 2 à 12 mois des six centres de santé et de services sociaux (CSSS). En effet, la collecte de données a été effectuée en plusieurs étapes ; une première collecte avait lieu à l'hôpital après que la mère ait accouché et quatre autres étapes de collecte avaient lieu lors des visites de la mère au CLSC pour la vaccination du bébé à 2 mois, 4 mois, 6 mois et 12 mois.

L'étude a permis de recueillir des informations auprès de 1 257 bébés nés en 2005-2006 (1<sup>er</sup> avril au 31 mars) de mères résidant en Abitibi-Témiscamingue, soit environ 83 % de l'ensemble des nouveau-nés de la région, compte tenu des estimations disponibles actuellement. Les bébés nés de mères provenant de l'extérieur de la région ont été exclus de l'étude car ils ne font pas l'objet d'un suivi par les CLSC de l'Abitibi-Témiscamingue pour la vaccination, étant pris en charge par les CLSC de leur propre région.

La grille utilisée pour la collecte des données est disponible à la section 4 de ce document<sup>1</sup>.


Les données collectées ont été saisies sur Excel puis traitées avec le logiciel SPSS. L'analyse réalisée est uniquement descriptive. À titre indicatif, la page suivante illustre le modèle logique d'analyse utilisé pour calculer les taux d'allaitement aux différentes étapes.

---

<sup>1</sup> Pour plus de détails sur l'instrument de collecte, le lecteur peut se référer au document suivant :  
Sylvie BELLOT. *L'allaitement maternel : état de la situation en Abitibi-Témiscamingue pour les bébés nés au cours de l'année financière 2004-2005*. Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, janvier 2007, p.3.



MODÈLE LOGIQUE POUR L'ANALYSE





## 1.2 Principaux résultats pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue

### À l'hôpital

- Taux d'allaitement : 76,8 %.
- Parmi les bébés allaités, près du quart le sont de façon exclusive, 15 % de façon prédominante et 6 sur 10 reçoivent une alimentation mixte.
- Parmi les mères qui allaitent, près d'1 sur 2 souhaite le faire le plus longtemps possible tandis que 15 % espèrent allaiter pour une période allant de plus de 3 mois jusqu'à 6 mois et 12 % ont pour objectif d'allaiter pour une durée de 3 mois ou moins.

### À 2 mois

- Taux d'allaitement : 57,9 %.
- Parmi les bébés allaités, 3 sur 4 le sont de façon exclusive.
- Pour les bébés qui ne sont plus allaités, la cessation de l'allaitement s'est produite à l'âge de 3 ou 4 semaines pour près de la moitié d'entre eux.
- Les principales raisons expliquant la cessation de l'allaitement avant l'âge de 2 mois sont d'abord la « *fatigue de la mère* », puis « *le fait de ne pas produire assez de lait ou que le bébé n'est pas satisfait* » et « *le manque d'intérêt ou le fait de considérer l'allaitement comme trop exigeant* ». Ajoutons cependant que beaucoup de raisons ne sont pas précisées et se retrouvent dans la catégorie « *autre raison* ».

### À 4 mois

- Taux d'allaitement : 46,7 %.
- Parmi les bébés allaités, près d'1 sur 2 l'est de façon exclusive et un peu plus du tiers reçoivent une alimentation mixte.
- Pour les bébés qui ne sont plus allaités, la cessation de l'allaitement s'est produite entre l'âge de 3 mois et 3 mois ½ pour la moitié d'entre eux.
- Les principales raisons expliquant la cessation de l'allaitement entre 2 et 4 mois sont d'abord la « *fatigue de la mère* », puis « *le fait de ne pas produire assez de lait ou que le bébé n'est pas satisfait* ». Ici encore, beaucoup de raisons ne sont pas précisées et se retrouvent dans la catégorie « *autre raison* ».

### À 6 mois

- Taux d'allaitement : 32,0 %.
- Parmi les bébés allaités, 7 sur 10 reçoivent une alimentation mixte.
- Pour les bébés qui ne sont plus allaités, la cessation de l'allaitement s'est produite entre l'âge de 4 1/2 mois et 5 mois pour près de la moitié d'entre eux.
- Les principales raisons expliquant la cessation de l'allaitement entre 4 et 6 mois sont la « *fatigue de la mère* » et « *le fait de ne pas produire assez de lait ou que le bébé n'est pas satisfait* ». Bon nombre de raisons ne sont pas précisées et se retrouvent dans la catégorie « *autre raison* ».

### À 12 mois

- Taux d'allaitement : 6,7 %.
- Tous les bébés allaités reçoivent une alimentation mixte.
- Pour les bébés qui ne sont plus allaités, la cessation de l'allaitement s'est produite entre l'âge de 6 et 8 mois pour la moitié d'entre eux.
- Les principales raisons expliquant la cessation de l'allaitement entre 6 et 12 mois, sont encore en premier la « *fatigue de la mère* », puis « *le fait que le bébé refuse le sein ou a de la difficulté à téter* ». Encore une fois, beaucoup de raisons ne sont pas précisées et se retrouvent dans la catégorie « *autre raison* ».

## 2. Tableaux de données



## PARTIE 1 : Information complétée dans les unités de maternité

**Tableau 1**

ou CS participants	N	%
Témiscaming	39	3,1
Ville-Marie	107	8,5
Rouyn-Noranda	380	30,2
La Sarre	155	12,3
Amos	211	16,8
Val-d'Or	365	29,0
TOTAL	1 257	100,0

**Tableau 2**

bébé à l'hôpital	N	%	% ajusté *
Allaitement exclusif	575	45,7	47,6
Allaitement prédominant	139	11,1	11,5
Mixte	215	17,1	17,8
<i>Prévalence de l'allaitement au CH</i>	929	73,9	76,8
Lait artificiel	280	22,3	23,2
Sous total	1 209	96,2	100,0
Sans réponse	48	3,8	
TOTAL	1 257	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**Tableau 3**

Si bébé est allaité :

	N	%	% ajusté *
De 0 à 3 mois	88	9,5	12,4
Plus de 3 mois à 6 mois	110	11,8	15,5
Plus de 6 mois à 9 mois	18	1,9	2,5
Plus de 9 mois à 12 mois	23	2,5	3,2
Plus de 12 mois	2	0,2	0,3
Le plus longtemps possible	322	34,7	45,3
Ne sais pas	148	15,9	20,8
Sous total	711	76,5	100,0
Sans réponse	218	23,5	
TOTAL	929	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**Tableau 4**

	<b>N</b>	<b>%</b>
Sein maternel	828	76,2
Biberon	402	37,0
Gobelet "cup"	193	17,8
Autre	63	5,8
<b>TOTAL</b>	<b>1 087</b>	<b>100,0</b>

\*\* Il ne s'agit pas d'une liste mutuellement exclusive, plusieurs moyens peuvent avoir été utilisés pour nourrir le bébé. À titre indicatif, chaque moyen est rapporté au total des bébés pour lesquels un moyen a été mentionné.

## PARTIE 2 : Information complétée lors des visites de vaccination

**Tableau 5**

	N	%	% ajusté *
Témiscaming	39	3,1	3,6
Ville-Marie	107	8,5	9,8
Rouyn-Noranda	278	22,1	25,4
La Sarre	155	12,3	14,2
Amos	147	11,7	13,4
Val-d'Or	303	24,1	27,7
Malartic	64	5,1	5,9
<i>Sous total Vallée-de-l'Or</i>	367	29,2	33,6
Sous total	1 093	87,0	100,0
Sans réponse	164	13,0	
TOTAL	1 257	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

### La situation lors de la visite à 2 mois

**Tableau 6**

	N	%	% ajusté *
Oui	600	54,9	57,9
Non	266	24,3	25,7
Ne s'applique pas car non allaité au CH	171	15,6	16,5
Sous total	1037	94,9	100,0
Sans réponse	56	5,1	
TOTAL	1 093	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

### La situation lors de la visite à 2 mois

**Tableau 7**

Si bébé est allaité :

	N	%	% ajusté *
Allaitement exclusif	450	75,0	76,5
Allaitement prédominant	44	7,3	7,5
Mixte	94	15,7	16,0
Sous total	588	98,0	100,0
Sans réponse	12	2,0	
TOTAL	600	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 2 mois**

**Tableau 8**

Si bébé n'est plus allaité :

	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>% ajusté *</b>
2 semaines ou moins	12	4,5	9,6
3 à 4 semaines	60	22,6	48,0
5 à 6 semaines	23	8,6	18,4
7 à 8 semaines	24	9,0	19,2
Plus de 2 mois	6	2,3	4,8
Sous total	125	47,0	100,0
Sans réponse	141	53,0	
TOTAL	266	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 2 mois**

**Tableau 9**

Si bébé n'est plus allaité :

<b><sup>re</sup> raison mentionnée pour avoir</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>% ajusté *</b>
Pas assez de lait ou bébé non satisfait	53	19,9	26,2
Fatigue de la mère	43	16,2	21,3
Pas d'intérêt ou jugé trop exigeant	30	11,3	14,9
Douleur ou problèmes aux seins	18	6,8	8,9
Bébé refuse le sein ou a de la difficulté à téter	12	4,5	5,9
Autre raison	46	17,3	22,8
Sous total	202	75,9	100,0
Sans réponse	64	24,1	
TOTAL	266	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 2 mois**

**Tableau 10**

Si bébé n'est plus allaité :

<sup>e</sup> raison mentionnée pour avoir	N	%	% ajusté *
Fatigue de la mère	30	11,3	33,3
Pas d'intérêt ou jugé trop exigeant	20	7,5	22,2
Pas assez de lait ou bébé non satisfait	10	3,8	11,1
Douleur ou problèmes aux seins	5	1,9	5,6
Bébé refuse le sein ou a de la difficulté à téter	5	1,9	5,6
Autre raison	20	7,5	22,2
Sous total	90	33,8	100,0
Sans réponse	176	66,2	
TOTAL	266	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 4 mois**

**Tableau 11**

	N	%	% ajusté *
Oui	475	43,5	46,7
Non	105	9,6	10,3
Ne s'applique pas car non allaité à 2 mois	437	40,0	43,0
Sous total	1017	93,0	100,0
Sans réponse	76	7,0	
TOTAL	1 093	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 4 mois**

**Tableau 12**

Si bébé est allaité :

	N	%	% ajusté *
Allaitement exclusif	219	46,1	47,0
Allaitement prédominant	72	15,2	15,5
Mixte	175	36,8	37,6
Sous total	466	98,1	100,0
Sans réponse	9	1,9	
TOTAL	475	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 4 mois**

**Tableau 13**

Si bébé n'est plus allaité :

	N	%	% ajusté *
Plus de 2 mois à 2 1/2 mois	21	20,0	25,0
Plus de 2 1/2 mois à 3 mois	0	0,0	0,0
Plus de 3 mois à 3 1/2 mois	44	41,9	52,4
Plus de 3 1/2 mois à 4 mois	15	14,3	17,9
Plus de 4 mois	4	3,8	4,8
Sous total	84	80,0	100,0
Sans réponse	21	20	
TOTAL	105	100	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 4 mois**

**Tableau 14**

Si bébé n'est plus allaité :

<sup>re</sup> raison mentionnée pour avoir	N	%	% ajusté *
Fatigue de la mère	24	22,9	28,6
Pas assez de lait ou bébé non satisfait	21	20,0	25,0
Pas d'intérêt ou jugé trop exigeant	8	7,6	9,5
Bébé refuse le sein ou a de la difficulté à téter	6	5,7	7,1
Douleur ou problèmes aux seins	2	1,9	2,4
Autre raison	23	21,9	27,4
Sous total	84	80,0	100,0
Sans réponse	21	20,0	
TOTAL	105	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 4 mois**

**Tableau 15**

Si bébé n'est plus allaité :

raison mentionnée pour avoir	N	%	% ajusté *
Fatigue de la mère	9	8,6	31,0
Pas d'intérêt ou jugé trop exigeant	5	4,8	17,2
Pas assez de lait ou bébé non satisfait	4	3,8	13,8
Douleur ou problèmes aux seins	1	1,0	3,4
Autre raison	10	9,5	34,5
Sous total	29	27,6	100,0
Sans réponse	76	72,4	
TOTAL	105	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 6 mois**

**Tableau 16**

	N	%	% ajusté *
Oui	307	28,1	32,0
Non	109	10,0	11,4
Ne s'applique pas car non allaité à 4 mois	542	49,6	56,6
Sous total	958	87,6	100,0
Sans réponse	135	12,4	
TOTAL	1 093	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 6 mois**

**Tableau 17**

Si bébé est allaité :

	N	%	% ajusté *
Allaitement exclusif	41	13,4	13,6
Allaitement prédominant	49	16,0	16,3
Mixte	211	68,7	70,1
Sous total	301	98,0	100,0
Sans réponse	6	2,0	
TOTAL	307	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 6 mois**

**Tableau 18**

Si bébé n'est plus allaité :

	N	%	% ajusté *
Plus de 4 mois à 4 1/2 mois	11	10,1	14,1
Plus de 4 1/2 mois à 5 mois	37	33,9	47,4
Plus de 5 mois à 5 1/2 mois	2	1,8	2,6
Plus de 5 1/2 mois à 6 mois	26	23,9	33,3
Plus de 6 mois	2	1,8	2,6
Sous total	78	71,6	100,0
Sans réponse	31	28,4	
TOTAL	109	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 6 mois**

**Tableau 19**

Si bébé n'est plus allaité :

<sup>re</sup> raison mentionnée pour avoir	N	%	% ajusté *
Pas assez de lait ou bébé non satisfait	16	14,7	20,3
Fatigue de la mère	15	13,8	19,0
Bébé refuse le sein ou a de la difficulté à téter	10	9,2	12,7
Pas d'intérêt ou jugé trop exigeant	7	6,4	8,9
Douleur ou problèmes aux seins	4	3,7	5,1
Autre raison	27	24,8	34,2
Sous total	79	72,5	100,0
Sans réponse	30	27,5	
TOTAL	109	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 6 mois**

**Tableau 20**

Si bébé n'est plus allaité :

<sup>e</sup> raison mentionnée pour avoir	N	%	% ajusté *
Fatigue de la mère	6	5,5	22,2
Bébé refuse le sein ou a de la difficulté à téter	6	5,5	22,2
Pas assez de lait ou bébé non satisfait	5	4,6	18,5
Pas d'intérêt ou jugé trop exigeant	3	2,8	11,1
Autre raison	7	6,4	25,9
Sous total	27	24,8	100,0
Sans réponse	82	75,2	
TOTAL	109	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 12 mois**

**Tableau 21**

	N	%	% ajusté *
Oui	56	5,1	6,7
Non	130	11,9	15,5
Ne s'applique pas car non allaité à 6 mois	651	59,6	77,8
Sous total	837	76,6	100,0
Sans réponse	256	23,4	
TOTAL	1 093	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 12 mois**

**Tableau 22**

Si bébé est allaité :

	N	%
Allaitement exclusif	0	0,0
Allaitement prédominant	0	0,0
Mixte	56	100,0
TOTAL	56	100,0

**La situation lors de la visite à 12 mois**

**Tableau 23**

Si bébé n'est plus allaité :

	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>% ajusté *</b>
De 6 à 8 mois	48	36,9	52,7
Plus de 8 mois à 10 mois	23	17,7	25,3
Plus de 10 mois à 12 mois	20	15,4	22,0
Sous total	91	70,0	100,0
Sans réponse	39	30,0	
TOTAL	130	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 12 mois**

**Tableau 24**

Si bébé n'est plus allaité :

<b>re raison mentionnée pour avoir</b>	<b>N</b>	<b>%</b>	<b>% ajusté *</b>
Fatigue de la mère	18	13,8	21,4
Bébé refuse le sein ou a de la difficulté à téter	8	6,2	9,5
Pas d'intérêt ou jugé trop exigeant	7	5,4	8,3
Pas assez de lait ou bébé non satisfait	5	3,8	6,0
Autre raison	46	35,4	54,8
Sous total	84	64,6	100,0
Sans réponse	46	35,4	
TOTAL	130	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".

**La situation lors de la visite à 12 mois**

**Tableau 25**

Si bébé n'est plus allaité :

<sup>e</sup> raison mentionnée pour avoir	N	%	% ajusté *
Pas d'intérêt ou jugé trop exigeant	4	3,1	33,3
Pas assez de lait ou bébé non satisfait	2	1,5	16,7
Bébé refuse le sein ou a de la difficulté à téter	1	0,8	8,3
Autre raison	5	3,8	41,7
Sous total	12	9,2	100,0
Sans réponse	118	90,8	
TOTAL	130	100,0	

\* : le pourcentage ajusté est calculé sur le total des cas excluant les "sans réponse".




### 3. Figures




### 3. FIGURES

- *Données régionales seulement*


**Figure 1**




**Figure 2**




**Figure 3**




**Figure 4**




**Figure 5**



**Figure 6**



**Figure 7**



**Figure 8**






Figure 9




### 3. FIGURES (suite)

- *Données régionales et locales (par territoire de CSSS)*


**Figure 10**




**Figure 11**




**Figure 12**



**Figure 13**



**Figure 14**



## 4. Modèle de grille de collecte des données



**SECTION À REMPLIR PAR L'HÔPITAL :** \_\_\_\_\_ (Nom du CH)

(selon le cas, inscrire la réponse ou encercler le code correspondant)

\_\_\_\_\_ (2 derniers chiffres du no de dossier)

• **Date de naissance de l'enfant :** \_\_\_\_\_ **Date de la sortie du CH :** \_\_\_\_\_  
*jour mois année* *jour mois année*

• **Quel a été le type d'alimentation du bébé à l'hôpital ?** (choisir 1 seule réponse)

- 1. Allaitement exclusif  
(enfant nourri exclusivement avec du lait maternel, au sein ou extrait ; le nourrisson ne reçoit aucun autre aliment ni boisson, ni eau, à l'exception de médicaments ou de quelques gouttes de vitamines ou sels minéraux)
- 2. Allaitement prédominant  
(enfant nourri principalement avec du lait maternel, au sein ou extrait, de même que certains liquides comme l'eau, les jus de fruits ainsi que les médicaments et les gouttes)
- 3. Mixte  
(enfant nourri tantôt au sein, tantôt avec du lait artificiel, ou encore avec d'autres aliments comme les céréales)
- 4. Artificiel  
(enfant nourri uniquement avec du lait artificiel ou du lait de vache)

▼ **Si votre bébé a été allaité à l'hôpital, jusqu'à quel âge voudriez-vous qu'il soit allaité ?** (choisir 1 seule réponse)

- 1. Nombre de jours (préciser) : \_\_\_\_\_
- 2. Nombre de semaines (préciser) : \_\_\_\_\_
- 3. Nombre de mois (préciser) : \_\_\_\_\_
- 4. Le plus longtemps possible
- 5. Je ne sais pas

• **Moyen(s) utilisé(s) pour nourrir le bébé durant le séjour à l'hôpital :** (plusieurs réponses possibles)

- 1. Sein maternel
- 2. Gobelet « cup »
- 3. Biberon
- 4. Autre (préciser) : \_\_\_\_\_

• **Recommandations particulières :** \_\_\_\_\_

**SECTION À REMPLIR PAR LE CLSC** (*encercler le code correspondant*) :

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1. Témiscaming   | 4. La Sarre       |
| 2. Ville-Marie   | 5. Amos           |
| 3. Rouyn-Noranda | 6. Vallée-de-l'Or |

<b>Visites au CLSC lors de la vaccination</b> ( <i>encercler ou inscrire la réponse ou le code uniquement dans chacune des colonnes</i> )				
	<b>2 mois</b>	<b>4 mois</b>	<b>6 mois</b>	<b>12 mois</b>
• <b>Date de la visite :</b>	Jour__ Mois__ An__	Jour__ Mois__ An__	Jour__ Mois__ An__	Jour__ Mois__ An__
• <b>Actuellement, l'enfant est-il allaité ?</b>	1. Oui 2. Non	1. Oui 2. Non	1. Oui 2. Non	1. Oui 2. Non
• <b><u>Si oui</u>, quel est le type d'allaitement ?</b>	1. Exclusif 2. Prédominant 3. Mixte	1. Exclusif 2. Prédominant 3. Mixte	1. Exclusif 2. Prédominant 3. Mixte	1. Exclusif 2. Prédominant 3. Mixte
• <b><u>Si non</u>, allaitement cessé à l'âge de :</b>  • <b><u>Si non</u>, nommez les <u>deux principales raisons</u> ayant incité à arrêter l'allaitement ou à ne pas le faire :</b>  1. Pas assez de lait ou bébé non satisfait 2. Fatigue de la mère 3. Pas d'intérêt ou trop exigeant 4. Bébé refuse le sein ou a de la difficulté à téter 5. Douleur ou problèmes aux seins 6. Autre	Âge : _____ (précisez en jours, en semaines ou en mois) 99. Ne s'applique pas (jamais allaité)  Raison 1 : _____ Raison 2 : _____  Commentaires (s'il y a lieu) : _____ _____ _____			

**MERCI !**