



Portrait de santé 2011

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, en collaboration avec l'Institut national de Santé publique du Québec et l'Institut de la Statistique du Québec, rendait public en novembre dernier le *Portrait de santé du Québec et de ses régions* (publié en 2 volumes). Le rapport contient plus d'une centaine d'indicateurs décrivant les déterminants de santé et les différents aspects de l'état de santé. Cette publication vise à informer l'ensemble de la population, les acteurs du système de la santé et des services sociaux et ceux des autres secteurs qui ont un impact sur la santé.

Les résultats de la région de la Chaudière-Appalaches traités dans ce fascicule sont tirés de «*Pour guider l'action – Portrait de santé du Québec et de ses régions*» : les statistiques et portent sur les déterminants de santé (démographie, conditions socio-économiques, habitudes de vie, environnement social, milieu de travail) et les problèmes de santé (santé globale, santé maternelle et infantile, maladies chroniques, santé buccodentaire, maladies infectieuses, environnement physique, accidents et blessures, santé mentale, ainsi que les services de santé).

Ce fascicule identifie les principaux déterminants et problèmes de santé pour lesquels la région présente des écarts favorables ou défavorables par rapport au Québec. Un tableau sur l'ampleur des phénomènes est joint pour les lecteurs désirant plus de précisions.

Fenêtre sur Chaudière-Appalaches

Un coup d'œil rapide sur les différences par rapport au Québec

Québec 

Marquise Jacques
Lucie Roy
Sylvie Veilleux



Principaux aspects favorables

Conditions démographiques et socioéconomiques

- ◆ Indice synthétique de fécondité plus élevé
- ◆ Proportion moins élevée de familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans
- ◆ Taux d'emploi plus élevé
- ◆ Taux de chômage plus faible
- ◆ Taux moins élevé de prestataires d'assistance sociale
- ◆ Proportion moins élevée de la population vivant sous le seuil de faible revenu

État de santé globale

- ◆ Espérance de vie à la naissance plus longue
- ◆ Espérance de vie en santé (sans incapacité) plus longue
- ◆ Taux de mortalité moins élevé pour l'ensemble des causes

Santé des mères et des tout-petits

- ◆ Taux moins élevé de :
 - grossesses à l'adolescence
 - interruptions volontaires de grossesse
- ◆ Proportion plus élevée d'enfants dont la mère a pris de l'acide folique
- ◆ Proportion moins élevée de :
 - naissances dont la mère a moins de 11 années de scolarité
 - naissances de faible poids (moins de 2 500 g)
 - naissances présentant une hypotrophie néonatale

Maladies chroniques

- ◆ Taux moins élevé de prévalence du diabète
- ◆ Taux de mortalité moins élevé pour l'ensemble des tumeurs malignes et pour les causes suivantes :
 - côlon, rectum et anus
 - poumon, trachée et bronches
- ◆ Taux de mortalité moins élevé pour l'ensemble des maladies de l'appareil circulatoire et pour les causes suivantes :
 - cardiopathie ischémique
 - infarctus aigu du myocarde



Principaux aspects favorables

Santé buccodentaire

- ◆ Proportion plus élevée de la population consommant de l'eau fluorée artificiellement
- ◆ Taux plus élevé de participation au programme de services dentaires pour les enfants de 0 à 9 ans

Maladies infectieuses

- ◆ Taux moins élevé d'incidence de certaines maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination, particulièrement pour l'hépatite B
- ◆ Proportion plus élevée de vaccination des filles contre le VPH
- ◆ Taux moins élevé d'incidence d'infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)
- ◆ Taux moins élevé de grossesses ectopiques

Environnement physique et santé

- ◆ Proportion moins élevée de la population ayant eu des symptômes de rhinite allergique
- ◆ Proportion moins élevée de logements loués nécessitant des réparations majeures

Travail et santé

- ◆ Durée moyenne d'indemnisation des lésions professionnelles déclarées et acceptées moins longue pour traumatisme et trouble musculo-squelettique

Santé mentale

- ◆ Proportion moins élevée de la population insatisfaite de certains domaines de leur vie :
 - logement
 - situation financière

Environnement social

- ◆ Taux moins élevé d'incidence des prises en charge dans le cadre de la *Loi sur la protection de la jeunesse* pour négligence
- ◆ Taux moins élevé de :
 - jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois
 - décrochage au secondaire du réseau public
 - crimes violents
 - crimes pour violence conjugale



Principaux aspects favorables

Services de santé

- ◆ Proportion moins élevée de la population n'ayant pas de médecin régulier
- ◆ Proportion plus élevée de femmes de 50 à 69 ans ayant passé une mammographie
- ◆ Taux d'hospitalisation moins élevé pour l'ensemble des conditions propices aux soins ambulatoires et pour celles se référant aux conditions médicales suivantes :
 - maladies pulmonaires obstructives chroniques
 - asthme
 - diabète
- ◆ Taux moins élevé de mortalité évitable



Principaux aspects défavorables

Conditions démographiques et socioéconomiques

- ◆ Taux plus faible de l'accroissement de la population
- ◆ Proportion plus élevée de personnes :
 - sans diplôme d'études secondaires
 - sans diplôme de grade universitaire
 - de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti
- ◆ Revenu personnel par habitant inférieur

État de santé globale

- ◆ Taux plus élevé de mortalité pour les causes suivantes :
 - suicide
 - traumatismes non intentionnels
- ◆ Taux plus élevé de mortalité prématurée pour les causes suivantes :
 - traumatismes non intentionnels
 - accidents de véhicule à moteur
- ◆ Taux plus élevé d'hospitalisation pour l'ensemble des diagnostics pour tous les groupes d'âge

Santé des mères et des tout-petits

- ◆ Taux plus faible d'allaitement chez les enfants âgés de 6 mois et moins
- ◆ Taux plus élevé de :
 - césarienne
 - épisiotomie
 - déchirure du périnée du troisième ou du quatrième degré
- ◆ Taux plus élevé de prévalence de certaines anomalies congénitales plus particulièrement pour :
 - cardiopathie congénitale
 - fente palatine
- ◆ Taux plus élevé d'hospitalisation chez les moins d'un an pour l'ensemble des diagnostics, plus particulièrement pour les suivants :
 - certaines maladies infectieuses
 - maladies de l'appareil respiratoire
 - maladies de l'appareil digestif
 - certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
 - malformations congénitales



Principaux aspects défavorables

Maladies chroniques

- ◆ Proportion moins élevée de la population ayant fait prendre sa tension artérielle
- ◆ Taux plus élevé d'hospitalisation pour l'ensemble des diagnostics, à l'exception des tumeurs malignes
- ◆ Taux plus élevé d'incidence du cancer de la prostate

Santé buccodentaire

- ◆ Proportion plus élevée de la population n'ayant plus de dents naturelles
- ◆ Proportion moins élevée de personnes utilisant la soie dentaire au moins une fois par jour
- ◆ Taux moins élevé de dentistes

Maladies infectieuses

- ◆ Taux plus élevé d'incidence de certaines maladies entériques à déclaration obligatoire dont la campylobactériose et la salmonellose
- ◆ Proportion plus élevée de personnes n'utilisant pas toujours le condom et qui ont eu deux partenaires et plus au cours de l'année

Environnement physique et santé

- ◆ Proportion plus élevée de personnes touchées quotidiennement par un avis d'ébullition de l'eau
- ◆ Proportion moins élevée de la population utilisant le transport en commun comme moyen pour se rendre au travail

Travail et santé

- ◆ Taux plus élevé de travailleurs exposés en milieu de travail aux agresseurs physiques ou chimiques suivants :
 - bruit intense
 - poussières de bois
 - fumée de soudage
 - vapeurs de solvant
- ◆ Taux plus élevé de travailleurs exposés en milieu de travail aux contraintes biomécaniques suivantes :
 - manipulation de charges lourdes
 - efforts en utilisant des outils, des machines
 - vibrations des mains ou des bras



Principaux aspects défavorables

- ◆ Proportion plus élevée de la population ayant un niveau élevé d'effort physique au travail
- ◆ Taux plus élevé d'incidence pour l'ensemble des lésions professionnelles déclarées et acceptées, plus particulièrement pour :
 - traumatismes
- ◆ Taux plus élevé d'incidence à la suite de lésions professionnelles déclarées et acceptées pour les sièges suivants :
 - tête
 - membres supérieurs

Traumatismes non intentionnels

- ◆ Taux plus élevé d'hospitalisation pour l'ensemble des traumatismes non intentionnels et particulièrement pour accidents de véhicules à moteur
- ◆ Taux plus élevé de mortalité pour l'ensemble des traumatismes non intentionnels et particulièrement par accidents de véhicules à moteur
- ◆ Taux plus élevé de condamnations liées à des infractions pour conduite avec facultés affaiblies
- ◆ Taux plus élevé de conducteurs décédés ayant obtenu un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise
- ◆ Proportion moins élevée de conducteurs portant la ceinture de sécurité la nuit

Santé mentale

- ◆ Proportion plus élevée de la population de 65 ans et plus faisant usage d'anxiolytiques, de sédatifs ou d'hypnotiques
- ◆ Taux plus élevé de mortalité par suicide

Environnement social

- ◆ Proportion plus élevée de la population ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale

Services de santé

- ◆ Taux moins élevé de médecins omnipraticiens
- ◆ Taux plus élevé d'hospitalisations liés à des conditions propices aux soins ambulatoires pour un diagnostic d'angine

Portrait de santé, 2011

Statistiques de la région de la Chaudière-Appalaches

	% ou taux	Chaudière-Appalaches				Le Québec
		Données antérieures		Données récentes		Données récentes
Population totale (2006 / 2011)	<i>n^{bre}</i>	396 951	ne	407 773	ne	7 946 832
Population selon l'âge (2006 / 2011)	%	100,0	na	100,0	na	100,0
0-17 ans	%	20,5	ne	19,3	ne	19,1
18-64 ans	%	65,5	ne	64,2	ne	65,1
65 ans et plus	%	14,0	ne	16,5	ne	15,8
Âge médian (2006 / 2011)	<i>ans</i>	41,3	ne	43,0	ne	41,5
Taux d'accroissement annuel moyen (2001-2006 / 2006-2011)	<i>pour 1 000</i>	3,1	ne	5,4	ne	8,1
FÉCONDITÉ ET NAISSANCES						
Taux de fécondité selon l'âge de la mère (1984-1988 / 2004-2008)						
15-19 ans	<i>pour 1 000</i>	9,2	(-)	6,3	(-)	10,0
20-24 ans	<i>pour 1 000</i>	76,5	(+)	57,5	(+)	52,3
25-29 ans	<i>pour 1 000</i>	141,6	(+)	149,9	(+)	112,0
30-34 ans	<i>pour 1 000</i>	67,6	(+)	109,5	(+)	103,7
35-39 ans	<i>pour 1 000</i>	17,4	ns	30,5	(-)	40,0
40-49 ans	<i>pour 1 000</i>	1,4	ns	1,7	(-)	3,1
Indice synthétique de fécondité (1999-2003 / 2004-2008)	<i>enfants par femme</i>	1,57	ne	1,79	ne	1,62
Âge moyen à la maternité (1999-2003 / 2004-2008)	<i>ans</i>	28,5	ne	29,1	ne	29,5
ÉTAT MATRIMONIAL ET FAMILLE						
Répartition de la population de 18 ans et plus selon l'état matrimonial de fait (2001 / 2006)						
Célibataires (jamais légalement mariés)	%	23,0	ne	22,6	ne	25,2
Légalement mariés (et non séparés)	%	45,6	ne	41,5	ne	39,4
Partenaires en union libre	%	18,4	ne	22,6	ne	20,4
Séparés	%	1,4	ne	1,3	ne	1,8
Divorcés	%	5,2	ne	5,5	ne	6,9
Veufs	%	6,5	ne	6,5	ne	6,3
Répartition des familles avec enfants de moins de 18 ans selon la structure de la famille (2001 / 2006)						
Couples actuellement mariés	%	54,1	ne	42,2	ne	44,5
Couples vivant en union libre	%	29,0	ne	39,1	ne	31,8
Monoparentales	%	16,9	ne	18,7	ne	23,7
Proportion d'enfants de moins de 18 ans vivant avec un seul parent (2001 / 2006)	%	14,0	ne	16,3	ne	20,8
IMMIGRATION ET LANGUE						
Proportion d'immigrants (2001 / 2006)	%	1,0	ne	1,2	ne	11,5
Répartition de la population selon la langue parlée le plus souvent à la maison (2001 / 2006)						
Français	%	99,6	ne	99,1	ne	82,7
Anglais	%	0,3	ne	0,5	ne	10,2
Autres langues	%	0,1	ne	0,3	ne	7,1
SCOLARITÉ						
Répartition de la population de 25-64 ans selon le plus haut niveau de scolarité (2007 / 2009)						
Sans diplôme d'études secondaires	%	20,7	ne	22,6	ne	16,6
Diplôme d'études secondaires	%	20,1	ne	19,1	ne	20,9
Certificat ou diplôme d'études postsecondaires	%	46,4	ne	44,4	ne	39,6
Grade universitaire	%	12,7	ne	13,8	ne	22,9
EMPLOI ET CHÔMAGE						
Taux d'emploi chez les 15 ans et plus (2008 / 2009)	%	62,7	ne	62,7	ne	59,7
Taux de chômage chez les 15 ans et plus (2008 / 2009)	%	5,0	ne	5,9	ne	8,5
PAUVRETÉ ET REVENU						
Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu selon la mesure du faible revenu (MFR) après impôt (2005 / 2007)	%	7,2	ne	7,7	ne	12,7
Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu (SFR) avant impôt (2000 / 2005)	%	12,7	ne	10,0	ne	17,2
Revenu personnel par habitant (2007 / 2009)	\$	30 185	ne	31 599	ne	33 623
SÉCURITÉ DU REVENU						
Taux de prestataires d'assistance sociale (2009 / 2010)	<i>pour 100</i>	4,5	ne	4,5	ne	7,6
Proportion de la population de 65 ans et plus bénéficiant du Supplément de revenu garanti (2005 / 2010)	%	58,3	ne	53,3	ne	45,9
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE						
Proportion de la population de 12 ans et plus dont le ménage a connu une insécurité alimentaire (2005 / 2007-2008)	%	3,9	ns	* 4,4	ns	6,0
ÉTAT DE SANTÉ GLOBALE						
PERCEPTION DE L'ÉTAT DE SANTÉ						
Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé (2005 / 2007-2008)	%	9,3	ns	8,8	ns	9,8

Portrait de santé, 2011

Statistiques de la région de la Chaudière-Appalaches

A-2

	Chaudière-Appalaches					Le Québec
	% ou taux	Données antérieures		Données récentes		Données récentes
ESPÉRANCE DE VIE						
Espérance de vie à la naissance (1985-1989 / 2005-2008)	ans	76,5	(+)	81,4	(+)	80,8
ESPÉRANCE DE SANTÉ						
Espérance de vie en bonne santé (sans incapacité) (2001 / 2006)	ans	68,3	ne	69,5	ne	67,4
Espérance de vie ajustée en fonction de l'état de santé (EVAS) (2003 / 2007-2008)	ans	71,5	ns	73,3	ns	72,8
LIMITATIONS ET INCAPACITÉS						
Proportion de la population de 12 ans et plus limitée dans sa participation à des d'activités (2005 / 2007-2008)	%	26,4	ns	21,0	ns	23,5
Proportion de la population ayant une incapacité (2001 / 2006)	%	9,5	ne	10,3	ne	12,6
Proportion de la population de 65 ans et plus ayant besoin d'aide pour les activités de la vie quotidienne (2005 / 2007-2008)	%	22,7	ns	* 14,6	ns	19,3
Proportion de la population de 12 ans et plus ayant des problèmes de santé fonctionnelle (2003 / 2007-2008)	%	14,6	ns	13,9	ns	13,5
ENFANTS HANDICAPÉS						
Taux d'enfants handicapés (2008 / 2009)	pour 1000	20,9	ne	21,5	ne	23,3
PRINCIPALES CAUSES DE MORTALITÉ						
Répartition des décès selon la cause (2005-2008)	%	nd		100,0	na	100,0
Tumeurs malignes	%	nd		32,2	ne	32,8
Maladies du cœur	%	nd		19,5	ne	19,8
Voies respiratoires inférieures	%	nd		4,9	ne	4,9
Maladies vasculaires cérébrales	%	nd		5,0	ne	4,8
Traumatismes non intentionnels	%	nd		5,0	ne	3,8
Maladie d'Alzheimer	%	nd		2,9	ne	3,5
Diabète sucré	%	nd		2,7	ne	2,7
Suicide	%	nd		2,7	ne	2,1
Grippe et pneumopathie	%	nd		1,8	ne	2,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie	%	nd		1,8	ne	1,7
Autres causes	%	nd		21,4	ne	21,9
MORTALITÉ SELON LA CAUSE						
Taux de mortalité pour l'ensemble des causes (2000-2004 / 2005-2008)	pour 100 000	756	(-)	688	(-)	724
Certaines maladies infectieuses	pour 100 000	nd		9	(-)	15
Tumeurs malignes	pour 100 000	nd		221	(-)	238
Maladies endocriniennes	pour 100 000	nd		26	ns	30
Système nerveux	pour 100 000	nd		41	ns	44
Appareil circulatoire	pour 100 000	nd		181	(-)	192
Appareil respiratoire	pour 100 000	nd		62	ns	64
Appareil digestif	pour 100 000	nd		24	ns	27
Appareil génito-urinaire	pour 100 000	nd		16	ns	16
Traumatismes	pour 100 000	nd		35	(+)	27
Suicide	pour 100 000	nd		19	(+)	15
MORTALITÉ PRÉMATURÉE						
Taux d'années potentielles de vie perdues selon la cause (2000-2004 / 2005-2008)	pour 100 000	5 368	ns	4 732	(-)	5 018
Tumeurs malignes	pour 100 000	nd		1 612	(-)	1 773
Côlon, rectum et anus	pour 100 000	nd		140	ns	172
Poumon, trachée et bronches	pour 100 000	nd		510	ns	567
Sein chez la femme	pour 100 000	nd		307	ns	335
Appareil circulatoire	pour 100 000	nd		630	(-)	766
Cardiopathies ischémiques	pour 100 000	nd		381	(-)	440
Maladies vasculaires cérébrales	pour 100 000	nd		89	ns	108
Appareil respiratoire	pour 100 000	nd		144	ns	174
Traumatismes non intentionnels	pour 100 000	nd		726	(+)	564
Accidents de véhicules à moteur	pour 100 000	nd		450	(+)	297
Suicide	pour 100 000	nd		553	ns	483
HOSPITALISATION ET MORTALITÉ CHEZ LES 1-19 ANS						
Taux d'hospitalisation pour l'ensemble des diagnostics (2002-2006 / 2006-2009)	pour 10 000	346,0	(+)	339	(+)	281
Certaines maladies infectieuses et parasitaires	pour 10 000	nd		36	(+)	21
Appareil respiratoire	pour 10 000	nd		101	(+)	71
Appareil digestif	pour 10 000	nd		52	(+)	41
Lésions traumatiques et empoisonnements	pour 10 000	nd		38	ns	39

Portrait de santé, 2011

Statistiques de la région de la Chaudière-Appalaches

	% ou taux	Chaudière-Appalaches			Le Québec
		Données antérieures	Données récentes	Données récentes	
Taux de mortalité pour l'ensemble des causes (2000-2004 / 2005-2008)					
Tumeurs malignes	pour 100 000	33 (+)	25 ns	21	
Système nerveux	pour 100 000	nd	* 3 ns	3	
Appareil circulatoire	pour 100 000	nd	** n.p. nd	1	
Traumatismes non intentionnels	pour 100 000	nd	** n.p. nd	1	
Accidents de véhicules à moteur	pour 100 000	nd	13,0 ns	9	
Suicide	pour 100 000	nd	* 10,0 (+)	6	
	pour 100 000	nd	* 3 ns	3	
HOSPITALISATION ET MORTALITÉ CHEZ LES 20 À 64 ANS					
Taux d'hospitalisation pour l'ensemble des diagnostics (2002-2006 / 2006-2009)					
Tumeurs malignes	pour 10 000	617 (+)	606 (+)	582	
Appareil circulatoire	pour 10 000	nd	43 ns	44	
Appareil respiratoire	pour 10 000	nd	81 (+)	69	
Appareil digestif	pour 10 000	nd	30 (+)	28	
Système ostéo-articulaire	pour 10 000	nd	71 (+)	68	
Appareil génito-urinaire	pour 10 000	nd	27 ns	26	
Lésions traumatiques et empoisonnements	pour 10 000	nd	38 (+)	35	
	pour 10 000	nd	48 (+)	46	
Taux de mortalité pour l'ensemble des causes (2000-2004 / 2005-2008)					
Tumeurs malignes	pour 100 000	241 (-)	234 (-)	248	
Poumon, trachée et bronches	pour 100 000	nd	105 ns	109	
Appareil circulatoire	pour 100 000	nd	37 ns	37	
Cardiopathies ischémiques	pour 100 000	nd	39 (-)	45	
Traumatismes non intentionnels	pour 100 000	nd	26 ns	28	
Accidents de véhicules à moteur	pour 100 000	nd	24 (+)	19	
Suicide	pour 100 000	nd	12 (+)	9	
	pour 100 000	nd	24 (+)	21	
HOSPITALISATION ET MORTALITÉ CHEZ LES 65 ANS ET PLUS					
Taux d'hospitalisation pour l'ensemble des diagnostics (2002-2006 / 2006-2009)					
Tumeurs malignes	pour 10 000	2 321 (+)	2 177 (+)	2 045	
Appareil circulatoire	pour 10 000	nd	215 (-)	231	
Cardiopathies ischémiques	pour 10 000	nd	619 (+)	544	
Appareil respiratoire	pour 10 000	nd	222 (+)	196	
Appareil digestif	pour 10 000	nd	309 (+)	267	
Lésions traumatiques et empoisonnements	pour 10 000	nd	219 ns	212	
	pour 10 000	nd	170 ns	175	
Taux de mortalité pour l'ensemble des causes (2000-2004 / 2005-2008)					
Tumeurs malignes	pour 100 000	4 161 (-)	3 832 (-)	3 998	
Organes digestifs	pour 100 000	nd	1 127 (-)	1 208	
Poumon, trachée et bronches	pour 100 000	nd	322 ns	342	
Appareil circulatoire	pour 100 000	nd	298 (-)	353	
Cardiopathies ischémiques	pour 100 000	nd	1 124 ns	1 171	
Appareil respiratoire	pour 100 000	nd	531 (-)	621	
	pour 100 000	nd	411 ns	417	
SANTÉ DES MÈRES ET DES TOUT-PETITS					
GROSSESSE CHEZ LES JEUNES					
Taux de grossesse chez les jeunes de 14-17 ans (1998-2002 / 2003-2007)					
Naissances totales	pour 1 000	9,1 (-)	6,9 (-)	14,2	
Interruptions volontaires de grossesses (IVG)	pour 1 000	nd	1,4 (-)	3,0	
	pour 1 000	nd	5,4 (-)	10,8	
Taux de grossesse chez les jeunes de 18-19 ans (1998-2002 / 2003-2007)					
Naissances totales	pour 1 000	40,2 (-)	33,8 (-)	57,5	
Interruptions volontaires de grossesses (IVG)	pour 1 000	nd	13,6 (-)	19,9	
	pour 1 000	nd	19,2 (-)	35,7	
TABAC ET ALCOOL PENDANT LA GROSSESSE					
Proportion d'enfants de 6 mois dont la mère a fumé la cigarette pendant la grossesse (2005-2006)	%	nd	17,6 ns	17,7	
Proportion d'enfants de 6 mois dont la mère a consommé de l'alcool pendant la grossesse (2005-2006)	%	nd	39,6 ns	34,1	
PRISE D'ACIDE FOLIQUE ET ALLAITEMENT					
Proportion d'enfants de 6 mois dont la mère a pris de l'acide folique les 3 mois avant le début de la grossesse (2005-2006)	%	nd	64,2 (+)	48,1	
Proportion d'enfants de 6 mois dont la mère a pris de l'acide folique les 3 premiers mois de la grossesse (2005-2006)	%	nd	92,6 (+)	84,1	
Taux d'allaitement total selon la durée (2005-2006)					
Hôpital ou maison de naissance	%	nd	80,3 ns	85,1	
2 ^e mois	%	nd	57,0 (-)	66,7	
4 ^e mois	%	nd	47,6 (-)	56,1	
6 ^e mois	%	nd	35,7 (-)	46,7	

Portrait de santé, 2011
Statistiques de la région de la Chaudière-Appalaches

A-4

	Chaudière-Appalaches				Le Québec	
	% ou taux	Données antérieures	Données récentes		Données récentes	
Taux d'allaitement exclusif selon la durée (2005-2006)						
Hôpital ou maison de naissance	%	nd	43,7	(-)	52,1	
2 ^e mois	%	nd	24,8	(-)	35,1	
4 ^e mois	%	nd	11,9	(-)	19,7	
6 ^e mois	%	nd	** n.p.	nd	3,0	
MÈRES FAIBLEMENT SCOLARISÉES						
Proportion de naissances dont la mère a moins de 11 années de scolarité (2001-2005 / 2006-2008)	%	8,0	(-)	3,8	(-)	7,3
CÉSARIENNES, ÉPISIOTOMIES ET DÉCHIRURES PÉRINÉALES						
Taux de césarienne (région de traitement) (2001-2006 / 2006-2009)	pour 100	24,3	(+)	25,3	(+)	23,1
Taux d'épisiotomie (région de traitement) (2001-2006 / 2006-2009)	pour 100	39,1	(+)	37,0	(+)	21,2
Taux de déchirure du périnée du troisième ou du quatrième degré (région de traitement) (2001-2006 / 2006-2009)	pour 100	7,7	(+)	8,6	(+)	6,6
INSUFFISANCE DE POIDS, PRÉMATURITÉ ET HYPOTROPHIE NÉONATALE						
Proportion de naissances de faible poids (1999-2003 / 2004-2008)						
Moins de 1 500 grammes	%	0,8	ns	0,8	ns	1,0
Moins de 2 500 grammes	%	4,9	(-)	5,2	(-)	5,7
Proportion de naissances prématurées (1999-2003 / 2004-2008)	%	7,4	ns	7,4	ns	7,6
Proportion de naissances présentant une hypotrophie néonatale (1999-2003 / 2004-2008)	%	7,6	(-)	7,0	(-)	8,1
ANOMALIES CONGÉNITALES						
Taux de prévalence de certaines anomalies congénitales (1997-2002 / 2003-2008)						
Anomalies du tube neural	pour 10 000	* 8,2	ns	* 4,4	ns	2,8
Cardiopathies congénitales	pour 10 000	152,8	ns	159,4	(+)	128,6
Fente palatine	pour 10 000	* 11,3	ns	* 11,5	(+)	6,7
Fente labiale associée ou non à une fente palatine	pour 10 000	** n.p.	nd	* 7,1	ns	6,7
Anomalies réductionnelles des membres	pour 10 000	* 4,3	ns	* 3,6	ns	4,3
Syndrome de Down	pour 10 000	* 15,2	ns	* 9,5	ns	10,0
HOSPITALISATION AU COURS DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE VIE						
Taux d'hospitalisation pour l'ensemble des diagnostics (2002-2006 / 2006-2009)	pour 10 000	8 109	(+)	9 556	(+)	7 826
Certaines maladies infectieuses	pour 10 000	nd		254	(+)	180
Appareil respiratoire	pour 10 000	nd		918	(+)	682
Appareil digestif	pour 10 000	nd		241	(+)	193
Appareil génito-urinaire	pour 10 000	nd		144	ns	144
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	pour 10 000	nd		6 202	(+)	5 342
Malformations congénitales	pour 10 000	nd		991	(+)	715
MORTALITÉ FOETO-INFANTILE						
Taux de mortalité fœtale (2000-2004 / 2005-2008)	pour 1 000	3,2	ns	3,4	ns	4,2
Taux de mortalité infantile (2000-2004 / 2005-2008)	pour 1 000	3,0	ns	2,8	ns	3,3
HABITUDES DE VIE						
CONSOMMATION DE FRUITS ET DE LÉGUMES						
Proportion de la population de 12 ans et plus consommant des fruits et des légumes moins de 5 fois par jour (2003 / 2007-2008)	%	51,9	ns	46,5	ns	47,4
ACTIVITÉ PHYSIQUE						
Proportion de la population de 12-17 ans peu ou pas active durant les loisirs (2005 / 2007-2008)	%	32,4	ns	* 28,7	ns	33,6
Proportion de la population de 18 ans et plus sédentaire durant les loisirs (2005 / 2007-2008)	%	24,8	ns	25,2	ns	25,8
Proportion de la population de 12 ans et plus inactive physiquement durant les loisirs (2005 / 2007-2008)	%	52,1	ns	54,1	ns	52,9
Proportion de la population de 12 ans et plus inactive physiquement durant le transport et les loisirs (2007-2008)	%	nd		51,9	ns	49,7
TABAGISME						
Proportion de fumeurs (total) de 12 ans et plus (2005 / 2007-2008)	%	23,6	ns	21,4	ns	24,2
Proportion de la population de 12 ans et plus fumant 11 cigarettes ou plus par jour (2005 / 2007-2008)	%	13,5	ns	11,2	ns	12,4
TABAC ET CONTRACEPTION HORMONALE COMBINÉE						
Proportion de femmes de 15-49 ans fumant la cigarette et utilisant une contraception hormonale combinée (2008)	%	nd		29,0	ns	23,5
CONSOMMATION ÉLEVÉE D'ALCOOL						
Proportion de la population de 12 ans et plus ayant pris 14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine (2003 / 2005)	%	6,3	ns	8,7	ns	7,1
Proportion de la population de 12 ans et plus présentant une consommation abusive d'alcool au cours d'une période de 12 mois (2005 / 2007-2008)	%	17,6	ns	18,0	ns	17,3
CONSOMMATION DE DROGUES						
Proportion de la population de 15 ans et plus ayant consommé au moins une drogue (2008)	%	nd		11,4	ns	13,1

Portrait de santé, 2011

Statistiques de la région de la Chaudière-Appalaches

	% ou taux	Chaudière-Appalaches		Le Québec
		Données antérieures	Données récentes	Données récentes
MALADIES CHRONIQUES				
MALADIES CHRONIQUES AUTO-DÉCLARÉES				
Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques chez les 12 ans et plus (2005 / 2007-2008)				
Maux de dos, autres que la fibromyalgie et l'arthrite	%	15,3	ns 18,5	ns 17,6
Hypertension	%	15,8	ns 16,9	ns 16,1
Arthrite sauf la fibromyalgie	%	nd	11,9	ns 11,2
Migraines	%	8,7	ns 8,2	ns 9,3
Asthme	%	6,2	ns 7,5	ns 8,5
Diabète	%	6,4	ns 5,2	ns 5,9
Maladie cardiaque	%	5,1	ns 5,5	ns 5,5
Trouble d'anxiété	%	* 4,3	ns 5,3	ns 5,2
Trouble de l'humeur	%	* 3,8	ns * 4,7	ns 4,8
Troubles intestinaux	%	* 2,8	ns * 2,7	ns 3,2
DIABÈTE				
Taux de prévalence du diabète (population d'un an et plus) (2005-2006 / 2006-2007)	pour 100	5,3	(-) 5,5	(-) 6,0
Taux de mortalité par diabète (2000-2004 / 2005-2008)	pour 100 000	21,0	(-) 18,4	ns 19,8
HYPERTENSION				
Proportion de la population de 18 ans et plus ayant fait prendre sa tension artérielle (2008)	%	nd	76,9	(-) 83,3
Proportion de la population de 18 ans et plus ayant un problème d'hypertension (2005 / 2007-2008)	%	17,3	18,5	17,6
POIDS CORPOREL				
Proportion de la population de 18 ans et plus faisant de l'embonpoint (2005 / 2007-2008)	%	33,9	ns 36,4	ns 32,7
Proportion de la population de 18 ans et plus souffrant d'obésité (2005 / 2007-2008)	%	14,5	ns 13,6	ns 15,5
Proportion de la population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids (2005 / 2007-2008)	%	48,4	ns 50,0	ns 48,2
Proportion de la population de 18 ans et plus présentant une insuffisance de poids (2005 / 2007-2008)	%	* 2,9	ns * 2,7	ns 2,8
MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE				
Taux d'hospitalisation pour l'ensemble des diagnostics (2002-2006 / 2006-2009)	pour 10 000	881	(+) 853	(+) 792
Tumeurs malignes	pour 10 000	nd	56	(-) 61
Appareil circulatoire	pour 10 000	nd	136	(+) 120
Appareil respiratoire	pour 10 000	nd	92	(+) 77
Appareil digestif	pour 10 000	nd	88	(+) 83
Système ostéo-articulaire	pour 10 000	nd	39	(+) 37
Appareil génito-urinaire	pour 10 000	nd	44	(+) 42
Lésions traumatiques et empoisonnements	pour 10 000	nd	62	ns 63
INCIDENCE DU CANCER				
Taux d'incidence du cancer (1998-2002 / 2003-2006)	pour 100 000	482	(-) 510	ns 511
Estomac	pour 100 000	nd	10	ns 11
Côlon, rectum et anus	pour 100 000	nd	64	ns 69
Pancréas	pour 100 000	nd	15	ns 14
Poumon, trachée et bronches	pour 100 000	nd	84	ns 90
Sein chez la femme	pour 100 000	nd	132	ns 133
Prostate	pour 100 000	nd	141	(+) 125
Vessie	pour 100 000	nd	26	ns 27
Rein	pour 100 000	nd	15	ns 16
Lymphome non hodgkinien	pour 100 000	nd	23	ns 21
Leucémie	pour 100 000	nd	15	ns 14
MORTALITÉ PAR TUMEURS MALIGNES				
Taux de mortalité par tumeurs malignes (2000-2004 / 2005-2008)	pour 100 000	239	(-) 221	(-) 238
Estomac	pour 100 000	nd	8	ns 7
Côlon, rectum et anus	pour 100 000	nd	23	(-) 29
Pancréas	pour 100 000	nd	15	ns 13
Poumon, trachée et bronches	pour 100 000	nd	64	(-) 73
Sein chez la femme	pour 100 000	nd	27	ns 31
Prostate	pour 100 000	nd	23	ns 23
Vessie	pour 100 000	nd	5	ns 6
Cerveau, méningues et autres parties du système nerveux central	pour 100 000	nd	7	ns 6
Lymphome non hodgkinien	pour 100 000	nd	8	ns 8
Leucémie	pour 100 000	nd	8	ns 7

Portrait de santé, 2011
Statistiques de la région de la Chaudière-Appalaches

A-6

		Chaudière-Appalaches				Le Québec
	% ou taux	Données antérieures		Données récentes		Données récentes
MORTALITÉ PAR MALADIES DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE						
Taux de mortalité pour l'ensemble des maladies de l'appareil circulatoire (2000-2004 / 2005-2008)	pour 100 000	217	(-)	181	(-)	192
Cardiopathies ischémiques	pour 100 000	109	(-)	90	(-)	104
Infarctus aigu du myocarde	pour 100 000	64	(-)	48	(-)	59
Maladies vasculaires cérébrales	pour 100 000	42	ns	35	ns	35
Maladies des artères	pour 100 000	12	ns	9	ns	10
MORTALITÉ PAR MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE						
Taux de mortalité pour l'ensemble des maladies de l'appareil respiratoire (2000-2004 / 2005-2008)	pour 100 000	69	ns	62	ns	64
Grippe et pneumopathie	pour 100 000	12	ns	12	ns	14
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	pour 100 000	41	ns	34	ns	35
SANTÉ BUCCODENTAIRE						
ÉVALUATION DE LA SANTÉ BUCCODENTAIRE						
Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire (2003 / 2007-2008)	%	13,5	ns	10,8	ns	12,0
Proportion de la population de 15 ans et plus n'ayant plus de dents naturelles (2008)	%	nd		13,4	(+)	11,0
CONDITIONS FAVORABLES À LA SANTÉ BUCCODENTAIRE						
Proportion de la population consommant de l'eau fluorée artificiellement (2003 / 2008)	%	2,6	ne	9,4	ne	3,4
Proportion de la population de 15 ans et plus se brossant les dents au moins deux fois par jour (2008)	%	nd		76,9	ns	78,8
Proportion de la population de 15 ans et plus utilisant la soie dentaire au moins une fois par jour (2008)	%	nd		28,2	(-)	33,1
DISPONIBILITÉ ET CONSULTATION D'UN DENTISTE						
Nombre de dentistes par 100 000 habitants (2005 / 2008)	par 100 000	33	ne	35	ne	45
Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consulté un spécialiste des soins dentaires (2005 / 2007-2008)	%	55,1	ns	58,4	ns	60,1
Taux de participation au programme de services dentaires pour les enfants de 0 à 9 ans (2005 / 2008)	par 100	55,7	ne	53,3	ne	45,7
MALADIES INFECTIEUSES						
MALADIES ENTÉRIQUES						
Taux d'incidence de certaines maladies entériques à déclaration obligatoire (2000-2004 / 2005-2009)						
Campylobactériose	pour 100 000	50,8	(+)	39,7	(+)	30,0
Salmonellose	pour 100 000	18,9	(+)	19,4	(+)	14,5
Giardiase	pour 100 000	12,9	ns	13,3	ns	12,2
Amibiase	pour 100 000	* 1,5	(-)	* 1,1	(-)	3,1
Shigellose	pour 100 000	* 1,1	(-)	* 1,5	(-)	2,4
Yersiniose	pour 100 000	2,5	(+)	1,8	ns	1,6
Escherichia coli entéro-hémorragique	pour 100 000	5,0	ns	3,0	(+)	1,9
Hépatite A	pour 100 000	* 1,1	ns	* 0,6	ns	1,1
MALADIES ÉVITABLES PAR LA VACCINATION						
Taux d'incidence de certaines maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination (2000-2004 / 2005-2009)						
Infection invasive à pneumocoque	pour 100 000	11,4	ns	11,6	ns	10,7
Hépatite B	pour 100 000	3,4	(-)	2,6	(-)	13,1
Coqueluche	pour 100 000	16,9	(+)	7,7	ns	7,2
Tuberculose	pour 100 000	* 1,0	(-)	* 1,4	(-)	3,0
VACCINATION CONTRE LE VPH ET LE VHB						
Proportion de filles en 4 ^e année du primaire ayant reçu le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) (2008-2009 / 2009-2010)	%	84,1	ne	84,1	ne	76,3
Proportion de filles en 3 ^e secondaire ayant reçu le vaccin contre le VPH (2008-2009 / 2009-2010)	%	87,0	ne	83,3	ne	76,0
Proportion d'élèves en 4 ^e année du primaire ayant reçu le vaccin contre le virus de l'hépatite B (VHB) (2007-2008 / 2009-2010)	%	90,6	ne	87,2	ne	84,9
VACCINATION CONTRE L'INFLUENZA ET LE PNEUMOCOQUE						
Proportion de la population de 50 ans et plus ayant reçu le vaccin contre l'influenza saisonnière (2006 / 2008)	%	41,6	ns	43,2	ns	46,1
Proportion de la population de 65 ans et plus ayant reçu le vaccin contre le pneumocoque (2006 / 2008)	%	49,4	ns	35,2	ns	48,3
INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG						
Taux d'incidence de certaines ITSS à déclaration obligatoire (2000-2004 / 2005-2009)						
Chlamydia trachomatis	pour 100 000	86,0	(-)	99,0	(-)	181,7
Infection gonococcique	pour 100 000	* 1,6	(-)	3,6	(-)	18,5
Hépatite C	pour 100 000	14,4	(-)	11,2	(-)	26,3
Hépatite B	pour 100 000	3,4	(-)	2,6	(-)	13,1
Syphilis infectieuse	pour 100 000	* 0,6	(-)	* 1,0	(-)	4,2
Infection par le VIH (2002-2004 / 2005-2009)	pour 100 000	* 1,6	(-)	* 0,6	(-)	5,0

Portrait de santé, 2011

Statistiques de la région de la Chaudière-Appalaches

	Chaudière-Appalaches				Le Québec
	% ou taux	Données antérieures	Données récentes		Données récentes
UTILISATION DU CONDOM					
Proportion de la population de 15 ans et plus n'utilisant pas toujours le condom (2008)					
1 partenaire	%	nd	92,0	(+)	89,3
2 partenaires et plus	%	nd	76,2	(+)	58,9
DISTRIBUTIONS DE SERINGUES AUX UDI					
Nombre de seringues par utilisateur de drogues par injection (2008-2009 / 2009-2010)	<i>n^{bre}</i>	15,5	ne	13,1	ne
GROSSESSES ECTOPIQUES					
Taux de grossesses ectopiques (2001-2006 / 2006-2009)	<i>pour 1 000</i>	8,7	(-)	7,7	(-)
INFECTIONS NOSOCOMIALES					
Taux d'incidence du SARM d'origine nosocomiale (région de traitement) (2006-2009)	<i>pour 10 000</i>	nd	0,74	ne	0,46
Taux d'incidence de clostridium difficile (DACD) d'origine nosocomiale (région de traitement) (2007-2008 / 2008-2009)	<i>pour 10 000</i>	6,7	ne	6,2	ne
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET SANTÉ					
EAU POTABLE					
Répartition de la population selon la source d'approvisionnement en eau potable (2009)	%	nd	100,0	na	100,0
Eaux de surface	%	nd	46,5	ne	71,3
Eaux souterraines	%	nd	27,8	ne	13,0
Eaux mixtes	%	nd	0,0	ne	3,3
Inconnue	%	nd	25,8	ne	12,4
Répartition de la population approvisionnée en eau de surface selon le type de traitement de l'eau potable (2009)	%	nd	100,0	na	100,0
Chloration seulement ou oxydation	%	nd	11,9	ne	7,4
Traitement conforme	%	nd	34,2	ne	18,9
Traitement avancé	%	nd	54,0	ne	73,6
Proportion moyenne de personnes touchées quotidiennement par un avis de non consommation en vigueur (2005-2008)	%	nd	0,1	ne	0,0
Proportion moyenne de personnes touchées quotidiennement par un avis d'ébullition en vigueur (2005-2008)	%	nd	1,1	ne	0,4
AIR EXTÉRIEUR					
Proportion de jours avec une mauvaise qualité de l'air (2007 / 2008)	%	2,2	ne	0,8	ne
Répartition (parmi les régions du Québec) des émissions atmosphériques générées par les industries (2002-2008)	%	nd	2,4	na	100,0
SO ₂	%	nd	3,3	na	100,0
CO	%	nd	0,5	na	100,0
NO _x	%	nd	7,0	na	100,0
Particules totales en suspensions	%	nd	4,1	na	100,0
COV	%	nd	10,8	na	100,0
Répartition (parmi les régions du Québec) des émissions atmosphériques générées par les véhicules moteurs pour l'ensemble des polluants) (2005 / 2006)	%	10,2	na	10,1	na
CO	%	nd	10,2	na	100,0
NO _x	%	nd	9,6	na	100,0
COV	%	nd	10,2	na	100,0
Autres polluants (NH ₃ , SO _x et PM)	%	nd	9,8	na	100,0
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ POUR SE RENDRE AU TRAVAIL					
Répartition de la population de 15 ans et plus active occupée selon le mode de transport utilisé pour se rendre au travail (1996 / 2006)	%	100,0	na	100,0	na
Conducteur	%	82,2	ne	83,6	ne
Passager	%	6,1	ne	6,0	ne
Transport en commun	%	1,7	ne	2,0	ne
À pied	%	8,4	ne	6,6	ne
À bicyclette	%	0,8	ne	0,8	ne
Autres moyens	%	0,7	ne	0,9	ne
RHINITE ALLERGIQUE					
Proportion de la population de 15 ans et plus ayant eu des symptômes de rhinite allergique (2008)	%	nd	14,5	(-)	16,8
EXPOSITION À LA FUMÉE SECONDAIRE					
Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés régulièrement à la fumée secondaire à la maison (2005 / 2007-2008)	%	13,2	ns	11,9	ns
Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés régulièrement à la fumée secondaire dans les lieux publics (2005 / 2007-2008)	%	19,7	ns	* 5,7	ns
Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés régulièrement à la fumée secondaire dans un véhicule privé (2005 / 2007-2008)	%	8,6	ns	8,3	ns

Portrait de santé, 2011
Statistiques de la région de la Chaudière-Appalaches

A-8

	% ou taux	Chaudière-Appalaches				Le Québec
		Données antérieures		Données récentes		Données récentes
INTERDICTION DE FUMER À DOMICILE						
Proportion de la population de 12 ans et plus vivant dans un domicile où il est interdit de fumer (2005 / 2007-2008)	%	40,0	ns	47,7	ns	51,9
ÉTAT DU LOGEMENT						
Proportion de logements nécessitant des réparations majeures (2001 / 2006)	%	7,4	ne	6,7	ne	7,7
Logements loués	%	6,1	ne	6,2	ne	8,9
Logements possédés	%	7,9	ne	6,9	ne	6,9
INTOXICATIONS						
Taux d'appels pour intoxications au Centre antipoison du Québec (1999-2003 / 2004-2008)	pour 100 000	628	(-)	612	(-)	635
Produits domestiques	pour 100 000	nd		291	ns	290
Médicaments	pour 100 000	nd		250	(-)	285
Autres produits	pour 100 000	nd		71	(+)	60
CANCERS ASSOCIÉS À DES FACTEURS DE RISQUE ENVIRONNEMENTAUX						
Taux d'incidence pour certains cancers associés à des facteurs de risque environnementaux (2003-2006)						
Côlon, rectum et anus	pour 100 000	nd		64	ns	69
Poumon, trachée et bronches	pour 100 000	nd		84	ns	90
Vessie	pour 100 000	nd		26	ns	27
Rein	pour 100 000	nd		15	ns	16
Cerveau, méninges et autres parties du système nerveux central	pour 100 000	nd		11	(+)	9
Glande thyroïde	pour 100 000	nd		9	ns	10
Maladie de Hodgkin	pour 100 000	nd		3	ns	3
Lymphome non hodgkinien	pour 100 000	nd		23	ns	21
Leucémie	pour 100 000	nd		15	ns	14
HOSPITALISATION ET MORTALITÉ ASSOCIÉES À DES FACTEURS DE RISQUE ENVIRONNEMENTAUX						
Taux d'hospitalisation pour certains diagnostics associés à des facteurs de risque environnementaux (2006-2009)						
Infarctus aigu du myocarde	pour 10 000	nd		21	(+)	20
Troubles du rythme cardiaque	pour 10 000	nd		17	(+)	16
Insuffisance cardiaque et œdème pulmonaire	pour 10 000	nd		19	(+)	16
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë	pour 10 000	nd		10	(+)	7
Asthme	pour 10 000	nd		3	(-)	5
Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires	pour 10 000	nd		3	(+)	3
Avortements spontanés	pour 10 000	nd		2	(-)	3
Malformations congénitales	pour 10 000	nd		13	(+)	10
Taux de mortalité pour certaines causes associées à des facteurs de risque environnementaux (2005-2008)						
Mélanome de la peau	pour 100 000	nd		* 2	ns	2
Tumeur maligne du rein	pour 100 000	nd		4	ns	5
Troubles du rythme cardiaque	pour 100 000	nd		12	(+)	10
Insuffisance cardiaque et œdème pulmonaire	pour 100 000	nd		16	ns	13
Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires	pour 100 000	nd		4	ns	5
TRAVAIL ET SANTÉ						
POPULATION DE TRAVAILLEUSES ET DE TRAVAILLEURS						
Répartition de la population de 15 ans et plus active occupée selon le type d'industrie (région de travail) (2001 / 2006)	%	100,0	na	100,0	na	100,0
Secteur primaire	%	7,8	ne	6,6	ne	2,6
Fabrication	%	29,8	ne	27,0	ne	15,4
Construction	%	3,1	ne	3,6	ne	2,9
Services publics, transport	%	4,0	ne	4,1	ne	4,9
Commerce	%	14,2	ne	15,2	ne	17,2
Information, culture	%	1,5	ne	1,8	ne	4,4
Finance, assurances	%	7,3	ne	8,0	ne	8,7
Services professionnels	%	2,5	ne	3,2	ne	6,5
Enseignement	%	5,8	ne	5,7	ne	7,3
Santé et services sociaux	%	10,3	ne	11,3	ne	12,2
Hébergement et restauration	%	5,3	ne	5,3	ne	6,5
Administration publique	%	2,9	ne	3,0	ne	6,3
Autres services	%	5,6	ne	5,3	ne	5,0

Portrait de santé, 2011

Statistiques de la région de la Chaudière-Appalaches

	% ou taux	Chaudière-Appalaches				Le Québec
		Données antérieures		Données récentes		Données récentes
Répartition de la population de 15 ans et plus active occupée selon la profession (région de travail) (2001 / 2006)	%	100,0	na	100,0	na	100,0
Gestion	%	7,2	ne	7,4	ne	9,6
Affaires, finance et administration	%	15,1	ne	15,8	ne	19,4
Sciences naturelles	%	4,0	ne	4,5	ne	6,6
Secteur de la santé	%	5,5	ne	5,8	ne	6,6
Sciences sociales	%	7,0	ne	8,0	ne	9,8
Arts, culture	%	1,4	ne	1,6	ne	3,1
Ventes et services	%	20,7	ne	21,0	ne	24,0
Métiers, transport et machinerie	%	15,6	ne	16,2	ne	11,9
Professions propres au secteur primaire	%	6,8	ne	5,8	ne	2,2
Transformation	%	16,5	ne	13,7	ne	6,9
MILIEU DE TRAVAIL						
Proportion de travailleurs de 15 ans et plus exposés à certaines situations à risque en milieu de travail (région de travail) (2008)						
Bruit intense	%	nd		9,7	(+)	7,3
Poussières de bois	%	nd		7,2	(+)	5,0
Fumées de soudage	%	nd		4,9	(+)	2,4
Vapeurs de solvant	%	nd		10,1	(+)	7,1
Gestes répétitifs des mains et des bras	%	nd		38,0	ns	38,8
Manipulation de charges lourdes	%	nd		19,3	(+)	14,3
Efforts en utilisant des outils, des machines	%	nd		27,4	(+)	21,9
Vibrations des mains ou des bras	%	nd		10,9	(+)	7,2
Vibrations de tout le corps	%	nd		6,8	ns	4,9
Proportion de demandes de retrait préventif ou de réaffectation de travailleuses enceintes selon les facteurs de risques à éliminer en milieu de travail (région de travail) (2008-2010)						
Ergonomique	%	nd		90,7	ne	85,4
Chimique	%	nd		34,7	ne	25,8
Biologique	%	nd		50,8	ne	51,4
Physique	%	nd		26,0	ne	18,0
Accident	%	nd		55,2	ne	43,0
Psychosocial	%	nd		35,7	ne	30,3
BLESSURES AU TRAVAIL						
Proportion de la population de 15 à 74 ans victime de blessures au travail (2005 / 2008)	%	* 2,9	ns	3,7	ns	3,3
Proportion de la population de 15 à 74 ans ayant eu une blessure au travail causée par des mouvements répétitifs (2005 / 2008)	%	* 5,0	ns	6,1	ns	7,3
CONTRAINTES PSYCHOSOCIALES AU TRAVAIL						
Proportion de la population de 15-74 ans ayant une faible latitude de décision relative aux compétences requises au travail (2000-2001 / 2005)	%	35,1	ns	26,5	ns	29,5
Proportion de la population de 15-74 ans n'ayant pas une grande latitude de prise de décision au travail (2000-2001 / 2005)	%	48,4	ns	45,9	ns	42,6
Proportion de la population de 15-74 ans ayant un niveau élevé de demandes psychologiques au travail (2000-2001 / 2005)	%	33,8	ns	42,3	ns	40,1
Proportion de la population de 15-74 ans ayant un faible soutien social au travail (2000-2001 / 2005)	%	50,4	ns	50,5	ns	49,2
Proportion de la population de 15-74 ans ayant un niveau élevé d'insécurité d'emploi au travail (2000-2001 / 2005)	%	20,7	ns	18,8	ns	21,7
Proportion de la population de 15-74 ans ayant un niveau élevé d'effort physique au travail (2000-2001 / 2005)	%	48,5	(+)	45,4	(+)	37,2
LÉSIONS PROFESSIONNELLES DÉCLARÉES ET ACCEPTÉES						
Taux d'incidence des lésions professionnelles déclarées et acceptées chez les 15 ans et plus (toutes les natures) (2001 / 2006)	<i>pour 1 000</i>	74,0	(+)	50,9	(+)	45,0
Traumatisme	<i>pour 1 000</i>	46,4	(+)	33,4	(+)	25,8
Trouble musculo-squelettique	<i>pour 1 000</i>	23,6	(+)	14,4	ns	15,4
Autres (incluant surdit� et trouble ou syndrome mental)	<i>pour 1 000</i>	3,9	ns	3,1	(-)	3,8
Incidence des lésions professionnelles déclarées et acceptées chez les 15 ans et plus selon le siège (2001 / 2006)	<i>pour 1 000</i>					
T�te	<i>pour 1 000</i>	7,8	(+)	5,3	(+)	3,9
Tronc (Incluant le cou)	<i>pour 1 000</i>	26,4	(+)	18,1	ns	18,0
Membres sup�rieurs	<i>pour 1 000</i>	22,8	(+)	15,4	(+)	11,7
Membres inf�rieurs	<i>pour 1 000</i>	10,3	(+)	7,7	ns	7,4
Sites multiples, syst�mes et autres	<i>pour 1 000</i>	6,6	(+)	4,4	ns	4,0

Portrait de santé, 2011

Statistiques de la région de la Chaudière-Appalaches

A-10

	% ou taux	Chaudière-Appalaches				Le Québec
		Données antérieures		Données récentes		Données récentes
Durée moyenne d'indemnisation des lésions professionnelles déclarées et acceptées chez les 15 ans et plus (toutes les natures) (2001-2004 / 2005-2008)	jours	47,4	ne	54,6	ne	70,3
Traumatisme	jours	45,2	ne	51,0	ne	69,0
Trouble musculo-squelettique	jours	52,2	ne	60,1	ne	70,4
Trouble ou syndrome mental	jours	127,6	ne	187,5	ne	168,6
Autres (incluant surdité)	jours	40,5	ne	55,4	ne	55,4
Durée moyenne d'indemnisation des lésions professionnelles déclarées et acceptées chez les 15 ans et plus selon le siège (2001-2004 / 2005-2008)	jours					
Tête	jours	15,6	ne	19,1	ne	22,3
Tronc (Incluant le cou)	jours	54,6	ne	63,5	ne	77,2
Membres supérieurs	jours	40,0	ne	44,9	ne	57,5
Membres inférieurs	jours	42,8	ne	51,2	ne	66,3
Sites multiples, systèmes et autres	jours	76,5	ne	83,2	ne	111,3
TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS						
BLESSURES ET CHUTES						
Proportion de la population de 12 ans et plus victime de blessures (2008)	%	11,5	ns	11,1	ns	11,0
Proportion de la population de 12 ans et plus ayant eu une blessure causée par des mouvements répétitifs (2008)	%	9,2	ns	9,6	ns	11,8
Proportion de la population de 65 ans et plus ayant subi une chute (2005 / 2008)	%	* 6,7	ns	* 3,4	ns	3,9
BLESSURES SPORTIVES						
Proportion de la population de 12 ans et plus victime de blessures lors d'activités sportives (2008)	%	* 3,1	ns	2,6	ns	2,7
Proportion de la population de 12 ans et plus victime de blessures lors d'activités sportives causées par des mouvements répétitifs (2008)	%	* 2,4	ns	* 1,7	(-)	2,9
HOSPITALISATION POUR TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS						
Taux d'hospitalisation pour traumatismes non intentionnels (2002-2006 / 2006-2009)	pour 10 000	59,7	(+)	54,6	(+)	50,9
Accidents de véhicules à moteur	pour 10 000	nd		6,6	(+)	5,4
Chocs, chutes d'un objet et compression entre deux objets	pour 10 000	nd		2,8	(+)	2,5
Incendies et brûlures	pour 10 000	nd		0,6	ns	0,5
Intoxications	pour 10 000	nd		0,8	ns	0,9
Chutes	pour 10 000	nd		30,8	ns	30,7
MORTALITÉ PAR TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS						
Taux de mortalité par traumatismes non intentionnels (2000-2004 / 2005-2008)	pour 100 000	33	(+)	35	(+)	27
Accidents de véhicules à moteur	pour 100 000	14	(+)	12	(+)	8
Chutes	pour 100 000	10	ns	13	ns	11
CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES						
Taux de condamnations reliées à des infractions pour conduite avec facultés affaiblies (2006 / 2007)	pour 100 000	331	ne	312	ne	223
Taux de conducteurs décédés ayant obtenu un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise (1991-1999 / 2000-2008)	pour 100 000	6,1	(+)	3,5	(+)	2,0
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DANS LES DÉPLACEMENTS						
Proportion des cyclistes portant le casque de sécurité (2006 / 2008)	%	41,4	(+)	39,3	ns	36,5
Proportion d'occupant de 5 ans et plus selon l'utilisation de la ceinture de sécurité la nuit (2006 / 2008)						
Passagers avant	%	83,3	ns	87,8	ns	88,4
Conducteurs	%	87,6	ns	87,8	(-)	90,1
SANTÉ MENTALE						
INSATISFACTION À L'ÉGARD DE LA VIE						
Proportion de la population de 12 ans et plus présentant une insatisfaction à l'égard de la vie (2005 / 2007-2008)	%	* 2,2	ns	* 1,3	ns	2,5
Proportion de la population de 12 ans et plus étant insatisfaite selon certains domaines de satisfaction (2005 / 2007-2008)						
Relations avec les amis	%	* 1,7	ns	** np	nd	2,0
Relations avec les membres de la famille	%	* 2,2	ns	* 2,7	ns	3,4
Logement	%	* 1,7	(-)	* 2,0	(-)	4,2
Soi-même	%	* 2,5	ns	* 2,9	ns	2,8
Quartier	%	* 2,0	(-)	* 2,3	ns	3,8
Emploi	%	* 4,4	ns	* 3,5	ns	5,4
Activités de loisirs	%	9,7	ns	9,8	ns	9,8
Apparence de son corps	%	6,2	ns	8,5	ns	8,6
Situation financière	%	11,8	ns	9,6	(-)	13,3

Portrait de santé, 2011

Statistiques de la région de la Chaudière-Appalaches

	% ou taux	Chaudière-Appalaches				Le Québec
		Données antérieures		Données récentes		Données récentes
SANTÉ MENTALE ET STRESS						
Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale (2005 / 2007-2008)	%	* 4,3	ns	* 4,1	ns	3,4
Proportion de la population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé (2005 / 2007-2008)	%	26,5	ns	24,2	ns	26,3
Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consulté un professionnel au sujet de sa santé mentale (2000-2001 / 2003)	%	7,9	ns	* 5,3	ns	8,1
TROUBLES DE L'HUMEUR ET DÉTRESSE						
Proportion de la population de 12 ans et plus ayant déclaré avoir reçu un diagnostic de troubles de l'humeur (2005 / 2007-2008)	%	* 3,8	ns	* 4,7	ns	4,8
Proportion de la population de 12 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique (2005 / 2007-2008)	%	22,0	ns	22,0	ns	20,0
USAGE DE CERTAINS PSYCHOTROPES CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES						
Proportion de la population de 65 ans et plus faisant usage d'anxiolytiques, de sédatifs ou d'hypnotiques (2007 / 2008)	%	35,9	ne	35,0	ne	28,8
DÉPENDANCE AU JEU						
Proportion de la population de 12 ans et plus ayant un risque de dépendance au jeu de hasard (2007-2008)	%	nd		* 1,9	ns	2,4
IDÉES SUICIDAIRES ET SUICIDE						
Proportion de la population de 15 ans et plus ayant songé au suicide (2005 / 2008)	%	* 1,8	ns	2,7	ns	2,8
Taux de mortalité par suicide	pour 100 000	23,9	(+)	19,0	(+)	15,4
ENVIRONNEMENT SOCIAL						
DÉVELOPPEMENT DES JEUNES						
Proportion d'enfants de 3-14 ans présentant un niveau modéré ou sévère de difficultés socio-émotionnelles (2008)	%	nd		13,7	ns	12,1
Proportion d'enfants de 3-14 ans présentant un comportement prosocial limite ou anormal (2008)	%	nd		* 4,5	ns	5,0
PROTECTION DE LA JEUNESSE						
Taux d'incidence des prises en charge chez les 0-17 ans dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (2003-2007 / 2005-2010)	pour 1 000	4,7	(-)	5,3	ns	5,3
Négligence (2003-2007)	pour 1 000	nd		2,7	(-)	3,4
Trouble de comportement (2003-2007)	pour 1 000	nd		1,5	ns	1,5
Abus physique (2003-2007)	pour 1 000	nd		0,3	ns	0,4
Abus sexuel ou abandon (2003-2007)	pour 1 000	nd		0,2	(-)	0,3
CRIMINALITÉ JUVÉNILE						
Taux de jeunes de 12 à 17 ans ayant contrevenu au Code criminel et aux lois (région de l'infraction) (2006 / 2008)	pour 100 000	4 492	ne	4 818	ne	6 091
DÉCROCHAGE SCOLAIRE						
Taux de décrochage au secondaire du réseau public (2005-2006 / 2008-2009)	%	16,3	ne	14,4	ne	21,3
Proportion de la population de 15-24 ans ne fréquentant pas l'école (2001 / 2006)	%	34,7	ne	35,1	ne	31,3
INTÉGRATION ET SOUTIEN SOCIAL						
Proportion de la population de 12 ans et plus ayant un très faible sentiment d'appartenance à sa communauté locale (2005 / 2007-2008)	%	15,4	ns	16,4	(+)	11,7
Proportion de la population de 12 ans et plus n'étant pas membre d'un organisme à but non lucratif (2003)	%	nd		72,6	ns	74,9
Proportion de la population de 12 ans et plus ayant un niveau faible ou modéré de soutien émotionnel ou informationnel (2005 / 2007-2008)	%	15,3	ns	13,5	ns	12,1
CRIMES VIOLENTS ET VIOLENCE CONJUGALE						
Taux de crimes violents (ensemble des catégories d'infractions, région de l'infraction) (2005-2009)	pour 100 000	nd		591	ne	1 071
Voies de fait	pour 100 000	nd		323	ne	572
Menaces	pour 100 000	nd		132	ne	219
Vol qualifié et extorsion	pour 100 000	nd		25	ne	102
Harcèlement criminel	pour 100 000	nd		34	ne	57
Agression sexuelle	pour 100 000	nd		43	ne	58
Autres catégories	pour 100 000	nd		35	ne	63
Taux de crimes pour violence conjugale chez les 12 ans et plus (ensemble des catégories d'infractions, région de l'infraction) (2000-2004 / 2005-2009)	pour 100 000	203	ne	247	ne	417
Voies de fait	pour 100 000	nd		156	ne	275
Menaces	pour 100 000	nd		32	ne	64
Harcèlement criminel	pour 100 000	nd		37	ne	51
Autres catégories	pour 100 000	nd		21	ne	27
PERSONNES ÂGÉES EN MÉNAGE PRIVÉ OU VIVANT SEULES						
Proportion de la population de 75 ans et plus vivant en ménage privé (2001 / 2006)	%	77,3	ne	77,3	ne	82,8
Proportion de la population de 75 ans et plus vivant seule (2001 / 2006)	%	37,6	ne	37,7	ne	39,3

Portrait de santé, 2011

Statistiques de la région de la Chaudière-Appalaches

A-12

	% ou taux	Chaudière-Appalaches				Le Québec
		Données antérieures		Données récentes		Données récentes
RÉSEAU SOCIAL CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES						
Proportion de la population de 65 ans et plus ayant un niveau faible ou modéré de soutien émotionnel ou informationnel (2005 / 2007-2008)	%	* 21,2	ns	* 16,4	ns	18,0
Proportion de la population de 15 ans et plus prodiguant sans rémunération des soins aux personnes âgées (2001 / 2006)	%	18,8	ne	19,2	ne	18,6
RECOURS AUX SERVICES À DOMICILE						
Proportion de la population de 65 ans et plus ayant reçu des services à domicile (2003 / 2005)	%	* 11,7	ns	* 13,6	ns	9,3
PERSONNES ÂGÉES EN INSTITUTION DE SANTÉ						
Proportion de la population de 65 ans et plus en institution de santé (2001 / 2006)	%	10,6	ne	11,3	ne	8,5
SERVICES DE SANTÉ						
DISPONIBILITÉ ET CONSULTATION D'UN MÉDECIN						
Nombre de médecins omnipraticiens par 100 000 habitants (2006 / 2008)	n ^{bre}	98	ne	95	ne	103
Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consulté un médecin de famille (2005 / 2007-2008)	%	71,8	ns	72,7	ns	70,2
Proportion de la population de 12 ans et plus n'ayant pas un médecin régulier (peut importe la raison invoquée) (2005 / 2007-2008)	%	15,3	(-)	17,4	(-)	26,9
Pas cherché un médecin régulier	%	nd		12,7	ns	15,4
Pas trouvé un médecin régulier	%	nd		* 4,7	(-)	11,5
DÉPISTAGE DE CANCERS						
Proportion de femmes de 50 à 69 ans ayant passé une mammographie (2005-2006 / 2007-2008)	%	71,5	(+)	72,0	(+)	67,3
Proportion de femmes de 20 à 69 ans ayant passé un test de Pap (2005 / 2008)	%	71,5	ns	68,3	ns	69,6
Proportion de la population de 50 à 74 ans ayant passé un test de dépistage du cancer colorectal (2008)	%	nd		* 4,7	ns	9,5
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE						
Taux d'interruption volontaire de grossesse selon les groupes d'âge (1998-2002 / 2003-2007)						
14-19 ans	pour 1 000	12,1	(-)	9,9	(-)	18,9
20-24 ans	pour 1 000	21,7	(-)	20,2	(-)	36,3
25-29 ans	pour 1 000	14,1	(-)	14,9	(-)	26,3
30-34 ans	pour 1 000	8,1	(-)	9,6	(-)	19,0
35-49 ans	pour 1 000	2,0	(-)	2,2	(-)	4,7
Nombre d'interruptions volontaires de grossesse	pour 100	21,7	ne	19,1	ne	37,8
HOSPITALISATION ET MORTALITÉ ÉVITABLES						
Taux d'hospitalisation liés à des conditions propices aux soins ambulatoires (ensemble des conditions) (2002-2006 / 2006-2009)	pour 10 000	47,0	ns	34,7	(-)	39,5
Épilepsie et autre état de mal épileptique	pour 10 000	nd		2,7	ns	2,6
Maladies pulmonaires obstructives chroniques	pour 10 000	nd		11,9	(-)	15,0
Asthme	pour 10 000	nd		3,0	(-)	5,5
Diabète	pour 10 000	nd		2,8	(-)	3,4
Insuffisance cardiaque et œdème pulmonaire	pour 10 000	nd		5,1	ns	5,5
Hypertension	pour 10 000	nd		0,7	ns	0,7
Angine	pour 10 000	nd		8,5	(+)	6,8
Taux de mortalité évitable (2000-2004 / 2005-2008)	pour 100 000	90	(-)	76	(-)	90

(+) (-) Situation de la région statistiquement plus élevée (+) ou moins élevée (-) qu'ailleurs au Québec, au seuil de 0,01.
 ns Situation de la région semblable à ailleurs au Québec, au seuil de 0,01.
 ne Situation de la région par rapport à ailleurs au Québec non mesurée statistiquement.
 * La valeur doit être interprétée avec prudence, le coefficient de variation est supérieur à 16,6 % ou égal à 33,3 %.
 **n.p. La valeur n'est pas présentée, le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %.
 na Non applicable.
 nd Données non disponibles.

Données tirées de : Pour guider l'action - Portrait de santé du Québec et de ses régions

Production : ASSS de Chaudière-Appalaches, DSPE, Service en surveillance, recherche, évaluation et Infocentre, 2011



La région de la Chaudière-Appalaches présente une situation comparable au Québec sous plusieurs aspects. Toutefois, les données montrent que la région est favorisée par rapport au Québec au regard de différents déterminants et problèmes de santé, tels que l'indice de fécondité, l'espérance de vie à la naissance, les naissances de faible poids, l'incidence des infections transmissibles sexuellement et par le sang et l'incidence des prises en charge des jeunes dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse pour négligence. Il s'agit de problématiques pour lesquelles il convient de poursuivre les efforts en prévention et en promotion de la santé.

Par contre, certains aspects moins favorables méritent une attention particulière. À ce titre, la région affiche des taux plus élevés que le Québec pour l'ensemble des diagnostics d'hospitalisation dont les maladies chroniques, les hospitalisations chez les tout-petits, l'incidence des lésions professionnelles déclarées et acceptées, les traumatismes non intentionnels et le suicide.

En dépit des gains observés dans la région, par exemple, la diminution du taux mortalité par suicide ou par accidents de véhicules à moteur ou l'augmentation du niveau de scolarité, plusieurs défis majeurs interpellent les intervenants et partenaires régionaux à poser des actions soutenues et concertées pour continuer de promouvoir la santé, prévenir la maladie et les problèmes psychosociaux.

Analyse et rédaction

Marquise Jacques, agente de planification, de programmation et de recherche
Lucie Roy, agente de planification, de programmation et de recherche
Sylvie Veilleux, technicienne en recherche psychosociale

Conception et révision du texte

Sylvie Lepage, agente administrative

Révision du texte

Lucie Pelchat, agente administrative

Document produit par le

Service en surveillance, recherche, évaluation et Infocentre
Direction de santé publique et de l'évaluation
Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de Chaudière-Appalaches
363, route Cameron
Sainte-Marie (Québec)
G6E 3E2

Ce document a été édité en quantité limitée et n'est maintenant disponible qu'à l'adresse
<http://www.agencecss12.gouv.qc.ca>

© Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches, 2011

Dépôt Légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011
Bibliothèque et Archives Canada, 2011

ISBN 978-2-89548-680-0 (version imprimée)

ISBN 978-2-89548-681-7 (version PDF)

Document déposé à Santécom (<http://www.santecom.qc.ca>)

Toute reproduction partielle de ce document est autorisée
et conditionnelle à la mention de la source.

Document de référence

Ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration avec l'Institut national de santé publique du Québec et l'Institut de la statistique du Québec (2011), Pour guider l'action – Portrait de santé du Québec et de ses régions : les statistiques, gouvernement du Québec, 351 pages.

Agence de la santé
et des services
sociaux de Chaudière-
Appalaches

Québec

