

ANNEXE A

Indications des inhibiteurs de la pompe à protons approuvées par Santé Canada

Indication de Santé Canada	Dexlansoprazole (Dexilant ^{MC})	Esomeprazole (Nexium ^{MC})	Lansoprazole (Prevacid ^{MC})	Oméprazole (Losec ^{MC})	Pantoprazole (Pantoloc ^{MC})	Pantoprazole (Tecta ^{MC})	Rabéprazole (Pariet ^{MC})
Ulçère gastrique**†			✓	✓	✓	✓	✓
Ulçère duodénal**†			✓	✓	✓	✓	✓
Ulçère gastro-duodénal associé aux AINS**†		Traitement + prévention UG	Traitement + prévention UG	Traitement + prévention UG + UD	Prévention UG + UD		
Œsophagite par reflux*	Traitement + maintien	Traitement + maintien	✓	Traitement + maintien	Traitement + maintien	✓	Traitement + maintien
Reflux gastro-œsophagien symptomatique**†	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dyspepsie**†				✓ [†]			
Syndrôme de Zollinger-Ellison		✓	✓	✓			✓
Éradication de <i>H. pylori</i> **†		✓ UD	✓ UD	✓ UG + UD	✓ UD	✓ UD	✓ UD

Abréviations : AINS = anti-inflammatoire non stéroïdien; *H. pylori* = *Helicobacter pylori*; UD = ulcère duodénal; UG = ulcère gastrique

* Indications évaluées par l'ACMTS dans les travaux portant sur les IPP en 2007.

† Indications évaluées par le Conseil du médicament dans les travaux portant sur les IPP en 2010.

‡ Les gélules de Losec^{MC} ne sont pas approuvées au Canada pour le traitement de la dyspepsie.

Sources : AstraZeneca Canada, 2012a; AstraZeneca Canada, 2012b; AstraZeneca Canada, 2012c; Janssen Inc., 2012; Nycomed Canada, 2012a; Nycomed Canada, 2012b; Takeda Canada, 2012; Takeda Pharmaceuticals America, 2012.