

L'AVIFAUNE DE LANAUDIÈRE

CAHIER 1

Les espèces dont la présence dans Lanaudière
est prévisible en toutes saisons (PÉAH)



Présence selon les saisons

Statuts et cartes de répartition

Nidification dans les différentes zones
géographiques

Habitats fréquentés

Constance d'observation : tendances
depuis 1994



**SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE
DE LANAUDIÈRE**

Rédaction	Luc Foisy et Marcel Harnois
Montage	Luc Foisy
Photographies des habitats	Marcel Harnois, à moins d'indication contraire.
Photographies des espèces	Denis Allard, Michèle Amyot, Pierre Bannon, Michelle Boulard, Daniel Coderre, Marc Guilbault, Marcel Harnois, Daniel Jauvin, Barbara Marsolais, Alexandre Mathews, Daniel Murphy, Raymond Piché et Richard Prévost.
Collaboration au graphisme	Alexandre Nicole
Collaboration ornithologique	Bernard Dugas

Citation du livre

Foisy, L. et M. Harnois. (2020). *L'avifaune de Lanaudière. Cahier 1. Les espèces dont la présence dans Lanaudière est prévisible en toutes saisons (PÉAH)*. Société d'ornithologie de Lanaudière, xxiv + 140 pages.

Photo de la page couverture

Grand Pic, © Denis Allard

ISBN 978-2-9805066-7-3

© 2020 Société d'ornithologie de Lanaudière, C.P. 339, Joliette (Québec) J6E 3Z6

TABLE DES MATIÈRES

Introduction **v**

Déterminer les statuts les plus probables des individus d'une espèce aviaire et prévoir la présence de l'espèce dans Lanaudière **vi**

Liste des 335 espèces d'oiseaux traitées dans les cinq cahiers de l'*Avifaune de Lanaudière* **xvi**

Quelques municipalités de Lanaudière et zones géographiques **xx**

Présentation visuelle de l'information pour chaque espèce **xxi**

- Identification de l'espèce **xxi**
- Habitat fréquenté par l'espèce **xxi**
- Présence de l'espèce dans Lanaudière **xxi**
- Carte de répartition **xxi**
- Statuts des oiseaux dans Lanaudière **xxi**
- Nidification dans les zones géographiques de Lanaudière **xxii**
- Évolution de la constance d'observation **xxiii**
- Les tendances **xxiii**
- Notes **xxiii**

Liste alphabétique des espèces dont la présence dans Lanaudière est prévisible en toutes saisons (PÉAH) **xxiv**

L'AVIFAUNE DE LANAUDIÈRE. Les espèces dont la présence dans Lanaudière est prévisible en toutes saisons (PÉAH) **1**

ANALYSE DES DONNÉES. Espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons **119**

- Diversité ornithologique **119**
- Présence relative des espèces **120**
- Espèces *menacées* ou *vulnérables* au Québec **120**
- Nidification selon les quatre zones géographiques de Lanaudière **121**
- Évolution de la constance d'observation **121**

Liste des 58 espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons dans Lanaudière (PÉAH) classées selon la valeur décroissante de leur constance d'observation, d'après les feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018 **124**

Liste des 10 espèces qui, parmi les 58 espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons, ont vu la valeur de la constance d'observation **augmenter** de plus de 100 % entre MAI 1994 et DÉCEMBRE 2018. Les espèces sont classées selon l'ordre décroissant de l'augmentation de la constance d'observation **126**

Liste des 7 espèces qui, parmi les 58 espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons, ont vu la valeur de la constance d'observation **diminuer** de plus de 50 % entre MAI 1994 et DÉCEMBRE 2018. Les espèces sont classées selon l'ordre décroissant de diminution de la constance d'observation **127**

Liste des 336 espèces d'oiseaux notées dans Lanaudière avant le 1^{er} janvier 2020 selon l'ordre taxonomique; noms en français, en latin et en anglais, avec identification des espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons (PÉAH) **128**

Références bibliographiques **139**

INTRODUCTION

Par sa topographie, la région de Lanaudière présente une coupe typique du relief québécois au nord de la portion fluviale du Saint-Laurent, lequel longe le territoire sur une distance de 60 km. Cette particularité permet de distinguer nettement quatre zones géographiques : les Terres-Basses, la Plaine, le Piedmont et le Plateau, chacune offrant une variété d'habitats pour l'avifaune.

Au fil des ans, ces habitats variés ont attiré nombre d'ornithologues qui ont enrichi de leurs observations la base régionale de données *Études des populations d'oiseaux du Québec* (ÉPOQ), base aujourd'hui intégrée au portail eBird. Une analyse des données tirées de ces bases informatisées a permis de dégager nombre d'informations importantes ayant trait à l'avifaune de Lanaudière.

Le présent ouvrage a pour but de rendre accessible ces informations à tous ceux et celles qui souhaitent mieux connaître les oiseaux de cette région. Ces données permettent de quantifier la présence de chaque espèce selon les saisons, d'établir les statuts probables de l'oiseau étudié, sa présence dans chacune des zones géographiques de Lanaudière, le type d'habitat fréquenté, les constances d'observations au fil des ans et les tendances qui se dégagent à moyen et long terme.

Le caractère cyclique de la vie des oiseaux permet de prévoir les saisons où une espèce peut être présente dans Lanaudière. On peut alors regrouper les espèces selon leur type de présence dans Lanaudière, les saisons où leur présence est prévisible. Ainsi, on a les espèces dont la présence est ...

- prévisible en toutes saisons : printemps, été, automne et hiver (PÉAH);
- prévisible trois saisons : printemps, été et automne; imprévisible à l'hiver (PÉA);
- prévisible trois saisons : automne, hiver et printemps; imprévisible à l'été (AHP);
- prévisible deux saisons : printemps et automne; imprévisible à l'été et à l'hiver (PA);
- imprévisible en toutes saisons (IMP).

LA SÉRIE L'AVIFAUNE DE LANAUDIÈRE COMPREND CINQ CAHIERS, UN POUR CHAQUE CATÉGORIE D'ESPÈCES



CE PREMIER CAHIER PORTE SUR LES ESPÈCES DONT LA PRÉSENCE EST PRÉVISIBLE EN TOUTES SAISONS; CE SONT DES ESPÈCES CONSTITUÉES ESSENTIELLEMENT DE NICHEURS RÉSIDANTS OU D'UN MÉLANGE DE NICHEURS MIGRATEURS ET DE MIGRATEURS DE PASSAGE, MAIS COMPORTANT UNE QUANTITÉ SIGNIFICATIVE DE NICHEURS RÉSIDANTS.

Déterminer les statuts les plus probables des individus d'une espèce aviaire et prévoir la présence de l'espèce dans Lanaudière.

L'attribution des statuts les plus probables aux individus d'une espèce dans Lanaudière et la détermination de la catégorie à laquelle elle appartient quant à la période où sa présence est prévisible est le résultat d'un processus d'analyse en trois étapes. Lors de la première étape, l'analyse de la carte de répartition permet rapidement de déterminer les statuts les plus probables d'une espèce et de la classer dans la catégorie correspondante. À la seconde étape, l'analyse d'un tableau de données d'observation vient confirmer ou contredire les informations tirées de la carte de répartition, mais peut aussi ajouter des informations supplémentaires. Au cours de la troisième étape, la recherche d'informations provenant d'autres sources peut s'avérer nécessaire s'il y a incohérence entre les informations tirées de la carte de répartition et celles provenant du tableau de données d'observation.

1^{ère} ÉTAPE - Analyse de la carte de répartition de l'espèce : un rapide coup d'œil à une carte facilement accessible dans un guide d'identification des oiseaux ou sur internet permet une première attribution des statuts probables des individus d'une espèce et un premier classement de l'espèce.


La carte de répartition géographique d'une espèce présente les différentes aires occupées par l'espèce au cours des saisons et permet de déterminer les saisons où la présence de l'espèce est prévisible dans une région donnée. Ces grandes aires de répartition sont :

L'aire de résidence permanente (zone rose-lilas). L'espèce est présente en toutes saisons.

L'aire de nidification (zone rose-orangé). L'espèce arrive au printemps, y passe l'été et repart à l'automne pour son aire d'hivernage.

L'aire de migration (zone jaune crème). L'espèce s'y retrouve au printemps lorsqu'elle va de son aire d'hivernage à son aire de nidification et à l'automne lorsqu'elle passe de son aire de nidification à son aire d'hivernage.


L'aire d'hivernage (zone bleu turquoise). L'espèce, arrivée au cours de l'automne, y passe l'hiver et retourne à son aire de nidification au cours du printemps.



Les cartes de répartition des espèces qui paraissent dans les pages-tableaux qui suivent ont été créées par Terry Sohl à partir des données d'observation de *NatureServe*. M. Sohl a généreusement autorisé la SOL à les utiliser. Au besoin, on se référera aux cartes de répartition produites sur le site *All About Birds* par The **Cornell**-Lab.

Lorsque Lanaudière fait partie de la zone rose-lilas de la carte de répartition, l'espèce y est alors constituée essentiellement de *nicheurs résidents* dont la présence est prévisible toute l'année.


Exemple : Le Geai bleu



Selon la carte de répartition, Lanaudière appartient à l'aire de résidence permanente (zone rose-lilas) du Geai bleu. L'espèce est donc constituée essentiellement de *nicheurs résidents* et sa présence y est prévisible en toutes saisons (PÉAH).

Lorsque Lanaudière fait partie de la zone rose-orangé de la carte de répartition, l'espèce y est alors constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrants* dont la présence est prévisible au printemps, à l'été et à l'automne et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible au printemps et à l'automne. Les premiers restent dans Lanaudière pour y nicher, les seconds ne font que traverser la région, sur la route entre leur aire de nidification et leur aire d'hivernage, toutes deux en dehors de Lanaudière.


Exemple : la Paruline jaune



Selon la carte de répartition, Lanaudière appartient à l'aire de nidification (zone rose-orangé) de la Paruline jaune. L'espèce est donc constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrants* et de *migrateurs de passage* et sa présence y est prévisible trois saisons : au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver (PÉA).

Lorsque Lanaudière fait partie de la zone jaune crème de la carte de répartition, l'espèce y est alors constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver. Les individus de l'espèce ne font que traverser la région sur la route entre leur aire de nidification et leur aire d'hivernage, toutes deux en dehors de Lanaudière.



Exemple : le Bruant à couronne blanche



Selon la carte de répartition, Lanaudière fait partie de l'aire de migration (zone jaune crème) du Bruant à couronne blanche. L'espèce est donc constituée essentiellement de *migrateurs de passage* et sa présence y est prévisible deux saisons : au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver (PA).

Lorsque Lanaudière fait partie de la zone bleu turquoise de la carte de répartition, l'espèce y est alors constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* dont la présence est prévisible tard à l'automne, à l'hiver et au début du printemps et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible à l'automne et au printemps. Les premiers viennent dans Lanaudière pour y passer l'hiver, les seconds ne font que traverser la région, sur la route entre leur aire de nidification et leur aire d'hivernage, toutes deux en dehors de Lanaudière.



Exemple : le Harfang des neiges



Selon la carte de répartition, Lanaudière fait partie de l'aire d'hivernage (zone bleu turquoise) du Harfang des neiges. L'espèce est donc constituée essentiellement d'un mélange d'*hivernants* et de *migrateurs de passage* et sa présence y est prévisible trois saisons : à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été (AHP).

Lorsque Lanaudière est en dehors de l'aire de résidence permanente (zone rose-lilas), de l'aire de nidification (zone rose-orangé), de l'aire de migration (zone jaune crème) et de l'aire d'hivernage (zone bleu turquoise) de l'espèce, celle-ci est constituée essentiellement de *visiteurs* dont la présence est imprévisible en tout temps.

Exemple : l'Avocette d'Amérique



Selon la carte de répartition, Lanaudière est une région très éloignée des aires de résidence permanente (zone rose-lilas), de nidification (zone rose-orangé), de migration (zone jaune crème) et d'hivernage (zone bleu turquoise) de l'Avocette d'Amérique. L'espèce est donc constituée essentiellement de *visiteurs* et sa présence y est imprévisible en toutes saisons (IMP).

Pour n'importe quelle espèce, l'information s'obtient rapidement sur un simple coup d'œil à la carte de répartition. Mais est-elle toujours fiable? NON. Voici l'avertissement de Roger Tory Peterson* sur les cartes de répartition :

« Les cartes représentent de manière approximative l'aire occupée par chacune des espèces. À l'intérieur des limites tracées, il y a de nombreux vides – les lieux où l'habitat de l'espèce n'existe pas. Le Troglodyte des marais a besoin d'un marais, la Sturnelle des prés a besoin d'un pré ou la Gélinotte huppée a besoin d'une forêt. »

Certaines espèces ne se rencontrent que par endroits ou certaines années seulement pour des raisons qui ne sont pas toujours claires. Des espèces sont en expansion, parfois rapide, tandis que d'autres sont en déclin ou même en voie de disparition dans les grandes zones où elles étaient présentes auparavant.

Les aires d'hivernage ne sont pas aussi bien délimitées que les aires de nidification. Une espèce peut être très rare dans la limite nord de son aire d'hivernage et survivre aux hivers doux, mais souvent succomber aux rigueurs de janvier et février. Les conditions météorologiques et la quantité de nourriture disponible, variables d'un hiver à l'autre, peuvent expliquer les variations importantes chez les populations hivernantes des oiseaux. »

Même si Lanaudière fait partie d'une des aires de répartition d'une espèce, il se peut que les habitats fréquentés par l'espèce n'existent pas dans la zone désignée ou qu'ils soient situés dans une région difficilement accessible et très peu fréquentée par les observateurs d'oiseaux. Il est donc nécessaire de confirmer les informations tirées des cartes de répartition des espèces par l'analyse d'un tableau de données d'observation. C'est la deuxième étape du processus d'analyse.

2^e ÉTAPE - Analyse d'un tableau de données d'observation : un tableau qui présente des données sur la présence de l'espèce, des chiffres pour confirmer les informations obtenues par l'analyse des cartes de répartition.

La période de référence de l'analyse couvre les premières 35 années de la SOL, entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018, pendant lesquelles des ornithologues de Lanaudière et d'ailleurs ont parcouru les différents habitats de la région. L'analyse porte sur 47 582 feuillets enregistrés pendant cette période. Ces feuillets comportent 553 192 mentions et rapportent 323 espèces différentes. Toutes ces données d'observation ont été conservées d'abord dans la banque ÉPOQ (*Étude des populations d'oiseaux du Québec*) du Regroupement QuébecOiseaux, puis dans la banque du portail eBird.

Pour la majorité des espèces observées dans Lanaudière, l'analyse du tableau de données d'observation permet effectivement de confirmer les informations obtenues à partir des cartes de répartition quant aux statuts les plus probables des individus de l'espèce et la détermination de la catégorie, du type de présence à laquelle elle appartient. Il en est ainsi pour les cinq espèces données en exemple plus haut. En voici la démonstration :

* Roger Tory Peterson, *Les oiseaux du Québec et de l'Est de l'Amérique du Nord*, 5^e édition, p. 333

Le Geai bleu

	Présence du Geai bleu dans Lanaudière			
	P	É	A	H
Nb de mentions	5 649	2 266	5 497	5 382
Constance d'observation	32,1	38,2	50,7	40,3
Classe	A	A	A	A
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de feuillets d'observations quotidiennes couvrant 35 années, du 1 ^{er} avril 1983 au 31 mars 2018.				

Les chiffres du tableau *Présence du Geai bleu dans Lanaudière* confirment les informations de la carte de répartition : le Geai bleu est *assidu* (mentionné dans plus de 31 % des feuillets d'observations quotidiennes) pour chacune des saisons. Sa présence est donc prévisible en toutes saisons et l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidants*, tel que suggéré par la carte de répartition.

La Paruline jaune

	Présence de la Paruline jaune dans Lanaudière			
	P	É	A	H
Nb de mentions	1 472	1 216	130	0
Constance d'observation	8,37	20,5	1,20	0
Classe	F	C	R	E
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de feuillets d'observations quotidiennes couvrant 35 années, du 1 ^{er} avril 1983 au 31 mars 2018.				

Les chiffres du tableau *Présence de la Paruline jaune dans Lanaudière* confirment les informations de la carte de répartition : absente à l'hiver, la Paruline jaune est présente aux trois autres saisons, caractéristique des espèces constituées essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrants* et de *migrateurs de passage*, tel que suggéré par la carte de répartition.

Le Bruant à couronne blanche

	Présence du Bruant à couronne blanche dans Lanaudière			
	P	É	A	H
Nb de mentions	1 278	27	596	36
Constance d'observation	7,27	0,46	5,50	0,27
Classe	F	I	O	I
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de feuillets d'observations quotidiennes couvrant 35 années, du 1 ^{er} avril 1983 au 31 mars 2018.				

Les chiffres du tableau *Présence du Bruant à couronne blanche dans Lanaudière* confirment les informations de la carte de répartition : on y voit le schéma caractéristique des espèces constituées essentiellement de *migrateurs de passage* : des sommets au printemps et à l'automne, des creux à l'été et à l'hiver, tel que suggéré par la carte de répartition.

Le Harfang des neiges

	Présence du Harfang des neiges dans Lanaudière			
	P	É	A	H
Nb de mentions	501	2	175	2 001
Constance d'observation	2,85	0,03	1,61	15,1
Classe	R	I	R	C
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de feuillets d'observations quotidiennes couvrant 35 années, du 1 ^{er} avril 1983 au 31 mars 2018.				

Les chiffres du tableau *Présence du Harfang des neiges dans Lanaudière* confirment les informations de la carte de répartition : presque absente à l'été, l'espèce est présente aux autres saisons, avec un sommet à l'hiver, schéma caractéristique des espèces constituées essentiellement d'un mélange d'*hibernants* et de *migrateurs de passage*, tel que suggéré par la carte de répartition.

L'Avocette d'Amérique

	Présence de l' Avocette d'Amérique dans Lanaudière			
	P	É	A	H
Nb de mentions	2	0	0	0
Constance d'observation	0,01	0	0	0
Classe	I	E	E	E
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de feuillets d'observations quotidiennes couvrant 35 années, du 1 ^{er} avril 1983 au 31 mars 2018.				

Les chiffres du tableau *Présence de l'Avocette d'Amérique dans Lanaudière* confirment les informations de la carte de répartition : on n'y retrouve que très peu de mentions (2 en 35 ans), schéma caractéristique des espèces constituées essentiellement de *visiteurs*, tel que suggéré par la carte de répartition.

Les chiffres du tableau de données d'observation peuvent fournir des informations supplémentaires. On verra au CAHIER 2 qui traite des espèces dont la présence est prévisible au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver (PÉA) que, si la carte de répartition suggère la présence d'un mélange de *nicheurs migrants* et de *migrateurs de passage*, le tableau des données peut nous informer sur l'abondance relative des uns par rapport aux autres.

Parfois, les chiffres du tableau de données d'observation contredisent les informations suggérées par l'analyse de la carte de répartition. Voici un exemple.

Le Pic flamboyant

	Présence du Pic flamboyant dans Lanaudière			
	P	É	A	H
Nb de mentions	3 714	1 860	1 476	28
Constance d'observation	21,1	31,4	13,6	0,21
Classe	C	A	F	I
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de feuillets d'observations quotidiennes couvrant 35 années, du 1 ^{er} avril 1983 au 31 mars 2018.				

1) Analyse de la carte de répartition

Selon la carte de répartition, la portion du territoire de Lanaudière qui longe le Saint-Laurent appartient à l'aire de résidence permanente (zone rose-lilas) du Pic flamboyant. L'espèce est donc constituée de *nicheurs résidents* et sa présence est prévisible en toutes saisons dans cette zone. Le reste du territoire appartient à la zone rose-orangé, ce qui suggère la présence de *nicheurs migrants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est imprévisible à l'hiver.

2) Analyse du tableau de données d'observation

Cependant, le tableau *Présence du Pic flamboyant dans Lanaudière* ne confirme pas la présence de *nicheurs résidents*. En effet, la présence de ce pic est *inusitée* en hiver (28 mentions en 35 hivers) alors qu'elle est *commune* au printemps, *assidue* à l'été et *fréquente* à l'automne. Ces chiffres sous-entendent que l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver. Cela contredit les informations suggérées par l'analyse de la carte de répartition.

Alors, est-ce que le Pic flamboyant est une espèce constituée essentiellement de *nicheurs résidents* dont la présence est prévisible en toutes saisons comme le suggère l'analyse de la carte de répartition ou d'un mélange de *nicheurs migrants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver comme le sous-entendent les chiffres du tableau de données d'observation?

Lorsqu'il y a contradiction entre les informations suggérées par la carte de répartition et celles obtenues par les chiffres du tableau de données d'observation, on privilégie généralement ces derniers : le Pic flamboyant serait donc une espèce constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrants* et de *migrateurs de passage* dont la présence est prévisible au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.

Cependant, on recherche des informations provenant d'autres sources en vue d'appuyer ce choix. C'est la troisième étape du processus d'analyse.

3^e ÉTAPE - Informations provenant d'autres sources. On pense aux deux atlas : *Les oiseaux nicheurs du Québec : atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional*, et le *Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional*; on pense aux deux éditions de *À la découverte des oiseaux de Lanaudière*; on pense aussi au site *All About Birds* produit par TheCornellLab; on pense au portail eBird, bien entendu. Par exemple, le site *All About Birds* vient confirmer le choix pour la classification du Pic flamboyant.

Le Pic flamboyant

Le site *All About Birds* produit par TheCornellLab comporte des cartes de répartition plus récentes que celles produites par Terry Sohl.

Au lien https://www.allaboutbirds.org/guide/Northern_Flicker/maps-range, on constate que Lanaudière et tout le Québec font partie de l'aire de nidification (zone rose-orangé) du Pic flamboyant et non pas de son aire de résidence permanente (zone rose-lilas). Tout cela est en accord avec les chiffres du tableau de données d'observation qui montrent que, dans Lanaudière, le Pic flamboyant est constitué essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrants* et de *migrateurs de passage* et que sa présence est prévisible au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver.


On retrouve à la page xvi la liste des 335 espèces inscrites dans les cinq cahiers de *L'AVIFAUNE DE LANAUDIÈRE* avec indication du cahier où l'espèce est traitée. Les espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons (PÉAH) apparaissent au CAHIER 1; les espèces dont la présence est prévisible au printemps, à l'été et à l'automne, mais imprévisible à l'hiver (PÉA) se trouvent au CAHIER 2; les espèces dont la présence est prévisible à l'automne, à l'hiver et au printemps, mais imprévisible à l'été (AHP) sont traitées au CAHIER 3; les espèces dont la présence est prévisible au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver (PA) font l'objet du CAHIER 4; enfin, les espèces dont la présence est imprévisible en toutes saisons (IMP) paraissent au CAHIER 5.

La détermination de la catégorie à laquelle appartient chacune de ces 335 espèces est déterminée par le processus d'analyse en 3 étapes décrit plus haut. Pour chaque espèce, on analyse la carte de répartition qui suggère une première classification. Puis, on analyse les chiffres du tableau de données d'observation. Lorsque l'analyse du tableau de données confirme la classification suggérée par la carte de répartition, on la maintient. S'il y a incohérence entre les informations tirées de la carte de répartition et celles provenant du tableau de données, on privilégie les chiffres du tableau de données d'observation, mais on cherche des informations provenant d'autres sources afin d'appuyer ce choix. C'est ainsi qu'on est en mesure de fournir, aujourd'hui, le meilleur estimé du portrait toujours changeant de la présence des oiseaux dans Lanaudière.

Les espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons

Suite à l'application de ce processus d'analyse en trois étapes, on estime qu'il y a 58 espèces dont la présence dans Lanaudière est prévisible en toutes saisons. Ce sont ces espèces qui font l'objet de ce premier cahier de *L'AVIFAUNE DE LANAUDIÈRE*. Le Grand Pic en est un exemple.

Le Grand Pic



1) Analyse de la carte de répartition

La carte de répartition situe Lanaudière dans l'aire de résidence permanente (zone rose-lilas) du Grand Pic et suggère que l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidents* et que sa présence y est prévisible en toutes saisons (PÉAH).

2) Analyse du tableau de données d'observations

Le tableau *Présence du Grand Pic dans Lanaudière* confirme ces informations : l'espèce, *fréquente* au printemps, est *occasionnelle* aux trois autres saisons. Le Grand Pic est une espèce constituée essentiellement de *nicheurs résidents* et sa présence y est prévisible en toutes saisons.

3) Informations provenant d'autres sources


La nidification du Grand Pic dans Lanaudière est confirmée dans la Plaine, le Piedmont et le Plateau par les travaux du 1^{er} et de 2^e atlas.

Parmi les 58 espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons, il y en a 32 qui présentent, tel le Grand Pic, une carte de répartition qui situe Lanaudière dans la zone rose-lilas. Pour chacune d'entre elles, l'analyse de la carte de répartition suggère que la présence de l'espèce est constituée essentiellement de *nicheurs résidents* et que sa présence est prévisible en toutes saisons. Les chiffres confirment cette classification dans tous les cas et on le reconnaît sur un simple coup d'œil à la carte de répartition et au tableau de données d'observation. De plus, toutes ces espèces sont confirmées nicheuses dans Lanaudière.

Deux facteurs principaux distinguent ces espèces les unes des autres : l'abondance des effectifs et l'accessibilité de leur habitat. Certaines espèces, tel le Geai bleu, ont des effectifs très abondants et fréquentent des habitats très accessibles aux observateurs d'oiseaux; d'autres, tel le Tétraz du Canada, sont peu nombreuses et fréquentent des habitats peu accessibles aux observateurs.

Cependant, il y a d'autres espèces dont Lanaudière fait partie de l'aire de nidification (zone rose-orangé), mais dont les chiffres du tableau des données d'observation indiquent que l'espèce est présente de façon significative en hiver. Le Merle d'Amérique constitue une de ces espèces.

Le Merle d'Amérique



1) Analyse de la carte de répartition

La carte de répartition situe Lanaudière dans l'aire de nidification (zone rose-orangé) du Merle d'Amérique et suggère que l'espèce est constituée essentiellement d'un mélange de *nicheurs migrants* et de *migrateurs de passage*. Les premiers arrivent au printemps, nichent, passent l'été et nous quittent au courant de l'automne. Les seconds traversent la région au printemps et à l'automne, sur leur route entre leur aire de nidification et leur aire d'hivernage, toutes deux en dehors de Lanaudière. Ces *nicheurs migrants* et ces *migrateurs de passage* ne restent pas pour l'hiver. L'analyse de la carte de répartition suggère que la présence du Merle d'Amérique est imprévisible à l'hiver.

2) Analyse du tableau de données d'observations

Cependant, les chiffres du tableau *Présence du Merle d'Amérique dans Lanaudière* indiquent que l'espèce comporte aussi un nombre significatif de mentions à l'hiver, mais moins important qu'aux autres saisons (l'espèce est *assidue* au printemps, à l'été et à l'automne, *rare à l'hiver*). Cela implique qu'une portion significative de la population est constituée de *nicheurs résidents* et que la présence du merle à l'hiver est prévisible, même si elle est moins importante qu'aux autres saisons.

3) Informations provenant d'autres sources

La nidification du Merle d'Amérique est confirmée dans les quatre zones géographiques de Lanaudière.


Il y a 25 espèces, tel le Merle d'Amérique, dont la carte de répartition situe Lanaudière dans l'aire de nidification (zone rose-orangé) de l'espèce, mais dont les chiffres du tableau de données d'observation révèlent la présence d'un nombre significatif de *nicheurs résidents*. La présence de ces espèces est prévisible en toutes saisons, mais moins importante à l'hiver.

Il reste à ajouter à cette liste une espèce dont la situation est bien particulière :

Le Faucon pèlerin



© Michèle Amyot



Peregrine Falcon
Falco peregrinus

Permanent Resident
 Breeding Resident
 Nonbreeding Resident
 Passage Migrant
 Introduced
 Uncertain Status
 Vagrant

Map created by Henry Sault
Data from MalheurSource

<http://saskotabirds.com>

Présence du Faucon pèlerin dans Lanaudière				
	P	É	A	H
Nb de mentions	407	88	109	80
Constance d'observation	2,31	1,48	1,01	0,60
Classe*	R	R	R	I
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de feuillets d'observations quotidiennes couvrant 35 années, du 1 ^{er} avril 1983 au 31 mars 2018.				

1) Analyse de la carte de répartition

La carte de répartition situe Lanaudière dans l'aire de migration (zone jaune crème) du Faucon pèlerin et suggère que l'espèce est constituée essentiellement de *migrateurs de passage* et que sa présence y est prévisible au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver (PA).

2) Analyse du tableau de données d'observation

Le tableau *Présence du Faucon pèlerin dans Lanaudière* ne présente pas le schéma caractéristique des espèces constituées essentiellement de *migrateurs de passage*, soit des sommets au printemps et à l'automne, des creux à l'été et à l'hiver. La présence du Faucon pèlerin à l'été y est significative et suggère que l'espèce comporte aussi des *nicheurs migrants*. Soulignons aussi les 80 mentions hivernales de l'espèce qui suggèrent la présence de *nicheurs résidents*.

3) Informations provenant d'autres sources

Est-ce que le Faucon pèlerin est une espèce constituée essentiellement de *migrateurs de passage* dont la présence dans Lanaudière est prévisible au printemps et à l'automne, mais imprévisible à l'été et à l'hiver

comme le suggère la carte de répartition ou comporte-t-elle des *nicheurs migrants* et des *nicheurs résidents* comme le sous-entendent les chiffres du tableau *Présence du Faucon pèlerin dans Lanaudière*?

Dans le livre *SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE DE LANAUDIÈRE, 35 années d'histoire, 1983-2018* par L. Foisy et M. Harnois, on raconte, p. 67 et suivantes, l'histoire des suivis des nidifications des Faucons pèlerins dans Lanaudière.

Au début des années 2000, des observations du Faucon pèlerin sont rapportées à l'occasion à la carrière Mas-kimo de l'Épiphanie notamment par Normand Allard, membre de la SOL. En 2002, Richard Prévost, autre membre de la SOL, décide de faire un suivi de la nidification de cette espèce sur ce site au cours des cinq années suivantes.

Cette décision marque le début de suivis de nidification par plusieurs ornithologues de la SOL sur huit sites de Lanaudière et, en 2018, les responsables des suivis auprès de SOS-POP, à qui ils fournissent un rapport annuel, peuvent dénombrer l'envol de 100 fauconneaux sur ces sites. La présence de nicheurs migrants ne fait pas de doute dans Lanaudière et les travaux du *Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional* peuvent ainsi rapporter un bilan de 7 nidifications confirmées, 1 probable et 1 possible dans Lanaudière.

La présence du faucon est due à deux sous-espèces: l'une, *tundrius*, niche au nord de la limite des arbres et migre vers le sud en survolant Lanaudière lors des migrations printanières et automnales; l'autre, reconstruite à partir d'individus de la sous-espèce *anatum*, se reproduit dans le sud du Québec, entre autres dans Lanaudière, et est aussi observée à l'hiver. C'est en raison de la présence combinée d'individus des deux sous-espèces que le Faucon pèlerin fait partie de la liste des espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons dans Lanaudière.

Ces 58 espèces constituent 17,31 % des espèces ayant été observées dans Lanaudière, mais, lorsqu'on observe un oiseau, on a presque 60 % des chances qu'il appartienne à l'une d'entre elles.

LISTE DES 335 ESPÈCES D'OISEAUX TRAITÉES DANS LES 5 CAHIERS DE L'AVIFAUNE DE LANAUDIÈRE


Les espèces sont classées selon l'ordre alphabétique du nom de l'espèce, avec indication du numéro du cahier dans lequel se trouve l'espèce.

Aigle royal 3	Bruant des champs 2	Cygne chanteur 5
Aigrette bleue 5	Bruant des marais 2	Cygne noir 5
Aigrette neigeuse 5	Bruant des plaines 2	Cygne siffleur 4
Aigrette tricolore 5	Bruant des prés 2	Cygne tuberculé 5
Alouette des champs 5	Bruant familial 2	Dendrocygne à ventre noir 5
Alouette hausse-col 1	Bruant fauve 4	Dickcissel d'Amérique 5
Arlequin plongeur 5	Bruant hudsonien 3	Dindon sauvage 1
Autour des palombes 1	Bruant noir et blanc 5	Durbec des sapins 3
Avocette d'Amérique 5	Bruant vespéral 2	Effraie des clochers 5
Balbusard pêcheur 2	Busard des marais 1	Eider à duvet 5
Barge hudsonienne 4	Buse à épaulettes 2	Eider à tête grise 5
Barge marbrée 5	Buse à queue rousse 1	Engoulevent bois-pourri 2
Bécasse d'Amérique 2	Buse de Swainson 5	Engoulevent d'Amérique 2
Bécasseau à croupion blanc 4	Buse pattue 3	Épervier brun 1
Bécasseau à échasses 4	Butor d'Amérique 2	Épervier de Cooper 1
Bécasseau à poitrine cendrée 4	Canard branchu 2	Érismature rousse 4
Bécasseau cocorli 5	Canard chipeau 2	Étourneau sansonnet 1
Bécasseau d'Alaska 5	Canard colvert 1	Faisan de Colchide 5
Bécasseau de Baird 5	Canard d'Amérique 2	Faucon émerillon 1
Bécasseau maubèche 4	Canard noir 1	Faucon gerfaut 3
Bécasseau minuscule 4	Canard pilet 2	Faucon pèlerin 1
Bécasseau roussâtre 5	Canard siffleur 5	Fou de Bassan 5
Bécasseau sanderling 4	Canard souchet 2	Foulque d'Amérique 2
Bécasseau semipalmé 4	Cardinal à poitrine rose 2	Frégate superbe 5
Bécasseau variable 4	Cardinal rouge 1	Fuligule à collier 2
Bécasseau violet 5	Carouge à épaulettes 1	Fuligule à dos blanc 5
Bécassin à long bec 5	Carouge à tête jaune 5	Fuligule à tête rouge 2
Bécassin roux 4	Chardonneret élégant 5	Fuligule milouinan 4
Bécassine de Wilson 2	Chardonneret jaune 1	Fuligule morillon 5
Bec-croisé bifascié 1	Chevalier grivelé 2	Gallinule d'Amérique 2
Bec-croisé des sapins 1	Chevalier semipalmé 5	Garrot à oeil d'or 2
Bernache cravant 4	Chevalier solitaire 2	Garrot d'Islande 5
Bernache de Hutchins 4	Chouette épervière 3	Geai bleu 1
Bernache du Canada 1	Chouette lapone 3	Gélinotte huppée 1
Bernache nonnette 5	Chouette rayée 1	Gobemoucheron gris-bleu 5
Bihoreau gris 2	Colibri à gorge rubis 2	Goéland à bec cerclé 1
Bihoreau violacé 5	Colibri roux 5	Goéland arctique 3
Bruant à couronne blanche 4	Colin de Virginie 5	Goéland argenté 1
Bruant à couronne dorée 5	Combattant varié 5	Goéland bourgmestre 3
Bruant à face noire 5	Cormoran à aigrettes 2	Goéland brun 3
Bruant à gorge blanche 2	Corneille d'Amérique 1	Goéland marin 3
Bruant à joues marron 5	Coulicou à bec jaune 5	Goglu des prés 2
Bruant chanteur 1	Coulicou à bec noir 2	Grand Chevalier 4
Bruant de Lincoln 2	Courlis corlieu 5	Grand Corbeau 1
Bruant de Nelson 5	Crécerelle d'Amérique 1	Grand Cormoran 5

Grand Harle 1	Martin-pêcheur d'Amérique 2	Paruline des pins 2
Grand Héron 2	Maubèche des champs 2	Paruline des prés 5
Grand Pic 1	Merle d'Amérique 1	Paruline des ruisseaux 2
Grand-duc d'Amérique 1	Merlebleu de l'Est 2	Paruline du Canada 2
Grande Aigrette 2	Mésange à tête brune 1	Paruline flamboyante 2
Grèbe à bec bigarré 2	Mésange à tête noire 1	Paruline hochequeue 5
Grèbe esclavon 4	Mésange bicolore 5	Paruline jaune 2
Grèbe jougris 4	Mésangeai du Canada 1	Paruline masquée 2
Grimpereau brun 1	Moineau domestique 1	Paruline noir et blanc 2
Grive à collier 5	Moqueur chat 2	Paruline obscure 2
Grive à dos olive 2	Moqueur polyglotte 2	Paruline orangée 5
Grive à joues grises 4	Moqueur roux 2	Paruline rayée 4
Grive de Bicknell 2	Moucherolle à côtés olive 2	Paruline tigrée 2
Grive des bois 2	Moucherolle à ventre jaune 2	Paruline triste 2
Grive fauve 2	Moucherolle à ventre roux 5	Paruline verdâtre 4
Grive solitaire 2	Moucherolle des aulnes 2	Passerin indigo 2
Gros-bec errant 1	Moucherolle des saules 2	Pélican brun 5
Grue du Canada 2	Moucherolle phébi 2	Pélican d'Amérique 5
Guifette noire 2	Moucherolle tchébec 2	Perdrix choukar 5
Guillemot à miroir 5	Moucherolle vert 5	Perdrix grise 1
Guillemot de Brünnich 5	Mouette de Bonaparte 4	Petit Blongios 2
Guiraca bleu 5	Mouette pygmée 5	Petit Chevalier 4
Harelde kakawi 4	Mouette tridactyle 5	Petit Fuligule 4
Harfang des neiges 3	Naucler à queue fourchue 5	Petit Garrot 4
Harle couronné 1	Nyctale de Tengmalm 3	Petit-duc maculé 1
Harle huppé 4	Oie à bec court 5	Petite Buse 2
Héron garde-bœufs 5	Oie cendrée 5	Petite Nyctale 1
Héron vert 2	Oie de Ross 5	Phalarope à bec étroit 4
Hibou des marais 1	Oie des neiges 4	Phalarope de Wilson 5
Hibou moyen-duc 1	Oie rieuse 5	Pic à dos noir 1
Hirondelle à ailes hérissées 2	Oriole de Baltimore 2	Pic à dos rayé 5
Hirondelle à front blanc 2	Oriole des vergers 5	Pic à tête rouge 5
Hirondelle bicolore 2	Ouette d'Égypte 5	Pic à ventre roux 5
Hirondelle de rivage 2	Paruline à ailes dorées 5	Pic chevelu 1
Hirondelle noire 2	Paruline à calotte noire 2	Pic flamboyant 2
Hirondelle rustique 2	Paruline à capuchon 5	Pic maculé 2
Ibis à face blanche 5	Paruline à collier 2	Pic mineur 1
Ibis blanc 5	Paruline à couronne rousse 2	Pie d'Amérique 5
Ibis falcinelle 5	Paruline à croupion jaune 2	Pie-grièche boréale 3
Jaseur boréal 3	Paruline à flancs marron 2	Pie-grièche migratrice 5
Jaseur d'Amérique 2	Paruline à gorge grise 5	Pigeon biset 1
Junco ardoisé 1	Paruline à gorge jaune 5	Pioui de l'Est 2
Labbe à longue queue 5	Paruline à gorge noire 2	Pipit d'Amérique 4
Labbe parasite 5	Paruline à gorge orangée 2	Piranga écarlate 2
Macareux moine 5	Paruline à joues grises 2	Plectrophane des neiges 3
Macreuse à ailes blanches 4	Paruline à poitrine baie 2	Plectrophane lapon 3
Macreuse à bec jaune 4	Paruline à tête cendrée 2	Plongeon catmarin 5
Macreuse à front blanc 4	Paruline azurée 5	Plongeon huard 2
Marouette de Caroline 2	Paruline bleue 2	Pluvier argenté 4
Martinet ramoneur 2	Paruline couronnée 2	Pluvier bronzé 4

Pluvier kildir 2	Sittelle à poitrine rousse 1	Troglodyte des forêts 2
Pluvier semipalmé 4	Sizerin blanchâtre 3	Troglodyte des marais 2
Pluvier siffleur 5	Sizerin flammé 3	Troglodyte familier 2
Pygargue à tête blanche 1	Sterne caspienne 2	Tyrان à longue queue 5
Quiscale bronzé 2	Sterne pierregarin 2	Tyrان de l'Ouest 5
Quiscale de Brewer 5	Sturnelle des prés 2	Tyrان huppé 2
Quiscale rouilleux 2	Tadorne de Belon 5	Tyrان tritri 2
Râle de Virginie 2	Tarin des pins 1	Urubu à tête rouge 2
Râle jaune 5	Tétras à queue fine	Urubu noir 5
Roitelet à couronne dorée 1	Tétras du Canada 1	Vacher à tête brune 1
Roitelet à couronne rubis 2	Tohi à flancs roux 5	Vanneau huppé 5
Roselin familier 1	Tournepierre à collier 4	Viréo à gorge jaune 5
Roselin pourpré 1	Tourterelle à ailes blanches 5	Viréo à tête bleue 2
Sarcelle à ailes bleues 2	Tourterelle rieuse 5	Viréo aux yeux rouges 2
Sarcelle cannelle 5	Tourterelle triste 1	Viréo de Philadelphie 2
Sarcelle d'hiver 2	Troglodyte à bec court 5	Viréo mélodieux 2
Sittelle à poitrine blanche 1	Troglodyte de Caroline 3	

QUELQUES MUNICIPALITÉS DE LANAUDIÈRE ET ZONES GÉOGRAPHIQUES



PRÉSENTATION VISUELLE DE L'INFORMATION RELATIVE À CHAQUE ESPÈCE

Deux pages-tableaux présentent l'information relative à chaque espèce.

La première page-tableau comporte six parties.

IDENTIFICATION DE L'ESPÈCE

On retrouve sous ce titre le nom français, le crédit photo, les noms latin et anglais, le nom de la famille ainsi qu'une photo, généralement celle du mâle en plumage nuptial.

HABITAT FRÉQUENTÉ PAR L'ESPÈCE

Une photo présente un habitat caractéristique occupé par l'espèce; une description de l'habitat permet d'en saisir les composantes. Les informations qui accompagnent la photo de l'habitat s'appliquent aux quatre zones géographiques de Lanaudière et non à l'ensemble du Québec.

PRÉSENCE DE L'ESPÈCE DANS LANAUDIÈRE

Pendant les premières 35 années d'existence de la SOL, entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018, l'effort d'observation des ornithologues dans Lanaudière a permis d'enregistrer 47 582 feuillets d'observations quotidiennes comportant 553 192 mentions d'oiseaux, pour un total de 323 espèces vues ou entendues. Ce sont ces données d'observation qui nous permettent de tracer un portrait des oiseaux dans Lanaudière.

Le tableau donne le nombre de mentions pour chacune des saisons ainsi que le nombre total de mentions pour la période de 35 ans, les valeurs des constances d'observations saisonnières ainsi que la valeur de la constance d'observation pour la période. On indique aussi la classe attribuée à l'oiseau pour chaque saison et pour la période.

En effet, selon la valeur de la constance d'observation, l'oiseau se voit attribuer l'une ou l'autre des classes apparaissant au tableau ci-contre.

CLASSES					
31 %	≤	Assidu (A)			
15 %	≤	Commun (C)	<	31 %	
7 %	≤	Fréquent (F)	<	15 %	
3 %	≤	Occasionnel (O)	<	7 %	
1 %	≤	Rare (R)	<	3 %	
0 %	<	Inusité (I)	<	1 %	
		Exceptionnel (E)	=	0 %	

CARTE DE RÉPARTITION

Voir page vi.

STATUTS DES OISEAUX DANS LANAUDIÈRE

Lorsqu'on observe un oiseau dans Lanaudière, on peut lui rattacher un « statut » qui est lié à son type de présence dans la région, aux saisons où on prévoit l'observer. Ces statuts se rapportent aux six situations suivantes :

- **Nicheur résidant** : l'oiseau niche dans Lanaudière et y réside à l'année. On peut donc l'observer toute l'année. Sa présence est prévisible en toutes saisons.
- **Nicheur migrateur** : l'oiseau niche dans Lanaudière, mais il quitte pour le sud lors de sa migration d'automne et revient lors de sa migration printanière. On peut donc l'observer au printemps après qu'il soit arrivé, à l'été et à l'automne avant qu'il reparte. Sa présence est prévisible trois saisons.
- **Migrateur de passage** : l'oiseau ne niche pas dans Lanaudière. Il traverse notre région lors de son passage entre son aire de nidification et son aire d'hivernage, toutes deux en dehors de Lanaudière. On peut donc l'observer essentiellement au printemps et à l'automne. Sa présence est prévisible deux saisons.
- **Hivernant** : l'oiseau ne niche pas dans Lanaudière. Il n'y vient que pour l'hiver : il arrive généralement au cours de l'automne, passe l'hiver et quitte au printemps. Sa présence est prévisible trois saisons.

- **Visiteur** : l'oiseau ne vient dans Lanaudière qu'accidentellement, entraîné hors de l'aire qu'il occupe habituellement par suite de divers phénomènes de dispersion : erratisme, déplacements hors des voies habituelles de migration, dispersion pré-nuptiale ou post-nuptiale, incursions subites. On peut l'observer en toutes saisons, mais sa présence est totalement imprévisible.
- **Origine indéterminée** ou *origine captive* ou *visiteur exotique* : l'oiseau est relâché librement ou échappé accidentellement de captivité, non acclimaté, mais a peut-être niché à une ou plusieurs reprises au Québec. On peut l'observer en toutes saisons, mais sa présence est totalement imprévisible.


Tous les individus d'une espèce peuvent avoir essentiellement un seul et même statut et c'est le cas du Grand Chevalier dont tous les individus observés dans Lanaudière sont fort probablement des *migrateurs de passage*; l'espèce est observée surtout au printemps et parfois à l'automne. Mais ce n'est généralement pas le cas. Ainsi, à titre d'exemple, le Canard pilet que l'on observe en grand nombre au printemps est une espèce constituée essentiellement d'un mélange de *migrateurs de passage* et de *nicheurs* migrants, ces derniers étant moins nombreux; dans Lanaudière, on observe l'espèce au printemps, à l'été et à l'automne.

NIDIFICATION DANS LES ZONES GÉOGRAPHIQUES DE LANAUDIÈRE

On attribue le statut *espèce nicheuse de Lanaudière* à toutes les espèces dont au moins un couple a réussi une nidification à l'intérieur des limites de la région.

La carte ci-contre présente les quatre zones géographiques de Lanaudière par différentes nuances de vert : les Basses-Terres, la Plaine, le Piedmont et le Plateau.

Dans cette section, on indique si l'espèce fait partie des *espèces nicheuses de Lanaudière*, on mentionne d'où vient la confirmation de nidification (1^{er} ATLAS seulement, 2^e ATLAS seulement, les deux ATLAS, autre source) et on montre dans quelles zones géographiques de Lanaudière il y a eu confirmation de nidification.



Carte réalisée par Alexandre Nicole

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES PARCELLES OÙ IL Y A EU CONFIRMATION DE NIDIFICATION

"Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*,
Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages"

La deuxième page-tableau comporte trois parties.

ÉVOLUTION DE LA CONSTANCE D'OBSERVATION

Cette section permet de comparer le nombre de mentions et les valeurs des constances d'observation pour trois périodes consécutives.

- **1^e période - Des débuts jusqu'au 31 mai 1994**

Il s'agit de la période couverte par les travaux de recensement des oiseaux pour la période traitée dans la première édition (1997) du livre *À la découverte des oiseaux de Lanaudière*. Les auteurs ont alors considéré les données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis les débuts jusqu'au 31 mai 1994.

- **2^e période - du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004**

Il s'agit de la période couverte par les travaux de recensement des oiseaux pour la période traitée dans la seconde édition (2007) du livre *À la découverte des oiseaux de Lanaudière*. Les auteurs ont alors considéré les données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.

- **3^e période - du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018**

Il s'agit de la période couvrant les années qui suivent la publication de la deuxième édition du livre *À la découverte des oiseaux de Lanaudière*. Les auteurs ont alors considéré les données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés pendant la période du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018.

LES TENDANCES

- **Tendances sur 14 ans : décembre 2004 - décembre 2018 : analyse de l'évolution de la constance d'observation.**
- **Tendances sur 24 ans : mai 1994 - décembre 2018 : analyse de l'évolution de la constance d'observation.**

Variation de la tendance. Selon le pourcentage de diminution ou d'augmentation de la valeur de la constance d'observation d'une période à une autre, on considère que la tendance est fortement à la baisse, à la baisse, stable, à la hausse ou fortement à la hausse en se basant sur les critères du tableau ci-dessous.

TENDANCES	Variation de la CO
Fortement à la baisse	Diminution de plus de 50 %
À la baisse	Diminution de plus de 15 % jusqu'à 50 %
Stable	Diminution ou augmentation inférieure ou égale à 15 % OU si l'espèce est <i>inusitée</i> (mentionnée dans moins de 1 % des feuillets) aux deux époques comparées.
À la hausse	Augmentation supérieure à 15 % jusqu'à 50 %
Fortement à la hausse	Augmentation supérieure à 50 %

NOTES

Cette section présente, s'il y a lieu, des informations sur certaines caractéristiques et comportements de l'espèce ainsi que des informations sur la probabilité d'observation de l'oiseau dans Lanaudière.

Les données relatives à l'espèce sont tirées de plusieurs sources dont les **Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional**.

Liste alphabétique des espèces dont la présence dans Lanaudière est prévisible en toutes saisons

Alouette hausse-col 2	Faucon émerillon 42	Moineau domestique 82
Autour des palombes 4	Faucon pèlerin 44	Perdrix grise 84
Bec-croisé bifascié 6	Geai bleu 46	Petit-duc maculé 86
Bec-croisé des sapins 8	Gélinotte huppée 48	Petite Nyctale 88
Bernache du Canada 10	Goéland à bec cerclé 50	Pic à dos noir 90
Bruant chanteur 12	Goéland argenté 52	Pic chevelu 92
Busard des marais 14	Grand Corbeau 54	Pic mineur 94
Buse à queue rousse 16	Grand Harle 56	Pigeon biset 96
Canard colvert 18	Grand Pic 58	Pygargue à tête blanche 98
Canard noir 20	Grand-duc d'Amérique 60	Roitelet à couronne dorée 100
Cardinal rouge 22	Grimpereau brun 62	Roselin familial 102
Carouge à épaulettes 24	Gros-bec errant 64	Roselin pourpré 104
Chardonneret jaune 26	Harle couronné 66	Sittelle à poitrine blanche 106
Chouette rayée 28	Hibou des marais 68	Sittelle à poitrine rousse 108
Corneille d'Amérique 30	Hibou moyen-duc 70	Tarin des pins 110
Crécerelle d'Amérique 32	Junco ardoisé 72	Tétras du Canada 112
Dindon sauvage 34	Merle d'Amérique 74	Tourterelle triste 114
Épervier brun 36	Mésange à tête brune 76	Vacher à tête brune 116
Épervier de Cooper 38	Mésange à tête noire 78	
Étourneau sansonnet 40	Mésangeai du Canada 80	

L'AVIFAUNE DE LANAUDIÈRE

**Les espèces dont la présence dans Lanaudière
est prévisible en toutes saisons (PÉAH)**

ALOUETTE HAUSSE-COL

(Photo: Michèle Amyot)

Eremophila alpestris
Horned Lark

ALAUDIDAE


Habitat fréquenté par l'espèce

Fréquente les milieux dégagés avec végétation rase ou éparse : terres labourées, pâturages et prés.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	484	21	92	302	899
Const. obs.	4,49	0,57	1,87	4,27	1,89
Classe	O	I	R	O	R


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant	✓
Nicheur migrateur	✓	Visiteur	
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée	



Carte de répartition


Espèce nicheuse de Lanaudière



Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages


Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	498	39	62	99	698			
	Constance d'observation	14,3	3,59	3,90	4,95	8,56			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	302	17	74	214	607			
	Constance d'observation	6,90	1,13	2,21	5,46	4,62			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	484	21	92	302	899			
	Constance d'observation	4,49	0,57	1,87	4,27	3,40			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 26,4 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 60,3 %							
Fortement à la baisse ☒		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Cette famille compte deux sous-espèces au Québec : *Eremophila alpestris praticola* (Alouette des prairies) présente exclusivement dans le sud de la province (gorge jaune pâle et sourcil blanc) et *Eremophila alpestris alpestris* (Alouette du nord), plus sombre et gorge d'un jaune plus marqué. On la retrouve depuis l'extrémité nord du Québec jusqu'au sud de la Baie James, ainsi que sur la Côte-Nord, dans l'Île d'Anticosti, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.



Eremophila alpestris praticola



Eremophila alpestris alpestris

Au Québec, la situation de l'Alouette hausse-col s'est gravement détériorée depuis le premier atlas; l'oiseau a été signalé dans trois fois moins de parcelles. La situation dans Lanaudière est tout à fait conforme à celle du Québec, la constance d'observation ayant diminué de 26,4 % depuis décembre 2004 et de 60,3 % si l'on remonte à mai 1994.

AUTOUR DES PALOMBES

(Photo: Daniel Jauvin)

Accipiter gentilis
Northern Goshawk

ACCIPITRIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Cette espèce préfère les peuplements d'arbres matures avec couronne dense et sous-bois éclairci, comme les Sapinières à bouleau blanc et à bouleau jaune. Fréquente également la lisière des forêts. D'une année à l'autre l'autour retourne au même site de nidification.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	143	41	193	121	498
Const. obs.	0,81	0,69	1,78	0,91	1,05
Classe	I	I	R	I	R


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	32	9	8	23	72
	Constance d'observation	0,92	0,83	0,50	1,15	0,88
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.					
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	57	22	22	57	158
	Constance d'observation	1,30	1,46	0,66	1,46	1,20
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.					
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	61	13	144	45	263
	Constance d'observation	0,57	0,35	2,92	0,64	0,99
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.					
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 17,5 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☒ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 12,5 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☒ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						

NOTES

Gros rapace forestier. Il alterne les glissés avec une série de courts battements d'ailes relativement lents. L'alternance des battements et des glissés est moins systématique que chez les deux autres éperviers. Son vol paraît lourd et laborieux. Quand on l'observe en migration, à cause de sa taille on songe d'abord à une buse.

BEC-CROISÉ BIFASCIÉ

(Photo: Daniel Jauvin)

Loxia leucoptera

White-winged Crossbill

FRINGILLIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Vit en forêt de conifères. La production localisée des cônes explique ses déplacements erratiques et, certains hivers, les invasions inattendues aux mangeoires. Espèce observée dans les forêts d'épinettes.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	142	42	202	350	736
Const. obs.	0,81	0,71	1,86	2,65	1,55
Classe	I	I	R	R	R


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	


Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	19	8	28	58	113			
	Constance d'observation	0,55	0,74	1,76	2,90	1,39			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	48	18	74	89	229			
	Constance d'observation	1,10	1,19	2,21	2,27	1,74			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	77	17	43	202	339			
	Constance d'observation	0,71	0,46	0,87	2,86	1,28			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 26,4 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 7,91 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Le Bec-croisé bifascié est facile à reconnaître, les ailes noires marquées de deux bandes alaires blanches bien visibles le distinguent clairement du Bec-croisé des sapins. Le Bec-croisé bifascié est celui qui, parmi tous les becs-croisés de la planète, possède le bec le plus mince, ce qui explique sa préférence pour les résineux à petits cônes. Peut nicher presque à tout moment de l'année.

Les oiseaux sont très attirés par le sel contenu dans l'urée. En hiver, certains se posent parfois, pour leur plus grand malheur, au milieu des routes afin de manger un peu de sel dont ils semblent avoir grand besoin.



© Marcel Harnois

BEC-CROISÉ DES SAPINS

(Photo: Daniel Jauvin)

Loxia curvirostra

Red Crossbill

FRINGILLIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

La plupart des habitats lui conviennent. Présent dans la forêt de conifères où il peut nicher en toutes saisons, surtout dans le sud de l'aire. La production localisée des cônes explique ses déplacements erratiques.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	21	5	17	37	80
Const. obs.	0,12	0,08	0,16	0,28	0,17
Classe	I	I	I	I	I


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	14	1	1	5	21			
	Constance d'observation	0,40	0,09	0,06	0,25	0,26			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	6	2	9	14	31			
	Constance d'observation	0,14	0,13	0,27	0,36	0,24			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	9	2	7	19	37			
	Constance d'observation	0,08	0,05	0,14	0,27	0,14			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 41,7 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 46,2 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Le Bec-croisé des sapins est plus rouge que le Bec-croisé bifascié, mais dépourvu de bandes alaires blanches.



Bec-croisé des sapins
Plus rouge, sans barres alaires



Bec-croisé bifascié
Deux barres alaires blanches bien visibles



BERNACHE DU CANADA

(Photo: Marcel Harnois)

Branta canadensis

Canada Goose

ANATIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

La plupart des milieux lui conviennent pourvu qu'il s'y trouve un milieu humide ou aquatique.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	5 498	865	2 259	568	9 190
Const. obs.	31,3	14,6	20,8	4,29	19,3
Classe	A	F	C	O	C


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

**Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)**

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	644	25	168	2	839			
	Constance d'observation	18,5	2,30	10,6	0,10	10,3			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 161	155	366	94	1 776			
	Constance d'observation	26,5	10,3	10,9	2,40	13,5			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	3 847	687	1 242	380	6 156			
	Constance d'observation	35,7	18,6	25,2	5,37	23,3			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 72,5 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☒	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 126 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☒	

NOTES

La plus commune de nos oies, connue sous le nom populaire « outarde ».

Au Québec, repérée dans 37% des parcelles visitées, la Bernache du Canada est l'espèce de sauvagine dont l'aire de nidification s'est le plus agrandie d'un atlas à l'autre.

BRUANT CHANTEUR

(Photo: Alexandre Mathews)

Melospiza melodia

Song Sparrow

PASSERELLIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Fréquente surtout les terrains ouverts et broussailleux : fourrés bordant les cours d'eau, champs abandonnés, parcs et quartiers résidentiels.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	7 629	3 519	2 350	299	13 787
Const. obs.	43,3	59,4	21,7	2,26	29,0
Classe	A	A	C	R	C


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 278	569	293	49	2 189			
	Constance d'observation	36,8	52,4	18,4	2,45	26,9			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 918	856	619	96	3 489			
	Constance d'observation	43,8	56,8	18,5	2,45	26,5			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	4 749	2 280	1 153	141	8 323			
	Constance d'observation	44,1	61,8	23,4	1,99	31,5			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 18,9 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☒		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 17,1 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☒		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

On peut l'identifier rapidement par son chant : trois notes claires identiques, un bourdonnement et un trille final, et par la poitrine rayée qui montre un point sombre en son centre. Le juvénile peut ne pas présenter de tache sombre à la poitrine.

BUSARD DES MARAIS

(Photo: Michèle Amyot)

Circus hudsonius
Northern Harrier

ACCIPITRIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Le Busard des marais niche en milieu ouvert, dans les marais, les lieux humides et les champs en friche. Il évite en général les secteurs de forêts continues. Le nid est construit au sol. Le couple qui a réussi sa couvée a tendance à retourner au même endroit l'année suivante.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	1 602	369	755	122	2 848
Const. obs.	9,11	6,23	6,96	0,92	5,99
Classe	F	O	O	I	O


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière

✓


Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière




Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	484	126	238	29	877			
	Constance d'observation	13,9	11,6	15,0	1,45	10,8			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1 ^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	476	104	183	27	790			
	Constance d'observation	10,9	6,90	5,47	0,69	6,01			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1 ^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	760	160	299	64	1 283			
	Constance d'observation	7,05	4,33	6,07	0,90	4,85			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 19,3 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 55,1 %							
Fortement à la baisse ☒		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Ses battements d'ailes sont souples. L'oiseau vole souvent en rase-mottes, à la recherche de petits rongeurs; il semble alors flotter à quelques mètres au-dessus du sol en se balançant de côté, les ailes relevées au-dessus de l'horizontale. Il évolue lentement, alternant le vol plané et le vol ramé, tout en scrutant le sol. Son vol est sinueux.




© Richard Prévost

BUSE À QUEUE ROUSSE

(Photo: Michèle Amyot)

Buteo jamaicensis
Red-tailed Hawk

ACCIPITRIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Niche dans les grands arbres matures des îlots boisés en milieu agricole ainsi qu'à la lisière des forêts. Le nid occupe la fourche supérieure d'un feuillu, mais l'espèce utilise à l'occasion des conifères, surtout le pin. Cette buse partage souvent le même habitat que le Grand-duc d'Amérique.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	1 587	228	1 186	976	3 927
Const. obs.	8,74	3,85	10,9	7,38	8,25
Classe	F	O	F	F	F


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant	
Nicheur migrateur	✓	Visiteur	
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée	



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière

✓


Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	195	25	143	26	389
	Constance d'observation	5,61	2,30	9,00	1,30	4,77
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.					
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	384	66	237	228	915
	Constance d'observation	8,78	4,38	7,08	5,82	6,96
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.					
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	994	142	660	667	2 463
	Constance d'observation	9,23	3,85	13,4	9,43	9,31
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.					
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 33,8 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☐ À la hausse ☒ Fortement à la hausse ☐						
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 95,2 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☐ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☒						

NOTES

La tête de la Buse à queue rousse a l'air capuchonnée. Le dessous du corps blanchâtre est traversé par une bande ventrale constituée de rayures foncées, parfois estompées chez certains individus. Posée, cette espèce présente plus de blanc en dessous que la Buse pattue. Elle se perche rarement au sommet d'un arbre comme la Buse pattue, mais plutôt dans la partie médiane de l'arbre.



Buse à queue rousse



Buse pattue, forme claire

CANARD COLVERT

(Photo: Michèle Amyot)

Anas platyrhynchos

Mallard

ANATIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Le Canard colvert niche dans une variété d'habitats : tourbières, forêts, champs agricoles et même les milieux urbains.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	5 561	1 353	2 211	788	9 913
Const. obs.	31,6	22,8	20,4	5,96	20,8
Classe	A	C	C	O	C


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

**Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)**

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant	
Nicheur migrateur	✓	Visiteur	
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée	



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière


✓

Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	680	74	142	9	905			
	Constance d'observation	19,6	6,81	8,94	0,45	11,1			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 289	260	429	153	2 131			
	Constance d'observation	29,5	17,3	12,8	3,91	16,2			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	3 725	1 035	1 136	573	6 469			
	Constance d'observation	34,6	28,0	23,0	8,10	24,4			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 50,6 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☒	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 120 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☒	

NOTES

On l'identifie rapidement en vol à sa queue blanche. Plusieurs individus fréquentent les eaux libres en hiver.



© Barbara Marsolais


CANARD NOIR

(Photo: Denis Allard)

Anas rubripes

American Black Duck

ANATIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Se reproduit dans une grande variété de milieux humides et aquatiques : petits étangs, ruisseaux, marais et lacs. Il fréquente aussi bien les secteurs ouverts que boisés.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	2 261	429	1 137	400	4 227
Const. obs.	12,9	7,24	10,5	3,02	8,88
Classe	F	F	F	O	F


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

**Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)**

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant	
Nicheur migrateur	✓	Visiteur	
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée	



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière

✓


Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	620	73	206	15	914			
	Constance d'observation	17,8	6,72	13,0	0,75	11,2			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	660	134	286	99	1 179			
	Constance d'observation	15,1	8,89	8,55	2,53	8,97			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 164	253	448	326	2 191			
	Constance d'observation	10,8	6,85	9,09	4,61	8,28			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 7,69 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 26,1 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Au Québec, le Canard noir arrive en tête des espèces de sauvagine repérée dans le plus grand nombre de parcelles du 2^e atlas. Toutefois on note une baisse de 12 % d'un atlas à l'autre du nombre de parcelles où cette espèce a été signalée. Dans Lanaudière, on constate aussi cette diminution : la constance d'observation est restée relativement stable (une baisse de 7,69 %) depuis décembre 2004, mais a diminué de 26,1 % si on remonte à mai 1994.

CARDINAL ROUGE

(Photo: Denis Allard)

Cardinalis cardinalis

Northern Cardinal

CARDINALIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Niche dans les parcs et les jardins des villes.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	2 458	626	1 002	1 692	5 778
Const. obs.	14,0	10,6	9,24	12,8	12,1
Classe	F	F	F	F	F


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	
Le Piedmont	
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	40	5	18	54	117			
	Constance d'observation	1,15	0,46	1,13	2,70	1,44			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	480	133	295	444	1 352			
	Constance d'observation	11,0	8,83	8,82	11,3	10,3			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 940	488	573	1 106	4 107			
	Constance d'observation	18,0	13,2	11,6	15,6	15,5			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 52,0 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☒	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 976 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☒	

NOTES

La première observation dans Lanaudière a été faite à Mandeville en 1978. Aujourd'hui, cette espèce est nicheuse dans Lanaudière.

Le Cardinal rouge est l'une des espèces ayant le taux de croissance le plus élevé des oiseaux nicheurs du Québec. Dans Lanaudière, elle est la seconde espèce quand à la croissance de la constance d'observation avec une augmentation de 976 % depuis mai 1994. Seul le Pygargue à tête blanche (1 007 %) la dépasse dans Lanaudière.

CAROUGE À ÉPAULETTES

(Photo: Daniel Murphy)

Agelaius phoeniceus

Red-winged Blackbird

ICTERIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Cette espèce fréquente surtout les zones ouvertes. Le carouge est fortement associé aux marais à quenouilles, naturels ou aménagés. Il niche également le long des routes dans les fossés envahis par le phragmite.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	8 102	2 510	880	172	11 664
Const. obs.	46,1	42,4	8,12	1,30	24,5
Classe	A	A	F	R	C


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	1 531	555	176	26	2 288
	Constance d'observation	44,0	51,1	11,1	1,30	28,1
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.					
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	2 073	599	209	15	2 896
	Constance d'observation	47,4	39,8	6,25	0,38	22,0
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.					
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	4 877	1 560	363	130	6 930
	Constance d'observation	45,3	42,3	7,37	1,84	26,2
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.					
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 19,1 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☐ À la hausse ☒ Fortement à la hausse ☐						
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 6,76 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☒ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						

NOTES

Ses retentissants *Oncle Henri* révèlent rapidement la présence de cet oiseau bruyant et territorial.

La femelle est très différente du mâle!

Carouge à épaulettes, femelle



© Denis Allard

CHARDONNERET JAUNE

(Photo: Denis Allard)

Spinus tristis
American Goldfinch

FRINGILLIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Il est observé dans les friches et les milieux arbustifs.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	6 426	3 456	4 366	3 061	17 309
Const. obs.	36,5	58,3	40,3	23,1	36,4
Classe	A	A	A	C	A


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière

✓


Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	749	555	562	398	2 264			
	Constance d'observation	21,5	51,1	35,4	19,9	27,8			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 647	988	1 404	995	5 034			
	Constance d'observation	37,7	65,6	42,0	25,4	38,3			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	4 150	2 067	2 020	2 131	10 368			
	Constance d'observation	38,5	56,0	41,0	30,1	39,2			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 2,37 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 41,0 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☒		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Cette espèce est rare en forêt. Le mâle est facile à identifier en plumage nuptial. L'hiver, les deux sexes ressemblent à la femelle en plumage estival. Affectionne le chardon et le tournesol. Peut nicher tard en saison.



© Denis Allard


CHOUETTE RAYÉE

(Photo: Michèle Amyot)

Strix varia

Barred Owl

STRIGIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Cette chouette niche principalement dans les forêts de feuillus et les forêts mixtes. Elle habite surtout les domaines des érablières.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	122	24	53	78	277
Const. obs.	0,69	0,40	0,49	0,59	0,58
Classe	I	I	I	I	I


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

**Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)**

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière


✓

Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	17	5	4	10	36			
	Constance d'observation	0,49	0,46	0,25	0,50	0,44			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	35	5	21	17	78			
	Constance d'observation	0,80	0,33	0,63	0,43	0,59			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	72	15	26	48	161			
	Constance d'observation	0,67	0,41	0,53	0,68	0,61			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 3,39 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 38,6 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Seul rapace nocturne aux yeux foncés et non jaunes comme chez les autres strigidés.

Coloration du plumage caractéristique donnant l'impression d'un foulard dans le cou: haut de la poitrine barré horizontalement et ventre rayé verticalement de bandes brunes.

La plus loquace des dix espèces de hiboux du Québec.



© Barbara Marsolais

CORNEILLE D'AMÉRIQUE

(Photo: Daniel Murphy)

Corvus brachyrhynchos
American Crow

CORVIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

L'habitat de prédilection de la corneille comporte deux éléments importants : des milieux ouverts, où l'espèce pourra s'alimenter au sol, et des sites (arbres isolés, boisés et lisières de forêts), où elle pourra installer son nid.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	9 944	3 210	4 751	4 420	22 325
Const. obs.	56,5	54,2	43,8	33,4	46,9
Classe	A	A	A	A	A


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 572	543	634	316	3 065			
	Constance d'observation	45,2	50,0	39,9	15,8	37,6			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	2 536	865	1 215	1 264	5 880			
	Constance d'observation	58,0	57,4	36,3	32,3	44,7			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	6 223	1 966	2 418	2 687	13 294			
	Constance d'observation	57,8	53,3	49,1	38,0	50,2			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 12,3 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 33,5 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☒		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Espèce grégaire. Aujourd'hui, cette espèce est présente à l'année dans la région. En vol, elle rame plus qu'elle ne plane.

CRÉCERELLE D'AMÉRIQUE

(Photos: Michèle Amyot)

Falco sparverius
American Kestrel

FALCONIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

La crécerelle fréquente une grande variété d'habitats. On la rencontre à la lisière des forêts, en milieu agricole et en milieu urbain. Tout comme les autres faucons, elle ne fabrique pas de nid. Elle dépose ses œufs dans une petite dénivellation, une cavité naturelle, un trou creusé par un pic et même un nichoir installé à son intention.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	1 458	361	514	361	2 694
Const. obs.	8,29	6,09	4,74	2,73	5,66
Classe	F	O	O	R	O


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière


☒

Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	608	158	163	115	1 044			
	Constance d'observation	17,5	14,6	10,3	5,75	12,8			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1 ^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	481	126	127	183	917			
	Constance d'observation	11,0	8,36	3,80	4,67	6,98			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1 ^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	513	124	227	68	932			
	Constance d'observation	4,76	3,36	4,61	0,96	3,52			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 49,6 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 72,5 %							
Fortement à la baisse ☒		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

La Crécerelle d'Amérique se distingue des autres *Falconidés* par sa petite taille et son fréquent recours au vol sur place.



DINDON SAUVAGE

(Photo: Daniel Coderre)

Meleagris gallopavo

Wild Turkey

PHASIANIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Le Dindon sauvage affectionne les forêts de feuillus matures entremêlées de milieux agricoles.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	23	6	14	34	77
Const. obs.	0,13	0,10	0,13	0,26	0,16
Classe	I	I	I	I	I


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant	
Nicheur migrateur		Visiteur	
Migrateur de passage		Origine indéterminée	✓



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière


✓

Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	0	0	0	0	0
	Constance d'observation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.					
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	0	0	0	0	0
	Constance d'observation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.					
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	23	6	14	24	67
	Constance d'observation	0,21	0,16	0,28	0,34	0,25
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.					
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		s/o				
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐	Stable ☐	À la hausse ☐	Fortement à la hausse ☒	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		s/o				
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐	Stable ☐	À la hausse ☐	Fortement à la hausse ☒	

NOTES

Première mention signalée dans Lanaudière : un individu, observé du 23 février au 8 mars 2005 à Lavaltrie. Oiseau grégaire. Au Québec, cette espèce a connu un essor fulgurant depuis le décompte du premier atlas.



© Pierre Bannon

ÉPERVIER BRUN

(Photo: Richard Prévost)

Accipiter striatus

Sharp-shinned Hawk

ACCIPITRIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Cet épervier affectionne les forêts denses de conifères ou les forêts mixtes ainsi que les jeunes peuplements touffus, les éclaircies avec broussailles et les lisières de forêts. Lorsqu'il retourne sur son territoire de nidification, il construit souvent un nouveau nid à moins de 100 m du précédent.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

516	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	516	130	548	334	1 528
Const. obs.	2,93	2,19	5,06	2,53	3,21
Classe	R	R	O	R	O


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant	
Nicheur migrateur	✓	Visiteur	
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée	



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	108	30	59	59	256			
	Constance d'observation	3,11	2,76	3,71	2,95	3,14			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	193	55	111	124	483			
	Constance d'observation	4,41	3,65	3,32	3,17	3,67			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	234	50	315	138	737			
	Constance d'observation	2,17	1,35	6,39	1,95	2,78			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 24,3 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 11,5 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

L'Épervier brun est le plus petit de nos *Accipitridés*. Il semble avoir de plus longues ailes que l'Épervier de Cooper qui, pour sa part, semble posséder une queue plus longue. Il se perche rarement sur un piquet en milieu ouvert. En hiver, il chasse souvent au voisinage des mangeoires.

- La tête de l'Épervier brun est relativement petite et arrondie.
- Le dessus de la tête gris-bleu de l'adulte est de la même couleur ou à peine plus foncé que la nuque et le dos.
- L'œil semble placé au centre de la tête.



© Marc Guilbault


ÉPERVIER DE COOPER

(Photos: Barbara Marsolais)

Accipiter cooperii

Cooper's Hawk

ACCIPITRIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

L'Épervier de Cooper niche dans les peuplements denses. Son nid est isolé dans les forêts de feuillus ou mixtes parvenues à maturité, souvent proches d'un plan d'eau. Il installe son nid dans la fourche d'un arbre ou sur un vieux nid de corneille. Il en construit souvent plus d'un avant le début de l'incubation.



Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	214	44	142	276	676
Const. obs.	1,22	0,74	1,31	2,09	1,42
Classe	R	I	R	R	R


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	16	2	7	21	46
	Constance d'observation	0,46	0,18	0,44	1,05	0,56
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.					
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	38	4	13	42	97
	Constance d'observation	0,87	0,27	0,39	1,07	0,74
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.					
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	165	38	109	204	516
	Constance d'observation	1,53	1,03	2,21	2,88	1,95
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.					
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		164 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☐ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☒						
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		248 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☐ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☒						

NOTES

En vol, il évoque une croix. Sa tête relativement large, d'allure carrée, est projetée bien au-delà des poignets, qui sont peu ou pas du tout arqués en vol plané.

Toutes proportions gardées, les ailes de l'Épervier de Cooper sont relativement courtes, de sorte que l'oiseau a l'air d'avoir un gros corps et une longue queue.

Se perche souvent sur un piquet en milieu ouvert, ce qui n'est pas fréquent chez l'Épervier brun.

- La couronne de l'adulte, plus sombre que la nuque et le dos, présente un contraste notable avec ceux-ci.
- L'œil semble placé vers l'avant de la tête.

© Barbara Marsolais



ÉTOURNEAU SANSONNET

(Photo: Denis Allard)

Sturnus vulgaris
European Starling

STURNIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Présent en ville comme en campagne; il cohabite avec l'humain sur le territoire. Tout lui convient pour nicher : les structures tubulaires des supports métalliques des panneaux routiers, les moindres ouvertures dans les vieilles bâtisses, etc.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	7 366	1 978	2 697	4 040	16 081
Const. obs.	41,9	33,4	24,9	30,5	35,8
Classe	A	A	C	C	A


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	1 445	416	480	499	2 840
	Constance d'observation	41,6	38,3	30,2	25,0	34,8
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.					
Du 1 ^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	1 950	516	935	1 584	4 985
	Constance d'observation	44,6	34,2	27,9	40,5	37,9
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.					
Du 1 ^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	4 301	1 172	1 082	1 907	8 462
	Constance d'observation	39,9	31,8	22,0	27,0	32,0
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.					
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 15,6 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☒ Stable ☐ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 8,05 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☒ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						

NOTES

Introduit en Amérique du Nord (New York) en 1890, il a été observé pour la première fois au Québec en 1917. Présent en grand nombre au site d'enfouissement Saint-Thomas/Berthier.



FAUCON ÉMERILLON

(Photos: Raymond Piché)

Falco columbarius

Merlin

FALCONIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Ce faucon recherche les forêts discontinues. Il fréquente les lisières des forêts; souvent il occupe un nid de corneille ou de corbeau placé dans un conifère ou un feuillu. En milieu urbain, il niche dans des arbres adultes qui bordent les rues.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	650	304	463	162	1 579
Const. obs.	3,70	5,13	4,27	1,22	3,32
Classe	O	O	O	R	O


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière

✓


Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	31	3	24	9	67
	Constance d'observation	0,89	0,28	1,51	0,45	0,82
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.						
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	157	48	104	32	341
	Constance d'observation	3,59	3,19	3,11	0,82	2,59
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.						
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	468	253	266	118	1 105
	Constance d'observation	4,34	6,85	5,40	1,67	4,18
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.						
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 61,4 %				
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐	Stable ☐	À la hausse ☐	Fortement à la hausse ☒	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 410 %				
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐	Stable ☐	À la hausse ☐	Fortement à la hausse ☒	

NOTES

Pas beaucoup plus gros que la Crécerelle d'Amérique. Les battements d'ailes de l'émerillon sont courts, rapides et continus, comme les mouvements d'un piston. Contrairement à la Crécerelle d'Amérique, ce faucon se perche rarement sur les fils. À l'automne, on l'observe fréquemment survolant les rives herbeuses des cours d'eau ou des marais à la recherche de bécasseaux. En vol, cet oiseau semble plus foncé que la crécerelle.

Le Faucon émerillon revient chaque année dans le même quartier, mais nidifie habituellement dans un secteur différent.



FAUCON PÈLERIN

(Photo: Michèle Amyot)

Falco peregrinus

Peregrine Falcon

FALCONIDAE



©Michèle Amyot



Habitat fréquenté par l'espèce

Les falaises demeurent l'endroit de prédilection de cet oiseau. Toutefois, dans Lanaudière, la majorité des couples observés nichent sur les corniches des parois abruptes des carrières et sous les ponts assez élevés. Le Faucon pèlerin ne construit pas de nid; il dépose ses œufs sur le sol d'une corniche, dans une dénivellation peu profonde.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	407	88	109	80	684
Const. obs.	2,31	1,48	1,01	0,60	1,44
Classe	R	R	R	I	R


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant	
Nicheur migrateur	✓	Visiteur	
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée	



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière

☒


Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
✓	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	
Le Piedmont	
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	31	4	13	5	53
	Constance d'observation	0,89	0,37	0,82	0,25	0,65
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.					
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	59	2	3	26	90
	Constance d'observation	1,35	0,13	0,09	0,66	0,68
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.					
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	328	82	71	47	528
	Constance d'observation	3,04	2,22	1,44	0,66	1,99
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.					
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		= + 193 %				
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐	Stable ☐	À la hausse ☐	Fortement à la hausse ☒	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 206 %				
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐	Stable ☐	À la hausse ☐	Fortement à la hausse ☒	

NOTES

Population reconstituée au sud de la limite des arbres (sous-espèces *anatum*) : la calotte foncée s'étend en un large triangle sur les joues (triangle jugal) dont la largeur varie suite à l'hybridation interrassiale.

Population nichant dans la toundra (sous-espèce *tundrius*) : le triangle jugal noir est étroit.

Le Faucon pèlerin *anatum* est désigné comme *vulnérable* au Québec depuis 2003. Le Faucon pèlerin *tundrius* fait partie des espèces susceptibles d'être désignées comme *menacées* ou *vulnérables* au Québec.

GEAI BLEU

(Photo: Michèle Amyot)

Cyanocitta cristata

Blue Jay

CORVIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Commun en forêt et en banlieue.



Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	5 649	2 266	5 497	5 382	18 744
Const. obs.	32,1	38,2	50,7	40,3	39,4
Classe	A	A	A	A	A


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

**Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)**

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	661	320	584	692	2 257			
	Constance d'observation	19,0	29,5	36,8	34,6	27,7			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 587	642	1 859	1 794	5 882			
	Constance d'observation	36,3	42,6	55,6	45,8	44,8			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	3 537	1 391	2 541	2 735	10 204			
	Constance d'observation	32,8	37,7	51,6	38,7	38,6			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 13,8 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 39,4 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☒		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Bon imitateur de la Buse à épaulettes. Criard. Présent aux mangeoires en hiver.



GÉLINOTTE HUPPÉE

(Photo: Denis Allard)

Bonasa umbellus

Ruffed Grouse

PHASIANIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Fréquente les forêts feuillues ou mixtes qui comprennent des peuplements matures, mais aussi des peuplements plus jeunes et des milieux ouverts.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	1 028	337	623	485	2 473
Const. obs.	5,84	5,69	5,75	3,67	5,20
Classe	O	O	O	O	O


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

**Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)**

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	235	75	18	89	417			
	Constance d'observation	6,76	6,91	1,13	4,45	5,12			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	384	105	254	177	920			
	Constance d'observation	8,78	6,97	7,59	4,52	7,00			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	484	183	231	232	1 130			
	Constance d'observation	4,49	4,96	4,69	3,28	4,27			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 39,0 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 16,6 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Le tambourinement de la Gélinothe huppée peut s'entendre jusqu'à un demi-kilomètre.

GOÉLAND À BEC CERCLÉ

(Photo: Michèle Amyot)

Larus delawarensis

Ring-billed Gull

LARIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Le Goéland à bec cerclé préfère s'établir sur des îles, mais on a signalé quelques colonies sur des rivages isolés.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	6 381	2 325	3 091	403	12 200
Const. obs.	36,3	39,2	28,5	3,05	25,6
Classe	A	A	C	O	C


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 060	411	496	47	2 014			
	Constance d'observation	30,5	37,9	31,2	2,35	24,7			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 520	558	754	169	3 001			
	Constance d'observation	34,7	37,0	22,5	4,32	22,8			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	3 940	1 423	1 351	172	6 886			
	Constance d'observation	36,6	38,6	27,4	2,43	26,0			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 14,0 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 5,26 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Cette espèce suit les activités humaines : elle accompagne le laboureur dans les champs, se regroupe sur les sites d'enfouissement, surveille les clients aux abords des casse-croûtes. Bref, il est là où il y a une possibilité de chaparder un peu de nourriture.

GOÉLAND ARGENTÉ

(Photo: Michèle Amyot)

Larus argentatus

Herring Gull

LARIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Utilise une variété de sites pour nicher, en autant qu'il se trouve près de l'eau et à l'abri des prédateurs terrestres. Niche en colonies ou en couples isolés sur les îles, les rochers.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	1 060	235	603	614	2 512
Const. obs.	6,03	3,96	5,56	4,64	5,28
Classe	O	O	O	O	O


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant	
Nicheur migrateur	✓	Visiteur	
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée	



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	
La Plaine	
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	278	48	102	20	448			
	Constance d'observation	7,99	4,42	6,42	1,00	5,50			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	244	74	199	167	684			
	Constance d'observation	5,58	4,91	5,95	4,26	5,20			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	669	135	268	387	1 459			
	Constance d'observation	6,21	3,66	5,44	5,47	5,51			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 5,96 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 0,2 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Plus gros que le Goéland à bec cerclé. On le reconnaît à ses pattes roses, son bec jaune marqué d'un point rouge et sa tête blanche. Comme tous les goélands, il présente une variété de plumages selon l'âge.

GRAND CORBEAU

(Photo: Barbara Marsolais)

Corvus corax
Common Raven

CORVIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Affectionne les forêts conifériennes et mixtes, les carrières et les escarpements. Depuis quelques années, on observe de plus en plus la présence de nids de Grands Corbeaux dans des pylônes électriques de la plaine. Le couple reste ensemble pour la vie et défend un territoire.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	2 135	764	1 691	1 898	6 488
Const. obs.	12,1	12,9	15,6	14,3	13,6
Classe	F	F	C	F	F


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	91	39	90	89	309			
	Constance d'observation	2,62	3,59	5,66	4,45	3,79			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	464	158	382	367	1 371			
	Constance d'observation	10,6	10,5	11,4	9,37	10,4			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 596	573	965	1 377	4 511			
	Constance d'observation	14,8	15,5	19,6	19,5	17,0			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 63,5 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☒	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 348 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☒	

NOTES


La queue cunéiforme est relativement longue. Les plumes de la gorge sont allongées, pointues et hérissées. Contrairement à la corneille, le Grand Corbeau plane souvent et réalise maintes acrobaties en vol.

GRAND HARLE

(Photo: Denis Allard)

Mergus merganser
Common Merganser

ANATIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Niche à proximité d'un plan d'eau. Le Grand Harle pose ses œufs dans une cavité, le plus souvent dans un gros arbre ou parfois au niveau du sol.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	1 684	318	800	578	3 380
Const. obs.	9,57	5,37	7,38	4,37	7,10
Classe	F	O	F	O	F


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	367	38	106	33	544
	Constance d'observation	10,6	3,50	6,67	1,65	6,67
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.						
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	452	99	213	150	914
	Constance d'observation	10,3	6,57	6,37	3,83	6,95
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.						
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	936	198	386	340	1 860
	Constance d'observation	8,69	5,36	7,83	4,81	7,03
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.						
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018 + 1,15 %						
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☒ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018 + 5,40 %						
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☒ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						

NOTES

Les femelles Grand Harle et Harle huppé sont souvent difficiles à distinguer. Il faut remarquer attentivement la façon dont le brun de la tête se découpe sur le blanc de la poitrine de façon nette chez la femelle Grand Harle, alors qu'il est diffus sur le cou et la poitrine de la femelle Harle huppé. À noter la présence importante de blanc sur les flancs et la poitrine du Grand Harle mâle.



GRAND PIC

(Photo: Denis Allard)

Dryocopus pileatus

Pileated Woodpecker

PICIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Fréquente les forêts matures feuillues ou mixtes.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	2 003	336	414	636	3 389
Const. obs.	11,4	5,67	3,82	4,81	7,12
Classe	F	O	O	O	F


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière

✓


Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière




Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	92	11	33	60	196			
	Constance d'observation	2,65	1,01	2,08	3,00	2,40			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	344	73	154	139	710			
	Constance d'observation	7,86	4,84	4,60	3,55	5,40			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	786	256	328	429	1 799			
	Constance d'observation	7,30	6,94	6,56	6,06	6,80			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 25,9 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☒		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 183 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☒	

NOTES

Les grandes cavités rectangulaires ou ovales qu'il creuse permettent de déceler sa présence en forêt. Son tambourinage sonore et retentissant ainsi que son cri, semblable à celui du Pic flamboyant, mais plus court, aident à l'identifier.




© Michèle Amyot

GRAND-DUC D'AMÉRIQUE

(Photo: Michèle Amyot)

Bubo virginianus
Great Horned Owl

STRIGIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Le Grand-duc s'accommode de toutes sortes de milieux, pourvu qu'il y trouve un boisé adéquat pour nicher.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	219	25	57	142	443
Const. obs.	1,25	0,42	0,53	1,07	0,93
Classe	R	I	I	R	I


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière

✓


Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	110	11	23	36	180
	Constance d'observation	3,16	1,01	1,45	1,80	2,21
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.					
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	55	6	20	50	131
	Constance d'observation	1,26	0,40	0,60	1,28	1,00
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.					
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	69	8	15	58	150
	Constance d'observation	0,64	0,22	0,30	0,82	0,57
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.					
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 43,0 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☒ Stable ☐ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 74,2 %				
Fortement à la baisse ☒ À la baisse ☐ Stable ☐ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						

NOTES

Hibou massif de forte taille. L'aspect redoutable et la marque blanche à la gorge le distinguent du Hibou moyen-duc.


GRIMPEREAU BRUN

(Photo: Michèle Amyot)

Certhia americana

Brown Creeper

CERTHIIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Niche dans les forêts âgées de feuillus ou de conifères. Recherche les chicots dont l'écorce se détache en lambeaux pour y accrocher son nid.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	650	115	369	392	1 526
Const. obs.	3,70	1,94	3,40	2,96	3,21
Classe	O	R	O	R	O


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	122	15	53	45	235			
	Constance d'observation	3,51	1,38	3,34	2,25	2,88			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	193	35	127	97	452			
	Constance d'observation	4,41	2,32	3,80	2,48	3,44			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	368	69	153	223	813			
	Constance d'observation	3,42	1,87	3,10	3,15	3,07			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 10,8 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 6,60 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Bien que largement réparti sur l'ensemble du territoire, sa présence se fait discrète en raison de sa coloration qui permet de le confondre avec l'écorce des arbres qu'il arpente en spirale de bas en haut.




© Denis Allard

GROS-BEC ERRANT

(Photo: Michèle Amyot)

Coccothraustes vespertinus
Evening Grosbeak

FRINGILLIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Niche en forêts mixtes. Sa présence sur le territoire est associée étroitement à celle de la chenille de la Tordeuse des bourgeons de l'épinette.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	1 102	256	463	890	2 711
Const. obs.	6,27	4,32	4,27	6,75	5,70
Classe	O	O	O	O	O


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	521	77	219	397	1 214			
	Constance d'observation	15,0	7,09	13,8	19,9	14,9			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	394	132	157	414	1 097			
	Constance d'observation	9,01	8,76	4,69	10,6	8,35			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	297	83	155	216	751			
	Constance d'observation	2,76	2,25	3,15	3,05	2,84			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 66,0 %							
Fortement à la baisse ☒		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 80,9 %							
Fortement à la baisse ☒		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une espèce « errante ». Des années peuvent s'écouler sans qu'on aperçoive un seul individu de l'espèce aux mangeoires, puis subitement cet oiseau envahit en grand nombre les sites d'alimentation bien pourvus en tournesol. Cet oiseau trapu et bavard émet un *pir* strident qui révèle sa présence dans les parages ou en vol.

HARLE COURONNÉ

(Photo: Denis Allard)

Lophodytes cucullatus

Hooded Merganser

ANATIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Niche dans une cavité d'arbres, ou encore un nichoir, près de petits lacs, d'étangs et de rivières en forêts dé-cidues et mixtes.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	954	69	746	119	1 888
Const. obs.	5,42	1,16	6,88	0,90	3,97
Classe	O	R	O	I	O


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

**Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)**

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essen-tiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant	
Nicheur migrateur	✓	Visiteur	
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée	



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière

✓


Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	184	10	54	1	249			
	Constance d'observation	5,29	0,92	3,40	0,05	3,05			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	231	13	152	36	432			
	Constance d'observation	5,28	0,86	4,54	0,92	3,29			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	577	49	367	66	1 059			
	Constance d'observation	5,36	1,33	7,45	0,93	4,00			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 21,6 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☒		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 31,1 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☒		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Lorsqu'elle est aplatie, la huppe du mâle présente une large ligne blanche.



HIBOU DES MARAIS

(Photo: Daniel Jauvin)

Asio flammeus
Short-eared Owl

STRIGIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Cette espèce fréquente divers habitats comme les prairies, les champs de foin, les terres en friche, les tourbières et les prairies humides.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	31	3	23	50	107
Const. obs.	0,18	0,05	0,21	0,38	0,22
Classe	I	I	I	I	I


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière

✓


Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
✓	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	
Le Piedmont	
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	19	3	12	11	45			
	Constance d'observation	0,55	0,28	0,76	0,55	0,55			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	5	1	5	15	26			
	Constance d'observation	0,11	0,07	0,15	0,38	0,20			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	17	0	6	23	46			
	Constance d'observation	0,16	0,00	0,12	0,33	0,17			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 15,0 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 69,1 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Actif en général à l'aube et au crépuscule. Survole les champs en friche à la recherche de proies. Vol irrégulier rappelant celui d'un papillon. Se pose souvent au sol. En vol, dessous des ailes pâle avec tache foncée au poignet.

Le Hibou des marais fait partie des espèces susceptibles d'être désignées comme *menacées* ou *vulnérables* au Québec.

HIBOU MOYEN-DUC

(Photo: Barbara Marsolais)

Asio otus

Long-eared Owl

STRIGIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Rapporté dans les environnements de forêts mixtes entrecoupées de petits champs.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	5	10	6	1	22
Const. obs.	0,03	0,17	0,06	< 0,01	0,05
Classe	I	I	I	I	I


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	5	1	5	0	11			
	Constance d'observation	0,14	0,09	0,31	0,00	0,13			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1	0	3	1	5			
	Constance d'observation	0,02	0,00	0,09	0,03	0,04			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	0	9	0	0	9			
	Constance d'observation	0,00	0,24	0,00	0,00	0,03			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 25 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 77 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Hibou nocturne longiligne fort discret; sa présence est détectée par les cris des jeunes quémendant de la nourriture, habituellement en juillet. Plus petit et plus mince que le Grand-duc dont il se distingue par les longues aigrettes rapprochées et un disque facial orangé.


JUNCO ARDOISÉ

(Photo: Michèle Amyot)

Junco hyemalis

Dark-eyed Junco

PASSERELLIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Niche en forêt de conifères jeunes ou matures, ou en forêt mixte. Présent surtout dans les peuplements en régénération.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	4 394	287	2 401	3 121	10 203
Const. obs.	25,0	4,84	22,1	23,6	21,4
Classe	C	O	C	C	C


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant	✓
Nicheur migrateur	✓	Visiteur	
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée	



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière

✓


Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	673	83	246	196	1 198			
	Constance d'observation	19,4	7,64	15,5	9,80	14,7			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 063	95	737	683	2 578			
	Constance d'observation	24,3	6,30	22,0	17,4	19,6			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	2 830	150	1 233	2 069	6 282			
	Constance d'observation	26,3	4,05	25,0	29,3	23,7			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 20,9 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☒		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 61,2 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☒	

NOTES

Le Junco ardoisé est l'un des oiseaux le plus communs en Amérique du Nord avec une population estimée à plus de 600 millions d'individus.

MERLE D'AMÉRIQUE

(Photo: Denis Allard)

Turdus migratorius

American Robin

TURDIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Fréquente plusieurs habitats, tant les milieux urbains que les milieux forestiers. Niche dans toutes les zones géographiques de Lanaudière.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	8 907	3 698	2 654	315	15 574
Const. obs.	50,6	62,4	24,5	2,38	32,7
Classe	A	A	C	R	A


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

**Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)**

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 499	578	397	21	2 495			
	Constance d'observation	43,1	53,2	25,0	1,05	30,6			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	2 309	1 016	744	53	4 122			
	Constance d'observation	52,8	67,4	22,2	1,35	31,4			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	5 469	2 280	1 332	238	9 319			
	Constance d'observation	50,8	61,8	27,0	3,36	35,2			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 12,1 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 15,0 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Se nourrit de lombrics en été et de petits fruits en automne. Peut faire deux nichées consécutives.

Observé parfois en hiver dans Lanaudière.



MÉSANGE À TÊTE BRUNE

(Photo: Michèle Amyot)

Poecile hudsonicus
Boreal Chickadee

PARIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Fait partie des rares passereaux nord-américains qui vivent toute l'année dans les forêts de conifères.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	139	60	238	120	457
Const. obs.	0,79	1,01	1,27	0,91	0,96
Classe	I	R	R	I	I


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	25	13	25	21	84			
	Constance d'observation	0,72	1,20	1,57	1,05	1,03			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	59	20	66	41	186			
	Constance d'observation	1,35	1,33	1,97	1,05	1,42			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	63	31	54	60	208			
	Constance d'observation	0,58	0,84	1,10	0,85	0,79			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 44,4 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 23,3 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Se distingue de la Mésange à tête noire par sa calotte brune et son chant plus lent et plus nasillard que celui de sa consœur.

MÉSANGE À TÊTE NOIRE

(Photo: Michelle Boulard)

Poecile atricapillus

Black-capped Chickadee

PARIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Commune dans les bois clairs, les clairières et les banlieues; utilise parfois les nichoirs.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	8 049	2 658	5 153	7 283	23 143
Const. obs.	45,8	44,8	47,5	55,1	48,6
Classe	A	A	A	A	A


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière


✓

Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 022	326	613	952	2 913			
	Constance d'observation	29,4	30,0	38,6	47,6	35,7			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	2 071	762	1 851	2 104	6 788			
	Constance d'observation	47,3	50,6	55,3	53,7	51,6			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	5 136	1 656	2 807	4 046	13 645			
	Constance d'observation	47,7	44,9	57,0	57,2	51,6			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		0,00 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 44,5 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☒		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Présente aux mangeoires en hiver. Familière, elle accepte, sur les sites les plus fréquentés, les graines de tournesol posées dans la main des visiteurs.



MÉSANGEAI DU CANADA

(Photo: Michèle Amyot)

Perisoreus canadensis

Canada Jay

CORVIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Ce résident des forêts conifériennes niche tôt en mars et avril.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	221	70	231	257	779
Const. obs.	1,26	1,18	2,13	1,94	1,64
Classe	R	R	R	R	R


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	31	12	50	38	131			
	Constance d'observation	0,89	1,10	3,15	1,90	1,61			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	94	27	114	81	316			
	Constance d'observation	2,15	1,79	3,41	2,07	2,40			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	99	33	81	141	354			
	Constance d'observation	0,92	0,89	1,64	1,99	1,34			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 44,2 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 16,8 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Autrefois appelé Geai gris, puis Geai du Canada. Cet oiseau très peu farouche est d'une gourmandise incroyable qui le rend parfois un peu polisson. Il communique avec ses congénères à l'aide de cris variés et rauques ou encore de sifflements doux; on dirait que l'oiseau marmonne continuellement.

Les jeunes sont gris foncé, presque noirâtre, avec une petite moustache blanche.



© Michèle Amyot

MOINEAU DOMESTIQUE

(Photo: Pierre Bannon)

Passer domesticus

House Sparrow

PASSERIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Omniprésent dans les régions habitées. Très grégaire en dehors de la saison de reproduction.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	3 591	905	1 652	3 271	9 419
Const. obs.	20,4	15,3	15,2	24,7	19,8
Classe	C	C	C	C	C


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	975	247	339	666	2 227			
	Constance d'observation	28,0	22,7	21,3	33,3	27,3			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1 ^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 164	341	874	1 591	3 970			
	Constance d'observation	26,6	22,6	26,1	40,6	30,2			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1 ^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 660	388	445	1 211	3 704			
	Constance d'observation	15,4	10,5	9,03	17,1	14,0			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 53,6 %							
Fortement à la baisse ☒		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 48,7 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Introduit en Amérique du Nord en 1850, à Brooklyn (New York) et en 1854 à Québec. Espèce en concurrence au niveau de l'habitat avec le Roselin familial.

PERDRIX GRISE

(Photo: Michèle Amyot)

Perdix perdix
Gray Partridge

PHASIANIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Habite les terres cultivées. Pratiquement invisible pendant la période de nidification, la végétation ayant tôt fait de soustraire les individus au regard des observateurs.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	145	22	51	318	536
Const. obs.	0,82	0,37	0,47	2,40	1,13
Classe	I	I	I	R	R


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	64	9	26	109	208			
	Constance d'observation	1,84	0,83	1,64	5,45	2,55			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	41	14	23	105	183			
	Constance d'observation	0,94	0,93	0,69	2,68	1,39			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	49	0	10	113	172			
	Constance d'observation	0,45	0,00	0,20	1,60	0,65			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 53,2 %							
Fortement à la baisse ☒		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 74,5 %							
Fortement à la baisse ☒		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Originaire d'Eurasie. Au Québec, la population a commencé à s'implanter dans le sud du territoire au début des années 1940. Plutôt rare dans le Québec méridional. Plus facile à repérer pendant la saison froide à proximité des fermes.




PETIT-DUC MACULÉ

(Photo: Marcel Harnois)

Megascops asio

Eastern Screech-Owl

STRIGIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Évite les vastes forêts matures. Le Petit-duc préfère s'établir dans les peuplements ouverts dont le sous-étage est clairsemé ainsi qu'en lisière des boisés.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	23	3	13	75	114
Const. obs.	0,13	0,05	0,12	0,57	0,24
Classe	I	I	I	I	I


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

**Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)**

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	
Le Piedmont	
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	7	0	2	0	9			
	Constance d'observation	0,20	0,00	0,13	0,00	0,11			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	7	1	6	30	44			
	Constance d'observation	0,16	0,07	0,18	0,77	0,33			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	11	2	3	41	57			
	Constance d'observation	0,10	0,05	0,06	0,58	0,22			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 36,7 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 100 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Présente trois formes de coloration: gris, roux – plus rare – et brun chocolat. L'oiseau se fond avec l'environnement lorsqu'il se pose à l'entrée de la cavité d'un arbre et se chauffe au soleil.




PETITE NYCTALE

(Photo: Barbara Marsolais)

Aegolius acadicus

Northern Saw-whet Owl

STRIGIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Cet oiseau forestier peut nicher tant en milieu feuillu ou mixte que coniférien.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	108	9	14	23	154
Const. obs.	0,61	0,15	0,13	0,17	0,32
Classe	I	I	I	I	I


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière




Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	
Les Terres-Basses	

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	29	0	3	10	42			
	Constance d'observation	0,83	0,00	0,19	0,50	0,52			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	31	5	7	9	52			
	Constance d'observation	0,71	0,33	0,21	0,23	0,40			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	51	4	3	4	62			
	Constance d'observation	0,47	0,11	0,06	0,06	0,23			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 42,5 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 55,8 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Disque facial brunâtre sans bordure sombre. Bec foncé, celui de la Nyctale de Tengmalm étant pâle. Réside exclusivement en Amérique du Nord.



Petite Nyctale



Nyctale de Tengmalm

PIC À DOS NOIR

(Photo: Michèle Amyot)

Picoides arcticus

Black-backed Woodpecker

PICIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Associé à la forêt coniférienne. Fréquente les forêts brûlées où il se nourrit de larves de longicornes et d'autres insectes qui pullulent sur les troncs calcinés. Malgré cette affinité, les forêts matures non perturbées par le feu constituent un habitat important pour la reproduction de l'espèce.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	72	23	66	107	268
Const. obs.	0,41	0,39	0,61	0,81	0,56
Classe	I	I	I	I	I


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	22	6	12	26	66			
	Constance d'observation	0,63	0,55	0,76	1,30	0,81			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1 ^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	24	2	26	25	77			
	Constance d'observation	0,55	0,13	0,78	0,64	0,59			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1 ^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	27	15	26	56	124			
	Constance d'observation	0,25	0,41	0,53	0,79	0,47			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 20,3 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 42,0 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Constance d'observation à la baisse en regard du premier atlas.


PIC CHEVELU

(Photo: Daniel Jauvin)

Picoides villosus

Hairy Woodpecker

PICIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Occupe tous les zones géographiques de Lanaudière.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	3 366	1 002	2 280	3 342	9 990
Const. obs.	19,1	16,9	21,0	25,3	21,0
Classe	C	C	C	C	C


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

**Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)**

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	359	89	154	472	1 074			
	Constance d'observation	10,3	8,20	9,69	23,6	13,2			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	975	280	696	999	2 950			
	Constance d'observation	22,3	18,6	20,8	25,5	22,4			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	2 172	652	1 274	1 826	5 924			
	Constance d'observation	20,2	17,7	25,9	25,8	22,4			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		0,00 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 69,7 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☒	

NOTES


D'un atlas à l'autre, la probabilité d'observation a augmenté.

PIC MINEUR

(Photo: Michèle Amyot)

Picoides pubescens
Downy Woodpecker

PICIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Son abondance relative la plus élevée s'observe dans l'Érablière à Caryer, l'Érablière à tilleul de l'Est et la Sapi-
nière à bouleau jaune.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	4 538	1 113	2 384	3 796	11 831
Const. obs.	25,8	18,8	22,0	28,7	24,9
Classe	C	C	C	C	C


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essen-
tiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	525	165	236	548	1 474			
	Constance d'observation	15,1	15,2	14,9	27,4	18,1			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 170	324	642	1 118	3 254			
	Constance d'observation	26,7	21,5	19,2	28,6	24,8			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	2 917	658	1 228	2 043	6 846			
	Constance d'observation	27,1	17,8	24,9	28,9	25,9			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 4,44 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 43,1 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☒		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Le plus petit des pics des États-Unis et du Canada. Observé aux mangeoires en hiver.

On peut distinguer le Pic mineur du Pic chevelu par la longueur relative de leur bec. Le bec du Pic mineur est beaucoup plus petit que la longueur de sa tête alors que la longueur du bec du Pic chevelu équivaut presque à la longueur de sa tête.



Bec du Pic mineur



Bec du Pic chevelu

PIGEON BISET

(Photo: Michèle Amyot)

Columba livia

Rock Pigeon

COLUMBIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Fréquente autant les milieux urbains que ruraux. Niche sous les viaducs et les ponts, occupe les structures des édifices en milieu urbain.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	3 143	817	1 254	2 904	8 118
Const. obs.	17,9	13,8	11,6	22,0	17,1
Classe	C	F	F	C	C


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière

✓


Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	613	154	223	386	1 376
	Constance d'observation	17,6	14,2	14,0	19,3	16,9
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.					
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	919	236	556	1 179	2 890
	Constance d'observation	21,0	15,7	16,6	30,1	22,0
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.					
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	1 742	450	521	1 375	4 088
	Constance d'observation	16,2	12,2	10,6	19,4	15,5
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.					
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 29,5 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☒ Stable ☐ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 8,28 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☒ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						

NOTES

Observé dans toutes les zones géographiques de Lanaudière.

PYGARGUE À TÊTE BLANCHE

(Photo: Michèle Amyot)

Haliaeetus leucocephalus

Bald Eagle

ACCIPITRIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Niche habituellement à proximité de l'eau, des lacs ou des rivières. Il construit de préférence son nid dans un arbre adulte. Le pygargue utilise surtout le Pin blanc. Le nid est occupé année après année et peut devenir immense.

Nid de pygargue à Saint-Michel-des-Saints, Lanaudière



Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	619	268	517	293	1 697
Const. obs.	3,52	4,52	4,77	2,22	3,57
Classe	O	O	O	R	O


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant	
Nicheur migrateur	✓	Visiteur	
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée	



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
✓	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	12	6	9	9	36
	Constance d'observation	0,35	0,55	0,57	0,45	0,44
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.						
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	68	42	62	43	215
	Constance d'observation	1,55	2,79	1,85	1,10	1,64
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.						
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	539	215	320	216	1 290
	Constance d'observation	5,00	5,82	6,49	3,05	4,87
Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.						
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 197 %				
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐	Stable ☐	À la hausse ☐	Fortement à la hausse ☒	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 1 007 %				
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐	Stable ☐	À la hausse ☐	Fortement à la hausse ☒	

NOTES

Cet oiseau massif plane les ailes presque à plat, à angle droit avec le corps; on dirait une planche volante en raison de son allure rigide. Le battement d'ailes lent du pygargue est comparable à celui du Grand Héron, mais en plus puissant.

Le Pygargue à tête blanche est désigné comme *vulnérable* au Québec depuis 2003.



ROITELET À COURONNE DORÉE

(Photo: Daniel Jauvin)

Regulus satrapa
Golden-crowned Kinglet

REGULIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Les forêts conifériennes matures constituent son habitat de prédilection.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	689	348	728	171	1 936
Const. obs.	3,92	5,87	6,72	1,29	4,07
Classe	O	O	O	R	O


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière

✓


Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	122	31	101	32	286
	Constance d'observation	3,51	2,85	6,36	1,60	3,51
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.					
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	219	80	223	44	566
	Constance d'observation	5,01	5,31	6,66	1,12	4,31
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.					
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	384	249	296	84	1 013
	Constance d'observation	3,56	6,75	6,01	1,19	3,83
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.					
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 11,1 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☒ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 6,27 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☒ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						

NOTES

En hiver, il migre à l'intérieur même d'une large part de son aire de nidification. La population du Roitelet à couronne dorée s'est accrue d'un atlas à l'autre.

ROSELIN FAMILIER

(Photo: Michèle Amyot)

Haemorhous mexicanus

House Finch

FRINGILLIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Ce roselin fréquente les milieux urbains. Il occupe souvent les mêmes habitats que le Moineau domestique : les lierres accrochés aux maisons, les ouvertures dans les excédents, les arbustes, etc.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	1 349	349	895	1 146	3 739
Const. obs.	7,67	5,89	8,26	8,66	7.86
Classe	F	O	F	F	F


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

**Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)**

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	127	37	88	132	384
	Constance d'observation	3,65	3,41	5,54	6,60	4,71
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.					
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	508	127	560	529	1 724
	Constance d'observation	11,6	8,43	16,7	13,5	13,1
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.					
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	715	185	211	452	1 563
	Constance d'observation	6,64	5,01	4,28	6,39	5,91
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.					
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 54,9 %				
Fortement à la baisse ☒ À la baisse ☐ Stable ☐ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐						
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 25,5 %				
Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☐ Stable ☐ À la hausse ☒ Fortement à la hausse ☐						

NOTES

Cet oiseau, originaire du sud-ouest des États-Unis, a été introduit dans l'Est de l'Amérique du Nord en 1976. Le Roselin familier est de plus en plus présent aux mangeoires, surtout en milieu urbain. Il est plus petit que le Roselin pourpre qui présente une coloration rouge framboise davantage étendue.



Roselin familier



Roselin pourpre

ROSELIN POURPRÉ

(Photo: Denis Allard)

Haemorhous purpureus

Purple Finch

FRINGILLIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Il fréquente les forêts de conifères ou les bois mixtes; il est observé moins fréquemment dans les régions où les conifères se font rares.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	2 551	1 223	1 075	643	5 492
Const. obs.	14,5	20,6	9,92	4,86	11,5
Classe	F	C	F	O	F


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant	
Nicheur migrateur	✓	Visiteur	
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée	



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	486	209	139	122	956			
	Constance d'observation	14,0	19,2	8,75	6,10	11,7			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	814	422	364	225	1 825			
	Constance d'observation	18,6	28,0	10,9	5,75	13,9			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 340	657	554	288	2 839			
	Constance d'observation	12,4	17,8	11,2	4,07	10,7			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 23,0 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 8,57 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Le Roselin pourpré mâle, presque entièrement rouge framboise, plus vif sur la tête et le croupion, est facile à reconnaître. La femelle se distingue de la femelle du Roselin familier par la bande couleur noisette bien nette sur le côté de la tête, le sourcil pâle et un favori marqué. Au printemps, vers la fin d'avril ou le début de mai, il faut porter attention afin de ne pas confondre cette femelle avec la femelle du Cardinal à poitrine rose, plus grosse et au bec plus fort.



Roselin pourpré femelle



Cardinal à poitrine rose femelle

SITTELE À POITRINE BLANCHE

(Photo: Michèle Amyot)

Sitta carolinensis

White-breasted Nuthatch

SITTIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Fréquente les forêts de feuillus.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	2 729	578	2 053	2 700	8 060
Const. obs.	15,5	9,75	18,9	20,4	16,9
Classe	C	F	C	C	C


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	315	105	215	323	958			
	Constance d'observation	9,06	9,67	13,5	16,2	11,8			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	602	154	521	705	1 982			
	Constance d'observation	13,8	10,2	15,6	18,0	15,1			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 876	346	1 096	1 596	4 914			
	Constance d'observation	17,4	9,37	22,2	22,6	18,6			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 23,2 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☒		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 57,6 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☒	

NOTES

Se nourrit sur les troncs des arbres, la tête en bas. Moins répandue que la Sittelle à poitrine rousse, mais observée plus souvent aux mangeoires en hiver.




SITTELE À POITRINE ROUSSE

(Photo: Denis Allard)

Sitta canadensis
Red-breasted Nuthatch

SITTIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Habite les forêts de conifères.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	2 653	1 156	2 412	2 207	8 428
Const. obs.	15,1	19,5	22,2	16,7	17,7
Classe	C	C	C	C	C


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

**Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)**

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	288	99	152	198	737			
	Constance d'observation	8,28	9,12	9,57	9,90	9,04			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	755	310	659	527	2 251			
	Constance d'observation	17,3	20,6	19,7	13,5	17,1			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 675	768	1 305	1 403	5 151			
	Constance d'observation	15,6	20,8	26,5	19,8	19,5			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		+ 14,0 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 116 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☒	

NOTES

Plus petite que la Sittelle à poitrine blanche. L'aire de nidification de cette espèce a peu changé depuis l'époque du premier atlas.


TARIN DES PINS

(Photo: Denis Allard)

Spinus pinus

Pine Siskin

FRINGILLIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Présent dans les forêts de résineux matures.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	2 099	251	488	854	3 692
Const. obs.	11,9	4,23	4,50	6,46	7,76
Classe	F	O	O	O	F


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	418	65	72	147	702			
	Constance d'observation	12,0	5,99	4,53	7,35	8,61			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	588	102	172	203	1 065			
	Constance d'observation	13,4	6,77	5,14	5,18	8,10			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1 123	97	206	229	1 655			
	Constance d'observation	10,4	2,63	4,18	3,24	6,25			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 22,8 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 27,4 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Le Tarin des pins est un oiseau grégaire qui peut se joindre aux sizerins en hiver; c'est un oiseau nomade.


TÉTRAS DU CANADA

(Photo: Daniel Jauvin)

Falcapennis canadensis

Spruce Grouse

PHASIANIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Fréquente principalement les forêts de conifères matures où sa présence est associée à celle de l'ÉpINETTE noire.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	6	9	32	12	59
Const. obs.	0,03	0,15	0,30	0,09	0,12
Classe	I	I	I	I	I


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière


✓

Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages



Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	4	3	4	4	15			
	Constance d'observation	0,12	0,28	0,25	0,20	0,18			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	2	4	20	4	30			
	Constance d'observation	0,05	0,27	0,60	0,10	0,23			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	1	2	14	4	21			
	Constance d'observation	0,01	0,05	0,28	0,06	0,08			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 65,2 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		- 55,6 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☒		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

Niche essentiellement au Canada.

TOURTERELLE TRISTE

(Photo: Denis Allard)

Zenaida macroura

Mourning Dove

COLUMBIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

Occupe une variété d'habitats. Niche à proximité des habitations et fréquente volontiers les mangeoires.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	6 913	2 388	3 718	5 047	18 066
Const. obs.	39,3	40,3	34,3	38,2	38,0
Classe	A	A	A	A	A


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur		Visiteur
Migrateur de passage		Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	997	301	465	541	2 304			
	Constance d'observation	28,7	27,7	29,3	27,1	28,3			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.								
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	2 080	782	1 584	1 938	6 384			
	Constance d'observation	47,5	51,9	47,3	49,5	48,6			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.								
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période			
	Nb de mentions	3 924	1 346	1 580	2 439	9 289			
	Constance d'observation	36,4	36,5	32,1	34,5	35,1			
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.								
TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018		- 27,8 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☒		Stable ☐		À la hausse ☐		Fortement à la hausse ☐	
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018		+ 24,0 %							
Fortement à la baisse ☐		À la baisse ☐		Stable ☐		À la hausse ☒		Fortement à la hausse ☐	

NOTES

La Tourterelle triste a commencé à se répandre au Québec au cours des années 1940, mais ce n'est qu'en 1970 qu'une partie de la population a commencé à y hiverner régulièrement. Pendant 35 ans, on a assisté à une croissance (une hausse de la constance d'observation de 71,8 % entre mai 1994 et décembre 2004) puis une décroissance (une baisse de 27,8 % de la constance d'observation entre décembre 2004 et décembre 2018) de la présence de la Tourterelle triste dans Lanaudière. Entre mai 1994 et décembre 2018, on enregistre une hausse de 24,0 % de la constance d'observation de cette espèce.

VACHER À TÊTE BRUNE

(Photo: Daniel Murphy)

Molothrus ater

Brown-headed Cowbird

ICTERIDAE



Habitat fréquenté par l'espèce

L'habitat de prédilection de cette espèce se situe à la transition entre milieux ouverts et milieux boisés.

Présence de l'espèce dans Lanaudière

(Selon les données de 47 582 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018)

	Printemps	Étés	Automnes	Hivers	PÉRIODE
Mentions	2 768	630	153	144	3 695
Const. obs.	15,7	10,6	1,41	1,09	7,77
Classe	C	F	R	R	F


TYPE DE PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE

Présence prévisible 4 saisons :
printemps, été, automne, hiver
(PÉAH)

Statuts des oiseaux au 31 mars 2018

Les oiseaux de l'espèce observée dans Lanaudière peuvent avoir, essentiellement, le ou les statuts suivants :

Nicheur résidant	✓	Hivernant
Nicheur migrateur	✓	Visiteur
Migrateur de passage	✓	Origine indéterminée



Carte de répartition

Espèce nicheuse de Lanaudière




Confirmations de nidification

	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} ATLAS seulement
	Nicheur confirmé selon 2 ^e ATLAS seulement
✓	Nicheur confirmé selon 1 ^{er} et 2 ^e ATLAS
	Nicheur confirmé par une autre source que l'ATLAS

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages

Nidification dans les différentes zones géographiques de Lanaudière



Le Plateau	✓
Le Piedmont	✓
La Plaine	✓
Les Terres-Basses	✓

Évolution de la constance d'observation

Des débuts jusqu'au 31 mai 1994 Période de recensement des oiseaux considérée pour la première édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (1997).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	930	260	72	30	1 292
	Constance d'observation	26,7	23,9	4,53	1,50	15,9
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 8 152 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés depuis le début jusqu'au 31 mai 1994.					
Du 1^{er} juin 1994 au 31 décembre 2004 Période de recensement des oiseaux considérée pour la deuxième édition du livre <i>À la découverte des oiseaux de Lanaudière</i> (2007).		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	859	200	57	56	1 172
	Constance d'observation	19,6	13,3	1,70	1,43	8,92
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 13 144 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} juin 1994 et le 31 décembre 2004.					
Du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2018		P	É	A	H	Période
	Nb de mentions	1 240	263	36	55	1 594
	Constance d'observation	11,5	7,13	0,73	0,78	6,02
	Valeurs obtenues ou calculées à partir des données de 26 467 feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1 ^{er} janvier 2005 et le 31 décembre 2018.					

TENDANCES : DÉCEMBRE 2004 - DÉCEMBRE 2018

- 32,5 %

Fortement à la baisse ☐ À la baisse ☒ Stable ☐ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐
TENDANCES : MAI 1994 - DÉCEMBRE 2018

- 62,1 %

Fortement à la baisse ☒ À la baisse ☐ Stable ☐ À la hausse ☐ Fortement à la hausse ☐

NOTES

Dépose ses œufs dans le nid d'autres espèces. Plusieurs individus sont observés annuellement en hiver sur le site d'enfouissement Saint-Thomas/Berthier, en compagnie des Étourneaux sansonnets.

ANALYSE DES DONNÉES

Espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons

Le caractère cyclique de la vie des oiseaux permet de prévoir les saisons où une espèce peut être présente dans Lanaudière. Dans le présent ouvrage on a regroupé les espèces selon leur type de présence dans Lanaudière, les saisons où leur présence est prévisible. Cette approche permet d'identifier les espèces dont la présence est ...

- prévisible en toutes saisons : printemps, été, automne et hiver (PÉAH);
- prévisible trois saisons : printemps, été et automne; imprévisible à l'hiver (PÉA);
- prévisible trois saisons : automne, hiver et printemps; imprévisible à l'été (AHP);
- prévisible deux saisons : printemps et automne; imprévisible à l'été et à l'hiver (PA);
- imprévisible en toutes saisons (IMP).

On obtient le tableau suivant :

Catégorie	Nombre d'espèces	% des espèces	Pourcentage des mentions*				
			PRINTEMPS	ÉTÉ	AUTOMNE	HIVER	PÉRIODE
PÉAH	58	17,31 %	56,85 %	43,01 %	64,42 %	82,21 %	59,62 %
PÉA	116	34,63 %	36,34 %	56,09 %	28,80 %	1,22 %	33,19 %
AHP	20	5,97 %	3,63 %	0,11 %	3,06 %	16,14 %	4,76 %
PA	39	11,64 %	2,99 %	0,60 %	3,46 %	0,19 %	2,21 %
IMP	102	30,45 %	0,19 %	0,19 %	0,26 %	0,24 %	0,21 %


Ce tableau situe les 58 espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons dans Lanaudière (PÉAH) en regard des quatre autres catégories.

On note que ces 58 espèces, soit 17,31 % de celles notées dans Lanaudière, récoltent cependant pour l'ensemble de la période 59,62 % des mentions, loin devant les autres catégories. Le tableau présente également le pourcentage de mentions pour chacune des saisons.

DIVERSITÉ ORNITHOLOGIQUE

Ces 58 espèces sont distribuées dans 21 des 56 familles d'oiseaux notées dans la région. On y compte...

- neuf rapaces diurnes (six des douze espèces d'*Accipitridés* et trois des quatre espèces de *Falconidés*),
- six des dix espèces de *Strigidés*, (hiboux ou chouettes)
- quatre des sept espèces de *Phasianidés* (perdrix, gélinottes, faisans, dindon, etc.)
- cinq des 47 espèces d'*Anatidés* (canards ou espèces qui leur ressemblent)
- quatre des neuf espèces de *Picidés* (pics)
- quatre des cinq espèces de *Corvidés* (corneilles, corbeaux, geais, etc.)
- sept des onze espèces de *Fringilidés* (chardonnerets, rosélins, sizerins, etc.)



Busard des marais



Petite Nyctale

À la page 128 et aux suivantes, on trouvera la liste des 336 espèces d'oiseaux notées dans Lanaudière avant le 1^{er} janvier 2020, selon l'ordre taxonomique, avec identification des espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons.

* selon les données des feuillets d'observations quotidiennes enregistrés pendant les 35 premières années de la SOL, du 1^{er} avril 1983 au 31 mars 2018

PRÉSENCE RELATIVE DES ESPÈCES

ESPÈCES DONT LA PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE EST PRÉVISIBLE EN TOUTES SAISONS Présence relative des espèces		
Classe	Nombre d'espèces	% des espèces
Assidue (A)	7	12,07 %
Commune (C)	12	20,69 %
Fréquente (F)	10	17,24 %
Occasionnelle (O)	12	20,69 %
Rare (R)	6	10,34 %
Inusitée (I)	11	18,96 %
Exceptionnelle (E)	0	0 %

Les sept espèces *assidues* (mentionnées dans plus de 31 % des feuillets d'observations quotidiennes) sont : la Mésange à tête noire (CO* = 48,6), la Corneille d'Amérique (CO = 46,9), le Geai bleu (CO = 39,4), la Tourterelle triste (CO = 38,0), le Chardonneret jaune (CO = 37,6), l'Étourneau sansonnet (CO = 33,8) et le Merle d'Amérique (CO = 32,7).



Mésange à tête noire

Les onze espèces *inusitées* (mentionnées dans moins de 1 % des feuillets d'observations quotidiennes) sont : la Mésange à tête brune (CO = 0,96), le Grand-duc d'Amérique (CO = 0,93), la Chouette rayée (CO = 0,58), le Pic à dos noir (CO = 0,56), la Petite Nyctale (CO = 0,32), le Petit-duc maculé (CO = 0,24), le Hibou des marais (CO = 0,22), le Bec-croisé des sapins (CO = 0,17), le Dindon sauvage (CO = 0,16), le Tétrás du Canada (CO = 0,12) et le Hibou moyen-duc (CO = 0,05). On y retrouve les six *strigidés* qui font partie des espèces dont la présence dans Lanaudière est prévisible en toutes saisons.



Mésange à tête brune

ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES AU QUÉBEC

Une espèce est *menacée* lorsque sa disparition est appréhendée. Une espèce est *vulnérable* lorsque sa survie est précaire même si sa disparition n'est pas appréhendée. Parmi ces 58 espèces, aucune n'est *menacée*. Cependant, deux espèces sont désignées *vulnérables*.

Le Pygargue à tête blanche

Le Pygargue à tête blanche est désigné comme *vulnérable* depuis 2003 parce que sa population est faible comparativement à la situation qui prévalait au début du vingtième siècle et parce que certaines menaces persistent encore sur lui : abattage par des braconniers, captures accidentelles lors d'activités de piégeage, contamination par des produits toxiques, dérangement et perte d'habitat.



© Michèle Amyot

* CO = la constance d'observation de l'espèce pour la période du 1^{er} avril 1983 au 31 mars 2018

Le Faucon pèlerin *anatum*

Le Faucon pèlerin *anatum* est désigné *vulnérable* depuis 2003 parce que l'effectif de la population reproductrice est encore faible et parce que les pesticides organochlorés, utilisés dans certains pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud où migrent plusieurs faucons pèlerins ainsi que leurs proies, contaminent encore plusieurs oiseaux.



NIDIFICATION SELON LES QUATRE ZONES GÉOGRAPHIQUES DE LANAUDIÈRE

Comme elles sont présentes en toutes saisons, ces espèces nichent de facto dans Lanaudière. Certaines espèces nichent dans plus d'une zone géographique. Ainsi, la nidification de 50 espèces est confirmée dans la Plaine, 48 dans le Plateau, 40 dans la Piedmont et 33 dans les Terres-Basses.

Une analyse du tableau ci-joint permet de dégager les informations suivantes :

- 37,9 % des espèces (22) sont confirmées nicheuses dans chacune des quatre zones géographiques de Lanaudière.
- 29,3 % des espèces (17) sont confirmées nicheuses dans trois zones géographiques.
- 22,4 % des espèces (13) sont confirmées nicheuses dans deux zones géographiques
- 10,3 % des espèces (6) sont confirmées nicheuses dans une seule zone géographique :
 - dans le Plateau : le Bec-croisé des sapins, la Mésange à tête brune, le Mésangeai du Canada, le Pic à dos noir et le Tétrás du Canada.
 - dans la Plaine : le Hibou des marais.

ESPÈCES DONT LA PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE EST PRÉVISIBLE EN TOUTES SAISONS Présence dans chaque zone géographique			
Nombre de zones	Zones où la nidification est confirmée	Nombre d'espèces	Nombre d'espèces
4	Toutes	22	22
3	T.-B., Plaine, Piedmont	1	17
	T.-B., Plaine, Plateau	4	
	Plaine, Piedmont, Plateau	12	
2	T.-B., Plaine	5	13
	T.-B., Plateau	1	
	Plaine, Piedmont	3	
	Plaine, Plateau	2	
1	Piedmont, Plateau	2	
	Plaine	1	6
	Plateau	5	

ÉVOLUTION DE LA CONSTANCE D'OBSERVATION

Variation de la tendance. Selon le pourcentage de diminution ou d'augmentation de la valeur de la constance d'observation d'une période à une autre, on considère que la tendance est fortement à la baisse, à la baisse, stable, à la hausse ou fortement à la hausse en se basant sur les critères du tableau ci-dessous.

TENDANCES	Variation de la CO
Fortement à la baisse	Diminution de plus de 50 %
À la baisse	Diminution de plus de 15 % jusqu'à 50 %
Stable	Diminution ou augmentation inférieure ou égale à 15 % OU si l'espèce est <i>inusitée</i> (mentionnée dans moins de 1 % des feuillets) aux deux époques comparées.
À la hausse	Augmentation supérieure à 15 % jusqu'à 50 %
Fortement à la hausse	Augmentation supérieure à 50 %

L'analyse traitera d'abord les tendances sur 14 ans (de décembre 2004 à décembre 2018) puis les tendances sur 24 ans (de mai 1994 à décembre 2018). Elle permettra de faire ressortir les espèces dont la constance d'observation est fortement à la baisse ou fortement à la hausse.

TENDANCES SUR 14 ANS

ESPÈCES DONT LA PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE EST PRÉVISIBLE EN TOUTES SAISONS Évolution de la constance d'observation entre décembre 2004 et décembre 2018		
Variation de la Constance d'observation	Nombre d'espèces	% des espèces
Fortement à la baisse	4	6,90 %
À la baisse	15	25,86 %
Stable	23	39,66 %
À la hausse	7	12,07 %
Fortement à la hausse	9	15,52 %

Le tableau révèle que 23 espèces (39,66 %) sont demeurées stables entre décembre 2004 et décembre 2018.

Espèces fortement à la baisse

Les quatre espèces fortement à la baisse sont :

- le Gros-bec errant (- 66,0 %),
- le Roselin familial (- 54,9 %),
- le Moineau domestique (- 53,6 %),
- la Perdrix grise (- 53,2 %).

Gros-bec errant



Espèces fortement à la hausse

Les neuf espèces fortement à la hausse sont :

le Pygargue à tête blanche (197 %), le Faucon pèlerin (193 %), l'Épervier de Cooper (164 %), la Bernache du Canada (72,5 %), le Grand Corbeau (63,5 %), le Faucon émerillon 61,4 %), le Cardinal rouge (52,0 %), le Canard colvert (50,6 %) et le Dindon sauvage.

Dindon sauvage



TENDANCES SUR 24 ANS

ESPÈCES DONT LA PRÉSENCE DANS LANAUDIÈRE EST PRÉVISIBLE EN TOUTES SAISONS Évolution de la constance d'observation entre mai 1994 et décembre 2018		
Variation de la Constance d'observation	Nombre d'espèces	% des espèces
Fortement à la baisse	7	12,07 %
À la baisse	6	10,34 %
Stable	21	36,21 %
À la hausse	9	15,52 %
Fortement à la hausse	15	25,86 %

Le tableau révèle que 21 espèces (36,21 %) sont demeurées stables entre mai 1994 et décembre 2018.

Espèces fortement à la baisse

Les sept espèces fortement à la baisse sont : le Gros-bec errant (- 80,9 %), la Perdrix grise (- 74,5 %), le Grand-duc d'Amérique (- 74,2 %), la Crécerelle d'Amérique (- 72,5 %), le Vacher à tête brune (- 62,1 %), l'Alouette hausse-col (- 60,3 %) et le Busard des marais (- 55,1 %).

Perdrix grise



Espèces fortement à la hausse

Les quinze espèces fortement à la hausse sont : le Pygargue à tête blanche (1 007 %), le Cardinal rouge (976 %), le Faucon émerillon (410 %), le Grand Corbeau (348 %), l'Épervier de Cooper (248 %), le Faucon pèlerin (206 %), le Grand Pic (183 %), la Bernache du Canada (126 %), le Canard colvert (120 %), la Sittelle à poitrine rousse (116 %), la Buse à queue rousse (95,2 %), le Pic chevelu (69,7 %), le Junco ardoisé (61,2 %), la Sittelle à poitrine blanche (57,6 %) et le Dindon sauvage qui était exceptionnel (aucune mention) avant 2005.

Cardinal rouge



Liste des 58 espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons dans Lanaudière (PÉAH) classées selon la valeur décroissante de leur constance d'observation, d'après les feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018

No	Nom	COP	COE	COA	COH	CO ₃₅
1	Mésange à tête noire	45,8	44,9	47,5	55,1	48,6
2	Corneille d'Amérique	56,5	54,2	43,8	33,4	46,9
3	Geai bleu	32,1	38,2	50,7	40,3	39,4
4	Tourterelle triste	39,3	40,3	34,3	38,2	38,0
5	Chardonneret jaune	36,5	58,3	40,3	27,7	37,6
6	Étourneau sansonnet	41,9	33,4	24,9	30,5	33,8
7	Merle d'Amérique	50,6	62,4	24,5	2,38	32,7
8	Bruant chanteur	43,3	59,4	21,7	2,26	29,0
9	Goéland à bec cerclé	36,3	39,2	28,5	3,05	25,6
10	Pic mineur	25,8	18,8	22,0	28,7	24,9
11	Carouge à épaulettes	46,1	42,4	8,12	1,30	24,5
12	Junco ardoisé	25,0	4,84	22,2	23,6	21,4
13	Pic chevelu	19,1	16,9	21,0	25,3	21,0
14	Canard colvert	31,6	22,8	20,4	5,96	20,8
15	Moineau domestique	20,4	15,3	15,2	24,7	19,8
16	Bernache du Canada	31,3	14,6	20,8	4,29	19,3
17	Sittelle à poitrine rousse	15,1	19,5	22,3	16,7	17,7
18	Pigeon biset	17,9	13,8	11,6	22,0	17,1
19	Sittelle à poitrine blanche	15,5	9,75	18,9	20,4	16,9
20	Grand Corbeau	12,1	12,9	15,6	14,4	13,6
21	Cardinal rouge	14,0	10,6	9,24	12,8	12,1
22	Roselin pourpré	14,5	20,6	9,92	4,86	11,5
23	Canard noir	12,9	7,24	10,5	3,02	8,88
24	Buse à queue rousse	8,74	3,85	10,9	7,38	8,25
25	Roselin familier	7,67	5,89	8,26	8,66	7,86
26	Vacher à tête brune	15,7	10,6	1,41	1,09	7,77
27	Tarin des pins	11,9	4,23	4,50	6,46	7,76
28	Grand Pic	11,4	5,67	3,82	4,81	7,12
29	Grand Harle	9,57	5,37	7,38	4,37	7,10
30	Busard des marais	9,11	6,23	6,96	0,92	5,99


COP = Constance d'observation printanière; COE = Constance d'observation estivale; COA = Constance d'observation automnale; COH = Constance d'observation hivernale; CO₃₅ = Constance d'observation pour la période de 35 ans

Liste des 58 espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons dans Lanaudière (PÉAH) classées selon la valeur décroissante de leur constance d'observation, d'après les feuillets d'observations quotidiennes enregistrés entre le 1^{er} avril 1983 et le 31 mars 2018 (suite)

No	Nom	COP	COE	COA	COH	CO ₃₅
31	Gros-bec errant	6,27	4,32	4,27	6,73	5,70
32	Crécerelle d'Amérique	8,29	6,09	4,74	2,73	5,66
33	Goéland argenté	6,03	3,96	5,56	4,64	5,28
34	Gélinotte huppée	5,84	5,69	5,75	3,67	5,20
35	Alouette hausse-col	6,35	1,11	2,09	4,69	4,27
36	Roitelet à couronne dorée	3,92	5,87	6,72	1,29	4,07
37	Harle couronné	5,42	1,16	6,88	0,90	3,97
38	Pygargue à tête blanche	3,52	4,52	4,77	2,22	3,57
39	Faucon émerillon	3,70	5,13	4,27	1,22	3,32
40	Épervier brun	2,93	2,19	5,06	2,53	3,21
41	Grimpereau brun	3,70	1,94	3,40	2,96	3,21
42	Mésangeai du Canada	1,26	1,18	2,13	1,94	1,64
43	Bec-croisé bifascié	0,81	0,71	1,86	2,65	1,55
44	Faucon pèlerin	2,31	1,48	1,01	0,60	1,44
45	Épervier de Cooper	1,22	0,74	1,31	2,09	1,42
46	Perdrix grise	0,82	0,37	0,47	2,40	1,13
47	Autour des palombes	0,81	0,69	1,78	0,91	1,05
48	Mésange à tête brune	0,79	1,01	1,27	0,91	0,96
49	Grand-duc d'Amérique	1,25	0,42	0,53	1,07	0,93
50	Chouette rayée	0,69	0,40	0,49	0,59	0,58
51	Pic à dos noir	0,41	0,39	0,61	0,81	0,56
52	Petite Nyctale	0,61	0,15	0,13	0,17	0,32
53	Petit-duc maculé	0,13	0,05	0,12	0,57	0,24
54	Hibou des marais	0,18	0,05	0,21	0,38	0,22
55	Bec-croisé des sapins	0,12	0,08	0,16	0,28	0,17
56	Dindon sauvage	0,13	0,10	0,13	0,26	0,16
57	Tétras du Canada	0,03	0,15	0,30	0,09	0,12
58	Hibou moyen-duc	0,03	0,17	0,06	0,01	0,05

COP = Constance d'observation printanière; COE = Constance d'observation estivale; COA = Constance d'observation automnale; COH = Constance d'observation hivernale; CO₃₅ = Constance d'observation pour la période de 35 ans

Liste des 10 espèces qui, parmi les 58 espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons, ont vu la valeur de la **constance d'observation augmenter** de plus de 100 % entre MAI 1994 et DÉCEMBRE 2018. Les espèces sont classées selon l'ordre décroissant de l'augmentation de la constance d'observation.

	(1) Pygargue à tête blanche + 1 007 %		(2) Cardinal rouge + 976 %
	(3) Faucon émerillon + 410 %		(4) Grand Corbeau + 348 %
	(5) Épervier de Cooper + 248 %		(6) Faucon pèlerin + 206 %
	(7) Grand Pic + 183 %		(8) Bernache du Canada + 126 %
	(9) Canard colvert + 120 %		(10) Sittelle à poitrine rousse + 116 %

Liste des 7 espèces qui, parmi les 58 espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons, ont vu la valeur de la **constance d'observation diminuer** de plus de 50 % entre MAI 1994 et DÉCEMBRE 2018. Les espèces sont classées selon l'ordre décroissant de diminution de la constance d'observation.

	(1) Gros-bec errant - 80,9 %		(2) Perdrix grise - 74,5 %
	(3) Grand-duc d'Amérique - 74,2 %		(4) Crécerelle d'Amérique - 72,5 %
	(5) Vacher à tête brune - 62,1 %		(6) Alouette hausse-col - 60,3 %
	(7) Busard des marais - 55,1 %		

LISTE DES 336 ESPÈCES D'OISEAUX NOTÉES DANS LANAUDIÈRE AVANT LE 1^{er} JANVIER 2020

Les noms de chaque espèce et l'ordre taxinomique utilisés tout au long de cet ouvrage sont ceux retenus par l'American Ornithological Society (AOS) au 1^{er} décembre 2019 et dont la liste est mise à jour annuellement par la Commission internationale des noms français des oiseaux. En bleu, les espèces dont la présence est prévisible dans Lanaudière en toutes saisons (PÉAH).

ANATIDAE

Dendrocygne à ventre noir	Dendrocygna autumnalis	Black-bellied Whistling-Duck
Oie des neiges	Chen caerulescens	Snow Goose
Oie de Ross	Chen rossii	Ross's Goose
Oie cendrée	Anser anser	Graylag Goose
Oie rieuse	Anser albifrons	Greater White-fronted Goose
Oie à bec court	Anser brachyrhynchus	Pink-footed Goose
Bernache cravant	Branta bernicla	Brant
Bernache nonnette	Branta leucopsis	Barnacle Goose
Bernache de Hutchins	Branta hutchinsii	Cackling Goose
Bernache du Canada	Branta canadensis	Canada Goose
Cygne tuberculé	Cygnus olor	Mute Swan
Cygne siffleur	Cygnus colombianus	Tundra Swan
Cygne chanteur	Cygnus cygnus	Whooper Swan
Cygne noir	Cygnus atratus	Black Swan
Ouette d'Égypte	Alopochen aegyptiaca	Egyptian Goose
Tadorne de Belon	Tadorna tadorna	Common Shelduck
Canard branchu	Aix sponsa	Wood Duck
Sarcelle à ailes bleues	Spatula discors	Blue-winged Teal
Sarcelle cannelle	Spatula cyanoptera	Cinnamon Teal
Canard souchet	Spatula clypeata	Northern Shoveler
Canard chipeau	Mareca strepera	Gadwall
Canard siffleur	Macera penelope	Eurasian Wigeon
Canard d'Amérique	Mareca americana	American Wigeon
Canard colvert	Anas platyrhynchos	Mallard
Canard noir	Anas rubripes	American Black Duck
Canard pilet	Anas acuta	Northern Pintail
Sarcelle d'hiver	Anas crecca	Green-winged Teal
Fuligule à dos blanc	Aythya valisineria	Canvasback
Fuligule à tête rouge	Aythya americana	Redhead
Fuligule à collier	Aythya collaris	Ring-necked Duck
Fuligule morillon	Aythya fuligula	Tufted Duck
Fuligule milouinan	Aythya marila	Greater Scaup
Petit Fuligule	Aythya affinis	Lesser Scaup
Eider à tête grise	Somateria spectabilis	King Eider
Eider à duvet	Somateria mollissima	Common Eider
Arlequin plongeur	Histrionicus histrionicus	Harlequin Duck
Macreuse à front blanc	Melanitta perspicillata	Surf Scoter
Macreuse à ailes blanches	Melanitta deglandi	White-winged Scoter
Macreuse à bec jaune	Melanitta americana	American Scoter
Harelde kakawi	Clangula hyemalis	Long-tailed Duck
Petit Garrot	Bucephala albeola	Bufflehead

ANATIDAE (suite)

Garrot à oeil d'or	Bucephala clangula	Common Goldeneye
Garrot d'Islande	Bucephala islandica	Barrow's Goldeneye
Harle couronné	Lophodytes cucullatus	Hooded Merganser
Grand Harle	Mergus merganser	Common Merganser
Harle huppé	Mergus serrator	Red-breasted Merganser
Érismature rousse	Oxyura jamaicensis	Ruddy Duck

ODONTOPHORIDAE

Colin de Virginie	Colinus virginianus	Northern Bobwhite
-------------------	---------------------	-------------------

PHASIANIDAE

Perdrix choukar	Alectoris chukar	Chukar
Perdrix grise	Perdix perdix	Gray Partridge
Faisan de Colchide	Phasianus colchicus	Ring-necked Pheasant
Gélinotte huppée	Bonasa unbellus	Ruffed Grouse
Tétras du Canada	Falcapennis canadensis	Spruce Grouse
Tétras à queue fine	Tympanuchus phasianellus	Sharp-tailed Grouse
Dindon sauvage	Meleagris gallopavo	Wild Turkey

PODICIPEDIDAE

Grèbe à bec bigarré	Podilymbus podiceps	Pied-billed Grebe
Grèbe esclavon	Podiceps auritus	Horned Grebe
Grèbe jougris	Podiceps grisegena	Red-necked Grebe

COLUMBIDAE

Pigeon biset	Columbia livia	Rock Pigeon
Tourterelle rieuse	Streptopelia roseogrisea	African Collared-Dove
Tourte voyageuse (éteinte)	Ectopistes migratorius	Passenger Pigeon
Tourterelle à ailes blanches	Zenaida asiatica	White-winged Dove
Tourterelle triste	Zenaida macroura	Mourning Dove

CUCULIDAE

Coulicou à bec jaune	Coccyzus americanus	Yellow-billed Cuckoo
Coulicou à bec noir	Coccyzus erythrophthalmus	Black-billed Cuckoo

CAPRIMULGIDAE

Engoulevent d'Amérique	Chordeiles minor	Common Nighthawk
Engoulevent bois-pourri	Antrostomus vociferus	Eastern Whip-poor-will

APODIDAE

Martinet ramoneur	Chaetura pelagica	Chimney Swift
-------------------	-------------------	---------------

TROCHILIDAE

Colibri à gorge rubis	Archilochus colubris	Ruby-throated Hummingbird
Colibri roux	Selasphorus rufus	Rufous Hummingbird

RALLIDAE

Râle jaune	Coturnicops noveboracensis	Yellow Rail
Râle de Virginie	Rallus limicola	Virginia Rail
Marouette de Caroline	Porzana carolina	Sora
Gallinule d'Amérique	Gallinula galeata	Common Gallinule
Foulque d'Amérique	Fulica americana	American Coot

GRUIDAE

Grue du Canada	Antigone canadensis	Sandhill Crane
----------------	---------------------	----------------

RECURVIROSTRIDAE

Avocette d'Amérique	Recurvirostra americana	American Avocet
---------------------	-------------------------	-----------------

CHARADRIIDAE

Vanneau huppé	Vanellus vanellus	Northern Lapwing
Pluvier argenté	Pluvialis squatarola	Black-bellied Plover
Pluvier bronzé	Pluvialis dominica	American Golden-Plover
Pluvier kildir	Charadrius vociferus	Kildeer
Pluvier semipalmé	Charadrius semipalmatus	Semipalmated Plover
Pluvier siffleur	Charadrius melodus	Piping Plover

SCOLOPACIDAE

Maubèche des champs	Bartramia longicauda	Upland Sandpiper
Courlis corlieu	Numenius phaeopus	Whimbrel
Barge hudsonienne	Limosa haemastica	Hudsonian Godwit
Barge marbrée	Limosa fedoa	Marbled Godwit
Tournepierrre à collier	Arenaria interpres	Ruddy Turnstone
Bécasseau maubèche	Calidris canutus	Red Knot
Combattant varié	Philomachus pugnax	Ruff
Bécasseau à échasses	Calidris himantopus	Stilt Sandpiper
Bécasseau cocorli	Calidris ferruginea	Curlew Sandpiper
Bécasseau sanderling	Calidris alba	Sanderling
Bécasseau variable	Calidris alpina	Dunlin
Bécasseau violet	Calidris maritima	Purple Sandpiper
Bécasseau de Baird	Calidris bairdii	Baird's Sandpiper
Bécasseau minuscule	Calidris minutilla	Least Sandpiper
Bécasseau à croupion blanc	Calidris fuscicollis	White-rumped Sandpiper
Bécasseau roussâtre	Tryngites subruficollis	Buff-breasted Sandpiper
Bécasseau à poitrine cendrée	Calidris melanotos	Pectoral Sandpiper
Bécasseau semipalmé	Calidris pusilla	Semipalmated sandpiper
Bécasseau d'Alaska	Calidris mauri	Western Sandpiper
Bécassin roux	Limnodromus griseus	Short-billed Dowitcher
Bécassin à long bec	Limnodromus scolopaceus	Long-billed Dowitcher
Bécasse d'Amérique	Scolopax minor	American Woodcock
Bécassine de Wilson	Gallinago delicata	Wilson's Snipe
Chevalier grivelé	Actitis macularius	Spotted Sandpiper
Chevalier solitaire	Tringa solitaria	Solitary sandpiper
Petit Chevalier	Tringa flavipes	Lesser Yellowlegs
Chevalier semipalmé	Tringa semipalmata	Willet

SCOLOPACIDAE (suite)

Grand Chevalier
Phalarope de Wilson
Phalarope à bec étroit

Tringa melanoleuca
Phalaropus tricolor
Phalaropus lobatus

Greater Yellowlegs
Wilson's Phalarope
Red-necked Phalarope

STERCORARIIDAE

Labbe parasite
Labbe à longue queue

Stercorarius parasiticus
Stercorarius longicaudus

Parasitic Jaeger
Long-tailed Jaeger

ALCIDAE

Guillemot de Brünnich
Guillemot à miroir
Macareux moine

Uria lomvia
Cepphus grylle
Fratercula arctica

Thick-billed Murre
Black Guillemot
Atlantic Puffin

LARIDAE

Mouette tridactyle
Mouette de Bonaparte
Mouette pygmée
[Goéland à bec cerclé](#)
[Goéland argenté](#)
Goéland arctique
Goéland brun
Goéland bourgmestre
Goéland marin
Sterne caspienne
Guiffette noire
Sterne pierregarin

Rissa tridactyla
Chroicocephalus philadelphia
Hydrocoloeus minutus
Larus delawarensis
Larus argentatus
Larus glaucoides
Larus fuscus
Larus hyperboreus
Larus marinus
Hydroprogne caspia
Chlidonias niger
Sterna hirundo

Black-legged Kittiwake
Bonaparte's Gull
Little Gull
Ring-billed Gull
Herring Gull
Iceland Gull
Lesser Black-backed Gull
Glaucous Gull
Great Black-backed Gull
Caspian Tern
Black Tern
Common Tern

GAVIIDAE

Plongeon catmarin
Plongeon huard

Gavia stellata
Gavia immer

Red-throated Loon
Common Loon

FREGATIDAE

Frégate superbe

Fregata magnificens

Magnificent Frigatebird

SULIDAE

Fou de Bassan

Morus bassanus

Northern Gannet

PHALACROCORACIDAE

Cormoran à aigrettes
Grand Cormoran

Phalacrocorax auritus
Phalacrocorax carbo

Double-crested Cormorant
Great Cormorant

PELECANIDAE

Pélican d'Amérique
Pélican brun

Pelecanus erythrorhynchos
Pelecanus occidentalis

American White Pelican
Brown Pelican

ARDEIDAE

Butor d'Amérique
Petit Blongios

Botaurus lentiginosus
Ixobrychus exilis

American Bittern
Least Bittern

ARDEIDAE (suite)

Grand Héron	Ardea herodias	Great Blue Heron
Grande Aigrette	Ardea alba	Great Egret
Aigrette neigeuse	Egretta thula	Snowy Egret
Aigrette bleue	Egretta caerulea	Little Blue Heron
Aigrette tricolore	Egretta tricolor	Tricolored Heron
Héron garde-boeufs	Bubulcus ibis	Cattle Egret
Héron vert	Butorides virescens	Green Heron
Bihoreau gris	Nycticorax nycticorax	Black-crowned Night-Heron
Bihoreau violacé	Nyctanassa violacea	Yellow-crowned Night-Heron

THRESKIORNITHIDAE

Ibis blanc	Eudocimus albus	White Ibis
Ibis falcinelle	Plegadis falcinellus	Glossy Ibis
Ibis à face blanche	Plegadis chihi	White-faced Ibis

CATHARTIDAE

Urubu noir	Coragyps atratus	Black Vulture
Urubu à tête rouge	Cathartes aura	Turkey Vulture

PANDIONIDAE

Balbusard pêcheur	Pandion haliaetus	Osprey
-------------------	-------------------	--------

ACCIPITRIDAE

Naucler à queue fourchue	Elanoides forficatus	Swallow-tailed Kite
Aigle royal	Aquila chrysaetos	Golden Eagle
Busard des marais	Circus hudsonius	Northern Harrier
Épervier brun	Accipiter striatus	Sharp-shinned Hawk
Épervier de Cooper	Accipiter cooperii	Cooper's Hawk
Autour des palombes	Accipiter gentilis	Northern Goshawk
Pygargue à tête blanche	Haliaeetus leucocephalus	Bald Eagle
Buse à épaulettes	Buteo lineatus	Red-shouldered Hawk
Petite Buse	Buteo platypterus	Broad-winged Hawk
Buse de Swainson	Buteo swainsoni	Swainson's Hawk
Buse à queue rousse	Buteo jamaicensis	Red-tailed Hawk
Buse pattue	Buteo lagopus	Rough-legged Hawk

TYTONIDAE

Effraie des clochers	Tyto alba	Barn Owl
----------------------	-----------	----------

STRIGIDAE

Petit-duc maculé	Megascops asio	Eastern Screech-Owl
Grand-duc d'Amérique	Bubo virginianus	Great Horned Owl
Harfang des neiges	Bubo scandiacus	Snowy Owl
Chouette épervière	Surnia ulula	Northern Hawk Owl
Chouette rayée	Strix varia	Barred Owl
Chouette lapone	Strix nebulosa	Great Gray Owl
Hibou moyen-duc	Asio otus	Long-eared Owl
Hibou des marais	Asio flammeus	Short-eared Owl

STRIGIDAE (SUITE)

Nyctale de Tengmalm	Aegolius funereus	Boreal Owl
Petite Nyctale	Aegolius acadicus	Northern Saw-whet Owl

ALCEDINIDAE

Martin-pêcheur d'Amérique	Megaceryle alcyon	Belted Kingfisher
---------------------------	-------------------	-------------------

PICIDAE

Pic à tête rouge	Melanerpes erythrocephalus	Red-headed Woodpecker
Pic à ventre roux	Melanerpes carolinus	Red-bellied Woodpecker
Pic maculé	Sphyrapicus varius	Yellow-bellied Sapsucker
Pic à dos rayé	Picoides dorsalis	American Three-toed Woodpecker
Pic à dos noir	Picoides arcticus	Black-backed Woodpecker
Pic mineur	Picoides pubescens	Downy Woodpecker
Pic chevelu	Picoides villosus	Hairy Woodpecker
Pic flamboyant	Colaptes auratus	Northern Flicker
Grand Pic	Dryocopus pileatus	Pileated Woodpecker

FALCONIDAE

Crécerelle d'Amérique	Falco sparverius	American Kestrel
Faucon émerillon	Falco columbarius	Merlin
Faucon Gerfaut	Falco rusticolus	Gyr Falcon
Faucon pèlerin	Falco peregrinus	Peregrine Falcon

TYRANNIDAE

Tyrann huppé	Myiarchus crinitus	Great Crested Flycatcher
Tyrann de l'Ouest	Tyrannus verticalis	Western Kingbird
Tyrann tritri	Tyrannus tyrannus	Eastern Kingbird
Tyrann à longue queue	Tyrannus forficatus	Scissor-tailed Flycatcher
Moucherolle à côtés olive	Contopus cooperi	Olive-sided Flycatcher
Pioui de l'Est	Contopus virens	Eastern Wood-Pewee
Moucherolle à ventre jaune	Empidonax flaviventris	Yellow-bellied Flycatcher
Moucherolle vert	Empidonax virescens	Acadian Flycatcher
Moucherolle des aulnes	Empidonax alnorum	Alder Flycatcher
Moucherolle des saules	Empidonax traillii	Willow Flycatcher
Moucherolle tchébec	Empidonax minimus	Least Flycatcher
Moucherolle phébi	Sayornis phoebe	Eastern Phoebe
Moucherolle à ventre roux	Sayornis saya	Say's Phoebe

LANIIDAE

Pie-grièche migratrice	Lanius ludovicianus	Loggerhead Shrike
Pie-grièche boréale	Lanius borealis	Northern Shrike

VIREONIDAE

Viréo à gorge jaune	Vireo flavifrons	Yellow-throated vireo
Viréo à tête bleue	Vireo solitarius	Blue-headed vireo
Viréo de Philadelphie	Vireo philadelphicus	Philadelphia Vireo
Viréo mélodieux	Vireo gilvus	Warbling Vireo
Viréo aux yeux rouges	Vireo olivaceus	Red-eyed Vireo

CORVIDAE

Mésangeai du Canada	Perisoreus canadensis	Canada Jay
Geai bleu	Cyanocitta cristata	Blue Jay
Pie d'Amérique	Pica hudsonia	Black-billed Magpie
Corneille d'Amérique	Corvus brachyrhynchos	American Crow
Grand Corbeau	Corvus corax	Common Raven

ALAUDIDAE

Alouette des champs	Alauda arvensis	Eurasian Skylark
Alouette hausse-col	Eremophila alpestris	Horned Lark

HIRUNDINIDAE

Hirondelle de rivage	Riparia riparia	Bank Swallow
Hirondelle bicolor	Tachycineta bicolor	Tree Swallow
Hirondelle à ailes hérissées	Stelgidopteryx serripennis	Northern Rough-winged Swallow
Hirondelle noire	Progne subis	Purple Martin
Hirondelle rustique	Hirundo rustica	Barn Swallow
Hirondelle à front blanc	Petrochelidon pyrrhonota	Cliff Swallow

PARIDAE

Mésange à tête noire	Poecile atricapillus	Black-capped Chickadee
Mésange à tête brune	Poecile hudsonicus	Boreal Chickadee
Mésange bicolor	Baeolophus bicolor	Tufted Titmouse

SITTIDAE

Sittelle à poitrine rousse	Sitta canadensis	Red-breasted Nuthatch
Sittelle à poitrine blanche	Sitta carolinensis	White-breasted Nuthatch

CERTHIIDAE

Grimpereau brun	Certhia americana	Brown Creeper
-----------------	-------------------	---------------

TROGLODYTIDAE

Troglodyte familier	Troglodytes aedon	House Wren
Troglodyte des forêts	Troglodytes hiemalis	Winter Wren
Troglodyte à bec court	Cistothorus platensis	Sedge Wren
Troglodyte des marais	Cistothorus palustris	Marsh Wren
Troglodyte de Caroline	Thryothorus ludovicianus	Carolina Wren

POLIOPTILIDAE

Gobemoucheron gris-bleu	Polioptila caerulea	Blue-gray Gnatcatcher
-------------------------	---------------------	-----------------------

REGULIDAE

Roitelet à couronne dorée	Regulus satrapa	Golden-crowned Kinglet
Roitelet à couronne rubis	Regulus calendula	Ruby-crowned Kinglet

TURDIDAE

Merlebleu de l'Est	Sialia sialis	Eastern Bluebird
Grive fauve	Catharus fuscescens	Veery
Grive à joues grises	Catharus minimus	Gray-cheeked Thrush

TURDIDAE (suite)

Grive de Bicknell	Catharus bicknelli	Bicknell's Thrush
Grive à dos olive	Catharus ustulatus	Swainson's Thrush
Grive solitaire	Catharus guttatus	Hermit Thrush
Grive des bois	Hylocichla mustelina	Wood Thrush
Merle d'Amérique	Turdus migratorius	American Robin
Grive à collier	Ixoreus naevius	Varied Thrush

MIMIDAE

Moqueur chat	Dumetella carolinensis	Gray Catbird
Moqueur roux	Toxostoma rufum	Brown Thrasher
Moqueur polyglotte	Mimus polyglottos	Northern Mockingbird

STURNIDAE

Étourneau sansonnet	Sturnus vulgaris	European Starling
---------------------	------------------	-------------------

BOMBYCILLIDAE

Jaseur boréal	Bombycilla garrulus	Bohemian Waxwing
Jaseur d'Amérique	Bombycilla cedrorum	Cedar Waxwing

PASSERIDAE

Moineau domestique	Passer domesticus	House Sparrow
--------------------	-------------------	---------------

MOTACILLIDAE

Pipit d'Amérique	Anthus rubescens	American Pipit
------------------	------------------	----------------

FRINGILLIDAE

Gros-bec errant	Coccothraustes vespertinus	Evening Grosbeak
Durbec des sapins	Pinicola enucleator	Pine Grosbeak
Roselin familier	Haemorhous mexicanus	House Finch
Roselin pourpre	Haemorhous purpureus	Purple Finch
Sizerin flammé	Acanthis flammea	Common Redpoll
Sizerin blanchâtre	Acanthis hornemanni	Hoary Redpoll
Bec-croisé des sapins	Loxia curvirostra	Red Crossbill
Bec-croisé bifascié	Loxia leucoptera	White-winged Crossbill
Chardonneret élégant	Carduelis carduelis	European Goldfinch
Tarin des pins	Spinus pinus	Pine Siskin
Chardonneret jaune	Spinus tristis	American Goldfinch

CALCARIIDAE

Plectrophane lapon	Calcarius lapponicus	Lapland Longspur
Plectrophane des neiges	Plectrophenax nivalis	Snow Bunting

PASSERELLIDAE

Bruant à joues marron	Chondestes grammacus	Lark Sparrow
Bruant noir et blanc	Calamospiza melanocorys	Lark Bunting
Bruant familier	Spizella passerina	Chipping Sparrow
Bruant des plaines	Spizella pallida	Clay-colored Sparrow
Bruant des champs	Spizella pusilla	Field Sparrow

PASSERELLIDAE (suite)

Bruant fauve	Passerella iliaca	Fox Sparrow
Bruant hudsonien	Spizelloides arborea	American Tree Sparrow
Junco ardoisé	Junco hyemalis	Dark-eyed Junco
Bruant à couronne blanche	Zonotrichia leucophrys	White-crowned Sparrow
Bruant à couronne dorée	Zonotrichia atricapilla	Golden-crowned Sparrow
Bruant à face noire	Zonotrichia querula	Harris's Sparrow
Bruant à gorge blanche	Zonotrichia albicollis	White-throated Sparrow
Bruant vespéral	Poocetes gramineus	Vesper Sparrow
Bruant de Nelson	Amospiza nelsoni	Nelson's Sparrow
Bruant des prés	Passerculus sandwichensis	Savannah Sparrow
Bruant chanteur	Melospiza melodia	Song Sparrow
Bruant de Lincoln	Melospiza lincioli	Lincoln's Sparrow
Bruant des marais	Melospiza georgiana	Swamp Sparrow
Tohi à flancs roux	Pipilo erythrophthalmus	Eastern Towhee

ICTERIDAE

Carouge à tête jaune	Xanthocephalus xanthocephalus	Yellow-headed Blackbird
Goglu des prés	Dolichonyx oryzivorus	Bobolink
Sturnelle des prés	Sturnella magna	Eastern Meadowlark
Oriole des vergers	Icterus spurius	Orchard Oriole
Oriole de Baltimore	Icterus galbula	Baltimore Oriole
Carouge à épauettes	Agelaius phoeniceus	Red-winged Blackbird
Vacher à tête brune	Molothrus ater	Brown-headed Cowbird
Quiscale rouilleux	Euphagus carolinus	Rusty Blackbird
Quiscale de Brewer	Euphagus cyanocephalus	Brewer's Blackbird
Quiscale bronzé	Quiscalus quiscula	Common Grackle

PARULIDAE

Paruline couronnée	Seiurus aurocapilla	Ovenbird
Paruline hochequeue	Parkesia motacilla	Louisiana Waterthrush
Paruline des ruisseaux	Parkesia noveboracensis	Northern Waterthrush
Paruline à ailes dorées	Vermivora chrysoptera	Golden-winged Warbler
Paruline noir et blanc	Mniotilta varia	Black-and-white Warbler
Paruline orangée	Protonotaria citrea	Prothonotary Warbler
Paruline obscure	Leiostyris peregrina	Tennessee Warbler
Paruline verdâtre	Leiostyris celata	Orange-crowned Warbler
Paruline à joues grises	Leiostyris ruficapilla	Nashville Warbler
Paruline à gorge grise	Oporornis agilis	Connecticut Warbler
Paruline triste	Geothlypis philadelphia	Mourning Warbler
Paruline masquée	Geothlypis trichas	Common Yellowthroat
Paruline à capuchon	Setophaga citrina	Hooded Warbler
Paruline flamboyante	Setophaga ruticilla	American Redstart
Paruline tigrée	Setophaga tigrina	Cape May Warbler
Paruline azurée	Setophaga cerulea	Cerulean Warbler
Paruline à collier	Setophaga americana	Northern Parula
Paruline à tête cendrée	Setophaga magnolia	Magnolia Warbler
Paruline à poitrine baie	Setophaga castanea	Bay-breasted Warbler

PARULIDAE (suite)

Paruline à gorge orangée	Setophaga fusca	Blackburnian Warbler
Paruline jaune	Setophaga petechia	Yellow Warbler
Paruline à flancs marron	Setophaga pensylvanica	Chestnut-sided Warbler
Paruline rayée	Setophaga striata	Blackpoll Warbler
Paruline bleue	Setophaga caerulescens	Black-throated Blue Warbler
Paruline à couronne rousse	Setophaga palmarum	Palm Warbler
Paruline des pins	Setophaga pinus	Pine Warbler
Paruline à croupion jaune	Setophaga coronata	Yellow-rumped Warbler
Paruline à gorge jaune	Setophaga dominica	Yellow-throated Warbler
Paruline des prés	Setophaga discolor	Prairie Warbler
Paruline à gorge noire	Setophaga virens	Black-throated Green Warbler
Paruline du Canada	Cardellina canadensis	Canada Warbler
Paruline à calotte noire	Cardellina pusilla	Wilson's Warbler

CARDINALIDAE

Piranga écarlate	Piranga olivacea	Scarlet Tanager
Cardinal rouge	Cardinalis cardinalis	Northern Cardinal
Cardinal à poitrine rose	Pheucticus ludovicianus	Rose-breasted grosbeak
Guiraca bleu	Passerina caerulea	Blue Grosbeak
Passerin indigo	Passerina cyanea	Indigo Bunting
Dickcissel d'Amérique	Spiza americana	Dickcissel

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Étude des populations d'oiseaux du Québec (ÉPOQ)*. 2018. Regroupement Québec Oiseaux, base informatisée.
- Godfrey, W.E. 1989. *Les oiseaux du Canada*. Édition révisée, Musées nationaux du Canada, Ottawa, Éditions Broquet, 650 p.
- Foisy, L. et M. Harnois. 2019. *SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE DE LANAUDIÈRE, 35 années d'histoire, 1983-2018*. Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, VIII + 92 p.
- Foisy, L. et M. Harnois, 2020. *LES ESPÈCES NICHEUSES DE LANAUDIÈRE*. Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, vi + 218 pages
- Harnois, M. et C. Ducharme. 2007. *À la découverte des oiseaux de Lanaudière*. Deuxième édition révisée et modifiée, Société d'ornithologie de Lanaudière, Joliette, xii + 328 p.
- Harnois, M. 2020. *Les comportements, un langage à décoder. Suivi d'un couple de Faucons pèlerins*. QuébecOiseaux, vol. 31, n° 4, p. 44.
- National Geographic Society. 2002. *Guide d'identification des oiseaux de l'Amérique du Nord*. Éditions Marcel Broquet, Saint-Constant, 477 p.
- Paquin, J. 2010. *Oiseaux du Québec, Guide d'identification*, Éditions Michel Quentin, Waterloo, 432 p.
- Peterson, R.T. et V.M. Peterson. 2002. *Birds of Eastern and Central North America*. Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, New York, 427 p.
- Robert, M., M.-H. Hachey, D. Lepage et A.R. Couturier (dir.). 2019. *Deuxième atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional*. Regroupement QuébecOiseaux, Service canadien de la faune (Environnement et Changement climatique Canada) et Études d'Oiseaux Canada, Montréal, xxv + 694 p.
- Sibley, D.A. 2000. *The Sibley Guide to Birds*. National Audubon Society, Alfred A. Knopf, New York, 546 p.

L'AVIFAUNE DE LANAUDIÈRE

CAHIER 1

Les espèces dont la présence dans Lanaudière
est prévisible en toutes saisons (PÉAH)

Par sa topographie, la région de Lanaudière présente une coupe typique du relief québécois au nord de la portion fluviale du Saint-Laurent, lequel longe le territoire sur une distance de 60 km. Cette particularité permet de distinguer nettement quatre zones géographiques : les Terres-Basses, la Plaine, le Piedmont et le Plateau, chacune offrant une variété d'habitats pour l'avifaune.

Au fil des ans, ces habitats variés ont attiré nombre d'ornithologues qui ont enrichi de leurs observations la base régionale de données *Études des populations d'oiseaux du Québec* (ÉPOQ), base aujourd'hui intégrée au portail eBird. Une analyse des données tirées de ces bases informatisées a permis de dégager nombre d'informations importantes ayant trait à l'avifaune de Lanaudière.

Le présent ouvrage a pour but de rendre accessible ces informations à tous ceux et celles qui souhaitent mieux connaître les oiseaux de cette région. Ces données permettent de quantifier la présence de chaque espèce selon les saisons, d'établir les statuts probables de l'oiseau étudié, sa présence dans chacune des zones géographiques de Lanaudière, le type d'habitat fréquenté, les constances d'observations au fil des ans et les tendances qui se dégagent à moyen et long terme.

Ce premier cahier porte sur les espèces dont la présence est prévisible en toutes saisons; ce sont des espèces constituées essentiellement de *nicheurs résidents* ou d'un mélange de *nicheurs migrants* et de *migrateurs de passage*, mais comportant une quantité significative de *nicheurs résidents*.



**SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE
DE LANAUDIÈRE**