

Engage Montréal

Portrait de la santé sexuelle des hommes
de la région métropolitaine de Montréal ayant
des relations sexuelles avec des hommes

Cycle 2017-2018

Recueil de
tableaux et outils

Québec 

Table des matières

Introduction	4	4.5 Amphétamines	76
Liste des tableaux	8	4.6 Drogues inhalées	78
1 Caractéristiques sociodémographiques	14	4.7 Sédatifs - Anxiolytiques	80
1.1 Groupe d'âge	14	4.8 Hallucinogènes	82
1.2 Ethnicité, statut d'immigration et langue d'usage	15	4.9 Opioïdes	84
1.3 Genre, orientation sexuelle et attirance sexuelle	18	4.10 Médicament contre la dysfonction érectile	86
1.4 État civil	20	4.11 Stéroïdes	86
1.5 Scolarité	23	4.12 Risque de dépendance associé à la consommation d'une substance	87
1.6 Revenu, source de revenu et situation financière	24	4.13 Influence de la consommation d'alcool ou de drogues sur les attitudes et comportements sexuels — désir de désinhibition / évitement	89
1.7 Lieu de résidence	26	4.14 Administration de drogues par injection ou par inhalation	91
1.8 Couverture d'assurance pour les soins médicaux et les médicaments d'ordonnance	29	4.15 Utilisation de services de réduction des méfaits	94
2 Relations avec la communauté gbHARSAH et soutien social	31	5 Mesures de prévention — Attitudes et accès à de l'information, à du matériel de protection et à un professionnel de la santé	98
2.1 Identité et dévoilement	31	5.1 Risque perçu de transmettre le VIH à un partenaire sexuel	98
2.2 Interaction avec la communauté gbHARSAH	36	5.2 Risque perçu de contracter le VIH	98
2.3 Soutien social	37	5.3 Perception de l'impact des traitements antirétroviraux	99
2.4 Utilisation des applications et sites Internet de rencontre	40	5.4 Connaissances et opinions au sujet du traitement antirétroviral comme outil de prévention	102
3 Comportements et attitudes sexuels	46	5.5 Altruisme sexuel	104
3.1 Comportements sexuels avec des hommes	46	5.6 Recours à des services d'information au sujet de la santé sexuelle	106
3.2 Relations sexuelles avec des femmes (cis ou trans)	49	5.7 Accès au matériel de prévention du VIH/ITSS	118
3.3 Relations sexuelles en échange d'argent, de drogues ou d'autres biens	52	5.8 Soutien d'un professionnel de la santé	121
3.4 Sexe en groupe	53	6 Mesures de prévention — Application des stratégies de réduction des risques	124
3.5 Participation à divers milieux ou groupes gais	55	6.1 Sérotriage	124
3.6 Violence entre partenaires intimes	56	6.2 Utilisation du condom	127
3.7 Relations sexuelles non-voulues	58	6.3 Vaccination	133
3.8 Compulsivité sexuelle	59	6.3.1 Vaccination contre les hépatites A et B, l'infection méningococcique et l'influenza saisonnier	133
3.9 Attitudes face à son corps	61	6.3.2 Vaccination contre les virus du papillome humain (VPH)	134
4 Consommation de substances	64	6.4 Détection des ITSS	138
4.1 Tabac	66	6.4.1 Antécédents de tests de détection des ITSS	138
4.2 Alcool	68		
4.3 Cannabis	72		
4.4 Cocaïne	74		

6.4.2 Test de détection du VIH.....	140	1.4 Annonces sur Facebook.....	224
6.4.3 Circonstances du test de détection du VIH le plus récent	144	II. COUPONS DE RECRUTEMENT	227
6.5 Notification aux partenaires sexuels	147	III. FICHES D'INFORMATION DISTRIBUÉE À LA FIN DE CHAQUE VISITE	228
6.6 Recours à la prophylaxie post-exposition (PEP) au VIH	150	IV. AFFICHES DÉCRIVANT LES MODALITÉS D'AUTO-PRÉLÈVEMENT URINAIRE ET RECTAL	230
6.6.1 Recours à la PPE.....	150	V. PROCÉDURE DE L'ÉTUDE	231
6.6.2 Antécédents de recours à la PPE	154	VI. FORMULAIRES DE CONSENTEMENT	232
6.6.3 PPE la plus récente.....	156	VII.SYNTHESE DES DIMENSIONS DU QUESTIONNAIRE	248
6.7 Recours à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) du VIH	158		
6.7.1 Recours à la PrEP.....	158		
6.7.2 Expérience d'utilisation de la PrEP	163		
6.8 Stratégies combinées de réduction des risques	167		
6.9 Traitement du VIH, participants de statut VIH positif	169		
6.9.1 Accès aux soins et aux traitements antirétroviraux	169		
6.9.2 Adhésion aux médicaments anti-VIH	175		
7 États de santé	178		
7.1 Santé sexuelle	178		
7.2 Santé mentale	181		
7.2.1 Traumatisme subis pendant l'enfance	181		
7.2.2 Antécédents de diagnostics d'un trouble de santé mentale	183		
7.2.3 Auto-évaluation de sa santé mentale	184		
7.2.4 Harcèlement hétérosexiste, rejet et discrimination	184		
7.2.5 Discrimination dans la vie quotidienne.....	189		
7.2.6 Échelle de micro-agressions vécues par les HARSAH de couleur (n=133).....	194		
7.2.7 Idéation et actes suicidaires et automutilation	198		
7.2.8 Anxiété et dépression.....	199		
7.2.9 Capacité à surmonter les épreuves (résilience)	202		
7.2.10 Recours à des services de santé mentale	203		
7.2.11 Services reçus lors de la dernière consultation auprès d'un intervenant en santé mentale ou émotionnelle.....	205		
7.3 Santé physique et infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)	206		
7.3.1 Appréciation globale de sa santé physique.....	206		
7.3.2 Antécédents d'ITSS.....	207		
7.3.3 Prévalence d'ITSS lors de l'enquête.....	211		
Annexes	219		
I. OUTILS DE PROMOTION DE LA PARTICIPATION À L'ÉTUDE	220		
1.1 Affiches de promotion	220		
1.2 Cartes d'information.....	222		
1.3 Annonces sur Grindr	223		

Introduction

L'étude Engage a pour objectif de dresser un portrait actualisé de divers aspects de la santé sexuelle des hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (gbHARSAH) afin d'appuyer des interventions de prévention.

L'étude est conduite auprès de résidents des régions métropolitaines de Vancouver, Toronto et Montréal. La Direction régionale de santé publique de Montréal mène le volet montréalais de l'étude en collaboration avec une équipe formée de représentants des milieux communautaire, universitaire et de santé publique.

Recruter un échantillon représentatif d'une population en particulier est toujours un défi. Une méthode de recrutement « en chaîne » a été appliquée, c.à.d. que les participants ont été recrutés par une personne de leur entourage qui avait elle-même participé à l'étude. Cette méthode permet de contacter une grande diversité de répondants. Afin d'accroître la représentativité des données colligées, celles-ci sont ensuite ajustées selon la taille du réseau social de chaque participant telle que rapportée par celui-ci.

Les participants sont des hommes cis et trans, résident de la région métropolitaine de Montréal, sexuellement actifs au cours des 6 derniers mois

et âgés de 18 à 80 ans. À chacune de leur visite, ils complètent un questionnaire auto-administré et fournissent des prélèvements biologiques afin de détecter diverses infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), dont le virus de l'immunodéficience humaine. Ils sont invités à effectuer des visites périodiquement afin de suivre l'évolution de l'épidémiologie des ITSS et des facteurs qui leur sont associés; cette cohorte se poursuivra jusqu'en 2023. Le présent rapport fait état des données colligées auprès des 1 179 participants au cycle 2017-2018 de l'étude (ce cycle correspond à la première visite).

L'étude Engage a colligé un très grand éventail d'observations. Ce rapport présente les tableaux détaillés produits pour chacune de ces observations. Il s'agit essentiellement de données descriptives (parfois stratifiées selon le statut sérologique VIH ou le groupe d'âge). Le rapport ne contient ni analyses multivariées ni discussion ou interprétation des observations. Par ailleurs, plusieurs outils développés dans le cadre de l'étude sont regroupés en annexe : outils de promotion de la participation à l'étude, coupon de recrutement, formulaire de consentement, synthèse des dimensions du questionnaire et affiches décrivant les modalités d'auto-prélèvement urinaire et rectal.

Équipe Engage

Les personnes suivantes ont constitué de manière occasionnelle ou régulière l'équipe Engage Montréal cycle 2107-2018 : M Messier Peet et H Apelian (agents de recherche), M Charron, E Nassif et MA Primeau (personnel infirmier) ainsi que AS Le et D Fernandes. (Personnel d'accompagnement lors des sessions de collecte).

Les co-chercheurs principaux de l'étude Engage sont J Cox et G Lambert (Montréal), J Jollimore N J Lachowsky et D Moore (Vancouver) ainsi que D Grace et T A Hart (Toronto).

Remerciements

L'équipe Engage remercie tous les hommes cis et transgenres qui ont participé à cette étude et tient à souligner la très précieuse collaboration de : Organisme communautaire RÉZO (notamment F Pronovost, R Coulon et A. Dumont Blaisé) ; Laboratoires de microbiologie et de sérologie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal ; E E M Moodie, biostatisticienne, et M Maheu-Giroux, épidémiologiste, du département d'épidémiologie de l'Université McGill ; les collaborateurs à Engage Montréal : M. Alary, M. Blais, E. Latimer, B. Lebouché, K. Monteith, J. Otis, B. Sehirir, C. Tremblay

Soutien financier

L'étude a reçu un soutien financier de :

- Direction de la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ;
- Institut national de santé publique du Québec ;
- Fonds de recherche en santé du Québec ;
- Instituts de recherche en santé du Canada,
- Fondation canadienne de recherche sur le SIDA,
- British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS,
- Ontario HIV Treatment Network
- Agence de la santé publique du Canada.

Pour citer ce document

G Lambert, H Apelian, C Tremblay, R Mbaye, W Pardoe, M Dvorakova, M Messier-Peet, A Fourmigue, B Linthwaite, J Cox. Engage Montréal, Portrait de la santé sexuelle des hommes de la région métropolitaine de Montréal ayant des relations sexuelles avec des hommes, Cycle 2017-2018 Recueil de tableaux et outils. Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Janvier 2022

Production de la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

ISBN 978-2-550-92395-4

Disponible sur :

santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/harsah/documentations/engage-men.ca/fr/montreal

Pour partager les tableaux

Ne pas hésiter à extraire des tableaux afin de les partager. Ceci peut être fait par l'intermédiaire d'une capture d'écran.

Recrutement des participants

Procédures

Les procédures de recrutement suivies par Engage Montréal ont été adaptées d'un guide de l'Organisation mondiale de la Santé* portant sur le « recrutement en chaîne avec ajustement des données » (en anglais, Respondent-Driven Sampling : RDS).

- Après qu'ait été menée une cartographie sociale sommaire de la population des gbHARSAH montréalais, un petit groupe de 27 gbHARSAH incluant des personnes appartenant à diverses communautés ethnoculturelles, de statut VIH positif et négatif, d'âges variés, cis et trans, ont été sélectionnés. Chacune de ces personnes appelées « racines » a reçu six coupons à remettre à des membres de son entourage les invitant à participer à l'étude. Ce nombre de « racines » est jugé approprié considérant la taille d'échantillon visée (près de 1 200 participants); 21 de ces « racines » ont recruté au moins une personne.
- Chaque personne ayant accepté de participer était encouragée à poursuivre la chaîne de recrutement. Une compensation financière de 50 \$ était remise pour la collecte de données elle-même (un questionnaire auto-administré et des prélèvements biologiques) à laquelle s'ajoutait une somme de 15 \$ pour chaque personne recrutée (maximum de 6 personnes). Une personne ne pouvait participer que si elle avait reçu un coupon. Des mesures avaient été mises en place pour éviter qu'une même personne participe plus d'une fois. Près de la moitié (45 %) des participants ont recruté au moins une personne; le nombre médian de personnes recrutées par ceux-ci a été de 2. Le nombre médian de générations successives dans une chaîne de recrutement a été de 6. Questionnés sur la nature de leur relation avec la personne qui leur avait remis un coupon de participation, tous les participants sauf 5 ont mentionné une connaissance, un ami ou un partenaire sexuel, passé ou présent.

Défis particuliers

- Biais de sélection pouvant découler des bénéfices de la participation à l'étude. L'offre d'une compensation financière est assez communément pratiquée lors d'études épidémiologiques. Une compensation élevée est susceptible d'attirer davantage certaines personnes que d'autres. La compensation offerte par Engage n'a pas été jugée élevée par le comité éthique ayant évalué l'étude et elle n'apparaît pas l'être au regard des déplacements impliqués et de la durée de l'entrevue (environ 2 heures 30 minutes). Questionnés sur la raison principale qui les avaient amenés à participer, la plupart ont mentionné qu'ils s'intéressaient aux enjeux touchant les gbHARSAH et à la santé sexuelle alors que 11 % ont répondu « qu'ils étaient surtout intéressés par la compensation financière ». Par ailleurs, la possibilité d'avoir accès gratuitement (même sans être bénéficiaire du régime d'assurance maladie du Québec) à un bilan des ITSS incluant un test de détection du VIH à résultat rapide a pu attirer davantage certains gbHARSAH que d'autres. Toutefois, durant toute la période de recrutement d'Engage, des conditions semblables d'accès à un bilan ITSS étaient disponibles à la Clinique SIDEPE + située à quelques centaines de mètres du site d'Engage.
- Survenue de goulots d'étranglement. Des goulots d'étranglement peuvent survenir lorsque des participants ne recrutent que des gbHARSAH provenant de leur propre sous-groupe et ayant les mêmes caractéristiques qu'eux (par exemple, des gens qui consomment des drogues régulièrement). L'investigation des données d'Engage a décelé la présence d'un tel goulot pour quelques indicateurs. À chaque fois le goulot, ne provenait que d'une ou deux « racines » et son effet se résorbait lors des analyses d'ensemble.
- Recherche de saturation des observations. À mesure que les chaînes de recrutement s'allongent, il est attendu que les indicateurs (par exemple, le revenu annuel moyen) atteignent une certaine stabilité, c.-à-d. que l'ajout d'autres participants ne fait plus vraiment varier l'indicateur. L'investigation de plusieurs indicateurs sociodémographiques, de comportements et d'attitudes a montré qu'une stabilité avait été atteinte avant que l'on ne mette fin à la collecte des données d'Engage.

Ajustement des données

Afin d'augmenter la représentativité des observations provenant d'un recrutement « en chaîne », diverses méthodes d'ajustements peuvent être appliquées. Les données d'Engage ont été ajustées selon la méthode RDS II, une méthode largement utilisée et recommandée par les deux consultants d'Engage en statistique et épidémiologie. Dans cette méthode, l'ajustement est fonction de la taille du réseau social de chaque participant (la pondération diminue à mesure que la taille du réseau social augmente : un poids plus élevé est attribué à la réponse d'un participant rapportant un plus petit réseau social). La taille du réseau social du participant est basée sur la réponse à la question suivante : « Combien connaissez-vous d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, âgés de 16 ans ou plus, y compris les hommes trans, qui habitent dans la région métropolitaine de Montréal (et ce, peu importe s'ils s'identifient comme gais ou autrement) ». La taille médiane du réseau social rapportée par les participants a été de 30 gbHARSAH.

Lorsque les participants présentant une certaine caractéristique (par exemple avoir passé un test VIH au cours des 6 derniers mois) rapportent une taille de réseau social en moyenne nettement inférieure ou nettement supérieure à celle des autres participants, la pondération RDS peut produire une proportion bien différente de celle obtenue sans ajustement. Le meilleur estimé de la situation dans la population de référence demeure celui obtenu par l'ajustement ; il ne se trouve pas entre la proportion ajustée et la proportion non ajustée. Par ailleurs, pour obtenir un ajustement RDS valide, il est préférable de l'établir au sein d'un échantillon suffisamment grand de participants. C'est pourquoi, aucune tentative d'ajustement et donc d'inférence n'a été effectuée ici pour des sous échantillons de moins de 100 participants (par exemple, une proportion ajustée du nombre de participants ayant passé un test VIH au cours des 6 derniers mois n'a pas été produite pour le sous-échantillon des participants chez qui une infection au VHC a été détectée). Enfin, la validité de l'ajustement RDS est dépendante de la validité de la taille de réseau social, rapportée de manière approximative par les participants malgré leur bonne volonté.

* World Health Organization. Regional Office for the Eastern Mediterranean (2013). Introduction to HIV/AIDS and sexually transmitted infection surveillance: Module 4: Introduction to respondent-driven sampling. http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2013_EN_1539.pdf

Adaptation d'échelles psycho sociales

L'étude Engage a recours à plusieurs échelles psychosociales pour mesurer des dimensions telles que l'anxiété, la dépression ou la consommation de substance. Elle a parfois adapté ces échelles (utilisation d'une seule composante de l'échelle, ajout d'items à l'échelle, modification du libellé d'un item). Le cas échéant, la nature des changements apportés est décrite. Il est important de tenir compte de ces adaptations dans l'interprétation des observations colligées par Engage et dans la comparabilité de celles-ci avec les observations basées sur les échelles originales.

Présentation des données

Tous les tableaux contiennent les informations suivantes :

- Le nombre de participant à qui la question ou sous-question a été posée ;
- Le libellé de la question tel qu'inscrit dans le questionnaire du participant ;
- Les valeurs de la variable telles qu'inscrites dans le questionnaire ;
- Les proportions ajustées et non-ajustées des réponses obtenues ainsi que les intervalles de confiance* des proportions ajustées.
- La proportion des données manquantes **
- La nature des réponses "Autre" le cas échéant ;
- Des informations complémentaires au besoin, par exemple la référence bibliographique d'une échelle psycho-sociale.

*Intervalles de confiance IC 95 % : La proportion dans la population se situe entre les marges indiquées par l'intervalle avec un niveau de confiance de 95 %. Selon une description plus technique de IC 95 % : si l'étude était répétée un grand nombre de fois 95 % des intervalles de confiance à 95 % contiendraient la vraie valeur de l'observation.

** Données manquantes : Une donnée est considérée manquante lorsque le participant n'a pas répondu à la question ou lorsqu'il a répondu « je préfère ne pas répondre ». Les données manquantes sont exclues du calcul des proportions présentées dans le tableau.

Liste des tableaux



1 Caractéristiques sociodémographiques

- Groupe d'âge
- Ethnicité, statut d'immigration et langue d'usage
- Genre, orientation sexuelle et attirance sexuelle
- État civil
- Scolarité
- Revenu, source de revenu et situation financière
- Lieu de résidence
- Couverture d'assurance pour les soins médicaux et les médicaments d'ordonnance



2 Relations avec la communauté gbHARSAH et soutien social

- Identité et dévoilement
- Interaction avec la communauté gbHARSAH
- Soutien social
- Utilisation des applications et sites Internet de rencontre



3 Comportements et attitudes sexuels

- Comportements sexuels avec des hommes
- Relations sexuelles avec des femmes (cis ou trans)
- Relations sexuelles en échange d'argent, de drogues ou d'autres biens
- Sexe en groupe
- Participation à divers milieux ou groupes gais
- Violence entre partenaires intimes
- Relations sexuelles non-voulues
- Compulsivité sexuelle
- Attitudes face à son corps



4 Consommation de substances

- Tabac
- Alcool
- Cannabis
- Cocaïne
- Amphétamines
- Drogues inhalées
- Sédatifs - Anxiolytiques
- Hallucinogènes
- Opioïdes
- Médicament contre la dysfonction érectile
- Stéroïdes
- Risque de dépendance associé à la consommation d'une substance
- Influence de la consommation d'alcool ou de drogues sur les attitudes et comportements sexuels — désir de désinhibition / évitement
- Administration de drogues par injection ou par inhalation
- Utilisation de services de réduction des méfaits



5 Mesures de prévention — Attitudes et accès à de l'information, à du matériel de protection et à un professionnel de la santé

- Risque perçu de transmettre le VIH à un partenaire sexuel
- Risque perçu de contracter le VIH
- Perception de l'impact des traitements antirétroviraux
- Connaissances et opinions au sujet du traitement antirétroviral comme outil de prévention
- Altruisme sexuel
- Recours à des services d'information au sujet de la santé sexuelle
- Accès au matériel de prévention du VIH/ITSS
- Soutien d'un professionnel de la santé



6 Mesures de prévention — Application des stratégies de réduction des risques

- Sérotriage
- Utilisation du condom
- Vaccination
- Détection des ITSS
- Notification aux partenaires sexuels
- Recours à la prophylaxie post-exposition (PEP) au VIH
- Recours à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) du VIH
- Stratégies combinées de réduction des risques
- Traitement du VIH, participants de statut VIH positif



7 États de santé

- Santé sexuelle
- Santé mentale
- Santé physique et infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)



1

Caractéristiques sociodémographiques



1 Caractéristiques sociodémographiques

1.1 Groupe d'âge

Tableau 1 **Groupe d'âge**

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Quel âge avez-vous ?		
Groupe d'âge	% naj	% aj (IC 95%)
18-29 ans	32,6	36,4 (31,3-41,4)
30-39 ans	28,8	26,6 (21,9-31,2)
40-49 ans	14,1	14,7 (11,2-18,2)
50-59 ans	15,4	12,2 (9,1-15,3)
60 ans et plus	9,2	10,1 (7,7-12,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



1.2 Ethnicité, statut d'immigration et langue d'usage

Parmi l'ensemble des participants, 34,9% (IC 95 % : 29,9% - 39,8%) ne sont pas nés au Canada.

Tableau 2 Groupe ethnique ou origine familiale d'identification

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i>				
Groupe ethnique ou origine familiale	À quel(s) groupe(s) ethnique(s) ou origine(s) familiale(s) vous identifiez-vous ? (Cochez tout ce qui s'applique) *		Parmi les groupes ethniques ou origines familiales sélectionnés, auquel vous identifiez-vous le plus ?	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Canadien français	58,1	50,2 (45,1-55,4)	52,8	44,9 (39,9-50,0)
Canadien anglais	13,7	14,8 (11,1-18,5)	9,4	10,0 (7,1-13,0)
Latino-Américain (p, ex, Mexicain, Guatémaltèque, Costaricain, Brésilien, Chilien, Argentin)	9,2	10,9 (7,2-14,7)	8,1	10,0 (6,4-13,6)
Français	10,8	11,1 (8,1-14,0)	7,9	8,2 (5,9-10,6)
Autres groupes de l'Europe de l'Est et de l'Ouest (p, ex, Irlandais, Italien, Grec, Allemand, Espagnol, Néerlandais, Belge, Flamand, Ukrainien, Polonais, Russe)	10,3	11,9 (8,4-15,3)	4,3	5,2 (3,3-7,2)
Arabe ou Africain du Nord (p, ex, Égyptien, Saoudien, Irakien, Libyen, Marocain)	5,3	6,4 (3,7-9,1)	3,5	5,2 (2,5-7,8)
Asiatique du Sud (p, ex, Indien, Punjabi, Pakistanais, Sri-Lankais, Bangladais)	1,4	2,7 (0,7-4,6)	1,0	2,1 (0,3-4,0)
Origine ethnique mixte	5,7	4,5 (2,2-6,8)	2,5	1,9 (0,6-3,2)
Asiatique de l'Est (p, ex, Chinois, Taïwanais, Japonais, Coréen)	1,4	1,7 (0,0-3,4)	1,0	1,5 (0,0-3,2)
Autochtone ou indigène (p, ex, Premières nations du Canada, Métis, Inuit, Amérindien ou peuples indigènes de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud)	3,4	2,9 (1,1-4,8)	0,8	1,2 (0,0-2,4)
Caribéen	1,7	1,5 (0,6-2,5)	0,8	1,2 (0,4-2,1)
Britannique (p, ex, Anglais, Écossais ou Gallois)	4,4	3,3 (1,6-4,9)	1,4	1,2 (0,1-2,3)
Noir (p. ex. Afro-Canadien ou tout autre groupe ayant des origines noires)	1,7	1,3 (0,0-2,8)	1,3	1,0 (0,0-2,5)
Asiatique de l'Ouest (p, ex, Iranien, Perse, Afghan, Assyrien)	0,8	1,3 (0,1-2,5)	0,5	1,0 (0,0-2,1)
Africain (p. ex. Africain subsaharien, Africain de l'Est ou Africain de l'Ouest)	1,0	1,0 (0,0-2,0)	0,8	0,9 (0,0-1,9)
Asiatique du Sud-est (p, ex, Vietnamiens, Cambodgien, Philippin, Malaisien, Thaïlandais, Indonésien, Laotien)	1,1	0,6 (0,0-1,3)	0,8	0,5 (0,0-1,2)
Pacifique (p. ex. Hawaïen, Guamien/Chamorro, Samoan ou tout autre groupe en provenance des îles du Pacifique)	0,0	s.o.	0,0	s.o.
J'utilise un autre terme afin de décrire mon groupe ethnique ou mes origines familiales **	3,9	4,3 (2,3-6,3)	3,1	3,8 (1,9-5,7)



Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

**Autre : à la peau foncé (1), Acadiens/Américains (1), Afro-caribéen / indien de l'ouest (1), Américain (4), Américain/Cajun (1), Arménien (1), Australien (1), Berbère / Kabyle (1), Blanc (2), Brésilien (1), Celte (1), citoyen du Monde (1), Européen (1), Faerie (1), Guatémaltèque (1), Humain (2), Irlandais / québécois, Juif (5), Juif/Italien/Anglais/Américain (1), du Moyen-Orient (4), du Terre-Neuve (1), Perse (1), Québécois (9), Syrien (1), Yéménite/Arabe juif (1)

**Tableau 3 Statut d'immigration**

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Quel est votre statut d'immigration actuel (aujourd'hui) ?		
Statut d'immigration	% naj	% aj (IC 95%)
Citoyen Canadien	81,3	74,3 (69,6-79,1)
Résident Permanent	7,8	9,9 (6,4-13,4)
Permis de travail temporaire	4,5	5,4 (2,9-8,0)
Visa étudiant	4,5	5,9 (3,7-8,1)
Refugié / demandeur d'asile	1,1	2,4 (0,3-4,6)
Sans Papier	0,2	0,7 (0,0-1,9)
Autre	0,6	1,2 (0,3-2,1)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 4 Langue d'usage

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Dans quelle langue vous exprimez-vous avec le plus d'aisance ?		
Langue	% naj	% aj (IC 95%)
Français	69,8	60,3 (55,1-65,5)
Anglais	23,6	29,4 (24,4-34,4)
Espagnol	3,2	4,2 (2,0-6,5)
Portugais	1,8	2,5 (1,1-3,9)
Autre*	1,5	3,6 (1,4-5,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Les autres langues incluent : arabe (7), tagalog (2), italien (2), grecque (1), azerbaïdjanais (1), créole (1), hébreu (1), perse (1), russe (1), "music" (1)

Tableau 5 Année d'arrivée au Canada

Parmi les participants qui ne sont pas nés au Canada (n=358) En quelle année êtes-vous déménagé au Canada ?		
Année	% naj	% aj (IC 95%)
<2000	18,3	11,6 (6,9-16,2)
2000-2004	8,7	8,8 (2,5-15,1)
2005-2009	14,5	11,0 (6,5-15,6)
2010-2014	25,9	19,6 (12-27,3)
2015-2017	32,6	49,0 (39,1-58,8)

Proportion de données manquantes : 3,4%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

Parmi les 203 participants qui ont déménagé au Canada depuis 2010, 28,6% sont nés en France, 10,8% au Brésil, 5,4% en Colombie, 3,9% au Mexique, 3,9% en Tunisie, 3,4% aux États-Unis, 2,5% en Belgique, 2,5% au Royaume-Uni, 2% en Algérie, 2% au Liban et 2% en Syrie.



1.3 Genre, orientation sexuelle et attirance sexuelle

Tableau 6 Identité de genre

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)				
Identité de genre	Quels termes utilisez-vous pour décrire votre identité de genre ? (Cochez tout ce qui s'applique) *		Si vous deviez sélectionner le terme qui décrit le mieux votre identité de genre, lequel choisiriez-vous ?	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Homme	94,1	91,6 (88,6-94,6)	92,4	88,4 (84,8-92,1)
Genderqueer / Non-conformiste de genre	3,6	3,0 (1,4-4,7)	2,6	2,2 (1,0-3,5)
Bi spirituel	2,4	5,6 (3,0-8,3)	2,1	4,9 (2,5-7,3)
Homme trans	1,8	2,1 (0,2-4,0)	1,2	1,5 (0,0-3,2)
Autre**	1,9	3,0 (0,9-5,1)	1,7	2,9 (0,8-5,0)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

**Autre : aucun terme (1), androgyne/genderfluid/trans boi (1), aux 3 : homme, femme, travestie (1), genderfuck/drag/genderflux/demi-homme/femme homme/genderfluid (1), non-binary man (1), radical faerie (1), 'oh god' (1), transmasculine (1).

Quelques participants ont indiqué des orientations sexuelles plutôt que des genres : gai, homosexuel, bisexuel

Tableau 7 Orientation sexuelle

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)				
Orientation sexuelle	Quels termes utilisez-vous pour décrire votre orientation sexuelle ? (Cochez tout ce qui s'applique) *		Si vous deviez sélectionner le terme qui décrit le mieux votre orientation sexuelle, lequel choisiriez-vous ?	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Gai	86,2	80,5 (76,0-85,0)	81,7	76,1 (71,4-80,7)
Bisexuel	13,8	18,9 (14,8-22,9)	8,4	12,7 (9,3-16,2)
Queer	11,7	10,0 (7,0-13,1)	5,3	4,5 (2,3-6,7)
Pansexuel	4,2	5,1 (3,0-7,2)	2,3	3,4 (1,7-5)
Autre**	5,7	7,6 (4,4-10,8)	2,3	3,3 (0,5-6,2)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

** Autre : Bicurieux (1), demisexuel (1), fag (1), fluent gai ouvert d'esprit (1), label free (1), malléable (1), non cis-gendre (1), pancurious (1), « radical faerie » (1), sapiosexuel (1), tapette (1), trans-oriented.

**Tableau 8 Attirance sexuelle**

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Êtes-vous attiré par les...?		
Identité de genre des personnes par qui le participant est attiré	% naj	% aj (IC 95%)
Hommes non-trans	91,8	88,7 (85-92,4)
Personnes genderqueer ou bigenre	15,1	14,4 (10,9-17,8)
Hommes trans	18,1	15,2 (11,4-18,9)
Femmes non-trans	10,8	13,7 (10,2-17,3)
Femmes trans	6,6	7,0 (4,9-9,2)
Aucune de ces réponses	5,3	5,4 (2,9-7,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



1.4 État civil

Parmi l'ensemble des participants 43,9% (IC 95 % : 38,8% – 49,0%) ont rapporté être en relation avec un partenaire principal au moment de leur visite à Engage. Parmi ces participants, 93,6% (IC 95 % : 89,1% – 98,0%) étaient en relation avec leur partenaire principal depuis 6 mois ou plus.

Tableau 9 État civil et caractéristiques du partenaire principal

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Quel est votre état civil actuel ?		
État civil	% naj	% aj (IC 95%)
Célibataire	71,8	74,1 (69,5-78,7)
Union de fait	15,9	14,1 (10,5-17,7)
Divorcé	4,7	3,8 (1,6-5,9)
Marié	3,6	3,9 (1,7-6)
Séparé	2,5	3,3 (1,2-5,3)
Veuf	1,5	0,8 (0,1-1,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 10 Genre du partenaire principal actuel

<i>Parmi les participants qui sont présentement en relation avec un partenaire principal (n=508)</i> Quel terme décrit le mieux le genre de votre partenaire principal ?		
Identité de genre du partenaire principal	% naj	% aj (IC 95%)
Homme non-trans	92,9	89,9 (84,4-95,3)
Genderqueer / non-conformiste de genre	2,8	4,7 (1,7-7,8)
Femme non-trans	2,8	3,0 (0,4-5,7)
Homme trans	1,2	2,1 (0,0-6,1)
Femme trans	0,2	0,1 (0-0,1)
Bi spirituel	0,2	0,2 (0,0-0,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 11 Statut sérologique VIH du partenaire principal actuel selon le statut sérologique du participant

Parmi les participants qui sont présentement en relation avec un partenaire principal (n=508) Connaissez-vous le statut sérologique VIH de ce partenaire principal ?					
Connaissance du statut sérologique VIH du partenaire principal	Statut VIH auto-rapporté du participant				
	VIH – ou inconnu (n=430)		VIH + (n=78)		Total (n=508)
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj % aj (IC 95%)
Non, je ne connais pas le statut sérologique de cette personne.	7,7	6,2 (2,3-10,1)	7,7	12,4 (0,0-31,9)	7,7 7,0 (2,4-11,6)
Oui, je suis certain que cette personne est séronégative (HIV-).	66,7	65,1 (57,3-72,8)	53,8	49,4 (29,7-69,0)	64,8 63,0 (55,7-70,4)
Oui, je pense que cette personne est séronégative (HIV-), mais je n'en suis pas certain.	18,1	21,4 (14,5-28,4)	2,6	1,4 (0,0-3,9)	15,7 18,8 (12,8-24,9)
Oui, je suis certain que cette personne est séropositive (HIV+).	7,0	7,0 (3,4-10,5)	34,6	36,4 (19,8-53,0)	11,2 10,8 (6,7-14,8)
Oui, je pense que cette personne est séropositive (HIV+), mais je n'en suis pas certain.	0,5	0,3 (0,0-0,8)	1,3	0,5 (0,0-2,2)	0,6 0,4 (0,0-0,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 12 Charge virale du partenaire principal étant connu de statut VIH séropositif

Parmi les participants qui étaient certains ou qui pensaient que leur partenaire principal était de statut séropositif (n=60) Connaissez-vous la charge virale la plus récente de ce partenaire principal ? (Le test quantitatif de la charge virale permet de mesurer la quantité de VIH présente dans le sang d'une personne.)	
Charge virale du partenaire principal étant connu de statut VIH séropositif	% naj
Non, je ne connais pas sa charge virale la plus récente.	8,3
Oui, sa charge virale était indétectable (ou supprimée).	91,7
Oui, sa charge virale était détectable (ou non-supprimée).	0,0

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



Tableau 13 Discussions avec le partenaire principal concernant les relations sexuelles avec d'autres partenaires

<i>Parmi les participants qui sont présentement en relation avec un partenaire principal (n=508)</i> Quelles discussions avez-vous eues avec votre partenaire principal concernant les relations sexuelles avec d'autres partenaires ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Nous n'avons pas expressément parlé du fait d'avoir d'autres partenaires.	15,9	21,4 (14,5-28,4)
Nous avons parlé de ne pas avoir d'autres partenaires, mais nous n'avons pas pris d'entente à cet effet.	12,2	13,8 (9,7-18,0)
Nous avons parlé de ne pas avoir d'autres partenaires et nous avons pris une entente à cet effet.	18,5	22,9 (16,3-29,5)
Nous nous sommes mis d'accord sur le fait d'avoir d'autres partenaires sexuels uniquement lorsque nous les partageons (nous ne jouons pas l'un sans l'autre).	10,4	9,4 (4,8-13,9)
Nous nous sommes mis d'accord sur le fait d'avoir d'autres partenaires sexuels que nous partageons ou que nous voyons séparément (nous jouons ensemble et séparément).	26,2	20,0 (14,6-25,4)
Nous nous sommes mis d'accord sur le fait d'avoir d'autres partenaires sexuels que nous voyons séparément (nous jouons toujours l'un sans l'autre).	13,2	7,9 (4,3-11,6)
Nous avons pris une autre entente que celles proposées ici.	3,5	4,6 (0,7-8,5)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



1.5 Scolarité

Au moment de leur visite à Engage, 28,6% (IC 95% : 23,8% - 33,4%) des participants étaient aux études.

Tableau 14 Niveau de scolarité actuel

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété jusqu'à présent ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Éducation non formelle	0,4	1,5 (0,0-3,0)
École primaire	0,8	1,1 (0,4-1,8)
École secondaire sans toutefois obtenir un diplôme	7,6	7,6 (5,1-10,2)
Diplôme d'études secondaires ou certificat d'équivalence d'études	11,8	15,1 (11,6-18,5)
Diplôme ou certificat d'une école professionnelle, technique ou de métiers	9,2	10,4 (7,8-13,1)
Études post-secondaires sans toutefois obtenir un diplôme ou un certificat	6,0	7,1 (4,1-10,1)
Diplôme ou certificat collégial ou universitaire inférieur à un baccalauréat	19,8	17,4 (13,3-21,5)
Baccalauréat	27,9	23,8 (19,7-28)
Diplôme d'études supérieures (doctorat ou maîtrise) ou professionnelles (avocat, etc.,)	16,5	16 (11,9-20)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



1.6 Revenu, source de revenu et situation financière

Au moment de leur visite, aj : 56,6% (IC 95% : 51,6% - 61,7%) des participants recevaient un revenu d'un travail rémunéré (légal ou « au noir »).

Tableau 15 Niveau de revenu

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> En tenant compte de l'ensemble de vos emplois rémunérés et de vos autres sources de revenu, quel était votre revenu annuel total de l'an dernier, avant les impôts et les autres déductions ?		
Revenu annuel brut	% naj	% aj (IC 95%)
0\$ ou sans revenu	3,1	8,1 (5,4-10,8)
1\$ - 9 999\$	12,0	15,3 (11,1-19,5)
10 000\$ - 19 999\$	26,9	28,5 (23,8-33,3)
20 000\$ - 29 999\$	15,6	14,9 (11,4-18,4)
30 000\$ - 39 999\$	13,0	12,1 (9,2-15,0)
40 000\$ - 49 999\$	11,2	8,2 (5,6-10,8)
50 000\$ - 59 999\$	6,5	5,0 (3,1-7,0)
60 000\$ - 69 999\$	3,3	2,3 (0,7-3,9)
70 000\$ - 79 999\$	3,1	1,8 (0,6-2,9)
80 000\$ - 89 999\$	1,6	0,9 (0-1,7)
90 000\$ - 99 999\$	1,4	0,9 (0,2-1,6)
100 000\$ ou plus	2,3	2,0 (0,9-3,2)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 16 Source de revenu

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours des six derniers mois, avez-vous reçu de l'argent de l'une ou l'autre des sources suivantes ? (Cochez tout ce qui s'applique) *		
Sources de revenu	% naj	% aj (IC 95%)
Programme d'aide sociale	18,4	23,1 (18,4-27,7)
Prestations d'assurance-emploi (A-E ou CAE)	6,9	8,6 (5,5-11,7)
Pension de retraite (publique ou privée)	8,9	9,1 (7,0-11,1)
Subventions ou prêts étudiants	10,3	11,3 (7,7-14,9)
Prêts (autre que les prêts étudiants ; généralement des prêts bancaires)	3,8	2,5 (1,0-4,0)
Cadeau ou prêt d'un partenaire, d'un proche ou d'un ami	15,3	13,4 (10,0-16,8)
Assurance-invalidité/Indemnités pour accident du travail	3,5	2,9 (1,2-4,6)
Travail d'escorte ou travail du sexe	4,0	2,7 (0,9-4,5)
Vente de drogues	2,2	2,0 (0,5-3,6)
Autres sources de revenu légales	25,1	23,3 (19,0-27,7)
Autres sources de revenu illégales	3,2	4,6 (2,7-6,5)
Je n'ai pas reçu d'argent de ces sources au cours des six derniers mois	32,6	29,6 (25,1-34,1)

Proportion de données manquantes : de 0,0% à 0,6% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



L'échelle « Indice de contraintes financières » (Financial Strain Index, Hamby et al. 2011)¹ vise à évaluer des mesures concrètes et observables indiquant un manque de ressources financières. Le revenu à lui seul n'est pas une indication suffisante de la stabilité financière et il est devenu plus évident que les personnes qui se situent généralement dans une tranche économique de classe moyenne peuvent également ressentir les effets de la tension financière¹. L'échelle comprend 5 énoncés. Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants pour chaque énoncé.

Tableau 17 Situation financière « Indice de contraintes financières »

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Indiquez si les affirmations suivantes en lien avec votre situation financière actuelle sont très vraies, un peu vraies ou pas du tout vraies.						
Affirmations en lien avec sa situation financière	Très vrai		Un peu vrai		Pas du tout vrai	
	%naj	%aj (IC 95%)	%naj	%aj (IC 95%)	%naj	%aj (IC 95%)
Vous auriez du mal à trouver l'argent nécessaire pour faire face à une dépense imprévue de 500 \$ ou plus (p. ex, une maladie ou une réparation).	33,5	38,2 (33,1-43,3)	23,9	25 (20,8-29,2)	42,6	36,8 (32-41,6)
Vous n'avez pas assez d'argent pour aller au restaurant ou vous payer des activités de divertissement ou de loisir.	15,8	19,3 (15,2-23,4)	34,3	33,8 (28,9-38,8)	50	46,9 (41,8-51,9)
Vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les vêtements ou les articles ménagers nécessaires pour votre famille ou vous-même.	10,9	12,6 (8,9-16,3)	26,9	28,8 (24,1-33,4)	62,2	58,6 (53,5-63,7)
Vous n'avez pas assez d'argent pour payer vos factures courantes.	7,3	8,8 (5,7-11,9)	22,8	28,3 (23,6-33,1)	69,9	62,9 (57,8-67,9)
Vous êtes en retard d'un mois ou plus sur votre loyer ou versement hypothécaire.	3,1	3,2 (1,6-4,9)	7,2	10,3 (6,8-13,9)	89,7	86,4 (82,6-90,3)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Situation financière « Indice de contraintes financières » - Calcul des scores

Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 1 à 3. La fréquence « pas du tout vrai » équivaut à 1 point tandis que la fréquence « très vrai » équivaut à 3 points. Le score d'un participant est obtenu en faisant la moyenne des points attribués à chacun des énoncés, il varie de 1-3. Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant. Une valeur élevée indique que les participants ont davantage de contraintes financières.

Tableau 18 Situation financière « Indice de contraintes financières » - sommaire

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Situation financière « Indice de contraintes financières »		
Étendue du score	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée (IC 95%)
1-3	1.5 (0.53)	1.58 (1.52-1.64)

Aucune donnée manquante.

Moyenne ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

¹ Hamby S, Turner HA, & Finkelhor D. Financial strain index. Durham, NH: Crimes Against Children Research Center. 2011.



1.7 Lieu de résidence

Les participants étaient invités à inscrire les trois premiers caractères du code postal de l'endroit où ils résidaient au moment de l'enquête. Le tableau ci-dessous présente les territoires de RTS/CIUSS associés au code postal rapporté par les participants.

Tableau 19 Territoire de résidence

<i>Parmi les participants qui résidaient sur l'île de Montréal et qui ont rapporté les trois premiers caractères du code postal de l'endroit où ils résidaient au moment de l'enquête (n=1026)</i>				
Réseaux territoriaux de services de santé et de services sociaux (RTS)	Par méthode A *		Par méthode B **	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
RTS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	50,9	42,7 (37,6-47,8)	54,6	49,4 (44,1-54,7)
RTS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	22,0	25,2 (22,5-27,9)	22,0	25,2 (22,5-27,9)
RTS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	11,4	10,4 (7,1-13,7)	11,8	11,0 (7,4-14,6)
RTS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal	7,8	10,4 (5,3-15,4)	10,1	13,1 (7,8-18,4)
RTS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	1,5	1,2 (0,0-3,3)	1,5	1,2 (0,0-3,3)
Plus d'un RTS	6,4	10,1 (5,7-14,6)	0,0	s.o.

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.= sans objet.

* Lorsqu'un code postal à trois positions était associé à plus d'un territoire de RTS/CIUSSS, la catégorie retenue a été : « plus d'un RTS ».

** Lorsqu'un code postal à trois positions était associé à plus d'un territoire de RTS/CIUSSS, celui avec la plus grande probabilité selon la taille du territoire lui a été associé.

Tableau 20 Situation d'hébergement actuelle

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i>		
Quel est votre situation d'hébergement actuelle ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Appartement, condo ou maison	91,3	87,2 (83,8-90,6)
Chambre dans une maison de chambres / hôtel pour personnes seules	4,1	6,5 (3,9-9,0)
Sans domicile fixe / sans-abri / chez des amis à l'occasion / sur la rue	1,6	3,1 (1,3-4,9)
Résidence étudiante	0,9	1,2 (0,0-2,7)
Refuge ou foyer	0,6	0,3 (0,2-0,5)
Centre de réadaptation en dépendance (consommation de drogues ou d'alcool)	0,3	0,5 (0,0-1,1)
Autre*	1,3	1,1 (0,8-1,5)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Autre : appartement supervisé (1), hlm (3), « low rental » (1), Maison Plein Cœur(1), réinsertion sociale (2), réadaptation médicale (1), rent room (1), résidence pour aînés (5), « transition home » (1).

**Tableau 21 Contribution monétaire à sa situation d'hébergement**

<i>Parmi les participants qui habitent dans un « appartement, condo, ou maison » ou dans une « résidence étudiante » ou dans une « chambre dans une maison de chambres/hôtel pour personnes seules » (n=1 150)</i> Comment contribuez-vous monétairement à votre situation d'hébergement ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
J'habite avec un ou des colocataires et je contribue partiellement au loyer ou au versement hypothécaire.	44,2	45,1 (39,9-50,2)
Je loue un logement à moi seul.	37,6	38,7 (33,6-43,8)
Je suis propriétaire.	13,0	10,1 (7,1-13,0)
Je ne suis pas propriétaire et je ne contribue pas à un loyer ni à un versement hypothécaire.	5,2	6,2 (3,7-8,7)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 22 Personne avec qui le participant habite

<i>Parmi les participants qui habitent dans un « appartement, condo, ou maison » ou dans une « résidence étudiante » ou dans une « chambre dans une maison de chambres/hôtel pour personnes seules » (n=1150)</i> Présentement, avec qui habitez-vous ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
J'habite seul	40,5	39,9 (34,9-45)
OU (Cochez tout ce qui s'applique) * j'habite avec :		
Colocataire(s) autre(s) qu'un partenaire/conjoint/amoureux	35,7	35,7 (30,9-40,5)
Partenaire, conjoint ou amoureux	18,9	17,2 (13,2-21,2)
Proche(s) (p, ex, un ou des parent(s), grands-parents(s), frère(s), cousin(s), etc.)	6,4	7,7 (4,6-10,9)
Un ou des enfant(s) qui n'a/n'ont pas de lien biologique avec moi et que je n'ai pas adopté	0,2	0,3 (0,2-0,4)
Mon ou mes enfant(s) biologique(s) ou adopté(s)	0,4	0,2 (0,0-0,4)
Autre	1,1	1,4 (0,0-2,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

Tableau 21 Nombre d'années vécues au Québec depuis le dernier déménagement en provenance d'une localisation hors Québec

Parmi l'ensemble des participants, 46,2% (IC 95% : 41,2% - 51,2%) ont déjà habité à l'extérieur du Québec au cours de leur vie.

<i>Parmi les participants qui ont déjà habité à l'extérieur du Québec (n=544)</i> Depuis combien d'années vivez-vous au Québec ?		
Nombre d'années	% naj	% aj (IC 95%)
Moins d'un an	4,8	5,9 (2,3-9,5)
Entre 1 à 5 ans	46,9	53,6 (46,5-60,7)
Entre 5 à 10 ans	17,6	15,7 (11,1-20,3)
Plus que 10 ans	30,7	24,8 (19,3-30,2)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 23 Nombre d'années vécues dans la présente ville ou municipalité de résidence depuis le dernier déménagement en provenance d'une localisation hors Québec

Parmi les participants qui ont déjà habité à l'extérieur du Québec (n=544) Depuis combien d'années vivez-vous ou êtes vous revenu dans cette ville ou municipalité ?		
Nombre d'années	% naj	% aj (IC 95%)
Moins d'un an	1,4	2,8 (1,3-4,3)
Entre 1 à 5 ans	37,5	45,2 (40,2-50,2)
Entre 5 à 10 ans	16,6	11,6 (8,6-14,6)
Plus que 10 ans	44,4	40,4 (35,6-45,2)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



1.8 Couverture d'assurance pour les soins médicaux et les médicaments d'ordonnance

Parmi l'ensemble des participants, 67,9% (IC 95% : 63,3% -72,4%) bénéficie d'une police d'assurance couvrant la totalité ou une partie du coût de leurs médicaments d'ordonnance.

Tableau 24 Régime d'assurance médicaments

<i>Parmi les participants qui ont une assurance qui couvre la totalité ou une partie du coût de leurs médicaments d'ordonnance (n=862)</i>		
Est-ce que votre régime d'assurance est ...		
	% naj	% aj (IC 95%)
Un régime d'assurance public du gouvernement (p, ex, la RAMQ)	48,8	54,2 (48,2-60,2)
Un régime offert par un employeur par le biais d'une compagnie d'assurance (p, ex, Croix Bleue, Sun Life)	42,9	36,2 (30,3-42,1)
Un régime offert par une association telle qu'un syndicat, une association professionnelle ou une organisation étudiante par le biais d'une compagnie d'assurance	14,2	13,2 (8,7-17,7)
Un autre régime, comme un régime personnel acheté par le biais d'une compagnie d'assurance (p, ex, la Croix Bleue ou Sun Life)	6,4	6,8 (3,6-10,1)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) %.

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



2

Relations avec la communauté gbHARSAH et soutien social



2 Relations avec la communauté gbHARSAH et soutien social

2.1 Identité et dévoilement

L'échelle « Identité lesbienne, gaie et bisexuelle » (The Lesbian, Gay, and Bisexual Identity Scale, Mohr et al. 2011)² vise à apprécier les multiples dimensions de l'identité des personnes d'orientation sexuelle lesbienne, gai ou bisexuelle (LGB). Elle comprend 8 sous-échelles dont 4 ont été incluses au questionnaire Engage, les sous-échelles: préoccupations face à l'acceptation de son orientation, tendance à dissimuler son orientation, sentiments d'homophobie intériorisée et affirmation de son identité. Chaque sous-échelle comprend trois énoncés. Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants selon leur niveau d'accord avec chacun des énoncés.

Tableau 25 Identité lesbienne, gaie et bisexuelle

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Certains d'entre vous préfèrent peut-être utiliser des termes différents de « lesbienne, gai ou bisexuel » afin de décrire leur orientation sexuelle (p. ex. « queer », « gouine » ou « en questionnement »). Nous utilisons le terme LGB dans le cadre de ce questionnaire pour des raisons de commodité et nous vous demandons d'être compréhensif si ce dernier ne reflète pas entièrement votre identité sexuelle.										
Pour chacune des questions suivantes, veuillez choisir la réponse qui correspond le mieux à votre vécu actuel en tant que personne lesbienne, gaie ou bisexuelle. Répondez aussi honnêtement que possible : indiquez ce que vous ressentez réellement au moment présent et non ce que vous croyez que vous devriez ressentir. Il n'est pas nécessaire de trop réfléchir à ces questions. Répondez à chacune d'entre elles selon votre sentiment initial et passez à la suivante.										
	Fortement en désaccord		En désaccord		Plutôt en désaccord		Plutôt en accord		En accord	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Préoccupations face à l'acceptation de son orientation										
Je me demande souvent si les autres me jugent en raison de mon orientation sexuelle.	27,9	22,4 (18,2-26,5)	19,4	14,9 (11,0-18,8)	17,1	18,1 (14,0-22,1)	19,0	24,3 (19,5-29,2)	10,7	12,2 (9,0-15,4)
Je ne peux pas me sentir à l'aise en sachant que les autres me jugent négativement à cause de mon orientation sexuelle.	29,8	27,2 (22,5-32,0)	21,2	17,9 (13,6-22,3)	16,5	14,1 (10,4-17,7)	17,5	25,4 (20,8-29,9)	9,4	9,8 (7,0-12,7)
Je pense beaucoup à comment mon orientation sexuelle affecte la manière dont les gens me perçoivent.	23,1	20,2 (16,0-24,4)	18,8	17,0 (12,8-21,1)	18,3	17,9 (13,7-22,1)	22,1	28,0 (23,2-32,8)	11,3	10,6 (7,4-13,7)
Tendance à dissimuler son orientation										

² Mohr JJ, Kendra MS. Revision and extension of a multidimensional measure of sexual minority identity: the lesbian, gay, and bisexual identity scale. *Journal of counseling psychology*. 2011;58(2):234-245. doi:10.1037/a0022858



Je préfère garder privées mes relations romantiques avec des partenaires de même sexe que moi.	16,8 13,4 (9,6-17,2)	18,9 16,0 (12,2-19,8)	12,9 12,1 (8,8-15,4)	19,8 24,3 (19,8-28,8)	17,4 18,9 (14,3-23,4)	14,3 15,3 (11,6-19,1)
Je fais attention de garder un contrôle sur qui est au courant de mes relations romantiques avec des partenaires de même sexe que moi.	22,5 19,4 (15,2-23,7)	15,7 15,4 (11,5-19,2)	14,3 14,4 (11,1-17,7)	22,6 23,6 (19,1-28,2)	15,6 16,0 (12,1-19,9)	9,4 11,2 (7,6-14,8)
Mon orientation sexuelle est un sujet très privé et personnel.	22,7 17,2 (13,1-21,2)	15,0 12,4 (9,2-15,6)	15,0 12,5 (9,3-15,7)	23,4 30,4 (25,7-35,2)	13,1 14,7 (10,4-19,1)	10,7 12,7 (8,9-16,6)
Sentiments d'homophobie intériorisée						
Si c'était possible, je choiserais d'être hétérosexuel.	44,6 37,3 (32,2-42,4)	19,5 17,9 (13,6-22,3)	14,7 14,2 (11,1-17,2)	9,6 13,9 (9,9-17,9)	5,5 8,1 (4,9-11,3)	6,1 8,5 (5,5-11,6)
J'aimerais être hétérosexuel.	47,2 40,4 (35,1-45,6)	19,1 19,0 (14,5-23,5)	15,1 17,2 (13,6-20,8)	9,9 11,8 (8,4-15,1)	4,4 5,5 (3,0-8,0)	4,3 6,1 (3,3-9,0)
Je crois que c'est injuste que je sois attiré par les personnes du même sexe que moi.	57,2 49,2 (43,9-54,4)	19,2 17,8 (13,6-22,1)	14,0 20,2 (16,3-24,1)	4,6 7,6 (5,0-10,2)	2,8 2,7 (0,6-4,9)	2,0 2,5 (0,9-4,1)
Affirmation de son identité						
Je suis heureux d'être une personne LGB (lesbienne, gaie ou bisexuelle).	3,9 3,6 (1,6-5,6)	2,7 3,2 (1,2-5,1)	5,7 7,8 (5,3-10,4)	23,0 25,2 (20,6-29,8)	27,6 27,1 (22,4-31,9)	37,1 33,1 (28,0-38,2)
Je suis fier de faire partie de la communauté LGB (lesbienne, gaie et bisexuelle).	3,9 5,0 (2,6-7,5)	4,7 4,6 (2,3-6,9)	8,5 13,0 (9,5-16,5)	28,5 27,6 (23,0-32,2)	24,8 25,0 (20,2-29,9)	29,6 24,7 (20,1-29,3)
Je suis fier d'être LGB (lesbienne, gai ou bisexuel).	3,3 3,9 (1,9-6,0)	3,7 6,0 (2,9-9,0)	8,0 7,8 (5,0-10,6)	27,8 30,6 (26,0-35,2)	24,5 23,2 (18,5-27,9)	32,7 28,5 (23,6-33,4)

Proportion de données manquantes 4,8% à 8,1% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Mohr JJ, Kendra MS. Revision and extension of a multidimensional measure of sexual minority identity: the lesbian, gay, and bisexual identity scale. Journal of counseling psychology. 2011;58(2):234-245. doi:10.1037/a0022858



Identité lesbienne, gaie et bisexuelle - Calcul des scores

Les participants ayant préféré ne pas répondre à tous les énoncés ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 1 à 6, selon le degré d'accord du participant avec l'énoncé. Le degré « fortement en désaccord » équivaut à 1 point tandis que le degré « fortement en accord » équivaut à 6 points. Le score d'un participant à une sous-échelle est obtenu en prenant la moyenne de la somme des points attribués à chacun des énoncés de la sous-échelle. Le score moyen de chaque sous-échelle pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant.

Une valeur élevée indique que les participants ont davantage de préoccupations face à l'acceptation de leur orientation par les autres, une tendance à dissimuler leur orientation..., etc.

Tableau 26 Identité lesbienne, gaie et bisexuelle – sommaire

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Identité lesbienne, gaie et bisexuelle			
Sous-échelle	Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée ¹ (IC 95%)
Préoccupations face à l'acceptation de son orientation par les autres	1-6	2,8 (1,3)	3,0 (2,9-3,2)
Tendance à dissimuler son orientation		3,3 (1,4)	3,5 (3,3-3,6)
Sentiments d'homophobie intériorisée		2,1 (1,2)	2,3 (2,2-2,5)
Affirmation de son identité		4,7 (1,2)	4,5 (4,4-4,7)

Proportion de données manquantes : 6,8% à 10,2% selon l'item.

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

Mohr JJ, Kendra MS. Revision and extension of a multidimensional measure of sexual minority identity: the lesbian, gay, and bisexual identity scale. Journal of counseling psychology. 2011;58(2):234-245. doi:10.1037/a0022858

**Tableau 27 Dévoilement de l'identité ghHARSAH**

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i>		
Je dirais que je suis ouvertement gai, bisexuel ou attiré par les hommes...		
Dévoilement	% naj	% aj (IC 95%)
Je ne suis pas du tout ouvertement gai	3,3	5,7 (3,2-8,2)
À quelques personnes que je connais	12,6	22,0 (17,2-26,8)
À environ la moitié des personnes que je connais	6,6	6,2 (3,6-8,8)
À l'ensemble ou la plupart des personnes que je connais	77,5	66,1 (60,8-71,3)

Proportion de données manquantes : 2,5%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

L'échelle « Estime de soi collective » (Collective Self-Esteem Scale, Luhtanen & Crocker 1991)³ vise à mesurer le sentiment d'appartenance à la communauté gaie/bisexuelle ainsi que l'importance accordée à l'orientation sexuelle gaie ou bisexuelle dans la détermination de l'identité. Elle comprend 9 énoncés dont 3 ont été adaptés par l'équipe Engage et inclus au questionnaire. Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants selon leur niveau d'accord avec chacun des énoncés.

Tableau 28 Estime de soi collectif

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i>								
Pour les énoncés ci-dessous, indiquez si vous êtes tout à fait en accord, en accord, en désaccord ou tout à fait en désaccord :								
Question	Tout à fait en accord		En accord		En désaccord		Tout à fait en désaccord	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Faire partie de la communauté gaie/bisexuelle/queer représente une partie importante de qui je suis.	8,7	11,8 (8,3-15,3)	20,6	25,7 (20,9-30,6)	42,8	39,8 (34,7-45,0)	27,9	22,6 (18,1-27,2)
Faire partie de la communauté gaie/bisexuelle/queer est une bonne chose pour moi.	6,1	9,9 (6,4-13,4)	13,8	20,6 (16,3-24,9)	53,9	47,5 (42,2-52,8)	26,2	22,0 (17,4-26,6)
Faire partie de la communauté gaie/bisexuelle/queer influence fortement comment je me sens dans ma peau.	10,7	15,5 (11,3-19,8)	24,4	25,8 (21,2-30,4)	41,2	38,6 (33,5-43,7)	23,7	20,1 (15,5-24,6)

Proportion de données manquantes : 3,5% à 6,3% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Luhtanen R, & Crocker J. Self-esteem and intergroup comparisons: Toward a theory of collective self-esteem. In J. Suls & T.A. Wills (Eds.), *Social comparison: Contemporary theory and research* (pp. 211-234). 1991. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum

³ Luhtanen R, & Crocker J. Self-esteem and intergroup comparisons: Toward a theory of collective self-esteem. In J. Suls & T.A. Wills (Eds.), *Social comparison: Contemporary theory and research* (pp. 211-234). 1991. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.



Estime de soi collectif - Calcul des scores

Les participants ayant préféré ne pas répondre à un ou plusieurs des énoncés ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 1 à 4 selon le degré d'accord du participant avec l'énoncé ; le degré « tout à fait en désaccord » équivaut à 1 point tandis que le degré « tout à fait en accord » équivaut à 4 points. Le score d'un participant est obtenu en additionnant les points attribués à chacun des énoncés de l'échelle, il varie de 3 à 12. Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant. Une valeur élevée indique que les participants éprouvent un sentiment d'estime de soi collectif élevé.

Tableau 29 **Estime de soi collectif – Sommaire**

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i>		
Estime de soi collectif		
Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée¹ (IC 95%)
3-12	8,7 (2,3)	8,2 (7,9-8,5)

Proportion de données manquantes : 7,7%

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



2.2 Interaction avec la communauté gbHARSAH

Tableau 30 Temps passé avec des personnes gbHARSAH

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Quel pourcentage de votre vie sociale (c.-à-d. le temps passé avec d'autres personnes à l'extérieur du travail) passez-vous avec des gars gais/bis que vous connaissez bien ?		
Proportion de la vie sociale	% naj	% aj (IC 95%)
25 % ou moins de ma vie sociale	29,9	45,9 (40,6-51,2)
26-50 % de ma vie sociale	24,6	21,6 (17,6-25,7)
50-75 % de ma vie sociale	23,4	18,8 (14,5-23,0)
Plus de 75 % de ma vie sociale	22,0	13,7 (10,6-16,8)

Proportion de données manquantes : 2,2%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 31 Consommation de média gbHARSAH

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours des six derniers mois, combien de fois avez-vous lu des articles concernant des gais ou des magazines gais (en version papier et/ou en ligne) ?		
Nombre de fois au cours des six derniers mois	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais	12,5	18,6 (14,2-23,0)
Moins d'une fois par mois	23,2	26,0 (21,6-30,5)
Environ une fois par mois	24,6	23,9 (19,6-28,3)
Plus d'une fois par mois	39,7	31,4 (26,8-36,0)

Proportion de données manquantes : 0,8%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 32 Fréquentation de bars gbHARSAH

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours des six derniers mois, combien de fois avez-vous fréquenté des bars gais ou des clubs gais (incluant les soirées gaies dans des clubs hétéros) ?		
Nombre de fois au cours des six derniers mois	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais	14,7	20,8 (16,4-25,2)
Moins d'une fois par mois	25,9	30,1 (25,2-35,0)
Environ une fois par mois	17,7	14,9 (11,8-18,1)
Plus d'une fois par mois	41,7	34,1 (29,2-39,0)

Proportion de données manquantes : 1,0%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



2.3 Soutien social

L'échelle « Soutien social » (Hays et al. 1995)⁴ vise à apprécier les multiples dimensions du soutien social fonctionnel de l'individu. L'échelle contient 18 énoncés, répartis en 4 sous-échelles: soutien émotionnel ou d'information, soutien tangible, soutien affectif intime et interactions sociales positives. Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants selon la fréquence à laquelle le participant peut, au besoin, accéder au soutien décrit par l'énoncé.

Tableau 33 Soutien social

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Nous nous tournons parfois vers d'autres personnes pour avoir de la compagnie, de l'assistance et d'autres formes de soutien. À quelle fréquence pouvez-vous avoir aux soutiens suivants lorsque vous en avez besoin ?										
	Jamais		Rarement		Parfois		La plupart du temps		Tout le temps	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Soutien émotionnel ou d'information										
Quelqu'un sur qui vous pouvez compter pour vous écouter lorsque vous avez besoin de parler	1,5	2,7 (1,8-3,5)	9,0	10,5 (7,1-13,8)	17,6	19,6 (15,4-23,9)	34,1	34,2 (29,2-39,2)	38,0	33,0 (28,2-37,8)
Quelqu'un qui vous donne des renseignements pour aider à comprendre une situation	2,2	3,5 (1,9-5,1)	9,6	11,6 (8,0-15,1)	22,2	23,1 (19,1-27,1)	37,2	35,9 (30,7-41,2)	28,8	25,9 (21,6-30,3)
Quelqu'un qui vous donne de bons conseils en situation de crise	2,3	3,8 (2,1-5,4)	11,3	11,4 (8,3-14,6)	21,0	24,9 (20,6-29,3)	35,5	33,2 (28,0-38,4)	29,9	26,7 (22,2-31,1)
Quelqu'un à qui vous confier ou à qui parler de vous ou de vos problèmes	2,8	3,0 (0,9-5,2)	9,9	11,3 (7,9-14,7)	18,4	20,7 (16,8-24,5)	33,7	35,8 (30,6-40,9)	35,2	29,2 (24,6-33,8)
Quelqu'un dont vous voulez vraiment les conseils	2,6	2,7 (1,0-4,4)	14,0	15,3 (11,7-19,0)	22,1	24,0 (19,7-28,4)	32,6	32,7 (27,7-37,7)	28,8	25,2 (20,7-29,8)
Quelqu'un avec qui partager vos craintes et vos inquiétudes les plus intimes	4,8	4,4 (2,4-6,4)	14,7	17,4 (13,1-21,6)	20,0	22,4 (18,4-26,5)	30,6	31,1 (26,1-36,0)	29,9	24,7 (20,3-29,2)
Quelqu'un vers qui vous tourner pour obtenir des suggestions sur les façons de gérer un problème personnel	2,5	4,6 (2,2-7,1)	13,0	14,7 (11,0-18,5)	20,4	22,0 (18,1-25,9)	33,9	33,6 (28,5-38,7)	30,2	25,1 (20,7-29,5)
Quelqu'un qui comprend vos problèmes	3,4	4,2 (2,5-5,8)	11,9	13,5 (9,7-17,3)	24,5	27,5 (23,1-31,9)	32,5	31,2 (26,3-36,2)	27,7	23,5 (19,1-28,0)
Soutien tangible										
Quelqu'un pour vous aider si vous étiez cloué au lit	7,3	7,7 (4,6-10,8)	14,9	18,0 (13,9-22,2)	21,1	21,8 (18,0-25,7)	27,1	28,6 (23,7-33,5)	29,6	23,8 (19,5-28,1)
Quelqu'un pour vous amener voir le médecin si vous en aviez besoin	7,6	9,9 (6,5-13,3)	16,0	17,7 (13,9-21,6)	17,3	19,1 (15,1-23,0)	27,1	26,0 (21,4-30,6)	32,0	27,3 (22,6-32,0)

⁴ Hays RD, Sherbourne CD, Mazel RM. *User's Manual for the Medical Outcomes Study (Mos) Core Measures of Health-Related Quality of Life*. Santa Monica, CA: Rand Corp; 1995.



Quelqu'un pour préparer vos repas si vous n'étiez pas en mesure de le faire vous-même	13,3 16,3 (12,3-20,3)	15,6 15,8 (12,0-19,6)	18,8 20,7 (17,0-24,4)	24,9 22,6 (17,9-27,4)	27,4 24,5 (20,2-28,9)
Quelqu'un pour vous aider avec vos tâches quotidiennes si vous étiez malade	13,6 16,0 (12,3-19,7)	16,2 16,3 (12,6-20,0)	21,2 23,1 (19,0-27,2)	24,3 22,6 (17,9-27,4)	24,7 21,9 (17,7-26,2)
Soutien affectif intime					
Quelqu'un qui vous donne de l'amour et de l'affection	5,4 5,2 (2,8-7,5)	13,2 13,8 (10,1-17,5)	22,7 24,2 (20,0-28,4)	26,4 27,2 (22,6-31,9)	32,2 29,6 (24,7-34,5)
Quelqu'un à aimer qui vous donne le sentiment d'être désiré	8,2 7,8 (5,4-10,2)	17,1 14,9 (11,1-18,8)	23,9 24,7 (20,2-29,2)	24,0 26,4 (21,9-30,9)	26,7 26,1 (21,5-30,8)
Quelqu'un qui vous prend dans ses bras	5,4 6,6 (3,5-9,7)	16,8 17,4 (13,6-21,2)	20,7 20,8 (16,7-24,8)	27,5 27,2 (22,6-31,8)	29,6 28,0 (23,3-32,8)
Interactions sociales positives					
Quelqu'un avec qui passer du bon temps	1,6 2,3 (0,4-4,3)	7,1 8,3 (5,3-11,2)	21,0 24,3 (19,9-28,7)	35,4 32,7 (27,9-37,5)	34,9 32,4 (27,5-37,3)
Quelqu'un avec qui être pour relaxer	2,4 2,8 (0,7-4,9)	9,3 12,7 (9,2-16,2)	22,3 23,2 (18,9-27,5)	33,6 31,7 (27,0-36,3)	32,4 29,6 (24,7-34,5)
Quelqu'un avec qui faire quelque chose d'agréable	1,7 2,7 (0,5-5,0)	6,4 8,7 (5,6-11,7)	21,0 23,4 (19,1-27,7)	36,0 32,9 (28,2-37,6)	34,8 32,3 (27,3-37,3)
Quelqu'un avec qui faire quelque chose pour vous changer les idées	1,6 4,7 (2,0-7,4)	7,7 9,7 (6,4-13,0)	21,2 22,1 (18,0-26,2)	35,9 32,9 (28,2-37,7)	33,6 30,6 (25,7-35,4)

Proportion de données manquantes : 1,4% à 2,0% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Hays RD, Sherbourne CD, Mazel RM. *User's Manual for the Medical Outcomes Study (Mos) Core Measures of Health-Related Quality of Life*. Santa Monica, CA: Rand Corp; 1995.

Soutien social - Calcul des scores

Les énoncés auxquels les participants ont préféré ne pas répondre ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 1 à 5, selon la fréquence à laquelle le participant peut, au besoin, accéder au soutien concerné. La fréquence « jamais » équivaut à 1 point tandis que la fréquence « tout le temps » équivaut à 5 points. Le score d'un participant peut être calculé par sous-échelle ou pour l'échelle au complet en faisant la moyenne des points attribués à chacun des énoncés de la (sous-échelle, il varie de 1 à 5. Le score moyen de chaque sous-échelle et de l'échelle au complet, pour l'ensemble des participants, est inscrit au tableau suivant. Une valeur élevée indique que les participants ont davantage accès à du soutien (émotionnel ou d'information, tangible, affectif intime...)

**Tableau 34 Soutien social – sommaire**

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Soutien social			
Sous-échelle	Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée¹ (IC 95%)
Soutien émotionnel ou d'information	1-5	3,8 (0,98)	3,7 (3,6-3,8)
Soutien tangible		3,5 (1,2)	3,3 (3,2-3,4)
Soutien affectif intime		3,6 (1,2)	3,5 (3,4-3,7)
Interactions sociales positives		3,9 (0,96)	3,8 (3,7-3,9)
Score global		3,7 (0,93)	3,6 (3,5-3,7)

Proportion de données manquantes : 1,6% à 3,6% selon l'item.

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)



2.4 Utilisation des applications et sites Internet de rencontre

Tableau 35 Fréquence d'utilisation des applications et sites Internet de rencontre

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours des six derniers mois, avez-vous utilisé une application pour téléphone intelligent ou un site Internet afin de communiquer avec d'autres hommes ?		
Fréquence d'utilisation	% naj	% aj (IC 95%)
Non, jamais	17,7	23,9 (19,5-28,3)
Non, mais j'en ai utilisé dans le passé	8,4	8,5 (5,6-11,4)
Oui, mais moins d'une fois par mois	6,1	6,1 (4,2-8,0)
Oui, environ une fois par mois	6,2	5,7 (3,3-8,1)
Oui, environ une fois par semaine	8,7	11,0 (8,1-13,9)
Oui, plusieurs fois par semaine	18,4	16,6 (12,7-20,6)
Oui, environ une fois par jour	8,7	7,2 (4,4-10,0)
Oui, plusieurs fois par jour	25,8	20,9 (16,7-25,0)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 36 Raison d'utilisation des applications et sites Internet de rencontre

Parmi les participants qui ont utilisé une application de rencontre à vie (n=970) Pour quelles raisons utilisez-vous ces applications ou ces sites internet ? (Cochez tout ce qui s'applique) *		
Raisons	% naj	% aj (IC 95%)
Pour avoir du sexe avec des gars	76,6	67,9 (62,5-73,4)
Pour me divertir	55,6	49,1 (43,3-54,8)
Pour socialiser et rencontrer de nouvelles personnes avec qui discuter	56,5	55,5 (49,8-61,2)
Pour trouver un copain / chum / amoureux	48,5	48,7 (42,9-54,4)
Pour me sentir désiré sexuellement	45,5	40,3 (34,7-46,0)
Pour faire partie de la communauté gaie	20,7	21,3 (16,4-26,3)
Pour trouver des gars avec qui m'amuser et prendre de la drogue	12,5	7,9 (4,7-11,0)
Autre	2,2	2,4 (0,9-3,9)

Proportion de données manquantes : 1%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

**Tableau 37 Noms des application(s) et sites Internet de rencontre utilisé(s)**

<i>Parmi les participants qui ont utilisé une application de rencontre à vie (n=970)</i> Parmi les applications et les sites internet suivants, lesquels avez-vous utilisé au cours des six derniers mois ? <i>(Cochez tout ce qui s'applique) *</i>		
Nom des applications et des sites Internet	% naj	% aj (IC 95%)
Grindr	73,1	72,1 (66,7-77,4)
Scruff	44,1	37,0 (31,5-42,4)
Tinder	31,6	34,9 (29,3-40,5)
Hornet	31,4	30,5 (25,3-35,7)
Gay411	30,6	24,2 (19,0-29,4)
easyGAYchat.com	15,0	10,1 (6,9-13,4)
Craigslist	13,4	13,1 (9,3-16,9)
Badoo	9,3	11,5 (7,9-15,1)
Squirt	9,1	6,8 (3,9-9,7)
BarebackRT	10,7	6,3 (3,2-9,5)
OkCupid	7,0	8,4 (4,8-12,0)
Growlr	9,0	5,5 (3,0-8,1)
Bear411	8,7	5,3 (3,0-7,5)
Recon	6,3	4,5 (2,1-6,8)
Dudesnude	7,0	4,2 (2,0-6,4)
ManHunt	5,0	3,8 (1,5-6,2)
Planet Romeo	3,7	3,8 (1,8-5,9)
POF (Plenty of Fish)	2,9	3,4 (1,1-5,7)
Gaydar	1,5	3,4 (0,0-6,7)
Jack'd	2,2	3,2 (1,2-5,3)
Rentmen	1,8	1,0 (0,0-2,1)
GuySpy	0,8	1,0 (0,0-2,4)
Mister	0,4	0,4 (0,0-1,0)
Autre	10,4	7,1 (4,6-9,6)

Proportion de données manquantes : 2,8%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



Tableau 38 **Caractéristiques des gars recherchés sur les applications et sites Internet de rencontre**

<i>Parmi les participants qui ont utilisé une application ou un site Internet de rencontre à vie (n=970)</i> Lorsque vous utilisez ces applications ou sites Internet de rencontre, est-ce que vous cherchez à avoir du sexe avec des gars qui ont les caractéristiques suivantes ? <i>(Cochez tout ce qui s'applique) *</i>		
Caractéristiques recherchées	% naj	% aj (IC 95%)
Gars de mon âge	73,7	70,4 (65,0-75,9)
Gars masculins	71,3	64,8 (59,2-70,4)
Gars versatiles	64,8	58,1 (52,3-63,8)
Gars qui utilisent des condoms	51,8	53,4 (47,6-59,2)
Gars musclés	56,6	50,1 (44,4-55,9)
Gars plus âgés que moi	51,1	48,7 (42,9-54,4)
Gars tops (ou insertifs)	51,3	48,1 (42,4-53,9)
Gars plus jeunes que moi	47,9	43,0 (37,3-48,6)
Gars séronégatifs au VIH	43,0	42,9 (37,2-48,6)
Gars avec des grosses queues	47,1	42,0 (36,5-47,5)
Gars bottoms (ou réceptifs)	46,9	41,0 (35,3-46,7)
Gars minces	44,3	40,8 (35,1-46,4)
Gars qui veulent une relation à long terme	41,4	38,7 (33,1-44,3)
Gars qui ont la même origine ethnique que moi	39,2	37,6 (32,1-43,2)
Gars qui ont une origine ethnique différente de la mienne	41,9	34,9 (29,5-40,3)
Gars non-trans	29,9	29,0 (24,1-33,8)
Gars séronégatifs au VIH sous PrEP	28,2	22,1 (17,6-26,6)
Gars qui aiment le sexe en groupe	26,0	17,0 (12,5-21,4)
Gars féminins	13,1	16,3 (11,9-20,8)
Gars séropositifs au VIH qui ont une charge virale indétectable	21,2	14,6 (10,8-18,4)
Gars corpulents	17,2	13,7 (10,0-17,4)
Gars qui pratiquent le bareback (sexe anal sans condom)	19,5	12,8 (9,2-16,4)
Gars qui aiment consommer de la drogue en baisant (Party and Play, pnp)	15,5	11,2 (7,6-14,8)
Gars avec des petites queues	11,6	10,4 (7,2-13,6)
Gars trans	9,6	9,6 (6,2-13,1)
Gars séropositifs au VIH	6,4	3,3 (1,6-5,1)
Autre	2,6	1,7 (0,3-3,1)
Je n'utilise pas ces applications ou ces sites internet de rencontre afin spécifiquement de trouver des partenaires sexuels	7,5	10,1 (6,3-13,9)

Proportion de données manquantes : 1,5%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

**Tableau 39** **Caractéristiques des gars évités sur les applications et sites Internet de rencontre**

<i>Parmi les participants qui ont utilisé une application de rencontre à vie (n=970)</i> Lorsque vous utilisez ces applications ou sites internet de rencontre est-ce que vous cherchez à <u>ne pas avoir</u> du sexe avec des gars qui ont les caractéristiques suivantes ? (Cochez tout ce qui s'applique) *		
Caractéristiques évitées	% naj	% aj (IC 95%)
Gars séropositifs au VIH	51,1	52,3 (46,5-58,1)
Gars trans	53,8	46,8 (41,0-52,6)
Gars qui aiment consommer de la drogue en baisant (Party and Play, pnp)	51,6	46,8 (41,0-52,6)
Gars corpulents	46,0	45,8 (40,0-51,7)
Gars féminins	48,8	44,4 (38,6-50,3)
Gars qui pratiquent le bareback (sexe anal sans condom)	43,1	44,2 (38,4-50,0)
Gars séropositifs au VIH qui ont une charge virale indétectable	35,1	38,5 (32,8-44,3)
Gars plus jeunes que moi	23,4	28,7 (23,6-33,9)
Gars qui aiment le sexe en groupe	23,6	24,0 (18,9-29,1)
Gars plus âgés que moi	23,6	23,1 (18,3-27,9)
Gars bottoms (ou réceptifs)	21,2	23,0 (18,0-27,9)
Gars avec des petites queues	27,1	22,3 (17,7-26,9)
Gars qui veulent une relation à long terme	23,3	20,0 (15,6-24,3)
Gars minces	16,9	18,2 (13,6-22,7)
Gars tops (ou insertifs)	15,5	14,1 (10,1-18,1)
Gars musclés	8,7	13,6 (9,9-17,3)
Gars non-trans	10,3	11,7 (8,2-15,2)
Gars séronégatifs au VIH sous PrEP	10,2	10,0 (6,8-13,1)
Gars masculins	7,0	9,2 (6,0-12,5)
Gars de mon âge	7,9	8,7 (5,9-11,4)
Gars qui ont la même origine ethnique que moi	7,2	8,6 (5,5-11,7)
Gars avec des grosses queues	6,8	8,1 (5,3-11,0)
Gars qui ont une origine ethnique différente de la mienne	7,8	7,8 (4,4-11,2)
Gars versatiles	6,6	7,4 (4,6-10,3)
Gars séronégatifs au VIH	7,3	7,1 (4,5-9,6)
Gars qui utilisent des condoms	6,7	6,1 (4,0-8,1)
Autre	1,7	2,0 (0,8-3,2)
Je n'utilise pas d'applications ou de sites internet afin de trouver des partenaires sexuels	6,6	10,4 (6,5-14,2)

Proportion de données manquantes : 4,8%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



Tableau 40 **Caractéristiques personnelles affichées sur les profils des applications et sites Internet de rencontre**

<i>Parmi les participants qui ont utilisé une application de rencontre à vie (n=970)</i> Affichez-vous une ou plusieurs des caractéristiques suivantes sur votre profil ou vos profils ? (Cochez tout ce qui s'applique) *		
Caractéristiques personnelles affichées	% naj	% aj (IC 95%)
Âge véritable	78,2	76,3 (71,3-81,3)
Photo du visage	77,5	70,6 (65,4-75,8)
Statut sérologique VIH	47,3	43,8 (38,1-49,5)
Groupe ethnique ou race	44,6	41,3 (35,6-46,9)
Photos de parties nues de votre corps	35,3	26,8 (22,0-31,5)
Consommation de drogue	12,0	9,6 (6,4-12,8)

Proportion de données manquantes : 1,8%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



3

Comportements et attitudes sexuels



3 Comportements et attitudes sexuels

3.1 Comportements sexuels avec des hommes

Parmi l'ensemble des participants, 96,2% (IC 95% : 93,9% - 98,5%) ont rapporté avoir eu des relations sexuelles orales avec un homme au cours de leur vie. Parmi ceux-ci, l'âge moyen lors de la première relation sexuelle orale avec un homme était 17,3 ans et l'âge médian, 17 ans*. Parmi l'ensemble des participants, 90,3% (IC 95% : 87,5% - 93,2%) ont rapporté avoir eu des relations sexuelles anales avec un homme à vie. Parmi ceux-ci, l'âge moyen lors de la première relation sexuelle anale était 20,4 ans et l'âge médian, 18 ans*.

Tableau 41 Âge lors de la première relation sexuelle avec un homme

<i>Parmi les participants qui ont déjà eu une relation sexuelle orale ou anale à vie</i> Quel âge aviez-vous lors de votre première relation sexuelle orale (donneur ou receveur) ou anale (top/insertif ou bottom/réceptif) avec un homme ?				
Âge lors de la première relation sexuelle	Relation sexuelle orale (n=1172)		Relation sexuelle anale (n=1127)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
8 à 14 ans*	26,6	27,0 (22,6-31,4)	10,7	11,0 (8,1-14,0)
15 ans	11,3	12,0 (8,7-15,3)	7,1	7,9 (4,6-11,2)
16 ans	9,8	9,2 (6,3-12,1)	8,6	6,3 (4,0-8,7)
17 ans	8,8	11,3 (7,5-15,0)	8,4	7,2 (4,5-9,9)
18 ans	13,2	13,3 (9,4-17,1)	16,3	15,0 (11,6-18,5)
18 ans et moins	69,6	72,8 (68,1-77,5)	51,1	47,5 (42,2-52,8)

Proportion de données manquantes : 1% à 4% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

*Une relation sexuelle avant l'âge de 8 ans est considérée comme non consentante. Les participants ayant indiqué un âge de 8 ans ou moins lors de leur première relation sexuelle ont été exclus du calcul de l'âge moyen, de l'âge médian et des proportions rapportées dans le tableau. À noter que 56 participants rapportent avoir eu leur première relation sexuelle orale avec un homme avant l'âge de 8 ans et que 13 participants rapportent avoir eu une première relation sexuelle anale avant l'âge de 8 ans.

Tableau 42 Nombre de partenaires sexuels masculins

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)						
Au cours des six derniers mois, avec combien d'hommes avez-vous eu des relations sexuelles ?						
Nombre de partenaires sexuels masculins	Tout type de relation sexuelle *		Relation orale ou anale		Relation anale	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
0	0,0	s.o.	2,8	4,5 (2,4-6,6)	11,5	15,9 (12,3-19,6)
1	13,2	21,1 (16,5-25,8)	16,2	21,2 (16,6-25,7)	22,2	27,7 (22,8-32,5)
2-4	29,8	33,8 (28,9-38,7)	30,4	34,9 (30,0-39,8)	29,9	30,9 (26,2-35,6)
5-9	19,9	19,3 (15,4-23,3)	18,8	18,2 (14,4-22,1)	14,8	13,1 (10,2-16,0)
10-14	13,0	12,2 (9,7-14,8)	11,5	9,9 (7,7-12,1)	7,8	5,4 (3,3-7,5)
15-19	5,4	3,3 (1,9-4,8)	5,6	4,0 (2,1-6,0)	3,8	1,7 (0,6-2,9)
20-29	8,0	5,0 (2,7-7,4)	6,6	3,4 (1,4-5,4)	4,6	2,9 (0,9-4,8)
30 ou plus	10,7	5,1 (2,9-7,3)	8,1	3,8 (1,9-5,8)	5,4	2,5 (0,7-4,2)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.

* Relation anale, orale, avec masturbation mutuelle, avec contact bouche-anus (rimming), frontale/vaginale, etc.

**Tableau 43** Nombre de nouveaux partenaires sexuels masculins

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Combien de ces hommes avec qui vous avez eu des relations sexuelles au cours des 6 derniers mois étaient de nouveaux partenaires (c.à.d. quelqu'un avec qui vous aviez une relation sexuelle pour la première fois) ?		
Nombre de nouveaux partenaires sexuels au cours des 6 derniers mois	% naj	% aj (IC 95%)
0	12,3	18,1 (13,9-22,4)
1	13,0	15,5 (11,5-19,6)
2-4	29,3	30,9 (26,1-35,7)
5-9	18,3	17,9 (14,3-21,5)
10-14	8,9	7,4 (5,5-9,2)
15-19	6,1	3,8 (1,8-5,8)
20-29	5,6	3,6 (1,6-5,7)
30 ou plus	6,5	2,7 (1,3-4,2)

Proportion de données manquantes : 0,9%

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

Tableau 44 Proportion de nouveaux partenaires sexuels masculins parmi les partenaires des six derniers mois

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Combien de ces hommes avec qui vous avez eu des relations sexuelles au cours des 6 derniers mois étaient de nouveaux partenaires (quelqu'un avec qui vous aviez une relation sexuelle pour la première fois) ?					
Proportion de nouveaux partenaires parmi l'ensemble des partenaires	Catégories du nombre de partenaires sexuels au cours des 6 derniers mois rapporté par le participant				
	4 partenaires ou moins (n=510)		5 partenaires ou plus (n=669)		Quel que soit le nombre de partenaires (n=1 179)
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	
0%	27,5	31,4 (24,1-38,8)	0,9	1,8 (0,0-4,5)	12,3 18,1 (13,9-22,4)
1-25%	1,6	0,8 (0,3-1,3)	4,0	3,1 (1,2-4,9)	3,0 1,8 (0,9-2,7)
26-50%	17,6	14,4 (8,9-19,8)	16,3	13,9 (8,9-18,8)	16,9 14,1 (10,4-17,8)
51-75%	14,2	11,2 (6,9-15,5)	24,1	20,9 (15,7-26,1)	19,9 15,5 (12,2-18,9)
76-99%	s.o.*	s.o.	33,8	29,6 (23,2-35,9)	19,3 13,3 (10,0-16,5)
100%	39,1	42,3 (34,6-49,9)	20,8	30,8 (24,6-36,9)	28,7 37,1 (32,1-42,1)

Proportion de données manquantes : 1,8% parmi les participants ayant rapporté 4 partenaires ou moins (N = 510) ; 0,1% parmi ceux ayant rapporté 5 partenaires ou plus (n=669) et 0,8 % parmi l'ensemble des participants.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.= sans objet.

* Compte tenu de la catégorie ici qui est de 4 partenaires ou moins, la proportion 76-99% de nouveaux partenaires ne s'applique jamais vraiment (p.ex., si une personne avait 3 nouveaux partenaires sur 4, la proportion de nouveaux partenaires est de 75%, si elle avait 4 partenaires nouveaux sur 4, elle est de 100%).

**Tableau 45 Types d'activités sexuelles avec des hommes**

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours des 6 derniers mois, quelles activités sexuelles avez-vous pratiqué avec des hommes ? (Cochez tout ce qui s'applique) *		
Activités sexuelles	% naj	% aj (IC 95%)
Un homme m'a donné du sexe oral. (Il a mis sa bouche ou sa langue sur mes organes génitaux.)	90,6	86,4 (82,6-90,1)
J'ai donné du sexe oral à un homme. (J'ai mis ma bouche ou ma langue sur ses organes génitaux.)	90,2	81,9 (77,5-86,4)
J'ai branlé ou me suis fait branler par un homme.	84,6	79,6 (74,8-84,3)
J'ai pénétré un homme par voie ANALE, j'étais top/insertif.	70,9	64,5 (59,6-69,5)
Un homme a embrassé/léché mon cul « rimming »	71,1	61,7 (56,5-66,8)
Je me suis fait pénétrer par voie ANALE, j'étais bottom/réceptif.	65,2	57,9 (52,7-63,1)
J'ai embrassé/léché le cul d'un homme. « rimming »	66,8	53,9 (48,7-59,2)
Un homme et moi avons utilisé des jouets sexuels.	28,0	23,5 (19,0-28,0)
J'ai reçu ou donné une douche dorée à un homme (jeu sexuel axé sur l'urine/ le fait d'uriner)	14,3	10,9 (7,5-14,3)
J'ai fait du « fisting » à un homme par voie anale ou par voie frontale/vaginale. (J'ai inséré tous mes doigts, mon poing ou mon avant-bras dans son anus ou orifice avant/vagin.)	11,1	8,2 (5,0-11,4)
Un homme m'a fait du « fisting » par voie anale ou par voie frontale/vaginale. (Il a inséré tous ses doigts, son poing ou son avant-bras dans mon anus ou orifice avant/vagin.)	5,8	5,2 (2,8-7,6)
Autre	2,0	1,6 (0,3-2,8)

Aucune donnée manquante.

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

Tableau 46 Préférence de positionnement lors de pénétration anale

Parmi les participants qui préfèrent avoir des relations sexuelles anales (n=999) Sur une échelle de 1 (toujours être pénétré par le partenaire) à 5 (toujours pénétrer le partenaire), quel type de relation sexuelle anale préférez-vous ?									
Je préfère presque toujours être pénétré par mon partenaire (« bottom/réceptif ») 1		Plutôt 'Bottom' 2		Je préfère tout autant être pénétré que pénétrer (« versatile ») 3		Plutôt 'Top' 4		Je préfère presque toujours pénétrer mon partenaire (« top/insertif ») 5	
% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
17,8	16,9 (12,9-21,0)	17,3	18,3 (14,2-22,4)	28,7	29,5 (24,3-34,7)	16,3	15,7 (11,6-19,8)	19,8	19,6 (14,8-24,4)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)



3.2 Relations sexuelles avec des femmes (cis ou trans)

Tableau 47 Nombre de partenaires sexuelles féminines (cis ou trans) à vie

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours de votre vie, avec combien de femmes (y compris les femmes trans) avez-vous eu des relations sexuelles (vaginales, orales ou anales) ?		
Nombre de partenaires féminines (cis et trans)	% naj	% aj (IC 95%)
0	51,3	54,3 (49,2-59,4)
1	13,5	9,3 (6,4-12,1)
2-4	20,0	18,4 (14,3-22,5)
5-9	5,9	7,1 (4,8-9,3)
10-19	4,3	5,4 (2,8-8,0)
20-29	2,0	2,7 (1,1-4,4)
30 ou plus	3,1	2,8 (1,0-4,7)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

Tableau 48 Âge lors de la première relation sexuelle avec une femme cis

<i>Parmi les participants qui ont eu une relation sexuelle avec une femme à vie (n=574)</i> Quel âge aviez-vous lors de votre première relation sexuelle (vaginale, orale, ou anale) avec une femme non-trans ?		
Âge lors de la première relation sexuelle avec une femme cis	% naj	% aj (IC 95%)
8 à 14 ans*	17,5	19,4 (13,4-25,4)
15 ans	10,1	9,8 (5,3-14,2)
16 ans	15,5	19,7 (13,2-26,3)
17 ans	12,5	11,1 (7,2-15,1)
18 ans	14,6	13,8 (8,6-18,9)
19 ans	8,3	8,1 (4,3-12,0)
20 ans	5,1	3,3 (1,9-4,8)
21-24 ans	10,6	10,9 (5,9-16,0)
25 ans ou plus	5,8	3,8 (1,2-6,4)

Proportion de données manquantes : 1,2%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Une relation sexuelle avant l'âge de 8 ans est considérée comme non consentante. Les participants ayant indiqué un âge de 8 ans ou moins lors de leur première relation sexuelle ont été exclus du calcul de ces proportions. À noter que 7 participants rapportent avoir eu leur première relation sexuelle avec une femme avant l'âge de 8 ans.

Le nombre moyen d'années entre l'âge actuel du participant et son âge lors de sa dernière relation sexuelle avec une femme cis était de :

- Parmi tous les participants : 14,7 ans (médiane : 11,5)
- Parmi ceux âgés de 29 ans ou moins : 5,4 ans (médiane : 5,5)
- Parmi ceux âgés de 30 à 49 ans : 13,3 ans (médiane : 13,0)
- Parmi ceux âgés de 50 ans ou plus : 26,5 ans (médiane : 32,0)

**Tableau 49 Âge lors de la dernière relation sexuelle avec une femme cis**

Parmi les participants qui ont eu une relation sexuelle avec une femme à vie (n=574)
Quel âge aviez-vous lors de votre dernière relation sexuelle (vaginale, orale, ou anale) avec une femme non-trans ?

Âge lors de la dernière relation sexuelle avec une femme cis	% naj	% aj (IC 95%)
14 ans ou moins	3,9	4,9 (0,9-8,9)
15 ans	2,0	1,1 (0,0-2,5)
16 ans	5,4	4,1 (1,3-7,0)
17 ans	6,3	4,1 (2,1-6,1)
18 ans	7,2	4,8 (1,9-7,7)
19 ans	8,7	8,5 (3,6-13,3)
20 ans	7,8	4,8 (2,6-6,9)
21-24 ans	18,5	21,6 (15,2-27,9)
25 ans ou plus	40,2	46,2 (38,5-53,9)

Proportion de données manquantes : 6,1%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 50 Nombre de partenaires sexuelles féminines cis au cours des six derniers mois

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)
Au cours des 6 derniers mois, avec combien de femmes non-trans avez-vous eu des relations sexuelles (vaginales, orales ou anales) ?

Nombre de femmes cis	% naj	% aj (IC 95%)
0	91,6	88,1 (84,5-91,6)
1	4,1	6,6 (3,9-9,4)
2-4	3,3	4,5 (2,1-7,0)
5 ou plus	1,0	0,8 (0,4-1,2)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 51 - Nombre de partenaires sexuelles féminines trans au cours de la vie

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)
Au cours de votre vie, avec combien de femmes trans avez-vous eu des relations sexuelles (vaginales, orales ou anales) ?

Nombre de femmes trans	% naj	% aj (IC 95%)
0	94,3	94,5 (92,7-96,3)
1	1,8	1,0 (0,2-1,7)
2-4	2,7	3,8 (2,4-5,3)
5 ou plus	1,2	0,7 (0,0-1,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).


Tableau 52 Âge lors de la première relation sexuelle avec une femme trans

Parmi les participants qui ont eu une relation sexuelle avec une femme trans à vie (n=67) Quel âge aviez-vous lors de votre première relation sexuelle (vaginale, orale, ou anale) avec une femme trans ?	
Âge	% naj
8 à 14 ans	9,8
15 ans	3,3
16 ans	6,6
17 ans	4,9
18 ans	14,8
19 ans	4,9
20 ans	6,6
21-24 ans	11,5
25 ans ou plus	37,7

Données manquantes : 8.5%

naj=non-ajustée

*Une relation sexuelle avant l'âge de 8 ans est considérée comme non consentante. Les participants ayant indiqué un âge de 8 ans ou moins lors de leur première relation sexuelle ont été exclus du calcul de ces proportions. À noter qu'aucun participant a rapporté avoir eu leur première relation sexuelle avec une femme trans avant l'âge de 8 ans.



3.3 Relations sexuelles en échange d'argent, de drogues ou d'autres biens

Tableau 53 Relations sexuelles en échange d'argent, de drogues ou d'autres biens à vie

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Avez-vous déjà donné ou reçu de l'argent, de la drogue ou d'autres biens et services en échange d'une relation sexuelle (orale, anale, frontale/vaginale) ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Non	73,2	80,1 (76,3-83,9)
Oui, mais pas dans les 6 derniers mois	16,5	12,1 (9,1-15,1)
Oui, dans les 6 derniers mois	10,3	7,8 (5,2-10,5)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

Tableau 54 Relations sexuelles en échange d'argent, de drogues ou d'autres biens au cours des six derniers mois

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours des 6 derniers mois, avez-vous....		
	% naj	% aj (IC 95%)
Donné en échange d'une relation sexuelle ?		
de l'argent	3,5	2,0 (0,9-3,1)
de la drogue	1,6	0,5 (0,1-0,9)
d'autres biens ou services*	1,5	0,7 (0,2-1,2)
l'un ou l'autre	4,8	2,5 (1,4-3,7)
Reçu en échange d'une relation sexuelle ?		
de l'argent	6,3	5,5 (3,1-7,9)
de la drogue	4,4	3,6 (1,7-5,6)
d'autres biens ou services*	3,3	2,6 (1,1-4,1)
l'un ou l'autre	7,6	6,2 (3,8-8,6)
Donné ou reçu en échange d'une relation sexuelle ?		
de l'argent	9,3	7,2 (4,6-9,8)
de la drogue	4,8	3,8 (1,8-5,7)
d'autres biens ou services*	3,9	2,9 (1,3-4,4)
l'un ou l'autre	10,2	7,8 (5,2-10,4)

Données manquantes : 1,9% à 2,1% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

* p.ex. une chambre, un repas ou des cadeaux



3.4 Sexe en groupe

Tableau 55 Fréquentation de sauna / sex-clubs et sexe en groupe selon le groupe d'âge.

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours des 6 derniers mois ...						
Variables	Groupe d'âge					
	29 ans et moins (N=435)		30 à 49 ans (n=455)		50 ans et plus (n=289)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Êtes-vous allé dans un sauna ou dans un « sex club » ?	31,2	21,1 (15,0-27,1)	41,2	37,2 (28,9-45,5)	46,0	42,6 (33,9-51,3)
Avez-vous participé à du sexe en groupe* ?	21,4	16,9 (10,8-22,9)	24,2	11,8 (6,9-16,6)	24,7	21,8 (16,3-27,3)
Avez-vous participé à du sexe en groupe à l'occasion d'un party « bareback » (un party où les participants s'attendent ou sont encouragés à avoir des relations sexuelles avec pénétration anale sans condom ?	5,8	5,8 (1,2-10,5)	10,0	4,2 (0,9-7,5)	9,8	5,6 (2,9-8,3)
Avez-vous participé à du sexe en groupe à l'occasion d'un party pnp (party'n'play) où il était possible de consommer ou non du crystal meth (T, Tina ou meth) ?	4,8	5,3 (0,7-9,9)	9,2	3,8 (0,5-7,2)	7,7	5,0 (2,4-7,6)
Avez-vous participé à du sexe en groupe où vous avez consommé des substances (drogues) que vous n'aviez pas prévues consommer ou que vous ne vous attendiez pas à consommer ?**	5,5	3,7 (0,3-7,2)	8,0	3,9 (0,7-7,2)	5,9	3,3 (0,8-5,7)
Avez-vous participé à du sexe en groupe où vous avez fait quelque chose au point de vue sexuel que vous n'aviez pas prévu ou à laquelle vous ne vous attendiez pas ?***	3,3	2,5 (0,1-5,0)	3,0	0,6 (0,1-1,0)	3,9	1,0 (0,2-1,7)
						1,4 (0,5-2,4)

Donnée manquante : 0,2% à 2,5% parmi ceux âgés de 29 ans et moins (N = 435). ; 0,9% to 3,7% parmi ceux âgés de 30 à 49 ans (N = 455)

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

*Le sexe en groupe c'est quand 4 personnes ou plus ont des relations sexuelles ensemble au même moment avec toutes ou quelques personnes du groupe. Le sexe en groupe peut avoir lieu dans un « sex party », un sauna, un « backroom » ou d'autres endroits.

** Parmi les participants qui ont rapporté avoir participé à du sexe en groupe (n=273), 23,2% (IC 95% : 13,4% - 32,9%) ont rapporté avoir alors consommé des substances (drogues) qu'ils n'avaient pas prévues ou planifiées de consommer

*** Parmi les participants qui ont rapporté avoir participé à du sexe en groupe (n=273), 10,0% (IC 95% : 3,3% - 16,7%) ont rapporté avoir fait quelque chose au point de vue sexuel qu'ils n'avaient pas prévu, comme : fisting (7), relation sexuelle anale (3), relation sexuelle sans condom (4), « BDSM » (3), « pisse » (3), « avaler » (2), « double pénétration », « être filmé » (1), « puppy play » (1)



Tableau 56 **Consommation non prévue ou planifiée de substances lors d'une relation sexuelle en groupe**

Parmi les participants qui ont rapporté avoir du sexe en groupe où ils ont consommé des substances non-prévues (n=77) Quelles étaient ces substances que vous n'aviez pas prévu consommer ou que vous ne vous attendiez pas à consommer ? (Cochez tout ce qui s'applique.)*	
Substances consommées	% naj
Crystal méthamphétamine (T, Tina)	57,1
GHB (G)	58,4
Cannabis/marijuana (weed, pot, 420)	55,8
Poppers (nitrite d'amyle)	55,8
Viagra/Cialis/Levitra	51,9
Alcool	48,1
Cocaïne	40,3
Ecstasy (E, MDMA)	39,0
Kétamine (K)	36,4
Autres drogues	10,4

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



3.5 Participation à divers milieux ou groupes gais

Tableau 57 Participation à divers milieux et groupes gais

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Parmi les milieux et les groupes suivants, quels sont ceux auxquels vous participez ? (Cochez tout ce qui s'applique.)*		
Milieux ou groupes	% naj	% aj (IC 95%)
Bareback/Sans capote	24,1	18,6 (14,6-22,7)
Twink	14,6	16,2 (8,0-13,9)
Sportif/Jock	20,4	15,3 (11,6-19,0)
Bear/Cub/Otter	19,2	12,4 (9,3-15,6)
Kink/fétiche	17,3	11,9 (8,6-15,1)
Queer	14,9	11,0 (8,0-13,9)
BDSM	11,4	10,5 (7,1-13,8)
Party & play/pnp	13,6	8,5 (5,7-11,2)
Cuir	13,6	7,9 (5,3-10,2)
Clubber/raver	9,7	7,9 (5,3-10,2)
Poz (+)	7,2	4,9 (2,7-7,0)
Trans	3,9	4,3 (1,7-6,9)
Drag	5,0	4,2 (2,3-6,0)
Autre	2,9	5,5 (3,4-7,6)
Aucun de ces milieux ou groupes	38,1	45,2 (40,0-50,5)

Proportion de données manquantes : 3%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



3.6 Violence entre partenaires intimes

L'échelle « Violence entre partenaires intimes » (Stults et al. 2015)⁵ vise à rendre compte des expériences de violence subie de la part d'un partenaire intime, ainsi que des expériences de violence infligée à un partenaire intime. L'échelle comprend 6 énoncés ; 3 concernant la violence subie et 3 concernant la violence infligée. Il s'agit d'une expérience à vie, au moins une fois. Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants selon leurs expériences.

Tableau 58 Violence subie de la part d'un partenaire intime ou infligée à un partenaire intime

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Les questions suivantes portent sur votre expérience de violence physique et sexuelle. Elles pourraient vous rappeler des souvenirs douloureux. Au besoin, un membre de l'équipe sera disponible pour discuter avec vous et vous informer sur les services de soutien psychologique.		
Type de violence subie Avez-vous déjà été...	% naj	% aj (IC 95%)
Insulté ou abusé verbalement par un amoureux ou un chum ?	41,7	38,9 (33,7-44,0)
Frappé, reçu une claque ou un coup de pied par un amoureux ou un chum ?	23,4	20,7 (16,6-24,7)
Abusé sexuellement ou violé par un amoureux ou un chum ?	12,0	11,1 (8,0-14,3)
L'un ou l'autre	45,8	42,0 (36,9-47,0)
Type de violence infligée Avez-vous déjà...	% naj	% aj (IC 95%)
Insulté ou abusé verbalement un amoureux ou un chum ?	29,5	26,5 (22,1-30,9)
Déjà frappé, donné une claque ou un coup de pied à un amoureux ou un chum ?	15,1	14,4 (10,8-18,0)
Abusé sexuellement ou violé un amoureux ou un chum ?	2,3	2,7 (1,3-4,0)
L'un ou l'autre	32,3	27,8 (23,4-32,3)
Type de violence subie ou infligée Avez-vous déjà été ou avez-vous déjà...		
Insulté ou abusé verbalement un amoureux ou un chum ?	45,5	41,8 (36,6-46,9)
Déjà frappé, donné une claque ou un coup de pied à un amoureux ou un chum ?	27,8	24,6 (20,2-29,0)
Abusé sexuellement ou violé un amoureux ou un chum ?	12,9	12,3 (9,1-15,6)
L'un ou l'autre	49,5	45,6 (40,5-50,7)

Proportion de données manquantes : 0,1% à 2,2% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Stults CB, Javdani S, Greenbaum CA, Kapadia F, Halkitis PN. Intimate partner violence and substance use risk among young men who have sex with men: the p18 cohort study. Drug and alcohol dependence. 2015;154:54-62.

doi:10.1016/j.drugalcdep.2015.06.008

⁵ Stults CB, Javdani S, Greenbaum CA, Kapadia F, Halkitis PN. Intimate partner violence and substance use risk among young men who have sex with men: the p18 cohort study. Drug and alcohol dependence. 2015;154:54-62.
doi:10.1016/j.drugalcdep.2015.06.008



Violence entre partenaires intimes - calcul des scores

Les participants ayant préféré ne pas répondre à un ou plusieurs des énoncés ont été exclus du calcul. Les participants ayant répondu « oui » à au moins un des énoncés concernant la victimisation ou la perpétration sont considérés comme avoir subi ou infligé de la violence entre partenaires intimes, respectivement. De plus, les participants ayant répondu « oui » à au moins un des 6 énoncés sont considérés comme ayant vécu une expérience de violence entre partenaires intimes, soit subie soit infligée. Le tableau suivant présente la proportion des participants qui ont subi ou infligé de la VPI.

Tableau 59 Violence entre partenaires intimes – Sommaire

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i>		
Violence entre partenaires intimes		
Expériences de violence une fois ou plus à vie	% naj	% aj (IC 95%)
Violence subie de la part d'un partenaire intime	45,8	42,0 (36,9-47,0)
Violence infligée à un partenaire intime	32,3	27,8 (23,4-32,3)
Violence subie OU infligée avec un partenaire intime	49,5	45,6 (40,5-50,7)
Violence subie ET infligée avec un partenaire intime	28,5	24,2 (20,1-28,4)

Proportion de données manquantes : 0,1% à 2,2% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



3.7 Relations sexuelles non-voulues

L'échelle « Relations sexuelles non voulues » (Sexual Coercion Scale, Aalsma & Fortenberry 2002)⁶ vise à mesurer la survenue de relations sexuelles non consentantes dans les populations adolescentes et adultes¹. Elle comprend 4 énoncés. Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants selon la fréquence à laquelle chaque situation est survenue depuis l'âge de 13 ans.

Tableau 60 Relations sexuelles non-voulues

Parmi l'ensemble des participants (n = 1 179)						
Les questions suivantes portent sur les relations sexuelles que vous avez vécues et qui n'étaient pas voulues alors que vous étiez âgé de 13 ans ou plus. Par non-voulues on désigne toute relation sexuelle à laquelle vous n'étiez pas consentant, et ce, même si vous connaissiez la personne impliquée.						
Depuis l'âge de 13 ans,	Jamais		Une fois		Deux fois ou plus	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Combien de fois avez-vous eu une relation sexuelle alors que vous n'en aviez vraiment pas envie ?	47,2	54,1 (48,9-59,3)	12,7	12,8 (9,5-16,0)	40,1	33,1 (28,2-38,0)
Combien de fois quelqu'un a-t-il utilisé à la force physique (p. ex. vous a donné un coup de poings ou vous a immobilisé) pour vous forcer à avoir une relation sexuelle ?	81,3	85,6 (82,0-89,1)	11,4	9,7 (6,8-12,7)	7,2	4,7 (2,4-6,9)
Combien de fois avez-vous eu une relation sexuelle avec quelqu'un parce que vous aviez peur de cette personne ?	85,6	86,3 (82,7-89,8)	7,5	8,0 (5,5-10,4)	7,0	5,8 (3,1-8,5)
Combien de fois quelqu'un a-t-il utilisé à une arme (p. ex. un fusil ou un couteau) pour vous forcer à avoir une relation sexuelle ?	97,2	98,0 (96,9-99,1)	1,4	1,5 (0,5-2,6)	1,4	0,5 (0,1-0,9)

Proportion de données manquantes : 1,9% à 3,1% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Aalsma MC, Zimet GD, Fortenberry JD, Blythe M, Orr DP. Reports of childhood sexual abuse by adolescents and young adults: stability over time. *The journal of sex research*. 2002;39(4):259-263.

Relations sexuelles non-voulues - Calcul des scores

Les participants ayant préféré ne pas répondre à un ou plusieurs des énoncés ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 0 à 3. La fréquence « jamais » équivaut à 0 point, la fréquence « une fois » équivaut à 1 point, et la fréquence « deux fois ou plus » équivaut à 3 points. Le score d'un participant est obtenu en additionnant les points attribués à chacun des énoncés. Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant. Une valeur élevée indique une plus grande fréquence d'expériences de relations sexuelles non voulues.

Tableau 61 Relations sexuelles non-voulues – Sommaire

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)		
Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée ¹ (IC 95%)
0-12	2,3 (2,7)	1,9 (1,6-2,1)

Proportion de données manquantes : 3,1%.

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

⁶ Aalsma MC, Zimet GD, Fortenberry JD, Blythe M, Orr DP. Reports of childhood sexual abuse by adolescents and young adults: stability over time. *The journal of sex research*. 2002;39(4):259-263.



3.8 Compulsivité sexuelle

L'échelle « Compulsivité sexuelle » (The Sexual Compulsivity Scale, Kalichman & Rompa 2001)⁷ vise à mesurer les comportements sexuels compulsifs, l'importance de préoccupations sexuelles, et les pensées sexuellement intrusives. La compulsivité sexuelle est une construction importante dans la description et potentiellement la prédiction de pratiques sexuelles non protégées avec plusieurs partenaires. L'échelle comprend 10 énoncés. Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants selon le degré d'applicabilité perçue de chaque énoncé.

Tableau 62 Compulsivité sexuelle

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Certaines personnes utilisent les énoncés suivants pour se décrire. Lisez chacun d'eux et cochez la réponse qui s'applique le mieux à vous.								
Énoncés	Cela ne me ressemble pas du tout		Cela me ressemble un peu		Cela me ressemble beaucoup		Cela me ressemble vraiment beaucoup	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Il m'arrive de penser au sexe en travaillant.	17,6	22,4 (17,8-27,0)	37,9	40,6 (35,4-45,9)	25,9	20,7 (16,8-24,5)	18,6	16,3 (12,4-20,2)
Je pense au sexe plus souvent que je le voudrais.	41,9	43,6 (38,3-48,9)	30,5	29,8 (25,0-34,7)	17,2	16,3 (12,9-19,8)	10,4	10,2 (6,7-13,8)
Mon appétit sexuel a nui à mes relations.	42,6	45,0 (39,8-50,2)	34,1	31,7 (26,9-36,5)	13,5	14,0 (10,6-17,3)	9,9	9,3 (6,0-12,7)
J'ai l'impression que les pensées et les émotions sexuelles sont plus fortes que moi	49,7	53,2 (47,9-58,4)	29,3	28,7 (24,0-33,4)	14,7	12,1 (9,0-15,2)	6,3	6,0 (3,6-8,4)
Mes pensées et mes comportements sexuels me posent des problèmes	50,7	49,6 (44,3-54,8)	31,4	31,0 (26,1-35,8)	11,6	12,2 (9,0-15,4)	6,3	7,3 (4,1-10,4)
Mon désir d'avoir des relations sexuelles a perturbé mon quotidien.	52,1	53,8 (48,5-59,0)	30,8	29,8 (25,1-34,5)	9,9	7,7 (5,0-10,4)	7,2	8,8 (5,6-12,0)
J'ai de la difficulté à trouver des partenaires sexuels qui ont autant envie que moi d'avoir des relations sexuelles.	55,2	53,1 (47,9-58,4)	24,7	23,1 (18,7-27,6)	11,2	12,2 (9,3-15,0)	9,0	11,6 (7,8-15,4)
Je dois me battre pour rester en contrôle de mes pensées et de mes comportements sexuels.	60,6	59,7 (54,6-64,8)	23,7	22,2 (18,1-26,3)	10,7	12,6 (9,1-16,1)	4,9	5,5 (3,0-8,0)

⁷ Kalichman S, Rompa D. The sexual compulsivity scale: further development and use with hiv-positive persons. Journal of personality assessment. 2001;76(3):379-395.



Il m'arrive d'être tellement excité sexuellement que je pourrais perdre le contrôle de moi-même.	64,0 61,7 (56,6-66,8)	22,3 20,9 (16,6-25,3)	8,5 11,0 (8,1-13,9)	5,3 6,3 (3,5-9,1)
Je n'arrive pas toujours à respecter mes responsabilités et mes engagements à cause de mon comportement sexuel.	64,5 63,4 (58,5-68,3)	22,9 22,2 (18,0-26,4)	7,9 8,6 (6,6-10,7)	4,7 5,8 (3,0-8,6)

Proportion de données manquantes 3,5% à 4,4%, selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Kalichman S, Rompa D. The sexual compulsivity scale: further development and use with hiv-positive persons. Journal of personality assessment. 2001;76(3):379-395.

Compulsivité sexuelle - Calcul des scores

Les énoncés auxquels les participants ont préféré ne pas répondre ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 1 à 4. Le degré « cela ne me ressemble pas du tout » équivaut à 1 point tandis que le degré « cela me ressemble vraiment beaucoup » équivaut à 4 points. Le score d'un participant est obtenu en additionnant les points attribués à chacun des énoncés, et ensuite en divisant par le nombre d'énoncés. Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant. Une valeur élevée indique que les participants ont davantage de compulsivité sexuelle.

Tableau 63 Compulsivité sexuelle – Sommaire

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)		
Compulsivité sexuelle		
Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée ¹ (IC 95%)
1-4	1,8 (0,7)	1,8 (1,7-1,9)

Proportion de données manquantes : 3,5% à 4,4% selon l'item.

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



3.9 Attitudes face à son corps

L'échelle « Attitudes face à son corps » (Male Body Attitudes Scale, Tylka et al. 2005)⁸ vise à apprécier les multiples dimensions des attitudes des hommes envers leur corps. L'échelle originale comprend 29 énoncés (dont 15 ont été inclus au questionnaire Engage) répartis en 3 sous-échelles: musculature, poids corporel et taille corporelle. L'énoncé « Je suis satisfait de la taille de mon pénis » a été ajouté pour l'étude Engage et ne fait pas partie de l'échelle originale. Le tableau suivant présente la fréquence à laquelle les participants pensent à chacun des seize énoncés retenus.

Tableau 64 Attitudes face à son corps

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Les questions suivantes portent sur votre perception de votre corps. Veuillez indiquer la fréquence à laquelle vous pensez à chacun des énoncés suivants.										
Énoncés	Jamais		Rarement		Occasionnellement		Souvent		Toujours	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Je crois que mon corps n'est pas assez musclé.	11,9	13,2 (9,5-16,8)	13,7	16,9 (12,5-21,3)	30,9	31,0 (26,2-35,8)	26,3	22,8 (18,6-27,0)	17,2	16,1 (12,1-20,1)
Je crois que mes jambes ne sont pas assez musclées.	26,5	26,1 (21,6-30,7)	26,6	25,4 (20,4-30,5)	21,1	24,4 (20,0-28,8)	16,6	14,0 (10,7-17,3)	9,1	10,1 (6,9-13,2)
Je crois que mes bras devraient être plus musclés.	12,3	14,2 (10,4-18,0)	14,0	13,2 (9,8-16,7)	28,3	28,9 (24,2-33,6)	27,9	26,0 (21,3-30,7)	17,5	17,6 (13,6-21,7)
J'ai honte de ma musculature.	28,0	30,5 (25,5-35,6)	28,6	26,3 (21,8-30,8)	22,9	21,5 (17,0-26,1)	13,2	14,0 (10,4-17,5)	7,3	7,7 (5,1-10,3)
Je crois que mon dos devrait être plus musclé.	24,9	26,4 (21,5-31,4)	23,2	19,4 (15,7-23,1)	22,7	25,5 (20,9-30,2)	18,5	17,9 (13,9-21,8)	10,6	10,8 (7,4-14,2)
Je crois que ma poitrine devrait être plus musclée.	15,0	15,8 (11,7-19,8)	14,1	12,4 (9,3-15,5)	29,6	32,9 (27,8-38,1)	24,7	20,9 (16,7-25,1)	16,6	18,0 (14,0-22,1)
Je suis satisfait de ma musculature.	7,8	9,8 (6,3-13,3)	25,2	22,8 (18,6-27,0)	28,0	29,4 (24,5-34,3)	22,8	21,3 (16,9-25,7)	16,2	16,7 (12,7-20,7)
Je crois que mon corps devrait être plus maigre.	34,8	33,7 (28,7-38,7)	16,4	15,7 (12,2-19,1)	19,5	18,0 (13,6-22,3)	15,4	15,6 (11,6-19,5)	13,9	17,2 (13,0-21,4)
Je crois que j'ai trop de gras sur mon corps.	32,0	32,6 (27,7-37,5)	16,8	13,9 (10,5-17,4)	20,2	22,6 (17,8-27,3)	15,8	14,4 (10,8-18,1)	15,2	16,5 (12,5-20,4)
Je me sens gros lorsque je mange des sucreries, des gâteaux ou tout autre aliment riche en calories.	37,2	35,7 (30,7-40,8)	16,2	14,5 (10,6-18,4)	18,3	21,8 (17,2-26,4)	15,8	15,4 (11,5-19,3)	12,5	12,6 (9,2-16,0)
Je me sens excessivement gros.	60,1	52,9 (47,6-58,3)	16,5	18,1 (13,9-22,2)	10,5	14,9 (10,6-19,2)	6,1	8,0 (5,1-10,9)	6,7	6,0 (3,8-8,3)

⁸ Tylka TL, Bergeron D, Schwartz JP. Development and psychometric evaluation of the male body attitudes scale (mbas). *Body image*. 2005;2(2):161-175. doi: 10.1016/j.bodyim.2005.03.001



Quand je vois mon reflet (p. ex. dans un miroir ou une fenêtre), je suis mal à l'aise de ma graisse corporelle.	41,7 39,4 (34,2-44,5)	20,3 21,9 (17,6-26,2)	18,1 17,4 (13,1-21,8)	11,4 12,9 (9,1-16,6)	8,5 8,4 (5,7-11,1)
J'aimerais être plus grand.	48,0 46,6 (41,3-51,9)	16,1 15,9 (11,7-20,0)	17,1 17,7 (13,3-22,0)	9,7 8,0 (5,1-10,8)	9,1 11,9 (8,0-15,7)
Je suis satisfait de ma grandeur.	42,2 42,7 (37,5-48,0)	25,7 21,4 (17,1-25,6)	15,1 16,3 (12,2-20,3)	8,8 12,1 (8,6-15,6)	8,3 7,5 (4,6-10,4)
J'ai honte de ma grandeur.	72,5 65,7 (60,4-70,9)	15,9 16,9 (12,7-21,1)	6,6 10,8 (7,7-14,0)	3,5 4,2 (1,5-6,8)	1,4 2,5 (0,4-4,5)
Je suis satisfait de la taille de mon pénis.*	6,3 5,2 (2,9-7,4)	7,7 8,4 (5,2-11,6)	17,3 18,9 (14,7-23,1)	33,2 31,8 (27,0-36,6)	35,4 35,7 (30,4-41,0)

Proportion de données manquantes 4,2% à 6,4% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Énoncé ajouté pour l'étude Engage et ne faisant pas partie de l'échelle originale.

Attitudes face à son corps - Calcul des scores

Les participants ayant préféré ne pas répondre à un ou plusieurs des énoncés ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués varie de 1 à 5 selon la fréquence à laquelle le participant pense à l'énoncé; la fréquence « jamais » équivaut à 1 point tandis que la fréquence « toujours » équivaut à 5 points. Pour les énoncés « Je suis satisfait de ma musculature », « Je suis satisfait de ma grandeur », et « Je suis satisfait de la taille de mon pénis », le calcul du score est inversé. L'énoncé « Je suis satisfait de la taille de mon pénis », n'est pas inclus dans le calcul du score de la taille corporelle et dans celui du score global. Le score d'un participant peut être calculé par sous-échelle ou pour l'ensemble de l'échelle. Les scores moyens de chaque sous-échelle et de l'échelle complète sont inscrits au tableau suivant. Une valeur élevée indique des attitudes corporelles plus négatives.

Tableau 65 Attitudes face à son corps – Sommaire

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)			
Attitudes face à son corps			
(Sous-)échelle	Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée ¹ (IC 95%)
Musculature	7-35	20,4 (6,9)	20,2 (19,5-20,9)
Poids corporel	5-25	11,8 (6,1)	12,2 (11,5-12,8)
Taille corporelle	3-15	5,8 (2,76)	6,0 (5,7-6,4)
Score global	15-75	37,9 (11,8)	38,3 (37,1-39,5)

Proportion de données manquantes : 4,8 à 6,4% selon l'item.

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



4

Consommation de substances



4 Consommation de substances

Tableau 66 Fréquence de la consommation de l'une ou l'autre substance à vie

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé l'une ou l'autre des substances suivantes ? (Usage non-médical seulement).						
Substance	Jamais		Oui, mais il y a plus de 6 mois		Oui, au cours des 6 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Tabac (cigarette, tabac à chiquer, cigare, etc.)	30,3	31,6 (26,4-36,8)	24,2	24,0 (19,9-28,2)	45,5	44,3 (39,1-49,5)
Boissons alcooliques (bière, vin, spiritueux, etc.)	6,7	10,6 (6,5-14,7)	8,2	8,0 (5,1-10,9)	85,1	81,3 (76,6-86,1)
Cannabis (marijuana, pot, herbe, hasch)	23,9	31,9 (26,6-37,2)	21,6	19,2 (15,2-23,2)	54,5	48,9 (43,7-54,1)
Cocaïne	Cocaïne en poudre (coke)		50,9	57,8 (52,7-63,0)	23,1	19,9 (16,1-23,6)
	"crack"		86,2	87,8 (84,4-91,2)	7,9	4,3 (2,1-6,4)
Amphétamines	Ecstasy/MDMA		51,7	59,3 (54,2-64,3)	25,7	23,5 (19,3-27,6)
	Méthamphétamine (crystal meth)		80,6	84,4 (80,6-88,2)	9,1	7,7 (5,3-10,2)
	Méphédronne		95,4	96,3 (94,6-97,9)	2,8	2,1 (1,2-2,9)
	Amphétamines (speed, dexedrine SANS ordonnance, etc.)		64,6	70,7 (66,1-75,3)	20,7	18,3 (14,5-22,2)
	Ritalin, Adderall, Concerta (SANS ordonnance)		82,0	81,4 (77,7-85,2)	10,9	11,3 (8,2-14,3)
Inhalants – Drogues inhalées	Poppers (nitrite d'amyle, nitrite de butyle)		44,1	56,0 (50,8-61,1)	23,9	20,6 (16,8-24,5)
	Protoxyde d'azote (gaz hilarant, oxyde nitreux)		91,1	91,7 (88,9-94,6)	6,6	6,2 (4,1-8,3)
Sédatifs - Anxiolytiques	Benzodiazépines (Valium, Xanax, etc.)		84,2	84,7 (80,9-88,5)	7,2	5,5 (3,2-7,9)
	Barbituriques (tranquillisants)		92,2	92,5 (89,5-95,4)	4,8	3,8 (1,8-5,7)
	GHB (GH, G, gamma hydroxybutyrate)		66,8	76,3 (72,1-80,6)	14,6	11,0 (7,8-14,2)
Hallucinogènes	Kétamine (« K », « special K »)		71,7	78,7 (74,6-82,7)	18,3	15,0 (11,6-18,5)
	Champignons (« champignons magiques », psilocybine, peyotl, etc.)		63,9	68,2 (63,5-72,9)	26,9	24,6 (20,3-28,9)
	LSD (acide)		75,0	76,2 (71,8-80,5)	20,4	19,4 (15,3-23,6)
	Autres hallucinogènes qui ne figurent pas plus haut (2C-B, 2C-I, PCP, MDA ou ayahuasca, etc.)		87,1	89,9 (87,2-92,5)	10,4	8,2 (5,9-10,6)
Opioides	Héroïne		95,2	94,8 (92,0-97,5)	3,2	2,2 (0,5-3,9)
	Morphine		90,7	91,8 (88,7-94,9)	6,3	4,8 (2,7-7,0)
	Codeine		86,8	88,6 (85,4-91,7)	10,0	8,2 (5,4-10,9)
	Oxycodone (Oxycontin, Percocet, etc.)		90,0	91,2 (88,2-94,1)	7,1	6,2 (3,8-8,7)
	Autres opiacés (Dilaudid, Fentanyl, etc.)		91,7	93,0 (90,2-95,7)	5,0	4,7 (2,4-6,9)
Médicaments contre la dysfonction érectile	Viagra, Cialis, Levitra (SANS ordonnance)		73,2	80,6 (76,5-84,6)	10,7	8,6 (5,3-11,8)
	Viagra, Cialis, Levitra (sur ordonnance)		84,2	89,3 (86,5-92,2)	5,0	2,7 (1,5-3,9)
Stéroïdes	Stéroïdes (SANS ordonnance)		96,4	95,8 (93,7-97,9)	2,3	1,5 (0,2-2,8)
	Stéroïdes (sur ordonnance)		97,3	98,1 (96,7-99,5)	1,4	1,3 (0,0-2,6)
Autres drogues	Autres drogues sur ordonnance		92,2	94,0 (91,7-96,3)	0,6	0,2 (0,0-0,5)
	Autres drogues sans ordonnance		96,9	97,3 (95,5-99,1)	0,5	0,5 (0,0-1,4)

Proportion de données manquantes : de 1,7% à 7,2% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Test de dépistage de la consommation d'alcool, de tabac et de drogues

Le test ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test [ASSIST], Humeniuk et al. 2008)⁹ est un outil de dépistage internationalement entériné pour détecter le risque de dépendance et d'effets nuisibles associés à la consommation d'alcool, de tabac ou de drogues. Le test permet de distinguer entre la consommation simple, l'abus, et la dépendance. La version 3.0, qui est incluse au questionnaire Engage, comprend une série de 8 questions posées pour chacune des catégories de substances suivantes (cliquer sur les énoncés pour accéder aux tableaux correspondants):

- [Tabac \(cigarette, tabac à chiquer, cigare, etc.\)](#)
- [Boissons alcoolisées \(bière, vin, spiritueux, etc.\)](#)
- [Cannabis \(marijuana, pot, herbe, hasch, etc.\)](#)
- [Cocaïne \(en poudre, crack\)](#)
- [Amphétamines \(speed, dexedrine SANS prescription, etc.\)](#)
- [Drogues inhalées \(poppers, nitrite d'amyle, protoxyde d'azote, gaz hilarant, etc.\)](#)
- [Sédatifs – anxiolytiques \(Valium, Xanax, GHB, barbituriques etc.\)](#)
- [Hallucinogènes \(Kétamine, champignons magiques, LSD, etc.\)](#)
- [Opioides \(héroïne, morphine, codéine, etc.\)](#)

Les tableaux suivants présentent la répartition des réponses des participants à chacun des énoncés et selon le type de substance. Le calcul du score pour l'évaluation de risques et la mesure du risque de dépendance est présenté dans la section 4.12.

⁹ Humeniuk RE, Ali RA, Babor TF, Farrell M, Formigoni ML, Jittiwutikarn J, Boerngen de Larcera R, Ling W, Marsden J, Monteiro M, Nhiwhatiwa S, Pal H, Poznyak V & Simon S (2008). Validation of the Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST). *Addiction* 103(6): 1039-1047



4.1 Tabac

Tableau 67 Fréquence de la consommation de tabac à vie

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé du tabac (cigarette, tabac à chiquer, cigare, etc.) ? (Usage non-médical seulement).		
Historique de la consommation du tabac à vie	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais	30,3	31,6 (26,4-36,8)
Oui, mais il y a plus de 6 mois	24,2	24,0 (19,9-28,2)
Ou, au cours des 6 derniers mois	45,5	44,3 (39,1-49,5)

Proportion de données manquantes : 2,2%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 68 Fréquence de la consommation de tabac au cours des six derniers mois

<i>Parmi ceux qui ont dit avoir consommé du au cours des 6 derniers mois (n = 525)</i> Au cours des six derniers mois, combien de fois avez-vous consommé du tabac ?		
Fréquence de consommation	% naj	% aj (IC 95%)
Une ou deux fois	12,5	12,4 (6,7-18,0)
Au moins 1 fois par mois	12,3	15,8 (10,1-21,4)
Au moins 1 fois par semaine	14,6	14,8 (8,8-20,8)
À tous les jours ou presque	60,7	57,0 (49,0-65,1)

Proportion de données manquantes : 2,1%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).


Tableau 69 Mesure de la consommation de tabac selon l'échelle ASSIST : section 1

Parmi ceux qui ont consommé du tabac au cours des six derniers mois (n=525)										
Mesure de la consommation de tabac selon l'échelle ASSIST (section 1)										
Au cours des trois derniers mois, Combien de fois	Jamais		Une ou deux fois		Au moins 1 fois par mois		Au moins 1 fois par semaine		À tous les jours ou presque	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Avez-vous consommé du tabac ?	3,5	3,7 (0,0-7,3)	12,8	13,3 (7,6-19,0)	9,9	13,8 (8,6-19,1)	14,3	15,3 (9,7-20,9)	59,6	53,9 (45,9-62,0)
Avez-vous eu une forte envie ou un besoin incontrôlable de consommer du tabac ?	24,4	30,6 (23,4-37,9)	8,6	7,8 (4,3-11,3)	4,0	4,1 (1,6-6,7)	11,1	10,8 (6,3-15,4)	51,8	46,6 (38,7-54,6)
Avez-vous eu des problèmes sociaux, juridiques, financiers ou de santé à cause du tabac ?	81,0	81,1 (75,5-86,6)	6,4	6,9 (3,7-10,1)	2,5	1,1 (0,0-2,3)	2,7	4,1 (2,0-6,3)	7,4	6,8 (2,6-11,0)

Proportion de données manquantes : 0,8% à 1,5% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 70 Mesure de la consommation de tabac selon l'échelle ASSIST : section 2

Parmi ceux qui ont consommé du tabac au cours des six derniers mois (n=525)						
Mesure de la consommation de tabac selon l'échelle ASSIST (section 2)						
	Non, jamais		Oui, mais pas dans les derniers 3 mois		Oui, au cours des 3 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Est-ce qu'un ami, un proche ou quelqu'un d'autre vous a déjà dit qu'il ou elle était préoccupée(e) par votre consommation de tabac ?	55,2	59,8 (52,2-67,4)	11,2	7,1 (4,8-9,5)	33,7	33,1 (25,6-40,5)
Avez-vous déjà essayé sans succès de contrôler, diminuer ou cesser votre consommation de tabac ?	40,6	45,5 (37,6-53,3)	24,9	18,7 (13,2-24,1)	34,6	35,8 (28,1-43,6)

Proportion de données manquantes : 2,7% à 4,2% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



4.2 Alcool

Tableau 71 Consommation d'alcool à vie

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé des boissons alcooliques (bière, vin, spiritueux, etc.) ? (Usage non-médical seulement.)		
Historique de la consommation d'alcool à vie	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais	6,7	10,6 (6,5-14,7)
Oui, mais il y a plus de 6 mois	8,2	8,0 (5,1-10,9)
Ou, au cours des 6 derniers mois	85,1	81,3 (76,6-86,1)

Proportion de données manquantes : 1,7%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 72 Fréquence de la consommation d'alcool au cours des six derniers mois

<i>Parmi ceux qui ont consommé de l'alcool les 6 derniers mois (N = 986)</i> Au cours des six derniers mois, combien de fois avez-vous consommé de l'alcool ?		
Fréquence de consommation d'alcool	% naj	% aj (IC 95%)
Une ou deux fois	7,2	9,3 (5,9-12,7)
Au moins 1 fois par mois	17,7	19,4 (15,1-23,6)
Au moins 1 fois par semaine	56,7	56,8 (51,3-62,3)
À tous les jours ou presque	18,4	14,5 (10,5-18,5)

Proportion de données manquantes : 1,1%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



L'échelle « Troubles liés à la consommation d'alcool » (AUDIT-C, Bradley et al. 2007)¹⁰ permet d'identifier les individus qui ont des troubles actuels de consommation d'alcool (incluant la dépendance). Elle comprend 3 énoncés. Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants à chacun des énoncés.

Tableau 73 Troubles liés à la consommation d'alcool (Fréquence habituelle de consommation d'alcool, AUDIT-C)

<i>Parmi l'ensemble des participants (n = 1 179)</i>		
Fréquence de consommation d'alcool		
À quelle fréquence consommez-vous des boissons alcoolisées ?	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais	10,5	13,7 (9,4-17,9)
Une fois par mois ou moins	15,7	18,3 (14,5-22,1)
2 à 4 fois par mois	30,2	30,9 (25,9-35,9)
2 à 3 fois par semaine	26,7	24,5 (20,3-28,8)
4 fois par semaine ou plus	16,9	12,6 (9,2-16,0)
Combien de verres de boissons alcoolisées consommez-vous un jour typique où vous buvez ?		
1 ou 2	41,2	43,1 (37,7-48,5)
3 ou 4	35,8	33,3 (28,1-38,6)
5 ou 6	16,5	15,9 (12,0-19,7)
7 à 9	4,9	5,2 (2,1-8,4)
10 ou plus	1,5	2,5 (0,3-4,6)
À quelle fréquence consommez-vous 6 verres ou plus de boissons alcoolisées lors d'une même occasion ?		
Jamais	28,7	30,2 (25,3-35,1)
Une fois par mois ou moins	33,5	34,1 (28,9-39,4)
2 à 4 fois par mois	18,6	18,6 (14,2-23,1)
2 à 3 fois par semaine	16,4	15,0 (10,6-19,3)
4 fois par semaine ou plus	2,7	2,1 (1,0-3,2)

Proportion de données manquantes : 2,0% à 12,6% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Bradley KA, DeBenedetti AF, Volk RJ, Williams EC, Frank D, Kivlahan DR. Audit-c as a brief screen for alcohol misuse in primary care. Alcoholism: clinical and experimental research. 2007;31(7):1208-1217. doi:10.1111/j.1530-0277.2007.00403.x

¹⁰ Bradley KA, DeBenedetti AF, Volk RJ, Williams EC, Frank D, Kivlahan DR. Audit-c as a brief screen for alcohol misuse in primary care. Alcoholism: clinical and experimental research. 2007;31(7):1208-1217. doi:10.1111/j.1530-0277.2007.00403.x



Troubles liés à la consommation d'alcool (AUDIT-C) - Calcul des scores

Les participants ayant préféré ne pas répondre à un ou plusieurs des énoncés ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 0 à 4 comme suit :

1. À quelle fréquence consommez-vous des boissons alcoolisées ?

Jamais (0 point), une fois par mois ou moins (1 point), 2 à 4 fois par mois (2 points), 2 à 3 fois par semaine (3 points), 4 fois par semaine ou plus (4 points).

2. Combien de verres de boissons alcoolisées consommez-vous un jour typique où vous buvez ?

1 ou 2 (0 point), 3 ou 4 (1 point), 5 ou 6 (2 points), 7 à 9 (3 points), 10 ou plus (4 points).

3. À quelle fréquence consommez-vous 6 verres ou plus de boissons alcoolisées lors d'une même occasion ?

Jamais (0 point), une fois par mois ou moins (1 point), 2 à 4 fois par mois (2 points), 2 à 3 fois par semaine (3 points), 4 fois par semaine ou plus (4 points). Les réponses à cette question ont été légèrement modifiées dans la traduction française (une traduction mot à mot aurait produit les valeurs suivantes : jamais, une fois par mois ou moins, mensuellement, hebdomadaire, tous les jours ou presque). Le score d'un participant est obtenu en additionnant les points attribués à chacun des énoncés de l'échelle, il varie de 0 à 12. Un score de 0 reflète l'absence de consommation d'alcool. Chez les hommes, un score de 4 ou plus signifie un risque accru de consommation alarmante d'alcool d'abus actif d'alcool ou de dépendance. En général, plus le score est élevé, plus il est probable que la consommation d'alcool de l'individu affecte sa santé et sa sécurité.

Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant. Étant donné que l'échelle AUDIT-C utilisée dans l'étude Engage a été modifiée, les résultats observés ne peuvent pas être directement comparés à ceux d'autres études ayant appliqué l'échelle AUDIT-C d'origine.

Tableau 74 Troubles liés à la consommation d'alcool (AUDIT-C) – Sommaire

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)		
Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée ¹ (IC 95%)
0-12	4,7 (2,4)	4,5 (4,2-4,8)

Proportion de données manquantes : 13,4%.

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)


Tableau 75 Mesure de la consommation d'alcool selon l'échelle ASSIST : section 1

Parmi ceux qui ont consommé de l'alcool au cours des six derniers mois (n=986)										
Mesure de la consommation d'alcool selon l'échelle ASSIST (section 1)										
	Jamais		Une ou deux fois		Au moins 1 fois par mois		Au moins 1 fois par semaine		À tous les jours ou presque	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous consommé de l'alcool ?	1,7	1,7 (0,7-2,6)	7,7	9,8 (6,3-13,2)	16,5	16,1 (12,0-20,3)	55,5	57,4 (51,9-63,0)	18,6	15,0 (11,0-19,0)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu une forte envie ou un besoin incontrôlable de consommer de l'alcool ?	44,3	37,8 (32,5-43,1)	13,4	19,1 (14,9-23,4)	8,3	9,8 (6,4-13,2)	23,6	23,6 (18,8-28,4)	10,4	9,7 (6,2-13,3)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu des problèmes sociaux, juridiques, financiers ou de santé à cause de l'alcool ?	82,9	80,8 (76,4-85,1)	8,2	10,1 (7,1-13,1)	3,9	4,8 (2,0-7,5)	3,1	2,5 (1,4-3,6)	1,9	1,8 (0,0-3,9)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois VOUS n'avez pas pu faire ce qui était normalement attendu de vous à cause de votre consommation d'alcool ?	79,7	77,4 (72,9-81,9)	13,6	15,3 (11,5-19,1)	3,1	4,2 (1,9-6,5)	2,7	2,6 (0,7-4,4)	1,0	0,6 (0,4-0,8)

Proportion de données manquantes : 0,5% à 1,5% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 76 Mesure de la consommation d'alcool selon l'échelle ASSIST : section 2

Parmi ceux qui ont consommé de l'alcool les 6 derniers mois (n = 986)						
Mesure de la consommation d'alcool selon l'échelle ASSIST (section 2)						
	Non, jamais		Oui, mais pas dans les derniers 3 mois		Oui, au cours des 3 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Est-ce qu'un ami, un proche ou quelqu'un d'autre vous a déjà dit qu'il ou elle était préoccupé(e) par votre consommation d'alcool ?	78,7	78,4 (73,9-83,0)	9,5	8,1 (4,9-11,3)	11,8	13,4 (9,8-17,0)
Avez-vous déjà essayé sans succès de contrôler, diminuer ou cesser votre consommation d'alcool ?	74,6	74,3 (69,2-79,4)	9,0	7,7 (5,0-10,4)	16,4	18,0 (13,2-22,7)

Proportion de données manquantes : 2,0% à 2,8% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



4.3 Cannabis

Tableau 77 Consommation de cannabis à vie

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé le cannabis (marijuana, pot, herbe, hasch) ? (Usage non-médical seulement).		
Historique de la consommation de cannabis à vie	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais	23,9	31,9 (26,6-37,2)
Oui, mais il y a plus de 6 mois	21,6	19,2 (15,2-23,2)
Ou, au cours des 6 derniers mois	54,5	48,9 (43,7-54,1)

Proportion de données manquantes : 1,9%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 78 Fréquence de la consommation de cannabis au cours des six derniers mois

<i>Parmi ceux qui ont consommé le cannabis durant les 6 derniers mois (n=631)</i> Au cours des six derniers mois, combien de fois avez-vous consommé du cannabis ?		
Fréquence de consommation	% naj	% aj (IC 95%)
Une ou deux fois	29,8	30,1 (23,1-37,1)
Au moins 1 fois par mois	23,7	22,0 (16,7-27,3)
Au moins 1 fois par semaine	20,6	22,9 (16,9-28,8)
À tous les jours ou presque	25,9	25,0 (18,9-31,1)

Proportion de données manquantes : 2,2%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).


Tableau 79 Mesure de la consommation de cannabis selon l'échelle ASSIST : section 1

Parmi ceux qui ont consommé du cannabis au cours des six derniers mois (n=631)										
Mesure de consommation de cannabis selon l'échelle ASSIST (section 1)										
	Jamais		Une ou deux fois		Au moins 1 fois par mois		Au moins 1 fois par semaine		À tous les jours ou presque	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous consommé du cannabis ?	6,9	8,2 (4,8-11,6)	30,0	31,8 (24,9-38,6)	18,1	16,9 (12,0-21,8)	19,5	18,4 (13,4-23,5)	25,6	24,7 (18,7-30,7)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu une forte envie ou un besoin incontrôlable de consommer du cannabis ?	50,4	47,2 (40,3-54,1)	11,2	13,7 (7,9-19,6)	6,7	5,8 (3,1-8,4)	12,4	13,4 (8,8-18,1)	19,3	19,9 (14,7-25,0)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu des problèmes sociaux, juridiques, financiers ou de santé à cause du cannabis ?	84,7	83,1 (78,7-87,4)	7,7	6,5 (4,2-8,8)	2,4	2,8 (0,8-4,8)	1,9	4,8 (2,8-6,7)	3,2	2,9 (0,3-5,5)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois vous n'avez pas pu faire ce qui était normalement attendu de vous à cause de votre consommation de cannabis ?	82,6	81,4 (76,9-86,0)	10,9	9,7 (6,7-12,6)	1,8	3,4 (1,0-5,7)	2,9	4,2 (1,4-7,1)	1,9	1,3 (0,8-1,8)

Proportion de données manquantes : 0,6% à 1,4% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 80 Mesure de la consommation de cannabis selon l'échelle ASSIST : section 2

Parmi ceux qui ont consommé du cannabis au cours des six derniers mois (n=631)						
Mesure de la consommation de cannabis selon l'échelle ASSIST (section 2)						
	Non, jamais		Oui, mais pas dans les derniers 3 mois		Oui, au cours des 3 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Est-ce qu'un ami, un proche ou quelqu'un d'autre vous a déjà dit qu'il ou elle était préoccupé(e) par votre consommation de cannabis ?	78,1	74,5 (68,3-80,6)	10,7	11,6 (7,5-15,7)	11,2	14,0 (8,8-19,2)
Avez-vous déjà essayé sans succès de contrôler, diminuer ou cesser votre consommation de cannabis ?	71,3	69,5 (62,9-76,1)	12,0	13,0 (8,5-17,5)	16,7	17,5 (11,7-23,3)

Proportion de données manquantes : 2,2% à 3,3% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



4.4 Cocaïne

Tableau 81 Consommation de cocaïne à vie

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé de la cocaïne ou du "crack" ? (usage non-médical seulement)						
	Jamais		Oui, mais il y a plus de 6 mois		Oui, au cours des 6 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Cocaïne	50,9	57,8 (52,7-63,0)	23,1	19,9 (16,1-23,6)	26,0	22,3 (18,0-26,6)
"crack"	86,2	87,8 (84,4-91,2)	7,9	4,3 (2,1-6,4)	5,8	8,0 (5,2-10,8)

Proportion de données manquantes : 2,6% à 2,7% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 82 Fréquence de la consommation de cocaïne au cours des six derniers mois

<i>Parmi ceux qui ont consommé de la cocaïne ou du « crack » durant les 6 derniers mois (n = 319)</i> Au cours des six derniers mois, combien de fois avez-vous consommé de la cocaïne ou du "crack" ?		
Fréquence de consommation	% naj	% aj (IC 95%)
Une ou deux fois	48,3	45,9 (35,1-56,8)
Au moins 1 fois par mois	30,7	28,0 (18,0-38,0)
Au moins 1 fois par semaine	16,7	20,5 (12,4-28,5)
À tous les jours ou presque	4,3	5,6 (1,7-9,5)

Proportion de données manquantes : 6%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).


Tableau 83 Mesure de la consommation de cocaïne selon l'échelle ASSIST : section 1

Parmi ceux qui ont consommé de la cocaïne au cours des six derniers mois (n=319)										
Mesure de la consommation de cocaïne selon l'échelle ASSIST (section 1)										
	Jamais		Une ou deux fois		Au moins 1 fois par mois		Au moins 1 fois par semaine		À tous les jours ou presque	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous consommé de la cocaïne ?	13,4	12,7 (6,4-18,9)	39,3	36,2 (25,8-46,6)	24,3	25,4 (17,4-33,4)	18,2	19,9 (12,1-27,7)	4,8	5,8 (1,8-9,9)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu une forte envie ou un besoin incontrôlable de consommer de la cocaïne ?	56,9	53,0 (42,9-63,1)	15,7	17,5 (8,2-26,8)	10,1	12,5 (8,5-16,6)	10,1	12,6 (5,2-20,0)	7,2	4,4 (0,9-7,8)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu des problèmes sociaux, juridiques, financiers ou de santé à cause de la cocaïne ?	80,8	76,4 (68,0-84,9)	8,6	10,2 (3,3-17,1)	4,8	8,2 (6,5-9,8)	3,2	3,4 (0,0-8,8)	2,6	1,8 (0,0-3,6)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois VOUS n'avez pas pu faire ce qui était normalement attendu de vous à cause de votre consommation de la cocaïne ?	77,9	68,6 (58,6-78,6)	14,5	15,2 (6,7-23,8)	2,8	9,6 (4,3-14,9)	2,5	5,5 (0,1-10,9)	2,2	1,1 (0,2-2,0)

Proportion de données manquantes : 0,3% à 1,9% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 84 Mesure de la consommation de cocaïne selon l'échelle ASSIST : section 2

Parmi ceux qui ont consommé de la cocaïne au cours des six derniers mois (n=319)						
Mesure de la consommation de la cocaïne selon l'échelle ASSIST (section 2)						
	Non, jamais		Oui, mais pas dans les derniers 3 mois		Oui, au cours des 3 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Est-ce qu'un ami, un proche ou quelqu'un d'autre vous a déjà dit qu'il ou elle était préoccupé(e) par votre consommation de cocaïne ?	69,9	66,6 (57,4-75,8)	7,4	3,5 (1,5-5,4)	22,8	29,9 (20,8-39,1)
Avez-vous déjà essayé sans succès de contrôler, diminuer ou cesser votre consommation de cocaïne ?	69,5	74,5 (65,4-83,6)	9,4	6,8 (2,0-11,6)	21,1	18,7 (10,4-27,0)

Proportion de données manquantes : 2,2% à 6,6% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



4.5 Amphétamines

Tableau 85 Consommation d'amphétamines à vie

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)
Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé l'une ou l'autre des substances suivantes ? (Usage non-médical seulement.)

Amphétamines	Jamais		Oui, mais il y a plus de 6 mois		Oui, au cours des 6 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Ecstasy	51,7	59,3 (54,2-64,3)	25,7	23,5 (19,3-27,6)	22,6	17,3 (13,7-20,9)
Crystal	80,6	84,4 (80,6-88,2)	9,1	7,7 (5,3-10,2)	10,3	7,9 (4,7-11,0)
Mephedrone	95,4	96,3 (94,6-97,9)	2,8	2,1 (1,2-2,9)	1,8	1,6 (0,2-3,0)
Speed	64,6	70,7 (66,1-75,3)	20,7	18,3 (14,5-22,2)	14,8	10,9 (7,8-14,1)
Ritalin	82,0	81,4 (77,7-85,2)	10,9	11,3 (8,2-14,3)	7,1	7,3 (4,9-9,7)

Proportion de données manquantes : 2,3% à 4,0% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 86 Fréquence de la consommation d'amphétamines au cours des six derniers mois

Parmi ceux qui ont consommé des amphétamines les 6 derniers mois (n = 369)
Au cours des six derniers mois, combien de fois avez-vous consommé des amphétamines ?

Fréquence de consommation	% naj	% aj (IC 95%)
Une ou deux fois	54,4	62,4 (53,2-71,6)
Au moins 1 fois par mois	28,1	20,5 (12,4-28,6)
Au moins 1 fois par semaine	12,0	12,9 (7,5-18,3)
À tous les jours ou presque	5,6	4,2 (1,6-6,7)

Proportion de données manquantes : 7,3%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).


Tableau 87 Mesure de la consommation d'amphétamines selon l'échelle ASSIST : section 1

Parmi ceux qui ont consommé des amphétamines au cours des six derniers mois (n=369)										
Mesure de la consommation d'amphétamines selon l'échelle ASSIST (section 1)										
	Jamais		Une ou deux fois		Au moins 1 fois par mois		Au moins 1 fois par semaine		À tous les jours ou presque	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous consommé des'amphétamines ?	19,1	18,4 (10,6-26,2)	42,1	43,4 (34,0-52,8)	23,0	24,3 (15,2-33,3)	11,1	11,1 (6,6-15,7)	4,7	2,8 (1,5-4,1)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu une forte envie ou un besoin incontrôlable de consommer des amphétamines ?	58,6	51,7 (42,3-61,2)	15,5	18,0 (10,8-25,3)	10,4	11,0 (3,4-18,6)	10,4	13,6 (7,8-19,4)	5,2	5,7 (2,4-9,0)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu des problèmes sociaux, juridiques, financiers ou de santé à cause de votre consommation d'amphétamines ?	82,1	78,9 (71,4-86,4)	9,9	12,1 (8,1-16,0)	2,5	2,3 (0,0-7,2)	2,5	3,4 (0,0-7,4)	3,0	3,3 (0,0-6,8)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois vous n'avez pas pu faire ce qui était normalement attendu de vous à cause de votre consommation d'amphétamines ?	80,9	75,8 (67,8-83,8)	11,7	13,9 (9,0-18,9)	2,5	6,0 (0,0-12,5)	2,7	2,6 (0,0-6,0)	2,2	1,7 (0,5-2,8)

Proportion de données manquantes : 0,5% à 2,2% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 88 Mesure de la consommation d'amphétamines selon l'échelle ASSIST : section 2

Parmi ceux qui ont consommé des amphétamines au cours des six derniers mois (n=369)						
Mesure de la consommation d'amphétamines selon l'échelle ASSIST (section 2)						
	Non, jamais		Oui, mais pas dans les derniers 3 mois		Oui, au cours des 3 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Est-ce qu'un ami, un proche ou quelqu'un d'autre vous a déjà dit qu'il ou elle était préoccupé(e) par votre consommation d'amphétamines ?	69,3	70,9 (62,9-78,9)	11,9	10,3 (4,7-16,0)	18,8	18,8 (12,4-25,2)
Avez-vous déjà essayé sans succès de contrôler, diminuer ou cesser votre consommation d'amphétamines ?	70,7	67,5 (58,3-76,8)	12,8	12,9 (7,1-18,7)	16,5	19,6 (11,1-28,1)

Proportion de données manquantes : 2,2% à 4,6% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



4.6 Drogues inhalées

Tableau 89 Consommation de drogues inhalées à vie

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé l'une ou l'autre des substances suivantes ? (Usage non-médical seulement)						
Drogue inhalée	Jamais		Oui, mais il y a plus de 6 mois		Oui, au cours des 6 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Poppers (nitrite d'amyle, nitrite de butyle)	44,1	56,0 (50,8-61,1)	23,9	20,6 (16,8-24,5)	32,0	23,4 (19,2-27,6)
Protoxyde d'azote (gaz hilarant, oxyde nitreux)	91,1	91,7 (88,9-94,6)	6,6	6,2 (4,1-8,3)	2,4	2,0 (0,0-4,1)

Proportion de données manquantes : 2,3% à 3,1% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 90 Fréquence de la consommation de drogues inhalées au cours des six derniers mois

<i>Parmi ceux qui ont consommé des drogues inhalées au cours des six derniers mois (n = 377)</i> Au cours des six derniers mois, combien de fois avez-vous consommé des drogues inhalées ?		
Fréquence de consommation	% naj	% aj (IC 95%)
Une ou deux fois	44,4	43,8 (34,5-53,2)
Au moins 1 fois par mois	33,3	36,6 (27,3-46,0)
Au moins 1 fois par semaine	20,3	18,4 (10,4-26,5)
À tous les jours ou presque	1,9	1,1 (0,2-1,9)

Proportion de données manquantes : 3,5%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).


Tableau 91 Mesure de la consommation de drogues inhalées selon l'échelle ASSIST : section 1

Parmi ceux qui ont consommé des drogues inhalées au cours des six derniers mois (n=377)										
Mesure de la consommation de drogues inhalées selon l'échelle ASSIST (section 1)										
	Jamais		Une ou deux fois		Au moins 1 fois par mois		Au moins 1 fois par semaine		À tous les jours ou presque	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous consommé des drogues inhalées ?	13,2	14,4 (7,1-21,7)	35,3	35,6 (26,6-44,5)	28,3	30,7 (21,9-39,5)	21,6	18,4 (11,1-25,6)	1,6	0,9 (0,1-1,7)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu une forte envie ou un besoin incontrôlable de consommer des drogues inhalées ?	65,8	67,2 (58,2-76,2)	16,6	13,1 (7,9-18,3)	8,3	11,9 (4,3-19,6)	7,8	6,9 (2,0-11,7)	1,6	0,9 (0,0-2,6)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu des problèmes sociaux, juridiques, financiers ou de santé à cause de votre consommation de drogues inhalées ?	93,0	93,7 (88,1-99,3)	3,2	1,9 (0,5-3,4)	2,4	3,2 (0,0-8,2)	1,1	1,1 (0,0-3,4)	0,3	0,1 (0,0-0,1)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois vous n'avez pas pu faire ce qui était normalement attendu de vous à cause de votre consommation de drogues inhalées ?	94,9	94,9 (89,4-100,0)	2,7	1,6 (0,4-2,8)	1,6	2,7 (0,0-7,7)	0,8	0,8 (0,0-3,1)	0,0	s.o.

Proportion de données manquantes : 0.8% à 1.6% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.

Tableau 92 Mesure de la consommation de drogues inhalées selon l'échelle ASSIST : section 2

Parmi ceux qui ont consommé des drogues inhalées au cours des six derniers mois (n=377)						
Mesure de la consommation de drogues inhalées selon l'échelle ASSIST (section 2)						
	Non, jamais		Oui, mais pas dans les derniers 3 mois		Oui, au cours des 3 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Est-ce qu'un ami, un proche ou quelqu'un d'autre vous a déjà dit qu'il ou elle était préoccupé(e) par votre consommation de drogues inhalées ?	95,1	96,0 (94,3-97,7)	1,6	1,2 (0,4-2,0)	3,3	2,8 (1,4-4,2)
Avez-vous déjà essayé sans succès de contrôler, diminuer ou cesser votre consommation de drogues inhalées ?	88,7	89,1 (82,5-95,6)	3,9	3,4 (1,4-5,3)	7,5	7,6 (1,2-14,0)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



4.7 Sédatifs - Anxiolytiques

Tableau 93 Consommation de sédatifs -anxiolytiques à vie

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé l'une ou l'autre des substances suivantes ? (Usage non-médical seulement)						
Sédatif - Anxiolytique	Jamais		Oui, mais il y a plus de 6 mois		Oui, au cours des 6 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Benzodiazépines (Valium, Xanax, etc.)	84,2	84,7 (80,9-88,5)	7,2	5,5 (3,2-7,9)	8,6	9,8 (6,7-12,9)
Barbituriques (tranquillisants)	92,2	92,5 (89,5-95,4)	4,8	3,8 (1,8-5,7)	3,0	3,8 (1,5-6,1)
GHB (GH, G, gamma hydroxybutyrate)	66,8	76,3 (72,1-80,6)	14,6	11,0 (7,8-14,2)	18,5	12,7 (9,6-15,7)

Proportion de données manquantes : 2,1% à 3,3% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 94 Fréquence de la consommation de sédatifs - anxiolytiques au cours des six derniers mois

<i>Parmi ceux qui ont consommé des sédatifs ou somnifères au cours des six derniers mois (n = 283)</i> Au cours des six derniers mois, combien de fois avez-vous consommé des sédatifs - anxiolytiques ?		
Fréquence de consommation	% naj	% aj (IC 95%)
Une ou deux fois	45,5	56,3 (44,8-67,8)
Au moins 1 fois par mois	23,2	12,2 (5,2-19,2)
Au moins 1 fois par semaine	20,5	17,5 (9,5-25,5)
À tous les jours ou presque	10,9	14,0 (6,5-21,5)

Proportion de données manquantes : 22,3%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).


Tableau 95 Mesure de la consommation de sédatifs - anxiolytiques selon l'échelle ASSIST : section 1

Parmi ceux qui ont consommé des sédatifs ou somnifères au cours des six derniers mois (n=283)										
Mesure de la consommation de sédatifs - anxiolytiques selon l'échelle ASSIST (section 1)										
	Jamais		Une ou deux fois		Au moins 1 fois par mois		Au moins 1 fois par semaine		À tous les jours ou presque	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous consommé des sédatives ou somnifères ?	30,1	32,9 (22,3-43,6)	27,5	29,2 (18,7-39,6)	18,1	11,5 (4,6-18,4)	14,1	13,6 (6,7-20,5)	10,1	12,8 (6,0-19,6)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu une forte envie ou un besoin incontrôlable de consommer des sédatives ou somnifères ?	67,5	72,4 (64,1-80,7)	11,1	7,5 (3,6-11,5)	4,6	7,8 (2,1-13,4)	9,6	5,1 (1,1-9,2)	7,1	7,2 (4,0-10,3)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu des problèmes sociaux, juridiques, financiers ou de santé à cause des sédatives ou somnifères ?	90,3	91,7 (87,9-95,6)	6,1	6,5 (3,4-9,7)	1,4	0,4 (0,0-1,4)	1,4	0,8 (0,0-1,8)	0,7	0,4 (0,0-2,0)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois VOUS n'avez pas pu faire ce qui était normalement attendu de vous à cause de votre consommation de sédatives ou somnifères ?	94,3	92,3 (88,5-96,2)	3,2	2,2 (0,1-4,3)	0,7	0,4 (0,0-1,1)	1,1	4,3 (1,6-7,1)	0,7	0,8 (0,0-2,3)

Proportion de données manquantes : 1.1% à 2.5% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 96 Mesure de la consommation de sédatifs - anxiolytiques selon l'échelle ASSIST : section 2

Parmi ceux qui ont consommé des sédatifs ou somnifères au cours des six derniers mois (n=283)						
Mesure de la consommation de sédatifs - anxiolytiques selon l'échelle ASSIST (section 2)						
	Non, jamais		Oui, mais pas dans les derniers 3 mois		Oui, au cours des 3 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Est-ce qu'un ami, un proche ou quelqu'un d'autre vous a déjà dit qu'il ou elle était préoccupé(e) par votre consommation de sédatives ou somnifères ?	85,8	88,8 (84,1-93,5)	5,1	3,5 (1,7-5,2)	9,1	7,7 (3,5-11,9)
Avez-vous déjà essayé sans succès de contrôler, diminuer ou cesser votre consommation de sédatives ou somnifères ?	86,8	89,6 (83,4-95,9)	5,3	6,1 (0,4-11,8)	7,9	4,3 (1,6-6,9)

Proportion de données manquantes : 3.2% à 6% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



4.8 Hallucinogènes

Tableau 97 Consommation d'hallucinogènes à vie

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé l'une ou l'autre des substances suivantes ? (Usage non-médical seulement).						
Hallucinogènes	Jamais		Oui, mais il y a plus de 6 mois		Oui, au cours des 6 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Kétamine (« K », « special K »)	71,7	78,7 (74,6-82,7)	18,3	15,0 (11,6-18,5)	10,0	6,3 (3,8-8,8)
Champignons (« champignons magiques », psilocybine, peyotl, etc.)	63,9	68,2 (63,5-72,9)	26,9	24,6 (20,3-28,9)	9,2	7,2 (4,8-9,6)
LSD (acide)	75,0	76,2 (71,8-80,5)	20,4	19,4 (15,3-23,6)	4,6	4,4 (2,8-6,0)
Autres hallucinogènes qui ne figurent pas plus haut (2C-B, 2C-I, PCP, MDA ou ayahuasca, etc.)	87,1	89,9 (87,2-92,5)	10,4	8,2 (5,9-10,6)	2,5	1,9 (0,7-3,2)

Proportion de données manquantes : 2,2% à 3,2% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 98 Fréquence de la consommation d'hallucinogènes au cours des six derniers mois

<i>Parmi ceux qui ont consommé des hallucinogènes au cours des six derniers mois (n=199)</i> Au cours des six derniers mois, combien de fois avez-vous consommé des hallucinogènes ?		
Fréquence de consommation	% naj	% aj (IC 95%)
Une ou deux fois	77,1	77,8 (68,2-87,3)
Au moins 1 fois par mois	21,1	21,0 (11,8-30,1)
Au moins 1 fois par semaine	1,8	1,3 (0,0-4,4)
À tous les jours ou presque	0,0	s.o.

Proportion de données manquantes : 16,6%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.= sans objet.


Tableau 99 Mesure de la consommation d'hallucinogènes selon l'échelle ASSIST : section 1

Parmi ceux qui ont consommé des hallucinogènes au cours des six derniers mois (n=199)										
Mesure de la consommation d'hallucinogènes selon l'échelle ASSIST (section 1)										
	Jamais		Une ou deux fois		Au moins 1 fois par mois		Au moins 1 fois par semaine		À tous les jours ou presque	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous consommé des hallucinogènes ?	30,6	31,2 (19,4-43,0)	51,0	48,6 (36,5-60,7)	15,8	13,2 (4,4-22,1)	1,5	0,9 (0,0-2,8)	1,0	6,1 (1,7-10,6)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu une forte envie ou un besoin incontrôlable de consommer des hallucinogènes ?	72,6	70,4 (59,6-81,2)	13,2	8,8 (3,3-14,2)	8,6	9,1 (1,5-16,7)	4,1	7,9 (3,3-12,6)	1,5	3,8 (0,0-10,3)
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu des problèmes sociaux, juridiques, financiers ou de santé à cause des hallucinogènes ?	91,8	88,4 (80,5-96,2)	5,6	4,8 (0,0-11,8)	1,0	0,2 (0,1-0,3)	1,5	6,7 (2,6-10,7)	0,0	s.o.
Au cours des trois derniers mois, combien de fois VOUS n'avez pas pu faire ce qui était normalement attendu de vous à cause de votre consommation des hallucinogènes ?	94,9	88,7 (81,4-96,0)	3,6	5,1 (0,0-11,8)	0,5	0,1 (0,0-0,1)	1,0	6,1 (2,6-9,6)	0,0	s.o.

Proportion de données manquantes : 1% à 1.5% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.= sans objet.

Tableau 100 Mesure de la consommation d'hallucinogènes selon l'échelle ASSIST : section 2

Parmi ceux qui ont consommé des hallucinogènes au cours des six derniers mois (n=199)						
Mesure de la consommation des hallucinogènes selon l'échelle ASSIST (section 2)						
	Non, jamais		Oui, mais pas dans les derniers 3 mois		Oui, au cours des 3 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Est-ce qu'un ami, un proche ou quelqu'un d'autre vous a déjà dit qu'il ou elle était préoccupé(e) par votre consommation des hallucinogènes ?	94,3	84,3 (73,8-94,8)	1,0	5,6 (1,2-10,1)	4,7	10,1 (0,2-20,0)
Avez-vous déjà essayé sans succès de contrôler, diminuer ou cesser votre consommation des hallucinogènes ?	92,0	87,6 (79,9-95,3)	3,7	2,1 (1,4-2,8)	4,3	10,3 (2,7-18,0)

Proportion de données manquantes : 3.5% à 5.5% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



4.9 Opiïdes

Tableau 101 Consommation d'opioïdes à vie

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé l'une ou l'autre des substances suivantes ? (usage non-médical seulement).						
Opiïdes	Jamais		Oui, mais il y a plus de 6 mois		Oui, au cours des 6 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Héroïne	95,2	94,8 (92,0-97,5)	3,2	2,2 (0,5-3,9)	1,6	3,0 (0,8-5,2)
Morphine	90,7	91,8 (88,7-94,9)	6,3	4,8 (2,7-7,0)	3,0	3,4 (1,0-5,8)
Codeïne	86,8	88,6 (85,4-91,7)	10,0	8,2 (5,4-10,9)	3,1	3,3 (1,7-4,9)
Oxycodone (Oxycontin, Percocet, etc.)	90,0	91,2 (88,2-94,1)	7,1	6,2 (3,8-8,7)	3,0	2,6 (0,9-4,3)
Autres opiacés (Dilaudid, Fentanyl, etc.)	91,7	93,0 (90,2-95,7)	5,0	4,7 (2,4-6,9)	3,3	2,3 (0,7-4,0)

Proportion de données manquantes : 2,6% à 2,7% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 102 Fréquence de consommation d'opioïdes au cours des six derniers mois

Parmi ceux qui ont consommé des opioïdes au cours des six derniers mois (n=93) Au cours des six derniers mois, combien de fois avez-vous consommé des opioïdes ?	
Fréquence de consommation	% naj
Une ou deux fois	50,0
Au moins 1 fois par mois	18,3
Au moins 1 fois par semaine	15,0
À tous les jours ou presque	16,7

Proportion de données manquantes : 35.5%.

naj=non-ajustée. L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.

**Tableau 103** Mesure de la consommation d'opioïdes selon l'échelle ASSIST : section 1

<i>Parmi ceux qui ont consommé des opioïdes au cours des six derniers mois (n=93)</i>					
Mesure de la consommation des opioïdes selon l'échelle ASSIST (section 1)					
	Jamais	Une ou deux fois	Au moins 1 fois par mois	Au moins 1 fois par semaine	À tous les jours ou presque
	% naj	% naj	% naj	% naj	% naj
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous consommé des opioïdes ?	45,7	25,0	10,9	5,4	13,0
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu une forte envie ou un besoin incontrôlable de consommer des opioïdes ?	63,0	12,0	5,4	5,4	14,1
Au cours des trois derniers mois, combien de fois avez-vous eu des problèmes sociaux, juridiques, financiers ou de santé à cause de votre consommation d'opioïdes ?	80,4	6,5	3,3	2,2	7,6
Au cours des trois derniers mois, combien de fois VOUS n'avez pas pu faire ce qui était normalement attendu de vous à cause de votre consommation d'opioïdes ?	81,7	5,4	7,5	3,2	2,2

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 104 Mesure de la consommation d'opioïdes selon l'échelle ASSIST : section 2

<i>Parmi ceux qui ont consommé des opioïdes au cours des six derniers mois (n=93)</i>			
Mesure de la consommation d'opioïdes selon l'échelle ASSIST (section 2)			
	Non, jamais	Oui, mais pas dans les derniers 3 mois	Oui, au cours des 3 derniers mois
	% naj	% naj	% naj
Est-ce qu'un ami, un proche ou quelqu'un d'autre vous a déjà dit qu'il ou elle était préoccupé(e) par votre consommation d'opioïdes ?	81,3	2,2	16,5
Avez-vous déjà essayé sans succès de contrôler, diminuer ou cesser votre consommation d'opioïdes ?	76,9	9,9	13,2

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée. L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



4.10 Médicament contre la dysfonction érectile

Parmi les 259 participants ayant consommé un médicament contre la dysfonction érectile une fois ou plus au cours des six derniers mois, : 49,2 (IC 95% 38,5%-60,0%) l'ont consommé sans ordonnance.

Tableau 105 Consommation d'une médication contre la dysfonction érectile

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé un médicament contre la dysfonction érectile ? (Usage non-médical seulement).						
	Jamais		Oui, mais il y a plus de 6 mois		Oui, au cours des 6 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Viagra, Cialis, Levitra (SANS ordonnance)	95,2	94,8 (92,0-97,5)	3,2	2,2 (0,5-3,9)	1,6	3,0 (0,8-5,2)
Viagra, Cialis, Levitra (SUR ordonnance)	90,7	91,8 (88,7-94,9)	6,3	4,8 (2,7-7,0)	3,0	3,4 (1,0-5,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 106 Fréquence de la consommation d'une médication contre la dysfonction érectile au cours des six derniers mois

Parmi ceux qui ont consommé le Viagra au cours des six derniers mois (n=259) Au cours des six derniers mois, combien de fois avez-vous consommé un médicament contre la dysfonction érectile ?		
Fréquence de consommation	% naj	% aj (IC 95%)
Une ou deux fois	40,3	44,6 (33,9-55,3)
Au moins 1 fois par mois	30,4	29,2 (20,0-38,3)
Au moins 1 fois par semaine	25,3	20,2 (10,5-29,9)
À tous les jours ou presque	4,0	6,1 (3,5-8,6)

Proportion de données manquantes : 20%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

4.11 Stéroïdes

Tableau 107 Consommation de stéroïdes à vie

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé l'une ou l'autre des substances suivantes ? (Usage non-médical seulement),						
	Jamais		Oui, mais il y a plus de 6 mois		Oui, au cours des 6 derniers mois	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Stéroïdes SANS prescription	96,4	95,8 (93,7-97,9)	2,3	1,5 (0,2-2,8)	1,2	2,7 (1,0-4,4)
Stéroïdes SUR prescription	97,3	98,1 (96,7-99,5)	1,4	1,3 (0,0-2,6)	1,3	0,6 (0,2-1,0)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



4.12 Risque de dépendance associé à la consommation d'une substance

Risque de dépendance - Calcul du score

Les participants ayant préféré ne pas répondre à tous les énoncés de l'échelle ASSIST ont été exclus du calcul des scores. Le pointage de chaque participant est calculé pour chaque catégorie de substance en utilisant uniquement les sections 1 et 2 de l'échelle (items A-F). Le nombre de points attribués à un énoncé varie selon l'énoncé lui-même et sa fréquence d'applicabilité (voir [ce document](#) pour plus de détails).

Le score d'un participant au test ASSIST fournit une indication du niveau de risque de dépendance et d'effets nuisibles associés à la consommation par le participant de chaque catégorie de substance. Le score obtenu détermine ce niveau de risque :

- Faible; consommation non problématique et pas d'intervention
- Modéré; abus et intervention brève
- Élevé; dépendance et référence à un spécialiste et traitement

Niveau de risque associé à la consommation d'une catégorie de fonction du score		
	En ce qui a trait à la consommation d'alcool	En ce qui a trait à la consommation de toute autre catégorie de substances
Risque faible	0-10	0-3
Risque modéré	11-26	4-26
Risque élevé	27+	27+

Tableau 108 Risque de dépendance ou d'effets nuisibles associé à la consommation d'une substance selon la catégorie de substance consommée

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Risque de dépendance ou d'effets nuisibles selon l'échelle ASSIST								
Substance	Niveau de risque de dépendance ou d'effets nuisibles							
	Aucun risque (aucune consommation)		Faible		Modérée		Élevée	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Alcool	14,1	17,9 (13,2-22,7)	53,7	50,4 (44,9-55,8)	26,3	26,0 (21,4-30,7)	6,0	5,7 (3,1-8,2)
Tabac	56,3	57,9 (52,6-63,1)	5,2	6,2 (3,8-8,7)	34,6	32,5 (27,5-37,4)	3,9	3,5 (1,9-5,0)
Cannabis	48,2	55,1 (49,9-60,4)	17,4	14,7 (11,4-17,9)	29,9	24,4 (19,8-29)	4,5	5,7 (3,8-7,7)
Amphétamines	74,5	79,7 (75,8-83,6)	8,4	6,6 (4,1-9)	14,6	12,1 (9,1-15,1)	2,5	1,7 (0,6-2,7)
Cocaïne	77,4	81,7 (77,9-85,4)	7,9	5,6 (3,5-7,6)	12	9,9 (7,2-12,6)	2,6	2,9 (0,9-4,8)
Drogues inhalées	71,9	79,5 (75,4-83,5)	12,7	10,3 (7,3-13,3)	15,2	10,0 (7,0-13,0)	0,2	0,2 (0,2-0,3)
Anxiolytiques	84,3	88,2 (85,1-91,3)	5,8	4,7 (2,5-6,9)	9,5	6,9 (4,7-9,2)	0,5	0,1 (0,0-0,3)
Hallucinogènes	88,8	90,7 (87,9-93,6)	5,8	4,0 (2,2-5,8)	5	4,1 (2,1-6,1)	0,4	1,2 (0,0-2,4)
Opioides	95,9	95,4 (93,4-97,5)	1,1	1,3 (0,2-2,5)	2	1,6 (0,6-2,6)	0,9	1,7 (0,3-3,0)

Proportion de données manquantes : 3,7% à 8,9% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Humeniuk RE, Ali RA, Babor TF, Farrell M, Formigoni ML, Jittiwutikarn J, Boerngen de Larcerda R, Ling W, Marsden J, Monteiro M, Niiwhatiwa S, Pal H, Poznyak V & Simon S (2008). Validation of the Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST). *Addiction* 103(6): 1039-1047



Tableau 109 Risque modéré ou élevé de dépendance ou d'effets nuisibles en lien avec la consommation de substances selon la catégorie de substance consommée et le groupe d'âge

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)
Risque modéré ou élevé de dépendance ou d'effets nuisibles en lien avec la consommation de substances selon la substance consommée et le groupe d'âge

Substance	Groupe d'âge									
	< 25 ans (n=205)		25 – 34 ans (n=422)		35 – 44 ans (n=189)		45 – 54 ans (n=191)		> 55 ans (n=172)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Alcool	35,1	35,8 (23,2-48,4)	35,1	33,1 (24,7-41,4)	29,9	28,3 (15,2-41,4)	29,0	28,9 (18,4-39,4)	27,0	27,3 (16,6-38,0)
Tabac	47,1	43,3 (31,1-55,6)	42,1	38,5 (30,0-47,0)	34,6	33,8 (19,8-47,8)	35,3	28,2 (15,8-40,5)	26,7	26,6 (14,5-38,8)
Cannabis	48,7	43,7 (31,5-55,9)	37,9	30,7 (22,9-38,4)	27	21,8 (9,1-34,4)	27,4	29,2 (17,8-40,6)	25,0	18,3 (7,6-29,1)
Amphétamines	22,5	18,4 (10,8-25,9)	17,9	14,0 (8,1-19,9)	18,2	13,4 (6,7-20,0)	14,6	14,3 (6,9-21,8)	9,9	5,8 (0,0-12,1)
Cocaïne	16,1	12,1 (5,1-19,1)	18,3	12,7 (7,5-18,0)	13,8	20,0 (8,8-31,2)	12,8	15,5 (7,2-23,8)	6,7	2,7 (0,1-5,4)
Drogues inhalées	15,5	11,5 (5,6-17,4)	14,6	8,5 (3,3-13,7)	11,1	5,9 (2,0-9,9)	23,3	19,8 (9,3-30,3)	13	8,6 (0,9-16,2)
Anxiolytiques	8,4	4,8 (1,7-7,9)	9,8	4,4 (1,6-7,2)	12,1	5,6 (2,5-8,7)	11,5	18,1 (10,7-25,6)	8,0	8,2 (0,0-16,7)
Hallucinogènes	12,6	11,0 (4,0-18,0)	5,8	4,3 (0,8-7,8)	3,9	1,4 (0,0-4,1)	2,7	9,3 (2,4-16,3)	0,6	0,1 (0,0-0,2)
Opioides	3,0	2,2 (0,5-4,0)	2,0	2,9 (0,0-6,4)	2,2	2,4 (0,1-4,8)	5,0	8,2 (3,2-13,1)	3,6	2,1 (0,1-4,0)

Proportion de données manquantes : de 2,0% à 8,8% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 110 Risque modéré ou élevé de dépendance ou d'effets nuisibles en lien avec la consommation de substances (sauf tabac, alcool et cannabis) selon le nombre de substances consommées

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)
 En considérant l'une ou l'autre des catégories de substance suivantes : les amphétamines, les drogues inhalées, les hallucinogènes, les sédatifs-anxiolytiques, la cocaïne et les opioïdes.

	% naj	% aj (IC 95%)
Proportion de participant présentant un risque modéré ou élevé de dépendance ou d'effets nuisibles en lien avec la consommation d'une catégorie de substance	34,0	28,5 (24,1-32,9)
Proportion de participant présentant un risque modéré ou élevé de dépendance ou nuisance en lien avec la consommation de deux catégories s de substances ou plus.	17,9	14,0 (10,4-17,6)

Proportion de données manquantes : 1,6% (un type de drogue), 14% (deux types de drogues).

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



4.13 Influence de la consommation d'alcool ou de drogues sur les attitudes et comportements sexuels — désir de désinhibition / évitement

L'échelle « Désir de désinhibition / évitement » (McKirnan et al. 2001)¹ vise à apprécier dans quelle mesure les hommes d'orientation sexuelle gaie ou bisexuelle se servent de l'alcool ou des drogues pour modifier leurs attitudes et comportements sexuels et éviter de penser au risque de contracter ou transmettre le VIH. L'échelle comprend 12 énoncés, dont 11 ont été inclus au questionnaire Engage. Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants selon leur niveau d'accord avec chacun des énoncés.

Tableau 111 Désinhibition sexuelle / évitement via la consommation d'alcool ou de drogue

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)										
Les énoncés de cette section portent sur la consommation de drogues et d'alcool et sur le sexe. Veuillez choisir la réponse qui vous semble la plus juste.										
Catégories	Tout à fait en désaccord		Fortement en désaccord		En désaccord		En accord		Fortement en accord	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Quand je suis sous l'influence de l'alcool ou de drogues, j'ai plus de chance de vouloir baiser ou me faire baiser.	14,9	14,3 (10,2-18,4)	4,6	5,5 (2,8-8,2)	12,8	14,0 (10,4-17,6)	40,5	42,8 (37,4-48,1)	27,2	23,5 (19,4-27,6)
Quand je suis sous l'influence de l'alcool ou de drogues, j'ai plus de chance d'avoir du sexe avec des personnes avec qui je n'ai habituellement pas de sexe.	16,2	16,9 (12,7-21,2)	7,0	7,6 (4,5-10,8)	20,9	22,8 (18,3-27,3)	40,4	39,1 (34,0-44,3)	15,5	13,5 (9,9-17,1)
Quand je suis sous l'influence de l'alcool ou de drogues, j'ai plus de chance de faire des activités sexuelles que je ne fais pas d'habitude.	17,1	16,8 (12,6-21,0)	6,5	7,8 (4,6-11,0)	24,1	25,2 (20,5-30,0)	37,5	35,1 (30,1-40,1)	14,8	15,1 (11,5-18,6)
Quand je suis sous l'influence de l'alcool ou de drogues, je suis plus à l'aise sexuellement.	13,7	14,1 (10,0-18,1)	5,3	5,3 (2,8-7,9)	16,6	16,7 (12,7-20,8)	46,9	50,7 (45,3-56,0)	17,6	13,2 (10,2-16,3)
Après avoir consommé de l'alcool ou des drogues, je me sens souvent plus sexuel.	12,6	13,1 (9,1-17,1)	4,4	5,7 (3,0-8,5)	14,4	16,4 (12,2-20,6)	49,4	50,6 (45,3-55,9)	19,2	14,2 (11,0-17,4)
Après avoir consommé de l'alcool ou des drogues, je suis plus réceptif sexuellement.	13,4	13,9 (9,8-18,0)	4,6	4,9 (2,5-7,4)	21,0	24,1 (19,3-28,9)	45,0	43,4 (38,1-48,8)	16,0	13,7 (10,6-16,7)
Quand je suis sous l'influence de l'alcool ou de drogues, je ferais n'importe quoi avec n'importe qui.	35,5	35,2 (30,3-40,2)	20,9	19,5 (15,0-24,1)	30,3	31,3 (26,4-36,3)	10,2	10,1 (6,7-13,6)	3,2	3,7 (1,6-5,8)
Quand je suis sous l'influence de l'alcool ou de drogues, j'ai de la difficulté à rester dans mes limites sexuelles.	27,6	27,1 (22,5-31,6)	16,5	17,1 (12,9-21,2)	32,1	31,5 (26,6-36,5)	19,1	19,2 (14,8-23,6)	4,8	5,1 (2,7-7,6)
Quand j'ai la chance d'avoir du sexe, je n'arrive pas à dire non même si nous n'utilisons pas de condoms.	34,0	30,4 (25,7-35,1)	17,2	19,1 (14,3-23,8)	31,6	31,7 (26,6-36,7)	12,5	13,7 (9,7-17,6)	4,7	5,2 (3,4-7,1)



Quand je suis en train d'avoir du sexe, je ne pense qu'au moment présent.	11,2	11,2 (7,4-15,0)	9,0	8,0 (5,2-10,9)	28,0	28,8 (23,9-33,7)	37,8	39,1 (33,9-44,4)	14,0	12,8 (9,8-15,8)
J'ai de la difficulté à maintenir mon engagement de pratiquer le sexe sécuritaire.	24,2	20,9 (16,7-25,1)	14,5	15,6 (11,1-20,1)	29,3	28,3 (23,3-33,2)	25,4	28,6 (23,7-33,4)	6,7	6,7 (4,7-8,7)

Proportion de données manquantes 5,7% à 7,4% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Déshinhibition sexuelle / évitement via la consommation d'alcool ou de drogue - Calcul des scores

Les participants ayant préféré ne pas répondre à un ou plusieurs des énoncés ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 1 à 5 selon le degré d'accord du participant avec l'énoncé ; le degré « tout à fait en désaccord » équivaut à 1 point tandis que le degré « fortement en accord » équivaut à 5 points. Le score d'un participant est obtenu en additionnant les points attribués à chacun des énoncés de l'échelle, il varie de 11 à 55. Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant. Une valeur élevée indique que les participants ont d'avantage une tendance à consommer de l'alcool ou des drogues pour améliorer leur sexualité et s'évader à conscience du risque de VIH.

Tableau 112 Déshinhibition sexuelle / évitement via la consommation d'alcool ou de drogue - Sommaire

Parmi l'ensemble des participants (n=1179) Déshinhibition sexuelle / évitement via la consommation d'alcool ou de drogue		
Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée ¹ (IC 95%)
11-55	33,9 (10,2)	33,6 (32,4-34,8)

Données manquantes : 10,6%

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

¹ McKirnan DJ, Vanable PA, Ostrow DG, Hope B. Expectancies of sexual "escape" and sexual risk among drug and alcohol-involved gay and bisexual men. *Journal of substance abuse*. 2001;13(1-2):137-154.



4.14 Administration de drogues par injection ou par inhalation

Tableau 113 Utilisation d'une seringue déjà utilisée par quelqu'un d'autre lors la consommation de stéroïdes par injection

Parmi ceux qui ont consommé des stéroïdes au cours des six derniers mois (n=27) Lorsque vous avez pris des stéroïdes par injection, à quelle fréquence vous êtes-vous servi d'une seringue qui avait déjà été utilisée par quelqu'un d'autre (y compris vos partenaires sexuels) ?	
Fréquence d'utilisation d'une seringue déjà utilisée par quelqu'un d'autre	% naj
Jamais	87,5
Rarement	4,2
Parfois	4,2
Toujours	4,2

Proportion de données manquantes : 11,1%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 114 Consommation de drogues « sniffées » ou inhalées

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Avez-vous déjà « sniffé » ou inhalé des drogues ? (usage non-médical seulement.)		
Fréquence de consommation	% naj	% aj (IC 95%)
Non, jamais	45,9	56,2 (51,2-61,3)
Oui, il y a plus de 6 mois	24,7	18,8 (15,1-22,4)
Oui, au cours des 6 derniers mois	29,4	25,0 (20,7-29,3)

Proportion de données manquantes : 0,7%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 115 Utilisation de matériel d'inhalation utilisé par quelqu'un d'autre lors de la consommation de drogues sniffées ou inhalées

Parmi ceux qui ont sniffé ou inhalé des drogues au cours des six dernier mois (n=344) Au cours des six derniers mois, à quelle fréquence vous êtes-vous servi d'une paille ou de tout autre objet déjà utilisé par quelqu'un d'autre (y compris vos partenaires sexuels) pour sniffer ou inhaler des drogues ?		
Fréquence d'utilisation de matériel d'inhalation déjà utilisé par quelqu'un d'autre	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais	31,3	28,0 (20,3-35,7)
Rarement	23,6	24,4 (15,0-33,8)
Parfois	22,4	25,8 (16,6-35)
Souvent	10,9	6,4 (3,1-9,6)
Presque toutes les fois	9,4	11,7 (4,7-18,8)
Toujours	2,4	3,7 (1,9-5,5)

Proportion de données manquantes : 1,5%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).


Tableau 116 Consommation de drogues par injection

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Vous êtes-vous déjà injecté des drogues ? (Pour un usage non-médical seulement.)		
	% naj	% aj (IC 95%)
Non, jamais	90,4	90,4 (87,0-93,8)
Oui, il y a plus de 6 mois	4,2	4,0 (2,5-5,6)
Oui, au cours des 6 derniers mois	5,4	5,6 (2,4-8,7)

Proportion de données manquantes : 0,7%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 117 Recours aux services d'accès à du matériel d'injection stérile

<i>Parmi ceux qui ont consommé des drogues par injection au cours des six dernier mois (n=63)</i> Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé les services d'un programme d'accès à du matériel d'injection stérile (p. ex. seringues, eau, contenants) ?	
Fréquence d'utilisation des services d'accès à du matériel d'injection stérile (nombre de fois au cours des six derniers mois)	% naj
0	26,7
1	6,7
2	11,7
3 à 5	16,7
6 à 10	8,3
Plus de 10	30

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



Tableau 118 Utilisation de matériel d'injection utilisé par quelqu'un d'autre lors la consommation de drogues par injection

<i>Parmi ceux qui ont consommé des drogues par injection au cours des six dernier mois (n=63)</i> Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence vous êtes-vous servi de matériel d'injection qui avait déjà été utilisé par quelqu'un d'autre (y compris vos partenaires sexuels) ?						
Matériel	Jamais	Rarement	Parfois	Souvent	Presque tous les jours	Toujours
	% naj	% naj	% naj	% naj	% naj	% naj
Seringue	69,8	7,9	9,5	6,3	6,3	0,0
Eau	71,4	6,3	9,5	6,3	6,3	0,0
Cuillère contenant	71,4	6,3	4,8	6,3	3,2	7,9
Filtre	76,2	7,9	6,3	3,2	3,2	3,2

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



4.15 Utilisation de services de réduction des méfaits

Tableau 119 Sentiment d'avoir besoin d'aide en lien avec la consommation d'alcool et perception de la facilité à obtenir celle-ci

Parmi ceux qui ont eu un score sur la mesure AUDIT (Fréquence de consommation d'alcool) >=4 (n=700)								
Sentiment d'avoir besoin d'aide en lien avec la consommation d'alcool et perception de la facilité à obtenir celle-ci								
	Pas du tout		Un peu		Beaucoup		Totalement	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des six derniers mois, à quel point avez-vous ressenti le besoin d'avoir de l'aide pour réduire ou cesser votre consommation d'alcool ?	74,9	69,1 (62,7-75,5)	17,3	19,8 (14,4-25,2)	4,8	5,5 (1,8-9,2)	1,9	0,8 (0,5-1,1)
Présentement, de façon générale, diriez-vous que c'est facile pour vous d'obtenir l'aide nécessaire pour réduire ou cesser votre consommation d'alcool ?	16,7	16,1 (10,8-21,4)	15,8	16,6 (11,6-21,6)	16,1	16,0 (10,4-21,7)	29,8	29,5 (23,2-35,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 120 Recours à un traitement, du soutien psychologique ou des services de réduction des méfaits en lien avec la consommation d'alcool

Parmi ceux qui ont eu un score à la mesure AUDIT (Fréquence de consommation d'alcool) ≥ 4 (n=700)		
Avez-vous déjà reçu un traitement, du soutien psychologique ou des services de réduction des méfaits pour votre consommation d'alcool ?		
Fréquence	% naj	% aj (IC 95%)
Non, jamais	90,3	86,3 (81,9-90,7)
Oui, il y a plus de 6 mois	6,6	7,5 (4,7-10,4)
Oui, au cours des 6 derniers mois	3,1	6,2 (2,5-9,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

**Tableau 121** Fréquence de recours à divers services en lien avec la consommation d'alcool

Parmi ceux qui ont reçu un traitement, du soutien psychologique ou des services de réduction des méfaits pour consommation d'alcool au cours des six derniers mois (n=28)
Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous utilisé les services suivants en lien avec votre consommation d'alcool ?

Services	Je n'ai pas utilisé ce service (0)	1	2	3-5	6-10	Plus de 10
	% naj	% naj	% naj	% naj	% naj	% naj
Soutien social/groupes d'entraide (p. ex. Alcooliques Anonymes)	34,6	3,8	15,4	3,8	11,5	30,8
Services de consultations externes (p. ex. programme de traitement de l'alcoolisme)	44,0	12,0	8,0	12,0	24,0	0
Service de réadaptation en milieu hospitalier	76,0	12,0	8,0	4,0	0	0
Service médical en milieu hospitalier et/ou de désintoxication	68,0	12,0	12,0	4,0	4,0	0

Proportion de données manquantes : 10%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.

Tableau 122 Sentiment d'avoir besoin d'aide en lien avec la consommation de drogues et perception de la facilité à obtenir celle-ci

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)
Sentiment d'avoir besoin d'aide en lien avec la consommation de drogues et perception de la facilité à obtenir celle-ci

	Pas du tout		Un peu		Beaucoup		Totalement	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des six derniers mois, à quel point avez-vous ressenti le besoin d'avoir de l'aide pour réduire ou cesser votre consommation de drogues ?	22,8	24,0 (19,1-28,9)	16,2	17,3 (13,4-21,3)	13,1	11,7 (8,3-15,1)	26,4	26,9 (22,0-31,7)
Présentement, de façon générale, diriez-vous que c'est facile pour vous d'obtenir l'aide nécessaire pour réduire ou cesser votre consommation de drogues ?	76,7	72,2 (67,5-76,8)	14,6	16,8 (13,4-20,3)	5,6	8,4 (4,9-12,0)	2,3	1,9 (0,8-3,0)

Proportion de données manquantes : 3,8% à 6,4% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 123 Recours à un traitement, du soutien psychologique ou des services de réduction des méfaits en lien avec la consommation de drogues

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Mis à part les cigarettes, avez-vous déjà reçu un traitement, du soutien psychologique ou des services de réduction des méfaits pour votre consommation de drogue ?		
Fréquence	% naj	% aj (IC 95%)
Non, jamais	89,1	88,7 (85,7-91,8)
Oui, il y a plus de 6 mois	8,5	7,7 (5,5-9,8)
Oui, au cours des 6 derniers mois	2,4	3,6 (1,3-5,9)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 124 Fréquence de recours à divers services en lien avec la consommation de drogues

<i>Parmi ceux qui ont reçu un traitement, du soutien psychologique ou des services de réduction des méfaits pour sa consommation de drogues au cours des six derniers mois (n=28)</i> Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous utilisé les services suivants en lien avec votre consommation de drogues ?						
Services	Je n'ai pas utilisé ce service (0)	1	2	3-5	6-10	Plus de 10
	% naj	% naj	% naj	% naj	% naj	% naj
Services d'injection et de consommation supervisée (sites d'injection supervisés)	96,0	4,0	0	0	0	0
Soutien social/groupes d'entraide (p. ex. Narcotiques Anonymes)	50,0	11,5	3,8	3,8	3,8	26,9
Services de consultations externes (p. ex. programme de traitement de la toxicomanie)	34,6	11,5	7,7	19,2	7,7	19,2
Traitement médical de substitution (p. ex. traitement de méthadone ou de suboxone)	88,5	7,7	3,8	0	0	0
Service de réadaptation en milieu hospitalier	73,1	11,5	11,5	3,8	0	0
Service médical en milieu hospitalier et/ou de désintoxication	69,2	7,7	11,5	3,8	7,7	0

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



5

Mesures de prévention

Attitudes et accès à de l'information,
à du matériel de protection et à un
professionnel de la santé



5 Mesures de prévention — Attitudes et accès à de l'information, à du matériel de protection et à un professionnel de la santé

5.1 Risque perçu de transmettre le VIH à un partenaire sexuel

Tableau 125 Risque perçu de transmettre le VIH à un partenaire sexuel

Parmi les participants de statut VIH auto-rapporté séropositif (n=211) Comment évalueriez-vous votre risque actuel de transmettre le VIH à un partenaire sexuel ?		
Évaluation du risque	% naj	% aj (IC 95%)
Très peu probable	63,3	69,8 (59,0-80,6)
Peu probable	28,2	21,9 (12,4-31,4)
Plutôt probable	2,1	1,3 (0,0-3,7)
Probable	4,3	5,1 (0,0-10,7)
Très probable	2,1	1,9 (0,0-4,1)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

5.2 Risque perçu de contracter le VIH

Tableau 126 Risque perçu de contracter le VIH

Parmi les participants de statut VIH auto-rapporté négatif ou inconnu (n=968) Comment évalueriez-vous votre risque actuel de contracter le VIH d'un partenaire sexuel ?		
Évaluation du risque	% naj	% aj (IC 95%)
Très peu probable	30,4	33,0 (27,5-38,4)
Peu probable	51,4	46,6 (41,0-52,3)
Plutôt probable	10,1	13,0 (8,8-17,2)
Probable	6,2	4,4 (2,2-6,6)
Très probable	1,8	2,4 (0,7-4,2)
Je crois que je suis déjà séropositif au VIH.	0,1	0,6 (0,0-1,8)

Proportion de données manquantes : 3,1%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)



5.3 Perception de l'impact des traitements antirétroviraux

La perception de l'impact des traitements antirétroviraux a été appréciée à l'aide de l'échelle « Optimisme-scepticisme face au traitement » (A Scale of Optimism-Scepticism in the Context of HIV Treatments, Van de Ven et al. 2000)¹¹. L'échelle a été développée pour être utilisée chez les hommes gais, afin de mesurer les attitudes envers les thérapies anti-VIH et leurs associations avec les comportements sexuels à risque. Elle comprend 12 énoncés. Sept autres énoncés ont été ajoutés au questionnaire Engage (il s'agit des 7 derniers énoncés dans le tableau suivant). Le tableau présente la répartition des réponses des participants selon leur niveau d'accord avec chacun des 19 énoncés.

Tableau 127 Perception de l'impact des traitements antirétroviraux

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Les questions suivantes portent sur le VIH, la charge virale et les nouveaux traitements anti-VIH. Choisissez la réponse qui vous semble la plus juste. Il n'y a pas de « bonne réponse ». Répondez selon vos attitudes et vos croyances personnelles sans vous préoccuper de ce que les autres choisiraient ou « devraient » choisir.								
Énoncé	Tout à fait en désaccord		En désaccord		En accord		Tout à fait en accord	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Une personne ne peut pas transmettre le virus lorsque sa charge virale est indétectable.	13,6	15,9 (12,3-19,5)	31,3	36,8 (32,0-41,7)	37,9	33,5 (28,5-38,5)	17,3	13,7 (10,0-17,5)
Je suis moins préoccupé par l'infection au VIH qu'avant.	17,1	18,2 (14,6-21,9)	29,8	33,0 (27,9-38,1)	41,0	38,6 (33,8-43,5)	12,1	10,1 (7,0-13,3)
Les nouveaux traitements anti-VIH permettront d'avoir des relations sexuelles sans crainte.	14,5	15,6 (11,9-19,2)	43,3	47,0 (41,8-52,1)	34,9	30,7 (25,9-35,5)	7,3	6,8 (4,1-9,4)
Si toutes les personnes séropositives prenaient les nouveaux traitements anti-VIH, l'épidémie prendrait fin.	12,7	15,0 (11,4-18,7)	42,2	44,7 (39,6-49,8)	35,4	31,9 (27,0-36,8)	9,7	8,4 (5,7-11,2)
Si on annonçait qu'un remède permet de guérir du VIH/sida, je cesserais de pratiquer le sexe sécuritaire.	23,4	26,2 (21,6-30,7)	47,1	44,3 (39,2-49,3)	21,1	20,4 (16,2-24,5)	8,4	9,2 (6,1-12,3)
Les personnes dont la charge virale est indétectable ne devraient pas trop s'inquiéter de transmettre le VIH.	18,7	22,0 (17,8-26,2)	41,0	44,8 (39,6-49,9)	31,5	26,7 (22,2-31,2)	8,9	6,6 (4,1-9,0)
Jusqu'à ce qu'on découvre un remède qui guérit du VIH/sida, la prévention reste la meilleure pratique.	4,6	6,5 (3,9-9,0)	7,8	10,3 (7,3-13,2)	43,2	40,5 (35,4-45,7)	44,3	42,8 (37,7-47,8)
La disponibilité d'une médication anti VIH (PPE) que l'on prend juste après la relation sexuelle fait en sorte qu'il n'est pas aussi important d'utiliser des condoms pendant les relations sexuelles.	32,3	31,4 (26,7-36,2)	47,7	47,1 (41,9-52,3)	16,6	18,4 (14,6-22,2)	3,4	3,1 (1,7-4,4)

¹¹ Van de Ven P, Crawford J, Kippax S, Knox S, Prestage G. A scale of optimism-scepticism in the context of HIV treatments. Aids care. 2000;12(2):171-176.



Le VIH est moins une menace puisque l'épidémie est en baisse.	29,8	28,5 (23,9-33,1)	52,2	50,2 (45,0-55,3)	15,4	18,2 (14,4-22,0)	2,6	3,1 (1,4-4,8)
Le VIH/sida est une menace moins importante qu'avant puisqu'il y a des nouveaux traitements.	17,8	19,7 (15,3-24,1)	35,8	36,4 (31,4-41,4)	40,0	37,7 (32,9-42,5)	6,4	6,2 (3,9-8,5)
Peu importe la charge virale, il n'est jamais sécuritaire d'avoir des relations sexuelles sans condom.	9,1	10,3 (6,8-13,7)	22,5	22,5 (18,5-26,4)	42,5	43,3 (38,2-48,5)	25,8	23,9 (19,5-28,4)
Grâce aux nouveaux traitements, moins de gens contractent le VIH.	8,2	9,4 (6,1-12,7)	34,6	36,7 (31,6-41,8)	50,4	48,8 (43,7-53,9)	6,8	5,1 (3,1-7,2)
Je crois qu'avec les nouveaux traitements les personnes séropositives sont moins à risque de transmettre l'infection. *	7,8	8,8 (5,9-11,7)	24,0	27,5 (22,8-32,3)	55,5	54,5 (49,4-59,7)	12,7	9,2 (6,2-12,1)
Je suis moins préoccupé par le VIH parce que les traitements sont maintenant meilleurs. *	12,1	15,0 (11,4-18,6)	37,1	40,5 (35,5-45,6)	42,6	37,5 (32,5-42,5)	8,2	7,0 (4,3-9,6)
Si un homme est sous PrEP (PrEP ; médicament anti-VIH pris par les hommes séronégatifs avant une exposition possible au VIH pour réduire leurs risques d'être infectés), c'est moins important d'utiliser des condoms pour les relations sexuelles anales. *	20,3	23,2 (18,7-27,7)	47,1	47,0 (41,8-52,1)	27,6	25,5 (21,1-29,8)	4,9	4,4 (2,3-6,4)
J'accepterais d'avoir une relation sexuelle anale SANS condom si un homme séropositif me disait que sa charge virale était indétectable. *	37,2	41,3 (36,1-46,4)	33,9	34,9 (30,0-39,8)	20,2	17,5 (14,0-21,1)	8,7	6,2 (3,7-8,7)
Le VIH n'est pas une maladie vraiment importante car la plupart des hommes séropositifs ont une charge virale indétectable. *	42,7	41,7 (36,6-46,8)	46,8	46,5 (41,4-51,6)	7,9	9,0 (5,9-12,1)	2,6	2,8 (1,3-4,3)
De nos jours, il est très difficile de contracter le VIH car la plupart des hommes séropositifs ont une charge virale indétectable. *	35,0	34,5 (29,5-39,5)	50,6	51,0 (45,9-56,2)	11,8	11,3 (7,9-14,7)	2,6	3,2 (1,5-4,8)
Le fait de connaître la charge virale d'un partenaire est tout aussi important que de connaître son statut sérologique. *	7,3	10,5 (7,3-13,7)	15,5	16,9 (13,4-20,4)	52,1	49,2 (44,0-54,3)	25,1	23,5 (18,9-28,0)

Proportion de données manquantes : 0,5%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Énoncé ajouté pour l'étude Engage et ne faisant pas partie de l'échelle originale

Van de Ven P, Crawford J, Kippax S, Knox S, Prestage G. A scale of optimism-scepticism in the context of HIV treatments. Aids care. 2000;12(2):171-176.



Perception de l'impact des traitements antirétroviraux - Calcul des scores

Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 1 à 4 selon le degré d'accord du participant avec l'énoncé ; le degré « tout à fait en désaccord » équivaut à 1 point tandis que le degré « tout à fait en accord » équivaut à 4 points. Pour les énoncés « jusqu'à ce qu'on découvre un remède qui guérit du VIH/sida, la prévention reste la meilleure pratique » et « peu importe la charge virale, il n'est jamais sécuritaire d'avoir des relations sexuelles sans condom » le calcul du score est inversé. Parmi ces énoncés, seulement les 12 premiers ont été utilisé pour le calcul des scores. Le score d'un participant est obtenu en additionnant les points attribués à chaque énoncé, puis en soustrayant les points attribués aux deux énoncés auxquels un accord signifie un rôle mitigé des antirétroviraux. L'étendue du score total varie de 0-36. Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant. Une valeur élevée indique que les participants ont des perceptions optimistes en lien avec les traitements antirétroviraux

Tableau 128 Perception de l'impact des médicaments antirétroviraux – Sommaire

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Perception de l'impact des traitements antirétroviraux		
Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée¹ (IC 95%)
2-36	16,9 (5,7)	16,5 (15,9-17,0)

Proportion de données manquantes : 0,5%.

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



5.4 Connaissances et opinions au sujet du traitement antirétroviral comme outil de prévention

Le terme « traitement comme outil de prévention » (TasP™) veut dire que lorsqu'une personne vivant avec le VIH prend des médicaments contre le VIH tous les jours pour rester en bonne santé, la quantité de virus dans son sang et ses liquides génitaux (c'est-à-dire sa charge virale) est réduite et cette personne est moins susceptible de transmettre le VIH à d'autres personnes.

Tableau 129 Connaissance de l'expression « traitement comme outil de prévention », selon le statut VIH auto-rapporté

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Avant aujourd'hui, aviez-vous entendu le terme « traitement comme outil de prévention » ou en anglais <i>Treatment as Prevention</i> ou TasP™ ?						
	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=1 179)	
	Négatif ou inconnu (n=968)		Positif (n=211)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	38,8	31,2 (25,8-36,6)	48,8	41,9 (30,6-53,3)	40,6	32,7 (27,7-37,6)
Non	52,9	58,0 (52,5-63,5)	45,0	51,9 (40,2-63,6)	51,5	57,2 (52,1-62,2)
Je ne sais pas / Je ne me souviens pas	8,3	10,8 (7,9-13,6)	6,2	6,2 (2,7-9,7)	7,9	10,2 (7,7-12,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 130 Discussions tenues avec des amis ou des partenaires sexuels au sujet du « traitement comme outil de prévention », selon le statut VIH auto-rapporté

Parmi ceux qui ont entendu le terme « traitement comme outil de prévention » ou en anglais <i>Treatment as Prevention</i> ou TasP™ : (n = 479)						
Au cours des 6 derniers mois, avez-vous discuté avec des amis ou des partenaires sexuels du « traitement comme outil de prévention » ou TasP™ ?						
	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=479)	
	Négatif ou inconnu (n=376)		Positif (n=103)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	65,6	64,7 (55,0-74,5)	66,3	65,3 (48,0-82,5)	65,7	64,8 (56,2-73,4)
Non	34,4	35,3 (25,5-45,0)	33,7	34,7 (17,5-52,0)	34,3	35,2 (26,6-43,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 131 Sources de l'information obtenue au sujet du « traitement comme outil de prévention », selon le statut VIH auto-rapporté

Parmi ceux qui ont entendu le terme « traitement comme outil de prévention » ou en anglais Treatment as Prevention ou TasP™ (n = 479)

Auprès de qui ou à quel endroit avez-vous entendu parler du « traitement comme outil de prévention » ou TasP™ ? (Cochez tout ce qui s'applique) *

Source de l'information	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=479)	
	Négatif ou inconnu (n=376)		Positif (n=103)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Ami(s)	56,4	56,8 (46,7-66,9)	49,5	34,2 (20,1-48,3)	54.9	52,8 (44,1-61,6)
Partenaire(s) sexuel(s)	39,1	39,6 (29,9-49,3)	29,1	13,1 (4,4-21,7)	37.0	34,9 (26,8-43,1)
Organisme(s) communautaire(s)	21,0	19,6 (11,5-27,7)	25,2	15,2 (4,3-26,1)	21.9	18,8 (12,1-25,6)
Médecin ou autre professionnel de la santé	29,3	23,3 (15,6-30,9)	40,8	25,2 (11,7-38,6)	31.7	23,6 (17,0-30,2)
Médias gais ou LGBT (p. ex., DailyXtra.com, Poz.com, site Web gai, PositiveLite.com, etc.)	34,0	28,6 (19,2-37,9)	41,7	44,1 (27,8-60,4)	35.7	31,3 (23,2-39,5)
Autres médias	21,3	21,2 (12,8-29,6)	17,5	31,4 (16,1-46,7)	20.5	23,0 (15,5-30,5)
Recherche personnelle / je me suis renseigné moi-même	30,6	31,3 (21,6-41,0)	24,3	24,2 (10,1-38,3)	29.2	30,1 (21,8-38,3)
Autre**	5,6	3,8 (0,0-7,8)	2,9	0,7 (0,0-1,7)	5.0	3,2 (0,0-6,5)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

** Autre : Application de rencontre (Scruff, Grindr) (13), lors de cours (5), étude de recherche (2), emploi (1)

Tableau 132 Efficacité perçue du « traitement comme outil de prévention », selon le statut VIH auto-rapporté

Parmi ceux qui ont entendu le terme « traitement comme outil de prévention » ou en anglais *Treatment as Prevention* ou *TasP™* (n = 479)

À votre avis, dans quelle mesure le « traitement comme outil de prévention » ou *TasP™* est-il efficace pour empêcher la transmission du VIH ?

Efficacité perçue	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=479)	
	Négatif ou inconnu (n=376)		Positif (n=103)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Totalement efficace	11,4	11,5 (4,7-18,2)	26,2	27,4 (12,1-42,7)	14.6	14,3 (8,1-20,4)
Très efficace	54,8	48,1 (37,9-58,2)	54,4	60,7 (44,7-76,7)	54.7	50,3 (41,5-59,0)
Modérément efficace	17,8	17,1 (8,6-25,6)	11,7	6,6 (2,5-10,7)	16.5	15,3 (8,4-22,2)
Un peu efficace	4,3	7,3 (1,4-13,2)	0,0	s.o.	3.3	6,0 (1,3-10,7)
Pas du tout efficace	0,8	1,4 (0,0-2,7)	1,0	0,2 (0,0-0,3)	0.8	1,1 (0,0-2,3)
Je n'ai pas d'opinion	10,9	14,7 (7,8-21,6)	6,8	5,1 (0,0-13,3)	10.0	13,0 (7,3-18,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.



5.5 Altruisme sexuel

L'échelle « Altruisme sexuel » (Nimmons et al. 1999)¹² vise à mesurer l'altruisme en termes de valeurs, motivations et comportements sexuels susceptibles de prévenir le VIH chez son partenaire ou dans sa communauté. L'échelle originale contient 27 énoncés, répartis en 4 sous-échelles. Une seule d'entre elles a été retenue dans le questionnaire Engage. Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants selon leur niveau d'accord avec chaque énoncé de cette sous-échelle.

Tableau 133 Altruisme sexuel

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)

Les énoncés de cette section portent sur le sexe sécuritaire, c'est-à-dire les moyens pour réduire le risque de transmission du VIH et des autres ITS. Selon les personnes, le sexe sécuritaire peut vouloir dire toujours utiliser le condom lors du sexe anal, prendre la PrEP, choisir des partenaires sexuels du même statut sérologique VIH que soi. Choisissez la réponse qui vous semble la plus juste.

	Tout à fait en désaccord		Plutôt en désaccord		Ni en accord, ni en désaccord		Plutôt en accord		Tout à fait en accord	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Le sexe sécuritaire est la responsabilité de tous	2,7	2,9 (0,6-5,3)	0,5	0,9 (0,3-1,5)	3,3	2,3 (0,8-3,8)	13,2	16,4 (12,5-20,3)	80,4	77,4 (73,0-81,9)
Pratiquer le sexe sécuritaire c'est ce que les hommes gais devraient faire les uns pour les autres.	2,5	2,4 (0,5-4,3)	2,0	2,7 (0,9-4,5)	7,1	5,5 (3,7-7,3)	21,8	22,2 (17,8-26,7)	66,6	67,2 (62,2-72,1)
Pratiquer le sexe sécuritaire c'est faire ma part pour mettre fin à l'épidémie.	3,0	3,5 (1,5-5,6)	2,9	4,2 (3,1-5,4)	9,9	9,1 (5,9-12,3)	22,0	21,4 (17,1-25,6)	62,2	61,7 (56,7-66,8)
Pratiquer le sexe sécuritaire c'est une façon par laquelle je peux aider à protéger la prochaine génération d'hommes gais.	3,0	2,8 (1,1-4,5)	2,8	3,4 (1,9-4,8)	11,0	11,6 (8,1-15,1)	21,9	21,1 (17,1-25,1)	61,2	61,1 (56,1-66,1)
La meilleure façon d'empêcher des hommes gais d'être infectés par le VIH/sida est de pratiquer le sexe sécuritaire.	2,8	2,5 (0,6-4,3)	2,2	1,6 (0,5-2,7)	6,1	5,4 (3,0-7,7)	20,4	19,5 (15,3-23,7)	68,5	71,1 (66,3-75,9)
Je pratique le sexe sécuritaire parce que je veux que la communauté gaie survive.	7,1	6,7 (4,2-9,1)	8,6	6,8 (4,3-9,3)	28,3	27,8 (23,2-32,4)	18,4	18,5 (14,4-22,6)	37,6	40,2 (35,0-45,4)

Proportion de données manquantes 0,9% à 4,2% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Nimmons D, Folkman S. Other-sensitive motivation for safer sex among gay men: expanding paradigms for HIV prevention. *Aids and behavior*. 1999;3(4):313-324. doi:10.1023/A:1025437418276

¹² Nimmons D, Folkman S. Other-sensitive motivation for safer sex among gay men: expanding paradigms for HIV prevention. *Aids and behavior*. 1999;3(4):313-324. doi:10.1023/A:1025437418276



Altruisme sexuel - Calcul des scores

Les participants ayant préféré ne pas répondre à un ou plusieurs des énoncés ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 1 à 5 selon le degré d'accord du participant avec l'énoncé ; le degré « tout à fait en désaccord » équivaut à 1 point tandis que le degré « tout à fait en accord » équivaut à 5 points. Le score d'un participant est obtenu en additionnant les points attribués à chacun des énoncés de la sous-échelle, il varie de 6 à 30. Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant. Une valeur élevée indique que les participants ont davantage d'altruisme sexuel.

Tableau 134 Altruisme sexuel

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)		
Altruisme sexuel		
Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée ¹ (IC 95%)
6-30	26,1 (4,8)	26,1 (25,6-26,7)

Proportion de données manquantes : 5,3%.

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



5.6 Recours à des services d'information au sujet de la santé sexuelle

Tableau 135 Recours à des services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources du domaine de la santé, selon le statut VIH auto-rapporté

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)
 Au cours des 6 derniers mois, avez-vous obtenu de l'information sur votre santé sexuelle par l'une ou l'autre des sources suivantes ? Par exemple, des renseignements sur la transmission du VIH ou la réduction des risques, la PrEP ou la vaccination contre le VPH. (Inscrire une réponse pour chaque source, Cochez tout ce qui s'applique) *

Ressource du domaine de la santé	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=1 179)	
	Négatif ou inconnu (n=968)		Positif (n=211)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Professionnels de la santé (p. ex., médecins, infirmières, conseillers en dépistage du VIH, etc.)	51,4	43,7 (38,2-49,2)	72,0	68,9 (57,7-80,2)	55.1	47,2 (42,1-52,3)
Sites internet de cliniques de santé (p. ex., l'Actuel, Quartier Latin, OPUS, SIDEP+)	26,9	21,3 (16,8-25,8)	27,0	20,5 (11,6-29,4)	26.9	21,2 (17,1-25,3)
Site internet de la santé publique ou d'un autre service gouvernemental	16,0	15,3 (11,4-19,1)	18,0	14,7 (6,1-23,2)	16.4	15,2 (11,6-18,7)
Pharmaciens	10,0	7,4 (4,0-10,8)	25,6	25,6 (15,0-36,2)	12.8	9,9 (6,4-13,3)
Fournisseurs de thérapie individuelle ou de groupe (p. ex., psychologues, travailleurs sociaux, sexologues)	4,8	4,2 (1,5-7,0)	13,7	10,5 (2,7-18,3)	6.4	5,1 (2,5-7,7)
Ligne téléphonique de renseignements généraux sur la santé (p. ex., Info-Santé)	3,2	3,8 (0,9-6,7)	5,7	6,9 (0,6-13,2)	3.6	4,2 (1,5-7,0)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



Tableau 136 Recours à des services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires, selon le statut VIH auto-rapporté

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours des <u>6 derniers mois</u> , avez-vous obtenu de l'information sur votre santé sexuelle par l'une ou l'autre des sources suivantes ? <i>Par exemple, des renseignements sur la transmission du VIH ou la réduction des risques, la PrEP ou la vaccination contre le VPH. (Inscrire une réponse pour chaque source, Cochez tout ce qui s'applique) *</i>						
Ressource communautaire	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=1 179)	
	Négatif ou inconnu (n=968)		Positif (n=211)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Interaction en personne avec un intervenant ou bénévole d'un organisme communautaire (p. ex., REZO, ACCM, Maison Plein Cœur)	11,1	8,7 (5,4-11,9)	19,9	16,2 (7,6-24,7)	12.6	9,7 (6,6-12,8)
Site internet d'un organisme communautaire	11,2	9,9 (6,5-13,2)	14,7	13,9 (6,2-21,7)	11.8	10,4 (7,3-13,6)
Présentation ou atelier d'une seule session (p. ex., REZOtage, Soirées MOBILISE !)	6,6	5,7 (2,8-8,5)	12,3	7,9 (2,1-13,7)	7.6	6,0 (3,4-8,5)
Programmes ou groupes de soutien continus ou à plusieurs sessions (p. ex., Phénix, Ateliers REZO)	3,6	3,9 (1,5-6,3)	11,8	9,6 (2,1-17,1)	5.1	4,7 (2,3-7,1)
Interaction en ligne avec un intervenant ou bénévole d'un organisme communautaire (p. ex., service de messagerie/clavardage sur un site de rencontre ou une appli)	2,2	4,1 (1,7-6,5)	4,3	5,1 (0,0-11,9)	2.5	4,2 (1,9-6,6)
Ligne téléphonique de soutien aux personnes LGBT (p. ex., Gai Écoute)	1,9	3,9 (1,5-6,3)	2,4	1,0 (0,2-1,9)	2.0	3,5 (1,4-5,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



Tableau 137 Recours à des services d'information au sujet de la santé sexuelle diffusés par des medias, selon le statut VIH auto-rapporté

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous obtenu de l'information sur votre santé sexuelle par l'une ou l'autre des sources suivantes ? (Par exemple, des renseignements sur la transmission du VIH ou la réduction des risques, la PrEP ou la vaccination contre le VPH. Inscrire une réponse pour chaque source.) (Cochez tout ce qui s'applique) *

Media	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=1 179)	
	Négatif ou inconnu (n=968)		Positif (n=211)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Médias imprimés ou en ligne s'adressant aux personnes LGBT (blogues, journaux, magazines)	29,5	24,7 (19,6-29,8)	28,9	21,6 (12,3-30,9)	29.4	24,3 (19,7-28,9)
Information sur les applis mobiles gaies/bi (p. ex. Grindr, Scruff, Hornet, dudesnude.com, barebackrt.com)	27,4	27,4 (22,3-32,5)	19,0	13,5 (6,2-20,8)	25.9	25,5 (20,9-30,1)
Médias sociaux en ligne ne s'adressant pas particulièrement aux personnes LGBT (Facebook, Twitter, Tumblr...)	25,6	24,0 (19,3-28,8)	16,6	18,2 (9,6-26,7)	24.0	23,2 (18,9-27,5)
Médias traditionnels ne s'adressant pas particulièrement aux personnes LGBT (magazines, journaux, émissions de télé)	18,7	14,9 (11,1-18,7)	22,3	22,0 (13,0-31,0)	19.3	15,9 (12,3-19,4)
Information sur les sites de réseautage social ou de rencontre sexuelle gaies/bi (p. ex., ManHunt, Adam4Adam, barebackrt.com, etc.)	11,4	10,6 (7,2-14,0)	15,6	11,3 (2,9-19,7)	12.1	10,7 (7,5-13,9)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

Tableau 138 Sujets concernant la prévention du VIH et des ITS discutés avec un autre utilisateur sur un site de rencontre ou une application mobile

Parmi les participants qui ont reçu de l'information sur les applications mobiles gaies/bi et sur les sites de réseautage social ou de rencontre sexuelles gai/bi (n=340)

Au cours des 6 derniers mois, au sujet de quel(s) aspect(s) de la prévention du VIH et des ITS avez-vous « chatté » avec un autre utilisateur (pas un intervenant) sur un site de rencontre ou une appli mobile (téléphone intelligent) comme Grindr, Scruff, etc. ? (Cochez tout ce qui s'applique) *

Aspect	% naj	% aj (IC 95%)
Condoms	76,7	78,0 (69,6-86,5)
Prophylaxie pré-exposition (PrEP)	53,1	46,1 (36,3-55,9)
Charge virale indétectable / Traitement comme outil de prévention (<i>Treatment as Prevention</i> ou TasP)	36,5	20,0 (13,6-26,4)
Test du VIH ou des ITS dans une clinique ou chez son médecin de famille	31,6	23,2 (15,9-30,5)
Prophylaxie post-exposition (PPE)	10,7	9,5 (3,7-15,2)
Accès au test du VIH ou des ITS par le biais d'un service en ligne	5,5	3,2 (2,1-4,3)
Vaccin contre le VPH	3,4	1,7 (0,2-3,1)
Services de réduction des méfaits (p. ex., échange de seringues)	3,1	2,0 (0,8-3,2)
Autre	1,2	1,0 (0,0-2,4)
Ne s'applique pas	11,7	14,0 (7,0-21,0)

Proportion de données manquantes : 4,1%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



Tableau 139 Sujets concernant la prévention du VIH et des ITS discutés en personne avec quelqu'un dont on a fait la connaissance sur un site Internet ou sur une application de rencontre

Parmi les participants qui ont reçu de l'information sur les applications mobiles gaies/bi et sur les sites de réseautage social ou de rencontre sexuelles gai/bi (n=340)
Au cours des 6 derniers mois, de quel(s) aspect(s) de la prévention du VIH et des ITS avez-vous discuté en personne avec quelqu'un dont vous avez fait la connaissance sur un site ou appli de rencontre sexuelle ? (Cochez tout ce qui s'applique) *

Aspects de prévention	% naj	% aj (IC 95%)
Condoms	76,5	81,0 (73,1-88,9)
Prophylaxie pré-exposition (PrEP)	52,3	51,1 (41,1-61,1)
Charge virale indétectable / Traitement comme outil de prévention (<i>Treatment as Prevention</i> ou TasP)	31,8	16,6 (10,6-22,6)
Test du VIH ou des ITS dans une clinique ou chez son médecin de famille	29,4	24,7 (16,2-33,3)
Prophylaxie post-exposition (PPE)	13,1	10,9 (5,5-16,4)
Accès au test du VIH ou des ITS par le biais d'un service en ligne	6,7	5,9 (2,9-8,8)
Services de réduction des méfaits (p. ex., échange de seringues)	3,4	3,7 (1,0-6,4)
Vaccin contre le VPH	3,1	1,2 (0,5-1,8)
Autre	2,1	1,2 (0,0-2,6)
Non applicable (il n'y a pas eu une discussion en personne)	10,7	10,9 (4,3-17,4)

Proportion de données manquantes : 3,8%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

Tableau 140 Difficulté perçue pour obtenir de l'information ou des services de counseling au sujet de sa santé sexuelle

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)
Actuellement, à quel point vous est-il facile d'obtenir de l'information ou des services de counseling au sujet de votre santé sexuelle ?

	% naj	% aj (IC 95%)
Très facile	41,6	33,5 (28,6-38,4)
Facile	48,7	51,6 (46,4-56,9)
Difficile	8,8	13,7 (10,1-17,2)
Très difficile	1,0	1,2 (0,7-1,6)

Proportion de données manquantes : 2,0%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 141 Recours à des services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires, selon le statut VIH auto-rapporté

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours des 6 derniers mois , avez-vous obtenu de l'information sur votre santé sexuelle par l'une ou l'autre des sources suivantes ? (Par exemple, des renseignements sur la transmission du VIH ou la réduction des risques, la PrEP ou la vaccination contre le VPH. Inscrire une réponse pour chaque source.) (Cochez tout ce qui s'applique) *						
Ressource communautaire	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=1 179)	
	Négatif ou inconnu (n=968)		Positif (n=211)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Interaction en personne avec un intervenant ou bénévole d'un organisme communautaire (p. ex., REZO, ACCM, Maison Plein Cœur)	11,1	8,7 (5,4-11,9)	19,9	16,2 (7,6-24,7)	12.6	9,7 (6,6-12,8)
Site internet d'un organisme communautaire	11,2	9,9 (6,5-13,2)	14,7	13,9 (6,2-21,7)	11.8	10,4 (7,3-13,6)
Présentation ou atelier d'une seule session (p. ex., REZOtage, Soirées MOBILISE !)	6,6	5,7 (2,8-8,5)	12,3	7,9 (2,1-13,7)	7.6	6,0 (3,4-8,5)
Programmes ou groupes de soutien continus ou à plusieurs sessions (p. ex., Phénix, Ateliers REZO)	3,6	3,9 (1,5-6,3)	11,8	9,6 (2,1-17,1)	5.1	4,7 (2,3-7,1)
Interaction en ligne avec un intervenant ou bénévole d'un organisme communautaire (p. ex., service de messagerie/clavardage sur un site de rencontre ou une appli)	2,2	4,1 (1,7-6,5)	4,3	5,1 (0,0-11,9)	2.5	4,2 (1,9-6,6)
Ligne téléphonique de soutien aux personnes LGBT (p. ex., Gai Écoute)	1,9	3,9 (1,5-6,3)	2,4	1,0 (0,2-1,9)	2.0	3,5 (1,4-5,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



Tableau 142 Recours à des services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires – interaction en personne avec un intervenant ou bénévole

Parmi les participants ayant obtenu de l'information sur leur santé sexuelle à travers d'une interaction en personne avec un intervenant ou bénévole d'un organisme communautaire (n=149)
La dernière fois que vous avez reçu des informations ou avez participé à une activité sur la santé sexuelle, quel(s) organisme(s) communautaire(s) vous avait fourni ces informations ou le service en question ? (Cochez tout ce qui s'applique)

Organisme Communautaire	% naj	% aj (IC 95%)
RÉZO	25,5	28,5 (14,5-42,5)
AIDS Community Care Montreal (ACCM)	25,5	24,2 (11,5-36,8)
Cocaïnomanes Anonyme	1,3	5,0 (0,5-9,5)
COCQ-SIDA	3,4	3,7 (0,0-11,7)
Maison Plein Coeur	5,4	3,1 (1,3-4,8)
ASSTEQ	4,0	2,4 (1,2-3,7)
GRIS-Montréal	4,0	2,2 (0,0-5,4)
Centre Jeunesse West-Island	1,3	1,1 (0,0-4,6)
Alterhéros	0,7	1,0 (0,5-1,4)
HELEM	0,7	1,0 (0,4-1,5)
Crystal Meth Anonyme	0,7	0,6 (0,0-2,9)
Astérisk	0,7	0,3 (0,1-0,5)
Gai Écoute	1,3	0,2 (0,0-0,4)
Arc-en-Ciel d'Afrique	0,0	s.o.
Jeunesse Lambda	0,0	s.o.
Projet 10	0,0	s.o.
SIDA-VIE Laval	0,0	s.o.
Je ne sais pas/Je ne me souviens pas	21,5	16,1 (3,6-28,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

Tableau 143 Niveau de satisfaction par rapport aux services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires - interaction en personne avec un intervenant ou un bénévole

Parmi les participants ayant obtenu de l'information sur leur santé sexuelle à travers d'une interaction en personne avec un intervenant ou bénévole d'un organisme communautaire (n=149)
Dans l'ensemble, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à l'information ou au service que vous avez reçu ?

Niveau de satisfaction	% naj	% aj (IC 95%)
Pas du tout satisfait	0,0	s.o.
Un peu satisfait	17,4	24,2 (11,2-37,2)
Modérément satisfait	77,5	68,3 (54,8-81,8)
Très satisfait	5,1	7,5 (2,6-12,5)

Proportion de données manquantes : 7,4%

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 144 Recours à des services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires – Site internet d'un organisme communautaire

<i>Parmi les participants ayant obtenu de l'information sur leur santé sexuelle à travers d'une site internet d'un organisme communautaire (n=139)</i> La dernière fois que vous avez reçu des informations ou avez participé à une activité sur la santé sexuelle, quel(s) organisme(s) communautaire(s) vous avait(ent) fourni ces informations ou le service en question ? (Cochez tout ce qui s'applique)		
Organisme Communautaire	% naj	% aj (IC 95%)
RÉZO	35,3	25,4 (14,4-36,5)
AIDS Community Care Montreal (ACCM)	31,7	25,3 (11,2-39,3)
GRIS-Montréal	11,5	19,0 (4,6-33,3)
Gai Écoute	6,5	13,9 (0,0-27,8)
Jeunesse Lambda	0,7	4,5 (0,0-13,0)
COCQ-SIDA	13,7	3,6 (0,8-6,4)
Crystal Meth Anonyme	4,3	2,9 (0,0-7,3)
ASSTEQ	2,9	2,3 (0,0-6,2)
Astérisk	2,2	2,2 (1,0-3,4)
Maison Plein Coeur	4,3	1,8 (0,0-5,8)
Projet 10	2,9	1,9 (0,0-4,0)
Centre Jeunesse West-Island	1,4	1,0 (0,0-5,1)
Alterhéros	1,4	0,2 (0,0-0,5)
Arc-en-Ciel d'Afrique	0,0	s.o.
Cocaïnomanes Anonyme	0,0	s.o.
HELEM	0,0	s.o.
SIDA-VIE Laval	0,0	s.o.
Je ne sais pas/Je ne me souviens pas	28,1	31,4 (18,1-44,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

Tableau 145 Niveau de satisfaction par rapport aux services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires – Site internet d'un organisme communautaire

<i>Parmi les participants ayant obtenu de l'information sur leur santé sexuelle à travers d'une site internet d'un organisme communautaire (n=139)</i> Dans l'ensemble, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à l'information ou au service que vous avez reçu ?		
Niveau de satisfaction	% naj	% aj (IC 95%)
Pas du tout satisfait	1,5	10,1 (0,0-23,9)
Un peu satisfait	5,3	8,0 (0,0-17,0)
Modérément satisfait	27,5	23,4 (9,6-37,3)
Très satisfait	65,6	58,4 (41,8-75,0)

Proportion de données manquantes :

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 146 Recours à des services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires – Présentation ou atelier d'une seule session

Parmi les participants ayant obtenu de l'information sur leur santé sexuelle à travers d'une présentation ou atelier d'une seule session (n=90)
La dernière fois que vous avez reçu des informations ou avez participé à une activité sur la santé sexuelle, quel(s) organisme(s) communautaire(s) vous avait(ent) fourni ces informations ou le service en question ? (Cochez tout ce qui s'applique)

Organisme Communautaire	% naj
RÉZO	42,2
AIDS Community Care Montreal (ACCM)	32,2
Maison Plein Coeur	12,2
COCQ-SIDA	10,0
Gai Écoute	6,7
ASSTÉQ	5,6
Astérisk	4,4
GRIS-Montréal	4,4
Crystal Meth Anonyme	3,3
Alterhéros	2,2
Arc-en-Ciel d'Afrique	2,2
Jeunesse Lambda	2,2
Projet 10	2,2
Centre Jeunesse West-Island	1,1
Cocaïnomanes Anonyme	1,1
HELEM	0,0
SIDA-VIE Laval	0,0
Je ne sais pas/Je ne me souviens pas	18,9

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.

Tableau 147 Niveau de satisfaction par rapport aux services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires – Présentation ou atelier d'une seule session

Parmi les participants ayant obtenu de l'information sur leur santé sexuelle à travers d'une présentation ou atelier d'une seule session (n=90)
Dans l'ensemble, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à l'information ou au service que vous avez reçu ?

Niveau de satisfaction	% naj
Pas du tout satisfait	1,2
Un peu satisfait	4,9
Modérément satisfait	14,6
Très satisfait	79,3

Proportion de données manquantes :

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



Tableau 148 Recours à des services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires – Programmes ou groupes de soutien continus ou à plusieurs sessions

Parmi les participants ayant obtenu de l'information sur leur santé à travers des programmes ou des groupes de soutien continus ou à plusieurs sessions (n=60)
La dernière fois que vous avez reçu des informations ou avez participé à une activité sur la santé sexuelle, quel(s) organisme(s) communautaire(s) vous avait(ent) fourni ces informations ou le service en question ? (Cochez tout ce qui s'applique)

Organisme Communautaire	% naj
RÉZO	38,3
AIDS Community Care Montreal (ACCM)	35,0
Maison Plein Coeur	23,3
COCQ-SIDA	13,3
ASSTEQ	6,7
Crystal Meth Anonyme	5,0
Astérisk	3,3
GRIS-Montréal	3,3
Arc-en-Ciel d'Afrique	1,7
HELEM	1,7
Jeunesse Lambda	1,7
Projet 10	1,7
Alterhéros	0,0
Centre Jeunesse West-Island	0,0
Cocaïnomanes Anonyme	0,0
Gai Écoute	0,0
SIDA-VIE Laval	0,0
Je ne sais pas/Je ne me souviens pas	11,7

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.

Tableau 149 Niveau de satisfaction par rapport aux services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires - Programmes ou groupes de soutien continus ou à plusieurs sessions

Parmi les participants ayant obtenu de l'information sur leur santé à travers des programmes ou des groupes de soutien continus ou à plusieurs sessions (n=60)
Dans l'ensemble, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à l'information ou au service que vous avez reçu ?

Niveau de satisfaction	% naj
Pas du tout satisfait	0,0
Un peu satisfait	5,6
Modérément satisfait	20,8
Très satisfait	73,6

Proportion de données manquantes :

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



Tableau 150 Recours à des services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires – Interaction en ligne avec un intervenant ou bénévole d'un organisme communautaire

Parmi les participants ayant obtenu de l'information sur leur santé à travers d'une Interaction en ligne avec un intervenant ou bénévole d'un organisme communautaire (n=30)
La dernière fois que vous avez reçu des informations ou avez participé à une activité sur la santé sexuelle, quel(s) organisme(s) communautaire(s) vous avait fourni ces informations ou le service en question ? (Cochez tout ce qui s'applique.)

Organisme Communautaire	% naj
AIDS Community Care Montreal (ACCM)	23,3
RÉZO	13,3
Cocaïnomanes Anonyme	6,7
COCQ-SIDA	3,3
Crystal Meth Anonyme	3,3
Gai Écoute	3,3
GRIS-Montréal	3,3
Alterhéros	0,0
Arc-en-Ciel d'Afrique	0,0
ASSTEQ	0,0
Astérisk	0,0
Centre Jeunesse West-Island	0,0
HELEM	0,0
Jeunesse Lambda	0,0
Maison Plein Coeur	0,0
Projet 10	0,0
SIDA-VIE Laval	0,0
Je ne sais pas/Je ne me souviens pas	40,0

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.

Tableau 151 Niveau de satisfaction par rapport aux services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires – Interaction en ligne avec un intervenant ou bénévole d'un organisme communautaire

Parmi les participants ayant obtenu de l'information sur leur santé à travers d'une Interaction en ligne avec un intervenant ou bénévole d'un organisme communautaire (n=30)
Dans l'ensemble, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à l'information ou au service que vous avez reçu ?

Niveau de satisfaction	% naj
Pas du tout satisfait	0,0
Un peu satisfait	8,0
Modérément satisfait	28,0
Très satisfait	64,0

Proportion de données manquantes :

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



Tableau 152 Recours à des services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires – Ligne téléphonique de soutien aux personnes LGBT

Parmi les participants ayant obtenu de l'information sur leur santé à travers d'une ligne téléphonique de soutien aux personnes LGBT (n=23)

La dernière fois que vous avez reçu des informations ou avez participé à une activité sur la santé sexuelle, quel(s) organisme(s) communautaire(s) vous avait fourni ces informations ou le service en question ? (Cochez tout ce qui s'applique)

Organisme Communautaire	% naj
RÉZO	26,1
Gai Écoute	21,7
AIDS Community Care Montreal (ACCM)	17,4
Crystal Meth Anonyme	13,0
GRIS-Montréal	13,0
Cocainomanes Anonyme	8,7
Arc-en-Ciel d'Afrique	4,3
Alterhéros	0,0
ASSTEQ	0,0
Astérisk	0,0
Centre Jeunesse West-Island	0,0
COCQ-SIDA	0,0
HELEM	0,0
Jeunesse Lambda	0,0
Maison Plein Coeur	0,0
Projet 10	0,0
SIDA-VIE Laval	0,0
Je ne sais pas/Je ne me souviens pas	17,4

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.

Tableau 153 Niveau de satisfaction par rapport aux services d'information au sujet de la santé sexuelle prodigués par des ressources communautaires – Ligne téléphonique de soutien aux personnes LGBT

Parmi les participants ayant obtenu de l'information sur leur santé à travers d'une ligne téléphonique de soutien aux personnes LGBT (n=23)

Dans l'ensemble, quel est votre niveau de satisfaction par rapport à l'information ou au service que vous avez reçu ?

Niveau de satisfaction	% naj
Pas du tout satisfait	0,0
Un peu satisfait	22,2
Modérément satisfait	33,3
Très satisfait	44,4

Proportion de données manquantes :

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



Tableau 154 Campagnes, services et interventions de prévention

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Avez-vous entendu parler des programmes, interventions ou services suivants ?		
Programmes, interventions ou services	% naj	% aj (IC 95%)
Ateliers RÉZO	50,3	33,5 (28,9-38,2)
Dépistage à RÉZO	42,4	30,4 (26,0-34,9)
Intervention RÉZO	33,5	20,0 (16,6-23,4)
Soirées RÉZOtage	24,9	14,5 (11,3-17,6)
Clinique SIDEp+	12,5	10,2 (7,0-13,4)
Arc-en-ciel d'Afrique	17,7	9,9 (7,1-12,8)
MOBILISE!	13,3	6,9 (4,6-9,2)
Kontak	13,0	6,9 (4,8-9,1)
ASTTEQ	9,1	5,5 (3,2-7,9)
Phénix	9,9	4,2 (2,9-5,4)
Entraide Positive	6,9	3,8 (2,0-5,6)
Charte OK	5,9	3,3 (1,9-4,7)
Jack & Jacques	4,4	1,9 (0,6-3,2)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 155 Campagnes, services et interventions de prévention

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Avez-vous vu le matériel des campagnes publicitaires suivantes ?		
Matériel des campagnes publicitaires	% naj	% aj (IC 95%)
Campagne de REZO sur la PrEP, la PPE ou la charge virale indétectable RÉZO	30,0	20,3 (16,4-24,2)
Sexe au Menu	16,5	12,3 (9,2-15,4)
Prêt pour l'action	13,9	9,9 (6,9-12,9)
J'Pense Positif	7,9	6,2 (3,9-8,5)
Soirée Légendaire, Un Dépistage C'est Clair	4,9	2,3 (1,0-3,7)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



5.7 Accès au matériel de prévention du VIH/ITSS

Tableau 156 Sentir le besoin d'utiliser du matériel de prévention lors des relations sexuelles

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours des 6 derniers mois, avez-vous senti le besoin d'utiliser le matériel suivant lors de vos relations sexuelles avec d'autres hommes ?		
Matériel	% naj	% aj (IC 95%)
Condoms standards en latex	72,1	69,0 (64,4-73,5)
Condoms particuliers (p. ex., grands, non lubrifiés, en polyuréthane, extramince, insertifs ou condoms féminins)	30,9	28,2 (23,6-32,9)
Lubrifiant personnel (à base d'eau ou de silicone)	85,8	81,2 (77,4-84,9)
Gants (en latex ou nitrile)	9,2	8,1 (4,9-11,3)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 157 Difficulté d'obtenir le matériel de prévention nécessaire

Parmi les participants qui ont senti le besoin d'utiliser le matériel mentionné lors de leurs relations sexuelles avec d'autres hommes								
Actuellement, à quel point vous est-il facile d'obtenir le matériel dont vous avez besoin ?								
Matériel	Très facile		Facile		Difficile		Très difficile	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Condoms standards en latex (n=850)	82,7	77,6 (72,6-82,7)	16,5	21,1 (16,2-26,0)	0,7	1,1 (0,0-2,7)	0,1	0,1 (0,0-0,6)
Condoms particuliers (p. ex.grands, non lubrifiés, en polyuréthane, extramince, insertifs ou condoms féminins) (n=364)	60,2	54,2 (45,1-63,2)	29,6	30,4 (22,4-38,5)	8,0	12,9 (7,1-18,7)	2,2	2,4 (0,0-4,9)
Lubrifiant personnel (à base d'eau ou de silicone) (n=1012)	71,1	65,6 (60,2-71,1)	24,4	29,1 (23,9-34,3)	4,2	5,1 (2,7-7,5)	0,3	0,2 (0,0-0,6)
Gants (en latex ou nitrile) (n=108)	54,7	54,5 (36,3-72,8)	29,2	27,9 (13,7-42,1)	14,2	16,8 (0,9-32,6)	1,9	0,8 (0,3-1,2)

Proportion de données manquantes : 0,1% à 1,9 selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 158 Proportion des condoms utilisés qui a été obtenue gratuitement auprès d'organismes, de services de santé ou d'autres sources

<i>Parmi les participants ayant senti le besoin d'utiliser les condoms lors de leurs relations sexuelles avec d'autres hommes : (n=904)</i> Quelle proportion de tous les condoms que vous avez utilisés au cours des 6 derniers mois avez-vous obtenue gratuitement auprès d'organismes communautaires, de cliniques, de services de santé publique ou de lieux gais comme les saunas ou les bars ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Aucun condom (0%)	21,8	27,1 (21,8-32,4)
Moins de la moitié (< 50%)	21,4	20,2 (15,6-24,7)
Plus de la moitié (> 50%)	21,5	21,0 (15,4-26,5)
Tous les condoms (100 %)	35,3	31,7 (25,9-37,5)

Proportion de données manquantes : 3,4%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 159 Satisfaction de la quantité et de la qualité des condoms obtenus gratuitement auprès d'organismes, de services de santé ou d'autres sources

<i>Parmi les participants qui ont obtenu des condoms gratuitement au cours des 6 derniers mois (n=714)</i> Dans l'ensemble, à quel point êtes-vous satisfait de la quantité et de la qualité des condoms que vous obtenez gratuitement auprès d'organismes communautaires, de cliniques, de services de santé publique ou de lieux gais comme les saunas ou les bars ?								
Critère	Pas du tout satisfait		Un peu satisfait		Modérément satisfait		Totalemtent satisfait	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Quantité des condoms obtenus	0,7	0,4 (0,0-1,1)	6,1	5,9 (2,7-9,0)	17,9	22,8 (16,6-29,0)	75,3	70,9 (64,4-77,4)
Qualité des condoms obtenus	2,5	2,1 (0,6-3,7)	10,8	10,1 (6,3-14,0)	30,9	34,9 (28,3-41,5)	55,9	52,9 (46,0-59,8)

Proportion de données manquantes : 3,8%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 160 Proportion du lubrifiant utilisé qui a été obtenue gratuitement auprès d'organismes, de services de santé ou d'autres sources

<i>Parmi les participants ayant senti le besoin d'utiliser les condoms lors de leurs relations sexuelles avec d'autres hommes : (n=1012)</i> Quelle proportion de tout le lubrifiant que vous avez utilisé au cours des 6 derniers mois avez-vous obtenue gratuitement auprès d'organismes communautaires, de cliniques, de services de santé publique ou de lieux gais comme les saunas ou les bars ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Aucun lubrifiant (0%)	45,5	49,9 (44,3-55,5)
Moins de la moitié (< 50%)	27,5	23,7 (18,9-28,6)
Plus de la moitié (> 50%)	13,4	11,1 (7,3-15,0)
Tout le lubrifiant (100 %)	13,6	15,2 (11,1-19,4)

Proportion de données manquantes : 2,0%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 161 Satisfaction de la quantité et de la qualité du lubrifiant obtenu gratuitement auprès d'organismes, de services de santé ou d'autres sources

<i>Parmi les participants qui ont obtenues de lubrifiant gratuitement au cours des 6 derniers mois (n=561)</i> Dans l'ensemble, à quel point êtes-vous satisfait de la quantité et de la qualité du lubrifiant que vous obtenez gratuitement auprès d'organismes communautaires, de cliniques, de services de santé publique ou de lieux gais comme les saunas ou les bars ?								
Critère	Pas du tout satisfait		Un peu satisfait		Modérément satisfait		Totalement satisfait	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Quantité du lubrifiant obtenu	6,6	6,3 (2,4-10,1)	16,2	19,1 (13,2-25,0)	32,3	25,1 (19,0-31,2)	44,8	49,5 (41,6-57,4)
Qualité du lubrifiant obtenu	7,6	7,3 (3,6-11,1)	19,6	20,1 (14,4-25,7)	34,6	29,4 (21,8-37,1)	38,2	43,2 (35,3-51,0)

Proportion de données manquantes : 3,4% à 4,3% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



5.8 Soutien d'un professionnel de la santé

Tableau 162 Accès à un professionnel de santé

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)

Avez-vous actuellement un professionnel régulier pour des soins médicaux généraux, c'est-à-dire un professionnel de la santé que vous pouvez consulter pour des examens médicaux de routine ou des préoccupations de santé spécifiques ?

Les professionnels réguliers pour des soins médicaux généraux peuvent inclure les médecins de famille, les infirmières praticiennes, les cliniques sans rendez-vous et les centres de santé interdisciplinaires, entre autres.

	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=1 179)	
	VIH – ou inconnu (n=968)		VIH + (n=211)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	61,9	54,5 (48,9-60,0)	93,4	93,4 (88,1-98,7)	67.5	59,8 (54,7-64,8)
Non	38,1	45,5 (40,0-51,1)	6,6	6,6 (1,3-11,9)	32.5	40,2 (35,2-45,3)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 163 Fréquence des visites chez un professionnel de santé régulier

Parmi les participants qui ont un professionnel régulier pour des soins médicaux généraux (n=796)

À quelle fréquence voyez-vous votre professionnel régulier pour des soins médicaux généraux ?

Fréquence	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=796)	
	VIH – ou inconnu (n=599)		VIH + (n=197)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
4 fois par année ou plus	23,4	28,9 (22,2-35,5)	63,1	63,7 (52,3-75,0)	33.2	36,5 (30,5-42,4)
2 à 3 fois par année	38,5	36,0 (29,3-42,7)	31,3	30,1 (20,5-39,8)	36.7	34,7 (29,2-40,2)
Une fois par année	27,1	21,6 (16,1-27,1)	3,6	3,1 (0,0-6,9)	21.3	17,5 (13,2-21,9)
Une fois tous les 2 à 3 ans	8,4	10,0 (5,1-14,9)	1,5	2,9 (0,0-10,9)	6.7	8,5 (4,4-12,5)
Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu mon professionnel régulier pour des soins médicaux généraux.	2,7	3,6 (0,9-6,3)	0,5	0,1 (0,0-0,4)	2.2	2,8 (0,8-4,9)

Proportion de données manquantes : 0,7% parmi les participants de statut VIH- ou inconnu ; 1,0% parmi les participants VIH+.
naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 164 Connaissance par le professionnel de santé régulier du fait que le participant a des relations sexuelles avec des hommes

Parmi les participants qui ont un professionnel régulier pour des soins médicaux généraux (n=796)						
Est-ce que votre professionnel régulier pour des soins médicaux généraux actuel sait que vous avez des relations sexuelles avec des hommes ?						
	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=796)	
	VIH – ou inconnu (n=599)		VIH + (n=197)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	82,6	68,9 (62,4-75,4)	97,5	95,3 (87,7-100,0)	86,3	74,5 (69,3-79,8)
Non	11,8	19,3 (13,2-25,4)	1,5	3,9 (0,0-11,3)	9,1	15,6 (10,6-20,6)
Je ne sais pas/je ne me souviens pas	6,3	14,6 (10,3-18,9)	1,0	0,8 (0,0-3,0)	5,0	11,7 (8,4-15,0)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 165 Aisance de poser au professionnel de santé régulier des questions concernant la santé des gbHARSAH

Parmi les participants qui ont un professionnel régulier pour des soins médicaux généraux (n=796) Vous sentez-vous à l'aise de parler à votre professionnel régulier pour des soins médicaux généraux de questions de santé touchant spécifiquement les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ?						
	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=796)	
	VIH – ou inconnu (n=599)		VIH + (n=197)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	83,9	75,6 (69,2-82,1)	92,8	91,5 (83,1-99,9)	86.1	79,0 (73,8-84,3)
Non	16,1	24,4 (17,9-30,8)	7,2	8,5 (0,1-16,9)	13.9	21,0 (15,7-26,2)

Proportion de données manquantes : 1,5% parmi les participants de statut VIH- ou inconnu ; 1,0% parmi les participants de statut VIH+

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 166 Consultation d'un professionnel de santé différent du prestataire régulier de soins en ce qui a trait à la santé sexuelle

Parmi les participants qui ont un professionnel régulier pour des soins médicaux généraux (n=796) Consultez-vous un professionnel de la santé différent de votre prestataire régulier de soins primaire (ou une clinique différente) pour vos questions liées à la santé sexuelle, vos dépistages d'ITS ou vos traitements d'ITS ?						
	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=796)	
	VIH – ou inconnu (n=599)		VIH + (n=197)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	44,5	43,7 (36,7-50,8)	23,1	31,4 (19,1-43,7)	39.2	41,1 (35,1-47,1)
Non	55,5	56,3 (49,2-63,3)	76,9	68,6 (56,3-80,9)	60.8	58,9 (52,9-64,9)

Proportion de données manquantes : 1% parmi les participants de statut VIH- ou inconnu et parmi les participants de statut VIH+

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



6

Mesures de prévention

Application des stratégies
de réduction des risques



6 Mesures de prévention — Application des stratégies de réduction des risques

6.1 Sérotriage

Parmi les participants de statut VIH+, 56,6% (IC 95% : 43,5% - 69,6%) ont eu, au cours des 6 derniers mois, au moins 1 partenaire séronégatif au VIH et 13,9% (IC 95% : 5,0% - 22,8%) ont eu 5 partenaires ou plus.

Parmi ces participants, 48,2% (IC 95% : 35,0% - 61,3%) ont eu au moins un partenaire dont le statut VIH leur était inconnu et 21,7% (IC 95% : 12,3% - 31,2%) ont eu 5 partenaires ou plus dont le statut VIH leur était inconnu

Parmi les participants de statut VIH- ou inconnu, 17,0% (IC 95% : 12,5% - 21,6%) ont eu, au cours des 6 derniers mois, au moins un partenaire séropositif au VIH et 1,6% (IC 95% : 0,0% - 3,4%) ont eu 5 partenaires ou plus.

Parmi ces participants, 49,6% (IC 95% : 43,6% - 55,7%) ont eu au moins un partenaire dont le statut VIH leur était inconnu et 15,9% (IC 95% : 11,7% - 20,0%) ont eu 5 partenaires ou plus dont le statut VIH leur était inconnu.

Tableau 167 Nombre de partenaires sexuels masculins selon le statut VIH auto rapporté

Parmi les participants qui ont eu des relations sexuelles oral ou anal (n=1146) Combien des hommes avec qui vous avez eu des relations sexuelles avec pénétration ORALE ou ANALE au cours des 6 derniers mois...						
	Statut VIH auto-rapporté par le participant				Total (n=1146)	
	VIH – ou inconnu (n=944)		VIH + (n=202)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Étaient séropositifs au VIH ?						
0	77,8	83,0 (78,4-87,5)	25,9	31,9 (20,0-43,7)	68,3	76,1 (71,5-80,7)
1	11,0	11,6 (7,7-15,5)	21,2	31,1 (20,2-41,9)	12,9	14,2 (10,4-18,0)
2-4	7,1	3,8 (1,7-5,9)	18,0	15,2 (5,4-24,9)	9,1	5,3 (2,9-7,7)
5-9	2,5	0,8 (0,2-1,5)	14,3	10,8 (3,1-18,4)	4,6	2,2 (0,9-3,4)
10 ou plus	1,5	0,8 (0,0-2,5)	20,6	11,1 (4,7-17,6)	5,0	2,2 (0,4-3,9)
Étaient séronégatifs au VIH ?						
0	21,6	27,3 (22,1-32,6)	37,1	43,4 (30,4-56,5)	24,2	29,4 (24,5-34,2)
1	22,0	26,6 (21,0-32,2)	22,9	28,1 (16,5-39,6)	22,1	26,8 (21,8-31,8)
2-4	26,7	24,7 (19,8-29,7)	16,5	14,7 (4,7-24,7)	25,0	23,5 (19,0-27,9)
5-9	14,6	13,3 (9,7-16,9)	14,1	8,0 (1,7-14,2)	14,5	12,6 (9,4-15,8)
10 ou plus	15,1	8,1 (4,8-11,3)	9,4	5,9 (0,0-12,5)	14,2	7,8 (4,8-10,7)
Avaient un statut sérologique VIH qui vous était inconnu (ou dont vous n'étiez pas certain) ?						
0	42,3	50,4 (44,3-56,4)	42,2	51,8 (38,7-65,0)	42,3	50,6 (44,9-56,2)
1	13,4	14,1 (9,6-18,6)	11,2	6,2 (0,9-11,5)	13,1	13,1 (9,1-17,1)
2-4	20,3	19,7 (14,6-24,7)	18,6	20,2 (8,0-32,4)	20,0	19,7 (15,0-24,5)
5-9	11,2	7,6 (4,7-10,4)	12,4	7,3 (2,9-11,7)	11,4	7,5 (5,0-10,1)
10 ou plus	12,7	8,3 (5,1-11,5)	15,5	14,4 (5,9-22,8)	13,2	9,1 (6,1-12,1)

Proportion de données manquantes : 8,8% à 14,9% selon l'item parmi les participants de statut VIH- ou inconnu (n=968) ; 6,6% à 20,3% selon l'item parmi les participants de statut VIH+ (n=211).

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 168 S'informer du statut sérologique VIH de son/ses partenaire(s), selon le statut VIH auto-rapporté

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)						
Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence vous êtes-vous informez du statut sérologique VIH des hommes avec qui vous avez eu des relations sexuelles ?						
Fréquence	Statut VIH auto-rapporté par le participant				Total (n=1 179)	
	Négatif ou inconnu (n=968)		Positif (n=211)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais (0 %)	22,4	25,9 (21,1-30,7)	27,9	40,7 (28,4-53,0)	23,4	27,9 (23,2-32,5)
Rarement (moins de 25 % du temps)	15,6	14,7 (11,1-18,2)	15,9	17,1 (8,5-25,6)	15,6	15,0 (11,7-18,3)
Parfois (25-49 % du temps)	9,4	10,2 (6,3-14,1)	10,4	10,4 (3,7-17,1)	9,6	10,2 (6,7-13,7)
Souvent (50-74 % du temps)	10,2	8,8 (5,6-12,0)	7,5	2,8 (0,6-5,0)	9,7	8,0 (5,2-10,7)
Presque tout le temps (75-99 % du temps)	19,5	16,5 (12,5-20,5)	15,9	9,1 (3,4-14,7)	18,9	15,5 (12,0-19,0)
Tout le temps (100 % du temps)	22,9	24,0 (18,8-29,1)	22,4	19,9 (10,2-29,7)	22,8	23,4 (18,7-28,1)

Proportion de données manquantes : 9% parmi les participants de statut VIH- ou inconnu (N = 968) ; 4,7% parmi les participants VIH+ (N = 211)

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 169 Informer son/ses partenaire(s) de son statut sérologique VIH, selon le statut VIH auto-rapporté

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)						
Au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous informé vos partenaires sexuels de votre statut sérologique VIH avant d'avoir des relations sexuelles ?						
Fréquence	Statut VIH auto-rapporté par le participant				Total (n=1 179)	
	Négatif ou inconnu (n=968)		Positif (n=211)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais (0 %)	24,0	27,5 (22,9-32,2)	19,6	30,0 (19,9-40,2)	23,3	27,9 (23,5-32,2)
Rarement (moins de 25 % du temps)	13,8	13,5 (10,1-16,8)	12,3	11,1 (2,8-19,4)	13,5	13,1 (10,0-16,3)
Parfois (25-49 % du temps)	9,9	9,1 (5,3-12,8)	10,8	13,2 (5,9-20,4)	10,0	9,6 (6,2-13,0)
Souvent (50-74 % du temps)	11,0	9,9 (6,3-13,6)	9,8	8,6 (2,4-14,9)	10,8	9,8 (6,5-13,0)
Presque tout le temps (75-99 % du temps)	15,1	9,5 (6,5-12,4)	15,2	8,7 (3,4-14,0)	15,2	9,4 (6,7-12,0)
Tout le temps (100 % du temps)	26,2	30,5 (25,0-36,1)	32,4	28,4 (16,9-40,0)	27,3	30,2 (25,1-35,4)

Proportion de données manquantes : 2,5% parmi les participants de statut VIH- ou inconnu (N = 968) ; 3,3% parmi les participants VIH+ (N = 211)

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 170 Présumer du statut sérologique VIH de ses partenaires

Parmi les participants qui ont eu des relations sexuelles avec pénétration anale ou frontale/vaginale au cours des 6 derniers mois (n=1067)

Au cours des 6 derniers mois, lorsque vous avez eu des relations sexuelles avec pénétration anale ou frontale/vaginale avec un homme qui ne vous avait pas informé de son statut sérologique VIH (ou avec qui vous n’aviez pas discuté de statut sérologique VIH) :

	Statut VIH auto-rapporté par le participant				Total (n=1067)	
	VIH – ou inconnu (n=881)		VIH + (n=186)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Vous avez pris pour acquis qu’il était séropositif au VIH	7,1	8,6 (3,8-13,4)	43,1	46,2 (32,2-60,1)	13,0	12,8 (8,1-17,4)
Vous avez pris pour acquis qu’il était séronégatif au VIH	47,4	56,1 (49,9-62,3)	9,8	13,7 (4,3-23,0)	41,3	51,4 (45,6-57,2)
Vous n’avez pas pris pour acquis qu’il était séropositif ou séronégatif au VIH	45,5	35,3 (29,5-41,0)	47,1	40,2 (26,2-54,2)	45,7	35,8 (30,4-41,2)

Proportion de données manquantes : 10,7% parmi les participants de statut VIH- ou inconnu (N = 968) ; 17,7% parmi les participants VIH+ (N = 211)

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 171 Opinions sur le fait d'informer son/ses partenaires de son statut sérologique VIH

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)
Veillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants

Énoncés	Tout à fait en désaccord		En désaccord		En accord		Tout à fait en accord	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Dans un sauna, personne n'a besoin d'informer les autres de son statut sérologique VIH.	49,3	51,3 (46,0-56,6)	31,3	30,0 (25,0-34,9)	14,3	13,7 (9,8-17,5)	5,0	5,1 (2,9-7,2)
Dans un « sex party », personne n'a besoin d'informer les autres de son statut sérologique VIH.	50,8	51,9 (46,7-57,2)	31,9	33,1 (28,2-38,1)	12,8	10,5 (7,1-13,9)	4,4	4,5 (2,2-6,7)
La stigmatisation liée au VIH peut affecter la capacité de quelqu'un à informer les autres de son statut sérologique VIH.	9,1	8,7 (5,4-11,9)	7,1	11,3 (7,9-14,7)	35,8	38,3 (33,1-43,4)	48,0	41,8 (36,6-46,9)

Proportion de données manquantes : 4,5% à 5,4% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



6.2 Utilisation du condom

Parmi l'ensemble des participants,

- 57,9% ont eu une relation sexuelle avec pénétration anale sans condom avec au moins un homme au cours des 6 derniers mois (Tableau 156).
- 74,9% de ceux-ci ont rapporté au moins une pénétration anale sans condom en positionnement insertif (top) et 67,4% en positionnement réceptif (bottom) (Tableau 157).

Parmi les participants de **statut VIH- ou inconnu**

ayant rapporté des relations sexuelles avec pénétration anale sans condom en positionnement **insertif** (top),

- 65,5% ont pénétré au moins une fois un partenaire séronégatif au VIH,
- 14,1% un partenaire séropositif
- et 45,6% un partenaire dont le statut sérologique VIH était inconnu. (Tableau 159)

ayant rapporté des relation sexuelle avec pénétration anale sans condom en positionnement **réceptif** (bottom),

- 72,8% ont été pénétrés au moins une fois par un partenaire séronégatif au VIH,
- 14,6% par un partenaire séropositif
- et 41,9% par un partenaire dont le statut sérologique VIH était inconnu. (Tableau 161)

Parmi les participants de **statut VIH positif**

ayant rapporté une relation sexuelle avec pénétration anale sans condom en positionnement **insertif** (top),

- 52,0% l'ont eu au moins une fois avec un partenaire séronégatif au VIH,
- 57,7% avec un partenaire séropositif
- et 59,6% avec un partenaire dont le statut sérologique VIH était inconnu. (Tableau 159)

ayant une relation sexuelle avec pénétration anale sans condom lors d'un positionnement **réceptif** (bottom),

- 34,6% l'ont eu au moins une fois avec un partenaire séronégatif au VIH,
- 65,3% avec un partenaire séropositif
- et 49,9% avec un partenaire dont le statut sérologique VIH était inconnu. (Tableau 161)

Tableau 172 Relations sexuelles sans condom

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)		
Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu une relation sexuelle avec pénétration anale sans condom avec au moins un homme ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	64,5	57,9 (52,9-62,8)
Non	35,5	42,1 (37,0-47,3)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 173 Relations sexuelles sans condom et positionnement

Parmi les participants qui ont eu une relation sexuelle avec pénétration anale sans condom avec au moins un homme (n=761)		
Lors de vos relations sexuelles avec pénétration anale des 6 derniers mois, avez-vous... (Cochez tout ce qui s'applique) *		
Type de positionnement	% naj	% aj (IC 95%)
Pénétré un homme (<u>top/insertif</u>) sans condom	76,6	74,9 (69,1-80,6)
Été pénétré (bottom/réceptif) sans condom	72,8	67,4 (61,5-73,2)
Pénétré un homme (<u>top/insertif</u>) ET été pénétré (bottom/réceptif) sans condom	49,4	42,2 (36,0-48,5)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



Tableau 174 Fréquence de relations sexuelles sans condom et positionnement insertif

<i>Parmi les participants qui ont eu une relation sexuelle avec pénétration anale en positionnement insertif (top) sans condom (n=583)</i>		
Au cours des 6 derniers mois, environ combien de fois avez-vous pénétré (top/insertif) un partenaire sans condom ?		
Fréquence	% naj	% aj (IC 95%)
1	15,8	18,9 (13,0-24,9)
2-5	36,3	46,0 (38,7-53,3)
6+	48,0	35,1 (28,1-42,0)

Proportion de données manquantes : 2,1%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 175 Fréquence de relations sexuelles sans condom en positionnement insertif selon le statut VIH du/des partenaires et selon son propre statut VIH auto-rapporté

Parmi les participants qui ont eu une relation sexuelle avec pénétration anale comme le partenaire insertif (top) sans condom (n=583)						
Au cours des 6 derniers mois, parmi les fois où vous avez pénétré (top/insertif) sans condom, combien de fois étaiſ-ce avec :						
Nombre de fois	Statut VIH auto rapporté				Total (n=583)	
	Négatif ou inconnu (n=478)		Positif (n=105)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Quelqu'un que vous saviez séronégatif au VIH ?						
0	26,6	34,5 (26,7-42,4)	46,7	48,0 (31,1-64,9)	30,2	36,2 (29,1-43,3)
1	19,5	21,0 (14,4-27,7)	17,1	16,3 (7,8-24,8)	19,0	20,4 (14,6-26,2)
2-5	24,1	25,2 (18,2-32,2)	17,1	18,0 (8,6-27,4)	22,8	24,3 (18,3-30,4)
6+	29,9	19,2 (13,2-25,2)	19,0	17,7 (2,0-33,4)	28,0	19,0 (13,5-24,6)
Quelqu'un que vous saviez séropositif au VIH ?						
0	81,8	85,9 (80,2-91,6)	24,8	42,3 (24,8-59,7)	71,5	80,5 (74,9-86,0)
1	6,3	5,4 (2,0-8,9)	9,5	10,6 (6,0-15,2)	6,9	6,1 (3,2-9,0)
2-5	7,1	5,5 (1,7-9,2)	23,8	17,1 (7,3-27,0)	10,1	6,9 (3,5-10,3)
6+	4,8	3,2 (0,1-6,3)	41,9	30,0 (13,9-46,1)	11,5	6,5 (2,9-10,2)
Quelqu'un dont le statut sérologique VIH vous était inconnu ou incertain ?						
0	58,2	54,4 (46,4-62,4)	47,6	40,4 (23,3-57,5)	56,3	52,7 (45,5-59,9)
1	15,3	20,8 (14,0-27,6)	12,4	13,4 (3,4-23,4)	14,8	19,9 (14,0-25,8)
2-5	18,0	19,3 (13,4-25,2)	15,2	21,8 (9,8-33,8)	17,5	19,6 (14,3-24,9)
6+	8,6	5,5 (1,2-9,8)	24,8	24,4 (10,1-38,8)	11,5	7,9 (3,7-12,0)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 176 Fréquence de relations sexuelles sans condom en positionnement réceptif

<i>Parmi les participants ayant eu une relation sexuelle avec pénétration anale en positionnement réceptif (bottom) sans condom (n=554)</i>		
Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous été pénétré (bottom/réceptif) par un partenaire sans condom ?		
Fréquence	% naj	% aj (IC 95%)
1	17,3	14,3 (8,9-19,7)
2-5	36,0	43,6 (36,5-50,7)
6+	46,7	42,1 (34,8-49,3)

Proportion de données manquantes : 0,7%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 177 Fréquence de relations sexuelles sans condom lors d'un positionnement réceptif selon le statut VIH du/des partenaires et selon son propre statut VIH auto-rapporté

Parmi les participants ayant eu une relation sexuelle avec pénétration anale en positionnnement réceptif (bottom) sans condom (n=554)						
Au cours des 6 derniers mois, parmi les fois où vous avez été pénétré (bottom/réceptif) sans condom, combien de fois étaiés-ce avec :						
Nombre de fois	Statut VIH auto rapporté				Total (n=554)	
	VIH – ou inconnu (n=442)		VIH + (n=112)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Quelqu'un que vous saviez séronégatif au VIH ?						
0	21,5	27,2 (20,4-34,1)	51,8	65,4 (50,5-80,2)	27,6	32,3 (25,7-39,0)
1	22,4	23,1 (17,0-29,2)	16,1	12,5 (4,2-20,9)	21,1	21,7 (16,5-26,9)
2-5	26,5	25,2 (17,6-32,8)	14,3	8,8 (2,9-14,8)	24,0	23,0 (16,5-29,5)
6+	29,6	24,5 (17,1-31,9)	17,9	13,3 (2,3-24,2)	27,3	23,0 (16,6-29,4)
Quelqu'un que vous saviez <u>séropositif</u> au VIH ?						
0	84,2	85,4 (79,1-91,8)	21,4	34,7 (16,2-53,1)	71,5	78,7 (72,6-84,7)
1	5,7	4,8 (1,2-8,4)	10,7	11,2 (0,1-22,4)	6,7	5,7 (2,4-9,0)
2-5	7,9	8,7 (3,2-14,2)	25,9	18,4 (4,6-32,2)	11,6	10,0 (5,0-15,0)
6+	2,3	1,0 (0,0-2,1)	42,0	35,7 (20,9-50,5)	10,3	5,6 (3,1-8,1)
Quelqu'un dont le statut sérologique VIH vous était inconnu ou incertain ?						
0	62,0	58,1 (49,8-66,3)	53,6	50,1 (32,3-67,8)	60,3	57,0 (49,7-64,4)
1	13,3	17,6 (10,6-24,5)	10,7	11,5 (0,0-26,9)	12,8	16,8 (10,6-22,9)
2-5	17,0	15,3 (9,0-21,6)	15,2	11,6 (1,1-22,2)	16,6	14,8 (9,4-20,2)
6+	7,7	9,0 (4,5-13,6)	20,5	26,9 (10,6-43,2)	10,3	11,4 (6,8-16,0)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 178 Sentiment d'efficacité personnelle à utiliser le condom

<i>Parmi les participants cis genre (n=1 153)</i> À quel point serait-il facile ou difficile pour vous de maintenir une érection en utilisant un condom ?									
Très difficile 1		2		3		4		Très facile 5	
% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
15,7	11,4 (8,4-14,4)	17,3	19,4 (15,5-23,3)	22,6	23,6 (18,7-28,4)	20,8	19,6 (15,4-23,8)	23,7	26,0 (21,1-30,9)

Proportion de données manquantes : 4,3%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Les obstacles à l'utilisation du condom ont été évalués à l'aide de l'échelle « Obstacles à l'utilisation du condom pour les hommes » (The Condoms Barriers Scale, Doyle et al. 2009)¹³. L'échelle originale modifiée afin d'être utilisée auprès d'hommes comprend 29 énoncés répartis en 4 sous-échelles. Une seule d'entre elles (Effets du condom sur l'expérience sexuelle) a été retenue dans le questionnaire Engage. Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants selon leur niveau d'accord avec chacun des 7 énoncés de cette sous-échelle.

Tableau 179 Obstacles à l'utilisation du condom; Effets du condom sur l'expérience sexuelle

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants. Par exemple, si vous êtes tout à fait en désaccord, choisissez le numéro « 5 ».										
Énoncé	Tout à fait en accord 1		2		3		4		Tout à fait en désaccord 5	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Les condoms frottent et causent des irritations.	12,6	13,3 (9,7-17,0)	9,9	9,8 (6,5-13,2)	18,3	19,9 (15,7-24,1)	22,6	20,4 (16,3-24,4)	36,6	36,6 (31,4-41,8)
Les condoms ne s'ajustent pas bien.	16,9	18,0 (13,8-22,1)	17,6	18,9 (15,0-22,7)	23,4	20,6 (16,1-25,2)	20,4	16,4 (12,7-20,1)	21,7	26,1 (21,3-30,9)
Les condoms ne sont pas confortables.	22,3	20,0 (15,8-24,2)	20,3	20,2 (16,4-24,0)	21,7	21,3 (16,8-25,7)	16,1	14,9 (10,9-18,8)	19,6	23,6 (18,9-28,4)
Les condoms brisent la magie du moment.	23,8	22,2 (17,9-26,4)	21,9	21,2 (17,1-25,4)	20,7	23,4 (18,8-27,9)	14,3	12,2 (8,8-15,6)	19,3	21,0 (16,2-25,8)
Les condoms ne donnent pas une sensation naturelle.	30,4	26,7 (22,0-31,5)	23,1	21,6 (17,5-25,7)	18,7	21,3 (16,5-26,1)	13,7	11,4 (8,6-14,2)	14,1	18,9 (14,5-23,4)
Les condoms changent ma façon de jouir ou d'avoir un orgasme.	31,4	30,4 (25,5-35,4)	19,9	20,4 (16,3-24,6)	17,3	16,1 (12,2-19,9)	13,9	12,5 (9,4-15,5)	17,5	20,6 (15,8-25,5)
Je me sens plus proche de mon partenaire sans condom.	45,2	43,7 (38,4-49,0)	19,5	16,6 (12,8-20,5)	11,4	14,4 (11,1-17,6)	8,7	7,3 (4,8-9,9)	15,1	18,0 (13,4-22,6)

Proportion de données manquantes 4,1% à 5,8% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Doyle SR, Calsyn DA, Ball SA. Factor structure of the condoms barriers scale with a sample of men at high risk for HIV. *Assessment*. 2009;16(1):3-15. doi:10.1177/1073191108322259

¹³ Doyle SR, Calsyn DA, Ball SA. Factor structure of the condoms barriers scale with a sample of men at high risk for HIV. *Assessment*. 2009;16(1):3-15. doi:10.1177/1073191108322259



Obstacles à l'utilisation du condom; Effets du condom sur l'expérience sexuelle- Calcul des scores

Les participants ayant préféré ne pas répondre à un ou plusieurs des énoncés ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 1 à 5 selon le degré d'accord du participant avec l'énoncé ; le degré « tout à fait en désaccord » équivaut à 1 point tandis que le degré « tout à fait en accord » équivaut à 5 points. Le score d'un participant est obtenu en additionnant les points attribués à chacun des énoncés, il varie de 7 à 35. Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant.

Une valeur élevée indique que les condoms affectent négativement l'expérience sexuelle des participants.

Tableau 180 **Obstacles à l'utilisation du condom, Effets du condom sur l'expérience sexuelle - Sommaire**

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Obstacles à l'utilisation du condom		
Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée¹ (IC 95%)
7-35	20,1 (7,8)	20,6 (19,7-21,5)

Proportion de données manquantes : 7,5%.

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



6.3 Vaccination

6.3.1 Vaccination contre les hépatites A et B, l'infection méningococcique et l'influenza saisonnier

Tableau 181 Vaccination contre les hépatites A et B, l'infection méningococcique et l'influenza saisonnier (la grippe), selon le statut VIH auto-rapporté

Avez-vous déjà reçu une dose ou plus des vaccins suivants ?						
Vaccin	Ne sais pas/Ne me souviens plus		Non		Oui	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Parmi les participants de statut VIH auto-rapporté négatif ou inconnu (n=968)						
Hépatite A	19,9	23,1 (18,3-27,9)	13,9	23,3 (18,3-28,3)	66,1	53,6 (48,0-59,1)
Hépatite B	18,2	19,9 (15,4-24,4)	13,5	21,2 (16,5-25,9)	68,3	58,9 (53,4-64,4)
Infection méningococcique	49,7	45 (39,6-50,5)	34,9	41,3 (35,8-46,8)	15,4	13,7 (9,7-17,6)
Grippe	12,5	13,9 (10,2-17,6)	43,8	47,5 (42-53,1)	43,7	38,5 (33,3-43,8)
Parmi les participants de statut VIH auto-rapporté positif (n=211)						
Hépatite A	12,8	14,0 (7,0-21,1)	20,9	22,7 (12,8-32,6)	66,4	63,3 (52,3-74,3)
Hépatite B	11,8	12,5 (6,2-18,8)	21,8	22,1 (11,8-32,4)	66,4	65,4 (54,3-76,5)
Infection méningococcique	39,8	39,9 (28,9-51)	36,0	40,2 (28,1-52,3)	24,2	19,9 (10,6-29,1)
Grippe	5,7	5,0 (0,1-9,9)	14,7	18,6 (10,0-27,3)	79,6	76,3 (66,8-85,9)
Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)						
Hépatite A	17,0	18,9 (14,9-22,9)	15,0	21,3 (17-25,7)	67,9	59,8 (54,7-64,8)
Hépatite B	18,7	21,9 (17,6-26,2)	15,2	23,2 (18,7-27,8)	66,2	54,9 (49,8-60)
Infection méningococcique	47,9	44,3 (39,3-49,3)	35,1	41,2 (36,1-46,3)	17,0	14,5 (10,8-18,2)
Grippe	11,3	12,7 (9,4-16)	38,6	43,6 (38,4-48,7)	50,1	43,7 (38,7-48,7)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 182 Nombre d'années écoulées depuis le dernier vaccin contre l'influenza saisonnière

<i>Parmi les participants qui ont reçu au moins une dose du vaccin contre la grippe (n=591)</i>		
À quelle année remonte votre dernier vaccin contre la grippe (influenza saisonnier) ?		
<i>Si vous n'êtes pas certain, répondez au mieux de votre connaissance.</i>		
Nombre d'années écoulées depuis le dernier vaccin contre la grippe	% naj	% aj (IC 95%)
0-1 an	56,2	60,1 (52,9-67,4)
2-3 ans	20,6	19,0 (13,0-25)
4 ans et plus	23,2	20,9 (15,1-26,7)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



6.3.2 Vaccination contre les virus du papillome humain (VPH)

Tableau 183 Avoir déjà entendu parler du vaccin contre les VPH, selon le groupe d'âge

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)						
Avant aujourd'hui, aviez-vous entendu parler du vaccin contre les VPH ?						
	Groupe d'âge				Total (n=1 179)	
	26 ans et moins (n=249)		27 ans et plus (n=930)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95 %)	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	80,7	80,8 (71,7-90,0)	66,0	55,1 (49,5-60,8)	69.1	61,0 (56,0-66,0)
Non	11,6	12,2 (6,9-17,5)	28,4	37,1 (31,6-42,5)	24.9	31,4 (26,7-36,1)
Je ne sais pas / Je ne me souviens pas	7,6	7,0 (0,0-15,5)	5,6	7,8 (4,5-11,1)	6.0	7,6 (4,5-10,7)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 184 Connaissance des recommandations concernant la vaccination contre les VPH et discussions antérieures à ce sujet avec un professionnel de la santé, selon le groupe d'âge

Parmi les participants ayant déjà entendu parler du vaccin (n=815)						
	Groupe d'âge				Total (n=815)	
	26 ans et moins (n=201)		27 ans et plus (n=614)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95 %)	% naj	% aj (IC 95%)
Avant aujourd'hui, saviez-vous que le vaccin contre les VPH était recommandé pour les garçons et les hommes ?						
Oui	83,1	77,7 (66,8-88,5)	63,3	59,8 (52,9-66,8)	68.2	65,2 (59,4-71,0)
Non	16,9	22,3 (11,5-33,2)	36,7	40,2 (33,2-47,1)	31.8	34,8 (29-40,6)
Avant aujourd'hui, est-ce qu'un professionnel de la santé avait discuté du vaccin contre les VPH avec vous ?						
Oui	66,3	50,9 (37,7-64,1)	30,2	31,6 (24,6-38,5)	39.0	37,4 (31,3-43,5)
Non	33,7	49,1 (35,9-62,3)	69,8	68,4 (61,5-75,4)	61.0	62,6 (56,5-68,7)

Proportion de données manquantes : entre 0,1% et 3,2% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 185 Avoir déjà reçu une dose ou plus du vaccin contre les VPH, selon le groupe d'âge

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Avez-vous déjà reçu une dose ou plus du vaccin contre les VPH ?						
	Groupe d'âge				Total (n=1 179)	
	26 ans et moins (n=249)		27 ans et plus (n=930)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95 %)	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	44,2	34,8 (23,6-46,1)	7,1	6,5 (3,4-9,6)	14.9	12,9 (9,3-16,5)
Non*	48,6	59,3 (47,9-70,7)	87,8	89,8 (86,3-93,3)	79.6	82,9 (78,9-86,8)
Je ne sais pas / Je ne me souviens pas	7,2	5,9 (0,6-11,1)	5,1	3,7 (1,9-5,5)	5.5	4,2 (2,4-6,0)

Aucune donnée manquante.

*Inclut également les participants qui n'ont jamais entendu parler du vaccin contre les VPH et ceux qui ont répondu 'Ne se souvient pas s'il a déjà entendu parler du vaccin

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 186 Nombre de doses de vaccin contre les VPH reçues

<i>Parmi les participants ayant reçu au moins une dose du vaccin contre les VPH (n=176)</i> Combien de doses du vaccin contre les VPH avez-vous reçues ?		
Nombre de doses reçues	% naj	% aj (IC 95%)
1 dose	13,6	11,7 (1,8-21,5)
2 doses	26,1	32,2 (20,5-44,0)
3 doses	49,4	39,3 (26,7-52,0)
Je ne sais pas/ je ne me souviens pas	10,8	16,8 (6,2-27,3)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 187 Frais pour la vaccination contre les VPH selon le groupe d'âge

<i>Parmi les participants ayant reçu au moins une dose du vaccin contre le VPH (n=176)</i> Le vaccin contre le VPH vous a-t-il été offert gratuitement ; autrement dit, avez-vous reçu le vaccin sans avoir à payer de votre poche ou de réclamer un remboursement de frais auprès de votre assureur ?						
	Groupe d'âge				Total (n=176)	
	26 ans et moins (n=110)		27 ans et plus (n=66)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	86.0	88.4 (79.6-97.3)	53.8	s.o.	73.8	85.5 (78.9-92.1)
Non	14.0	11.6 (2.7-20.4)	46.2	s.o.	26.2	14.5 (7.9-21.1)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.= sans objet.

Tableau 188 Âge à la réception de la première dose du vaccin contre les VPH

<i>Parmi les participants ayant reçu au moins une dose du vaccin contre les VPH (n=176)</i> À quel âge avez-vous reçu votre première dose du vaccin contre les VPH ? Si vous n'êtes pas certain, répondez au mieux de votre connaissance.		
Âge lors de la première dose du vaccin	% naj	% aj (IC 95%)
14-19 ans	10,1	15,2 (5,4-25,1)
20-26 ans	74,4	66,5 (54,2-78,8)
27 ans +	15,5	18,3 (8,5-28)

Proportion de données manquantes varie entre 3,6% et 6,1% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 189 Lieu d'administration de la plus récente dose du vaccin contre les VPH

Parmi les participants ayant reçu au moins une dose du vaccin contre les VPH (n=176) À quel endroit avez-vous reçu votre dose la plus récente du vaccin contre les VPH ?		
Endroit	% naj	% aj (IC 95%)
Clinique médicale se spécialisant dans la santé sexuelle	55,7	38,3 (25,4-51,2)
Centre de santé communautaire [ou CLSC]	15,5	22,3 (12,1-32,5)
Clinique médicale non spécialisée dans la santé sexuelle	12,1	16,1 (7,6-24,6)
Milieu scolaire	4,6	10,4 (0,2-20,5)
Clinique sans rendez-vous	2,3	5,4 (0,0-14,6)
Service des urgences d'un hôpital	5,2	3,6 (1,4-5,8)
Pharmacie	2,3	2,3 (0,0-8,5)
Clinique externe d'un hôpital	0,6	0,4 (0,0-1,2)
Autre	1,7	1,1 (0,7-1,5)

Nsp/ne ne me souviens pas=1,1% Autre (Cactus, Neo Terrebonne, aT HOME, MUM'S A NURSE)
naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 190 Intérêt à recevoir la vaccination contre les VPH selon diverses options de coûts pour celle-ci

Parmi les participants âgés de 27 ans et plus ayant déjà entendu parler du vaccin contre les VPH et n'ayant jamais été vacciné contre les VPH (n=548)										
Certains régimes provinciaux d'assurance maladie paient une portion ou la totalité du vaccin contre le VPH. Pour les personnes non couvertes par un régime d'assurance, chaque dose du vaccin coûte environ 150 \$ à 170 \$ (selon la province de résidence) ; le coût des trois doses s'élève donc à 300 \$ à 500 \$.										
Au cours de la prochaine année, seriez-vous prêt à revoir le vaccin contre les VPH...										
Énoncé	Très improbable		Improbable		Indécis		Probable		Très probable	
	% naj	% aj, (IC 95%)	% naj	% aj, (IC 95%)	% naj	% aj, (IC 95%)	% naj	% aj, (IC 95%)	% naj	% aj, (IC 95%)
...s'il vous était offert gratuitement ?	7,2	7,2 (3,2-11,2)	3,9	5,2 (1,8-8,6)	8,7	15,4 (9,2-21,6)	13,5	13,8 (9-18,6)	66,7	58,4 (50,8-66,0)
...si le coût était partiellement couvert, de sorte que vous n'avez qu'à payer 30 \$ par dose (environ 90 \$ en tout) ?	17,1	12,9 (7,7-18,1)	11,5	11,7 (6,1-17,4)	17,7	25,5 (19,7-31,3)	22,9	19,3 (12,8-25,8)	30,9	30,6 (23,5-37,6)
...si vous deviez payer le prix intégral (entre 300 et 500 \$ en tout) ?	53,9	51,2 (43,5-58,9)	20,3	19,8 (13,0-26,6)	18,0	18,9 (13,2-24,6)	4,5	4,7 (1,9-7,6)	3,3	5,3 (2,3-8,4)
...s'il était offert gratuitement après avoir dit au professionnel de la santé que vous avez des relations sexuelles avec des hommes ?	9,5	12,2 (7,0-17,4)	3,3	3,7 (-0,1-7,4)	8,7	11,0 (5,9-16,0)	14,1	19,8 (13,8-25,8)	64,4	53,4 (45,7-61,1)

La proportion de données manquantes varie entre 1,5% et 1,8% selon l'item.
naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 191 Probabilité de se faire vacciner contre les VPH au cours de la prochaine année

<i>Parmi les participants âgés de 26 ans et moins ayant déjà entendu parler du vaccin contre les VPH et n'ayant jamais été vacciné (n=91)</i> Le vaccin contre le VPH est offert gratuitement à tout homme (y compris les hommes trans) de 26 ans ou moins qui s'identifie comme gai, bisexuel ou comme un homme ayant des relations sexuelles avec des hommes ; il doit alors dire cette information à un professionnel de la santé. Dans quelle mesure est-il probable ou improbable que vous vous fassiez vacciner contre le VPH au cours de la prochaine année ?	
Probabilité	% naj
Très improbable	10,2
Improbable	8,0
Indécis	19,3
Probable	33,0
Très probable	29,5

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



6.4 Détection des ITSS

6.4.1 Antécédents de tests de détection des ITSS

Tableau 192 Antécédents de tests de détection des ITSS autres que le VIH (à vie)

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours de votre vie, avez-vous déjà été testé pour...?						
ITSS	Oui		Non		Je ne sais pas/je ne me souviens pas	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Des infections transmissibles sexuellement (ITS) autres que le VIH *	89,0	82,1 (77,9-86,3)	9,5	15,2 (11,1-19,2)	1,5	2,8 (1,2-4,3)
La syphilis spécifiquement	75,2	65,2 (60,1-70,3)	12,2	18,3 (13,8-22,8)	12,6	16,5 (12,7-20,3)
L'hépatite C spécifiquement	65,8	57,4 (52,4-62,4)	11,8	17,7 (13,7-21,7)	22,4	24,9 (20,7-29,1)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Cela pourrait inclure la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, la LGV, l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, les verrues génitales ou anales, la shigella, la giardiase, l'herpès (VHS) et la vaginose bactérienne.

Tableau 193 Antécédents de tests de détection des ITSS autres que le VIH (à vie) selon le statut VIH du participant

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours de votre vie, avez-vous déjà été testé pour...?							
ITSS	Statut VIH auto-rapporté						
	Négatif ou inconnu (n=968)				Positif (n=211)		
	Oui		Je ne sais pas/je ne me souviens pas		Oui		Je ne sais pas/je ne me souviens pas
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj % aj (IC 95%)
Des infections transmissibles sexuellement (ITS) autres que le VIH *	87,9	81,6 (77,1-86,1)	1,7	3,0 (1,2-4,7)	93,8	85,3 (76,2-94,4)	0,9 1,4 (0,3-2,4)
La syphilis spécifiquement	72,2	62,9 (57,3-68,4)	14,4	18,2 (13,9-22,5)	89,1	80,0 (69,2-90,8)	4,3 5,5 (0,0-11,6)
L'hépatite C spécifiquement	63,1	55,4 (50,0-60,9)	23,8	25,7 (21,1-30,4)	78,2	69,6 (58,1-81,0)	16,1 19,7 (10,4-29,1)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Cela pourrait inclure la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, la LGV, l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, les verrues génitales ou anales, la shigella, la giardiase, l'herpès (VHS) et la vaginose bactérienne.



Tableau 194 Moment des derniers tests de détection des ITSS autres que le VIH

Parmi les participants ayant déjà passé des tests de détection des ITSS autres que le VIH
À quand remonte vos derniers tests de...?

Date du dernier dépistage des ITSS	Toute ITS autre que le VIH * (n=1049)		La syphilis spécifiquement (n=865)		L'hépatite C spécifiquement (n=734)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des 3 derniers mois	34,3	32,0 (27,0-37,0)	33,9	31,5 (26,4-36,7)	27,0	25,3 (19,9-30,8)
Il y a entre 3 et 6 mois	22,6	21,0 (16,5-25,5)	21,6	18,6 (13,8-23,3)	20,4	19,6 (13,6-25,5)
Il y a entre 6 et 12 mois	18,9	21,9 (17,6-26,3)	21,4	27,0 (21,8-32,2)	21,1	26,8 (21,5-32,2)
Il y a entre 1 et 2 ans	13,0	12,5 (8,4-16,7)	12,8	13,2 (9,1-17,3)	16,2	16,4 (11,7-21,1)
Il y a plus de 2 ans	11,2	12,6 (8,8-16,3)	10,3	9,7 (6,3-13,1)	15,3	11,9 (8,0-15,7)

Proportion de données manquantes : 1,4% à 5,7% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Cela pourrait inclure la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, la LGV, l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, les verrues génitales ou anales, la shigella, la giardiase, l'herpès (VHS) et la vaginose bactérienne.

Tableau 195 Fréquence de tests de détection des ITSS autres que le VIH au cours des deux dernières années

Parmi les participants qui ont passé des tests de détection des ITSS au cours des 2 dernières années (n=918)
Au cours des 2 dernières années, combien de fois avez-vous consulté un professionnel de la santé pour des tests d'ITS autres que le VIH ?

Fréquence* de tests de détection des ITSS au cours des deux dernières années	% naj	% aj (IC 95%)
1 fois	16,1	22,4 (17,3-27,4)
2 fois	21,4	24,6 (19,2-30,1)
3 à 5 fois	36,7	36,2 (30,6-41,9)
6 fois et plus	25,9	16,8 (12,5-21,1)

Proportion de données manquantes : 3,2%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Il s'agit d'un nombre global de tests incluant les tests initiaux et le cas échéant, les tests de contrôle post traitement.

Tableau 196 Nature des prélèvements effectués lors des derniers tests de détection des ITSS autres que le VIH

Parmi les participants qui ont déjà été testé pour des ITS autres que le VIH (n=1049)
Lors de votre dernier bilan ITS de routine (pour une « évaluation générale d'ITS et non parce que vous aviez des symptômes), quels examens ont été fait par le professionnel de la santé ?

Types d'examens	Oui		Non		Je ne sais pas/ je ne me souviens pas	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Prise de sang / test sanguin	96,5	95,9 (93,7-98,0)	3,1	3,4 (1,7-5,0)	0,5	0,8 (0,0-2,2)
On m'a demandé d'uriner dans un pot (test d'urine)	91,4	88,4 (84,4-92,4)	7,2	9,9 (6,2-13,6)	1,4	1,7 (0,0-3,4)
Prélèvement de la gorge	72,7	61,0 (55,6-66,5)	24,2	34,2 (28,8-39,5)	3,2	4,8 (2,7-7,0)
Prélèvement du rectum (cul)	58,0	48,2 (42,8-53,6)	39,2	49,3 (43,8-54,7)	2,9	2,5 (0,7-4,4)
Prélèvement du pénis /urètre	21,3	23,6 (19,0-28,2)	74,7	73,2 (68,4-78,0)	4,0	3,2 (1,4-5,1)
Anuscopie (on a inséré un anuscopie, un tube en plastique, à une profondeur de quelques centimètres dans mon rectum/cul afin d'observer le canal anal)	6,8	5,4 (3,2-7,7)	91,1	92,2 (89,2-95,2)	2,1	2,3 (0,3-4,3)

Proportion de données manquantes : 0,1% à 0,3% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



6.4.2 Test de détection du VIH

Tableau 197 Facteurs pouvant influencer le recours au test de détection du VIH

Parmi les participants VIH- ou inconnu (n=968) Actuellement, dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes au sujet du test du VIH ? Veuillez fournir une réponse pour chaque affirmation.										
Énoncé	Tout à fait en désaccord		En désaccord		Ni en accord, ni en désaccord		En accord		Tout à fait en accord	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Je connais assez bien les recommandations de dépistage du VIH pour savoir à quelle fréquence je devrais me faire tester.	4,3	4,0 (2,1-5,8)	8,4	9,5 (7,0-12,0)	9,1	15,7 (11,4-20,1)	51,2	49,6 (44,1-55,1)	27,0	21,1 (16,6-25,6)
Mon risque de contracter l'infection par le VIH est faible.	5,7	4,0 (2,1-5,8)	15,8	15,7 (11,4-20)	21,7	24,8 (19,9-29,8)	43,1	42,7 (37,3-48,1)	13,7	12,8 (9,1-16,5)
Je crois que le test du VIH donne des résultats fiables.	3,5	3,0 (1,1-4,9)	3,2	3,0 (1,2-4,9)	7,6	15,5 (10,8-20,2)	49,2	46,5 (41,0-52,0)	36,5	31,9 (26,9-37)
Je ne pourrais pas supporter de savoir que je suis séropositif.	10,7	10,6 (6,9-14,2)	26,5	23,4 (18,9-28)	31,2	35,9 (30,6-41,3)	20,8	19,2 (14,8-23,5)	10,7	10,9 (7,4-14,3)
J'ai honte de penser que j'aurais besoin de me faire tester pour le VIH.	49,5	38,1 (32,9-43,3)	31,5	34,0 (28,7-39,4)	10,4	16,2 (11,5-20,8)	6,5	9,8 (6,8-12,8)	2,1	1,9 (0,1-3,7)
Si je savais que j'étais séropositif, ça me permettrait de recevoir des soins le plus tôt possible.	4,6	3,9 (2,1-5,7)	3,3	5,7 (3,3-8,0)	11,5	16,3 (11,7-21)	41,8	40,4 (34,9-45,9)	38,7	33,7 (28,7-38,7)
Je ne voudrais pas être pris avec l'obligation de dire mon statut à mes futurs partenaires sexuels si je savais que j'étais séropositif.	19,0	17,3 (12,9-21,7)	24,7	28,3 (23,2-33,4)	17,9	19,2 (14,7-23,7)	27,2	26,4 (21,6-31,2)	11,3	8,8 (6,5-11,2)
Si je savais que j'étais séropositif, je pourrais éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.	2,7	4,3 (2,3-6,3)	2,4	3,3 (1,6-5,0)	4,6	6,4 (3,1-9,8)	37,1	35,4 (30,2-40,6)	53,2	50,5 (45-56,1)
J'ai peur de subir de la discrimination si mon test est positif.	8,2	7,1 (4,2-10,1)	10,1	7,7 (5,1-10,3)	15,3	18,0 (13,4-22,6)	38,4	39,9 (34,5-45,4)	28,0	27,2 (22,5-32)
Je ne sais pas où aller pour passer un test du VIH.	63,8	50,4 (44,8-55,9)	26,3	33,1 (27,6-38,6)	3,5	6,3 (3,3-9,3)	3,9	7,0 (4,6-9,3)	2,4	3,3 (2,0-4,7)



Parmi les participants VIH- ou inconnu (n=968)
Actuellement, dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes au sujet du test du VIH ? Veuillez fournir une réponse pour chaque affirmation.

Énoncé	Tout à fait en désaccord		En désaccord		Ni en accord, ni en désaccord		En accord		Tout à fait en accord	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Il y a des cliniques près de mon domicile ou de mon travail où je pourrais me faire tester pour le VIH.	4,1	3,8 (1,8-5,7)	5,8	5,4 (2,9-7,8)	10,1	16,8 (12,8-20,8)	40,0	42,0 (36,4-47,6)	40,0	32,1 (27,3-36,8)
J'ai peur que le résultat de mon test du VIH ne demeure pas anonyme ou confidentiel.	38,6	26,4 (21,9-30,9)	27,6	30,7 (25,2-36,1)	14,4	19,0 (14,4-23,6)	14,2	16,7 (12,7-20,8)	5,3	7,1 (4,8-9,5)
Je peux trouver une clinique ou un service pour me faire tester pour le VIH où les gens sont sensibles et acceptent mes activités et choix d'ordre sexuel.	4,9	4,2 (1,8-6,5)	3,9	4,7 (2,8-6,6)	8,2	13,7 (9,8-17,5)	41,3	44,7 (39,1-50,3)	41,7	32,8 (27,8-37,7)
Je n'aime pas avoir à parler de ma vie sexuelle, mes activités sexuelles ou mon orientation, pour me faire tester pour le VIH.	32,0	19,5 (15,6-23,3)	29,1	25,0 (20-29,9)	20,1	30,7 (25,5-35,9)	14,2	16,3 (12,0-20,6)	4,5	8,6 (5,4-11,8)
Je trouve que le test du VIH et le counseling qui vient avec prend trop de temps.	22,2	15,3 (11,9-18,8)	34,5	31,5 (26,2-36,9)	28,2	36,4 (31-41,9)	11,3	11,9 (8,5-15,3)	3,8	4,8 (2,9-6,6)
Il y a eu des moments où je ne me suis pas fait tester pour le VIH à cause des coûts (p. ex., frais pour établir un dossier médical, frais pour transporter les échantillons au laboratoire, frais du test de dépistage rapide).	47,8	36,3 (31,2-41,4)	29,3	34,0 (28,7-39,4)	8,9	13,4 (9,4-17,4)	9,6	11,7 (7,9-15,6)	4,3	4,6 (2,3-6,9)
Je ne veux pas me faire tester dans un endroit connu pour donner des services aux personnes gaies.	57,7	45,3 (39,9-50,8)	26,9	33,8 (28,5-39)	10,7	15,1 (10,6-19,6)	3,2	3,0 (0,7-5,2)	1,4	2,9 (2,0-3,7)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 198 Trajectoire d'accès au test de détection du VIH

<i>Parmi les participants de statut VIH négatif ou inconnu (n=968)</i>		
	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des 6 derniers mois, a senti le besoin de se faire tester pour le VIH	62,7	55,4 (49,9-60,9)
Au cours des 6 derniers mois, a essayé de passer un test du VIH	56,5	54,3 (48,8-59,8)
Au cours des 6 derniers mois, a passé un test du VIH	51,7	50,0 (44,3-55,6)

Proportion de données manquantes : 2,3%

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 199 Cascade d'accès au test de détection du VIH

<i>Parmi les participants de statut VIH négatif ou inconnu (n=968)</i>		
	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des 6 derniers mois, a senti le besoin de se faire tester pour le VIH	62,7	55,4 (49,9-60,9)
<i>Parmi les participants de statut VIH négatif ou inconnu qui ont senti le besoin de se faire tester pour le VIH (n=607)</i> Au cours des 6 derniers mois, a essayé de passer un test du VIH	76,1	77,4 (71,2-83,7)
<i>Parmi les participants de statut VIH négatif ou inconnu qui ont senti le besoin et ont essayé de se faire tester pour le VIH (n=458)</i> Au cours des 6 derniers mois, a passé un test du VIH	86,0	80,9 (75,5-86,4)

Proportion de données manquantes : 2,3%

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 200 Dernier test de détection du VIH

<i>Parmi les participants de statut VIH négatif ou inconnu (n=968)</i> À quand remonte votre plus récent test du VIH ?		
Délai depuis le dernier test de détection du VIH	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des 3 derniers mois	30,2	30,9 (25,5-36,2)
Il y a entre 3 et 6 mois	21,5	19,1 (14,4-23,8)
Il y a entre 6 et 12 mois	21,4	23,9 (19,5-28,3)
Il y a entre 1 et 2 ans	11,8	9,4 (6,3-12,6)
Il y a plus de 2 ans	11,3	11,9 (8,0-15,8)
Je n'ai jamais passé un test du VIH ou je ne suis pas certain d'avoir déjà passé un test du VIH	3,8	4,8 (2,2-7,4)

Proportion de données manquantes : 2,7%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 201 Fréquence du test de détection du VIH

<i>Parmi les participants de statut VIH négatif ou inconnu qui ont passé un test du VIH au cours des deux dernières années (n=803)</i> Au cours des 2 dernières années, combien de fois avez-vous passé un test du VIH ?		
Fréquence du test de détection du VIH	% naj	% aj (IC 95%)
1 fois	17,7	24,2 (19,1-29,3)
2 fois	22,0	24,3 (18,7-29,9)
3 à 5 fois	35,6	35,9 (29,9-42,0)
6 fois ou plus	24,7	15,6 (10,9-20,2)

Proportion de données manquantes : 0,7%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



6.4.3 Circonstances du test de détection du VIH le plus récent

Tableau 202 Lieu du test de détection du VIH le plus récent

Parmi les participants qui ont passé un test du VIH au cours des deux dernières années (n=803) À quel endroit avez-vous passé votre plus récent test du VIH ?		
Endroit	% naj	% aj (IC 95%)
Clinique médicale se spécialisant dans la santé sexuelle	48,4	32,0 (26,3-37,6)
Clinique médicale non spécialisée dans la santé sexuelle	19,3	25,1 (19,8-30,4)
Centre local de services communautaires (CLSC)	12,4	15,1 (9,2-20,9)
Clinique sans rendez-vous	3,5	7,3 (4,1-10,5)
Clinique externe d'un hôpital	4,4	5,8 (2,4-9,2)
Service des urgences d'un hôpital	1,8	4,0 (1,6-6,4)
Organisation vouée à la santé des hommes gais	5,2	3,7 (1,8-5,7)
Organisme de lutte contre le sida	1,0	1,9 (0,4-3,4)
Test à domicile (test administré chez vous)	0,1	0,1 (0,1-0,1)
Test en ligne	0,0	s.o.
Autre*	3,9	5,1 (2,1-8,0)

Proportion de données manquantes : 1,4%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.

* Autre : Recherches (ALGOPHARMA, Centre recherche chum, Cohort St-luc, DISCOVER, Protege, « pour des études cliniques ») (9), écoles/université (Cégep de Maisonneuve, « event at concordia », « school event », « school health services ») (4), « family doctor » (4), services hospitalier non-précisés (4), « Cactus » (3), sauna/bathhouse (2), detox (1), ASSTT(e)Q (1), prison (1), don de sang (1), emploi (1), « Dans la Rue » (1).

Tableau 203 Prise de rendez-vous pour le test de détection de VIH le plus récent

Parmi les participants qui ont passé un test du VIH au cours des deux dernières années (n=803) La dernière fois que vous avez passé un test du VIH, aviez-vous pris un rendez-vous pour vous faire tester ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	60,5	53,1 (46,8-59,5)
Non, cela n'a pas été nécessaire	23,9	29,0 (23,2-34,8)
Non, j'avais déjà un rendez-vous pour une autre raison liée à ma santé	15,7	17,9 (13,2-22,5)

Proportion de données manquantes : 2,4%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 204 Délai d'attente avant d'obtenir un rendez-vous pour le test de détection du VIH le plus récent

Parmi les participants qui ont pris un rendez-vous pour un dépistage de VIH (n=474) Combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez fixé le rendez-vous et le rendez-vous lui-même ?		
Durée d'attente	% naj	% aj (IC 95%)
Moins d'une semaine	27,9	27,3 (19,0-35,7)
1 à 2 semaines	42,8	45,6 (37,0-54,2)
3 à 4 semaines	20,5	20,4 (12,5-28,2)
5 à 10 semaines	6,3	5,3 (1,4-9,2)
Plus de 10 semaines	2,4	1,4 (-0,6-3,4)

Donnée manquante : 3,4%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 205 Type de test effectué lors du test de détection du VIH le plus récent

Parmi les participants qui ont passé un test du VIH au cours des deux dernières années (n=803) La dernière fois que vous avez eu un test du VIH, c'était... ? (cochez tout ce qui s'applique)*		
Type de test du VIH	% naj	% aj (IC 95%)
Un test du VIH standard (test sanguin avec obtention du résultat après quelques jours/semaines)	90,2	86,8 (81,4-92,1)
Un test du VIH rapide (test par piqûre du doigt ou frottis buccal et obtention du résultat lors de la même visite)	14,3	10,7 (7,4-13,9)
Un test du VIH auto-administré (à partir de sang d'une piqûre du doigt ou un prélèvement dans la bouche que vous avez fait vous-même)	1,0	1,8 (0,0-4,2)
Je ne sais pas / je ne me souviens pas	2,6	6,4 (1,9-10,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

Tableau 206 Procédure anonyme lors du test de détection du VIH le plus récent

Parmi les participants qui ont passé un test de détection du VIH au cours des deux dernières années (n=803) La dernière fois que vous avez eu un test du VIH, votre test était-il anonyme ? Les tests du VIH anonymes sont habituellement offerts dans des sites spéciaux de dépistage du VIH ou des cliniques de santé sexuelle, et les résultats sont conservés séparément de tous vos autres dossiers médicaux, D'ordinaire, le test est désigné par un numéro et aucun renseignement personnel n'est requis (comme votre numéro de téléphone, adresse ou numéro de carte d'assurance maladie).		
	% naj	% aj (IC 95%)
Non, mon dernier test n'était pas anonyme	56,4	57,9 (51,6-64,1)
Oui, mon dernier test était anonyme	25,5	23,8 (18,2-29,4)
Je ne sais pas / Je ne me souviens pas	18,1	18,3 (13,6-23,0)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 207 Opportunité de poser des questions lors du test de détection du VIH le plus récent

Parmi les participants qui ont passé un test du VIH au cours des deux dernières années (n=803) La dernière fois que vous avez eu un test du VIH, dans quelle mesure avez-vous eu l'occasion de poser des questions ou de parler de vos préoccupations concernant votre test du VIH ?		
Opportunité de poser des questions / parler de ses préoccupations	% naj	% aj (IC 95%)
Beaucoup	44,3	38,5 (32,1-44,9)
Modérément	26,2	22,2 (16,9-27,6)
Un peu	16,5	19,4 (13,9-24,9)
Pas du tout	13,0	19,9 (15,1-24,6)

Proportion de données manquantes : 4,4%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 208 Montant payé lors du test de détection du VIH le plus récent

Parmi les participants qui ont passé un test du VIH au cours des deux dernières années (n=803)
La dernière fois que vous avez eu un test du VIH, quel montant avez-vous dû payer avec votre propre argent (après le remboursement d'un assureur) ?
Veuillez inclure les frais liés à la consultation, au test lui-même, au matériel pour le test et au transport de votre échantillon biologique au laboratoire.

Coût	% naj	% aj (IC 95%)
0,00 \$ (gratuit)	59,0	67,9 (62,3-73,6)
Moins de 25 \$	28,2	19,0 (14,3-23,7)
25 \$ à 49 \$	8,5	7,0 (4,3-9,7)
50 \$ à 149 \$	2,6	3,3 (1,0-5,7)
150 \$ à 249 \$	0,9	1,4 (0,2-2,5)
250 \$ ou plus	0,8	1,3 (0,0-2,8)

Proportion de données manquantes : 3,8%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 209 Niveau de satisfaction générale quant à l'expérience du test de détection du VIH le plus récent

Parmi les participants qui ont passé un test du VIH au cours des deux dernières années (n=803)
Dans l'ensemble, comment décririez-vous votre niveau de satisfaction par rapport à votre plus récente expérience de passer un test du VIH ?

Niveau de satisfaction	% naj	% aj (IC 95%)
Pas du tout satisfait	1,4	3,1 (2,0-4,1)
Un peu satisfait	6,6	6,8 (3,2-10,4)
Modérément satisfait	21,0	22,9 (17,6-28,3)
Très satisfait	70,9	67,2 (61,2-73,2)

Proportion de données manquantes : 2,4%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



6.5 Notification aux partenaires sexuels

Tableau 210 Avoir été contacté par un partenaire sexuel ou un professionnel de la santé en regard d'une exposition à une ITSS (incluant une infection à VIH)

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours des 6 derniers mois, est-ce qu'un professionnel de la santé ou un partenaire sexuel vous a contacté pour vous informer que vous devriez être testé ou traité pour une infection transmissible sexuellement (y compris le VIH) ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	22,3	17,6 (14,0-21,3)

Proportion de données manquantes : 0,8%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 211 Action prise après avoir été contacté par un partenaire sexuel ou un professionnel de la santé en regard d'une exposition à une ITSS (incluant une infection à VIH)

<i>Parmi les participants qui ont été contactés au cours des 6 derniers mois en regard d'une exposition à une ITSS (n=261)</i> Qu'est-ce que vous avez fait ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
J'ai pris rendez-vous ou suis allé à une clinique sans rendez-vous pour me faire tester et/ou traiter.	91,0	87,5 (79,4-95,6)

Proportion de données manquantes : 1,9%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Parmi les participants ayant reçu un résultat positif à un test de l'une ou l'autre des ITSS suivantes : chlamydia, gonorrhée, hépatite C, LGV, syphilis au cours des 6 derniers mois (n=177)

Les questions suivantes portent sur votre expérience de contacter vos partenaires sexuels après avoir reçu un résultat positif à un test ITSS pour les inviter à se faire tester ou traiter.

Ici, « partenaire sexuel récent » veut dire toute personne avec qui vous avez eu une relation sexuelle au cours des 2 mois précédant votre diagnostic d'ITSS

Tableau 212 Lors du plus récent diagnostic d'ITSS, encouragement reçu de la part d'un professionnel de la santé à contacter les partenaires sexuels récents

<i>Parmi les participants ayant reçu un résultat positif à un test de l'une ou l'autre des ITSS suivantes : chlamydia, gonorrhée, hépatite C, LGV, syphilis au cours des 6 derniers mois (n=177)</i> La dernière fois que vous avez eu un test positif pour une ITS, est-ce qu'un professionnel de la santé (médecin, infirmière ou autre personnel clinique) vous a encouragé à contacter vos partenaires sexuels récents* pour les inviter à aller se faire tester ou traiter ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	83,6	73,9 (61,2-86,7)
Non	11,9	17,6 (5,5-29,6)
Je ne sais pas / je ne me souviens pas	4,0	8,4 (1,5-15,3)
Je préfère ne pas répondre	0,6	0,1 (0,0-0,2)

Proportion de données manquantes : 4,5%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*« Partenaires sexuels récents veut dire toute personne avec qui vous avez eu une relation sexuelle au cours des 2 mois précédant votre diagnostic d'ITSS »



Tableau 213 Lors du dernier diagnostic d'ITSS, offre reçue de la part d'un professionnel de la santé à contacter des partenaires sexuels récents

<i>Parmi les participants ayant reçu un résultat positif à un test de l'une ou l'autre des ITSS suivantes : chlamydia, gonorrhée, hépatite C, LGV, syphilis au cours des 6 derniers mois (n=177)</i> La dernière fois que vous avez eu un test positif pour une ITS, est-ce que la clinique ou le personnel de la santé publique vous a offert de contacter et d'informer vos partenaires sexuels récents* afin qu'ils se fassent tester ou traiter ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	41,5	40,5 (27,0-54,1)

Proportion de données manquantes : 7,3%

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*« Partenaires sexuels récents veut dire toute personne avec qui vous avez eu une relation sexuelle au cours des 2 mois précédant votre diagnostic d'ITSS »

Tableau 214 Lors du dernier diagnostic d'ITSS, acceptation de l'offre de contacter les partenaires sexuels récents reçue de la part d'un professionnel de la santé après avoir reçu un diagnostic d'ITSS

<i>Parmi les participants ayant reçu un résultat positif à un test de l'une ou l'autre des ITSS suivantes : chlamydia, gonorrhée, hépatite C, LGV, syphilis au cours des 6 derniers mois et dont le personnel de la santé publique ou de la clinique a offert de contacter les partenaires sexuels (n=68)</i> Avez-vous fourni des renseignements à cette personne afin qu'elle puisse contacter un ou plusieurs de vos partenaires sexuels récents* ?	
	% naj
Oui	21,0

Proportion de données manquantes : 8,8% (4,4%= refus et 4,4%=je ne sais pas/je ne me souviens pas).

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*« Partenaires sexuels récents veut dire toute personne avec qui vous avez eu une relation sexuelle au cours des 2 mois précédant votre diagnostic d'ITSS »

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.

Tableau 215 Lors du dernier diagnostic d'ITSS, avoir contacté soi-même des partenaires sexuels récents

<i>Parmi les participants ayant reçu un résultat positif à un test de l'une ou l'autre des ITSS suivantes : chlamydia, gonorrhée, hépatite C, LGV, syphilis au cours des 6 derniers mois (n=177)</i> Avez-vous contacté des partenaires sexuels récents pour les inviter à se faire tester ou traiter ?		
Proportion des partenaires sexuels récents contactés	% naj	% aj (IC 95%)
J'ai contacté seulement mon partenaire principal (soit le partenaire principal mentionné plus tôt dans le questionnaire)	18,1	13,2 (4,0-22,4)
J'ai contacté moins de la moitié de mes partenaires sexuels récents	14,7	14,3 (5,1-23,6)
J'ai contacté la plupart de mes partenaires sexuels récents	33,3	21,7 (13,3-30,2)
J'ai contacté tous mes partenaires sexuels récents	24,9	33,1 (21,0-45,2)
Non, je n'ai contacté aucun de mes partenaires sexuels récents	9,0	17,7 (5,2-30,2)

Proportion de données manquantes : de 0,0 à 0,8% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 216 Lors du dernier diagnostic d'ITSS, méthode(s) utilisées pour contacter soi-même des partenaires sexuels récents

Parmi les participants ayant reçu un résultat positif à un test de l'une ou l'autre des ITSS suivantes : chlamydia, gonorrhée, hépatite C, LGV, syphilis au cours des 6 derniers mois et qui ont contacté leurs partenaires sexuels récents, autres que leur partenaire principal (n=129)
Quelles méthodes avez-vous utilisées pour contacter vos partenaires sexuels récents, autres que votre partenaire principal, pour les inviter à se faire tester ou traiter ? (Cochez tout ce qui s'applique.)*

Méthode utilisé	% naj	% aj (IC 95%)
Message texte	78,1	68,1 (55,5-80,6)
Téléphone	35,2	24,1 (11,9-36,3)
Message dans un site de rencontre ou une appli	34,4	20,8 (8,6-33,0)
En personne	33,6	39,9 (26,8-53,0)
Courriel / Facebook	19,5	11,2 (0,9-21,5)

Proportion de données manquantes : de 0,0 à 0,8% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

Tableau 217 Connaissance du service de notification aux partenaires sexuels offert par la santé publique

Parmi les participants ayant reçu un résultat positif à un test de l'une ou l'autre des ITSS suivantes : chlamydia, gonorrhée, hépatite C, LGV, syphilis au cours des 6 derniers mois et à qui un professionnel de la santé publique n'a pas offert de contacter les partenaires sexuels (n=109)
Saviez-vous que la santé publique peut informer des partenaires sexuels de l'importance de se faire tester ou traiter sans leur donner des informations personnelles à votre sujet (comme votre nom), de sorte que vous n'avez pas à les aviser vous-même ?

Connaissance du service de notification aux partenaires de la santé publique	% naj	% aj (IC 95%)
Oui, je le savais.	31,1	38,7 (21,5-55,9)
Je n'ai jamais entendu parler de ce service, mais je suis intéressé à m'en servir dans le futur.	42,7	35,5 (18,6-52,3)
Je n'ai jamais entendu parler de ce service, et je ne suis pas intéressé à m'en servir.	26,2	25,8 (14,3-37,4)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



6.6 Recours à la prophylaxie post-exposition (PEP) au VIH

La section suivante contient des questions sur votre expérience de la prophylaxie post-exposition au VIH (PPE). La PPE est une méthode de prévention du VIH où une personne séronégative prend des médicaments anti-VIH prescrits par un médecin peu de temps APRÈS une possible exposition au VIH (p, ex, après une relation sexuelle ou après avoir utilisé du matériel d'injection de drogues qui avait été utilisé par d'autres personnes) pour réduire son risque d'être infecté. La PPE consiste en la prise d'un ou deux comprimés de médicament anti-VIH par la bouche chaque jour pendant un mois après l'exposition soupçonnée.

6.6.1 Recours à la PPE

Tableau 218 Connaissance de la PPE selon le statut VIH auto-rapporté

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Avant aujourd'hui, aviez-vous entendu parler de la PPE (prophylaxie post-exposition) ?							
	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=1 179)		
	Négatif ou inconnu (n=968)		Positif (n=211)				
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	
Oui	69,7	56,0 (50,4-61,6)	75,8	61,9 (50,6-73,2)	70,8	56,8 (51,7-61,9)	

Donnée manquante : 2,1% parmi les participants VIH- ou inconnu et 1,9% parmi les participants VIH+.
naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 219 Trajectoire d'accès à la PPE

Parmi les participants de statut VIH négatif- ou inconnu qui ont déjà entendu parler de la PPE (n=661)		
Questions liées à l'accès à la PPE	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des 6 derniers mois, a senti le besoin de prendre la PPE	18,4	18,3 (12,1-24,6)
Au cours des 6 derniers mois, a essayé d'obtenir la PPE	8,2	7,3 (3,1-11,4)
Au cours des 6 derniers mois, a pris la PPE	4,0	3,9 (0,8-7,0)

Proportion de données manquantes : de 0,2% à 1,3% selon l'item.
naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 220 Cascade d'accès à la PPE

Parmi les participants de statut VIH négatif- ou inconnu qui ont déjà entendu parler de la PPE (n=661)		
Questions liées à l'accès à la PPE	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des 6 derniers mois, a senti le besoin de prendre la PPE	18,4	18,3 (12,1-24,6)
Parmi les participants de statut VIH négatif- ou inconnu qui ont déjà entendu parler de la PPE et qui ont senti le besoin de prendre la PPE (n=120)		
Au cours des 6 derniers mois, a essayé d'obtenir la PPE	42,5	38,2 (21,9-54,5)
Parmi les participants de statut VIH négatif- ou inconnu qui ont déjà entendu parler de la PPE, qui ont senti le besoin de prendre et ont essayé d'obtenir la PPE (n=50)		
Au cours des 6 derniers mois, a pris la PPE	50,0	s.o.*

Proportion de données manquantes : de 0,2% à 1,3% selon l'item.
naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).
* L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



Tableau 221 Perception de l'efficacité de la PPE

<i>Parmi les participants de statut VIH négatif ou inconnu qui ont déjà entendu parler de la PPE (n=661)</i> À votre avis, dans quelle mesure la PPE est-elle efficace pour empêcher que quelqu'un exposé au VIH contracte ce virus (cette infection) ?		
Niveau d'efficacité	% naj	% aj (IC 95%)
Totalement efficace	7,0	8,4 (4,1-12,8)
Très efficace	52,6	41,4 (34,7-48,2)
Modérément efficace	18,8	23,8 (17,1-30,4)
Un peu efficace	1,4	1,9 (0,0-4,0)
Pas du tout efficace	0,0	s.o.
Je n'ai pas d'opinion	20,3	24,5 (17,8-31,2)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.



Tableau 222 Facteurs pouvant influencer le recours à la PPE

Parmi les participants de statut VIH négatif ou inconnu qui ont entendu parler de la PPE (n=661)												
Actuellement, dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes au sujet de la PPE ? Veuillez fournir une réponse pour chaque affirmation												
Énoncé	Tout à fait en désaccord		En désaccord		Ni en accord, ni en désaccord		En accord		Tout à fait en accord		N.A. / Je préfère ne pas répondre	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Je n'en sais pas assez sur la PPE pour dire si je pourrais en avoir besoin un jour.	37,7	33,2 (26,6-39,9)	28,1	29,8 (23-36,6)	8,9	9,0 (5-12,9)	16,9	21,1 (15,1-27,1)	7,3	6,1 (2,4-9,8)	1,1	0,8 (0,0-1,8)
Je ne me suis jamais senti assez à risque d'avoir contracté le VIH pour utiliser la PPE.	21,6	17,8 (12,5-23)	16,9	16,6 (10,9-22,2)	11,2	15,1 (9,9-20,2)	27,7	30,1 (23,7-36,6)	21,2	19,1 (13,3-25)	1,4	1,3 (0,0-2,8)
Je m'inquiète de me faire juger négativement par les professionnels de la santé si j'essaie d'avoir accès à la PPE.	42,7	35,0 (28,4-41,5)	24,8	28,2 (21,4-34,9)	11,6	16,8 (11-22,7)	15,3	16,1 (10,7-21,5)	3,6	2,5 (0,3-4,8)	2,0	1,4 (0,2-2,7)
Je ne veux pas que mon assureur privé sache que j'ai pris la PPE.	32,8	25,3 (19,6-31)	16,5	19,9 (14,1-25,7)	11,8	15,1 (9,6-20,7)	9,4	13,0 (7,3-18,8)	11,8	11,8 (7,4-16,2)	17,7	14,8 (9,9-19,8)
Je m'inquiète que ma démarche pour obtenir la PPE ou le fait que je prenne la PPE ne demeure pas confidentiel.	38,1	30,6 (24,2-37,1)	26,0	30,7 (23,8-37,6)	13,3	12,5 (7,7-17,2)	14,1	18,4 (12,6-24,2)	4,7	4,1 (1,7-6,6)	3,8	3,7 (1,1-6,4)
Je sais où me procurer la PPE.	15,7	22,4 (15,8-28,9)	19,7	24,7 (18,3-31)	9,8	8,5 (4,3-12,8)	25,7	24,9 (18,8-31,1)	27,1	17,7 (13-22,5)	2,0	1,8 (0,6-3,1)
Les cliniques qui prescrivent la PPE sont trop loin de chez moi.	32,8	23,8 (18,1-29,5)	26,3	27,2 (20,6-33,7)	22,5	28,5 (22,2-34,9)	5,6	4,3 (1,4-7,2)	2,0	1,2 (0,0-2,8)	10,7	15,0 (9,2-20,9)
Je n'aime pas avoir à parler de ma vie sexuelle, mes activités sexuelles ou mon orientation, pour avoir accès à la PPE.	40,4	30,1 (24-36,3)	28,1	32,2 (25,1-39,3)	13,9	18,5 (12,8-24,2)	11,2	11,7 (7,1-16,3)	3,8	3,8 (0,7-7)	2,6	3,7 (0,8-6,5)
Je ne veux pas prendre des pilules tous les jours pendant un mois.	31,6	25,7 (19,7-31,7)	21,3	23,4 (16,9-29,8)	16,5	16,8 (11,4-22,2)	20,3	24,9 (18,7-31,2)	8,2	6,4 (3,2-9,7)	2,1	2,7 (0,3-5,2)
Je m'inquiète des effets secondaires des médicaments utilisés pour la PPE.	14,5	14,6 (9,2-19,9)	11,3	9,7 (5,6-13,8)	17,4	19,1 (13,5-24,7)	38,1	38,5 (31,4-45,6)	15,9	15,0 (10,2-19,9)	2,7	3,2 (0,8-5,6)
Il y a eu des moments où je n'ai pas pris la PPE à cause du coût des médicaments utilisés pour la PPE.	30,3	24,3 (18,4-30,1)	15,3	19,9 (14,1-25,7)	10,9	10,4 (6,6-14,2)	7,3	8,5 (3,2-13,7)	5,6	4,1 (1,4-6,8)	30,7	32,9 (26,1-39,7)
La plupart des médecins n'en savent pas assez sur la PPE pour se sentir à l'aise de la prescrire.	15,1	14,1 (9,4-18,8)	12,6	15,2 (10,0-20,4)	37,7	34,2 (27,4-41,1)	12,1	10,8 (6,4-15,1)	4,2	3,8 (1,7-5,9)	18,3	21,9 (15,4-28,3)



Aucune donnée manquante.

N.A.=ne s'applique pas

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 223 Niveau de facilité/difficulté à obtenir la PPE

<i>Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont entendu parler de la PPE (n=661)</i> Actuellement, à quel point vous est-il facile d'obtenir la PPE ?		
Niveau de difficulté perçu	% naj	% aj (IC 95%)
Très facile	20,6	17,6 (12,0-23,2)
Facile	37,4	34,8 (28,2-41,4)
Difficile	7,6	10,0 (5,6-14,4)
Très difficile	2,4	3,1 (0,6-5,6)
Je ne sais pas	32,1	34,5 (27,4-41,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

6.6.2 Antécédents de recours à la PPE

Parmi l'ensemble des participants de statut VIH négatif ou inconnu, 11,5% (8,0% - 15,1%) ont déjà pris la PPE une fois au plus au cours de leur vie. Cette proportion est de 21,6% (15,8%-27,5%) parmi les participants de statut VIH négatif ou inconnu ayant déjà entendu parlé de la PPE.

Tableau 224 Fréquence du recours à la PPE à vie

<i>Parmi les participants qui ont pris la PPE (à vie) (n=150)</i> Combien de fois dans votre vie avez-vous commencé une PPE (prophylaxie post-exposition) à la suite d'une exposition possible au VIH (par relation sexuelle ou autrement) ? Si vous n'êtes pas certain, répondez au mieux de votre connaissance.		
Nombre de fois	% naj	% aj (IC 95%)
1	65,3	55,2 (39,6-70,9)
2	23,3	35,5 (21,2-49,8)
3	6,0	4,6 (0,0-9,3)
4 et plus	5,3	4,7 (0,0-15,9)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 225 Moment du dernier recours à la PPE

<i>Parmi les participants qui ont pris la PPE (à vie) (n=150)</i> Quand avez-vous commencé une PPE pour la <u>dernière</u> fois ?		
Moment du dernier recours à la PPE	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours des 3 derniers mois	7,4	8,9 (0,2-17,5)
Il y a entre 3 et 6 mois	10,1	9,3 (0,0-20,4)
Il y a entre 6 et 12 mois	12,1	33,0 (17,1-49,0)
Il y a entre 1 et 2 ans	24,2	18,0 (7,0-29,0)
Il y a plus de 2 ans	46,3	30,8 (17,8-43,8)

Proportion de données manquantes : 0,7%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 226 Effets secondaires associés à la prise de la PPE

<i>Parmi les participants qui ont pris la PPE (à vie) (n=150)</i> Avez-vous déjà éprouvé des effets secondaires pendant que vous preniez la PPE (p. ex., nausées, vomissements, diarrhées, fatigue/manque d'énergie) ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Non	26,2	27,7 (12,0-43,4)
Oui, mais ils n'ont pas eu d'impact sur mes activités quotidiennes	43,0	36,3 (21,8-50,8)
Oui, et ils ont eu un impact sur mes activités quotidiennes	30,9	36,0 (21,8-50,2)

Proportion de données manquantes : 0,7%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 227 Niveau de satisfaction par rapport à l'expérience de la PPE

<i>Parmi les participants qui ont pris la PPE une fois ou plus à vie (n=150)</i> Dans l'ensemble, comment décririez-vous votre niveau de satisfaction par rapport à votre expérience de la PPE ?		
Niveau de satisfaction	% naj	% aj (IC 95%)
Pas du tout satisfait	7,4	4,0 (0,0-9,5)
Un peu satisfait	6,8	5,6 (1,7-9,6)
Modérément satisfait	28,4	23,4 (9,7-37,1)
Très satisfait	57,4	66,9 (52,2-81,7)

Proportion de données manquantes : 1,3%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



6.6.3 PPE la plus récente

Tableau 228 Nombre de jours de prise de la PPE lors du dernier recours à la PPE

<i>Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont utilisé la PPE au cours des 2 derniers années (n=80)</i> La dernière fois que vous avez pris la PPE à la suite d'une relation sexuelle, pendant environ combien de jours avez-vous pris le(s) comprimé(s) ? Si vous n'êtes pas certain, répondez au mieux de votre connaissance	
Durée de prise de la PPE la plus récente	% naj
7 jours ou moins*	20,0
Entre 7 jours à 27 jours*	12,5
28 jours	67,5

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée.

* La raison de l'arrêt de la PPE n'était pas documentée. Il peut s'agir de situations pour lesquelles la PPE a été initiée rapidement suite à l'exposition et a été jugée finalement non indiquée.

Tableau 229 Source des comprimés utilisés lors de la PPE la plus récente

<i>Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont utilisé la PPE au cours des 2 derniers années (n=80)</i> La dernière fois que vous avez pris la PPE à la suite d'une relation sexuelle, de quelle(s) source(s) avez-vous obtenu les comprimés ? (Cochez tout ce qui s'applique) *	
Source des comprimés utilisés lors de la PPE la plus récente*	% naj
Dans une pharmacie (les médicaments ont été payés totalement ou partiellement par un régime d'assurance médicaments)	85,0
Dans une pharmacie (j'ai payé de ma poche, aucun remboursement par une assurance)	13,8
Une connaissance qui suit un traitement anti-VIH m'a donné les comprimés	1,2
Une connaissance qui prend la PrEP m'a donné les comprimés	1,2
J'ai acheté les comprimés dans un autre pays (p. ex., les États-Unis) et les ai rapportés au Canada	1,2
Autre(s) source(s) informelle(s) (p. ex. auprès d'un dealer / dans la rue)	1,2
J'ai acheté les comprimés sur Internet	0,0
Autre**	5
La dernière fois que vous avez pris la PPE à la suite d'une relation sexuelle, les comprimés avaient-ils été prescrits par un médecin ?	
Oui	96,2

Proportion de données manquantes : 1,3%.

naj=non-ajustée.

*les réponses ne sont pas mutuellement exclusives alors la somme peut excéder à 100%.

**Autre source : Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC), prescription précédente, clinique de santé sexuelle



Tableau 230 Occasion de poser des questions ou de parler de ses préoccupations concernant la prise de la PPE auprès du (des) professionnel(s) de la santé

<i>Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont utilisé la PPE <u>prescrite par un médecin</u> au cours des 2 dernières années et (n=77) La dernière fois que vous avez pris la PPE à la suite d'une relation sexuelle, dans quelle mesure avez-vous eu l'occasion de poser des questions ou de parler de vos préoccupations concernant la prise de la PPE auprès du (des) professionnel(s) de la santé que vous avez consulté(s) ?</i>	
	% naj
Beaucoup	52,1
Modérément	34,2
Un peu	9,6
Pas du tout	4,1

Proportion de données manquantes : 5,0%.

naj=non-ajustée.

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.

Tableau 231 Coût de la PPE

<i>Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont utilisé la PPE <u>prescrite par un médecin</u> au cours des 2 dernières années et (n=77) La dernière fois que vous avez fait remplir une prescription de PPE dans une pharmacie, quel montant avez-vous dû payer avec votre propre argent (après le remboursement d'un assureur) ?</i>	
Montant payer de son propre argent	% naj
0,00 \$ (gratuit)	47,4
Moins de 25 \$	3,5
25 \$ à 149 \$	40,4
150 \$ ou plus	8,8

Proportion de données manquantes : 26,0%.

Les participants qui ont répondu 'Dans une pharmacie (les médicaments ont été payés totalement ou partiellement par un régime d'assurance médicaments)' à la question portant sur la source de la PPE ET qui ont répondu : '150\$ ou plus' à la question portant sur le coût de leur prescription de PPE ont été exclus du calcul

naj=non-ajustée.

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



6.7 Recours à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) du VIH

6.7.1 Recours à la PrEP

La PrEP est recommandée (Tan et al, 2017 Guide canadien concernant la PrEP) chez les gbHARSAH ayant eu des relations sexuelles sans condom lors des 6 derniers mois lorsque s'applique l'une ou l'autre des situations suivantes: 1) un antécédent de syphilis ou d'une ITS bactérienne anale, particulièrement si celle-ci a été diagnostiquée dans les 12 derniers mois; 2) un antécédent d'utilisation d'une prophylaxie post exposition (PPE); 3) des relations sexuelles avec un partenaire séropositif lorsque le risque transmission du VIH est significatif et 4) un score de ≥ 11 sur l'échelle « High-incidence risk index-MSM » (critères utilisés dans le calcul de cet index : l'âge, le nombre de partenaires sexuels, le nombre de partenaires sexuels de statut VIH positif, le nombre des actes sexuels réceptifs ou « insertifs » sans condom avec un partenaire de statut VIH positif et l'utilisation d'amphétamines ou de « poppers » lors des activités sexuelles).

Tableau 232 Trajectoire de recours à la PrEP

Parmi les participants de statut VIH- ou inconnu (n=968)						
Questions liées à l'accès à la PrEP	Participant chez qui la PrEP est recommandée selon le guide canadien*				Total (n=968)	
	Oui (n=511)		Non (n=423)			
	%naj	%aj (IC 95%)	%naj	%aj (IC 95%)	%naj	%aj (IC 95%)
Avant aujourd'hui, a entendu parler de la PrEP	93,2	84,6 (79,3-90,0)	72,3	64,4 (56,0-72,8)	82,9	71,7 (66,8-76,6)
Au cours des 6 derniers mois, a senti le besoin de prendre la PrEP	51,9	39,2 (31,7-46,7)	14,2	12,3 (7,2-17,4)	34,1	24,1 (19,4-28,7)
Au cours des 6 derniers mois, a essayé d'obtenir la PrEP	27,0	20,6 (14,0-27,3)	4,5	4,4 (1,6-7,2)	16,2	11,6 (8,1-15,2)
Au cours des 6 derniers mois, a pris la PrEP	21,1	14,5 (8,4-20,5)	2,1	1,5 (0,6-2,5)	12,1	7,4 (4,4-10,5)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* À cause de données manquantes, il n'a pas été possible de déterminer si la PrEP était recommandée ou non dans le cas de 34 participants de statut VIH – ou inconnu



Tableau 233 Cascade de recours à la PrEP

Parmi les participants de statut VIH- ou inconnu (n=968)							
Questions liées au recours à la PrEP	Participant chez qui la PrEP est recommandée selon le guide canadien*				Total		
	Oui		Non				
	%naj	%aj (IC 95%)	%naj	%aj (IC 95%)	%naj	%aj (IC 95%)	
Avant aujourd’hui, a entendu parler de la PrEP	93,2	84,6 (79,3-90,0)	72,3	64,4 (56,0-72,8)	82,9	71,7 (66,8-76,6)	
Parmi les participants de statut VIH négatif- ou inconnu qui ont déjà entendu parler de la PrEP (n=802) Au cours des 6 derniers mois, a senti le besoin de prendre la PrEP	55,7	46,4 (38,3-54,4)	19,6	19,1 (11,7-26,5)	41,1	33,6 (27,5-39,6)	
Parmi les participants de statut VIH négatif- ou inconnu qui ont déjà entendu parler de la PrEP et qui ont senti le besoin de prendre la PrEP (n=120) Au cours des 6 derniers mois, a essayé d’obtenir la PrEP	51,7	52,4 (40,7-64,0)	28,3	s.o.**	46,7	47,7 (37,3-58,1)	
Parmi les participants de statut VIH négatif- ou inconnu qui ont déjà entendu parler de la PrEP, qui ont senti le besoin de prendre et ont essayé d’obtenir la PrEP (n=50) Au cours des 6 derniers mois, a pris la PrEP	74,5	67,0 (52,7-81,2)	47,1	s.o.**	71,4	61,7 (47,5-76,0)	

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* À cause de la proportion de données manquantes, il n'a pas été possible de déterminer si la PrEP était recommandée ou non dans le cas de 34 participants de statut VIH – ou inconnu

** L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100



Tableau 234 Niveau perçu de facilité à obtenir la PrEP

<i>Parmi les participants de statut VIH- ou inconnu qui ont entendu parler de la PrEP (n=802)</i>		
Actuellement, à quel point vous est-il facile d'obtenir la PrEP ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Très facile	25,8	15,1 (11,0-19,2)
Facile	33,0	31,3 (25,3-37,3)
Difficile	10,6	13,8 (9,8-17,8)
Très difficile	3,1	2,8 (0,2-5,3)
Je ne sais pas	27,4	37,0 (30,5-43,5)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 235 Suggestion de prendre la PrEP reçue d'un professionnel de la santé

<i>Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont entendu parler de la PrEP (n=802)</i> Est-ce qu'un professionnel de la santé vous a déjà suggéré de prendre la PrEP (sans que vous lui posiez spécifiquement des questions à propos de la PrEP) ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	29,7	24,2 (18,9-29,5)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 236 Niveau d'intérêt à prendre la PrEP

<i>Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont entendu parler de la PrEP (n=802)</i> Dans quelle mesure seriez-vous intéressé à prendre la PrEP pour prévenir l'infection par le VIH ?		
Niveau d'intérêt	% naj	% aj (IC 95%)
Extrêmement intéressé	22,9	19,3 (13,9-24,8)
Très intéressé	18,7	19,4 (14,1-24,7)
Modérément intéressé	25,6	24,3 (18,7-29,9)
Un peu intéressé	18,7	21,0 (15,9-26,2)
Pas du tout intéressé	14,2	15,9 (11,2-20,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 237 Niveau perçu d'efficacité de la PrEP

<i>Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont entendu parler de la PrEP (n=802)</i> À votre avis, dans quelle mesure la PrEP est-elle efficace pour empêcher quelqu'un de contracter le VIH (être infecté) ?		
Niveau perçu d'efficacité	% naj	% aj (IC 95%)
Totalement efficace	9,0	6,5 (3,5-9,6)
Très efficace	56,2	42,0 (35,7-48,3)
Modérément efficace	19,8	28,1 (22,2-34,0)
Un peu efficace	2,6	4,6 (1,7-7,4)
Pas du tout efficace	0,6	0,7 (0,0-1,5)
Je n'ai pas d'opinion	11,7	18,1 (12,7-23,4)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 238 Facteurs pouvant influencer le recours à la PrEP

Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont entendu parler de la PrEP (n=802)										
Actuellement, dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes au sujet de la PrEP ? Veuillez fournir une réponse pour chaque affirmation.										
Énoncé	Tout à fait en désaccord		En désaccord		Ni en accord, ni en désaccord		En accord		Tout à fait en accord	
	%naj	%aj (IC 95%)	%naj	%aj (IC 95%)	%naj	%aj (IC 95%)	%naj	% aj (IC 95%)	%naj	%aj (IC 95%)
Je ne me sens pas assez à risque pour utiliser la PrEP.	15,5	11,1 (7,3-14,9)	18,8	17,2 (12,7-21,6)	17,6	24,6 (18,6-30,7)	28,2	29,2 (23,0-35,5)	19,9	17,8 (13,1-22,6)
J'en sais assez sur la PrEP pour déterminer si elle me convient ou pas.	8,4	9,8 (6,1-13,5)	19,7	23,6 (17,4-29,7)	16,7	20,0 (14,5-25,5)	34,6	30,3 (24,4-36,2)	20,6	16,3 (12,0-20,6)
La PrEP me permettrait d'avoir le genre de relations sexuelles que je désire.	11,0	13,6 (9,3-18,0)	23,6	25,9 (20,2-31,6)	28,7	31,0 (24,7-37,2)	22,8	19,4 (14,3-24,6)	13,9	10,0 (6,0-14,0)
Si je prenais la PrEP, il est très probable que j'arrêteraï d'utiliser des condoms.	22,3	25,3 (19,6-31,0)	28,9	30,6 (24,6-36,5)	19,7	20,3 (14,6-26,0)	19,7	17,4 (12,8-21,9)	9,5	6,5 (3,8-9,1)
La PrEP est perçue positivement dans la communauté.	3,3	3,7 (1,1-6,3)	16,3	16,0 (11,3-20,6)	31,8	36,5 (29,9-43,0)	37,0	35,1 (29,1-41,1)	11,7	8,7 (5,3-12,1)
J'ai peur que les gars sous PrEP cessent d'utiliser d'autres moyens de se protéger.	3,8	2,3 (0,7-3,9)	6,0	4,6 (2,1-7,0)	14,0	15,4 (10,1-20,7)	40,5	43,0 (36,5-49,5)	35,8	34,8 (28,7-40,9)
Je m'inquiète de me faire juger négativement si je prends la PrEP.	26,4	22,9 (17,6-28,2)	25,0	22,5 (17,0-28,0)	25,2	28,7 (22,6-34,8)	18,1	21,3 (16,0-26,5)	5,3	4,6 (2,3-6,9)
Je vais choisir mes partenaires sexuels selon qu'ils prennent la PrEP ou pas.	34,1	32,0 (26,3-37,8)	31,5	33,5 (27,5-39,6)	21,0	21,4 (15,6-27,1)	10,3	10,9 (7,0-14,9)	3,1	2,2 (0,1-4,3)
Si je prenais la PrEP, j'en discuterais avec mes partenaires sexuels.	2,6	2,4 (0,5-4,3)	3,3	3,6 (1,2-6,1)	12,3	14,5 (9,4-19,6)	45,6	49,1 (42,5-55,6)	36,2	30,4 (24,8-35,9)
Je doute que je puisse trouver un médecin assez ouvert à mes activités et choix sexuels pour me prescrire la PrEP.	44,8	32,8 (26,9-38,6)	32,0	35,4 (28,9-41,9)	12,5	19,9 (14,0-25,7)	7,9	8,4 (5,4-11,5)	2,8	3,5 (1,6-5,5)
Je sais où aller pour obtenir une prescription de PrEP.	11,6	13,1 (8,1-18,0)	17,9	24,9 (19,2-30,6)	6,7	8,9 (4,0-13,8)	28,6	30,5 (24,6-36,5)	35,2	22,6 (17,7-27,4)
Les cliniques où je pourrais obtenir une prescription de PrEP sont trop loin de chez moi.	40,7	26,7 (21,6-31,9)	29,5	32,3 (25,7-38,8)	21,8	31,5 (25,1-37,9)	5,9	6,0 (1,6-10,3)	2,1	3,5 (1,2-5,8)
Je m'inquiète des effets secondaires à court et à long terme de la PrEP.	7,5	5,5 (3,3-7,8)	11,1	10,1 (6,4-13,7)	20,9	24,0 (17,8-30,1)	37,0	38,9 (32,6-45,1)	23,4	21,6 (16,3-26,8)
Je n'aime pas l'idée de devoir aller aux rendez-vous de suivi médical réguliers nécessaires à la PrEP (tests du VIH et d'ITS et autres tests sanguins tous les 3 mois).	23,8	17,1 (12,7-21,5)	28,6	31,0 (24,8-37,2)	18,6	21,3 (15,9-26,8)	22,7	24,9 (19,3-30,4)	6,3	5,7 (2,8-8,5)
Je n'ai pas cherché à me faire prescrire la PrEP dans le passé à cause du coût de la médication.	23,7	19,5 (14,5-24,6)	20,4	21,7 (15,9-27,5)	16,8	18,6 (13,0-24,1)	22,0	23,5 (18,2-28,8)	17,2	16,6 (11,9-21,4)
J'aurais de la difficulté à prendre tous les jours les comprimés de la PrEP.	23,6	20,7 (15,4-26,0)	28,0	29,7 (23,7-35,7)	16,4	21,4 (15,8-26,9)	23,9	20,3 (15,5-25,1)	8,1	7,9 (4,6-11,3)
La plupart des médecins n'en savent pas assez sur la PrEP pour se sentir à l'aise de la prescrire.	15,2	9,7 (6,7-12,7)	19,4	21,7 (16,3-27,2)	43,5	47,2 (40,5-54,0)	16,6	16,9 (11,2-22,6)	5,2	4,4 (2,4-6,4)

Proportion de données manquantes : 0% à 10% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



6.7.2 Expérience d'utilisation de la PrEP

Parmi les participants de statut VIH- ou inconnu, 9,4% (IC 95% : 6,1% - 12,7%) ont pris la PrEP 'à demande' ou 'en continue', au moins une fois au cours de leur vie.

Tableau 239 Moment du premier recours à la PrEP

Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont déjà pris la PrEP au cours de leur vie (n=145) Quand avez-vous pris la PrEP pour la première fois ?		
Année du début de la première prise de la PrEP	% naj	% aj (IC 95%)
En 2015 ou avant	24,1	25,2 (11,8-38,5)
En 2016	31,0	32,0 (16,5-47,6)
En 2017 ou 2018	44,8	42,8 (27,6-57,9)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 240 Moment du dernier recours à la PrEP

Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont déjà pris la PrEP au cours de leur vie (n=145) À quand remonte votre dernière PrEP ?		
Année de la dernière prise de PrEP	% naj	% aj (IC 95%)
En 2015 ou avant	4,8	4,0 (0,0-9,9)
En 2016	8,3	5,2 (1,0-9,4)
En 2017 ou 2018	30,3	42,7 (27,1-58,3)
Je prends la PrEP en ce moment	56,6	48,1 (32,7-63,5)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 241 Modalité de prise de la PrEP

Parmi les participants de statut VIH- ou inconnu qui ont déjà pris la PrEP au cours de leur vie (n=145) Il existe deux sortes de PrEP : la PrEP « en continue » (un comprimé tous les jours) et la PrEP « à demande » (un comprimé avant une relation sexuelle, pendant la période de risque, puis jusqu'à deux jours après), Quel(s) régime(s) avez-vous suivi (s) lorsque vous preniez la PrEP ?		
Modalité de prise de la PrEP	% naj	% aj (IC 95%)
PrEP « en continue » (comprimés tous les jours)	59,3	61,6 (47,7-75,5)
PrEP « à demande » (comprimés à l'occasion, avant et après des relations sexuelles)	15,9	10,5 (3,6-17,5)
Les deux (parfois « en continue », parfois « à demande »)	24,8	27,9 (15,1-40,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 242 Prescription de la PrEP par un médecin lors du dernier recours à la PrEP

Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont déjà pris la PrEP au cours de leur vie (n=145) Est-ce que votre dernière PrEP (incluant la PrEP actuelle le cas échéant) a été prescrite par un médecin ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Oui	93,7	96,1 (92,7-99,5)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 243 Source des comprimés lors du dernier recours à la PrEP

Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont déjà pris la PrEP au cours de leur vie (n=145)
La dernière fois que vous avez pris la PrEP, de quelle(s) source(s) avez-vous obtenu les comprimés ? (Cochez tout ce qui s'applique) *

Source de la PrEP	% naj	% aj (IC 95%)
Dans une pharmacie (le traitement a été payé totalement ou partiellement par un régime d'assurance médicaments) **	74,5	73,6 (60,3-86,9)
Dans le cadre d'une étude clinique (p.ex. PROTEGE, Discover)	13,8	12,5 (1,2-23,8)
Dans une pharmacie (j'ai payé de ma poche, aucun remboursement par une assurance)	7,6	11,6 (2,0-21,3)
Une connaissance qui prend la PrEP m'a donné les comprimés	6,9	12,1 (2,5-21,7)
Une connaissance qui suit un traitement anti-VIH m'a donné les comprimés	0,7	0,2 (0,0-0,7)
Autre(s) source(s) informelle(s) (p. ex. auprès d'un dealer / dans la rue)	0,7	0,4 (0,0-2,0)
J'ai acheté les comprimés sur Internet	0,0	s.o.
J'ai acheté les comprimés dans un autre pays (p. ex. les États-Unis) et les ai rapportés au Canada	0,0	s.o.
Autre (veuillez préciser)**	1,4	0,5 (0,0-1,0)

Proportion de données manquantes : 26,9%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ;

s.o. = sans objet.

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

**Autre : « CHUM Hôtel Dieu » (1), « clinique Actuel » (1)

Tableau 244 Lieu de la consultation médicale lors du premier recours à la PrEP

Parmi les participants qui ont pris la PrEP prescrite par un médecin (n=134)
Lorsqu'on vous a prescrit la PrEP pour la première fois, à quel endroit la consultation auprès d'un professionnel de la santé a-t-elle eu lieu ?

Lieu de la consultation	% naj	% aj (IC 95%)
Clinique médicale se spécialisant dans la santé sexuelle	79,7	73,8 (57,2-90,4)
Clinique médicale non spécialisée dans la santé sexuelle	7,5	10,6 (0,0-23,3)
Clinique externe d'un hôpital	3,0	3,4 (0,1-6,7)
Centre local de services communautaires (CLSC)	2,3	0,8 (0,3-1,2)
Clinique sans rendez-vous	1,5	0,5 (0,0-1,1)
Service des urgences d'un hôpital	0,8	0,1 (0,0-0,2)
Autre (veuillez préciser)*	5,3	10,8 (0,0-24,6)

Proportion de données manquantes : 0,7%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Autre : CHUM (2), projet de recherche « Protege » (1), « hôpital » (1), « Hôtel Dieu » (1), Projet de recherche « Discover » (1), « médecin » (1)



**Tableau 245 Interaction avec le professionnel de la santé lors du premier recours à la PrEP :
Opportunité de poser des questions ou de parler de ses préoccupations**

<i>Parmi les participants qui ont pris la PrEP prescrite par un médecin (n=134)</i> Lorsqu'on vous a prescrit la PrEP pour la première fois, dans quelle mesure avez-vous eu l'occasion de poser des questions ou de parler de vos préoccupations concernant la prise de la PrEP auprès du (des) professionnel(s) de la santé que vous avez consulté(s) ?		
Occasion de poser des questions / parler de ses préoccupations	% naj	% aj (IC 95%)
Beaucoup	73,3	71,8 (55,7-87,8)
Modérément	22,9	22,4 (6,6-38,3)
Un peu	3,8	5,8 (0,5-11,1)
Pas du tout	0,0	s.o.

Proportion de données manquantes : 2,2%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.

**Tableau 246 Interaction avec le professionnel de la santé lors du premier recours à la PrEP :
nécessité de convaincre le professionnel de faire une prescription de PrEP**

<i>Parmi les participants qui ont pris la PrEP prescrite par un médecin (n=134)</i> Lorsqu'on vous a prescrit la PrEP pour la première fois, dans quelle mesure avez-vous senti qu'il vous fallait convaincre le professionnel de la santé de vous faire la prescription ?		
Nécessité de convaincre le professionnel de la santé	% naj	% aj (IC 95%)
Beaucoup	7,6	5,2 (0,0-10,3)
Modérément	16,7	30,4 (13,9-46,9)
Un peu	14,4	9,2 (2,9-15,4)
Pas du tout	61,4	55,3 (39,4-71,2)

Proportion de données manquantes : 1,5%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 247 Coût de la PrEP

<i>Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont déjà pris la PrEP au cours de leur vie (n=145)</i> La dernière fois que vous avez fait remplir une prescription de PrEP dans une pharmacie, quel montant avez-vous dû payer avec votre propre argent (après le remboursement d'un assureur) ?		
Montant payé de son propre argent (\$ canadien)	% naj	% aj (IC 95%)
0,00 \$ (gratuit)	38,8	37,9 (22,1-53,6)
Moins de 25 \$	5,4	4,1 (0,1-8,1)
25 \$ à 149 \$	45,0	48,4 (32,9-63,9)
150 \$ à 299 \$	8,5	7,4 (0,0-15,9)
300 \$ à 899 \$	2,3	2,2 (0,0-9,5)

Proportion de données manquantes : 3,7%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 248 Satisfaction générale en regard de l'expérience de prise de la PrEP

<i>Parmi les participants VIH- ou inconnu qui ont déjà pris la PrEP au cours de leur vie (n=145)</i> Dans l'ensemble, comment décririez-vous votre niveau de satisfaction par rapport à votre expérience de la prise de PrEP ?		
Niveau de satisfaction	% naj	% aj (IC 95%)
Pas du tout satisfait	4,1	3,1 (0,0-8,2)
Un peu satisfait	5,5	12,5 (2,8-22,3)
Modérément satisfait	35,2	44,5 (28,8-60,1)
Très satisfait	55,2	39,9 (24,7-55,2)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



6.8 Stratégies combinées de réduction des risques

Tableau 249 Stratégies combinées de réduction des risques parmi les participants de statut VIH positif

<i>Parmi les participants de statut VIH positif (n=211)</i> Certains hommes séropositifs au VIH adoptent des conduites pour éviter de transmettre le VIH à leurs partenaires sexuels, au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu l'une ou l'autre des conduites suivantes pour éviter de transmettre le VIH à vos partenaires ? (Cochez tout ce qui s'applique) *		
Stratégies de réduction des risques	% naj	% aj (IC 95%)
Avoir des relations sexuelles sans CONDOM quand vous savez que les hommes avec qui vous avez des relations sexuelles sont séropositifs au VIH	38,0	27,6 (17,1-38,0)
Avoir des relations sexuelles sans CONDOM si votre charge virale est « indétectable » (basse)	38,0	30,2 (19,6-40,9)
Avoir des relations sexuelles sans CONDOM avec des hommes séronégatifs au VIH qui sont sous PrEP (prophylaxie pré-exposition)	33,5	18,1 (10,5-25,7)
Demander le statut sérologique VIH de vos partenaires avant d'avoir des relations sexuelles	33,5	27,8 (17,7-37,9)
Utiliser le condom en tout temps lors de relations sexuelles avec pénétration anale	30,5	32,5 (20,3-44,8)
Être le partenaire bottom/réceptif lors de relations sexuelles avec pénétration anale	26,5	23,6 (12,6-34,6)
Ne pas éjaculer à l'intérieur de vos partenaires sexuels	25,6	27,1 (17,9-36,3)
Avoir des relations sexuelles moins souvent ou réduire votre nombre de partenaires	22,5	20,0 (10,3-29,6)
Avoir des relations sexuelles sans pénétrations anale	15,0	15,8 (7,4-24,3)
Aucune de ces réponses	14,5	20,4 (10,8-30,0)

Proportion de données manquantes : 0 à 10,0% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



Tableau 250 **Stratégies combinées de réduction des risques parmi les participants de statut VIH négatif ou inconnu**

<i>Parmi les participants de statut VIH-inconnu (n=968)</i> Certains hommes séronégatifs au VIH adoptent des conduites pour éviter d'être infectés par le VIH, au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu l'une ou l'autre des conduites suivantes pour éviter d'être infecté par le VIH par vos partenaires ? (Cochez tout ce qui s'applique) *		
Stratégies combinées de réduction des risques	% naj	% aj (IC 95%)
Utiliser le condom en tout temps lors de relations sexuelles avec pénétration anale	50,8	53,2 (47,7-58,7)
Avoir des relations sexuelles sans pénétrations anales	50,5	42,2 (36,8-47,6)
Demander le statut sérologique VIH de vos partenaires avant d'avoir des relations sexuelles	44,3	39,7 (34,2-45,2)
Avoir des relations sexuelles moins souvent ou réduire votre nombre de partenaires	35,3	37,7 (32,3-43,1)
Avoir des relations sexuelles sans condom quand vous savez que les hommes avec qui vous avez des relations sexuelles sont séronégatifs au VIH	41,3	32,6 (27,5-37,8)
Être le partenaire top/insertif lors de relations sexuelles avec pénétration anale	28,7	21,5 (16,8-26,3)
Avoir des relations sexuelles sans condom avec des hommes séronégatifs au VIH et qui sont sous PrEP (prophylaxie pré-exposition)	24,2	19,6 (15,2-23,9)
Ne pas laisser vos partenaires éjaculer en vous	22,4	20,6 (16,3-24,9)
Utiliser la prophylaxie post-exposition (PPE)	7,5	10,6 (7,2-14,1)
Utiliser la prophylaxie pré-exposition (PrEP)	13,2	9,5 (6,5-12,5)
Avoir des relations sexuelles sans condom quand vous savez que les hommes avec qui vous avez des relations sexuelles sont séropositifs au VIH et ont une charge virale indétectable (basse)	11,9	8,4 (5,4-11,4)
Aucune de ces réponses	2,4	3,1 (1,4-4,7)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.



6.9 Traitement du VIH, participants de statut VIH positif

Cette section s'adresse aux personnes ayant rapporté être de statut VIH positif

6.9.1 Accès aux soins et aux traitements antirétroviraux

Tableau 251 Date du premier résultat positif d'un test de détection du VIH

Parmi les participants de statut VIH positif (n=211) Quand avez-vous eu un test du VIH positif pour la première fois ?		
Année du premier test du VIH positif	% naj	% aj (IC 95%)
Avant 1996 (avant la disponibilité de médicaments anti-VIH)	36,0	38,8 (27,0-50,6)
1996 à 2008 (disponibilité de médicaments anti-VIH)	35,0	35,3 (23,9-46,7)
Après 2008 (époque du mouvement indétecté = intransmissible)	29,0	25,9 (15,2-36,6)

Proportion de données manquantes : 5,2%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Veuillez voir le préambule de la section 'répondants séropositifs' pour une explication des trois périodes de traitement du VIH.

- 1) **Avant 1996 (pré-médicaments anti-VIH)** - Les personnes qui ont été diagnostiquées avant 1996 n'ont pas eu alors accès à des médicaments antirétroviraux (ou anti-VIH) efficaces. À cette époque, un diagnostic d'infection au VIH était souvent considéré comme une condamnation à mort ;
- 2) **De 1996 à 2008 (premiers médicaments anti-VIH)** - Les personnes qui ont été diagnostiquées entre 1996 et 2008 ont pu recevoir des traitements afin de gérer leur infection, mais ils devaient prendre plusieurs comprimés plusieurs fois par jour et subir de multiples effets secondaires, souvent sévères ;
- 3) **Après 2008 (ère I=I)** - Les personnes qui ont été diagnostiquées après 2008 ont eu accès à des traitements efficaces et simples (un comprimé par jour), engendrant peu d'effets secondaires. ; cette époque correspond à la naissance du mouvement indétectable = intransmissible (I=I).

Parmi les participants de statut VIH positif ayant reçu un diagnostic d'infection à VIH il y a moins de deux ans (n=12)

Moment du dernier test de détection du VIH avant le premier résultat positif d'un test du VIH

- 3 avaient obtenu un résultat négatif d'un à six mois avant leur test positif ;
- 3 avaient obtenu un résultat négatif de sept à douze mois avant leur test positif ; et,
- 4 avaient obtenu un résultat négatif il y a plus de douze mois avant leur test positif,
- 2 n'avaient jamais passé de test du VIH avant de recevoir leur premier résultat positif.

Délai entre le résultat du premier résultat positif d'un test du VIH et la première consultation médicale pour des soins reliés au VIH

- 4 n'avaient pas dû attendre pour leur première consultation au sujet du VIH après avoir reçu leur résultat positif car ils l'avaient eu au moment de leur premier test du VIH positif ;
- 4 avaient eu la consultation dans la semaine suivant leur premier résultat positif ;
- 3 avaient eu la consultation entre une semaine et un mois après leur premier résultat positif ; et,
- 1 avait eu la consultation entre un et deux mois après son premier résultat positif.

Parmi les personnes qui ont retardé à consulter un professionnel pour des soins VIH,

Les raisons invoquées* incluent (n=4) :

- "Je ne voulais pas croire le résultat du test" (n=3) ;
- "Je voulais attendre le plus longtemps possible avant de commencer à prendre des médicaments anti-VIH" (n=3) ;
- "Je ne voulais pas penser au fait que j'étais séropositif" (n=2) ;
- "Je me sentais en bonne santé" (n=1) ;
- "J'étais incapable de prendre rendez-vous pour une évaluation médicale auprès d'un professionnel pour des soins VIH" (n=1) ;

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives.



Tableau 255 Moment du plus récent rendez-vous pour des soins reliés au VIH

Parmi les participants de statut VIH positif ayant un professionnel ou une clinique médicale pour les soins du VIH (n=197) À quand remonte votre plus récent rendez-vous chez votre professionnel ou votre clinique pour des soins VIH ?		
Temps écoulé depuis le plus récent rendez-vous	% naj	% aj (IC 95%)
Il y a moins d'un mois	45,7	51,4 (39,2-63,5)
Il y a entre 1 et 3 mois	32,5	27,6 (16,1-39,2)
Il y a entre 3 et 6 mois	16,2	16,4 (7,6-25,1)
Il y a entre 6 et 12 mois	4,6	4,0 (0,0-8,5)
Il y a entre 12 et 24 mois (1 à 2 ans)	1,0	0,6 (0,0-1,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

À noter : Plusieurs facteurs influencent la fréquence de visites médicales. Habituellement, les personnes vivant avec le VIH et prenant des antirétroviraux ont des visites à tous les 3 à 4 mois. Des visites à tous les 6 mois sont recommandées lorsque la charge virale est indétectable et les marqueurs de la fonction immunitaire sont stables depuis deux ans¹⁴.

Tableau 256 Niveau de satisfaction par rapport aux soins reliés au VIH reçus au cours des 12 derniers mois

Parmi les participants de statut VIH positif ayant un professionnel ou une clinique médicale pour les soins du VIH et qui ont reçu des soins au cours des 12 derniers mois (n=195) Dans l'ensemble, comment décririez-vous votre niveau de satisfaction par rapport aux soins VIH que vous avez reçus au cours des 12 derniers mois ?		
Niveau de satisfaction	% naj	% aj (IC 95%)
Pas du tout satisfait	2,1	2,9 (0,0-9,6)
Un peu satisfait	3,1	6,7 (0,0-15,3)
Modérément satisfait	12,8	7,5 (3,3-11,6)
Très satisfait	82,1	82,9 (72,3-93,5)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

¹⁴ Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. "Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents living with HIV: Laboratory Testing Schedule for Monitoring Patients with HIV Before and After Initiation of Antiretroviral Therapy" (2018). Accédé 2019-août-08 à <https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/htmltables/1/6999>.



Tableau 257 Prise de médicaments contre l'infection au VIH

Parmi les participants de statut VIH positif (n=211) Avez-vous déjà pris des médicaments prescrits pour traiter votre infection au VIH ?		
Prise de médicaments pour traiter l'infection au VIH	% naj	% aj (IC 95%)
Oui, et j'en prends encore maintenant	96,5	97,8 (95,4-100,0)
Oui, mais je ne prends pas de médicaments anti-VIH en ce moment	2,0	1,3 (0,0-3,6)
Non, je n'ai jamais pris de médicaments anti-VIH	1,5	0,9 (0,0-1,8)

Proportion de données manquantes : 5,2%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 258 Année du début de la prise de médicaments contre l'infection au VIH

Parmi les participants de statut VIH positif qui ont déjà pris des médicaments pour le VIH (n=197) Quand avez-vous commencé à prendre des médicaments pour traiter votre infection au VIH ? Si vous n'êtes pas certain, répondez au mieux de votre connaissance.								
Nombre d'années après le premier résultat positif d'un test du VIH	Avant 1996 (n=72)		1996 à 2008 (n=70)		Après 2008 (n=55)		Total (n=197)	
	%naj	%aj (IC 95%) *	%naj	%aj (IC 95%)	%naj	%aj (IC 95%)	%naj	%aj (IC 95%)
Même année	48,6	s.o	70,0	s.o	84,2	s.o	66,5	65,0 (53,2-76,7)
1 à 2 ans	8,6	s.o	14,3	s.o	14,0	s.o	12,2	9,7 (2,8-16,7)
3 à 5 ans	5,7	s.o	5,7	s.o	1,8	s.o	4,6	5,3 (0,0-13,4)
6 à 10 ans	17,1	s.o	5,7	s.o	0,0	s.o	8,1	7,9 (3,6-12,1)
Plus de 10 ans	20,0	s.o	4,3	s.o	0,0	s.o.	8,6	12,1 (3,4-20,7)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.

L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



Tableau 259 Raisons pour avoir retardé ou évité de commencer à prendre des médicaments contre l'infection au VIH, selon l'année du diagnostic d'infection au VIH

Parmi les participants de statut VIH positif qui ont déjà pris des médicaments contre le VIH (n=197) Avez-vous retardé ou évité de commencer à prendre des médicaments anti-VIH pour l'une ou l'autre des raisons suivantes ? Veuillez fournir une réponse pour chaque affirmation.									
	Année du diagnostic d'infection au VIH								
Raison	Avant 1996 (n=72)		1996 à 2008 (n=70)		Après 2008 (n=55)		Total (n=197)		
	%naj	%aj (IC 95%) *	%naj	%aj (IC 95%) *	%naj	%aj (IC 95%) *	%naj	%aj (IC 95%)	
Rien ne m'a fait retarder ; je n'ai pas retardé à voir un professionnel pour des soins VIH.	40,3	s.o.	54,3	s.o.	62,1	s.o.	51,5	54,4 (42,3-66,4)	
Mon médecin ne m'a jamais parlé de prendre un traitement.	1,4	s.o.	4,3	s.o.	1,7	s.o.	2,5	3,8 (0,0-11,5)	
Mon médecin m'a dit que, pour des raisons médicales, je n'avais pas encore besoin de suivre un traitement.	11,1	s.o.	22,9	s.o.	17,2	s.o.	17,0	17,5 (9,1-25,9)	
Je ne me sentais pas prêt.	25,0	s.o.	20,0	s.o.	17,2	s.o.	21,0	15,3 (5,9-24,6)	
Je n'aimais pas l'idée de prendre des pilules, à moins que ce soit absolument nécessaire.	11,1	s.o.	14,3	s.o.	6,9	s.o.	11,0	8,3 (1,3-15,2)	
J'ai une charge virale indétectable depuis longtemps sans avoir pris de médicaments anti-VIH.	9,7	s.o.	2,9	s.o.	3,4	s.o.	5,5	8,5 (0,0-17,9)	
Je n'étais pas admissible au traitement en vertu de ma politique d'assurance médicaments.	0,0	s.o.	1,4	s.o.	5,2	s.o.	2,0	0,8 (0,0-2,1)	
Je ne voulais pas avoir d'effets secondaires à cause des médicaments anti-VIH.	11,1	s.o.	15,7	s.o.	6,9	s.o.	11,5	11,2 (1,3-21,0)	
Mon médecin m'a recommandé d'interrompre mon traitement à cause d'effets secondaires, d'autres maladies, de restrictions en matière de voyage ou d'une chirurgie.	2,8	s.o.	0,0	s.o.	3,4	s.o.	2,0	2,0 (0,0-7,1)	
Je n'avais pas les moyens de couvrir le coût des médicaments.	1,4	s.o.	2,9	s.o.	8,6	s.o.	4,0	4,3 (0,0-12,1)	
J'en avais pris dans le passé mais j'ai décidé d'arrêter.	6,9	s.o.	0,0	s.o.	1,7	s.o.	3,0	3,1 (0,0-6,5)	
Autre	6,9	s.o.	7,1	s.o.	6,9	s.o.	7,0	3,6 (0,0-8,5)	

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.= sans objet.

* L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



Tableau 260 Charge virale du VIH, auto-rapportée

Parmi les participants de statut VIH positif (n=211) En ce moment, selon vous, quelle est votre charge virale du VIH ?		
Charge virale du VIH, auto-rapportée	% naj	% aj (IC 95%)
Détectable (plus de 50 copies/ml)	9,0	7,4 (1,4-13,4)
Indétectable	88,0	88,5 (80,9-96,1)
Ne sait pas / incertain	3,0	4,1 (0,0-9,1)

Proportion de données manquantes : 5,2%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

“Charge virale indétectable” Une charge virale indétectable correspond à une charge virale inférieure au seuil de détection du virus par les tests VIH courants¹⁵. Malgré le fait qu'il existe des tests capables de détecter le virus à moins de 20 copies/ml, le seuil de 50 copies/ml, correspondant au seuil de détection habituel au Québec, a été choisi comme seuil de suppression virale afin de faciliter la comparaison entre les générations de tests du VIH. Parmi les participants à Engage de statut VIH positif, environ 8 /10 (81,6%, IC 95 % : 72,4-90,7) avaient une charge virale inférieure à 50 copies/ml lors de leur visite.

‘Virus non transmissible’ Dans le cadre de l'initiative I=I (indétectable = intransmissible), l'indétectabilité signifie que la charge virale se situe à un niveau auquel la transmission du virus est impossible lors de relations sexuelles (toutes les sortes) ou d'injections intraveineuses. Le consensus est que cette limite correspond à 200 copies/ml, cependant certains groupes considèrent que le virus ne serait pas transmissible même en présence d'une charge virale de 1000 copies/ml¹⁶. Parmi les participants à Engage de statut VIH positif, environ 9/10 (89,5%, IC 95 % : 81,5-97,6) avaient une charge virale inférieure à 200 copies/ml lors de leur visite.

¹⁵ UNAIDS, Ending AIDS: Progress Towards the 90-90-90 Targets, 2017

¹⁶ Prevention Access Campaign, Risque de transmission sexuelle du VIH d'une personne séropositive avec une charge virale indétectable: Messages introductifs et déclaration de consensus, 2017, Accédé 2019-août-15 à <https://www.sidaction.org/actualites/declaration-de-consensus-634>



6.9.2 Adhésion aux médicaments anti-VIH

L'adhésion aux médicaments anti-VIH a été évaluée en utilisant l'échelle « The Center for Adherence Support Evaluation (CASE) Adherence Index » (Mannheimer et al. 2006)¹⁷. L'échelle contient les trois questions suivantes :

Tableau 261 Difficultés à prendre les médicaments contre l'infection au VIH à l'heure prescrite

<i>Parmi les participants de statut VIH positif qui prennent des médicaments pour le VIH actuellement (n=193)</i> À quelle fréquence est-ce difficile de prendre vos médicaments anti-VIH à l'heure prescrite ? L'expression « à l'heure prescrite » veut dire un maximum de deux heures avant ou après l'heure à laquelle votre médecin vous a dit de prendre vos médicaments.		
	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais	42,0	49,7 (37,5-61,9)
Rarement	42,5	31,9 (21,9-41,9)
La plupart du temps	11,9	10,4 (1,7-19,2)
Tout le temps	3,6	7,9 (1,0-14,9)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 262 Oubli d'une dose des médicaments contre l'infection au VIH au cours d'une période d'une semaine

<i>Parmi les participants de statut VIH positif qui prennent des médicaments pour le VIH actuellement (n=193)</i> En moyenne, combien de jours par semaine oubliez-vous de prendre au moins une dose de vos médicaments anti-VIH ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Tous les jours	1,0	3,0 (0,0-10,7)
4 à 6 jours par semaine	0,5	0,1 (0,0-0,4)
2 à 3 jours par semaine	4,7	8,7 (3,6-13,8)
Une fois par semaine	10,9	4,9 (0,4-9,3)
Moins d'une fois par semaine	37,8	29,7 (19,4-39,9)
Jamais (6)	45,1	53,7 (41,4-66,0)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 263 Oubli d'une dose des médicaments contre l'infection au VIH, date de la dernière fois

<i>Parmi les participants de statut VIH positif qui prennent des médicaments pour le VIH actuellement (n=193)</i> À quand remonte la dernière fois que vous avez oublié de prendre au moins une dose de vos médicaments anti-VIH ?		
Moment du dernier oubli d'une dose	% naj	% aj (IC 95%)
Au cours de la dernière semaine	15,5	9,1 (2,6-15,5)
Il y a 1 à 2 semaines	17,6	17,2 (8,1-26,2)
Il y a 3 à 4 semaines	10,4	9,5 (5,7-13,2)
Il y a entre 1 et 3 mois	14,0	14,7 (6,1-23,3)
Il y a plus de 3 mois	15,5	17,2 (8,5-25,9)
Jamais	26,9	32,4 (19,9-44,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

¹⁷ Mannheimer, S. B., et al. "The CASE adherence index: A novel method for measuring adherence to antiretroviral therap.," AIDS care 18.7 (2006): 853-861



L'adhésion aux médicaments anti-VIH - Calcul des scores

Le nombre de points attribués à un énoncé varie selon la question : 1. À quelle fréquence est-ce difficile de prendre vos médicaments anti-VIH à l'heure prescrite : Jamais (4 points), rarement (3 points), la plupart du temps (2 points) tout le temps (1 point); 2. En moyenne, combien de jours par semaine pensez-vous avoir oublié de prendre au moins une dose de vos médicaments anti-VIH : Tous les jours (1 point), 4 à 6 jours par semaine (2 points), 2 à 3 jours par semaine (3 points), une fois par semaine (4 points), moins d'une fois par semaine (5 points), jamais (6 points); 3. À quand remonte la dernière fois que vous avez oublié de prendre au moins une dose de vos médicaments anti-VIH : Il y a 1 à 2 semaines (2 points), il y a 3 à 4 semaines (3 points), il y a entre 1 et 3 mois (4 points), il y a plus de 3 mois (5 points), jamais (6 points).

Le score d'un participant est obtenu en additionnant les points attribués à chacun des énoncés de l'échelle, il varie de 1 à 16. Un score de plus de 10 correspond à une « bonne adhérence ». Parmi les participants de statut VIH positif qui prennent des médicaments pour le VIH, naj : 69,9% aj : 78,5% (IC 95% : 69,9%-87,1%) avaient un score à l'index "Case Adherence" correspondant à une "bonne adhérence", tandis que naj : 30,1% aj : 21,5% (IC 95% : 12,9%-30,1%) avaient un score correspondant à une "mauvaise adhérence". À noter que parmi les 56 participants qui avaient un score correspondant à une "mauvaise adhérence", 52 avaient tout de même une charge virale indétectable (moins de 200 copies/ml).

Le score moyen d'adhésion pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant.

Tableau 264 L'adhésion aux médicaments anti-VIH – Sommaire

<i>Parmi les participants de statut VIH positif qui prennent des médicaments pour le VIH actuellement (n=193)</i>		
Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée ¹ (IC 95%)
6-16	12,2 (2,9)	12,5 (11,9-13,2)

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)



7

État de santé



7 États de santé

7.1 Santé sexuelle

Tableau 265 Problèmes de fonctionnement sexuel

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours des 6 derniers mois, avez-vous vécu l'une ou l'autre des situations suivantes ?								
Problèmes de fonctionnement sexuel	Jamais		Parfois		Souvent		Très souvent	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Perte de libido (désir sexuel)	39,9	43,9 (38,6-49,2)	44,7	42,5 (37,4-47,7)	9,8	8,8 (6,0-11,6)	5,5	4,8 (2,7-6,8)
Problème érectile	47,1	53,1 (47,9-58,3)	41,6	35,8 (30,8-40,9)	6,8	6,1 (4,7-7,5)	4,4	5,0 (3,2-6,8)
Éjaculation précoce ou retardée	51,6	54,1 (48,8-59,4)	34,4	33,2 (28,3-38,1)	9,8	8,8 (5,7-11,9)	4,3	3,9 (1,4-6,4)

Proportion de données manquantes 2,1% à 4,6% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

Tableau 266 Auto-évaluation de sa santé sexuelle au cours des 6 derniers mois

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours des 6 derniers mois, vous diriez que votre santé sexuelle était... ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Excellente	18,3	17,2 (13,2-21,1)
Très bonne	30,0	29,3 (24,5-34,2)
Bonne	29,5	32,5 (27,6-37,5)
Acceptable	15,2	13,4 (10,0-16,8)
Médiocre	6,9	7,6 (4,6-10,6)

Proportion de données manquantes : 0,2%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

L'échelle « Satisfaction sexuelle » (Sexual Satisfaction Scale, Stulhofer et al. 2010)¹⁸ vise à fournir une mesure de satisfaction sexuelle multidimensionnelle. L'échelle est basée sur un modèle conceptuel qui comprend 5 domaines du comportement sexuel : sensations sexuelles, conscience et concentration sexuelles, échange sexuel, proximité émotionnelle et activité sexuelle. L'échelle originale contient 20 énoncés, répartis en 2 sous-échelles : 'satisfaction du répondant' et 'satisfaction du partenaire appréciée par le répondant'. Seule la sous-échelle 'satisfaction ressentie par le répondant' a été retenue dans le questionnaire Engage). Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants selon leur niveau de satisfaction pour chaque énoncé de cette sous-échelle.

¹⁸ Stulhofer A, Busko V, Brouillard P. Development and bicultural validation of the new sexual satisfaction scale. *Journal of sex research*. 2010;47(4):257-268.

**Tableau 267 Satisfaction sexuelle**

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) En pensant à votre vie sexuelle des 6 derniers mois, indiquez votre niveau de satisfaction pour chacun des items suivants :										
	Pas du tout satisfait		Légèrement satisfait		Moyennement satisfait		Très satisfait		Extrêmement satisfait	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Le plaisir que vous apportez à votre partenaire	2,2	1,9 (0,8-3,0)	6,0	8,5 (5,5-11,6)	24,1	28,3 (23,5-33,0)	44,4	42,0 (36,8-47,3)	23,3	19,2 (15,1-23,4)
La façon dont vous réagissez à votre partenaire sur le plan sexuel	2,9	2,7 (1,0-4,3)	8,4	10,2 (7,3-13,2)	27,4	30,0 (25,2-34,7)	45,2	43,3 (38,1-48,6)	16,1	13,8 (10,0-17,5)
L'intensité de votre excitation sexuelle	4,0	4,5 (2,3-6,7)	9,2	10,6 (7,4-13,9)	30,7	32,1 (27,2-37,0)	38,7	38,5 (33,3-43,7)	17,5	14,3 (10,7-17,8)
Votre attention/votre concentration pendant les relations sexuelles	4,4	4,5 (2,6-6,4)	12,7	15,3 (11,7-18,9)	29,4	32,4 (27,6-37,3)	40,2	35,2 (30,0-40,4)	13,3	12,6 (9,0-16,1)
Votre humeur après les relations sexuelles	4,5	7,0 (4,4-9,5)	9,1	10,1 (6,8-13,4)	21,8	22,6 (18,4-26,9)	42,6	40,7 (35,4-45,9)	22,0	19,6 (15,4-23,8)
La qualité de vos orgasmes	4,6	6,0 (3,5-8,5)	8,6	9,1 (6,0-12,2)	28,7	31,3 (26,3-36,3)	41,3	38,7 (33,6-43,8)	16,8	14,9 (11,3-18,5)
La façon dont votre corps fonctionne sexuellement	5,6	4,3 (2,7-5,9)	10,8	14,4 (10,8-18,0)	28,5	26,3 (21,8-30,9)	39,2	39,8 (34,6-45,0)	15,8	15,2 (11,2-19,1)
Votre capacité de vous « laisser aller » et de vous abandonner au plaisir sexuel pendant vos relations sexuelles	7,0	6,5 (4,0-9,0)	13,1	16,3 (12,5-20,2)	29,7	30,1 (25,2-35,0)	35,0	34,7 (29,6-39,7)	15,2	12,4 (9,0-15,9)
Votre ouverture sur le plan émotionnel pendant les relations sexuelles	7,1	8,8 (6,1-11,5)	12,2	13,6 (10,1-17,1)	27,4	28,6 (23,8-33,3)	35,9	33,0 (27,9-38,2)	17,3	16,0 (12,2-19,7)
La fréquence de vos orgasmes	8,0	8,4 (5,4-11,4)	10,7	12,4 (9,0-15,9)	27,5	28,3 (23,7-33,0)	36,2	35,5 (30,4-40,6)	17,6	15,3 (11,5-19,2)

Proportion de données manquantes 2,8% à 3,6% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Stulhofer A, Busko V, Brouillard P. Development and bicultural validation of the new sexual satisfaction scale. *Journal of sex research*. 2010;47(4):257-268.



Satisfaction sexuelle - Calcul des scores

Les participants ayant préféré ne pas répondre à un ou plusieurs des énoncés ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 1 à 5 selon le degré de satisfaction du participant ; le degré « pas du tout satisfait » équivaut à 1 point tandis que le degré « extrêmement satisfait » équivaut à 5 points. Le score d'un participant est obtenu en additionnant les points attribués à chacun des énoncés de la sous-échelle, il varie de 10 à 50. Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant. Une valeur élevée indique que les participants ont davantage de satisfaction sexuelle.

Tableau 268 **Satisfaction sexuelle – Sommaire**

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i>		
Satisfaction sexuelle		
Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée¹ (IC 95%)
10-50	34,5 (9,8)	32,2 (30,9-33,4)

Proportion de données manquantes : 0,5%

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



7.2 Santé mentale

7.2.1 Traumatisme subis pendant l'enfance

L'échelle « Traumatismes subis durant l'enfance » (Childhood Trauma Questionnaire Short Form [CTQSF], Bernstein et al. 2003)¹⁹ vise à mesurer les expériences auto déclarées de maltraitance et de négligence pendant l'enfance et l'adolescence. L'échelle originale contient 28 énoncés, répartis en 5 sous-échelles. Une seule d'entre elles, abus sexuel, a été retenue dans le questionnaire Engage. Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants selon la fréquence à laquelle chaque situation est survenue durant leur enfance. L'énoncé « Quelqu'un a porté atteinte à ma pudeur (indécence à caractère sexuel sans pénétration) » est une traduction imprécise de l'énoncé original en anglais « Someone molested me ».

Tableau 269 Traumatismes subis durant l'enfance – Abus sexuel

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Ces questions portent sur votre enfance. Bien qu'elles soient très personnelles, tentez d'y répondre aussi honnêtement que possible. Pour chacune d'entre elles, choisissez la réponse qui correspond le mieux à ce que vous ressentez.										
Types de traumatismes subis pendant l'enfance	Jamais (1)		Rarement (2)		Parfois (3)		Souvent (4)		Très Souvent (5)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Quelqu'un a tenté de me faire des attouchements sexuels ou m'a incité à le ou la toucher.	65,7	68,1 (63,1-73)	16,3	14,4 (10,9-17,9)	11,4	11,2 (7,4-15,0)	4,1	3,9 (1,8-6,0)	2,6	2,4 (1,5-3,4)
Je crois que j'ai été victime d'abus sexuel.	76,1	74,9 (70,5-79,3)	9,1	10,4 (7,4-13,5)	7,1	7,1 (4,9-9,3)	4,0	4,7 (2,2-7,2)	3,7	2,9 (1,3-4,4)
Quelqu'un a porté atteinte à ma pudeur (indécence à caractère sexuel sans pénétration).	78,9	75,8 (71,5-80,1)	9,7	10,4 (7,6-13,1)	6,5	9,0 (6,0-12,0)	2,9	2,8 (0,9-4,7)	2,1	2,0 (1,3-2,7)
Quelqu'un a tenté de me faire faire ou de me faire regarder des choses sexuelles.	79,3	76,7 (72,2-81,1)	9,2	12,2 (8,8-15,7)	6,8	6,7 (4,1-9,3)	3,2	3,0 (1,0-5,0)	1,5	1,4 (0,8-2,1)
Quelqu'un m'a menacé de me faire du mal ou de dire des mensonges à mon sujet si je ne faisais pas des choses sexuelles avec lui ou elle.	87,8	87,2 (83,5-90,8)	5,5	7,4 (4,8-10,1)	3,3	2,9 (0,8-5)	2,1	1,9 (0,2-3,6)	1,4	0,6 (0,0-1,2)

Proportion de données manquantes : de 6,4% à 7,5% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

¹⁹ Bernstein DP, Stein JA, Newcomb MD, et al. Development and validation of a brief screening version of the childhood trauma questionnaire. Child abuse & neglect. 2003;27(2):169-190.



Traumatismes subis durant l'enfance - Calcul des scores

Les participants ayant préféré ne pas répondre à un ou tous les deux des énoncés ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 1 à 5 selon la fréquence à laquelle chaque participant sent que chaque situation est survenue durant leur enfance. La fréquence « jamais » équivaut à 1 point tandis que la fréquence « très souvent » équivaut à 5 points. Le score d'un participant est calculé en additionnant les points attribués aux énoncés. Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant. Une valeur élevée indique que les participants ont subis davantage d'abus sexuel durant leur enfance.

Tableau 270 Traumatismes subis durant l'enfance – Abus sexuel - Sommaire

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)		
Score global		
Moyenne (écart-type)	Étendue	Moyenne ajustée¹ (IC 95%)
7,1 (3,9)	5-25	7,1 (6,7-7,5)

Proportion de données manquantes : 8,1%.

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



7.2.2 Antécédents de diagnostics d'un trouble de santé mentale

Tableau 271 Antécédents de diagnostics d'un trouble de santé mentale

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Vous êtes-vous déjà fait dire par un médecin, un psychologue ou un psychiatre que vous aviez l'un ou l'autre des troubles de santé mentale suivants ?						
Trouble de santé mentale	Oui, au cours des 6 derniers mois		Oui, il y a plus de 6 mois		Oui, à vie	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Trouble anxieux (p. ex. crises de panique, anxiété sociale, inquiétudes)	17,5	17,1 (13,0-21,3)	19	16,9 (12,9-20,9)	36,6	34,2 (29,1-39,2)
Trouble lié au stress	14,1	16,2 (12,5-19,8)	12,5	10,7 (7,7-13,8)	26,7	27,0 (22,5-31,4)
Trouble dépressif majeur	7,4	9,8 (6,7-12,9)	10,7	8,0 (5,2-10,7)	19,2	18,3 (14,3-22,3)
Trouble lié à la consommation de substances (abus, dépendance)	6,0	6,1 (3,8-8,4)	7,5	5,9 (4,3-7,5)	13,4	12,0 (9,2-14,8)
Trouble déficitaire de l'attention (TDA)/Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH)	4,6	4,8 (3-6,6)	7,4	5,8 (3,8-7,7)	12,0	10,6 (7,9-13,2)
Trouble de stress post-traumatique	5,2	4,2 (1,9-6,4)	5,6	4,6 (2,5-6,7)	10,8	8,7 (5,8-11,7)
Trouble de la personnalité limite	3	3,4 (1,6-5,3)	2,8	3,3 (0,8-5,8)	5,8	6,7 (3,7-9,8)
Trouble bipolaire	2,2	2,0 (-0,1-4,1)	3,2	2,6 (0,5-4,8)	5,4	4,7 (1,7-7,6)
Autre trouble de santé mentale (précisez)* :	3,2	2,5 (0,8-4,1)	3,4	2,3 (1,1-3,5)	6,5	4,7 (2,7-6,7)
L'un ou l'autre diagnostic de trouble de santé mentale	26,5	25,8 (21,4-30,2)	34,3	30,5 (25,8-35,2)	51,0	48,7 (43,6-53,8)

Proportion de données manquantes : 3,4% à 6,4% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Parmi les réponses « autres », les 10 réponses les plus fréquentes étaient : trouble obsessionnel-compulsif (TOC, n=7), syndrome d'épuisement professionnel (n=5), trouble d'adaptation (n=4), trouble schizo-affectif (n=4), trouble du spectre de l'autisme (n=2), dysthymie (n=2), insomnie (n=2)



7.2.3 Auto-évaluation de sa santé mentale

Les trois-quarts des participants ont rapporté que leur santé mentale était bonne, très bonne ou excellente

Tableau 272 Auto-évaluation de sa santé mentale

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Au cours des six derniers mois, comment était votre santé mentale en général ?		
État de sa santé mentale auto-rapportée	% naj	% aj (IC 95%)
Excellente	19,5	20,0 (15,5-24,5)
Très Bonne	29,1	27,9 (23,4-32,3)
Bonne	28,9	27,9 (23,2-32,6)
Passable	16,4	17,1 (13,2-20,9)
Mauvaise	6,1	7,1 (3,9-10,4)

Proportion de données manquantes : 2%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

7.2.4 Harcèlement hétérosexiste, rejet et discrimination

L'échelle « Harcèlement hétérosexiste, rejet et discrimination » (Heterosexist Harassment, Rejection and Discrimination Scale, Szymanski 2006)²⁰ vise à évaluer le harcèlement hétérosexiste, le rejet et la discrimination subis au cours de la dernière année. L'échelle contient 14 énoncés, répartis en 3 sous-échelles : hétérosexisme et rejet, emploi et milieu scolaire, discrimination dans divers contextes. L'énoncé « Avant l'âge de 18 ans, combien de fois avez-vous fait rire de vous, été intimidé, poussé, frappé ou menacé de violence parce que vous étiez un homme gai/bisexuel ? » a été ajouté dans le questionnaire Engage et ne fait pas partie de l'échelle originale. Les tableaux suivants présentent la répartition des réponses des participants selon la fréquence à laquelle chaque événement est survenu au cours de la dernière année.

²⁰ Szymanski D. Does internalized heterosexism moderate the link between heterosexist events and lesbians' psychological distress? Sex roles. 2006;54(3-4):227-234.


Tableau 273 Échelle de harcèlement heterosexiste, rejet et discrimination : Sous-échelle 'hétérosexisme et rejet' *

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)												
Pour chacune des questions suivantes, choisissez la fréquence à laquelle l'événement s'est produit au cours de la dernière année.												
Hétérosexisme et rejet	Jamais		De temps en temps (<10 % du temps)		Parfois (10-25 % du temps)		Souvent (26-49 % du temps)		La plupart du temps (50-70 %)		Presque tout le temps (>70 %)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Combien de fois avez-vous été traité de noms tels que tapette ou homo de façon péjorative ?	37,0	40,3 (35,1-45,5)	37,5	32,4 (27,7-37,1)	14,2	14,7 (10,8-18,6)	6,6	7,1 (4,3-9,9)	2,8	3,1 (1,8-4,3)	2,0	2,5 (0,4-4,5)
Combien de fois avez-vous entendu des remarques anti-gaies/bisexuelles de la part de membres de votre famille ?	43,7	44,2 (38,9-49,4)	30,9	26,6 (22,1-31,2)	11,9	13,9 (10,5-17,3)	6,7	7,8 (4,9-10,7)	3,1	3,5 (1,4-5,6)	3,7	4,0 (2,0-6,0)
Combien de fois avez-vous été insulté oralement parce que vous êtes un homme gai/bisexuel ?	49,1	52,8 (47,5-58)	36,7	32,2 (27,3-37,1)	7,2	7,0 (4,1-9,9)	4,1	4,4 (2,2-6,6)	1,6	1,4 (0,5-2,3)	1,3	2,3 (0,7-3,9)
Combien de fois avez-vous été traité injustement par votre famille parce que vous êtes un homme gai/bisexuel ?	55,5	57,8 (52,5-63,0)	23	20,2 (16,1-24,4)	9,9	8,9 (5,9-11,9)	4,2	4,9 (2,1-7,8)	2,8	3,9 (2,1-5,7)	4,5	4,3 (2,1-6,5)
Combien de fois avez-vous fait rire de vous, été intimidé, poussé, frappé, menacé de violence parce que vous êtes un homme gai/bisexuel ?	59,6	62,3 (57,2-67,4)	24,7	20,3 (16,1-24,5)	8,4	9,5 (6,4-12,7)	4,3	4,1 (1,7-6,5)	1,9	2,3 (1,3-3,3)	1,2	1,4 (0,0-2,9)
Combien de fois avez-vous été rejeté par des membres de votre famille parce que vous êtes un homme gai/bisexuel ?	67,2	66,9 (61,9-72,0)	19,0	18,1 (14,1-22,1)	5,0	4,9 (2,6-7,1)	3,4	4,8 (2,1-7,6)	2,2	1,5 (0,4-2,6)	3,2	3,7 (1,6-5,8)
Combien de fois avez-vous été rejeté par des amis parce que vous êtes un homme gai/bisexuel ?	73,1	72,5 (67,8-77,3)	18,3	17,5 (13,3-21,6)	4,7	3,6 (1,5-5,7)	1,9	3,2 (1,3-5,1)	1,4	1,7 (0,7-2,7)	0,7	1,5 (0,2-2,7)
L'un ou l'autre des évènements précédents	22,2	26,4 (21,6-31,1)	37,4	30,7 (26,0-35,4)	18,7	20,0 (15,8-24,1)	10,9	11,0 (7,5-14,5)	4,7	6,2 (4,0-8,4)	6,1	5,8 (3,2-8,4)

Proportion de données manquantes : de 1,6% à 3,1% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Szymanski D. Does internalized heterosexism moderate the link between heterosexist events and lesbians' psychological distress? Sex roles. 2006;54(3-4):227-234.


Tableau 274 Échelle de harcèlement hétérosexiste, rejet et discrimination : Sous-échelle 'emploi et milieu scolaire' *

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Pour chacune des questions suivantes, choisissez la fréquence à laquelle l'événement s'est produit au cours de la dernière année.												
Harcèlement hétérosexiste, rejet et discrimination dans le domaine de l'emploi et de l'enseignement	Jamais		De temps en temps (<10 % du temps)		Parfois (10-25 % du temps)		Souvent (26-49 % du temps)		La plupart du temps (50-70 %)		Presque tout le temps (>70 %)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Combien de fois avez-vous été traité injustement par vos collègues de travail ou vos camarades de classe parce que vous êtes un homme gai/bisexuel ?	57,5	59,3 (54,1-64,5)	23,7	21,3 (17,2-25,3)	10,5	9,7 (6,6-12,8)	4,5	5,8 (2,7-8,8)	2,7	2,4 (0,6-4,2)	1,1	1,6 (0,3-2,9)
Combien de fois avez-vous été traité injustement par votre employeur, votre patron ou vos superviseurs parce que vous êtes un homme gai/bisexuel ?	73,9	73,8 (69,0-78,6)	14,9	13,4 (9,8-17,1)	6,2	7,3 (4,4-10,2)	2,4	2,8 (0,6-4,9)	1,5	1,1 (0,1-2,2)	1,0	1,5 (0,2-2,9)
Combien de fois avez-vous été traité injustement par des enseignants ou des professeurs parce que vous êtes un homme gai/bisexuel ?	75,9	76,2 (71,7-80,7)	13,1	10,0 (7,2-12,8)	6,2	8,0 (5,2-10,8)	2,8	3,2 (0,7-5,8)	1,4	1,5 (0,4-2,6)	0,6	1,1 (0,0-2,4)
Combien de fois avez-vous été privé d'une augmentation de salaire, d'une promotion, d'un poste permanent, d'un projet intéressant, d'un travail ou de toute autre chose dans le cadre de votre emploi parce que vous êtes un homme gai/bisexuel ?	87,7	86,1 (82,2-90,1)	6,8	4,8 (2,9-6,7)	2,4	2,8 (1-4,6)	1,2	3,1 (0,4-5,8)	1,0	1,6 (0,2-2,9)	1,0	1,6 (0,2-3,0)
L'un ou l'autre des évènements précédents	53,9	56,9 (51,7-62,0)	25,0	21,0 (17,0-25,0)	11,3	10,4 (7,3-13,4)	4,8	5,8 (2,6-9,0)	3,4	3,8 (1,8-5,8)	1,6	2,1 (0,7-3,6)

Proportion de données manquantes : de 1,9% à 2,4% selon l'item

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling)

*Szymanski D. Does internalized heterosexism moderate the link between heterosexist events and lesbians' psychological distress? Sex roles. 2006;54(3-4):227-234.


Tableau 275 Échelle de harcèlement heterosexiste, rejet et discrimination : Sous-échelle 'discrimination dans divers contextes' *

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)												
Pour chacune des questions suivantes, choisissez la fréquence à laquelle l'événement s'est produit au cours de la dernière année.												
Harcèlement hétérosexiste, rejet et discrimination dans divers contextes	Jamais		De temps en temps (<10 % du temps)		Parfois (10-25 % du temps)		Souvent (26-49 % du temps)		La plupart du temps (50-70 %)		Presque tout le temps (>70 %)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Combien de fois avez-vous été traité injustement par des inconnus parce que vous êtes un homme gai/bisexuel ?	40,4	46,4 (41,1-51,6)	38,4	32,3 (27,5-37,1)	13,3	11,9 (8,8-15,0)	4,8	5,6 (2,8-8,5)	1,9	1,9 (1,3-2,6)	1,2	1,9 (0,0-3,8)
Combien de fois avez-vous été traité injustement par des gens qui donnent des services à la clientèle (p. ex. des commis de magasin, des serveurs, des barmans, des serveuses et des caissiers de banque) parce que vous êtes un homme gai/bisexuel ?	68,9	72,2 (67,5-76,9)	20,5	17,4 (13,4-21,4)	6,7	6,0 (3,8-8,1)	2,4	2,7 (0,6-4,8)	0,9	0,5 (0,2-0,8)	0,6	1,2 (0,0-2,6)
Combien de fois avez-vous été traité injustement par des gens dans le secteur de la santé (p. ex. des docteurs, des infirmiers, des psychiatres, des dentistes et des conseillers) parce que vous êtes un homme gai/bisexuel ?	78,2	78,2 (73,8-82,6)	14,9	12,9 (9,4-16,5)	3,6	4,8 (2,6-7,0)	1,3	1,3 (0,0-3,0)	1,1	0,7 (0,1-1,3)	0,9	2,0 (0,6-3,4)
L'un ou l'autre des événements précédents	38,4	43,9 (38,7-49,1)	38,9	33,7 (28,8-38,5)	13,6	12,2 (9,0-15,4)	5,2	5,1 (2,3-7,9)	2,3	2,1 (1,3-2,9)	1,6	3,0 (1,0-5,0)

Proportion de données manquantes : 1,3% à 1,4% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Szymanski D. Does internalized heterosexism moderate the link between heterosexist events and lesbians' psychological distress? Sex roles. 2006;54(3-4):227-234.



Tableau 276 - Harcèlement hétérosexiste, rejet et discrimination vécu avant l'âge de 18 ans

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Pour la question suivante, choisissez la fréquence à laquelle l'événement s'est produit avant l'âge de 18 ans : Combien de fois avez-vous fait rire de vous, été intimidé, poussé, frappé ou menacé de violence parce que vous étiez un homme gai/bisexuel ?		
Fréquence de harcèlement subis avant l'âge de 18 ans	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais	72,9	69,2 (64,1-74,3)
De temps en temps (<10 % du temps)	19,3	17,7 (13,7-21,8)
Parfois (10-25 % du temps)	18,3	15,7 (12,4-19,1)
Souvent (26-49 % du temps)	15,6	14,9 (11,1-18,7)
La plupart du temps (50-70 %)	10,3	10,0 (7,4-12,6)
Presque tout le temps (>70 %)	9,5	10,8 (7,4-14,2)

Proportion de données manquantes : 2,4%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Échelle de harcèlement hétérosexiste, rejet et discrimination - Calcul des scores

Les énoncés auxquels les participants ont préféré ne pas répondre ne pas ont été exclus du calcul des scores. L'énoncé « Combien de fois avez-vous fait rire de vous, été intimidé, poussé, frappé ou menacé de violence parce que vous étiez un homme gai/bisexuel ? » n'est pas inclus dans le calcul du score de l'ensemble des 3 sous-échelles. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 1 à 6 selon la fréquence à laquelle chaque événement est survenu au cours de la dernière année ; la fréquence « jamais » équivaut à 1 point tandis que la fréquence « presque tout le temps » équivaut à 6 points. Le score d'un participant est calculé par sous-échelle ou pour l'ensemble de l'échelle. Les scores moyens de chaque sous-échelle et de l'échelle complète sont inscrits au tableau suivant. Une valeur élevée indique davantage d'expériences de harcèlement hétérosexiste, rejet et discrimination vécus au cours de la dernière année.

Tableau 277 Échelle de harcèlement hétérosexiste, rejet et discrimination - Sommaire

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Sommaire des sous-échelles de l'échelle de harcèlement hétérosexiste, rejet et discrimination			
Sous-échelle	Étendue du Score	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée (IC 95%) ¹
Hétérosexisme et rejet	1-6	1,8 (0,9)	1,8 (1,7-1,9)
Emplois et travail	1-6	1,5 (0,79)	1,5 (1,4-1,6)
Discrimination dans divers contextes	1-6	1,6 (0,78)	1,6 (1,5-1,7)
Ensemble des 3 sous-échelles	1-6	1,7 (0,77)	1,7 (1,6-1,8)

Proportion de données manquantes : 3, 6%.

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



7.2.5 Discrimination dans la vie quotidienne

L'échelle « Discrimination dans la vie quotidienne » (Williams et al. 1997)²¹ vise à apprécier un large éventail d'expériences subjectives de discrimination au cours de la vie quotidienne. La discrimination perçue peut nuire à la santé physique, mentale et comportementale en induisant du stress. L'échelle comprend 5 énoncés. Le tableau suivant présente la répartition des réponses des participants selon la fréquence à laquelle chaque situation est survenue.

Tableau 278 Échelle de discrimination dans la vie quotidienne *

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Par les questions suivantes, nous voulons connaître votre perception de la fréquence à laquelle les gens vous ont traité injustement pour des raisons telles que votre sexualité, votre genre, votre ethnicité, votre âge ou votre apparence. Dans votre quotidien, à quelle fréquence vivez-vous les situations suivantes ?										
Situations de harcèlement	Jamais (1)		Moins d'une fois par année (2)		Quelques fois par année (3)		Quelques fois par mois (4)		Au moins une fois par semaine (5)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Vous êtes traité avec moins de courtoisie ou de respect que les autres.	55,7	55,8 (50,5-61)	20,1	17,4 (13-21,8)	15,4	17,1 (13,5-20,7)	4,9	5,0 (2,2-7,7)	4,0	4,7 (2,4-7,0)
Les gens agissent comme s'ils avaient peur de vous.	66,2	68,0 (63,1-73,0)	14,7	13,5 (9,9-17,2)	12,4	12,0 (8,6-15,3)	3,8	4,5 (2,4-6,6)	2,9	2,0 (0,3-3,7)
Vous vous faites menacer ou harceler.	66,3	66,9 (62,0-71,9)	21,3	17,3 (13,5-21,2)	9,1	11,4 (8,0-14,8)	2,0	3,2 (1,1-5,2)	1,4	1,1 (0,0-2,2)
Les gens agissent comme si vous n'étiez pas intelligent.	69,2	69,0 (64,1-73,9)	13,0	11,2 (8,3-14,1)	10,9	10,6 (7,1-14)	3,7	6,5 (3,7-9,4)	3,3	2,7 (0,9-4,5)
Vous recevez un moins bon service que les autres dans les restaurants ou les magasins.	70,1	71,3 (66,6-76,1)	14,7	13,6 (10,3-17,0)	9,6	7,7 (5,0-10,5)	3,1	4,6 (1,9-7,2)	2,4	2,8 (1,0-4,5)
L'une ou l'autre de ces situations	43,9	47,1 (41,9-52,3)	19,9	15,8 (12,0-19,7)	22,3	21,6 (17,5-25,8)	6,9	8,4 (5,3-11,6)	7,0	7,0 (4,2-9,7)

Proportion de données manquantes : 2,2% à 2,6% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Williams DR, Yan Yu, Jackson JS, Anderson NB. Racial differences in physical and mental health: socio-economic status, stress and discrimination. *Journal of health psychology*. 1997;2(3):335-351. doi:10.1177/1359105397002003

²¹ Williams DR, Yan Yu, Jackson JS, Anderson NB. Racial differences in physical and mental health: socio-economic status, stress and discrimination. *Journal of health psychology*. 1997;2(3):335-351. doi:10.1177/1359105397002003



Échelle de discrimination dans la vie quotidienne- Calcul des scores

Les énoncés auxquels les participants ont préféré ne pas répondre ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 1 à 5 selon la fréquence à laquelle chaque situation est survenue au participant. La fréquence « jamais » équivaut à 1 point tandis que la fréquence « au moins une fois par semaine » équivaut à 5 points. Le score d'un participant est obtenu en faisant la moyenne des points attribués à chacun des énoncés, il varie de 1-5. Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant. Une valeur élevée indique que les participants ont vécu davantage de discrimination quotidienne.

Tableau 279 Échelle de discrimination dans la vie quotidienne- Sommaire

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Échelle de discrimination au quotidien : score global		
Moyenne (écart-type)	Étendu	Moyenne ajustée (IC 95%)
1,6 (0,83)	1-5	1,6 (1,5-1,7)

Proportion de données manquantes : 4,1%.

Moyenne ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 280 Échelle de discrimination dans la vie quotidienne distribution des scores

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Distribution des scores de l'échelle de discrimination dans la vie quotidienne		
Catégories des scores	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais (score =1)	44,7	48,1 (42,9-53,4)
Moins d'une fois par année (1< score < 2)	28,2	23,1 (18,8-27,5)
Entre quelques fois par année et quelques fois par mois (2< score < 4)	24,5	25,2 (20,7-29,8)
Au moins une fois par semaine (4< score ≤ 5)	2,7	3,5 (1,2-5,9)

Proportion de données manquantes : 4,1%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 281 Raisons pour lesquelles les participants croient avoir été la cible de discrimination et la raison principale

Parmi les participants qui ont rapporté avoir vécu une forme de discrimination quotidienne (n=655)				
Raisons	Pour quelles raisons croyez-vous avoir vécu ces expériences ? (Cochez tout ce qui s'applique.)*		Selon vous, quelle serait la raison principale parmi celles que vous venez de citer ?	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Votre orientation sexuelle	75,2	73,2 (66,6-79,7)	41,6	40,8 (33,3-48,3)
Votre expression de genre (expression féminine)	20,0	21,1 (15,1-27,1)	8,9	10,3 (6,5-14,1)
Quelque chose en lien avec votre apparence physique autre que votre poids	24,4	23,0 (17,3-28,8)	7,4	7,4 (3,8-10,9)
Votre race	23,0	26,4 (19,1-33,6)	8,7	7,2 (3,0-11,4)
Votre statut sérologique VIH	9,4	9,8 (5,1-14,6)	4,8	5,8 (1,8-9,8)
Votre identité de genre	11,7	15,0 (8,6-21,3)	2,7	5,6 (1,1-10,1)
Votre groupe ethnique	18,5	17,2 (12,1-22,2)	4,2	4,8 (1,6-8,0)
Votre âge	21,1	19,8 (14,0-25,5)	3,7	3,3 (1,4-5,1)
Un problème de santé mentale	12,3	13,6 (8,8-18,3)	2,5	2,8 (0,4-5,1)
Votre poids	18,1	15,3 (9,9-20,7)	4,0	2,5 (0,7-4,3)
Votre revenu	15,2	14,5 (8,9-20,1)	1,7	2,0 (0,0-4,2)
Votre statut d'immigration perçu	14,2	16,3 (10,6-22,0)	2,3	1,9 (1,1-2,6)
Votre expression de genre (expression masculine)	6,1	6,5 (2,8-10,1)	0,7	1,5 (0,0-3,7)
Votre genre	14,7	19,4 (12,4-26,4)	1,7	1,0 (0,0-2,6)
Votre religion	7,8	7,0 (3,2-10,7)	1,3	1,2 (0,0-2,7)
Un handicap	4,2	3,6 (0,7-6,4)	1,0	0,7 (0,0-2,4)
Autre raisons**	4,0	3,1 (0,7-5,5)	2,8	1,5 (0,3-2,7)

Proportion de données manquantes : 4,4% à 8,7% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

**Autres raisons: Langue : être anglophone (3), « dual french and english background » (1), langue d'origine (1), le français comme langue seconde (1); consommation des drogues et toxicomanie (3), famille (2), « connaissance générale » (1), « la religion des autres » (1), trouble d'apprentissage (1), manque de confiance (1), « mon attitude » (1), ouverture (1), timidité (1), « un allure pas commode » (1), des conflits de personnalité (1), « les gens sons cons » (1), « patinage artistique »(1), « proprio de triplex » (1)

**Tableau 282 Réception d'un moins bon service de santé que les autres**

<i>Parmi les participants qui ont rapporté avoir vécu une forme de discrimination quotidienne (n=655)</i>		
Avez-vous reçu un moins bon service que les autres dans l'une ou l'autre des situations suivantes ? (Cochez tout ce qui s'applique) *		
Situations	% naj	% aj (IC 95%)
Dans le bureau d'un médecin	15,4	19,7 (14,2-25,1)
Au téléphone	14,6	13,5 (8,7-18,2)
Aux urgences d'un hôpital	12,5	11,4 (6,8-15,9)
Dans une clinique sans rendez-vous	10,2	10,4 (5,9-14,9)
Dans un centre de santé communautaire	6,6	7,3 (2,5-12,1)
Dans une clinique de santé sexuelle	4,5	3,6 (0,7-6,5)
De la part des services ambulanciers après avoir composé le 911	3,4	2,9 (0,1-5,6)
En utilisant un autre service hospitalier	3,6	2,7 (0,1-5,4)
Ligne de santé (p, ex, Info-Santé)	2,4	1,7 (0,1-3,3)
Autres services**	3,3	1,7 (0,5-2,9)
AUCUNE DE CES RÉPONSES (Je n'ai pas reçu un moins bon service que les autres dans aucune de ces situations.)	63,6	61,4 (54,5-68,2)

Proportion de données manquantes : 2,6%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

**Autres services : « Police » (5), « RAMQ » (2), Dentiste (3), « Aide Aux Trans Québec » (1), Aéroport (1), École (1), « Fingerprinting Service » (1), Magasin (1), « Magasin/Banque » (1), « Misgendering+Analcheck » (1), Pharmacien (1), Système De Justice (1), Via Rail (1)



Tableau 283 Raisons pour lesquelles les participants croient avoir reçu un moins bon service de santé que les autres et raison principale

<i>Parmi les participants qui ont rapporté d'avoir reçu un moins bon service que les autres dans l'une ou l'autre des situations ci-dessous (n= 232)</i>				
	Pour quelles raisons croyez-vous avoir vécu ces expériences ? (Cochez tout ce qui s'applique.)*		Selon vous, quelle serait la raison principale parmi celles que vous venez de citer ?	
Raisons	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Votre orientation sexuelle	56,6	57,0 (46,1-67,9)	33,5	37,3 (24,7-49,8)
Votre âge	14,2	24,0 (15,9-32,2)	4,4	14,3 (9,7-18,8)
Votre statut sérologique VIH	13,2	8,7 (3,6-13,7)	9,7	8,5 (3,2-13,7)
Votre statut d'immigration perçu	12,3	9,9 (2,8-17,0)	5,8	5,8 (0,0-12,8)
Votre identité de genre	9,1	10,1 (2,6-17,7)	4,9	5,4 (0,0-12,1)
Votre groupe ethnique	15,1	10,5 (4,8-16,2)	5,8	4,5 (1,7-7,4)
Votre expression de genre (expression féminine)	11,9	10,9 (4,0-17,7)	4,4	4,0 (0,0-9,3)
Votre race	15,1	12,1 (4,1-20,1)	5,3	3,3 (0,0-6,7)
Votre genre	11,4	14,3 (4,9-23,7)	3,9	2,5 (0,1-5,0)
Votre santé mentale	12,3	9,3 (2,3-16,4)	2,9	2,1 (0,9-3,2)
Quelque chose en lien à votre apparence physique d'autre que votre poids	13,2	12,4 (5,0-19,7)	4,4	1,5 (0,3-2,8)
Un handicap	5,0	3,9 (0,0-8,6)	1,9	1,5 (0,0-5,9)
Votre poids	4,6	3,9 (0,0-9,7)	1,5	1,0 (0,4-1,6)
Votre revenu	11,4	12,4 (3,0-21,8)	1,0	0,6 (0,0-2,2)
Votre religion	7,3	9,7 (1,5-18,0)	1,0	0,4 (0,0-1,1)
Votre expression de genre (expression masculine)	5,5	3,4 (0,6-6,2)	0,5	0,1 (0,0-0,1)
Autres raisons**	10,5	9,8 (0,8-18,8)	9,2	7,4 (0,0-15,3)

Proportion de données manquantes : 5,6% à 11,2% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Les réponses ne sont pas mutuellement exclusives donc la somme des proportions présentées excède 100%.

**Autres raisons: être anglophone (4), Problème De Drogue/toxicomanie (3), le français comme langue seconde (1), langue (1), « Anal Ring Cut » (1), « Criminal » (1), « Élocution » (1), « Intonation Voix » (1), « La Prep à L'urgence » (1), « Le Système » (1), « Mauvaise Partie Politique » (1), Achat d'une prescription (1), « Pratiques Sexuelles » (1), « Préjudice Du Doc » (1). Relation Non-Exclusive (1)



7.2.6 Échelle de micro-agressions vécues par les HARSAH de couleur (n=133)

L'échelle « Microagressions vécues par les HARSAH de couleur » (The LGBT People of Color Microaggressions Scale, Balsam et al. 2011)²² évalue les microagressions spécifiquement subies par les HARSAH appartenant à des groupes d'une couleur raciale autre que blanche. Elle contient 18 énoncés, répartis en 3 sous-échelles : microagressions raciales, microagressions hétérosexistes, et microagressions raciales dans les relations interpersonnelles. L'échelle originale a été modifiée pour assurer l'applicabilité à tous les participants de l'étude Engage. Chaque sous-échelle comprend 6 énoncés. Les tableaux suivants présentent la fréquence de survenue de diverses situations et le niveau de malaise ressenti. Ces questions étaient posées aux participants à Engage s'étant identifiés (dans la question précédente) comme personne de couleur.

Tableau 284 Échelle de micro-agressions vécues par les HARSAH de couleur : Sous-échelle 'microagressions raciales' *

Parmi ceux qui s'identifient comme étant une personne de couleur (n=133)												
Indiquez si vous avez vécu les situations suivantes au cours de votre vie et comment vous vous êtes senti lorsqu'elles se sont produites.												
Situations de micro-agressions raciales	Cela ne m'est pas arrivé/cela ne s'applique pas à moi (0)		Cela m'est arrivé et cela m'a dérangé...									
			Pas du tout (1)		Un peu (2)		Moyennement (3)		Beaucoup (4)		Extrêmement (5)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Devoir éduquer les personnes LGBT blanches sur les questions raciales	13,6	13,0 (6,5-19,4)	11,4	27,0 (13,8-40,2)	22,7	17,8 (5,9-29,7)	12,9	16,2 (4,8-27,6)	19,7	15,3 (5,5-25,1)	19,7	10,8 (3,6-18,0)
Se faire dire que la « race n'est pas importante » par des personnes LGBT blanches	15,3	17,1 (9,2-25,0)	17,6	31,4 (17,5-45,3)	17,6	15,9 (4,3-27,6)	19,1	14,7 (3,3-26,1)	13,7	10,6 (4,6-16,7)	16,8	10,2 (2,3-18,1)
Se sentir incompris par les personnes LGBT blanches	21,2	17,4 (7,9-26,8)	19,7	28,8 (17,0-40,5)	18,9	15,6 (2,4-28,9)	14,4	22,1 (9,9-34,3)	14,4	9,5 (2,6-16,4)	11,4	6,6 (0,1-13,0)
Être la personne LGBT de couleur de service au sein d'un groupe ou d'un organisme	22,1	24,2 (13,4-35,1)	18,3	29,0 (15,9-42,0)	19,1	25,0 (10,9-39,1)	10,7	6,6 (0,0-13,1)	17,6	8,2 (2,8-13,7)	12,2	7,0 (0,7-13,2)
Ne pas être capable de faire confiance aux personnes LGBT blanches	25,0	25,4 (12,9-37,9)	26,5	36,4 (22,7-50,1)	18,2	13,4 (4,1-22,7)	9,1	10,0 (-0,1-20,2)	12,9	9,3 (2,6-16,0)	8,3	5,4 (0,0-11,6)
Entendre des personnes LGBT blanches tenir des propos racistes	9,0	11,8 (5,7-17,8)	10,5	18,6 (13,4-23,7)	19,5	17,4 (5,8-28,9)	24,1	26,6 (12,1-41,1)	18,8	14,2 (3,7-24,7)	18,0	11,5 (2,9-20,0)
L'une ou l'autre situation de micro-agression raciale	6,0	8,7 (3,8-13,5)	6,0	17,0 (12,6-21,4)	13,5	11,6 (1,9-21,3)	15,8	18,6 (3,3-34,0)	24,1	24,8 (12,6-37,1)	34,6	19,2 (9,7-28,8)

Proportion de données manquantes : 0% à 1,5% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Balsam KF, Molina Y, Beadnell B, Simoni J, Walters K. Measuring multiple minority stress: the LGBT people of color microaggressions scale. *Cultural diversity & ethnic minority psychology*. 2011;17(2):163-174. doi:10.1037/a0023244

²² Balsam KF, Molina Y, Beadnell B, Simoni J, Walters K. Measuring multiple minority stress: the LGBT people of color microaggressions scale. *Cultural diversity & ethnic minority psychology*. 2011;17(2):163-174. doi:10.1037/a0023244


Tableau 285 Échelle de micro-agressions : Sous-échelle 'microagressions hétérosexistes' *

Parmi ceux qui s'identifient comme étant une personne de couleur (n=133) Indiquez si vous avez vécu les situations suivantes au cours de votre vie et comment vous vous êtes senti lorsqu'elles sont arrivées.												
Situations de micro-agression hétérosexiste	Cela ne m'est pas arrivé/cela ne s'applique pas à moi (0)		Cela m'est arrivé et cela m'a dérangé...									
			Pas du tout (1)		Un peu (2)		Moyennement (3)		Beaucoup (4)		Extrêmement (5)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Se sentir incompris par les personnes de votre communauté ethnique/raciale	15,0	12,0 (6,2-17,8)	11,3	21,7 (11,3-32,2)	26,3	27,3 (13,1-41,6)	13,5	13,8 (4,7-22,8)	19,5	13,7 (5,7-21,8)	14,3	11,4 (0,3-22,6)
Ne pas avoir de personnes LGBT de couleur comme modèles positifs	19,7	23,4 (14,9-32,0)	17,4	15,9 (4,2-27,7)	23,5	33,4 (19,5-47,3)	12,1	8,4 (1,2-15,6)	12,1	7,9 (2,3-13,5)	15,2	10,9 (0,0-22,5)
Ne pas être accepté par les gens de la même ethnicité/race que vous parce que vous êtes une personne LGBT	21,8	19,9 (11,0-28,8)	18,0	26,1 (13,4-38,8)	18	19,5 (6,2-32,7)	13,5	9,8 (1,9-17,7)	15,0	11,6 (6,5-16,7)	13,5	13,1 (0,8-25,4)
Avoir de la difficulté à trouver des amis LGBT issus du même milieu ethnique/racial que vous	21,8	15,9 (9,3-22,4)	18,0	26,6 (14,5-38,7)	21,1	18,3 (7,9-28,6)	13,5	16,7 (4,8-28,6)	12,8	11,5 (2,7-20,3)	12,8	11,1 (0,0-22,9)
Se sentir invisible parce que vous êtes une personne LGBT	22,0	21,2 (12,5-29,9)	28,0	29,6 (18,2-40,9)	18,9	21,4 (7,9-34,9)	15,9	16,5 (4,9-28,0)	9,1	5,3 (0,0-10,7)	6,1	6,0 (0,0-16,6)
Ne pas s'être senti le bienvenu dans un groupe ou un événement organisé par votre communauté ethnique/raciale	27,1	26,9 (15,9-37,9)	21,8	30,2 (17,2-43,2)	21,8	15,3 (4,5-26,2)	12,0	12,9 (4,5-21,2)	11,3	7,8 (0,8-14,9)	6,0	6,9 (0,0-18,0)
L'une ou l'autre situation de micro-agression hétérosexiste	7,5	8,1 (3,1-13,0)	4,5	3,7 (0,4-7,0)	18,8	29,9 (16,6-43,2)	15,8	18,5 (6,3-30,6)	24,1	16,0 (8,9-23,1)	29,3	23,9 (10,7-37,0)

Proportion de données manquantes : 0% à 0,8% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Balsam KF, Molina Y, Beadnell B, Simoni J, Walters K. Measuring multiple minority stress: the LGBT people of color microaggressions scale. *Cultural diversity & ethnic minority psychology*.

2011;17(2):163-174. doi:10.1037/a0023244


Tableau 286 Échelle de micro-agressions : Sous-échelle 'microagressions raciales dans les relations interpersonnelles' *

Parmi ceux qui s'identifient comme étant une personne de couleur (n=133)												
Indiquez si vous avez vécu les situations suivantes au cours de votre vie et comment vous vous êtes senti lorsqu'elles sont arrivées.												
Situations de micro-agressions de racisme dans les relations interpersonnelles	Cela ne m'est pas arrivé/cela ne s'applique pas à moi (0)		Cela m'est arrivé et cela m'a dérangé...									
			Pas du tout (1)		Un peu (2)		Moyennement (3)		Beaucoup (4)		Extrêmement (5)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Lire des annonces personnelles qui excluent votre ethnicité/race (p. ex. « blancs seulement »)	11,4	14,8 (6,2-23,5)	14,4	12,0 (1,3-22,7)	21,2	28,8 (18,3-39,4)	9,8	7,6 (-1,9-17,1)	22,7	21,0 (8,4-33,5)	20,5	15,8 (5,5-26,0)
Avoir l'impression que les personnes LGBT blanches s'intéressent seulement à vous en raison de votre apparence	12,0	15,4 (4,5-26,3)	11,3	20,6 (14,0-27,2)	26,3	26,0 (12,4-39,5)	17,3	12,3 (1,6-22,9)	14,3	10,3 (0,1-20,4)	18,8	15,5 (6,9-24,2)
Être perçu comme un objet sexuel par les autres personnes LGBT à cause de votre ethnicité/race	15,2	21,3 (9,8-32,8)	15,9	21,2 (13,3-29,2)	18,9	19,8 (6,5-33,1)	9,8	7,6 (1,5-13,6)	22,7	16,0 (6,6-25,4)	17,4	14,2 (2,5-25,8)
Être rejeté par des partenaires sexuels ou par des personnes avec qui vous aviez une « date » à cause de votre ethnicité/race	20,3	22,9 (12,3-33,6)	16,5	24,9 (12,7-37)	21,1	17,7 (6,7-28,8)	11,3	12,9 (2,9-22,9)	13,5	6,2 (2,8-9,6)	17,3	15,4 (2,9-27,8)
Avoir vécu de la discrimination de la part d'autres personnes LGBT de couleur à cause de votre ethnicité/race	23,3	23,9 (12,1-35,7)	24,1	15,2 (2,8-27,6)	22,6	33,7 (21,6-45,8)	12,0	12,9 (4,8-21,0)	9,0	6,6 (-2,9-16,2)	9,0	7,7 (1,1-14,2)
Être rejeté par d'autres personnes LGBT de la même ethnicité/race que vous	25,6	28,9 (17,5-40,2)	36,8	42,6 (28,3-57,0)	18,8	16,8 (5,2-28,3)	9,0	5,6 (0,3-10,8)	5,3	1,8 (0,0-3,6)	4,5	4,4 (0,0-11,1)
L'une ou l'autre situation de micro-agression de racisme dans les relations interpersonnelles	6,0	8,0 (2,9-13,1)	4,5	3,9 (0,0-8,0)	20,3	31,0 (18,3-43,6)	10,5	12,9 (3,6-22,3)	22,6	15,4 (3,9-26,9)	36,1	28,8 (15,7-41,9)

Proportion de données manquantes : 0% à 0,8% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

*Balsam KF, Molina Y, Beadnell B, Simoni J, Walters K. Measuring multiple minority stress: the LGBT people of color microaggressions scale. *Cultural diversity & ethnic minority psychology*. 2011;17(2):163-174. doi:10.1037/a0023244



Échelle de micro-agressions vécues par les HARSAH de couleur - Calcul des scores

Les énoncés ou sous-échelles auxquels les participants ont préféré ne pas répondre ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribué à un énoncé varie de 1 à 5 selon la fréquence des diverses situations et le niveau de malaise ressenti par le participant. Le niveau de malaise « cela ne m'a pas dérangé du tout » équivaut à 1 point tandis que le niveau « cela m'a dérangé extrêmement » équivaut à 5 points. Si le participant n'a jamais vécu la situation, le pointage est de 0 point. Le score moyen de chaque sous-échelle et de l'échelle complète pour l'ensemble des participants sont inscrits au tableau suivant. Un score moyen de 2,0 suggère que les participants de couleur ont vécu un niveau léger à modéré de discrimination. Étant donné que l'étude Engage a modifié l'échelle, les scores rapportés ici ne peuvent pas être directement comparés à ceux d'autres études ayant utilisé l'échelle d'origine.

Tableau 287 Échelle de micro-agressions vécues par les HARSAH de couleur - Sommaire

<i>Parmi les participants qui s'identifient comme étant une personne de couleur (n=133)</i>			
(Sous-)échelle	Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée¹ (IC 95%)
Microagressions raciales	0-5	2,4 (1,37)	2,0 (1,7-2,3)
Microagressions hétérosexistes	0-5	2,1 (1,30)	2,0 (1,6-2,4)
Racisme dans les relations interpersonnelles	0-5	2,3 (1,25)	2,0 (1,7-2,4)
Score global	0-5	2,2 (1,17)	2,0 (1,7-2,3)

Proportion de données manquantes : 0,8% à 3,0% selon l'item.

1 : ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



7.2.7 Idéation et actes suicidaires et automutilation

Tableau 288 Idéations et actes suicidaires au cours de la vie

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i>		
Au cours de votre vie, avez-vous déjà pensé ou essayé de vous enlever la vie ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais	39,7	43,5 (38,2-48,9)
Cela m'a déjà traversé l'esprit brièvement	34,4	29,2 (24,4-34,0)
J'ai déjà planifié de m'enlever la vie à au moins à une reprise, mais je ne suis pas passé à l'acte	11,0	9,1 (6,0-12,3)
J'ai déjà planifié de m'enlever la vie à au moins une reprise et j'espérais vraiment mourir	4,1	6,3 (3,6-9,0)
J'ai tenté de m'enlever la vie, mais je ne voulais pas mourir	5,1	7,3 (4,5-10,1)
J'ai tenté de m'enlever la vie et j'espérais vraiment mourir	5,7	4,6 (3,1-6,2)

Proportion de données manquantes : 7,0%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 289 Idéations suicidaires au cours des six derniers mois

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i>		
Combien de fois avez-vous pensé à vous enlever la vie au cours des 6 derniers mois ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Jamais	71,1	66,8 (61,8-71,8)
Rarement (1 fois)	12,4	11,7 (8,4-15,1)
Parfois (2 fois)	8,6	13,5 (9,8-17,2)
Souvent (3-4 fois)	3,9	4,5 (2,8-6,2)
Très souvent (5 fois ou plus)	4,0	3,4 (1,4-5,5)

Proportion de données manquantes : 6,6%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 290 Automutilation au cours de la vie

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i>		
Au cours de votre vie, vous êtes-vous déjà fait du mal par exprès (p. ex. en vous coupant ou en prenant une surdose de pilules) ?		
	% naj	% aj (IC 95%)
Oui (à vie)	18,2	17,6 (13,4-21,8)

Proportion de données manquantes : 5,7%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



7.2.8 Anxiété et dépression

L'échelle « Mesure d'anxiété et de dépression » (The Hospital Anxiety and Depression Scale, Zigmond & Snaith 1983)²³ est un outil simple visant à évaluer l'anxiété et la dépression. Elle comprend 2 sous-échelles : anxiété et dépression. Chaque sous-échelle comprend 7 énoncés. Les tableaux suivants présentent la répartition des participants selon leur niveau d'anxiété et de dépression.

Tableau 291 Anxiété au cours de la dernière semaine

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Veillez lire chaque énoncé et choisir la réponse qui correspond le mieux à comment vous vous êtes senti au cours de la dernière semaine. Ne réfléchissez pas trop avant de répondre ; votre réaction immédiate sera probablement plus juste qu'une réponse trop réfléchie.								
Énoncés relatifs à l'anxiété (échelle HADS)	Pas du tout (0)		De temps en temps, occasionnellement (1)		Souvent (2)		La plupart du temps (3)	
	% naj	% naj (IC 95%)	% naj	% naj (IC 95%)	% naj	% naj (IC 95%)	% naj	% naj (IC 95%)
Je me sens tendu ou énervé	16,1	16,6 (12,7-20,6)	46,0	43,4 (38,2-48,6)	26,3	25,5 (20,9-30,1)	11,6	14,4 (10,8-18,1)
	Seulement à l'occasion (0)		De temps en temps, mais pas trop souvent (1)		Souvent (2)		La plupart du temps (3)	
J'ai des pensées qui me créent de l'inquiétude	32,9	28,7 (24,2-33,2)	32,9	31,8 (26,8-36,7)	23,9	27,2 (22,4-32,0)	10,4	12,4 (8,7-16,0)
	Pas du tout (0)		Pas très souvent/ occasionnellement (1)		Assez souvent (2)		Très souvent (3)	
Je me sens fébrile comme si je n'arrive pas à tenir en place	34,0	29,8 (25,0-34,6)	36,2	35,0 (30,0-40,0)	23,2	27,3 (22,6-32,1)	6,7	7,8 (5,5-10,1)
J'éprouve des sensations soudaines de panique	45,3	40,7 (35,5-45,9)	37,5	38,5 (33,4-43,6)	12,8	16,5 (12,3-20,6)	4,4	4,3 (2,1-6,6)
J'ai une sensation de peur comme si quelque chose d'horrible était sur le point de m'arriver	42,1	37,5 (32,3-42,7)	28,5	27,4 (22,7-32,2)	21,1	23,7 (19,3-28,1)	8,3	11,4 (8,2-14,5)
	Pas du tout (0)		Un peu, mais cela ne m'inquiète pas (1)		Oui, mais la sensation n'est pas trop forte (2)		Absolument et la sensation est très forte (3)	
J'éprouve des sensations de peur et j'ai l'estomac noué	39,9	36,8 (31,7-41,9)	47,0	47,1 (41,8-52,3)	9,3	10,3 (6,9-13,7)	3,7	5,9 (3,4-8,3)
Au moins un des sentiments d'anxiété mentionné ci-dessous	16,1	16,6 (12,7-20,6)	46,0	43,4 (38,2-48,6)	26,3	25,5 (20,9-30,1)	11,6	14,4 (10,8-18,1)
	Définitivement (0)		La plupart du temps (1)		Pas souvent (2)		Pas du tout (3)	
	% naj	% naj (IC 95%)	% naj	% naj (IC 95%)	% naj	% naj (IC 95%)	% naj	% naj (IC 95%)
Je peux rester tranquillement assis à ne rien faire et me sentir relaxé	24,0	22,8 (18,6-27,0)	42,5	43,6 (38,3-48,8)	27,5	27,9 (23,2-32,7)	6,0	5,7 (3,0-8,5)

Proportion de données manquantes : 4,2% à 5,9% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Zigmond AS, Snaith RP. The Hospital Anxiety and Depression Scale. *Acta psychiatrica scandinavica*. 1983;67(6):361-370. doi:10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x

²³ Zigmond AS, Snaith RP. The Hospital Anxiety and Depression Scale. *Acta psychiatrica scandinavica*. 1983;67(6):361-370. doi:10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x



Tableau 292 Dépression au cours de la dernière semaine

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)
Veillez lire chaque énoncé et choisir la réponse qui correspond le mieux à comment vous vous êtes senti au cours de la dernière semaine. Ne réfléchissez pas trop avant de répondre ; votre réaction immédiate sera probablement plus juste qu'une réponse trop réfléchie.

Énoncés relatifs à la dépression (échelle HADS)	Pas du tout (0)		Parfois (1)		Très souvent (2)		Presque tout le temps (3)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
J'ai l'impression de fonctionner au ralenti	31,6	28,3 (23,3-33,2)	46,0	46,6 (41,4-51,9)	16,5	19,9 (15,8-24,0)	6,0	5,2 (2,8-7,5)
	J'en prends soin autant qu'avant (0)		Je n'en prends peut-être pas autant soin que je devrais (1)		Je n'en prends pas autant soin que je devrais (2)		Définitivement (3)	
Je ne me préoccupe plus de mon apparence physique	43,9	41,3 (36,1-46,6)	23,5	25,2 (20,7-29,7)	21,2	20,5 (16,5-24,6)	11,4	12,9 (9,5-16,3)
L'une ou l'autre des mesures de dépression ci-dessus	18,0	15,5 (11,4-19,6)	37,9	38,0 (32,8-43,2)	27,9	29,5 (24,8-34,2)	16,2	17,0 (13,1-20,9)
	La plupart du temps (0)		Parfois (1)		Pas souvent (2)		Pas du tout (3)	
Je suis de bonne humeur	67,8	57,1 (51,9-62,4)	24,8	34,4 (29,3-39,4)	5,7	6,4 (3,5-9,3)	1,7	2,1 (0,5-3,8)
	Définitivement autant (0)		Pas autant qu'avant (1)		Seulement un peu (2)		À peine (3)	
J'apprécie toujours les choses que j'appréciais avant	50,1	44,3 (39,1-49,5)	36,7	36,3 (31,2-41,3)	9,5	13,9 (9,9-17,8)	3,7	5,6 (3,1-8,0)
	Toujours autant qu'avant (0)		Pas autant qu'avant (1)		Définitivement moins qu'avant (2)		À peine (3)	
Je me réjouis d'avance à l'idée de faire certaines choses	58,6	54,3 (49,1-59,6)	25,9	27,4 (22,6-32,1)	11,0	13,1 (9,2-17)	4,5	5,2 (3,1-7,4)
	Toujours autant qu'avant (0)		Pas autant qu'avant (1)		Définitivement pas autant qu'avant (2)		Pas du tout (3)	
Je ris et vois le bon côté des choses	64,8	60,2 (55,0-65,5)	25,8	30,0 (25,2-34,8)	7,4	7,3 (4,4-10,2)	2,0	2,5 (0,1-4,9)
	Toujours autant qu'avant (0)		Pas autant qu'avant (1)		Définitivement pas autant qu'avant (2)		Pas du tout (3)	
Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission de télévision ou de radio	67,3	61,4 (56,2-66,6)	20,9	24,9 (20,4-29,4)	6,6	6,9 (3,9-9,9)	5,2	6,9 (4,1-9,6)
L'une ou l'autre des mesures de dépression ci-dessus	30,6	25,0 (20,5-29,5)	36,4	35,1 (30,1-40,1)	19,6	22,0 (17,6-26,5)	13,4	17,8 (13,6-22,0)

Proportion de données manquantes : 4,3% à 6,1% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Mesure d'anxiété et de dépression - Calcul des scores

Les participants ayant préféré ne pas répondre à un ou plusieurs des énoncés ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 0 à 3 ; il augmente selon le niveau d'anxiété ou de dépression exprimé. Le score d'un participant est obtenu en additionnant les points attribués à chacun des énoncés de la sous-échelle, il varie de 0 à 21. Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant. En fonction de ce score, le niveau d'anxiété ou de dépression est jugé normal (0-7 point), léger (8-10 points) modéré (11-14 points) ou sévère (15-21 points).

Tableau 293 Niveaux d'anxiété au cours de la dernière semaine selon le score obtenu pour l'ensemble des énoncés de l'échelle HADS

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Niveaux d'anxiété - échelle HADS		
	% naj	% aj (IC 95%)
Normal (score 0-7)	57,9	52,7 (47,4-58,1)
Léger (score 8-10)	19,7	20,0 (15,8-24,1)
Modéré (score 11-14)	15,7	19,7 (15,6-23,8)
Sévère (score 15-21)	6,7	7,6 (4,6-10,6)

Proportion de données manquantes : 8,5%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 294 Niveaux de dépression au cours de la dernière semaine selon le score obtenu pour l'ensemble des énoncés de l'échelle HADS

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Niveaux de dépression – échelle HADS		
	% naj	% aj (IC 95%)
Normal (score 0-7)	78,5	72,9 (68,2-77,6)
Léger (score 8-10)	13,9	17,6 (14,0-21,2)
Modéré (score 11-14)	6,7	8,4 (5,1-11,7)
Sévère (score 15-21)	0,8	1,1 (0,0-2,7)

Proportion de données manquantes : 9,2%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 295 Score moyen d'anxiété et de dépression pour l'ensemble des énoncés de l'échelle HADS

<i>Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)</i> Score moyen d'anxiété et de dépression - échelle HADS			
Sous-échelle	Étendue	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée (IC 95%)
Anxiété	0-21	7,1 (4,47)	7,7 (7,2-8,2)
Dépression	0-21	4,6 (3,59)	5,1 (4,7-5,6)

Proportion de données manquantes : 8,5% (anxiété), 9,2% (dépression)

Moyenne ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



7.2.9 Capacité à surmonter les épreuves (résilience)

L'échelle « Capacité à surmonter les épreuves » (Connor-Davidson, Resilience Scale-2, Vaishnavi et al. 2007)²⁴ vise à mesurer la capacité à s'adapter aux changements et à 'rebondir' après une épreuve, deux qualités considérées comme indicatrices de santé mentale¹. L'échelle comprend 2 énoncés. Le tableau suivant présente la fréquence à laquelle chaque énoncé s'applique.

Tableau 296 Échelle de résilience Connor Davidson

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)										
Pour chaque question, choisissez l'option qui correspond le mieux à ce que vous ressentez.										
Questions de résilience	Pas de tout vrai (0)		Rarement vrai (1)		Parfois vrai (2)		Souvent vrai (3)		Presque toujours vrai (4)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Je suis capable de m'adapter quand des changements surviennent.	1,5	2,1 (0,0-4,1)	2,6	3,3 (1,9-4,6)	12,9	17,1 (12,9-21,4)	35,2	37,7 (32,6-42,7)	47,8	39,9 (34,8-44,9)
J'ai tendance à rebondir après une maladie, une blessure ou d'autres épreuves.	3,8	4,0 (1,4-6,6)	5,1	7,9 (5,3-10,5)	17,6	20,4 (16,0-24,8)	34,7	35,3 (30,4-40,2)	38,8	32,4 (27,4-37,5)

Proportion de données manquantes : 3,6% à 5,0% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Vaishnavi S, Connor K, Davidson JRT. An abbreviated version of the Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC-2), the cd-risc2: psychometric properties and applications in psychopharmacological trials. *Psychiatry research*. 2007 ;152(2):293-297. doi:10.1016/j.psychres.2007.01.006

Échelle de résilience Connor Davidson - Calcul des scores

Les participants ayant préféré ne pas répondre à l'un ou l'autre des deux énoncés ont été exclus du calcul des scores. Le nombre de points attribués à un énoncé varie de 0 à 4 ; la fréquence « pas du tout vrai » équivaut à 0 point tandis que la fréquence « presque toujours vrai » équivaut à 4 points. Le score d'un participant est calculé en additionnant les points attribués chacun des deux énoncés. Le score moyen pour l'ensemble des participants est inscrit au tableau suivant. Une valeur élevée indique que les participants ont davantage de capacité à surmonter les épreuves.

Tableau 297 Échelle de résilience Connor Davidson - Sommaire

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)		
Score moyen de capacité à surmonter les épreuves - Échelle de résilience Connor Davidson		
Étendue du score	Moyenne (écart-type)	Moyenne ajustée (IC 95%)
0-8	6,3 (1,65)	5,9 (5,7-6,1)

Proportion de données manquantes : 5,3%

Moyenne ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

²⁴ Vaishnavi S, Connor K, Davidson JRT. An abbreviated version of the Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC-2), the cd-risc2: psychometric properties and applications in psychopharmacological trials. *Psychiatry research*. 2007;152(2):293-297. doi:10.1016/j.psychres.2007.01.006



7.2.10 Recours à des services de santé mentale

Tableau 298 Trajectoire d'accès à des services de santé mentale

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours des 6 derniers mois, avez-vous ...		
Étapes de la trajectoire d'accès à des services de santé mentale	% naj	% aj (IC 95%)
... ressenti le besoin de consulter ou de parler à un intervenant à propos de votre santé émotionnelle ou mentale (p. ex. un médecin, un psychologue, un psychiatre, un travailleur social ou un intervenant communautaire) ?	47,8	46,2 (40,9-51,4)
... cherché à voir ou à consulter un intervenant à propos de votre santé émotionnelle ou mentale (p. ex. un médecin, un psychologue, un psychiatre, un travailleur social ou un intervenant communautaire) ?	32,1	30,8 (26,0-35,6)
... vu ou consulté un intervenant à propos de votre santé émotionnelle ou mentale (p. ex. un médecin, un psychologue, un psychiatre, un travailleur social ou un intervenant communautaire) ?	28,2	26,3 (21,9-30,7)

Proportion de données manquantes : 3,9% à 4,9% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 299 Fréquence de consultations d'intervenants en santé mentale ou émotionnelle au cours des six derniers mois (parmi l'ensemble des participants)

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours des 6 derniers mois, quel(s) intervenant(s) avez-vous vu ou consulté pour votre santé émotionnelle ou mentale ? (Veuillez cocher une fréquence pour chaque type de d'intervenant mentionné)								
Type de professionnel de la santé consulté	Au moins une fois		Une fois		Deux fois		Trois fois ou plus	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Médecin de famille ou médecin omnipraticien	16,1	15,8 (12,3-19,3)	6,7	6,8 (4,3-9,3)	3,7	4,1 (2,2-6,1)	5,7	4,9 (3,1-6,7)
Psychologue	15,5	13,5 (10,0-17,1)	2,5	2,2 (0,4-3,9)	2,3	2,2 (0,6-3,7)	10,7	9,2 (6,3-12,0)
Travailleur ou intervenant social	11,7	13,3 (10,0-16,6)	3,4	4,8 (3,5-6,1)	1,8	1,4 (0,1-2,8)	6,5	7,1 (4,2-9,9)
Infirmière ou infirmière praticienne	7,3	7,6 (5,2-10,0)	3,4	3,2 (1,3-5,1)	1,7	3,1 (1,9-4,2)	2,3	1,3 (0,4-2,3)
Psychiatre	6,4	10,7 (7,6-13,8)	2,9	6,6 (4,4-8,7)	1,4	1,6 (0,1-3,1)	2,1	2,5 (0,6-4,4)
Intervenant de milieu d'un organisme communautaire	5,0	4,2 (2,4-6,0)	1,2	0,8 (0,3-1,2)	1,3	1,2 (0,0-2,9)	2,4	2,2 (1,5-2,9)
Groupe de soutien	4,5	3,2 (1,7-4,7)	1,0	0,4 (0,3-0,6)	0,9	0,9 (0,6-1,2)	2,5	1,9 (0,4-3,3)
Consultation téléphonique ou en ligne (c.-à-d. ligne de crise)	2,5	3,8 (2,1-5,5)	1,1	3,0 (1,4-4,5)	0,7	0,6 (0,0-1,5)	0,6	0,2 (0,0-0,3)
Chef religieux, spirituel ou communautaire	2,0	3,0 (2,0-4,0)	0,8	1,8 (1,5-2,0)	0,5	0,8 (0,0-1,7)	0,7	0,4 (0,0-0,8)
Autre (précisez)*	2,0	1,0 (0,4-1,7)	0,4	0,2 (0,0-0,6)	0,2	0,0 (0,0-0,1)	1,5	0,8 (0,2-1,3)

Proportion de données manquantes : 2,9% à 3,7% selon l'item.

**Autre réponses : famille ou ami(e) (7), sexologue (5), professionnel de la santé mentale (3), coach de vie (1), centre de crise (1), hypnologue (1), thérapie en couple (1), pneumologue (1), parrain dans la fraternité CMA (crystale meth anonyme) (1), Dollars-cormier (1)

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



Tableau 300 Fréquence de consultation d'intervenants en santé mentale ou émotionnelle au cours des six derniers mois (parmi les participants ayant rapporté avoir consulté un intervenant)

Parmi les participants qui ont consulté ou parlé à un intervenant à propos de leur santé émotionnelle ou mentale au cours des six derniers mois (N=319)

Au cours des 6 derniers mois, quel(s) intervenant(s) avez-vous vu ou consulté pour votre santé émotionnelle ou mentale ?
(Veuillez cocher une réponse pour chaque type de d'intervenant mentionné.)

Type de professionnel de la santé consulté	Au moins une fois		Une fois		Deux fois		Trois fois ou plus	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Médecin de famille ou médecin omnipraticien	56,4	54,8 (45,3-64,4)	23,6	21,3 (12,4-30,2)	12,7	15,0 (7,9-22,2)	20,1	18,5 (12,3-24,7)
Psychologue	56,2	55,4 (45,9-64,8)	8,9	8,8 (2,0-15,5)	8,3	9,0 (3,0-14,9)	39,0	37,7 (28,3-47,0)
Travailleur ou intervenant social	41,4	46,8 (37,1-56,5)	12,1	13,5 (8,2-18,7)	6,7	5,9 (0,7-11,1)	22,6	27,4 (18,4-36,5)
Infirmière ou infirmière praticienne	25,2	21,5 (14,2-28,9)	12,1	11,8 (6,0-17,6)	5,1	4,6 (1,4-7,9)	8,0	5,1 (1,1-9,1)
Psychiatre	22,8	36,8 (27,2-46,3)	9,9	19,7 (12,9-26,6)	5,1	6,6 (0,6-12,5)	7,7	10,4 (3,4-17,5)
Intervenant de milieu d'un organisme communautaire	17,9	16,0 (10,4-21,6)	4,5	3,1 (1,0-5,3)	4,5	3,9 (0,0-8,1)	8,9	9,0 (5,9-12,1)
Groupe de soutien	16,2	13,3 (7,4-19,1)	3,8	1,8 (1,0-2,6)	3,2	3,8 (2,3-5,2)	9,2	7,7 (2,0-13,3)
Consultation téléphonique ou en ligne (c.-à-d., ligne de crise)	8,3	8,1 (3,2-13,1)	3,5	4,7 (0,9-8,4)	2,6	2,7 (0,0-5,9)	2,2	0,8 (0,0-1,6)
Chef religieux, spirituel ou communautaire	7,0	5,9 (1,9-10,0)	2,5	1,1 (0,0-2,2)	1,9	3,4 (0,0-6,9)	2,5	1,5 (0,0-3,4)
Autre (précisez)*	7,5	4,3 (1,4-7,3)	1,3	0,9 (0,0-2,6)	0,7	0,2 (0,0-0,7)	5,6	3,3 (0,9-5,6)

Proportion de données manquantes : 1,3% à 4,4% selon l'item.

*Autre réponses : famille ou ami(e) (7), sexologue (5), professionnel de la santé mentale (3), coach de vie (1), centre de crise (1), hypnologue (1), thérapie en couple (1), pneumologue (1), parrain dans la fraternité CMA (crystale meth anonyme) (1), Dollars-cormier (1) ;

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



7.2.11 Services reçus lors de la dernière consultation auprès d'un intervenant en santé mentale ou émotionnelle

Tableau 301 Montant déboursé lors de la dernière consultation auprès d'un intervenant en santé mentale ou émotionnelle

Parmi ceux qui ont consulté ou parlé à un intervenant à propos de leur santé émotionnelle ou mentale au cours des six derniers mois (N=319)
La dernière fois que vous avez reçu des services de santé mentale, environ combien avez-vous payé de votre poche ?
 (après le remboursement d'assurance si applicable)

Montant déboursé	% naj	% aj (IC 95%)
0\$ (services gratuits ou entièrement remboursés)	64,9	73,1 (64,9-81,3)
Moins de 25 \$	5,8	4,5 (0,9-8,0)
Entre 25 \$ et 49 \$	8,4	5,8 (2,3-9,4)
Entre 50 \$ et 149 \$	16,9	12,1 (6,3-17,8)
Entre 150 \$ et 249 \$	1,9	1,7 (0,0-3,8)
250 \$ ou plus	1,9	2,9 (0,0-7,0)

Proportion de données manquantes : 3,4%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 302 Satisfaction par rapport aux services reçus lors de la dernière consultation auprès d'un intervenant en santé mentale ou émotionnelle

Parmi ceux qui ont consulté ou parlé à un intervenant à propos de leur santé émotionnelle ou mentale au cours des six derniers mois (N=319)
La dernière fois que vous avez reçu des services en santé mentale, en général, dans quelle mesure étiez-vous satisfait des services ?

Niveau de satisfaction	% naj	% aj (IC 95%)
Pas du tout satisfait	8,1	7,6 (2,8-12,5)
Un peu satisfait	9,4	21,2 (12,7-29,7)
Moyennement satisfait	25,6	32,7 (23,4-41,9)
Très satisfait	57,0	38,5 (29,4-47,6)

Proportion de données manquantes : 3,1%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 303 Facilité d'accès à des services en santé mentale ou émotionnelle

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)
Présentement, dans quelle mesure diriez-vous qu'il est facile pour vous d'obtenir une consultation avec un intervenant en santé émotionnelle ou mentale (p. ex. un médecin, un psychologue, un psychiatre, un travailleur social ou un intervenant communautaire) ?

Facilité d'accès	% naj	% aj (IC 95%)
Très facile	22,9	20,3 (15,9-24,7)
Facile	36,4	37,2 (32,0-42,3)
Difficile	18,7	19,4 (15,6-23,2)
Très difficile	9,1	8,6 (5,8-11,5)
Je ne suis pas certain	13,0	14,5 (10,7-18,3)

Proportion de données manquantes : 4,6%.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



7.3 Santé physique et infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)

7.3.1 Appréciation globale de sa santé physique

Tableau 304 Appréciation globale de sa santé physique

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours des 6 derniers mois, comment a été votre santé physique en général ?						
Appréciation de sa santé	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=1 179)	
	VIH – ou inconnu (n=968)		VIH + (n=211)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Excellente	19,4	17,8 (13,1-22,5)	16,2	24,3 (15,5-33,0)	18,8	18,7 (14,4-23,0)
Très bonne	37,9	33,4 (28,2-38,5)	24,8	17,0 (10,0-23,9)	35,5	31,1 (26,5-35,7)
Bonne	26,5	28,2 (23,2-33,1)	31,9	27,1 (17,2-37,1)	27,5	28,0 (23,5-32,6)
Moyenne	12,8	17,2 (13,0-21,5)	19,5	23,8 (11,6-36,1)	14,0	18,1 (13,9-22,3)
Mauvaise	3,4	3,4 (1,9-5,0)	7,6	7,8 (0,0-15,6)	4,2	4,0 (2,2-5,9)

Proportion de données manquantes : 0,5% parmi les participants de statut VIH- ou inconnu et parmi les participants de statut VIH+ naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

Tableau 305 Limitations des activités quotidiennes à cause de sa santé physique

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Au cours des 6 derniers mois, combien de fois votre santé physique a-t-elle limité vos activités quotidiennes (par exemple, monter les escaliers ou porter votre épicerie) ?						
Fréquence	Statut VIH auto-rapporté				Total (n=1 179)	
	VIH – ou inconnu (n=968)		VIH + (n=211)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Toujours	1,1	3,1 (0,6-5,6)	1,9	1,4 (0,0-3,8)	1.2	2,8 (0,7-5,0)
Fréquemment	3,0	5,6 (2,3-8,9)	11,1	16,2 (4,7-27,6)	4.4	7,1 (3,5-10,7)
La moitié du temps	4,3	4,2 (2,3-6,2)	11,1	10,1 (3,3-16,9)	5.6	5,0 (3,1-7,0)
Rarement	35,8	33,7 (28,5-39,0)	37,7	33,4 (21,9-44,9)	36.1	33,7 (28,8-38,5)
Jamais	55,9	53,4 (47,7-59,0)	38,2	39,0 (28,5-49,4)	52.7	51,4 (46,1-56,6)

Proportion de données manquantes : 2,4% parmi les participants de statut VIH- ou inconnu ; 1,9% parmi les participants de statut VIH+ naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).



7.3.2 Antécédents d'ITSS

Tableau 306 Antécédents d'ITSS selon le moment du dernier diagnostic parmi les participants de statut VIH auto-rapporté négatif ou inconnu

<i>Parmi les participants de statut VIH auto-rapporté négatif ou inconnu (n=968)</i> Est-ce qu'un médecin ou une infirmière vous a déjà dit que vous aviez une ou plusieurs des infections transmissibles sexuellement suivantes (ITSS) ? À quand remonte la dernière fois qu'un médecin ou une infirmière vous a dit que vous aviez cette ITSS ?										
ITSS	Oui, il y a plus d'un an		Oui, il y a entre 6 mois et un an		Oui, au cours des 6 derniers mois		Oui, mais je ne me souviens pas quand		Oui, au moins une fois à vie	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Chlamydirose	18,1	10,4 (7,4-13,4)	6,4	4,0 (1,8-6,2)	7,6	7,9 (5,0-10,8)	1,2	1,6 (0,2-3,0)	33,3	23,9 (19,3-28,5)
Gonorrhée	20,7	13,8 (10,1-17,6)	7,4	6,2 (3,6-8,8)	7,0	5,0 (2,3-7,6)	1,3	0,7 (0,3-1,1)	36,3	25,6 (20,8-30,5)
Syphilis	8,5	5,7 (3,4-8,1)	2,1	1,5 (0,5-2,5)	2,0	2,2 (0,3-4,0)	0,6	0,3 (0,1-0,5)	13,3	9,7 (6,6-12,8)
LGV	0,3	0,2 (0,0-0,7)	0,0	s.o.	0,2	1,7 (0,3-3,1)	0,0	s.o.	0,5	1,9 (0,4-3,4)
Infection intestinale (p. ex., shigella)	2,3	0,9 (0,0-1,8)	0,6	0,3 (0,0-0,5)	0,6	1,2 (0,0-2,5)	0,0	s.o.	3,6	2,3 (0,6-4)
Hépatite A	1,6	0,9 (0,3-1,6)	0,2	0,1 (0,0-0,3)	0,1	0,8 (0,0-2,2)	0,4	0,1 (0,0-0,2)	2,3	2,0 (0,4-3,6)
Hépatite B	2,4	2,0 (0,6-3,3)	0,1	0,0 (0,0-0,0)	0,2	0,9 (0,0-2,3)	0,3	1,7 (1,6-1,9)	3,1	4,6 (2,7-6,6)
Hépatite C	2,0	2,0 (0,3-3,8)	0,2	0,2 (0,0-0,6)	0,4	2,0 (0,0-4,7)	0,4	1,7 (1,6-1,9)	3,0	6,0 (2,8-9,1)
Verrues génitales ou anales (condylomes)	15,4	11,3 (7,8-14,9)	1,8	0,8 (0,2-1,4)	1,1	1,4 (0,0-3,0)	0,4	0,4 (0,0-1,1)	18,7	14,0 (10-17,9)
Virus de l'herpès simplex	11,5	6,9 (4,0-9,8)	1,4	2,1 (0,0-4,2)	1,6	2,0 (0,0-4,1)	0,3	0,2 (0,0-0,9)	14,8	11,2 (7,2-15,2)
« On m'a dit que j'avais une ITSS mais je ne me rappelle plus le nom »	2,4	1,2 (0,4-2,0)	0,1	0,1 (0,0-0,4)	0,1	0,9 (0,0-2,3)	0,2	0,1 (0,0-0,2)	2,8	2,2 (0,5-3,8)

Proportion de données manquantes : 1,4% à 3,7% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.


Tableau 307 Antécédents d'ITSS selon le moment du dernier diagnostic parmi les participants de statut VIH auto-rapporté positif

Parmi les participants de statut VIH auto-rapporté positif (n=211)
Est-ce qu'un médecin ou une infirmière vous a déjà dit que vous aviez une ou plusieurs des infections transmissibles sexuellement suivantes (ITSS) ? À quand remonte la dernière fois qu'un médecin ou une infirmière vous a dit que vous aviez cette ITSS ?

ITSS	Oui, il y a plus d'un an		Oui, il y a entre 6 mois et un an		Oui, au cours des 6 derniers mois		Oui, mais je ne me souviens pas quand		Oui, au moins une fois à vie	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Chlamydie	25,6	17,5 (10,2-24,8)	7,9	3,4 (0,7-6,1)	12,3	8,8 (2,0-15,7)	1,0	0,7 (0,0-2,1)	46,8	30,4 (20,4-40,5)
Gonorrhée	33,5	31,0 (20,7-41,2)	9,7	6,3 (0,8-11,9)	14,6	12,2 (5,9-18,6)	3,9	5,1 (0,2-10,1)	61,7	54,7 (42,3-67)
Syphilis	30,8	21,1 (12,8-29,4)	10,6	14,3 (4,6-23,9)	11,1	4,9 (1,2-8,6)	1,0	0,5 (0,2-0,7)	53,4	40,7 (29,2-52,2)
LGV	2,0	0,4 (0,1-0,6)	1,5	0,5 (0,0-1,5)	1,0	1,1 (0,0-2,7)	0,0	s.o.	4,5	1,9 (0,0-3,9)
Infection intestinale (p. ex., shigella)	9,9	10,6 (2,8-18,5)	1,0	0,5 (0,0-2,3)	2,0	1,7 (0,0-4,9)	2,0	0,5 (0,1-1)	14,8	13,3 (4,9-21,8)
Hépatite A	10,1	5,0 (2,7-7,4)	0,0	s.o.	0,5	0,5 (0,0-1,9)	1,5	1,1 (0,0-2,3)	12,1	6,7 (3,7-9,7)
Hépatite B	12,9	8,4 (2,8-13,9)	0,5	0,2 (0,0-0,6)	0,5	0,5 (0,0-1,9)	3,0	3,1 (0,0-8,8)	16,9	12,3 (4,6-19,9)
Hépatite C	10,3	10,9 (3,6-18,1)	3,0	1,3 (0,0-2,8)	4,4	6,1 (0,0-12,6)	1,0	0,9 (0,3-1,5)	18,7	19,2 (9,8-28,5)
Verrues génitales ou anales (condylomes)	32,5	25,9 (17,1-34,7)	3,3	2,4 (-3,4-8,3)	5,7	5,2 (0,0-11,9)	5,3	10,7 (2,2-19,3)	46,9	44,3 (32,7-55,9)
Virus de l'herpès simplex	30,7	25,6 (15,6-35,5)	2,9	0,5 (0,2-0,8)	4,4	3,9 (0,8-6,9)	3,4	5,4 (4,1-6,7)	41,5	35,3 (24,7-46)
« On m'a dit que j'avais une ITSS mais je ne me rappelle plus le nom »	3,1	4,1 (0,0-8,2)	0,0	s.o.	0,5	0,6 (0,0-2,1)	1,0	0,5 (0,0-1,8)	4,7	5,2 (0,7-9,7)

Proportion de données manquantes : 0,5% à 9,5% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.


Tableau 308 Antécédents d'ITSS selon le moment du dernier diagnostic parmi l'ensemble des participants

Parmi les participants de statut VIH auto-rapporté négatif ou inconnu (n=968)
Est-ce qu'un médecin ou une infirmière vous a déjà dit que vous aviez une ou plusieurs des infections transmissibles sexuellement suivantes (ITS) ? À quand remonte la dernière fois qu'un médecin ou une infirmière vous a dit que vous aviez cette ITSS ?

ITSS	Oui, il y a plus d'un an		Oui, il y a entre 6 mois et un an		Oui, au cours des 6 derniers mois		Oui, mais je ne me souviens pas quand		Oui, au moins une fois à vie	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Chlamydie	19,5	11,3 (8,5-14,1)	6,6	3,9 (2,0-5,9)	8,5	8,0 (5,3-10,8)	1,1	1,5 (0,2-2,7)	35,7	24,8 (20,5-29)
Gonorrhée	23,0	16,2 (12,5-19,8)	7,8	6,2 (3,8-8,6)	8,3	5,9 (3,5-8,4)	1,7	1,3 (0,5-2,1)	40,8	29,6 (25,0-34,2)
Syphilis	12,5	7,9 (5,5-10,2)	3,7	3,3 (1,4-5,2)	3,7	2,5 (0,9-4,2)	0,7	0,3 (0,1-0,5)	20,5	14,0 (10,7-17,3)
LGV	0,6	0,2 (0,0-0,7)	0,3	0,1 (0,0-0,2)	0,4	1,6 (0,4-2,8)	0,0	s.o.	1,2	1,9 (0,6-3,2)
Infection intestinale (p. ex., shigella)	3,7	2,2 (0,6-3,8)	0,7	0,3 (0,0-0,6)	0,9	1,2 (0,0-2,5)	0,3	0,1 (0,0-0,1)	5,6	3,8 (1,7-5,9)
Hépatite A	3,0	1,5 (0,8-2,2)	0,2	0,1 (0,0-0,3)	0,2	0,8 (0,0-2,0)	0,6	0,3 (0,1-0,4)	4,0	2,6 (1,3-4,0)
Hépatite B	4,3	2,8 (1,4-4,3)	0,2	0,05 (0,0-0,1)	0,3	0,9 (0,0-2,1)	0,8	1,9 (1,0-2,8)	5,5	5,7 (3,6-7,7)
Hépatite C	3,5	3,2 (1,3-5,2)	0,7	0,3 (0,0-0,8)	1,1	2,6 (0,1-5,1)	0,5	1,6 (1,5-1,8)	5,8	7,8 (4,7-10,8)
Verrues génitales ou anales (condylomes)	18,5	13,4 (10,0-16,7)	2,1	1,0 (0,0-2,1)	1,9	1,9 (0,1-3,7)	1,3	1,9 (0,2-3,5)	23,8	18,2 (14,1-22,2)
Virus de l'herpès simplex	14,9	9,5 (6,5-12,5)	1,7	1,9 (0,0-3,7)	2,1	2,2 (0,3-4,1)	0,9	0,9 (0,3-1,5)	19,6	14,5 (10,6-18,3)
« On m'a dit que j'avais une ITSS mais je ne me rappelle plus le nom »	2,5	1,6 (0,6-2,5)	0,1	0,1 (0,0-0,4)	0,2	0,8 (0,0-2,1)	0,4	0,1 (0,0-0,3)	3,1	2,6 (1,0-4,2)

Proportion de données manquantes : 1,9% à 4,7% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.



Tableau 309 Fréquence d'un diagnostic d'infection gonococcique au cours des deux dernières années selon le statut VIH auto-rapporté

Parmi les participants ayant reçu un diagnostic d'infection gonococcique de la part d'un médecin au d'une infirmière, à vie (n=471)

Au cours des 2 dernières années, combien de fois un professionnel de la santé vous a-t-il dit que vous aviez la gonorrhée ?

	Statut VIH auto-rapporté				Ensemble des participants (n=471)	
	Négatif ou inconnu (n=344)		Positif (n=127)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
0	31,1	29,2 (20,5-38,0)	43,3	57,2 (42-72,4)	34,4	36,3 (28,3-44,2)
1	45,1	45,7 (35,8-55,6)	29,9	23,8 (11,8-35,9)	40,0	40,2 (32-48,5)
2	14,5	14,7 (7,7-21,6)	11,8	12,7 (2,1-23,3)	13,8	14,2 (8,3-20,0)
3+	9,3	10,4 (4,5-16,2)	15,0	6,2 (0,4-12)	10,8	9,3 (4,7-14,0)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ;

dx=diagnostique

Parmi les participants ayant reçu un diagnostic de syphilis de la part d'un médecin ou d'une infirmière au cours de leur vie (n= 236), 97,4% (93,1% - 100,0%) avaient déjà reçu un traitement contre la syphilis.

Tableau 310 Moment du dernier traitement reçu contre la syphilis selon le groupe d'âge

Parmi les participants ayant reçu un diagnostic de syphilis de la part d'un médecin ou d'une infirmière et ayant déjà reçu un traitement contre la syphilis (n= 228)

À quand remonte votre plus récent traitement contre la syphilis ? (Le traitement de la syphilis consiste habituellement en une injection de pénicilline dans une fesse (à moins que vous soyez allergique à la pénicilline))

Moment du dernier traitement contre la syphilis	Groupe d'âge						Ensemble des participants (n=228)	
	29 ans moins (n=35)*		30-54 ans (n=140)		55 ans et plus (n=53)*			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
2 ans et moins	80,0	s.o	64.3	66.8 (51.7-81.9)	40.5	s.o	62,1	68.6 (56.8-80.5)
Entre 3 et 5 ans	13,3	s.o	20.9	18.4 (8.2-28.6)	5.4	s.o	16.5	13.1 (6.6-19.6)
6 ans et plus	6,7	s.o	14.8	14.8 (2.2-27.3)	54.1	s.o	21.4	18.2 (7.9-28.6)

Proportion de données manquantes : de 14,4 à 32,7% selon le groupe d'âge.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.



7.3.3 Prévalence d'ITSS lors de l'enquête

7.3.3.1 Infections bactériennes

Tableau 311 Détection d'une infection à *C. trachomatis* sur un prélèvement effectué lors de l'enquête (au site pharyngé, urinaire ou rectal), selon le groupe d'âge et le statut VIH auto-rapporté

Parmi l'ensemble des participants ayant fourni un prélèvement valide à au moins un site (n=1177)
Prévalence d'une chlamydie (site pharyngé, urinaire ou rectal) selon le groupe d'âge et le statut VIH auto-rapporté lors de l'enquête.

Groupe d'âge	Statut VIH – ou inconnu (n=968)			VIH + (n=211)			Ensemble des participants (n=1 179)		
	n	% naj	% aj (IC 95%)	n	% naj	% aj (IC 95%)	n	% naj	% aj (IC 95%)
29 ans et moins	374	3,0	2,1 (0,7-3,5)	10	20,0	s.o.	384	3,5	3,1 (0,3-5,9)
30-54 ans	469	5,0	3,2 (0,6-5,9)	129	2,4	0,8 (0,0-2,3)	598	4,5	2,9 (0,7-5,1)
55 ans et plus	125	3,4	2,5 (0,0-7,2)	72	1,5	s.o.	197	2,7	2,4 (0,0-5,3)
Tous les groupes d'âge	960	4,0	2,7 (1,2-4,1)	211	3,0	4,2 (0,0-9,2)	1 179	3,8	2,9 (1,3-4,4)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.

Tableau 312 Détection d'une infection gonococcique sur un prélèvement effectué lors de l'enquête (au site pharyngé, urinaire ou rectal), selon le groupe d'âge et le statut VIH auto-rapporté

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)
Prévalence d'une infection gonococcique (site pharyngé, urinaire ou rectal) selon le groupe d'âge et statut VIH auto-rapporté lors de l'enquête.

Groupe d'âge	Statut VIH – ou inconnu (n=968)			VIH + (n=211)			Ensemble des participants (n=1 179)		
	n	% naj	% aj (IC 95%)	n	% naj	% aj (IC 95%)	n	% naj	% aj (IC 95%)
29 ans et moins	374	8,6	7,2 (2,6-11,7)	10	20,0	s.o.	384	9,0	8,0 (3-13,1)
30-54 ans	469	4,1	3,5 (0,0-7,1)	129	15,2	12,3 (0,7-23,8)	598	6,5	4,8 (1,3-8,4)
55 ans et plus	125	3,4	1,3 (0,0-4,1)	72	4,4	s.o.	197	3,8	3,4 (0,0-7,3)
Tous les groupes d'âge	960	5,8	4,7 (2,2-7,2)	211	11,9	12,8 (4,4-21,3)	1 179	6,9	5,8 (3,2-8,4)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.

Tableau 313 Détection d'une infection à *C. trachomatis* ou d'une infection gonococcique selon le site de prélèvement effectué lors de l'enquête,

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)
Prévalence de la chlamydie et de l'infection gonococcique selon le site de prélèvement

ITSS	Rectal (n=1156)		Urinaire (n=1171)		Pharyngé (n=1175)		L'un ou l'autre site (n=1177)	
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Chlamydie	2,9	2,4 (1,2-3,7)	0,8	0,4 (0,2-0,6)	0,5	0,4 (0,2-0,5)	3,7	2,8 (1,5-4,0)
Infection gonococcique	2,9	3,1 (1,2-4,9)	0,4	0,4 (0,1-0,8)	4,7	3,5 (2,1-5,0)	6,7	5,6 (3,5-7,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).


Tableau 314 Détection d'une lymphogranulomatose vénérienne sur un prélèvement rectal effectué lors de l'enquête

Détection de la lymphogranulomatose vénérienne rectale		
	% naj	% aj (IC 95%)
Parmi les participants ayant eu un prélèvement rectal valide (n=1156)	0.3	0.3 (0.0-0.7)
Parmi les participants ayant présenté un test positif de la chlamydiae sur prélèvement rectal (n=37) *	10.8	s.o.

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.= sans objet.

* L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.

Tableau 315 Résultats de tests sérologiques effectués lors de l'enquête compatibles avec une syphilis résolue, récente ou courante selon le groupe d'âge et le statut VIH auto-rapporté

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Détection d'une syphilis résolue, récente ou courante ¹ selon le groupe d'âge et le statut VIH auto-rapporté lors de l'enquête.									
Groupe d'âge	Statut VIH - ou inconnu (n=968)			Statut VIH + (n=211)			Ensemble des participants (n=1 179)		
	n	% naj	% aj (IC 95%)	n	% naj	% aj (IC 95%)	n	% naj	% aj (IC 95%)
29 ans et moins	374	9,1	8,4 (2,6-14,3)	10	40,0	s.o. **	384	9,9	9,4 (3,3-15,5)
30-54 ans	469	13,7	11,2 (6,9-15,4)	129	55,5	40,8 (25,0-56,7)	598	22,7	15,9 (11,1-20,6)
55 ans et plus	125	17,6	24,4 (15,1-33,8)	72	36,6	s.o.	197	24,5	27,7 (18,1-37,3)
L'ensemble des participants	960	12,4	11,7 (8,5-14,9)	211	48,3	39,2 (27,6-50,8)	1 179	18,8	15,4 (11,9-18,8)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.

*: Compatibles avec une infection résolue, récente ou courante : Test tréponémique (ELISA) réactif (lequel doit être confirmé par un test tréponémique complémentaire (TP-PA ou INNO-LIA) lorsque le titre de RPR est de 1/8 ou moins)

** L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.

Tableau 316 Résultats de tests sérologiques effectués lors de l'enquête compatibles avec une syphilis récente ou courant, selon le groupe d'âge et le statut VIH auto-rapporté

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Prévalence d'une syphilis récente ou courante ¹ selon le groupe d'âge et le statut VIH auto-rapporté									
Groupe d'âge	Statut VIH – ou inconnu (n=968)			VIH + (n=211)			Ensemble des participants (n=1 179)		
	n	% naj	% aj (IC 95%)	n	% naj	% aj (IC 95%)	n	% naj	% aj (IC 95%)
29 ans et moins	374	2,1	1,1 (0,5-1,7)	10	20,0	s.o.	384	2,6	1,3 (0,7-1,8)
30-54 ans	469	1,1	0,7 (-0,7-2,2)	129	10,2	6,6 (1,5-11,7)	598	3,0	1,7 (0,1-3,2)
55 ans et plus	125	1,6	2,4 (-0,3-5,1)	72	8,5	s.o.	197	4,1	3,2 (0,9-5,6)
L'ensemble des participants	960	1,6	1,1 (0,3-1,9)	211	10,0	6,1 (2,5-9,8)	1 179	3,1	1,8 (0,9-2,6)

Aucune donnée manquante.

*Compatibles avec une infection récente ou courante : Test tréponémique (ELISA) réactif et titre RPR de 1/8 ou plus

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.

Pour l'ensemble des participants, en utilisant le critère d'un titre RPR de 1/16 ou plus, la prévalence d'une syphilis récente ou courante active est de 1,3% (IC 95 % :0,8%-1,8%). Le titre 1/8 est plus sensible mais moins spécifique que le titre RPR de 1/16.



7.3.3.2 Infections virales

Tableau 317 Résultats des tests de détection de l'infection par le virus de l'hépatite B effectués lors de l'enquête, selon le statut VIH auto-rapporté

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Résultats des tests de détection de l'infection par le virus de l'hépatite B effectués lors de l'enquête, selon le statut VIH auto-rapporté						
Description des résultats	Statut VIH auto-rapporté				Ensemble des participants (n=1 179)	
	Négatif ou inconnu (n=968)		Positif (n=211)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Test HbsAg, anti-HBc et anti-HBs tous trois non-réactifs.	28,1	33,3 (27,7-38,9)	21,4	15,9 (7,0-24,7)	26,9	31,0 (25,9-36,0)
Compatibles avec une immunisation secondaire* à une infection naturelle (Test HbsAg non-réactif, anti-HBc réactif et anti-HBs réactif)	9,0	11,2 (8,3-14,2)	30,1	27,1 (15,6-38,5)	12,7	13,3 (10,1-16,6)
Compatibles avec une immunisation secondaire* à la vaccination (Test HbsAg non-réactif, anti-HBc non-réactif et anti-HBs)	60,9	53,0 (47,3-58,6)	40,0	49,0 (37,3-60,6)	57,2	52,4 (47,2-57,6)
Compatibles avec une Infection chronique ou active (Test HbsAg réactif, anti-HBc réactif et anti-HBs non-réactif)	0,1	0,1 (0,0-0,1)	2,9	4,3 (0,0-10,2)	0,6	0,6 (0,0-1,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

* Il est possible qu'une personne soit immune bien que ces marqueurs d'hépatite B soient non réactifs.

Tableau 318 Résultats des tests de détection de l'infection par le virus de l'hépatite B effectués lors de l'enquête, selon le groupe d'âge

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Résultats des tests de détection de l'infection par le virus de l'hépatite B lors de l'enquête, selon le groupe d'âge						
Description des résultats	Groupe d'âge				Ensemble des participants (n=1 179)	
	29 ans et moins (n=384)		29 ans et moins (n=384)			
	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)	% naj	% aj (IC 95%)
Test HbsAg, anti-HBc et anti-HBs tous trois non-réactifs.	25,6	27,1 (18,6-35,7)	27,6	33,1 (27,1-39,2)	26,9	31,0 (25,9-36,0)
Compatibles avec une immunisation secondaire * à une infection naturelle (Test HbsAg non-réactif, anti-HBc réactif et anti-HBs réactif)	1,3	4,4 (0,0-10,0)	18,3	18,5 (14,2-22,7)	12,7	13,3 (10,1-16,6)
Compatibles avec une immunisation secondaire*à la vaccination (Test HbsAg non-réactif, anti-HBc non-réactif et anti-HBs)	72,1	68,0 (58,7-77,3)	50,0	43,7 (37,8-49,7)	57,2	52,4 (47,2-57,6)
Compatibles avec une Infection chronique ou active (Test HbsAg réactif, anti-HBc réactif et anti-HBs non-réactif)	0,0	s.o.	0,9	1,0 (0,0-2,5)	0,6	0,6 (0,0-1,6)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.

* Il est possible qu'une personne soit immune bien que ces marqueurs d'hépatite B soient non réactifs.



Infection par le VIH

La prévalence de l'infection par le VIH parmi l'ensemble des participants était de 14,2% (IC 95% : 10,6 – 17,7). Elle était de 34,2% (IC 95% : 18,7% à 49,7%) chez les participants qui avaient déjà utilisé des drogues par injection dans leur vie et de 11,7% (IC 95 % : 8,3% à 15,1%) chez ceux qui n'en avaient jamais utilisées.

Tableau 319 Prévalence de l'infection par le VIH lors de l'enquête, selon le groupe d'âge

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179) Prévalence de l'infection par le VIH ¹ lors de l'enquête), selon le groupe d'âge.		
Groupe d'âge	% naj	% aj (IC 95%)
18-29 ans (n=384)	3,4	3,6 (0,0-7,4)
30-54 ans (n=598)	21,7	16,3 (10,8-21,8)
55 ans et plus (n=197)	36,5	32,1 (21,3-42,8)
Ensemble des participants (n=1 179)	18,3	14,2 (10,6-17,7)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling).

¹ : test ELISA réactif confirmé par un test Western Blot




Cascade de l'infection par le VIH

Parmi les répondants ayant un test de confirmation de l'infection par le VIH positif, 96,7% (IC 95% : 91,6% à 100,0%) étaient au courant de leur infection. Parmi les répondants qui étaient au courant de leur infection, 96,8% (IC 95% : 91,6% - 100,0%) prenaient un traitement et parmi ceux qui prenaient un traitement, 93,7% (IC 95% : 87,8% - 99,8%) avaient une charge virale indétectable.

Figure 1 - Cascade de l'infection par le VIH

Parmi les participants ayant un test de confirmation de l'infection par le VIH positif (n=215) ; proportions ajustées selon l'échantillonnage en fonction des répondants.






Trajectoire de l'infection par le VIH

Parmi les répondants ayant un test de confirmation de l'infection par le VIH positif, 96,7% étaient au courant de leur infection, 93,5% (IC 95% : 87,7% - 99,3%) étaient sous traitement et 87,9% (IC 95% : 79,7% - 95,7%) avaient une charge virale indétectable (moins de 200 copies/ml).

Figure 2 - Trajectoire de l'infection par le VIH

Parmi les participants ayant un test de confirmation de l'infection par le VIH positif (n=215) ; proportions ajustées selon l'échantillonnage en fonction des répondants.





Infection par le VHC

Tableau 320 Résultats des tests de détection du virus de l'hépatite C effectués lors de l'enquête compatibles avec une infection résolue ou active, selon le groupe d'âge

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)		
Prévalence d'une infection résolue ou active par le virus de l'hépatite C ¹ lors de l'enquête, selon le groupe d'âge		
Groupe d'âge	% naj	% aj (IC 95%)
18-29 ans (n=384)	0,3	s.o.
30-54 ans (n=598)	6,5	7,9 (2,9-12,8)
55 ans et plus (n=197)	11,1	21,4 (10,5-32,2)
Ensemble des participants (n=1 179)	5,2	7,2 (4,0-10,3)

Aucune donnée manquante.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.=sans objet.


1 : test anti-VHC réactif

Cascade de l'infection par le VHC

Parmi les répondants ayant un test de l'infection par le VHC réactif, naj : 93,3%²⁵ étaient au courant de leur infection. Parmi les répondants qui étaient au courant de leur infection, naj : 71,7%²⁶ avaient déjà pris ou prenaient un traitement.

Figure 3 - Cascade de l'infection par le VHC

Parmi les participants ayant un test anti-VHC réactif (n=60) ; proportions non ajustées selon l'échantillonnage en fonction des répondants.



²⁵ Pour obtenir un ajustement RDS valide, il est préférable de l'établir au sein d'un échantillon suffisamment grand de participants. C'est pourquoi, aucune tentative d'ajustement et donc d'inférence n'a été effectuée ici pour des sous échantillons de moins de 100 participants



Trajectoire de l'infection par le VHC

Parmi les répondants ayant un test de l'infection par le VHC réactif, naj : 93,3%²⁶ étaient au courant de leur infection et naj : 66,7%²⁶ avaient déjà pris ou prenaient un traitement

Figure 4 – Trajectoire de l'infection par le VHC

Parmi les participants ayant un test anti-VHC réactif (n=60) ; proportions non ajustées selon l'échantillonnage en fonction des répondants.




Tableau 321 Détection d'infection concomitantes par le VIH et par le VHC sur des prélèvements effectués lors de l'enquête

Parmi l'ensemble des participants (n=1 179)		
Infection par le VIH et par le VHC selon les résultats des tests sur des prélèvements effectués lors de l'enquête		
	% naj	% aj (IC 95%)
Infection par le VIH ET par le VHC	2,9	2,2 (0,3-4,2)
Proportion des personnes infectées par le VIH ayant une infection par le VHC (n=60)*	56,7	s.o.
Proportion des personnes infectées par le VHC ayant une infection par le VIH (n=201)	16,9	17,4 (59,2 -28,9)
Infection par le VIH seulement	18,3	14,2 (10,6-17,7)
Infection par le VHC seulement	5,2	7,2 (4,0-10,3)
Pas d'infection par le VIH ni par le VHC	79,2	80,6 (76,5-84,8)

Proportion de données manquantes : 0,1 à 2,9% selon l'item.

naj=non-ajustée ; aj=ajustée selon « l'échantillonnage en fonction des répondants » (Respondent-Driven Sampling) ; s.o.= sans objet.

* L'ajustement de la proportion n'a pas été calculé contenu que le nombre d'évènement est ici plus petit que 100.

Parmi les participants qui avaient un test anti-VHC réactif et qui avaient pris des antiviraux (n=38), 18,9% (proportion non ajustée) avaient encore des ARN détectables.

²⁶ Pour obtenir un ajustement RDS valide, il est préférable de l'établir au sein d'un échantillon suffisamment grand de participants. C'est pourquoi, aucune tentative d'ajustement et donc d'inférence n'a été effectuée ici pour des sous échantillons de moins de 100 participants

Annexes



I. OUTILS DE PROMOTION DE LA PARTICIPATION À L'ÉTUDE

1.1 Affiches de promotion

Pour les hommes (cis ou trans) ayant des relations sexuelles avec des hommes, quel que soit le statut VIH.

Es-tu prêt à ...

- aider à arrêter la transmission du VIH à Montréal?
- passer des tests ITSS complets et gratuits? (avec un test du VIH à résultat rapide, si tu le veux)
- recevoir jusqu'à 140\$?

Tu pourrais être invité à participer à l'enquête Engage par quelqu'un de ton entourage. Sois prêt!

engage
Vers l'avancement de la santé sexuelle des hommes gais et bisexuels

L'enquête Engage est menée par la Direction régionale de santé publique en collaboration avec REZO et des membres des communautés GBTQ.
engagemontreal@gmail.com
engage-hommes.ca

ONTARIO HIV TREATMENT NETWORK
CIHR IRSC
SANTÉ
REZO
Québec

For men (cis or trans) who have sex with men, regardless of HIV status.

Are you ready to...

- help stop the transmission of HIV in Montréal?
- get a free and comprehensive STI checkup? (including HIV rapid-testing, if you like)
- receive up to \$140?

You could be invited to participate in the Engage study by someone you know. Get ready!

engage
Advancing gay and bisexual men's sexual health

The Engage study is conducted by the Direction de santé publique de la région de Montréal, in collaboration with REZO and members of our communities.
engagemontreal@gmail.com
engage-men.ca

ONTARIO HIV TREATMENT NETWORK
CIHR IRSC
SANTÉ
REZO
Québec

Pour les hommes (cis ou trans) ayant des relations sexuelles
avec des hommes, quel que soit le statut VIH.

Es-tu prêt à ...

- aider à arrêter la transmission du VIH à Montréal?
- passer des tests ITSS complets et gratuits?
(avec un test du VIH à résultat rapide, si tu le veux)
- recevoir jusqu'à 140\$?

Tu pourrais être invité à participer à l'enquête
Engage par quelqu'un de ton entourage. Sois prêt!




Vers l'avancement de la santé sexuelle des
hommes gais, bisexuels, queer et trans*



L'enquête Engage est menée par la DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE du CIUSSS du Centre-Sud de
l'Île de Montréal en collaboration avec REZO et des membres des communautés GBTQ, avec l'appui financier de :

montreal@engage-hommes.ca
engage-hommes.ca



1.2 Cartes d'information

Es-tu prêt à ...

- aider à arrêter la transmission du VIH à Montréal?
- passer des tests ITSS complets et gratuits? (avec un test du VIH à résultat rapide, si le tu veux)
- recevoir jusqu'à 140\$?

engage
Nouvellement, on a pu faire un autre
test VIH à résultat rapide.



Pour les hommes (cis ou trans)
ayant des relations sexuelles
avec des hommes,
quel que soit le statut VIH.

**Tu pourrais être invité
à participer à l'enquête
Engage par quelqu'un
de ton entourage.
Sois prêt!**

L'Enquête Engage est menée par la Direction de
santé publique de la région de Montréal en collaboration
avec REZO et des membres de nos communautés.

Information :
engagemontreal@gmail.com
engagehommes.ca

For men (cis or trans)
who have sex with men,
regardless of HIV status.

**You could be invited
to participate in
the Engage study by
someone you know.
Get ready!**

The Engage study is conducted by the Direction
de santé publique de la région de Montréal,
in collaboration with REZO and
members of our communities.

Information :
engagemontreal@gmail.com
engage-men.ca

1.3 Annonces sur Grindr



1.4 Annonces sur Facebook

Health Initiative for Men (HIM)
Sponsored · 🌟

Aidez à rendre plus sécuritaires, plus fiers et plus en santé les hommes gais, bi et queer, y compris les hommes trans et les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Visitez engage-hommes.ca pour savoir comment faire une différence.

[See Translation](#)



Engage | Vers l'avancement de la santé sexuelle des hommes gais et bisexuels

ENGAGE-MEN.CA [Learn More](#)

Health Initiative for Men (HIM)
Sponsored · 🌟

Aidez à rendre plus sécuritaires, plus fiers et plus en santé les hommes gais, bi et queer, y compris les hommes trans et les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Visitez engage-hommes.ca pour savoir comment faire une différence.

[See Translation](#)




Engage | Vers l'avancement de la santé sexuelle des hommes gais et bisexuels

ENGAGE-MEN.CA [Learn More](#)

Health Initiative for Men (HIM)
Sponsored · 🌟

Help make gay, bi, and queer men, including trans men, and other men who have sex with men safer, prouder and healthier. Find out how you can make a difference at engage-men.ca.



Engage | Advancing gay and bisexual men's sexual health

engage-men.ca [Learn More](#)

[Like](#) [Comment](#) [Share](#)

Health Initiative for Men (HIM)
Sponsored · 10

Nous lançons une des plus grandes études canadiennes sur les hommes gais, bi et queer, y compris les hommes trans, et les autres hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Les participants reçoivent 50 dollars en échange de leur participation, et 15 dollars additionnels pour chaque homme qu'ils invitent à participer à l'étude à leur tour. Visitez engage-hommes.ca pour savoir comment participer.

[See Translation](#)



Engage | Vers l'avancement de la santé sexuelle des hommes gais et bisexuels

engage-men.ca [Learn More](#)

Health Initiative for Men (HIM)
Sponsored · 10

Nous lançons une des plus grandes études canadiennes sur les hommes gais, bi et queer, y compris les hommes trans, et les autres hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Les participants reçoivent 50 dollars en échange de leur participation, et 15 dollars additionnels pour chaque homme qu'ils invitent à participer à l'étude à leur tour. Visitez engage-hommes.ca pour savoir comment participer.

[See Translation](#)



Engage | Vers l'avancement de la santé sexuelle des hommes gais et bisexuels

engage-men.ca [Learn More](#)

Health Initiative for Men (HIM)
Sponsored · 10

We're launching one of the largest Canadian studies of gay, bi, and queer men, including trans men, and other men who have sex with men. Participants receive 50 dollars for taking part in our study, and an... [More](#)



Engage | Advancing gay and bisexual men's sexual health

engage-men.ca [Learn More](#)

[Like](#) [Comment](#) [Share](#)

Health Initiative for Men (HIM) Sponsored ·  Like Page

Les progrès de la recherche sur le VIH sont en train de changer la manière de voir la prévention et le traitement du VIH chez les hommes gais, bi et queer, y compris les hommes trans, et les autres hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Participez et partagez vos idées. Visitez engage-hommes.ca.

[See Translation](#)



Engage | Vers l'avancement de la santé sexuelle des hommes gais et bisexuels

[Learn More](#)

ENGAGE-MEN.CA

Health Initiative for Men (HIM) Sponsored ·  Like Page

Les progrès de la recherche sur le VIH sont en train de changer la manière de voir la prévention et le traitement du VIH chez les hommes gais, bi et queer, y compris les hommes trans, et les autres hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Participez et partagez vos idées. Visitez engage-hommes.ca.

[See Translation](#)



Engage | Vers l'avancement de la santé sexuelle des hommes gais et bisexuels

[Learn More](#)

ENGAGE-MEN.CA

Health Initiative for Men (HIM) Sponsored ·  

Advances in HIV research are changing how we understand HIV transmission, prevention, and treatment for gay, bi, and queer men, including trans men, and other men who have sex with men. Participate and share your perspective. Check out engage-men.ca.



Engage | Advancing gay and bisexual men's sexual health

[Learn More](#)

engage-men.ca

 Like  Comment  Share

Health Initiative for Men (HIM) Sponsored ·  

Advances in HIV research are changing how we understand HIV transmission, prevention, and treatment for gay, bi, and queer men, including trans men, and other men who have sex with men. Participate and share your perspective. Check out engage-men.ca.



Engage | Advancing gay and bisexual men's sexual health

[Learn More](#)

engage-men.ca

 Like  Comment  Share

II. COUPONS DE RECRUTEMENT



What is Engage?
Engage is a sexual health study of gay, bi and queer men, including trans men and other men who have sex with men regardless of HIV status.

What to expect?

- Anonymous computer survey
- Testing for sexually transmitted infections, including an HIV rapid-test if you want one
- Compensation of up to \$140 cash, and chances to win a \$2000 travel voucher or a \$250 pre-paid credit card

C'est quoi Engage?

Engage est une étude sur la santé sexuelle des hommes gais et bisexuels.

Vous recevrez un questionnaire anonyme par ordinateur.

Engage vous offrira une compensation jusqu'à 140\$ en argent comptant, ou des chances de gagner un voyage de 2000\$.

Engage vous offrira également un test de dépistage des IST, y compris un test rapide de l'HIV si vous le souhaitez.

Make your appointment now!
Please bring this coupon with you to your visit.

Prends ton rendez-vous maintenant !
Amène ce coupon avec toi lors de ta visite.

Sur notre site Internet : engage-hommes.ca/fr/montreal/
ou par téléphone / texto : 514 260-0966

Mon rendez-vous :
Date : _____
Heure : _____

Lieu : **1223A, rue Amherst
Montréal**

Coupon : _____
Référence : _____

L'Équipe Engage est menée par la Direction régionale de santé publique de Montréal.

engage

Address: **1223A Amherst
Montréal**

My appointment:
Date: _____
Time: _____

or by phone/text : 514-260-0966
On our website : montreal.engage-men.ca

The Engage study is conducted by the Commission régionale de santé publique de Montréal.

III. FICHES D'INFORMATION DISTRIBUÉE À LA FIN DE CHAQUE VISITE



C'est quoi ?

Une étude sur la santé sexuelle des hommes gais, bi et queer, y compris les hommes trans, et les autres hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, quel que soit leur statut sérologique au VIH.

Comment ça marche ?

La seule façon de participer à engage est d'être invité par quelqu'un qui a déjà participé. Avec un coupon, tu peux prendre un rendez-vous en ligne, à la date et l'heure qui te conviennent, sur notre site : montreal.engage-hommes.ca

chaque visite au site de l'étude (12254, rue Amherst) prend environ 2,5 à 3 heures et se divise en 3 volets :

- 1 - Discussion générale sur l'étude**
 - Explication des procédures de l'étude
 - Signature du consentement
- 2 - Questionnaire**
 - Sondage anonyme sur ordinateur
 - Questions sur la santé physique, psychologique et sexuelle au cours des 6 derniers mois
- 3 - Partie clinique**
 - Counseling sur le VIH/ITS
 - Dépistage du VIH pour les gens séronégatifs avec test à résultat rapide (s'il te le veux)
 - Charge virale et CD4 pour les gens séropositifs
 - Dépistage des hépatites B & C et de la syphilis
 - Dépistage de la gonorrhée et de la chlamydia
 - Recherche du VPH pour les gens de 30 ans et moins

Tu as des questions ?

Besoin de plus d'information ?

Site Web
www.engage-hommes.ca

Courriel
montreal@engage-hommes.ca

Téléphone ou texte
514 260-0966

Soutien financier - Ministère de la santé et des services sociaux du Québec




Engage est menée par la Direction régionale de santé publique de Montréal en étroite collaboration avec des organisations communautaires tels AGO, ACCM et Mission Plus-Cœur ainsi que des cliniciens, des chercheurs universitaires, et des membres de nos communautés.

Quelques hôpitaux partenaires de santé sexuelle sont mentionnés sur le site de l'étude





Québec 

Compensation pour ta participation

- 50 \$ en argent comptant pour avoir participé

OU

- 5 billets de 10 \$ chacun pour participer dans 2 tirages et avoir une chance de gagner une carte-cadeau prépayée de 250 \$ ou un forfait de voyage de 2000 \$

En plus

- 15 \$ pour chaque gas que tu auras invité et qui aura participé. Tu peux inviter jusqu'à 6 gas, pour un maximum de 90 \$!

Faire rouler la « Boule de Neige »

Le recrutement utilise l'approche **BOULE DE NEIGE**, ce qui veut dire que les participants eux-mêmes invitent des gas qui font partie de leur réseau social et social à participer à l'étude.

Ta collaboration assurera que le projet reflète la grande diversité de la population, incluant les hommes séropositifs et séronégatifs ainsi que les membres des communautés ethniques, culturelles et linguistiques.

Ta voix est importante!

Quels gas inviter ?

Des gas qui :

- Te sont **FAMILIERS** (p. ex., des amis, partenaires sexuels ou connaissances)
- **PAS DES INCONUS**
- S'identifient comme des **HOMMES**, y compris les hommes trans
- Ont **16 ans ou plus**
- Ont eu des relations sexuelles avec d'autres hommes au cours des **6 derniers mois**
- **TRÈS IMPORTANT !**
- S'intéressent à participer à l'étude

Quoi leur dire ?

Tu ne sais pas trop comment parler d'Engage à un autre gas ? Voici quelques messages que tu peux suggérer :

- « Tu peux passer des dépistages d'ITS complets, tu n'auras pas à attendre pour obtenir un résultat et il n'y a aucun frais »
- « Si tu veux, tu peux avoir un test de VIH à résultat rapide; un résultat dans les quelques minutes »
- « Tu ne te sentiras pas jugé »
- « C'est entièrement confidentiel »
- « En embarquant toi aussi, tu contribués au portrait vraiment représentatif des GBT de la grande région de Montréal »
- « Tu vas aider à rendre nos communautés plus sécuritaires, plus saines, plus en santé »

Quoi leur remettre?

La seule façon de participer à Engage est d'être invité par quelqu'un qui a déjà participé.

Tu es en main des coupons en format carte d'affaires à remettre à tes invités.

Ton choix

Donner le coupon papier



OU

Prendre le coupon papier en photo avec ton téléphone intelligent, et l'envoyer par courriel/texto/tu es les applications mobiles.

Chaque coupon d'invitation peut être utilisé par une seule personne.

Encourage ceux que tu invites à prendre rapidement leur rendez-vous pour bénéficier d'une plus grande disponibilité de plages horaires!

What is Engage?

Engage is a sexual health study of gay, bi and queer men, including trans men and other men who have sex with men, regardless of their HIV status.

How does it work?

The only way to participate in Engage is to be invited by someone who has already participated. Once you have been given a coupon, you can book an appointment online and choose a date and time that suits you best. Just go to our website at engage-men.ca/montreal

The study visit at 1223A Amherst Street lasts about 2.5 to 3 hours, and consists of 3 parts:

- 1 - Study overview
 - Explanation of study procedures
 - Signing of consent forms
- 2 - Questionnaire
 - Anonymous computer survey
 - Questions on your physical, psychological and sexual health during the past 6 months
- 3 - Clinical component
 - HIV/STI counselling
 - HIV testing, with an HIV rapid test (if you want one)
 - Viral load and CD4 count for HIV positive guys
 - Hepatitis B & C and syphilis testing
 - Gonorrhea and chlamydia testing

Who should you invite?

Guys who:

- are 16 years of age or over
- you **KNOW** (e. g. friends, sex partners, acquaintances) - **NO STRANGERS**
- identify as **MEN**, including trans men
- have had sexual relations with other men in the past 6 months - **VERY IMPORTANT!**
- are interested in taking part in the study

What should you say to them?

Don't really know how to talk about Engage with another guy? Here are a few suggestions:

"You can get full STI testing, you won't have to wait long to get an appointment, and it's free."

"If you want, you can get a rapid HIV test; you can get your results in a few minutes."

"You won't feel judged."

"It's completely confidential."

"By participating, you help contribute to a portrait that's representative of Montréal's population of gay, bi, and queer men including trans men and other men who have sex with men."

"You'll help make our communities safer, prouder and healthier."

What should you give them?

The only way a person can participate in Engage is to be invited by someone who has already participated.

You've been given paper coupons to hand out to guys you want to invite.

Your choice

1. Give them a paper invitation coupon



OR

2. Take a picture of the paper coupon with your smartphone and send it to them by email or text, or using a mobile app.

Each invitation coupon can only be used by one person.

Encourage people you invite to book an appointment quickly so they can have more choice of appointment times!

IV. AFFICHES DÉCRIVANT LES MODALITÉS D'AUTO-PRÉLÈVEMENT URINAIRE ET RECTAL



Instructions pour l'auto-prélèvement rectal

Instructions for the rectal auto-swab

Étape 1
Step 1



Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon.
Wash your hands with soap and water.

Étape 2
Step 2



Mettez un essuie-tout à plat sur une surface horizontale. Entrez le couvrecil du tube en le faisant glisser.
Spread a paper towel flat on a flat surface. Insert the cap of the tube.

Étape 3
Step 3



Mettez-vous dans la position qui vous donne l'accès le plus facile à votre anus.
Get into a position that gives you access to your anus.

Étape 4
Step 4



Avec une main, tenez une de vos fesses. Avec l'autre main, placez l'auto-swab sur l'ouverture de votre anus.
Hold one hand and squeeze your hand to the side. With your other hand, put the auto-swab into the opening of your anus.

Étape 5
Step 5



Insérez l'auto-swab à une profondeur d'environ 4 cm (plus ou moins l'équivalent de la largeur de deux ou trois doigts). Doucement, faites 2 ou 3 cercles avec l'auto-swab en tournant les parties du rectum.
Insert the auto-swab to a depth of about 4 cm (about the width of two or three fingers). Gently move the auto-swab in circles 2 or 3 times. Insert the auto-swab into the rectum.

Étape 6
Step 6



Mettez l'auto-swab dans le tube. Remettez le couvrecil sur le tube en vous assurant de bien le resserrer.
Put the auto-swab in the tube and put the cap back on the auto-swab.

Étape 7
Step 7



Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon.
Wash your hands with soap and water.

Si l'infirmière vous a demandé de faire un auto-prélèvement rectal, suivez les premières étapes mais mouillez l'auto-swab avant de l'introduire dans le rectum.
If the nurse instructed you to take a rectal auto-swab, follow the first steps but make sure to wet the auto-swab before introducing it into the rectum.

V. PROCÉDURE DE L'ÉTUDE



VI. FORMULAIRES DE CONSENTEMENT



FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT PARTICIPANTS 16 ANS À 30 ANS

Centre universitaire
de santé McGill
Institut de recherche



McGill University
Health Centre
Research Institute

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal



Titre de l'étude :	Enquête Engage Montréal
Chercheurs principaux :	Joseph Cox Médecin, professeur agrégé Direction régionale de santé publique du CIUSSS-CSIM Institut de recherche du CUSM, site Glen Université McGill Téléphone : 514-528-2400, poste 3630 Gilles Lambert Médecin Direction régionale de santé publique du CIUSSS-CSIM Institut national de santé publique du Québec Téléphone : 514-528-2400, poste 3630
Co-chercheurs :	Martin Blais, UQAM Eric Latimer, Université McGill Bertrand Lebouché, Centre universitaire de santé McGill

Ken Monteith, COCQ-SIDA
 Joanne Otis, UQAM
 Bouchra Sehrir, Laboratoire de santé publique du Québec
 Cécile Tremblay, Université de Montréal

Bailleurs de fonds : Instituts de recherche en santé du Canada (numéros de référence 107544, 143342, 146056)

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

1. Préambule

Nous vous invitons à participer à ce projet de recherche parce que vous vous identifiez comme un homme, avez 16 ans ou plus, avez eu des relations sexuelles avec d'autres hommes au cours des six derniers mois, vivez à Montréal ou dans les environs et êtes capable de comprendre et de répondre à un questionnaire écrit en français ou en anglais. Avant d'accepter de participer à ce projet et de signer le formulaire d'information et de consentement, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et d'examiner avec soin les renseignements suivants.

Il est possible que ce formulaire contienne des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous encourageons à poser toute question au personnel de l'étude et à lui demander de vous expliquer n'importe quel mot ou renseignement qui ne vous est pas clair.

2. Nature et objectif du projet de recherche

Les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (gbHARSAH) courent des risques élevés de contracter le VIH et d'autres infections transmissibles sexuellement (ITS). Malgré les progrès importants de la thérapie antirétrovirale suivi d'une baisse des taux de morbidité et de mortalité parmi les personnes infectées par le VIH, et malgré les efforts de prévention visant la réduction des nouvelles infections par le VIH, à chaque année, le nombre de nouvelles infections par le VIH demeure relativement stable parmi les hommes gbHARSAH, et le nombre de nouvelles ITS est à la hausse.

Nous souhaitons en apprendre plus sur comment les hommes gbHARSAH vivant dans la grande région de Montréal répondent aux changements dans l'épidémie de VIH à mesure que l'accès au traitement du VIH augmente. Nous souhaitons aussi en apprendre plus sur les attitudes, les croyances et les comportements actuels en ce qui concerne la santé sexuelle, la santé mentale et la consommation de drogues récréatives. Nous nous intéressons également à savoir comment les progrès récents du traitement et de la prévention du VIH au Québec influencent les façons dont les hommes gbHARSAH choisissent de vivre, d'aimer et de s'amuser.

Pour ce projet de recherche, nous comptons recruter 1 000 hommes gbHARSAH âgés de 16 ans ou plus. Pour le recrutement, chaque participant invitera un maximum de 6 personnes qu'il connaît bien à participer. En même temps, des hommes gbHARSAH s'inscriront à des études semblables se déroulant à Toronto et à Vancouver. Ces études constituent le travail d'une équipe de recherche nationale portant le nom d'« Engage ».

3. Procédures de l'étude

3.1. Prise de contact initiale et processus de consentement

Nous examinerons avec vous les critères d'inclusion et d'exclusion de ce projet de recherche afin de déterminer votre admissibilité. Nous expliquerons aussi les procédures de l'étude et répondrons à toutes vos questions. Nous vous demanderons ensuite de confirmer votre participation en indiquant votre consentement à la fin de ce formulaire Web.

Ensuite, nous vous donnerons un code de participant et nous vous demanderons de remplir un bref formulaire afin de recueillir quelques renseignements personnels. Nous vous demanderons de fournir votre nom, votre sexe, votre date de naissance et votre code postal. Si vous préférez ne pas donner votre nom ou code postal, vous aurez le droit de refuser. Nous vous demanderons aussi un numéro de téléphone ou une adresse courriel ou postale pour permettre à l'équipe de recherche de vous contacter.

Vos coordonnées pourraient être utilisées dans 3 situations : 1) pour vous informer des résultats de vos tests; 2) pour vous conseiller et soutenir dans le recrutement de participants parmi les gens que vous connaissez; et 3) pour vous aviser lorsque les personnes que vous avez recrutées ont terminé leur visite au site de l'étude pour que vous puissiez recevoir votre compensation.

3.2. Visite au site de l'étude

Si vous acceptez de participer à cette étude de recherche, nous vous demanderons de remplir un questionnaire par ordinateur. Le questionnaire nécessitera un maximum de 90 minutes et vous le remplirez seul. Le questionnaire se rapportera à la période de six mois précédant immédiatement votre participation à l'étude. Les questions aborderont plusieurs sujets : facteurs sociodémographiques (p. ex., ethnicité, niveau d'éducation, etc.); votre participation à diverses activités communautaires; aspects de la santé mentale; vos activités sexuelles avec vos partenaires récents; consommation de drogues; et vos expériences de discrimination et de traumatismes physiques. Le questionnaire vous interrogera aussi sur vos attitudes et croyances concernant les risques de VIH; les normes sexuelles dans vos cercles sociaux; et vos sentiments à l'égard des risques et des responsabilités liés au VIH et aux autres ITS. Si une question vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. De plus, si vous ne comprenez pas une question, vous pourrez demander de l'aide au personnel de l'étude.

Si vous consentez à participer, un infirmier d'expérience prélèvera 5 petits tubes de sang et les fera tester pour le VIH, l'hépatite C, l'hépatite B et la syphilis. Ce nombre de tubes correspond à ce qui se fait normalement lors d'un dépistage d'ITS complet en clinique. L'infirmier vous expliquera aussi comment prélever vous-même un échantillon d'urine, un rinçage buccal et des échantillons de frottis de la gorge et du rectum pour les faire tester pour la gonorrhée, la chlamydia et le virus du papillome humain (VPH). Pour les personnes séropositives, 3 tubes de sang supplémentaires seront prélevés pour mesurer la charge virale en VIH et le compte de cellules CD4 (cellules immunitaires auxiliaires T); pour les personnes avec un résultat positif au dépistage de l'hépatite C, nous préleverons un tube de sang supplémentaire pour effectuer des tests pour détecter la présence de particules virales dans le sang. Les échantillons positifs pour la chlamydia seront analysés pour déterminer s'il s'agit de la souche à l'origine des infections à LGV. Si vous désirez connaître votre statut VIH

lors de votre visite, nous pourrions effectuer un test de dépistage rapide gratuit. Les résultats de vos autres tests vous seront communiqués dans les deux semaines suivant votre visite. Si vous le désirez, vous pourrez obtenir des copies de vos résultats afin de les montrer à votre médecin.

Vous pourrez obtenir les résultats de tous vos tests sauf celui du VPH, car ce test ne peut être utilisé à des fins de diagnostic clinique et de suivi.

Une fois les procédures ci-dessus terminées, vous recevrez des coupons afin de recruter des participants parmi les gens que vous connaissez, ainsi que des instructions détaillées sur la manière de les donner de façon confidentielle à vos amis et connaissances admissibles. Si vous êtes recruté vous-même vers la fin de l'étude, il est possible que vous ne receviez aucun coupon. Ce mécanisme nous permettra de ralentir et de mettre fin au recrutement.

En tout, la visite au site de l'étude devrait durer environ 2 heures et demie.

4. Consentement à être contacté pour participer à d'autres études liées à Engage

Cette étude fait partie de plusieurs activités de recherche prévues par l'équipe Engage au cours des 4 prochaines années. Par exemple, nous prévoyons lancer une étude qualitative pour en savoir plus sur des sujets spécifiques comme les expériences vécues pour accéder et utiliser des services de prévention et de soins du VIH et des ITS. L'équipe participera aussi à l'évaluation d'interventions visant la prévention du VIH.

À la fin du présent formulaire de consentement, nous vous demanderons d'indiquer si vous acceptez que l'équipe de recherche utilise vos coordonnées pour vous inviter à participer à des études futures liées à Engage. Si vous acceptez, sachez que vous ne donnez PAS votre consentement à participer aux études en question. Si nous vous contactons, nous vous demanderons de fournir un consentement distinct avant de participer.

5. Bienfaits possibles

Nous vous proposerons un test de dépistage rapide du VIH gratuit dont le résultat vous sera communiqué immédiatement. Vous aurez un dépistage complet pour la détection du VIH et autres ITS qui sont fréquentes parmi les hommes gbHARSAH. Vous recevrez aussi un counseling sur le dépistage du VIH et des ITS de la part du personnel formé. Vos réponses aux questions portant sur vos pratiques sexuelles pourraient stimuler une réflexion personnelle positive. De plus, les participants à des études semblables ont fait état d'un sentiment de gratification découlant de leur contribution à l'avancement de ce genre de recherche. Nous nous attendons à ce que les résultats de cette étude aient des bienfaits pour les hommes gbHARSAH de la grande région de Montréal, de même qu'à travers le Québec et le Canada.

6. Risques associés au projet de recherche

Certaines questions porteront sur des sujets liés à la sexualité, à la consommation de drogues et à la violence. Il est possible que vous ressentiez un inconfort au moment de répondre à ces questions.

Les complications possibles des prises de sang peuvent inclure des ecchymoses légères, de l'irritation, de la rougeur, des saignements légers et/ou de l'enflure à l'endroit où le sang est prélevé. Si vous ignorez que vous avez une infection transmissible sexuellement, apprendre que vous en avez une pourrait causer un choc émotionnel. Si c'est nécessaire ou que vous le demandez, nous pourrions vous dire où vous pouvez obtenir du soutien approprié en plus de vous orienter vers des soins et des traitements.

7. Droits légaux

Si vous acceptez de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncerez à aucun de vos droits légaux et ne déchargerez pas les chercheurs, les bailleurs de fonds ou l'institut de leurs responsabilités civiles et professionnelles.

8. Confidentialité

Lorsque nous partagerons de l'information avec vous, nous confirmerons votre identité en vérifiant les réponses à deux questions de votre choix auxquelles vous aurez répondu précédemment. Votre code de participant sera utilisé en tout temps, à l'exception des situations décrites ci-dessus. La clé permettant de lier votre code de participant à votre nom sera conservée dans une base de données protégée par un mot de passe et ne sera accessible qu'au personnel autorisé de l'étude. Seules les informations nécessaires pour répondre aux objectifs de l'étude seront recueillies.

8.1. Stockage de l'information et période de rétention

Le site de l'étude se trouve au 1223-A, rue Amherst, à Montréal. L'information sera recueillie de façon électronique, à l'exception des résultats des tests, lesquels seront envoyés par le laboratoire en format papier. Les documents en format papier seront conservés de façon sécuritaire à ce site dans un classeur verrouillé. Après la fin de l'étude, les copies papier des résultats de laboratoire seront conservées de façon sécuritaire pendant 7 ans au bureau de coordination de l'étude à la Direction régionale de santé publique du CIUSSS-CSIM, situé au 1301, rue Sherbrooke Est, Montréal. Les données recueillies par questionnaire électronique seront conservées temporairement sur l'ordinateur que vous utiliserez pour remplir le questionnaire jusqu'à ce qu'il soit terminé. Une fois le questionnaire rempli, les données seront encryptées et envoyées de façon sécuritaire via un réseau privé vers un serveur sécurisé situé au Centre d'excellence sur le VIH/sida de la Colombie-Britannique (BCCfE). Les renseignements personnels et les résultats de laboratoire seront également saisis dans le serveur sécurisé. Le serveur se situe dans un secteur sécurisé du BCCfE qui n'est accessible qu'au personnel des technologies de l'information autorisé. À la fin de la période de conservation de 7 ans, les copies papier des résultats de laboratoire seront déchiquetées, mais les données électroniques seront conservées.

8.2. Partage des données

Les chercheurs de l'étude Engage Montréal prévoient utiliser les données que nous recueillerons pour contribuer à l'étude nationale sur la santé des hommes gbHARSAH qui se déroulera simultanément à Toronto et à Vancouver. Pour cette raison, votre questionnaire et vos données de laboratoire seront inclus dans une base de données plus grande et contribueront à approfondir notre compréhension de la santé sexuelle des hommes gbHARSAH d'un bout à l'autre du Canada. Vos renseignements

personnels ne seront pas partagés avec les autres équipes.

8.3. Divulgations de renseignements exigées par la loi

Vos renseignements personnels et toute information susceptible de révéler votre identité seront protégés dans les limites de la loi. Vos échantillons biologiques destinés au dépistage du VIH et des ITS seront envoyés aux laboratoires du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, accompagnés des renseignements personnels suivants : prénom, nom de famille, sexe, date de naissance et code postal ou encore avec votre code de participant, votre sexe et votre date de naissance si vous demandez que votre nom et votre code postal ne soient pas utilisés lors des dépistages.

Comme le VIH et les ITS sont toutes des infections à déclaration obligatoire, tous les nouveaux résultats positifs devront être signalés aux autorités de la santé publique avec des renseignements identifiants (nom, sexe, date de naissance et code postal). Si vous décidez de ne pas donner vos nom et code postal, votre code de participant sera utilisé à la place.

Pour des raisons d'éthique et de conformité avec l'étude, il est possible que vos renseignements soient examinés par une personne mandatée par le comité d'éthique de la recherche du CUSM, l'Institut de recherche du CUSM ou les Instituts de recherche en santé du Canada. Ces individus et organismes ont accepté de respecter une politique de confidentialité. En signant le présent document, vous consentez à donner à ces personnes l'accès à vos renseignements personnels et aux données recueillies vous concernant.

Vos renseignements personnels ne seront révélés en aucun autre cas sans votre consentement exprès, à moins que ce soit exigé par des autorités judiciaires; à titre d'exemple, notons que nous pourrions être obligés de fournir, si une ordonnance de la cour l'exigeait, de l'information sur le non-dévoilement à un partenaire sexuel de la séropositivité au VIH.

9. Dissémination des résultats de la recherche

Des mises à jour et des rapports en langage clair et simple (c.-à.-d. en langage non technique) seront affichés sur la page Web de l'étude à l'adresse www.engage-hommes.ca. Des résultats seront également présentés lors de conférences scientifiques et dans des revues scientifiques. Nous travaillerons aussi avec divers organismes communautaires pour disséminer les résultats de la recherche en langage clair et simple et en formats accessibles.

Aucun renseignement susceptible de révéler l'identité d'un individu ne sera utilisé dans ces mises à jour, rapports, présentations ou articles de revues.

10. Compensation

Afin de reconnaître votre contribution précieuse à l'étude et de compenser les coûts découlant de tout inconfort ou de toute perte de revenu, nous vous offrirons 50 \$ en échange de votre participation à cette étude.

Vous pourrez accepter votre compensation de 2 façons différentes :

1. Recevoir 60 \$ en argent comptant
OU
2. Recevoir 6 billets (valeur de 10 \$ chaque) valides pour 2 tirages différents :
 - o **Tirage 1 : carte de crédit prépayée d'une valeur de 250 \$**
 - Chaque billet a au moins une chance sur 25 de gagner
 - Si vous dépensez la totalité des 60 \$ en billets pour ce tirage, vous aurez au moins une chance sur 5 de gagner
 - o **Tirage 2 : coupon de voyage d'une valeur de 2 000 \$**
 - Chaque billet a au moins une chance sur 200 de gagner
 - Si vous dépensez la totalité des 60 \$ en billets pour ce tirage, vous aurez au moins une chance sur 33 de gagner

Vous pourrez choisir n'importe quelle combinaison des options ci-dessus (par exemple, 20 \$ en argent comptant et 40 \$ en billets pour l'un ou l'autre des tirages). Le personnel de l'étude vous demandera comment vous souhaitez diviser votre compensation et vous donnera l'argent comptant/billets de tirage correspondants à la fin de votre visite au site de l'étude.

De plus, vous recevrez 15 \$ pour chaque participant additionnel admissible (maximum de 6) qui se présente au site de l'étude pour y participer. Ce montant additionnel est destiné à vous compenser pour le temps passé à recruter des gens au sein de votre réseau social. Nous communiquerons avec vous lorsque la personne ou les personnes que vous aurez recrutées auront visité le site de l'étude, afin que vous puissiez recevoir la compensation additionnelle. La compensation que vous mériterez en recrutant des pairs pourra être dispensée sous forme de billets additionnels pour les tirages décrits ci-dessus.

Si vous souhaitez offrir votre compensation en don à un organisme, vous pourrez mettre l'argent dans les boîtes désignées.

11.Participation volontaire et droit de se retirer

Votre participation à l'étude est entièrement volontaire. Vous pourrez refuser de prendre part à l'étude ou vous en retirer à tout moment et ce, sans justifier votre décision. Si vous vous retirez de l'étude, les données déjà recueillies à votre sujet ne seront utilisées qu'à des fins de vérification (situations où le comité d'éthique souhaite vérifier les procédures de l'étude), mais ne seront utilisées lors d'aucune analyse future.

12.Coordonnées

Si vous avez des questions au sujet du projet de recherche ou si vous éprouvez un problème que vous croyez lié à votre participation au projet de recherche, vous pouvez communiquer avec les chercheurs principaux :

Dr Joseph Cox (514-528-2400, poste 3630) Dr Gilles Lambert (514-528-2400, poste 3802)

Pour toute question se rapportant à vos droits en tant que participant à la recherche, tout commentaire ou toute plainte, vous pourrez communiquer avec le Bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité du CUSM.

Courriel : ombudsman@muhc.mcgill.ca
Téléphone : 514-934-1934, poste 35655

13. Surveillance des aspects éthiques du projet de recherche

Le comité d'éthique de la recherche du CUSM a approuvé ce projet de recherche et est responsable de la surveillance du projet. Tout changement ou amendement apporté au protocole de recherche ou au formulaire d'information et de consentement devra être approuvé au préalable par le comité d'éthique du CUSM.

CONSENTEMENT

I. Déclaration de consentement du participant

J'ai examiné tous les renseignements et le formulaire de consentement. Je reconnais que l'étude m'a été expliquée, que l'on a répondu à mes questions à ma satisfaction et que l'on m'a accordé suffisamment de temps pour prendre une décision.

- ☐ J'accepte de participer à cette étude conformément aux conditions stipulées ci-dessus.

II. Invitation optionnelle à participer à d'autres études liées à Engage

Je reconnais que cet aspect optionnel de l'étude m'a été expliqué, que l'on a répondu à mes questions à ma satisfaction et que l'on m'a accordé suffisamment de temps pour prendre une décision.

- ☐ Je voudrais recevoir des nouvelles concernant la participation à d'autres études liées à Engage.
- ☐ Je ne veux pas recevoir de nouvelles concernant la participation à d'autres études liées à Engage.

Code identifiant du participant

Signature du participant

Date



FORMULAIRE D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

PARTICIPANTS DE PLUS QUE 30 ANS

Centre universitaire
de santé McGill
Institut de recherche



McGill University
Health Centre
Research Institute

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal

Québec



Titre de l'étude :	Enquête Engage Montréal
Chercheurs principaux :	Joseph Cox Médecin, professeur agrégé Direction régionale de santé publique du CIUSSS-CSIM Institut de recherche du CUSM, site Glen Université McGill Téléphone : 514-528-2400, poste 3630 Gilles Lambert Médecin Direction régionale de santé publique du CIUSSS-CSIM Institut national de santé publique du Québec Téléphone : 514-528-2400, poste 3630
Co-chercheurs :	Martin Blais, UQAM Eric Latimer, Université McGill Bertrand Lebouché, Centre universitaire de santé McGill Ken Monteith, COCQ-SIDA Joanne Otis, UQAM Bouchra Sehrir, Laboratoire de santé publique du Québec Cécile Tremblay, Université de Montréal
Bailleurs de fonds :	Instituts de recherche en santé du Canada (numéros de référence

107544, 143342, 146056)

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

14. Préambule

Nous vous invitons à participer à ce projet de recherche parce que vous vous identifiez comme un homme, avez 16 ans ou plus, avez eu des relations sexuelles avec d'autres hommes au cours des six derniers mois, vivez à Montréal ou dans les environs et êtes capable de comprendre et de répondre à un questionnaire écrit en français ou en anglais. Avant d'accepter de participer à ce projet et de signer le formulaire d'information et de consentement, veuillez prendre le temps de lire, de comprendre et d'examiner avec soin les renseignements suivants.

Il est possible que ce formulaire contienne des mots que vous ne comprenez pas. Nous vous encourageons à poser toute question au personnel de l'étude et à lui demander de vous expliquer n'importe quel mot ou renseignement qui ne vous est pas clair.

15. Nature et objectif du projet de recherche

Les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (gbHARSAH) courent des risques élevés de contracter le VIH et d'autres infections transmissibles sexuellement (ITS). Malgré les progrès importants de la thérapie antirétrovirale suivi d'une baisse des taux de morbidité et de mortalité parmi les personnes infectées par le VIH, et malgré les efforts de prévention visant la réduction des nouvelles infections par le VIH, à chaque année, le nombre de nouvelles infections par le VIH demeure relativement stable parmi les hommes gbHARSAH, et le nombre de nouvelles ITS est à la hausse.

Nous souhaitons en apprendre plus sur comment les hommes gbHARSAH vivant dans la grande région de Montréal répondent aux changements dans l'épidémie de VIH à mesure que l'accès au traitement du VIH augmente. Nous souhaitons aussi en apprendre plus sur les attitudes, les croyances et les comportements actuels en ce qui concerne la santé sexuelle, la santé mentale et la consommation de drogues récréatives. Nous nous intéressons également à savoir comment les progrès récents du traitement et de la prévention du VIH au Québec influencent les façons dont les hommes gbHARSAH choisissent de vivre, d'aimer et de s'amuser.

Pour ce projet de recherche, nous comptons recruter 1 000 hommes gbHARSAH âgés de 16 ans ou plus. Pour le recrutement, chaque participant invitera un maximum de 6 personnes qu'il connaît bien à participer. En même temps, des hommes gbHARSAH s'inscriront à des études semblables se déroulant à Toronto et à Vancouver. Ces études constituent le travail d'une équipe de recherche nationale portant le nom d'« Engage ».

16. Procédures de l'étude

16.1. Prise de contact initiale et processus de consentement

Nous examinerons avec vous les critères d'inclusion et d'exclusion de ce projet de recherche afin de déterminer votre admissibilité. Nous expliquerons aussi les procédures de l'étude et répondrons à toutes vos questions. Nous vous demanderons

ensuite de confirmer votre participation en indiquant votre consentement à la fin de ce formulaire Web.

Ensuite, nous vous donnerons un code de participant et nous vous demanderons de remplir un bref formulaire afin de recueillir quelques renseignements personnels. Nous vous demanderons de fournir votre nom, votre sexe, votre date de naissance et votre code postal. Si vous préférez ne pas donner votre nom ou code postal, vous aurez le droit de refuser. Nous vous demanderons aussi un numéro de téléphone ou une adresse courriel ou postale pour permettre à l'équipe de recherche de vous contacter.

Vos coordonnées pourraient être utilisées dans 3 situations : 1) pour vous informer des résultats de vos tests; 2) pour vous conseiller et soutenir dans le recrutement de participants parmi les gens que vous connaissez; et 3) pour vous aviser lorsque les personnes que vous avez recrutées ont terminé leur visite au site de l'étude pour que vous puissiez recevoir votre compensation.

16.2. Visite au site de l'étude

Si vous acceptez de participer à cette étude de recherche, nous vous demanderons de remplir un questionnaire par ordinateur. Le questionnaire nécessitera un maximum de 90 minutes et vous le remplirez seul. Le questionnaire se rapportera à la période de six mois précédant immédiatement votre participation à l'étude. Les questions aborderont plusieurs sujets : facteurs sociodémographiques (p. ex., ethnicité, niveau d'éducation, etc.); votre participation à diverses activités communautaires; aspects de la santé mentale; vos activités sexuelles avec vos partenaires récents; consommation de drogues; et vos expériences de discrimination et de traumatismes physiques. Le questionnaire vous interrogera aussi sur vos attitudes et croyances concernant les risques de VIH; les normes sexuelles dans vos cercles sociaux; et vos sentiments à l'égard des risques et des responsabilités liés au VIH et aux autres ITS. Si une question vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. De plus, si vous ne comprenez pas une question, vous pourrez demander de l'aide au personnel de l'étude.

Si vous consentez à participer, un infirmier d'expérience prélèvera 5 petits tubes de sang et les fera tester pour le VIH, l'hépatite C, l'hépatite B et la syphilis. Ce nombre de tubes correspond à ce qui se fait normalement lors d'un dépistage d'ITS complet en clinique. L'infirmier vous expliquera aussi comment prélever vous-même un échantillon d'urine, un rinçage buccal et des échantillons de frottis de la gorge et du rectum pour les faire tester pour la gonorrhée et la chlamydia. Pour les personnes séropositives, 3 tubes de sang supplémentaires seront prélevés pour mesurer la charge virale en VIH et le compte de cellules CD4 (cellules immunitaires auxiliaires T); pour les personnes avec un résultat positif au dépistage de l'hépatite C, nous préleverons un tube de sang supplémentaire pour effectuer des tests pour détecter la présence de particules virales dans le sang. Les échantillons positifs pour la chlamydia seront analysés pour déterminer s'il s'agit de la souche à l'origine des infections à LGV. Si vous désirez connaître votre statut VIH lors de votre visite, nous pourrions effectuer un test de dépistage rapide gratuit. Les résultats de vos autres tests vous seront communiqués dans les deux semaines suivant votre visite. Si vous le désirez, vous pourrez obtenir des copies de vos résultats afin de les montrer à votre médecin.

Une fois les procédures ci-dessus terminées, vous recevrez des coupons afin de recruter des participants parmi les gens que vous connaissez, ainsi que des instructions détaillées sur la manière de les donner de façon confidentielle à vos amis et connaissances admissibles. Si vous êtes recruté vous-même vers la fin de l'étude, il est possible que vous ne receviez aucun coupon. Ce mécanisme nous permettra de ralentir et de mettre fin au recrutement.

En tout, la visite au site de l'étude devrait durer environ 2 heures et demie.

17. Consentement à être contacté pour participer à d'autres études liées à Engage

Cette étude fait partie de plusieurs activités de recherche prévues par l'équipe Engage au cours des 4 prochaines années. Par exemple, nous prévoyons lancer une étude qualitative pour en savoir plus sur des sujets spécifiques comme les expériences vécues pour accéder et utiliser des services de prévention et de soins du VIH et des ITS. L'équipe participera aussi à l'évaluation d'interventions visant la prévention du VIH.

À la fin du présent formulaire de consentement, nous vous demanderons d'indiquer si vous acceptez que l'équipe de recherche utilise vos coordonnées pour vous inviter à participer à des études futures liées à Engage. Si vous acceptez, sachez que vous ne donnez PAS votre consentement à participer aux études en question. Si nous vous contactons, nous vous demanderons de fournir un consentement distinct avant de participer.

18. Bienfaits possibles

Nous vous proposerons un test de dépistage rapide du VIH gratuit dont le résultat vous sera communiqué immédiatement. Vous aurez un dépistage complet pour la détection du VIH et autres ITS qui sont fréquentes parmi les hommes gbHARSAH. Vous recevrez aussi un counseling sur le dépistage du VIH et des ITS de la part du personnel formé. Vos réponses aux questions portant sur vos pratiques sexuelles pourraient stimuler une réflexion personnelle positive. De plus, les participants à des études semblables ont fait état d'un sentiment de gratification découlant de leur contribution à l'avancement de ce genre de recherche. Nous nous attendons à ce que les résultats de cette étude aient des bienfaits pour les hommes gbHARSAH de la grande région de Montréal, de même qu'à travers le Québec et le Canada.

19. Risques associés au projet de recherche

Certaines questions porteront sur des sujets liés à la sexualité, à la consommation de drogues et à la violence. Il est possible que vous ressentiez un inconfort au moment de répondre à ces questions.

Les complications possibles des prises de sang peuvent inclure des ecchymoses légères, de l'irritation, de la rougeur, des saignements légers et/ou de l'enflure à l'endroit où le sang est prélevé. Si vous ignorez que vous avez une infection transmissible sexuellement, apprendre que vous en avez une pourrait causer un choc émotionnel. Si c'est nécessaire ou que vous le demandez, nous pourrions vous dire où vous pouvez obtenir du soutien approprié en plus de vous orienter vers des soins

et des traitements.

20.Droits légaux

Si vous acceptez de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncerez à aucun de vos droits légaux et ne déchargerez pas les chercheurs, les bailleurs de fonds ou l'institut de leurs responsabilités civiles et professionnelles.

21.Confidentialité

Lorsque nous partagerons de l'information avec vous, nous confirmerons votre identité en vérifiant les réponses à deux questions de votre choix auxquelles vous aurez répondu précédemment. Votre code de participant sera utilisé en tout temps, à l'exception des situations décrites ci-dessus. La clé permettant de lier votre code de participant à votre nom sera conservée dans une base de données protégée par un mot de passe et ne sera accessible qu'au personnel autorisé de l'étude. Seules les informations nécessaires pour répondre aux objectifs de l'étude seront recueillies.

21.1. Stockage de l'information et période de rétention

Le site de l'étude se trouve au 1223-A, rue Amherst, à Montréal. L'information sera recueillie de façon électronique, à l'exception des résultats des tests, lesquels seront envoyés par le laboratoire en format papier. Les documents en format papier seront conservés de façon sécuritaire à ce site dans un classeur verrouillé. Après la fin de l'étude, les copies papier des résultats de laboratoire seront conservées de façon sécuritaire pendant 7 ans au bureau de coordination de l'étude à la Direction régionale de santé publique du CIUSSS-CSIM, situé au 1301, rue Sherbrooke Est, Montréal. Les données recueillies par questionnaire électronique seront conservées temporairement sur l'ordinateur que vous utiliserez pour remplir le questionnaire jusqu'à ce qu'il soit terminé. Une fois le questionnaire rempli, les données seront encryptées et envoyées de façon sécuritaire via un réseau privé vers un serveur sécurisé situé au Centre d'excellence sur le VIH/sida de la Colombie-Britannique (BCCfE). Les renseignements personnels et les résultats de laboratoire seront également saisis dans le serveur sécurisé. Le serveur se situe dans un secteur sécurisé du BCCfE qui n'est accessible qu'au personnel des technologies de l'information autorisé. À la fin de la période de conservation de 7 ans, les copies papier des résultats de laboratoire seront déchiquetées, mais les données électroniques seront conservées.

21.2. Partage des données

Les chercheurs de l'étude Engage Montréal prévoient utiliser les données que nous recueillerons pour contribuer à l'étude nationale sur la santé des hommes gbHARSAH qui se déroulera simultanément à Toronto et à Vancouver. Pour cette raison, votre questionnaire et vos données de laboratoire seront inclus dans une base de données plus grande et contribueront à approfondir notre compréhension de la santé sexuelle des hommes gbHARSAH d'un bout à l'autre du Canada. Vos renseignements personnels ne seront pas partagés avec les autres équipes.

21.3. Divulgations de renseignements exigées par la loi

Vos renseignements personnels et toute information susceptible de révéler votre identité seront protégés dans les limites de la loi. Vos échantillons biologiques destinés au dépistage du VIH et des ITS seront envoyés aux laboratoires du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, accompagnés des renseignements personnels suivants : prénom, nom de famille, sexe, date de naissance et code postal ou encore avec votre code de participant, votre sexe et votre date de naissance si vous demandez que votre nom et votre code postal ne soient pas utilisés lors des dépistages.

Comme le VIH et les ITS sont toutes des infections à déclaration obligatoire, tous les nouveaux résultats positifs devront être signalés aux autorités de la santé publique avec des renseignements identifiants (nom, sexe, date de naissance et code postal). Si vous décidez de ne pas donner vos nom et code postal, votre code de participant sera utilisé à la place.

Pour des raisons d'éthique et de conformité avec l'étude, il est possible que vos renseignements soient examinés par une personne mandatée par le comité d'éthique de la recherche du CUSM, l'Institut de recherche du CUSM ou les Instituts de recherche en santé du Canada. Ces individus et organismes ont accepté de respecter une politique de confidentialité. En signant le présent document, vous consentez à donner à ces personnes l'accès à vos renseignements personnels et aux données recueillies vous concernant.

Vos renseignements personnels ne seront révélés en aucun autre cas sans votre consentement exprès, à moins que ce soit exigé par des autorités judiciaires; à titre d'exemple, notons que nous pourrions être obligés de fournir, si une ordonnance de la cour l'exigeait, de l'information sur le non-dévoilement à un partenaire sexuel de la séropositivité au VIH.

22. Dissémination des résultats de la recherche

Des mises à jour et des rapports en langage clair et simple (c.-à.-d. en langage non technique) seront affichés sur la page Web de l'étude à l'adresse www.engage-hommes.ca. Des résultats seront également présentés lors de conférences scientifiques et dans des revues scientifiques. Nous travaillerons aussi avec divers organismes communautaires pour disséminer les résultats de la recherche en langage clair et simple et en formats accessibles.

Aucun renseignement susceptible de révéler l'identité d'un individu ne sera utilisé dans ces mises à jour, rapports, présentations ou articles de revues.

23. Compensation

Afin de reconnaître votre contribution précieuse à l'étude et de compenser les coûts découlant de tout inconfort ou de toute perte de revenu, nous vous offrirons 50 \$ en échange de votre participation à cette étude.

Vous pourrez accepter votre compensation de 2 façons différentes :

3. Recevoir 50 \$ en argent comptant

OU

4. Recevoir 5 billets (valeur de 10 \$ chaque) valides pour 2 tirages différents :

- o **Tirage 1 : carte de crédit prépayée d'une valeur de 250 \$**
 - Chaque billet a au moins une chance sur 25 de gagner
 - Si vous dépensez la totalité des 50 \$ en billets pour ce tirage, vous aurez au moins une chance sur 5 de gagner
- o **Tirage 2 : coupon de voyage d'une valeur de 2 000 \$**
 - Chaque billet a au moins une chance sur 200 de gagner
 - Si vous dépensez la totalité des 50 \$ en billets pour ce tirage, vous aurez au moins une chance sur 50 de gagner

Vous pourrez choisir n'importe quelle combinaison des options ci-dessus (par exemple, 20 \$ en argent comptant et 30 \$ en billets pour l'un ou l'autre des tirages). Le personnel de l'étude vous demandera comment vous souhaitez diviser votre compensation et vous donnera l'argent comptant/billets de tirage correspondants à la fin de votre visite au site de l'étude.

De plus, vous recevrez 15 \$ pour chaque participant additionnel admissible (maximum de 6) qui se présente au site de l'étude pour y participer. Ce montant additionnel est destiné à vous compenser pour le temps passé à recruter des gens au sein de votre réseau social. Nous communiquerons avec vous lorsque la personne ou les personnes que vous aurez recrutées auront visité le site de l'étude, afin que vous puissiez recevoir la compensation additionnelle. La compensation que vous mériterez en recrutant des pairs pourra être dispensée sous forme de billets additionnels pour les tirages décrits ci-dessus.

Si vous souhaitez offrir votre compensation en don à un organisme, vous pourrez mettre l'argent dans les boîtes désignées.

24.Participation volontaire et droit de se retirer

Votre participation à l'étude est entièrement volontaire. Vous pourrez refuser de prendre part à l'étude ou vous en retirer à tout moment et ce, sans justifier votre décision. Si vous vous retirez de l'étude, les données déjà recueillies à votre sujet ne seront utilisées qu'à des fins de vérification (situations où le comité d'éthique souhaite vérifier les procédures de l'étude), mais ne seront utilisées lors d'aucune analyse future.

25.Coordonnées

Si vous avez des questions au sujet du projet de recherche ou si vous éprouvez un problème que vous croyez lié à votre participation au projet de recherche, vous pouvez communiquer avec les chercheurs principaux :

Dr Joseph Cox (514-528-2400, poste 3630)
poste 3802)

Dr Gilles Lambert (514-528-2400,

Pour toute question se rapportant à vos droits en tant que participant à la recherche, tout commentaire ou toute plainte, vous pourrez communiquer avec le Bureau de la commissaire aux plaintes et à la qualité du CUSM.

Courriel : ombudsman@muhc.mcgill.ca
Téléphone : 514-934-1934, poste 35655

26. Surveillance des aspects éthiques du projet de recherche

Le comité d'éthique de la recherche du CUSM a approuvé ce projet de recherche et est responsable de la surveillance du projet. Tout changement ou amendement apporté au protocole de recherche ou au formulaire d'information et de consentement devra être approuvé au préalable par le comité d'éthique du CUSM.

CONSENTEMENT

I. Déclaration de consentement du participant

J'ai examiné tous les renseignements et le formulaire de consentement. Je reconnais que l'étude m'a été expliquée, que l'on a répondu à mes questions à ma satisfaction et que l'on m'a accordé suffisamment de temps pour prendre une décision.

- ☐ J'accepte de participer à cette étude conformément aux conditions stipulées ci-dessus.

II. Invitation optionnelle à participer à d'autres études liées à Engage

Je reconnais que cet aspect optionnel de l'étude m'a été expliqué, que l'on a répondu à mes questions à ma satisfaction et que l'on m'a accordé suffisamment de temps pour prendre une décision.

- ☐ Je voudrais recevoir des nouvelles concernant la participation à d'autres études liées à Engage.
- ☐ Je ne veux pas recevoir de nouvelles concernant la participation à d'autres études liées à Engage.

Code identifiant du participant

Signature du participant

Date

VII. SYNTHÈSE DES DIMENSIONS DU QUESTIONNAIRE



ENGAGE MONTRÉAL – Dimensions couverts par le questionnaire Cycle 1

Section 1 & 2 : Données RDS et démographiques

- Raison de participation, Nombre de gbHARSAH dans leur entourage
- Age, Ethnicité(s), Pays d'origine, statut d'immigration, langue(s) parlés
- Genre, orientation sexuelle, niveau d'attraction vers les hommes & femmes, statut trans
- État civil, partenaire principale, ouverture de relation avec ce partenaire principal
- Niveau de scolarité, niveau de revenu, situation financière, couverture d'assurance, situation résidentielle

Section 3 : Accès aux services

- **Statut sérologique au VIH**, Évaluation de sa santé physique en général
- **Accès à un médecin de famille**, ouverture avec son médecin du fait qu'il est HARSAH, consulte-t'il un médecin différent pour ses besoins de santé en lien avec la santé sexuelle?
- **Accès aux services médicaux spécifiques aux personnes trans**, état de transition
- **Accès aux vaccinations** (incluant le vaccin VPH)
- Santé des organes génitaux
- **Antécédent de dépistage ITSS**, antécédent de diagnostic ITSS, détail sur le traitement, Notification des partenaires (quelle proportion, comment, qui a fait le contact)
- **Accès aux sources d'information sur la santé sexuelle** (professionnels de la santé, organismes communautaires, médias), détail sur les sujets abordés, exposition aux campagnes de prévention
- Connaissances et opinions en lien avec le traitement comme outil de prévention (TasP)
- **Accès et utilisation du matériel de prévention ITSS** (condoms, lubrifiants, gants), évaluation de qualité + quantité des condoms + lubrifiants
- **Accès à la PPE** + détails sur les barrières d'accès, antécédents de PPE, détails sur sa dernière PPE (source, adhérence, cout, peut demander des questions au médecin prescrivait)
- **Accès à la PrEP** + détails sur les barrières d'accès, intérêt à prendre la PrEP, antécédents de PrEP, détails sur sa dernière PrEP (source, continuels vs sur demande, adhérence, cout, peut demander des questions au médecin prescrivait, satisfaction)
- **Accès aux dépistage du VIH** + détails sur les barrières d'accès, antécédents de dépistage VIH, évaluation de l'expérience la plus récente de dépistage
- **Accès aux soins spécifiques aux personnes séropositives au VIH**, délai entre diagnostic et suivi médical, recours aux médecins spécialisés en VIH, évaluation de la dernière interaction avec son médecin traitant VIH, accès aux médicaments anti-VIH + détail en lien avec la prise de médicaments, charge virale perçue

Section 4 : Relations avec communauté et contexte social

- **Liens avec communauté HARASH** : Fréquentation des bars gais, consommation de médias gais, proportion de son entourage sont HARSAH, Ouverture de son statut HARSAH
- **Utilisation des applications de rencontres gais**, détail sur les applications de rencontres utilisés et les détails qu'ils mettent sur leur profil
- **Échelles** :
 - o *Harcèlement hétérosexiste*
 - o *Rejet et discrimination*
 - o *Discrimination quotidienne*
 - o *Microaggressions vécues par les HARSAH de couleur*
 - o *Soutien social*

Section 5 : Comportements connaissances et attitudes sexuelles

- Appartenance aux **sous-communautés HARSAH**
- **Comportements sexuels avec des hommes (cis et trans) et les femmes (cis et trans), à vie et dans les derniers 6 mois**, incluant le nombre de partenaires, leur statut sérologique, et la pratique des activités sexuelles précises
- **Sérotriage**, communication en matière de santé sexuelle et comportements en lien avec le dévoilement du statut sérologique
- **Stratégies de réduction des risques adoptés** dans les derniers 6 mois
- **Relations sexuelles en échange** d'argent, de drogues et/ou d'autres biens
- **Sexe en groupe**, sex-parties, **PnP/Chemsex** (à vie)
- **Violence** entre partenaires intimes & **relations sexuelles non-voulues** (à vie)
- **Détails des relations sexuelles avec les derniers 5 partenaires au cours des derniers 6 mois**
 - o Date de la première et dernière relation sexuelle avec ce partenaire, nombre de relations sexuelles avec ce partenaire, comment ils se sont rencontrés et lieu de la rencontre, typologie de la relation de ce partenaire
 - o Ethnicité du partenaire
 - o Activités sexuelles avec ce partenaire (activité + avec condom? avec lubrifiant?), difficultés vécues en lien avec le condom et les troubles d'érection
 - o Consommation de substances dans le contexte de la dernière relation sexuelle, échange d'argent/drogues
 - o Statut sérologique du partenaire
 - o Utilisation de PrEP & utilisation de PPE avant/après la relation avec ce partenaire
 - o Attentes sexuelles avec ce partenaire
- **Santé sexuelle** (évaluation générale)
- Préférences sexuelles en lien avec le **positionnement**
- **Risque perçue de transmission/acquisition du VIH**
- **Échelles** :
 - o *Efficacité personnelle à utiliser le condom*
 - o *Satisfaction sexuelle*
 - o *Perception du traitement anti-VIH (« HAART Optimism Scale »)*
 - o *Compulsivité sexuelle*
 - o *Obstacles à l'utilisation du condom*

Section 6 – Caractéristiques Individuelles

- **Modes d'administration de substances et partage de matériel** (d'injection et en lien avec reniflement)
- Utilisation des services de **réduction des méfaits**
- **Tendances suicidaires** et d'automutilation, **Traumatismes** subis pendant l'enfance
- **Évaluation générale de santé mentale**, antécédents de **diagnostic des troubles de santé mentale**, **accès aux services de santé mentale**, fréquence de consultation avec les professionnels de santé mentale, détails de leur dernière consultation avec ce professionnel de santé mentale
- **Échelles :**
 - o *Consommation de drogues & alcool (échelles AUDIT/DUDIT, fréquence de consommation)*
 - o *Conséquences de la consommation de drogues et d'alcool sur les comportements sexuels*
 - o *Attitudes face à leur corps & normes de masculinité*
 - o *Mesures d'anxiété et dépression*
 - o *D'identité gai et bisexuelle*
 - o *Capacité à surmonter les épreuves*

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal

Québec 

