

Le Kakawi

Volume 30, numéro 1


Septembre 2009



Guiraca bleu, Jacques Larivée

Publié par le Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent, inc.
Case postale 66, Rimouski, (Québec), G5L 7B7

**CONTIENT LES FAITS SAILLANTS DU PRINTEMPS 2009
ET LE COMPTE RENDU DES OBSERVATIONS DU PRINTEMPS 2008**




**Le COBSL a 30 ans
et les fêtera joyeusement !**

**Un vin d'honneur et des bouchées aux saveurs
du Bas-Saint-Laurent vous seront servis
le samedi 24 octobre, de 17 h à 19 h,
au Pavillon multifonctionnel de Pointe-au-Père.**

**Réservez vite votre place
en remplissant le coupon-réponse
que vous avez reçu par la poste au début du mois.**

**Nous comptons sur votre présence
pour le succès de cette fête !**



LE KAKAWI

Vol. 30, no 1

Septembre 2009

Le Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent inc. est un organisme sans but lucratif fondé en 1979. Ses principaux objectifs sont de faire connaître les oiseaux et de contribuer à leur conservation. Plusieurs activités sont organisées au gré des saisons sur tout le territoire bas-laurentien.

Les administrateurs et administratrices pour l'année financière 2009 sont :

<i>Jacques Larivée,</i>	<i>président</i>
<i>Claire Douville,</i>	<i>vice-présidente</i>
<i>Louise Lefebvre,</i>	<i>trésorière</i>
<i>Jean-Maurice Turgeon,</i>	<i>secrétaire</i>
<i>Rita Saint-Laurent,</i>	<i>directrice</i>
<i>Réal Bélanger,</i>	<i>directeur</i>
<i>Jean-Pierre le Bel,</i>	<i>directeur</i>
<i>Jean Veillette,</i>	<i>directeur</i>

Le Kakawi est réalisé par plusieurs bénévoles, les voici :

Édition : Jean-Pierre le Bel

Mise en page : Christian Charest

Production du compte rendu saisonnier : Jacques Larivée

Saisies des feuillets : Robert Lebrun
Rita Saint-Laurent

Articles et chroniques : Marco Beaulieu
Jacques Deschênes
Claire Douville
Julie Gasse
Ronald Lang
Jean-Pierre le Bel
Serge Rhéaume
Rita Saint-Laurent
Jean-Maurice Turgeon

Correction du texte : Claire Douville
Chantal Gagné
Julie Gasse
Jacques Larivée
Louise Lefebvre

Expédition : Jean Veillette



Mésange à tête noire partiellement albinos - Dominique Berteaux

[Crédit photo de la première page](#)

[Nouveaux membres](#)

[Sommaire](#)



COBSL, Case postale 66, Rimouski (Québec) G5L 7B7

cobsl@globetrotter.net

Réseau Info-Oiseaux : parulaine@yahoo.ca

www.libertel.org/cobsl

<http://fr.groups.yahoo.com/group/COBSL/>

Au sommaire

<u>Le mot du président</u>	5
<u>Le mot de l'éditeur</u>	6
<u>Faits saillants du printemps 2009</u>	7
<u>Décompte aux mangeoires, Hiver 2008-2009</u>	10
<u>Les canards à Pointe-au-Père</u>	11
<u>La faune ailée du marais de Gros-Cacouna et de ses environs</u>	12
<u>Les oiseaux de proie à Sainte-Félicité de Matane</u>	13
<u>Les parulines dans la vallée de la Matapédia</u>	14
<u>Sortie en canot sur la rivière Sud-Ouest</u>	15
<u>Le T'huit T'huit 2009</u>	16
<u>Fin de semaine à l'île aux Basques, Printemps 2009</u>	16
<u>Une journée à l'île aux Lièvres</u>	17
<u>Un petit jeu-questionnaire sur les noms français des oiseaux</u>	18
<u>Mes débuts ornithologiques, Ronald Lang</u>	19
<u>Compte rendu des observations du printemps 2008</u>	23
<u><i>Eider à duvet</i></u>	28
<u><i>Aigle royal</i></u>	33
<u><i>Phalarope de Wilson</i></u>	38
<u><i>Moqueur polyglotte</i></u>	43
<u><i>Sturnelle des prés</i></u>	48
<u><i>Liste des observatrices et des observateurs</i></u>	51
<u>Les belles plumes du COBSL</u>	54
<u>Le ti mot que j'm ou l'étymo 101</u>	57
<u>Plongeon huard en détresse</u>	58
<u>Un petit jeu-questionnaire sur les noms des oiseaux (suite)</u>	59
<u>Changements taxonomiques à la liste de l'American Ornithologists' Union</u>	60
<u>Programme de marquage de Goélands à bec cerclé dans la région de Montréal</u>	60
<u>Découverte d'une nouvelle espèce d'oiseau, le Bulbul chauve</u>	62
<u>Activités scolaires</u>	63
<u>Des feuillets S.V.P.</u>	64
<u>Portfolio de M. Ronald Lang</u>	65

Mot du président

Les résultats d'une recherche récente de Benoît Laliberté, étudiant à la maîtrise, dans le cadre du projet « Changement climatique et biodiversité » dirigé par le professeur Dominique Berteaux de l'UQAR, montrent que la date moyenne de départ automnal de 41 espèces d'oiseaux migrateurs du Québec a reculé de près d'un mois entre 1975 et 2005. Ce constat, obtenu en utilisant les observations des observatrices et des observateurs d'oiseaux du Québec, illustre éloquemment un des effets du changement du climat sur la vie des oiseaux. Chaque ornithologue, perché sur son grain de sable, arrive à percevoir des variations qui affectent le cycle annuel des oiseaux qu'il observe, mais la mise en commun de millions d'observations élargit la base de la pyramide au sommet de laquelle la lentille de la démarche scientifique peut capter des changements globaux impossibles à représenter autrement. L'observation des oiseaux est un loisir, mais constitue aussi une admirable manifestation de la science citoyenne.

Le COBSL à 30 ans cette année et nous profiterons de cet anniversaire pour souligner la contribution originale d'une observatrice membre du club depuis de nombreuses années. Vous avez reçu récemment une invitation à participer à une rencontre le 24 octobre prochain. Je vous invite sincèrement à accepter cette invitation, car l'observation des oiseaux n'est pas qu'un loisir scientifique, mais une activité humaine qui favorise la création de liens amicaux par le partage d'expériences personnelles mémorisées sur des canevas de perceptions sensorielles aussi agréables que variées.

C'est maintenant certain, le Québec ornithologique entreprendra au printemps 2010 son plus important projet collectif de la décennie. Il s'agit de produire un deuxième Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Le biologiste Pierre Fradette, membre du COBSL et ancien président du conseil d'administration, coordonnera la réalisation régionale des activités devant mener à la publication d'un portrait actualisé des oiseaux nicheurs.

Enfin, chaque membre sera invité à participer à la prochaine assemblée générale annuelle du COBSL qui aura lieu le 14 novembre prochain. Je vous incite à réserver à votre agenda une partie de ce samedi après-midi et à venir discuter avec nous du présent et de l'avenir du COBSL.

Beaux oiseaux d'automne,

Jacques Larivée
Président

[Retour](#)

Mot de l'éditeur

Nous vous présentons le premier numéro du volume 30 qui contient le compte rendu saisonnier du printemps 2008 ainsi que les faits saillants du printemps 2009.

Ce numéro présente le sommaire des diverses activités réalisées au cours des derniers mois ainsi que les résultats du décompte aux mangeoires de l'hiver 2008-2009. Une nouvelle chronique concernant l'étymologie vous est aussi présentée. Elle porte à notre connaissance, et ce, avec un certain humour, l'origine des noms d'oiseaux. Nous vous encourageons à nous suggérer des noms d'oiseaux pour les prochains numéros du Kakawi.

Un jeu-questionnaire nous rappelle aussi les modifications majeures qui ont eu cours dans la dénomination des d'oiseaux depuis le début du XX^e siècle. Nous complétons ce numéro par des articles informatifs qui traitent d'observations et de recherches réalisées sur les oiseaux. Une recherche sur le Goéland à bec cerclé nous amènera d'ailleurs à porter une plus grande attention à l'observation de ce laridé.

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, suggestions et sujets que vous aimeriez voir traités. Le Kakawi est votre revue, ainsi nous demeurons à votre écoute pour traiter tout sujet pour lequel vous aimeriez avoir des informations.

Bonne lecture.

Jean-Pierre le Bel

cobsl@globetrotter.net

[Retour](#)

Faits saillants du printemps 2009

Préparé par Rita Saint-Laurent et Claire Douville

Oie rieuse

Le 12 avril, un individu a été aperçu à l'embouchure de la rivière Rimouski (C. Douville et M. Bernier).

Bernache de Hutchins

Le 19 avril, cette petite bernache a été observée à Amqui (R. Lang).

Canard siffleur

Ce visiteur rare a été observé le 27 avril au Marais de Pointe-au-Père (G. Proulx, R. et L. Saint-Laurent).

Sarcelle d'hiver (sous-espèce d'Eurasie)

Le 30 avril, au Sentier du Littoral à Rimouski, l'on a observé un individu (G. Gendron).

Fuligule à tête rouge

Aux étangs d'épuration de Rimouski-Est, ce beau canard a été vu à 2 reprises, le 16 et le 18 mai (J. P. le Bel).

Arlequin plongeur

Une seule mention pour cette espèce, le 5 mai à Matane (L. Fradette).

Garrot d'Islande

À Saint-Fabien-sur-Mer, ce garrot a été observé le 3 mars (A. Lévesque) et le 26 mars (D. Desjardins). Le 27 mars, 198 individus ont été dénombrés à Sainte-Flavie (J.P. le Bel).

Érismature rousse

Dans le secteur de la rivière des Vases dans la municipalité de L'Isle-Verte, ce canard a été vu du 8 mai (S. Rhéaume) et jusqu'au 22 mai, plusieurs observateurs ont mentionné sa présence.

Perdrix grise

À Sainte-Luce, un oiseau a été observé du 8 au 16 mars (L. Lefebvre) (R. et L. Saint-Laurent). Le 10 mai, à Rivière-du-Loup, 20 individus ont été signalés (G. Verreault).

Plongeon du Pacifique

Cette rare observation a été faite le 30 mai au large de Sainte-Félicité (J. Deschènes).

Grèbe esclavon

Un oiseau de cette espèce a été observé à Sainte-Luce (D. Ruest et autres) et à l'Anse aux bécasseaux à Pointe-au-Père, le 18 mai (R. et L. Saint-Laurent et R. Pelletier).

Héron vert

Ce héron a été vu le 15 mai dans le Sentier du Littoral à Rimouski (G. Proulx) et le 16 mai aux étangs d'épuration de Rimouski-Est (J.P. le Bel).

Buse à épaulettes

Le 23 mai à l'Île Verte, cette buse a été observée par les membres du Club ornithologique de Longueuil (Y. Gauthier).

Faucon pèlerin

Au Cégep de Rimouski, plusieurs observateurs ont signalé sa présence du 19 mars (J. Gasse) au 24 mai. Il a aussi été vu à Cacouna le 24 mars (M. Beaulieu). Le 23 mai, un couple a été observé à Cacouna (Y. Gauthier, COL).

Grue du Canada

3 mentions de cet oiseau en vol ont été rapportées : à Saint-Fabien, le 4 mai (L. Brisson) et le 8 mai (D. Desjardins), à Sainte-Félicité le 11 mai (J. Deschènes).

Foulque d'Amérique

Le 7 mai, à Pointe-au-Père, une foulque a été observée (G. Proulx).

Barge hudsonienne

Ce bel échassier a été observé à Pointe-au-Père, le 10 mai (R. Pelletier), à Rimouski-Est, le 24 mai (R. Saint-Laurent) et à l'embouchure de la rivière Germain-Roy à Rimouski-Est, par plusieurs observateurs du 24 au 27 mai.

Barge marbrée

3 mentions ont été rapportées : le 4 mai à Sainte-Luce (L. et R. Claveau et autres), le 6 mai à Rimouski (J.-M. Turgeon) et à Cacouna le 23 mai (Y. Gauthier, COL).

Bécasseau maubèche

À l'île Verte, le 23 mai, on a observé un groupe de 10 bécasseaux (Y. Gauthier, COL). Le 26 mai, un individu a été vu à Pointe-au-Père (J. Larivée).

Phalarope de Wilson

Le 21 mai, ce phalarope a été observé à Sainte-Félicité (J. Deschènes).

Petit pingouin

Plusieurs observateurs ont vu des Petits Pingouins à partir du 3 avril à Les Boules (J.P. le Bel) jusqu'au 23 mai à l'île Verte.

Tourterelle turque

Première mention dans le Bas-Saint-Laurent, la Tourterelle turque a été observée du 22 avril au 26 avril à Sainte-Félicité (J. Deschènes et autres).

Chouette épervière

À partir du 9 mars, cette chouette a été vue à Pointe-au-Père (R. Pitre) (A. Brisson et autres), à Notre-Dame-du-Lac (M. Beaulieu) et à Sainte-Luce (L. Lefebvre).

Chouette rayée

Une seule mention d'observation a été rapportée : le 5 mai à Sainte-Odile (R. Pitre).

Hibou des marais

Ce hibou a été vu au marais de Pointe-au-Père, le 3 mai (J. Larivée), à Saint-Fabien le 10 mai (G. Rivard et autres) et à Rivière-Hâtée le 26 mai (R. Pitre).

Chouette lapone

Le 15 mai, au marais de Sacré-Cœur, cette chouette a été observée par plusieurs personnes, ainsi que le 21 mai à Sainte-Luce et le 23 mai à l'île Verte.

Nyctale de Tengmalm

Le 27 mars, les 3 et 15 avril, l'on a observé une chouette dans le Sentier du Littoral à Rimouski (R. Pitre et autres).

Martinet ramoneur

Cet oiseau de plus en plus rare, a été vu à Rimouski, le 21 mai à la passerelle du dynamo et le 31 mai à l'Étang Parent (G. Rivard et autres).

Pic à dos rayé

3 mentions d'observation ont été rapportées : à Rimouski le 1^{er} mars (D. Ruest et G. Gendron), le 16 mai (G. Gendron) et le 22 mai (R. et L. Saint-Laurent).

Viréo aux yeux blancs

Ce visiteur inusité a été observé sur la rue de la Sapinière Nord à Rimouski, le 26 mai (G. Proulx).

Hirondelle à ailes hérissées

Le 27 mai, cette migratrice inusitée a été observée à Rivière-du-Loup (M. Beaulieu).

Troglodyte familial

Ce rare visiteur a été observé à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, dans le Témiscouata, le 25 mai (M. Beaulieu).

Gobemoucheron gris-bleu

Une seule observation pour cet oiseau : le 14 mai dans le Sentier du Littoral à Rimouski (G. Gendron).

Merlebleu de l'Est

Ce nicheur occasionnel a été vu le 28 mai à Rimouski (S. Rhéaume) et le 30 mai à Rivière-Hâtée (R. Pitre).

Grive des bois

À Rimouski, le 6 mai, l'on a observé un individu au sol (L. et R. St-Laurent).

Paruline à capuchon

Cette paruline qui visite le Bas-Saint-Laurent pour la troisième fois a été observée sur la rue de la Pinède à Rimouski, le 22 avril (H. Dionne et A. Patry)

Bruant à joues marron

Les 2 et 3 mai, un individu a été observé au lac Saint-Mathieu (J. Larivée et P. Fradette) (G. Rivard).

Guiraca bleu

À Sainte-Luce, ce visiteur inusité a été vu du 29 au 31 mai (L. Lefebvre et autres).

Cardinal rouge

Un mâle a été observé à Amqui, les 10 et 14 mars (R. Lang).

Passerin indigo

À partir du 9 mai (G. Morissette) jusqu'au 29 mai, plusieurs mentions ont été rapportées sur l'ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent.

Quiscale rouilleux

Ce rare nicheur a été observé du 19 mars à Saint-Arsène (R. Dubé) au 10 mai, à Saint-Anaclet et à Rimouski. Le 3 mai, un groupe de 8 individus a été observé à l'étang de la rue Dollard (C. Gagné).

Oriole de Baltimore

Le 17 mai, l'on a observé un individu au lac Saint-Mathieu (H. Rioux et P. Dumas) et un couple à Rimouski (R. Fortin). Quelques observations ont été rapportées pour Rimouski, jusqu'au 22 mai.

Décompte aux mangeoires Hiver 2008-2009

Cette année, il y a eu 10 inscriptions au décompte. Les participants provenaient de toutes les parties de notre région, de Saint-Eusèbe à Saint-Ulric et de Causapscal à Trois-Pistoles.

Le plus grand nombre d'espèces observées à un site d'alimentation est de 19, et ce, au site de Yolande Angers et Ronald Lang à Amqui. Il était cependant talonné de près par le site de Marco Beaulieu à Saint-Eusèbe (17 espèces) et par celui de Suzanne Mercier à Saint-Ulric (16 espèces).

Le prix de participation, par tirage au sort, fut gagné pour une deuxième année consécutive par Madame Suzanne Mercier de Saint-Ulric. Elle a donc reçu un ensemble de cartes photo d'oiseaux de la région, création de Ghislaine Rivard.

En ce qui concerne le concours des photos d'oiseaux, le grand gagnant est M. Ronald Lang avec sa photo de la Mésange à tête brune.

En tout, 34 espèces différentes ont été dénombrées sur les sites inscrits à cette activité. L'on note cependant que 13 espèces n'ont été observées qu'à un seul des sites d'alimentation. Parmi celles-ci, le Pygargue à tête blanche qui n'a été observé qu'au site d'alimentation de Lucie Lemay et Michel Brouillette à Causapscal ainsi que le Canard colvert qui n'était présent qu'au site de Yolande Angers et Ronald Lang à Amqui.



Cette compétition amicale est bien prisée par les participants, car elle permet de donner une saveur ornithologique à cette saison où les espèces sont moins nombreuses dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Responsable Sylvie Landry

[Retour](#)

Les canards à Pointe-au-Père

3 mai 2009

Le soleil brille et le vent souffle du nord-ouest. Huit personnes sont présentes à l'est du quai de Pointe-au-Père à 8 h : Pierick Arsenault, Nicolas Casajus, François Cavalier, Julie Gasse, Sylvie Leblond, Alix Villeneuve, François Villeneuve et le guide Jacques Larivée. Nous passons une bonne demi-heure à scruter les eaux de l'estuaire. Un petit groupe de Macreuses à front blanc s'alimente à l'abri du vent à l'est du quai ; un Harelde kakawi mâle en mue les accompagne. Au large, quelques Fous de Bassan, plusieurs Eiders à duvet, une Mouette tridactyle, deux Plongeurs catmarins, des Cormorans à aigrettes, quelques Guillemots à miroir, des goélands des 5 espèces et des Harles huppés.

Nous nous rendons ensuite au marais salé pour y observer de nombreux anatidés parmi lesquels une minuscule femelle Petit Garrot. Une vingtaine de Grands Chevaliers et 2 Petits Chevaliers s'alimentent devant nous, à la bordure du marais. Un Hibou des marais houspillé par un groupe de corneilles se perche sur un chicot à la limite sud du marais, dans la section où poussent les typhas. Nous le perdons de vue lorsqu'il plonge au sol pour échapper au cortège noir et criard qui n'apprécie pas sa présence.

Pendant ce temps, nous pouvons observer plusieurs oiseaux de proie en migration vers l'ouest. Vus à contre-jour, haut dans le ciel, la majorité ne peut être identifiée, mais nous pouvons reconnaître quelques Buses pattues et une Buse à queue rousse. Trois Éperviers bruns passent près de nous, à la hauteur des yeux. Enfin, nous avons le plaisir d'assister à l'arrivée de plusieurs bandes d'Oies des neiges qui se posent devant nous. Nous estimons leur nombre à 3 000 individus ; nous en observerons 2 000 autres un peu plus tard dans le secteur de l'Anse au Lard.

Nous avons observé 45 espèces et avons été pendant quelques heures des témoins heureux de la migration printanière. Il y avait à chaque instant des oiseaux à observer partout où nous dirigions nos jumelles. Un groupe de joyeux ornithologues, de l'eau bleue, de l'air pur et des oiseaux suffisent à créer quelques heures de bonheur.

Jacques Larivée, responsable.



Photo de Jacques Larivée

La faune ailée du marais de Gros-Cacouna et de ses environs

Cette activité, qui s'est déroulée en partie sous un épais brouillard, a intéressé dix observateurs. Les quelques percées d'un soleil ardent et chaud ont cependant permis la création de courants d'air favorisant la migration des rapaces le long de la montagne.

Malgré ces conditions d'observation difficiles, 66 espèces ont été recensées dont :

18 Quiscales rouilleux;

1 Faucon pèlerin (aucun indice de nidification dans la falaise de la carrière);

3 Petits Garrots;

5 Sarcelles à ailes bleues;

28 Bihoreaux gris;

9 Petits Chevaliers;

Plusieurs dizaines d'Éperviers bruns ainsi que plusieurs Buses à queue rousse.

M. Jean-Maurice Turgeon a capté cette photo où il est possible d'observer le collier brun cannelle rarement visible chez le Fuligule à collier.



Malgré certaines attentes, le Fuligule à tête rouge et le Canard souchet n'ont pu être observés. Quelques observateurs se sont par la suite dirigés à l'étang de Canards Illimités aménagé près de la rivière des Vases. Cette visite a permis l'observation de 44 espèces dont :

1 Érismature rousse;

1 Faucon pèlerin;

1 Marouette de Caroline;

1 Chevalier solitaire.

Les espèces suivantes étaient abondantes aux deux endroits :
Sarcelle d'hiver;
Fuligule à collier;
Canard pilet;
Canard chipeau.

Serge Rhéaume, responsable.

Les oiseaux de proie à Sainte-Félicité de Matane 10 mai 2009

Un épais tapis de brume s'étant installé à faible d'altitude, l'activité a dû être abandonnée. L'on peut juste souhaiter de meilleures conditions l'an prochain.

Jacques Deschenes, responsable.



Bruant à couronne blanche de la sous-espèce gambelii - Dominique Berteaux

Les parulines dans la vallée de la Matapédia

23 mai 2009

Treize (13) personnes ont participé à cette activité et ont pu voir, ou entendre, 69 espèces au total. Parmi les observateurs, notons les présences remarquées et appréciées de Julie Marcoux et Serge Rhéaume. Sans eux, nous aurions raté 5 espèces. Quatre autres participants en étaient à leur première expérience. Il n'est pas fréquent d'avoir, lors d'activités que j'organise, la participation d'ornithologues qui proviennent de l'extérieur de la vallée de La Matapédia. Même si la température était fraîche en ce samedi matin, le soleil était au rendez-vous, de même que la bonne humeur. Les observations les plus remarquables ont été - Au camping d'Amqui et ses alentours : 1 Râle de Virginie *, 1 Marouette de Caroline, 2 Chevaliers solitaires, 1 Grand Chevalier, 5 Bécasseaux minuscules et 5 espèces de parulines.

Au site du lac Castonguay : 1 Oie des neiges, 2 Bernaches du Canada (la femelle était sur son nid, situé sur le dessus d'une ancienne cabane à castors, et couvait), 2 Sarcelles à ailes bleues, 2 Canards souchets, 2 Fuligules milouinans, 1 Busard Saint-Martin (se laissait planer au-dessus de l'eau) 1 Buse à queue rousse, 3 Chevaliers solitaires, 1 Grand Chevalier, 2 Tyrans tritri, un minimum de 80 Hirondelles bicolores, 10 Hirondelles de rivage, 3 Goglus des prés et 12 espèces de parulines.

* En se rendant observer des limicoles dans un champ inondé le long de la route 132, près du camping, Serge avait entendu un Râle de Virginie dans un petit marais au bas du talus de la route. En retournant au camping, je me suis installé près du marais, alors que les autres sont restés sur le bord de la route. J'ai utilisé un enregistrement de chants d'oiseaux pour voir si le râle allait se manifester. À la deuxième tentative, l'oiseau est sorti de sa cachette et s'est précipité dans ma direction. J'ai aussitôt fermé mon lecteur MP3 et suis resté immobile. Le râle est venu me trouver, se promenait à côté de moi et semblait intrigué par le petit haut-parleur que je tenais dans ma main posée sur le sol. Notre vedette n'est restée à mes côtés que quelques instants pour ensuite retourner se cacher dans les quenouilles. Je suis aussitôt allé rejoindre les autres et nous avons quitté les lieux. C'était ma première observation de cette espèce et ce fut toute une expérience d'observer ce petit râle d'aussi près. Certaines personnes ont pensé que j'allais me faire attaquer, alors que d'autres ont pris plaisir à me demander si j'avais eu peur. Tous les autres observateurs ont été enchantés par cette belle observation.

Nous avons passé une demi-journée intéressante.
Un gros merci à Julie et à Serge.

Ronald Lang, responsable.



Photo de Ronald Lang

Sortie en canot sur la rivière du Sud-Ouest

Malgré les prévisions météorologiques quelque peu déprimantes, j'ai pris une chance et j'ai décidé de ne pas annuler notre sortie en canot planifiée le lendemain 24 mai.

Au réveil, la journée s'annonçait clémente, sans vent et déjà plus chaude que la veille. Cinq membres du Club ont accepté la proposition de La Cordelle, soit de faire une balade sur le lac Saint-Mathieu et la rivière du Sud-Ouest, bien assis dans le canot à observer les oiseaux.

À la mise à l'eau des canots, nous avons remarqué l'agitation produite par la fraie des Meuniers noirs ; des centaines de nageoires se promenaient fébrilement à la surface de l'eau, dans toutes les directions. La table était mise pour les Balbuzards pêcheurs que nous avons eu le plaisir d'observer et qui étaient très actifs autour de leur nid plateforme.

Canards, parulines, hirondelles et bien d'autres étaient au rendez-vous : au total 48 espèces ont été observées. Les participants ont bien apprécié l'excursion et souhaitent renouveler l'expérience l'an prochain.

Claire Douville, responsable



Photo de Jean-Maurice Turgeon

Le T'huit T'huit 2009

Le T'huit T'huit 2009 s'est tenu du vendredi 29 mai à 17 h au samedi 30 mai à 17 h. La compilation des observations a eu lieu au pavillon multi-fonctionnel du quartier Pointe-au-Père lors d'une soirée très animée.

Pour le lecteur qui est néophyte avec cette activité, il est pertinent de préciser que l'objectif est de parcourir le plus d'habitats différents afin de dénombrer le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux en 24 heures au Bas-Saint-Laurent.

En 2009, un total de 183 espèces a été recensé par la trentaine de participants. Ce nombre d'espèces est supérieur à la moyenne des dix dernières années qui est de 174,6. Le record a été réalisé en 1999 alors que 193 espèces avaient été identifiées par l'ensemble des observateurs.

Les nouvelles espèces qui se sont ajoutées à la liste cumulative sont : le Guiraca bleu chez Louise Lefebvre à Sainte-Luce et le Troglodyte familier qui a été observé dans le Témiscouata.

Il s'agissait des 254^e et 255^e espèces observées au cours de cette activité du COBSL qui se tient depuis maintenant 20 ans.

En ce qui concerne les observations d'un intérêt particulier, l'on doit signaler la présence de l'Érismature rousse à la rivière des Vases ainsi qu'à Cacouna et un Fuligule à tête rouge à Trois-Pistoles.

Serge Rhéaume, responsable

Fin de semaine à l'île aux Basques, 2009

Cette année, le pèlerinage ornithologique à l'île aux Basques, c'est tenu du 5 au 7 juin. L'on parle de pèlerinage, car une bonne partie des participants reviennent année après année sur cette petite île du Saint-Laurent afin de se rencontrer et de se ressourcer avec la nature.

Bien que la traversée initiale se soit effectuée sur une mer assez forte, les participants ont pu profiter d'un temps superbe et d'une période de mer très calme qui a permis d'observer facilement les Petits Pingouins, Guillemots à miroir, Mouettes tridactyles, Fous de Bassan ainsi que des Bélugas.

Le groupe était constitué de 13 personnes qui ont pu observer 66 espèces d'oiseaux au cours de leur séjour.

Les crèches d'Eiders à duvet étaient omniprésentes et très nombreuses cette année, si l'on compare la situation aux dernières années. Les Parulines ont fait le bonheur des observateurs, car 17 espèces ont été observées. Les oiseaux de rivage étaient cependant presque absents de l'île cette année n'étant représentés que par deux Pluviers semipalmés.

Les observations d'une Nyctale de Tengmalm et d'un Eider à tête grise mâle ont cependant fait la joie de plusieurs observateurs pour qui ces espèces constituaient une première observation à vie.

Claire Douville, responsable.

Une journée sur l'île aux Lièvres

13 juin 2009

Introduction

Située à huit kilomètres de Rivière-du-Loup, l'île aux Lièvres est longue et effilée aux deux extrémités (treize kilomètres de longueur et moins de deux kilomètres de largeur). Propriété de la Société Duvetnor Ltée, un réseau de sentiers de randonnée pédestre y est aménagé (45 km) et le niveau de difficulté varie de débutant à expert. En plus de la randonnée pédestre, le camping sauvage et divers forfaits d'hébergement sont possibles. L'heure de traversée par bateau varie selon les marées et la durée est d'environ vingt minutes.

La journée d'observation

Observateurs : Marco Beaulieu, Claire Douville, Marcel Bernier, Julie Marcoux, Serge Rhéaume, Diane Gagné, Jacques Larivée, Alix Villeneuve, Rita et Lucille Saint-Laurent

C'est à 8 h 30, par une belle journée ensoleillée et douce, que nous quittons le quai de Rivière-du-Loup en direction de l'île aux Lièvres. Sur notre route, à un kilomètre avant d'arriver à destination, se trouvent les îles du Pot à l'Eau-de-Vie. Nous pouvons y observer des milliers de couples d'oiseaux nicheurs (Cormoran à aigrettes, Goéland argenté, Goéland marin, Mouette tridactyle, Guillemot marmette, Petit Pingouin, Guillemot à miroir) qui volent autour du bateau.



Photo de Marcel Bernier

À l'arrivée sur l'île aux Lièvres, les passereaux forestiers habituels chantent le long du sentier qui nous amène à l'extrémité est de l'île. À cet endroit, un belvédère nous permet d'observer les oiseaux sur le fleuve tout autour de nous. Nous profitons du site pour prendre notre lunch en continuant d'épier les alentours, rien de particulier à part quelques Hareldes kakawis qui passent en volant et la présence importante d'Eiders à duvet. Nous quittons la pointe est en marchant sur la plage du côté nord de l'île. Un Bécasseau violet se laisse observer par quelques chanceux du groupe. Par la suite, nous continuons nos observations dans les sentiers forestiers et près de l'embarcadère. De cet endroit, nous avons une vue imprenable sur la plus grosse des îles du Pot à l'Eau-de-Vie où une importante colonie de Petits Pingouins s'est établie.

Nous embarquons sur le bateau du retour à 17 h. En passant près des îles du Pot, le capitaine du bateau nous permet d'observer à loisir les Guillemots marmettes et les Petits Pingouins. En quittant les îles, une dernière surprise nous attendait : quelques dizaines de bélugas ont « encerclé » le bateau. L'arrêt des moteurs, pendant quelques minutes, nous a permis de profiter de cette proximité inusitée. Nous sommes de retour au quai de Rivière-du-Loup à 17 h 30. En résumé, une longue et belle journée d'été sur un site où les oiseaux sont omniprésents avec 62 espèces et un total de 8601 individus observés.

Marco Beaulieu, responsable

Un petit jeu-questionnaire sur les noms français des oiseaux

En considérant les dernières modifications proposées par l'American ornithologist Union ainsi que l'utilisation occasionnelle d'anciens noms d'oiseaux dans des messages envoyés au groupe de discussion du COBSL, j'ai élaboré un petit jeu-questionnaire.

L'on discute habituellement des noms d'oiseaux qui ont subi des changements. J'ai élaboré ce petit exercice en faisant le contraire, soit en recherchant ceux qui ont conservé le même nom qu'au début du XX^e siècle.

Les bases de comparaison qui ont été utilisées pour ce faire sont le feuillet d'observations quotidiennes, Oiseaux du Québec, juillet 2008 et le livre de Charles-Eusèbe Dionne intitulé « Les Oiseaux de la Province de Québec » publié en 1906. Le jeu consiste à répondre à la question suivante : combien d'espèces présentes sur le feuillet d'observations quotidiennes portent encore le même nom que celui utilisé par Dionne en 1906? Vous trouverez la réponse dans la suite de l'article plus loin dans ce numéro du Kakawi. L'utilisation d'un feuillet d'observations quotidiennes peut faciliter l'exercice. Je crois que le résultat vous surprendra.

Jean-Pierre le Bel



Moqueur polyglotte, Suzanne Mercier

Mes débuts ornithologiques



D'aussi loin que je me souviens, mes premiers rapports avec les p'tits oiseaux remontent vers le début de l'adolescence. J'ai grandi au Nouveau-Brunswick sur une ferme bien modeste située à proximité du lac Baker, à la frontière de la province de Québec (précisément le Témiscouata). Puisqu'une ferme avec tous ses bâtiments représente un milieu attrayant pour la faune ailée, les oiseaux étaient omniprésents et ce, du printemps jusqu'à l'automne. Je me revois encore, fasciné par la présence des beaux mâles Chardonnerets jaunes, des nichées d'Hirondelles des granges (Hirondelles rustiques) et les petits poussins jaunes de nos poules domestiques. Les Hirondelles rustiques construisaient des nids dans la grange, mais il y avait toujours un couple d'hirondelles qui préféraient avoir le sien dans l'étable. À cet endroit, le nid était facilement accessible et je n'avais qu'à utiliser un petit banc pour l'atteindre. Combien de fois je me suis étiré le bras pour tâter les petits œufs, de même que les oisillons? La femelle, qui était habituée à notre présence et que je considérais comme un membre de la famille, me permettait parfois, lorsqu'elle couvait, de lui toucher les plumes.

Mais l'oiseau qui a le plus marqué mon enfance est celui que j'appelais le « **roi du lac** ». Vous aurez probablement deviné que je veux parler du huard, notre beau Huard à collier¹. Je me souviens très bien qu'à plusieurs reprises je prenais plaisir à l'imiter. Je me rendais en flanc de montagne, d'où j'avais une superbe vue sur le lac, et là j'imitais son chant et très souvent il me répondait. J'avais l'impression de dialoguer avec lui.

Aujourd'hui encore, chaque fois que j'entends ses vocalises, peu importe que ce soit dans la nature ou à la télévision, cela me fait vibrer et remémorer de beaux souvenirs.

Au début des années 1980, au cours de mes randonnées de chasse, il m'arrivait souvent d'observer des oiseaux que je ne pouvais pas identifier. Lors d'un voyage à Québec, je me suis procuré mon premier guide sur l'identification des oiseaux. C'était *BIRDS of North America* écrit par Chandler S. Robbins, Bertel Bruun et Herbert S. Zim.

Mais la vraie aventure ornithologique a débuté au mois de janvier 1991. Mon voisin d'en arrière, de l'autre côté de la rivière, nourrissait les oiseaux et j'avais remarqué de beaux gros oiseaux noirs et jaunes qui étaient très bruyants. Intéressé par ce spectacle, j'ai voulu voir si je pouvais en attirer chez moi. En regardant dans mon guide, j'ai pu identifier ces oiseaux (Evening Grosbeak), mais je ne savais pas le nom français et avec quoi les attirer. Je me suis donc rendu à la librairie où j'ai trouvé le livre *Comment nourrir les oiseaux autour de chez soi*, écrit par Normand David et Gaétan Duquette. Le lendemain, je suis allé acheter un petit sac de graines de tournesol et j'en ai mis sur un plateau improvisé que j'avais placé sur la rampe du patio. Je n'ai pas eu à attendre bien longtemps avant de recevoir mes premiers clients, une dizaine de Gros-becs errants. Quelques semaines plus

tard, des Sizerins flammés sont arrivés. En les observant, j'avais remarqué qu'ils n'étaient pas craintifs. Au bout de quelques jours, j'avais réussi à en faire manger dans mes mains. Ce fut un moment magique et je venais de me prendre dans l'«engrenage» du loisir ornithologique.

L'année suivante, j'ai entendu parler du Club des ornithologues du Bas-St-Laurent et j'en suis devenu membre.

Lorsque j'ai commencé à organiser des activités pour le secteur de la Vallée de la Matapédia, j'ai reçu l'aide précieuse de feu Jean-Louis Martel. Il fut mon mentor au cours de mes premières années d'activités.

Au fil des ans, je me suis procuré divers livres et guides d'identifications. Mon premier livre en français fut *Encyclopédie des oiseaux du Québec* par W. Earl Godfrey. En 1996, j'ai vendu mes armes de chasse et me suis acheté une lunette Bushnell Spacemaster avec un oculaire 22x grand-angle. Trois ans auparavant, j'avais fait l'acquisition de jumelles Bausch & Lomb Custom 8x36.

Aujourd'hui, près de vingt ans plus tard, je suis toujours passionné des oiseaux et la grande majorité de mes observations sont faites dans ma région (Amqui).

Mes oiseaux préférés: l'Hirondelle bicolore, le Jaseur boréal et le Pic mineur.

Pour conclure, voici une anecdote qui s'est passée en 1976, alors que j'étais à la chasse à l'original avec des membres de ma belle-famille. À l'endroit où nous chassions, il y avait beaucoup de Geais du Canada (Mésangeais), que l'on appelait à l'époque des pies, ou pies de lunch. J'utilisais une cache installée au niveau du sol et vers la fin de la saison de chasse, je m'amusais à attirer quelques-uns de ces geais et à les nourrir. Un jour, alors qu'un de ces oiseaux avait pris l'habitude de venir chercher de la nourriture dans mes mains, j'ai décidé de tenter de le capturer. C'était tôt en début de matinée. J'avais placé des morceaux de fromage dans une main et positionné l'autre main pour faire la capture. Lorsque j'ai capturé l'oiseau, celui-ci s'est mis à émettre des cris de détresse et les autres geais du secteur se sont aussitôt manifestés. J'ai déposé l'oiseau au sol et après quelques secondes il a repris ses sens et s'est envolé. Par la suite, je n'ai pas réussi à les attirer à nouveau à cet endroit. Chaque fois qu'un Geai du Canada s'approchait, un autre venait se percher pas très loin et émettait des cris, que je considérais comme un signal d'alarme, et mon visiteur s'éloignait aussitôt.

Moi qui voulais être gentil, je suis passé pour un vilain.

J'aurais bien d'autres anecdotes ou faits vécus à vous raconter, mais cela serait trop long pour cette chronique...

Sur ce, je vous souhaite de belles observations et n'oubliez pas que se promener dans la nature, c'est comme assister à une pièce de théâtre où il y a plein de beaux décors et beaucoup d'acteurs.

(¹) Même si celui-ci porte maintenant le nom de Plongeon huard, je préfère encore utiliser Huard à collier, car je trouve que cela fait plus poétique. Je suis un peu déçu de voir que ce bel oiseau a changé de nom, car pour moi il a perdu de son identité.

Ronald Lang

Bretelles pour jumelles

Le COBSL est fier de vous présenter pour seulement 25 \$, tous frais compris, les bretelles pour jumelles, au logo du club.

Cet article, conçu pour répartir le poids des jumelles sur les épaules, rendra la période d'observation beaucoup plus agréable.

Pour vous procurer une ou plusieurs paires, veuillez nous transmettre le bon de commande ci-dessous, accompagné de votre chèque.

Merci de votre encouragement !



BON DE COMMANDE

Nombre d'article(s) () x 25\$ = \$

Nom _____

Adresse _____

Ville _____ Code postal _____

Payable par chèque au COBSL, C.P. 66, Rimouski (Québec) G5L 7B7

[Retour](#)

Abonnez un (e) ami (e)!



COBSL

C.P. 66

Rimouski (QC) G5L 7B7

cobsl@globetrotter.net

Nom : _____

Prénom : _____

No et rue : _____

Ville : _____

Code postal : _____

Téléphone : _____

Courriel : _____

☐ Je désire recevoir la liste des activités et Le Kakawi par courriel.

Cotisation

Membre étudiant 16 \$:

Membre régulier 20 \$:

Membre familial 22 \$:

Membre à vie 300 \$:

Don :

Total :

Cotisation familiale : nom des membres

☐ Je ne veux pas que mes coordonnées apparaissent sur la liste des membres.

☐ Je désire des Feuilles d'observations quotidiennes

[Retour](#)

Le compte rendu des observations du printemps 2008 dans le Bas-Saint-Laurent

Jacques Larivée

*Ne tuons pas la beauté du monde
Ne tuons pas le chant des oiseaux
Ne tuons pas le bleu du jour*

Luc Plamondon

Trente ans d'observation d'oiseaux !

Le printemps 2008 est le trentième printemps du COBSL. Le tableau suivant compare des totaux des printemps 1979 et 2008. Il permet de constater à quel point l'observation des oiseaux a changé depuis 30 ans dans le Bas-Saint-Laurent.

	Printemps 1979	Printemps 2008
Nombre de feuillets	144	1 079
Feuillets de dénombrement de rapaces	0	52
Feuillets interactifs	0	100
Feuillets ÉPOQ en papier	144	899
Feuillets de mentions publiées sur Internet	0	11
Feuillets « Vingt-quatre heures de mai »	0	17
Nombre de mentions	3 157	19 616
Nombre de mentions par feuillet	22	18
Nombre d'heures d'observation	196 h	2 292 h 10
Nombre d'espèces observées	179	219
Nombre de sites visités	25	137
Nombre d'observateurs	36	121
Observateur qui a produit le plus de feuillets	Jacques Larivée (27)	Marco Beaulieu (167)
Nombre d'annotations sur les feuillets	102	2 453

Les **10** espèces suivantes sont observées au printemps 1979, mais pas au printemps 2008 : Grand Cormoran, Grande Aigrette, Aigrette neigeuse, Héron vert, Bécasseau sanderling, Sterne arctique, Labbe pomarin, Labbe parasite, Chouette lapone et Bruant à face noire.

Par contre, les **44** espèces suivantes sont observées au printemps 2008, mais pas au printemps 1979 : Oie de Ross, Bernache de Hutchins, Petit Garrot, Perdrix grise, Tétras du Canada, Grèbe esclavon, Grèbe jougris, Aigrette tricolore, Urubu à tête rouge, Pygargue à tête blanche, Autour des palombes, Buse à épauettes, Râle de Virginie, Grue du Canada, Pluvier bronzé, Courlis corlieu, Bécasseau à croupion blanc, Bécasseau de Baird, Phalarope de Wilson, Goéland brun, Mouette tridactyle, Mergule nain, Grand-duc d'Amérique, Chouette rayée, Petite Nyctale, Colibri à gorge rubis, Moucherolle à côté olive, Moucherolle à ventre jaune, Moucherolle des aulnes, Tyran huppé, Viréo mélodieux, Hirondelle à front blanc, Mésange bicolore, Sittelle à poitrine blanche, Merlebleu de l'Est, Moqueur roux, Paruline des pins, Paruline à couronne rousse, Paruline rayée, Cardinal rouge, Sturnelle des prés, Roselin familier et Bec-croisé des sapins.


Plusieurs raisons peuvent être invoquées pour expliquer la présence d'espèces en 2008 qui n'ont pas été observées en 1979. Il y a les espèces qui étaient sans doute présentes sur le territoire en 1979, mais qui n'ont pas été observées à cause du petit nombre d'observateurs : le Tétrás du Canada, le Grèbe jougris, l'Autour des palombes, le Bécasseaux à croupion blanc, les 3 strigidés, le Colibri à gorge rubis, les Parulines à couronne rousse et rayée ainsi que la Sturnelle des prés. Il y a les 4 moucherolles, rares en 1979 avant les premiers jours de juin, maintenant plus faciles à observer en mai. Puis, il y a les oiseaux de proie devenus rares après la seconde guerre mondiale à cause de l'utilisation de l'insecticide DDT et aujourd'hui plus abondants à la suite du bannissement de ce poison au Canada en 1971. Enfin, il y a les espèces qui s'établissent en région depuis 1979, espèces dont l'aire s'étend vers le nord-est, sans doute favorisées par le changement du climat : Perdrix grise, Urubu à tête rouge, Buse à épauettes, Grue du Canada, Goéland brun, Tyran huppé, Viréo mélodieux, Mésange bicolore, Sittelle à poitrine blanche, Moqueur roux, Cardinal rouge et Roselin familier.

À la lumière de la fréquence des espèces observées, il ressort clairement que les observations du printemps 2008 sont beaucoup mieux réparties sur le territoire du COBSL que celles de 1979 qui provenaient principalement de sites situés près des rives de l'estuaire du Saint-Laurent. De plus, les 5 espèces dont la fréquence a le plus augmenté entre 1979 et 2008 fréquentent les mangeoires (Tourterelle triste, Geai bleu, Mésange à tête noire, Pic mineur et Pic chevelu) ; oui, beaucoup moins de gens nourrissaient les oiseaux en 1979.

Cependant, la plus grande part de changement des 30 dernières années ne vient pas des oiseaux, mais des humains. En 1979, point de *field guide* en français¹, peu de disques et de cassettes de chants d'oiseaux, pas de ligne InfoOiseaux ni de groupes de discussion, pas d'iPod, pas de page des oiseaux rares, très peu de photographes, pas d'espèces menacées, et surtout, surtout, pas de Kakawi !

Les observations du printemps 2008

En 2008, la récolte de données sur les oiseaux du Bas-Saint-Laurent avoisine la moyenne des 15 derniers printemps. Comme le montre la figure suivante, la cueillette des **1 079** feuillets du printemps 2008 est bonne, sans atteindre le sommet de 1 379 feuillets du printemps 1997.



¹ Le premier guide traduit en français (le Peterson) est publié en 1980.

Voici le tableau des statistiques générales de la saison du printemps 2008.

Statistiques générales				
	Feuillets	Mentions	Mentions par feuillet	Heures d'observation
Ensemble des observations traitées				
Mars	219	1886	8,61	371 h 50 m
Avril	410	6032	14,71	774 h 07 m
Mai	450	11704	26,01	1146 h 13 m
Total	1079	19622	18,19	2292 h 10 m
Observations faites aux mangeoires				
Mars	106	1099	10,37	174 h 10 m
Avril	74	966	13,05	108 h 15 m
Mai	53	939	17,72	87 h 05 m
Total	233	3004	12,89	369 h 30 m

Nouvelles dates d'arrivée hâtives

Espèce	Ancienne date d'arrivée hâtive	Nouvelle date d'arrivée hâtive
Canard d'Amérique	14 mars 1995	1 ^{er} mars 2008
Perdrix grise	13 mars 1999	4 mars 2008
Paruline à gorge noire	3 mai 1995	26 avril 2008
Bruant lapon	4 mars 1994	1 ^{er} mars 2008

Nouveaux grands nombres printaniers

Espèce	Ancien nombre maximal printanier	Nouveau nombre maximal printanier
Bernache de Hutchins	1	2
Perdrix grise	2	5
Goéland brun	3	4
Junco ardoisé	280	300

Les raretés

Le printemps 2008 n'a pas apporté de nouvelles espèces dans le Bas-Saint-Laurent, mais des espèces ont été observées une seule fois : Grèbe esclavon, Aigrette tricolore, Pluvier bronzé, Mergule nain, Engoulevent d'Amérique, Moucherolle à côtés olive, Paruline verdâtre, Paruline des pins, Bruant lapon, Cardinal rouge et Bec-croisé des sapins. D'autres espèces, tout aussi rares, ont été observées plus d'une fois : Oie de Ross, Bernache de Hutchins, Perdrix grise, Foulque d'Amérique, Grue du Canada, Courlis corlieu de la sous-espèce européenne, Bécasseau de Baird, Phalarope de Wilson et Mésange bicolore.

Sommaire

S'il faut résumer en peu de mots les observations du printemps 2008, nous avons assisté à une migration tardive (3 des 4 espèces dont la date d'observation hâtive printanière a été modifiée ont hiverné) et sans grandes surprises. Cela n'a cependant en rien diminué le plaisir d'être dehors et d'observer les oiseaux.

Remerciements

En plus des observatrices et des observateurs dont les noms apparaissent en fin de ce compte rendu, les 3 personnes suivantes ont contribué très spécialement à sa création : Rita Saint-Laurent a préparé les feuillets d'observations et Robert Lebrun en a saisi le contenu sur ordinateur ; Jean-Pierre le Bel a relu le texte et suggéré des corrections ; je les en remercie bien sincèrement. Enfin, les photographies des personnes suivantes illuminent le texte : Denis Desjardins, Yves Gauthier, Jean-Étienne Joubert, Jacques Larivée, Ghislaine Rivard, Pierre-Paul Turcotte.

NDLR : Les espèces et les mentions qui suivent sont sélectionnées selon des critères de rareté, d'intérêt des textes d'accompagnement, de disponibilité des photos. Une attention spéciale est accordée aux mentions des espèces en péril.

Oie de Ross *Chen rossii*

Rimouski, marais salé, 1 ind. le 3 mai par G. Gendron qui note : « *J'ai pu observer une Oie de Ross en phase bleue dans le marais de Sacré-Coeur au travers environ 8 000 Oies blanches* ».

Rimouski, marais salé, 1 ind. le 8 mai par R. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : mai 2

Bernache cravant *Branta bernicla*

Rimouski, baie, 1 000 ind. le 23 mai par J-É. Joubert et M. Labrecque qui notent : « *Estimation par groupe de 10, de 20, de 50, et de 100 (nous avons recompté deux fois)* ».

Nombre de mentions : avril 17, mai 46, total 63

Bernache de Hutchins *Branta hutchinsii*

Rimouski, promenade de la Mer, 1 ind. le 26 avril par G. Gendron qui note : « *Ce soir 26 avril, j'ai pu observer une Bernache de Hutchins au travers une centaine de Bernaches du Canada. L'individu était visible de la promenade pédestre qui longe le fleuve directement en avant de la Grande Place* ».

Rimouski, marais salé, 2 ind. le 8 mai par R. Saint-Laurent qui note : « *Les deux ensemble et tout près d'elles, une Bernache du Canada où l'on pouvait voir facilement la différence de grosseur et la longueur du cou* ».

Rimouski, 1 ind. le 9 mai par R. Pelletier.

Nombre de mentions : avril 1, mai 2, total 3

Bernache du Canada *Branta canadensis*

Lac Saint-Mathieu, 9 ind. le 31 mai par R. Pelletier, J. Boulva et L. Brisson qui notent : « *Nous avons observé un couple accompagné de 7 poussins ; le groupe était sur la rivière du Sud-Ouest à l'est du lac Saint-Mathieu (au pont)* ».

Nombre de mentions : avril 87, mai 111, total 198

Canard siffleur *Anas penelope*

Première mention de la saison : Amqui, 1 ind. le 24 avril par R. Lang et Y. Angers qui notent : « *En début d'après-midi, j'ai observé à l'entrée ouest d'Amqui, dans la partie inondée du champ à l'arrière des Ateliers de soudure Gilles Roy, un Canard siffleur mâle. C'était la première fois que j'observais cette espèce* ». Cet individu sera observé à cet endroit jusqu'au 1^{er} mai.

Nombre de mentions : avril 5, mai 4, total 9

Canard d'Amérique *Anas americana*

Dégelis, 2 ind. le 1^{er} mars par J-F. Rousseau, S. Blais et P. Richer qui notent : « *Un couple en aval du barrage. Curieusement, plongent sous l'eau à quelques reprises pour s'alimenter* ». Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière hâtive (ancien record : 14/03/1995 Dégelis par M. Beaulieu et M. Gagnon).
Nombre de mentions : mars 1, avril 7, mai 33, total 41

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

Sainte-Luce, 2 ind. le 28 avril par R. Claveau et L. Claveau qui notent : « *Depuis environ 12 jours, un couple de colverts fréquente nos mangeoires près de la maison. Ils arrivent et repartent à pied. Au début, le mâle ouvrait la marche à l'arrivée et au départ, mais depuis une semaine, c'est la femelle. Ils préfèrent le maïs. Je leur donne du maïs en épi séché et ils réussissent à le dégarnir grain par grain et je peux dire que les grains y sont très bien fixés. Ils mangent couchés la plupart du temps ! Le mâle porte une bague métallique à la patte gauche* ».
Nombre de mentions : mars 35, avril 146, mai 197, total 378

Canard pilet *Anas acuta*

Amqui, 1 ind. hybridé avec un Canard colvert le 28 mai par R. Lang qui note : « *Description : la forme et la grosseur du corps, la queue, de même que la longueur du cou sont identiques au Canard pilet non hybride. La différence se situe au niveau de la coloration de la tête, du cou et de la poitrine : tête verte comme le Canard colvert, poitrine et cou marron terne, un collier blanc sépare le vert de la tête du marron du cou. Ce collier ne fait pas complètement le tour du cou mais seulement sur le devant et les côtés* ».
Nombre de mentions : avril 11, mai 13, total 24

Sarcelle d'hiver (Eurasie) *Anas crecca crecca*

Cacouna, marais, 1 ind. le 10 mai par D. Jalbert et É. Asselin qui notent : « *Pareille à la Sarcelle d'hiver, mais avec la ligne blanche à l'épaule en moins et ayant une ligne blanche sur le côté du dos (ligne horizontale)* ».
Mentions antérieures de cette espèce : printemps (12), été (0), automne (0), hiver (0)
Nombre de mentions : mai 1

Eider à tête grise *Somateria spectabilis*

Rimouski, marais salé, 1 ind. le 8 mai par J-É. Joubert qui note : « *Un Eider à tête grise est présent depuis trois jours de l'est de la baie jusque devant l'Îlet Canuel. Je dis un, mais c'est peut-être deux individus, sauf que toutes mes séquences d'observations relatent un comportement non méfiant et surtout, celui d'un oiseau qui semble éprouver des difficultés à voler. J'ai pris une photo potable avec mon télescope dans le marais salé* ».
Nombre de mentions : avril 8, mai 2, total 10



Eider à tête grise, Jean-Étienne Joubert

Eider à duvet *Somateria mollissima*

Rivière-du-Loup, embouchure de la rivière, 140 ind. le 28 avril par M. Beaulieu qui note : « Deux mâles se battent sur l'eau pendant plusieurs minutes : ils se saisissent le cou et les ailes avec leur bec puis se calent dans l'eau. Une femelle observe tout près ».

Nombre de mentions : mars 21, avril 91, mai 79, total 191

Harelde kakawi *Clangula hyemalis*

Rivière-Bleue, 8 ind. le 24 avril par M. Beaulieu qui note : « Observés dans un champ inondé ! ».

Nombre de mentions : avril 17, mai 23, total 40

Petit Garrot *Bucephala albeola*

Première mention de la saison : Pointe-au-Père, 1 ind. le 20 avril par G. Rivard et C. Cossette.

Nombre de mentions : avril 4, mai 8, total 12

Garrot d'Islande *Bucephala islandica*

Dégelis, 5 ind. le 13 mars par M. Beaulieu.

Grand-Métis, 98 ind. le 7 avril par R. Saint-Laurent et R. Pelletier qui notent : « Femelles avec leur bec jaune ; mâles avec leur croissant blanc devant l'œil ».

Saint-Fabien-sur-Mer, 50 ind. le 11 avril par J. Boulva et N. Charest qui notent : « Un très gros groupe sur la baie, à environ 300 m du rivage, de 50 à 70 selon notre estimé. Pas de Garrot à œil d'or parmi eux ».

Cacouna, marais, 2 ind. le 20 avril par É. Sabourin et S. Binet qui notent : « Un couple nageant ensemble dans le bassin près de la cimenterie. Bonne observation avec photo ».

Rivière Hâtée, 19 ind. le 9 mai par R. Saint-Laurent qui note : « Quatre mâles adultes et 15 mâles immatures dont le croissant, sur la joue est plus petit et qui n'ont pas encore les couleurs de l'adulte ».

Nombre de mentions : mars 7, avril 55, mai 14, total 76

Harle huppé *Mergus serrator*

Rimouski, rivière Rimouski, 3 ind. le 28 mai par C. Douville qui note : « *Le mâle est en parade devant la femelle (courbe sur l'eau, tête projetée vers l'arrière, battement d'ailes, le corps tout allongé)* ». Cette mention constitue une référence tardive à la note « Parade nuptiale » (date tardive actuelle : 15/05/1996 à Cacouna par J. Larivée).
Nombre de mentions : mars 5, avril 37, mai 41, total 83

Perdrix grise *Perdix perdix*

Sainte-Luce, Rang 2 Est, 5 ind. le 4 mars par L. Lefebvre. Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière hâtive et un nouveau nombre d'individus maximum printanier (anciens records : 2 ind. à Saint-Michel-du-Squatec le 13/03/1999 par L. Bourgoïn). Deux individus étaient encore présents au même endroit le 21 avril.

Nombre de mentions : mars 1, avril 7, total 8

Tétras du Canada *Falcipennis canadensis*

Lac à Chamard, 1 ind. le 26 et le 31 mai par M. Beaulieu qui note : « *Un mâle dans un peuplement d'Épinette noire de faible densité, de hauteur variée et poussant sur un sol humide* ».

Nombre de mentions : mai 2

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

Première mention de la saison : Rivière-du-Loup, embouchure de la rivière, 8 ind. le 28 avril par M. Beaulieu.

Nombre de mentions : avril 1, mai 8, total 9

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

Mention unique : Le Bic, 1 ind. le 27 avril par L. Messely.

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

Première mention de la saison : Cabano, 3 ind. le 30 avril par M. Beaulieu.

Nombre de mentions : avril 1, mai 2, total 3

Fou de Bassan *Morus bassanus*

Pointe-au-Père, quai, 1 ind. le 4 mai par A. Girard qui note : « *Près du rivage, vol nonchalant vers l'est, plonge pour s'alimenter* ».

Nombre de mentions : avril 7, mai 13, total 20

Cormoran à aigrettes *Phalacrocorax auritus*

Première mention de la saison : Notre-Dame-du-Portage, 9 ind. le 4 avril par D. Bérubé et J. Després.

Nombre de mentions : avril 28, mai 95, total 123

Aigrette tricolore *Egretta tricolor*

Mention unique : Rimouski, sentier du Littoral, 1 ind. le 31 mai par F. Villeneuve et A. Villeneuve. Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière tardive (ancienne date tardive : le 29/05/2000 à Cacouna par J-P. Ouellet et M. Lafleur).

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (5), été (15), automne (8), hiver (0), total (28).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*

Rimouski, étang de la rue Dollard, 2 ind. le 30 mai par R. Saint-Laurent qui note : « *Un adulte en plumage nuptial et un second individu plus brun avec quelques rayures brunes près des côtés et près du cou : selon Sibley, il s'agit d'un individu de premier été* ».

Nombre de mentions : mai 15

Urubu à tête rouge *Cathartes aura*

Première mention de la saison : Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 1 ind. le 27 mars par D. Desjardins.

Nombre de mentions : mars 1, avril 44, mai 54, total 99

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*

Première mention de la saison : Saint-Fabien, 2 ind. le 19 avril par G. Rivard qui note : « *Accouplement sur un pylône; semblent avoir un nid en construction juste à côté* ».

Saint-Fabien, belvédère Raoul-Roy, 1 ind. photographié le 2 mai par D. Desjardins alors qu'il transporte une proie.



Balbuzard pêcheur, Denis Desjardins

Lac Saint-Mathieu, 2 ind. le 30 mai par P. Dumas et H. Rioux qui notent : « *Femelle couve et mâle à côté du nid faisant le guet sur un pylône à Saint-Mathieu* ».

Nombre de mentions : avril 20, mai 38, total 58

Pygargue à tête blanche *Haliaeetus leucocephalus*

Estcourt, 1 ind. le 14 mars par M. Beaulieu qui note : « *Un individu perché dans un arbre en bordure de la rivière Saint-François qui ne gèle pas en hiver. Il est houspillé par quatre corneilles* ».

Mont Longue-Vue, 1 adulte le 18 mars par R. Deschênes et G. Auclair.

Mont Longue-Vue, 1 ind. le 21 avril par R. Deschênes qui note : « *Un jeune observé au village de Trinité-des-Monts se faisant harceler par un groupe de corneilles* ».

Sayabec, 2 immatures le 26 avril par R. Lang, C. Carré, J. Leclerc et M. Carré.

Lac à l'Anguille, 1 immature le 4 mai par S. Rhéaume, J. Marcoux et R. Rhéaume.

Île Saint-Barnabé, 1 ind. le 22 mai par J-É. Joubert, F. Bruaux et M. Labrecque.

Lac Saint-Mathieu, 1 ind. le 30 mai par P. Dumas et H. Rioux qui notent : « *Un adulte posé sur un arbre près de la rivière Saint-Mathieu* ».

Rimouski, 1 immature le 31 mai par R. Pitre.

Nombre de mentions : mars 7, avril 42, mai 25, total 74

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

Métis-sur-Mer, 1 ind. le 15 avril par J. Boulva et N. Charest qui notent : « *Se tenait sur le bord de la 132 avec 2 corneilles à se nourrir d'un Raton laveur mort. Ne s'est pas envolé quand on s'est arrêté à 30 m plus loin. Après quelques minutes a pris son envol, ce qui nous a permis d'observer toutes ses caractéristiques* ».

Nombre de mentions : avril 42, mai 76, total 118

Épervier brun *Accipiter striatus*

Lac de la Montagne, 2 ind. le 25 avril par J. Larivée qui note : « *Ce matin, les deux individus sont présents sur le site de nidification situé à mi-hauteur dans le flanc de la montagne. J'entends un individu émettre un cri répété, doux, beaucoup moins puissant que le cri que l'espèce émet habituellement. Je vois un deuxième individu qui a une petite branche dans le bec ; je crois que c'est un second individu, car j'entends l'autre crier un peu plus loin. Il s'envole, la branche au bec : c'est un transport de matériel* ». La note « Transport de matériel » est associée pour la première fois à cette espèce.

Saint-Fabien, belvédère Raoul-Roy, 42 ind. le 28 avril par D. Desjardins qui note sur le groupe de discussion COBSL : « *J'ai pris une série de photos d'un Épervier brun subadulte en vol nuptial. Vous pourrez remarquer les plumes sous-caudales blanches qui sont redressées à la base de la queue et très visibles durant le vol nuptial. Le vol est constitué de battements d'ailes saccadés et il le termine avec un vol en piqué et en forme de «J» qui n'est pas saisi sur les photos* ».



Épervier brun en parade nuptiale, Denis Desjardins


Lac de la Montagne, 2 ind. le 5 mai par J. Larivée qui note : « *Les deux individus sont sur le site de nidification ; ils volent dans le sous-bois à quelques mètres du sol. Les deux émettent le même cri, soit «tou-tou-tou» 20 fois ; un des deux a le cri bas et discret alors que l'autre est un peu plus fort et plus haut. Je repère une structure qui est peut-être le nid à 7 ou 8 mètres dans un sapin. À suivre...* ». Le 9 mai au même endroit, le même observateur note : « *Un adulte au nid ! Le nid est constitué de petites branches et il est situé dans un Sapin baumier à 6 ou 7 mètres de hauteur. Du chemin qui mène au lac, il est à la hauteur des yeux ; il est orienté sud et la structure fait un peu plus de 180° par rapport au tronc* ».

Nombre de mentions : mars 5, avril 48, mai 78, total 131

Épervier de Cooper *Accipiter cooperii*

Première mention de la saison : Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 2 ind. le 20 avril par D. Desjardins.

NDLR : Les 11 autres mentions proviennent du même site. Cette espèce est de plus en plus présente dans la région, comme le montre la figure suivante.



Nombre de mentions : avril 5, mai 7, total 12

Buse à épaulettes *Buteo lineatus*

Première mention de la saison : Mont Longue-Vue, 2 ind. le 7 avril par R. Deschênes.

Lac à Chamard, 1 ind. le 9 mai par M. Beaulieu.

Île Verte, 1 immature le 25 mai par Y. Gauthier, S. Morand et le Club d'ornithologie de Longueuil.

Nombre de mentions : avril 5, mai 3, total 8

Aigle royal *Aquila chrysaetos*

Première mention de la saison : Réserve faunique de Matane, La Côte aux Perches, 1 ind. le 15 mars par L. Fradette qui note : « Volait à 300 m au-dessus de la Côte aux Perches ».

Saint-Fabien, belvédère Raoul-Roy, 4 ind. le 27 mars par D. Desjardins qui note sur le groupe de discussion COBSL : « Malgré la neige qui est tombée aujourd'hui au belvédère Raoul-Roy, il est passé 4 Aigles royaux, dont trois en plein dans le gros des précipitations ; on y voyait à peine à 500 mètres devant. Comme vous pouvez voir sur la photo jointe, les aigles regardaient régulièrement vers le sol pour y avoir toujours un point de repère durant le vol, car ils se déplaçaient tout près du relief ».



Aigle royal dans la tempête de neige, D. Desjardins

Saint-Narcisse-de-Rimouski, Canyon des Portes de l'Enfer, 1 ind. le 6 avril par S. Rhéaume, J. Marcoux, M. Bellavance et A. Rhéaume.

Mont Longue-Vue, 1 adulte houspillé par une Buse à queue rousse et un Épervier brun le 21 avril par R. Deschênes.

Trinité-des-Monts, 1 immature le 28 avril par R. Deschênes.

Réserve faunique de Matane, 1 ind. le 14 mai par R. Lang et C. Carré qui notent : « En arrivant au site d'observation, nous avons observé un adulte en vol transportant une proie dans ses serres. L'aigle est allé au nid dans la grotte ».

Nombre de mentions : mars 7, avril 24, mai 12, total 43

Crécerelle d'Amérique *Falco sparverius*

Rimouski, 11 ind. le 1^{er} mai par J. Boulva qui note : « Généralement solitaires, très nombreuses. Une vue attaquant une Buse pattue posée sur un arbre en bordure d'un champ ».

Nombre de mentions : avril 73, mai 80, total 153

Faucon émerillon *Falco columbarius*

Saint-Anaclet-de-Lessard, 1 ind. le 14 mars par P. Jourdain et D. Beaulieu qui notent : « Le 10 mars au matin, découverte de la dépouille d'une Tourterelle triste à ma mangeoire derrière la maison. Deux jours plus tard, une autre tourterelle a subi le même sort et une autre s'est fait étourdir sérieusement. Dans les 2 cas de mortalité, seules les entrailles et la tête des victimes ont été mangées. Pas de coupable dans les environs. Le 14 mars au matin, le coupable fait surface. Il pourchasse mes tourterelles à fond de train et se perche dans l'érable derrière la maison près des mangeoires sans victime cette fois. C'est le Faucon émerillon qui est le chasseur qui pige dans ce garde-manger naturel ».

Amqui, 3 ind. le 31 mars par S. Dumont qui note : « Une femelle qui s'accouple à deux mâles à tour de rôle, puis la poursuite des mâles s'engage. Le rituel se passe plusieurs fois par jour selon les propriétaires du terrain où se trouve le trio ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Accouplements répétés » (date hâtive actuelle : le 27/04/2001 à Sainte-Félicité par J. Deschênes et D. Desjardins).

Amqui, 1 ind. le 9 avril par R. Lang et Y. Angers qui notent : « Alors que j'étais dehors, près de la maison, j'entends les cris d'un rapace : en m'approchant de la rivière, j'aperçois un Faucon émerillon qui fait des cercles tout en

étant houspillé par une corneille. Il s'éloigne et je vois une autre corneille sur le bord du quai qui mange quelque chose que je ne peux pas identifier. Au bout d'une ou deux minutes, cette corneille se déplace et c'est alors que je peux voir son repas, soit une tourterelle. Je présume que le faucon avait attaqué et blessé la tourterelle et que la corneille s'est empressée de la lui voler ».

Sainte-Luce, 1 ind. le 3 mai par R. Claveau et L. Claveau qui notent : « Un mâle déguste un Quiscale bronzé pendant DEUX heures. Le rapace prend son temps avec de longs et fréquents arrêts pour plumer puis déguster sa victime. Tout se passe au sol sous les branches basses. À la fin, il ne reste que la tête, décapitée et intacte, et un paquet de plumes. Il a avalé les entrailles, les muscles, les os ».

Nombre de mentions : mars 4, avril 41, mai 39, total 84

Faucon gerfaut *Falco rusticolus*

Métis-sur-Mer, 1 ind. le 13 mars par R. Pintiaux qui note : « De forme grise, posé sur un gros bloc de glace devant le phare. [Ornitho-Qc] ».

Saint-Fabien, belvédère Raoul-Roy, 1 ind. le 16 avril par D. Desjardins.

Nombre de mentions : mars 1, avril 1, total 2

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

Première mention de la saison : Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 1 ind. le 30 mars par L. Brisson.

Rivière Hâtée, 2 ind. le 9 avril par R. Pitre qui note : « Les deux individus sont dans la falaise ».

Cacouna, marais, 2 ind. le 20 avril par É. Sabourin et S. Binet qui notent : « Un couple observé pendant plus de 20 minutes. Se posent ensemble sur la cimenterie et font plusieurs vols aux alentours. Se posent aussi dans la falaise derrière la cimenterie. Photo (de loin) où on voit les deux ensemble ».

Pointe-au-Père, 1 ind. le 27 avril par A. Brisson qui note : « Il a foncé et plongé à une couple de mètres de ma face alors que je regardais mes petits oiseaux de la fenêtre salon : grosseur d'une corneille avec le dos foncé et quand il se relève, je lui vois le blanc crème du ventre et la tête d'un faucon. Vitesse d'un éclair et après l'événement, un Jaseur boréal a une patte cassée et pendante sans toutefois faire le lien avec le passage du Faucon pèlerin ».

Cacouna, 1 ind. le 6 mai par M. Beaulieu qui note : « Un individu observé perché sur le silo près de la falaise ».

Cacouna, 2 ind. le 10 mai par S. Rhéaume lors d'une excursion du COBSL qui note : « Une femelle est observée couvant au nid, sur le plus récent nid de Grand Corbeau, dans la partie ouest de la carrière. Un autre adulte est observé au vol par la suite ; observation faite au haut de la montagne ».

Nombre de mentions : mars 2, avril 24, mai 19, total 45

Foulque d'Amérique *Fulica americana*

Rimouski-Est, Étangs d'épuration, 1 ind. le 6 mai par R. Saint-Laurent et L. Saint-Laurent. L'oiseau est revu au même endroit le 9 mai par R. Pelletier.

Nombre de mentions : mai 2

Grue du Canada *Grus canadensis*

Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 2 ind. le 10 mai par D. Desjardins.



Grue du Canada, Denis Desjardins

Cacouna, 2 ind. le 10 mai par S. Rhéaume et le COBSL.
 Saint-Fabien, belvédère Raoul-Roy, 2 ind. le 10 mai par L. Brisson.
 Nombre de mentions : mai 3

Pluvier bronzé *Pluvialis dominica*

Mention unique : Saint-Fabien, 1 ind. le 26 avril par G. Rivard et C. Cossette. Voici le commentaire fait à G. Rivard par J. Larivée à la suite du visionnement de photos transmises par Mme Rivard : « *C'est un oiseau en mue. J'ai l'impression que le bec est trop long et la poitrine trop pâle pour qu'il s'agisse d'un Pluvier doré d'Eurasie. De plus, les ailes semblent dépasser la queue d'une bonne longueur. Par contre, il est difficile de savoir s'il s'agit d'un Pluvier du Pacifique ou d'un Pluvier bronzé. Beaucoup plus probable est le Pluvier bronzé, d'autant plus que certaines photos montrent qu'il a la nuque pâle, ce qui est le cas chez cette espèce* ».



Pluvier bronzé, Ghislaine Rivard

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (31), été (22), automne (1010), hiver (0), total (1063).

Pluvier semipalmé *Charadrius semipalmatus*

Pointe-au-Père, 36 ind. le 29 mai par J. Larivée qui note : « J'ai observé plusieurs comportements d'intimidation (gonflement des plumes du front, du dos, du collier, étalement des rectrices, adoption de postures de menaces, cris, brèves envolées face à face) lorsque deux Pluviers semipalmés s'approchaient l'un de l'autre ».



Pluvier semipalmé, Jacques Larivée

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

Île Verte, 1 ind. le 23 mai par Y. Gauthier, S. Morand et le Club d'ornithologie de Longueuil ; Y. Gauthier note : « Ce courlis fut observé les 23-24 et 25 mai, face au motel Entre Deux Marées. Il fréquentait les portions herbeuses du littoral. L'oiseau n'a pas crié. Il fut vu en vol à trois reprises, ce qui a permis de noter les sous-alaires pâles et la pointe blanche qui part du croupion et s'avance au milieu du dos. L'espèce fut identifiée comme étant un Courlis corlieu de la race européenne ».



Courlis corlieu de la race européenne, Yves Gauthier

Nombre de mentions : mai 3

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

Île Verte, 1 ind. les 24 et 25 mai par Y. Gauthier, S. Morand et le Club d'ornithologie de Longueuil.

Nombre de mentions : mai 2

Bécasseau à croupion blanc *Calidris fuscicollis*

Île Verte, 1 ind. le 24 mai par Y. Gauthier, S. Morand et Club d'ornithologie de Longueuil.

Pointe-au-Père, 2 ind. le 29 mai par R. Pelletier.

Rimouski, Sentier du Littoral, 1 ind. le 31 mai par F. Villeneuve et A. Villeneuve.

Nombre de mentions : mai 3

Bécasseau de Baird *Calidris bairdii*

Rimouski, 2 ind. le 28 mai par J. Boulva qui note : « Les deux oiseaux ont été observés de longues minutes sur la plage de l'Anse aux Bécasseaux à Pointe-au-Père, avec un excellent éclairage. Ils étaient plus gros que les B. minuscules aussi présents et se tenaient surtout sur le haut de la plage où ils picoraient le sable sec par de rapides coups de bec. Au début, j'ai pensé à des B. à croupion blanc à cause de leur taille, mais les flancs blancs immaculés (pas de rayures) et le chamois de la poitrine qui s'arrêtait haut sur celle-ci, leur allure générale pâle, pointaient vers une autre espèce. Les pattes étaient noires et les ailes dépassaient très légèrement le bout de la queue. Le dos ressemblait davantage à celui de l'adulte internuptial à la p. 159 du Sibley, plutôt qu'à l'adulte nuptial illustré dessous. J'étais avec une observatrice qui a moins d'expérience que moi, mais elle a aussi conclu que c'est l'espèce la plus probable parmi les bécasseaux illustrés dans le Sibley. Rosaire Pelletier, un observateur de longue expérience, est arrivé sur les entrefaites et, après un bon examen des deux oiseaux au télescope, a aussi conclu au Baird. Malheureusement, il n'y a pas eu de photo de prise, on n'avait pas l'équipement nécessaire ». Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière tardive (ancienne date tardive : le 26/05/1984 à Cacouna par C. Marcotte, B. Vanier et R. Sélesse).

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (1), été (4), automne (254), hiver (0), total (259).

Nombre de mentions : mai 2

Phalarope de Wilson *Phalaropus tricolor*

Rimouski, Baie, 1 ind. les 15 et 17 mai par J-É. Joubert.

Nombre de mentions : mai 2

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*

Cabano, 110 ind. le 19 mai par M. Beaulieu qui note : « *La colonie qui avait commencé à nicher aux étangs d'épuration des eaux de la ville est détruite* ».

Nombre de mentions : mars 5, avril 108, mai 124, total 237

Goéland argenté *Larus argentatus*

Rimouski, 2 ind. le 11 mars par L. Masson qui note : « *Un couple de Goélands argentés crieurs et excités sur le toit de la Caisse populaire sur la rue de l'Évêché; comportement nicheur* ».

Nombre de mentions : mars 31, avril 134, mai 130, total 295

Goéland brun *Larus fuscus*

Rivière Rimouski, 4 ind. le 24 avril par J. Larivée et R-J. Dionne qui notent : « *Quatre adultes de la sous-espèce graellsii qui se tiennent avec les Goélands argentés, marins et bourgmestres. Légèrement plus petits que les mâles Goéland argenté* ». Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum printanier (ancien record : 3 ind. à Rimouski le 25/04/2003 par R. Pelletier).

Nombre de mentions : mars 1, avril 2, mai 1, total 4

Mergule nain *Alle alle*

Mention unique : Pointe-au-Père, 1 ind. le 30 mai par L. Saint-Laurent et A. Harvey qui notent : « *Très petit, sans cou noir dessus la gorge noire, du blanc au ventre, petite queue retroussée et corps trapu : plonge souvent* ».

NDLR : Normalement, à cette date, les Petits Pingouins couvent encore. Cependant, toute mention printanière ou estivale du Mergule nain dans le Bas-Saint-Laurent devrait montrer qu'on a tenu compte de la possibilité qu'il s'agisse de jeunes pingouins.

Mentions antérieures de cette espèce : printemps (5), été (6), automne (92), hiver (28), total (131).

Petit Pingouin *Alca torda*

Métis-sur-Mer, 6 ind. le 12 avril par J-P. le Bel qui note : « *Six individus sur le centre de la grosse Boule près d'une crevasse; un accouplement au sol* ».

Nombre de mentions : avril 5, mai 6, total 11

Tourterelle triste *Zenaida macroura*

Rimouski, 2 ind. le 1^{er} mars par L. Masson qui note : « *Il est 5 h 50 et il fait noir encore; deux tourterelles chantent. Elles ont commencé à chanter dans ma cour à la dernière pleine lune, environ vers le 20 février* ».

Rimouski, 1 ind. le 13 avril par L. Masson qui note : « *Voilà comment elle boit de l'eau dans la «slush» sur ma mangeoire : son bec fermé formant une paille, elle suce le liquide de forts moments dans sa gorge* ».

Nombre de mentions : mars 130, avril 200, mai 237, total 567

Grand-duc d'Amérique *Bubo virginianus*

Saint-Marcellin, 2 ind. le 6 avril par L. Saint-Laurent qui note : « *Dans la nuit du 5 au 6 avril, j'ai entendu un Grand-duc faire son hululement et après un deuxième hululement lui répond; le tout a duré 10 minutes* ».

Saint-Anaclet-de-Lessard, 1 ind. le 31 mai par J. Boulva qui note : « *Entendu trois fois à 4 h 35, à l'extrémité est du lac à l'Anguille* ».

Nombre de mentions : avril 7, mai 3, total 10

Harfang des neiges *Bubo scandiacus*

Île Verte, 1 mâle le 24 mai par Y. Gauthier, S. Morand et le Club d'ornithologie de Longueuil ; Y. Gauthier note : « Ce harfang mâle fut observé dans une petite clairière en plein cœur de la forêt. Il était posé sur une roche et s'est envolé pour se percher au faite d'un grand conifère ».

Nombre de mentions : mars 2, mai 1, total 3

Chouette rayée *Strix varia*

Lac des Huit Milles (Sainte-Irène), 2 ind. le 14 mai par R. Lang qui note : « Dans une érablière, il y a un érable que les Chouettes rayées utilisent comme nid depuis quelques années : l'érable est incliné et de bonne taille dans le flanc d'une montagne pas très abrupte et orientée nord-est. Il y a une grosse branche de cassée, laissant une cavité à l'intérieur du tronc. Cette cavité, qui sert de nid, est située entre 30 et 40 pieds de la base de l'arbre et il reste environ 25 pieds de tronc au-dessus du nid. Vu du sol, il n'y a rien qui indique que des chouettes y nichent. Ce soir, je me suis rendu afin de vérifier si les chouettes étaient présentes encore cette année. Ce n'est que vers 19 h 40 que l'une d'elles a commencé à se manifester. Une dizaine de minutes plus tard, j'ai pu apercevoir et entendre le couple. Je me suis donc installé à un endroit pas très éloigné de l'arbre où se trouve le nid et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, la femelle est venue se percher pas loin et y est restée une minute pour ensuite se diriger vers le nid. Je l'observais avec mes jumelles et je l'ai vue entrer à l'intérieur de la cavité ; une fois installé sur le nid, l'oiseau est complètement dissimulé ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Adulte au nid » (date hâtive actuelle : le 18/05/2003 à Sainte-Irène par R. Lang).

Le 25 mai, le même observateur note : « En arrivant dans le secteur où les chouettes nichent, j'ai observé le nid aux jumelles et je pouvais apercevoir le dessus de la tête de la femelle qui était au nid à couvrir les oeufs. Par après, je me suis approché pour prendre des photos et chercher au pied de l'arbre des boulettes de régurgitation que je n'ai pas trouvées. Ensuite, je me suis éloigné et installé afin de pouvoir observer le nid de loin et attendre qu'une des chouettes se manifeste. Il était 19 h 15. En attendant de voir de l'action, les grives et les Parulines couronnées ont agrémenté mon attente de leur concert. J'observais souvent la partie de l'arbre où se trouve le nid dans l'espoir d'apercevoir une chouette. Vers 19 h 45, les merles ont commencé à émettre des cris d'alerte. Je savais alors qu'une chouette avait commencé à se déplacer. En tournant la tête en direction d'où venaient les cris, j'ai aperçu le mâle qui était perché non loin de moi. L'oiseau n'y est resté que quelques secondes et s'envola plus loin. Je l'aperçois à nouveau qui se déplace et j'entends toujours les merles crier puis la chouette commence à émettre des «Hooooaw» à quelques reprises. À 19 h 55, elle est venue se percher à environ 25 mètres du nid et elle y était encore lorsque j'ai quitté à 20 h 20. Durant ces 25 minutes qu'il est resté perché sur la même branche, le mâle faisait le toilettage de ses plumes et à l'occasion, regardait vers le sol ou tournait la tête vers la gauche ou vers la droite. Il était très bien dissimulé perché près du tronc de l'arbre. Je n'ai pas vu la femelle hors du nid et elle n'a émis aucun son ; elle est restée très discrète. La température était idéale : doux, pas de vent et pas de bruits. Seuls les oiseaux brisaient le silence avec leurs chants ou leurs cris. Je peux dire que j'ai passé «Une soirée chouette au chant des grives ».

Nombre de mentions : avril 4, mai 5, total 9

Hibou des marais *Asio flammeus*

Première mention de la saison : Pointe-au-Père, 1 ind. le 10 avril par G. Gendron qui note : « Des cris de corneilles ont attiré mon attention et un examen du ciel m'a permis de voir 4 corneilles à la poursuite d'un oiseau de proie qui s'est avéré être un Hibou des marais. Celui-ci a pris de plus en plus d'altitude sûrement dans le but de se débarrasser de ses harceleurs... ce qui fut fait après quelques minutes. Il se dirigeait alors de l'ouest vers l'est ».

Rimouski-Est, aéroport, 1 ind. le 25 avril par J. Marcoux, M. Bellavance et le COBSL.

Pointe-au-Père, tourbière, 1 ind. le 28 avril par M. McCarthy qui note sur le groupe de discussion COBSL : « En marchant derrière chez-moi, dans la tourbière du secteur de Pointe-au-Père, j'ai vu un Hibou des marais. Il était 18 h 15, il a pris son envol, il était au sol tout près de moi ».

Sainte-Luce, 273 Rang 2 Est, 1 ind. le 3 mai par L. Lefebvre et R. Dorais qui notent : « Le long du chemin Carrier, entre la 20 en construction et le deuxième rang est ; je l'ai levé ».

Rimouski-Est, aéroport, 1 ind. le 6 mai par J. Marcoux et S. Rhéaume qui notent : « L'individu est repéré alors qu'il

survole une friche; il va ensuite se percher au sommet d'un Mélèze assez haut. Il y reste un bon moment, très alerte, tournant la tête au moindre bruit et au moindre mouvement. Le Hibou se met ensuite à faire sa toilette, soit le lissage des plumes des ailes et de la queue ».

Nombre de mentions : avril 4, mai 2, total 6

Petite Nyctale *Aegolius acadicus*

Première mention de la saison : Saint-Anaclet-de-Lessard, 1 ind. le 22 avril par S. Rhéaume et J. Marcoux.

Lac Légaré (Packington), 1 ind. le 27 mai par M. Beaulieu qui note : « *Un individu chante en plein jour* ».

Nombre de mentions : avril 2, mai 3, total 5

Engoulevent d'Amérique *Chordeiles minor*

Mention unique : Lac des Joncs, 1 ind. le 30 mai par S. Rhéaume, M. Bellavance et J. Marcoux.

Martinet ramoneur *Chaetura pelagica*

Cacouna, marais, 15 ind. le 18 mai par É. Sabourin.

Nombre de mentions : mai 5

Martin-pêcheur d'Amérique *Ceryle alcyon*

Saint-Eusèbe, 1 ind. le 11 mai par M. Beaulieu qui note : « *Un individu entre dans un trou creusé dans une gravière* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « *Adulte au nid* » (date hâtive actuelle : le 23/05/1992 à Saint-Eusèbe par M. Beaulieu).

Nombre de mentions : avril 11, mai 82, total 93

Pic à dos noir *Picoides arcticus*

Île Saint-Barnabé, 1 ind. *dans un chablis au centre de l'île* le 22 mai par J-É. Joubert, F. Bruaux et M. Labrecque.

Nombre de mentions : mai 8

Moucherolle à côtés olive *Contopus cooperi*

Mention unique : Sainte-Blandine, 2 *mâles chanteurs* le 31 mai par R. Saint-Laurent, V. Antoine et J. Proulx-Brisson.

Moucherolle à ventre jaune *Empidonax flaviventris*

Lac Anna, 1 ind. le 30 mai par M. Beaulieu qui note : « *Un individu chante dans une cédrière à Sapin baumier de plus de 100 ans* ».

Nombre de mentions : mai 4

Moucherolle phébi *Sayornis phoebe*

Première mention de la saison : Saint-Anaclet-de-Lessard, 1 ind. le 12 avril par J-P. Plourde.

Neigette, pont couvert, 2 ind. le 11 mai par L. Lefebvre et R. Dorais qui notent : « *À la lisière d'un boisé, le long de la rivière Neigette, près du pont couvert entre Neigette et Saint-Donat, deux Moucherolles phébis, sons et images* ».

Rimouski, chemin La Couronne, 2 ind. le 21 mai par R. Saint-Laurent et L. Saint-Laurent qui notent : « *Nichent en-dessous du pont; le mâle faisait son «phébi»* ».

Nombre de mentions : avril 13, mai 19, total 32

Tyran huppé *Myiarchus crinitus*

Saint-Eusèbe, 1 ind. le 15 mai par M. Beaulieu qui note : « *Un oiseau chante dans la forêt inondée qui longe la rivière Cabano* ».

Forêt refuge du Grand-Lac-Macpès, 1 ind. le 25 mai par R. Saint-Laurent.

Nombre de mentions : mai 2

Viréo à tête bleue *Vireo solitarius*

Première mention de la saison : Saint-Eusèbe, 1 mâle chanteur le 26 avril par M. Beaulieu. Cette mention constitue une référence hâtive à « Mâle chanteur » (date hâtive actuelle : le 01/05/1993 à Saint-Eusèbe par M. Beaulieu).
Nombre de mentions : avril 1, mai 103, total 104

Mésangeai du Canada *Perisoreus canadensis*

Mont Longue-Vue, 2 ind. le 18 mars par R. Deschênes et G. Auclair qui notent : « Deux adultes se perchent sur une souche renversée dont le système racinaire fait partiellement jour hors de l'épais couvert de neige. La souche est mise en andin sur le mont Longue-Vue. Les deux individus arrachent plusieurs petites racines et s'envolent sur une courte distance avant de s'engouffrer dans un taillis de conifères et en ressortir le bec vide tous les deux ! Observation captivante ! ».

Nombre de mentions : mars 5, avril 3, mai 2, total 10

Geai bleu *Cyanocitta cristata*

Île Verte, 56 ind. le 25 mai par Y. Gauthier, S. Morand et Club d'ornithologie de Longueuil ; Y. Gauthier note : « Cinquante-six (56) Geais bleus regroupés haut en vol au-dessus de la pointe ouest de l'île ».

Nombre de mentions : mars 116, avril 114, mai 166, total 396

Corneille d'Amérique *Corvus brachyrhynchos*

Saint-Eusèbe, 16 ind. le 18 mars par M. Beaulieu qui note : « Un couple s'accouple à au moins trois reprises en une vingtaine de minutes sur une branche d'Épinette de Norvège. ». La note « Accouplements répétés » est associée pour la première fois à cette espèce. De plus, cette mention constitue une référence hâtive à « Accouplement perché » (date hâtive actuelle : le 02/04/2004 à Pointe-au-Père par A. Brisson).

Rimouski, 2 ind. le 2 avril par L. Masson qui note : « Deux corneilles arrachent des petites branches de 5 à 10 centimètres sur un gros tilleul. Un individu est plus actif que l'autre et en empile plusieurs dans son bec, puis va construire son nid dans la tête d'une grosse Épinette bleue ».

Sainte-Luce, Rang 2 Est, 200 ind. le 4 avril par L. Lefebvre qui note : « Des chasseurs de corneilles ont installé des appâts (carcasses) entre le rang 2 et le rang 3 est ».

Rivière-Trois-Pistoles, 5 ind. le 30 mai par H. Rioux et P. Dumas qui notent : « Corneille et 4 petits au nid dans une falaise près de la rivière Trois-Pistoles ».

Nombre de mentions : mars 171, avril 318, mai 326, total 815

Grand Corbeau *Corvus corax*

Mont Longue-Vue, 16 ind. le 7 avril par R. Deschênes qui note : « Quelques couples en parade aérienne de même qu'un accouplement perché au sommet d'un chicot de résineux. ». La note « Accouplement perché » est associée pour la première fois à cette espèce.

Le Bic, Marina, 6 ind. le 3 mai par J. Larivée, D. Gagné, J. Dufour et J. Fortin qui notent : « Deux individus, perchés un peu à l'abri des regards, se lissent mutuellement les plumes du cou et de la tête ».

Nombre de mentions : mars 114, avril 166, mai 201, total 481

Hirondelle bicolore *Tachycineta bicolor*

Lac Castonguay, 2 ind. le 18 avril par R. Lang qui note : « Je me suis rendu au lac Castonguay, aujourd'hui, pour nettoyer les nichoirs à hirondelles. En arrivant à l'avant du dernier nichoir, j'aperçois, à ma grande surprise, deux Hirondelles bicolores perchées non loin. Lorsque j'ai commencé à ouvrir le nichoir, les deux hirondelles ont foncé vers moi et m'ont houspillé par trois fois. Elles avaient un comportement agressif comme si elles étaient en période de nidification et qu'elles voulaient défendre le nid. Lorsque j'ai eu fini le nettoyage, j'ai continué ma randonnée et sur le chemin du retour, en passant près du nichoir en question, l'une des hirondelles a encore foncé vers moi. J'ai été étonné d'un tel comportement si tôt au printemps et aussi c'était mon observation la plus hâtive d'Hirondelle bicolore à Amqui ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Utilise un nichoir » (date hâtive actuelle : le 07/05/1998 à Rivière-du-Loup par R. Bouchard) et une référence hâtive à « Défense du

territoire » (date hâtive actuelle : le 11/05/1998 à Rimouski par L. Masson).

Amqui, 13 ind. le 22 mai par R. Lang qui note : « *Le mâle du couple qui niche chez moi est venu chercher, dans ma main, une plume. Il va se percher sur la corde à linge, la femelle vient le trouver et il donne la plume à la femelle qui va la porter au nid* ». La note « Offrande de matériaux de construction » est associée pour la première fois à cette espèce.

Sainte-Odile-sur-Rimouski, 5 ind. dont *un nid contenant des jeunes* le 31 mai par A. Villeneuve, F. Villeneuve, É. Villeneuve, J. Villeneuve et A. Bourassa. Cette mention constitue une référence hâtive à « Nid contenant des jeunes » (date hâtive actuelle : le 06/06/2003 à Sainte-Isèbe par S. Brodeur).

Nombre de mentions : avril 40, mai 236, total 276

Hirondelle à front blanc *Petrochelidon pyrrhonota*

Lac Saint-Mathieu, 2 ind. le 24 mai par R. Fortin et R. Pelletier qui notent : « *Sous le pont situé à l'est du lac, on a repéré trois nids dont au moins deux étaient occupés* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Adulte au nid » (date hâtive actuelle : le 27/05/2006 à Saint-Anaclet-de-Lessard par R. et L. Saint-Laurent).

Nombre de mentions : mai 20

Mésange à tête noire *Poecile atricapillus*

Amqui, 2 ind. le 12 mai par R. Lang et Y. Angers qui notent : « *Transport de matériel dans un nichoir pour construire un nid. Lorsqu'un Pic mineur s'approche trop près du nichoir, les deux mésanges foncent sur lui pour qu'il s'éloigne* ». Le lendemain, le même observateur note : « *Pendant que la femelle apporte des matériaux pour la construction du nid, le mâle surveille, inspecte le nid, siffle et frémit des ailes lorsque la femelle se perche* ». Puis, le 16 mai, il note : « *Seul le mâle du couple vient au nichoir où il se perche et appelle la femelle en sifflant. Il semble que la femelle n'y est plus, car il n'y a pas eu d'activité de la journée au nichoir, sauf les quelques présences du mâle qui cherche sa compagne* ». L'histoire continue le 22 mai : « *Après quelques jours, voilà que la femelle est de retour et elle apporte au nid quelque chose qui ressemble à du duvet* », puis le jour suivant : « *Entre 6 h et 7 h 15, le mâle apporte de la nourriture au nichoir à deux reprises. Il entre dans le nichoir et en ressort aussitôt : ce comportement confirme que la femelle est sur le nid et couve ses oeufs. La nourriture est des amandes de graines de tournesol* ». La note « Adulte nourrit au nid » est associée pour la première fois à cette espèce.

Enfin, le 26 mai, Ronald note : « *Le mâle apporte de la nourriture à la femelle qui couve. Des fois, il apporte des amandes de graines de tournesol alors que d'autres fois, c'est autre chose. Des fois, il entre dans le nichoir et d'autres fois, il ne fait qu'entrer la tête dans le trou. Il y a des visites qui sont très rapprochées et chaque visite dure environ 6 secondes. Le mâle, lorsqu'il arrive, se perche non loin du nichoir et il siffle pour avertir la femelle qu'il est là, puis il se rend au nichoir pour remettre la nourriture à la femelle* ».

Nombre de mentions : mars 165, avril 197, mai 264, total 626

Mésange bicolore *Baeolophus bicolor*

Pointe-au-Père, 1 ind. le 13 mars par R. Saint-Laurent et L. Saint-Laurent. Le même individu est observé une dernière fois le 17 mars par R. Pelletier qui note : « *Cet avant-midi, à 10 h 15, j'ai observé à loisir la Mésange bicolore. Elle était aux mangeoires de France Lévesque* ».

Nombre de mentions : mars 2

Sittelle à poitrine blanche *Sitta carolinensis*

Nombre de mentions : mars 5, avril 19, mai 7, total 31

Merlebleu de l'Est *Sialia sialis*

Première mention de la saison : Sainte-Blandine, 1 ind. le 21 avril par L. Brisson.

Rimouski, 1 ind. le 31 mai par L. Robichaud qui note : « *À 5 h 10, il est perché sur ma corde à linge ; il sautille sur la pelouse pleine de rosée. Il repart le bec plein et revient quelques minutes plus tard. À 11 h 50, il est perché sur le fil électrique ; il descend souvent au sol et remonte sur le fil environ 15 minutes ; c'est un mâle* ». Cette mention

constitue une référence hâtive à « Transport de nourriture » (date hâtive actuelle : 14/06/1992 à Saint-Elzéar-de-Témiscouata par R. Deschênes).

Sainte-Blandine, Chemin Saint-Gérard, 1 ind. le 31 mai par J. Proulx-Brisson qui note : « *Se tient sur notre clôture de pieux; on espère qu'il va trouver l'âme sœur pour rester avec nous* ».

Nombre de mentions : avril 2, mai 7, total 9

Moqueur polyglotte *Mimus polyglottos*

Pointe-au-Père, 2 ind. le 30 mai par J. Marcoux, M. Bellavance et S. Rhéaume qui notent : « *Un couple est observé en face d'un chalet: la femelle transporte du matériel de nidification (long brin d'herbe) dans un cèdre accolé au chalet* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Transport de matériel » (date hâtive actuelle : le 14/06/1981 à Rimouski par P. Dupal).

Nombre de mentions : mai 3

Moqueur roux *Toxostoma rufum*

Première mention de la saison : Rimouski, 1 ind. le **17 avril** par A. Boulianne qui note : « *Ce matin à 6 h 25, il y avait un Moqueur roux dans ma cour qui cherchait de la nourriture sous les feuilles dans les rares coins où il n'y a plus de neige. Une belle surprise après un tel hiver* ». [Courriel transmis à Rosaire Pelletier et publié sur le groupe de discussion COBSL]. Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière hâtive (ancien record : le 28/04/1982 à Rimouski par J. Rocheleau).

Nombre de mentions : avril 1, mai 19, total 20

Jaseur boréal *Bombycilla garrulus*

Rimouski, 14 ind. le 17 avril par J. Boulva qui note : « *Comportement comme le Jaseur d'Amérique, ne sont pas en groupe, sont dispersés en ville et chassent les insectes un peu comme un moucherolle. C'est la première fois que j'observe un tel comportement chez cette espèce* ».

Pointe-au-Père, 100 ind. le 21 avril par J. Larivée et R-J. Dionne qui notent : « *Les Jaseurs boréaux mangent des fruits d'argousier et s'alimentent en bandes au sol. J'ai pu prendre plusieurs photos des oiseaux qui étaient calmes et peu craintifs* ».



Jaseur boréal. Jacques Larivée

Nombre de mentions : mars 5, avril 59, mai 13, total 77

Jaseur d'Amérique *Bombycilla cedrorum*

Première mention de la saison : Saint-Antonin, 2 ind. le 29 mars par D. Bérubé et J. Després.

Nombre de mentions : mars 1, mai 15, total 16

Paruline verdâtre *Vermivora celata*

Mention unique : Rimouski, 1 ind. le long de la rivière Rimouski le 22 mai par G. Gendron.

Paruline à gorge noire *Dendroica virens*

Parc national du Bic, secteur Saint-Fabien, 1 ind. le **26 avril** par S. Royer Tardif et C. Desroches. Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière hâtive (ancien record : le 03/05/1995 à Rimouski par R. Saint-Laurent).

Nombre de mentions : avril 1, mai 66, total 67

Paruline des pins *Dendroica pinus*

Mention unique : Lac à Chamard, 1 ind. le 9 mai par M. Beaulieu qui note : « *Un mâle chanteur dans une pinède à Pin blanc et Pin rouge* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Mâle chanteur » (date hâtive actuelle : le 13/05/2006 à Saint-Eusèbe par M. Beaulieu).

Paruline à couronne rousse *Dendroica palmarum*

Première mention de la saison : Lac à l'Anguille, 1 *mâle chanteur* le 28 avril par J. Marcoux. Cette mention constitue une référence hâtive à « Mâle chanteur » (date hâtive actuelle : le 05/05/2000 à Pointe-au-Père par R. Fortin et Y. Dion).

Lac à Chamard, 3 ind. le 26 mai par M. Beaulieu qui note : « *Trois mâles chanteurs dans un peuplement d'Épinette* ».

noire de 1 à 3 mètres de haut avec quelques îlots de tiges de 5 à 7 mètres de haut. Peuplement issu d'une coupe totale de 1997 sur un site très humide (sphaignes et éricacées) ».

Nombre de mentions : avril 1, mai 5, total 6

Bruant hudsonien *Spizella arborea*

Première mention de la saison : Sainte-Blandine, 1 ind. le 10 avril par J. Proulx-Brisson.

Nombre de mentions : avril 44, mai 74, total 118

Bruant familial *Spizella passerina*

Le Bic, 12 ind. le 18 mai par L. Masson et J-L. Camiré qui notent : « *Rare que je note 12 individus dans le bois entre une pinède de Pin gris et le champ ; comportement nicheur et un couple sur le bord de s'accoupler* ».

Nombre de mentions : avril 28, mai 214, total 242

Bruant des prés *Passerculus sandwichensis*

Pointe-au-Père, 1 ind. le 26 mai par A. Brisson qui note : « *Une forme très foncée pour ressembler davantage à un Bruant fauve pour ses rayées noir/brun ; calotte spécialement foncée avec un filet de blanc allant de l'arrière du front jusqu'à la fin de la calotte en arrière. Très dessiné, c'est-à-dire qu'on observe davantage ses petits traits blancs, joues spécialement noires, le rayé descend en bas de la poitrine et se trouve sur le ventre. Je n'ai pas vu le blanc du ventre. Une sous-espèce, laquelle ?* ».

Nombre de mentions : avril 26, mai 129, total 155

Bruant chanteur *Melospiza melodia*

Rimouski, 1 ind. le 3 mai par L. Masson qui note : « *Un étonnant mâle chanteur lance une mélodie à 2 h du matin, très claire. Depuis une semaine, il débute son chant à exactement 4 h 30 du matin* ».

Pointe-au-Père, 2 ind. le 9 mai par A. Brisson qui note : « *Parade devant la femelle qui se tient dans le bas d'un arbuste ; le mâle fait des allers et venues vers l'arbuste une dizaine de fois ; il lève sa queue et marche* ». Cette mention constitue une référence tardive à la note « Parade nuptiale » (date tardive actuelle : le 30/04/1998 à Rimouski, Sacré-Cœur par C. Robin).

Nombre de mentions : mars 2, avril 164, mai 281, total 447

Bruant à gorge blanche *Zonotrichia albicollis*

Saint-Fabien, Belvédère Raoul-Roy, 15 ind. le 12 mai par D. Desjardins.



Bruant à gorge blanche, Denis Desjardins

Lac de la Montagne, 8 ind. le 12 mai par J. Larivée qui note : « *Un individu à la tête brune poursuit avec assiduité un individu aux rayures blanches. Les deux oiseaux, peu craintifs, volent à hauteur d'un mètre et moins, d'un vol papillonné. Ils parcourent un trajet presque circulaire et passent près de moi comme si je n'étais pas là. C'est ce que Stoke appelle le vol frémissant qui est un prélude à la copulation* ».

Baseley, 10 ind. le 15 mai par M. Beaulieu qui note : « *Un individu au nid ; nid dans la cime d'un Sapin baumier qui est renversé au sol. L'habitat est une érablière à bouleau jaune* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Adulte au nid » (date hâtive actuelle : le 14/06/2002 à Pointe-au-Père par J-L. Martel).

Nombre de mentions : avril 53, mai 303, total 356

Junco ardoisé *Junco hyemalis*

Saint-Eusèbe, 300 ind. le 20 avril par M. Beaulieu. Cette mention constitue un nouveau nombre d'individus maximum printanier (ancien record : 280 ind. à Saint-Eusèbe, le 18/04/1994 par M. Beaulieu).

Nombre de mentions : mars 16, avril 150, mai 224, total 390

Bruant lapon *Calcarius lapponicus*

Mention unique : Cacouna, 1 ind. le 1^{er} mars par D. Bérubé et J. Després. Cette mention constitue une nouvelle date d'observation printanière hâtive (ancien record : le 04/03/1994 à Sainte-Luce par C. Brassard).

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*

Pointe-au-Père, 4 ind. le 9 mars par G. Rioux qui note : « *Depuis plusieurs années, j'observe qu'ils viennent chez moi lors de très grands vents, de poudrerie ou lors des tempêtes où tout est fermé sur les routes avec visibilité nulle* ».

Mont-Joli, 5 000 ind. le 12 avril par J-P. le Bel qui note : « *Des nuées de Bruants des neiges s'abattent dans les champs à l'est de l'aéroport. Très mobiles* ».

Métis-sur-Mer, 1 000 ind. le 15 avril par J. Boulva et N. Charest qui notent : « *Mille (1000) estimé en un seul énorme groupe dans des champs le long de la route 132. Un autre groupe aussi important observé vers 14 h 30*

sur le 2e rang, 2 km à l'ouest de Mont-Joli ».

Sainte-Luce, rang 2 Est, 5 000 ind. le 17 avril par L. Lefebvre qui note : « Très grande volée (nombre difficile à évaluer) se mouvant comme une entité, vue aussi la veille par Louis Fradette au même endroit ».

Lac de la Montagne, 1 ind. le 1^{er} mai par J. Larivée qui note : « Étrange présence d'un Bruant des neiges en forêt. L'oiseau s'alimente dans le chemin forestier, mais se sauve en forêt lorsque je l'approche. Il vole bas parmi les arbres, se perche sur une souche. Au retour, je le retrouve dans le chemin et voilà qu'il se remet à voler bas à travers les arbres. J'ai pris quelques photos ». Puis, au même endroit le 9 mai : « Il s'agit du même individu observé les jours précédents; aujourd'hui, je l'ai observé perché dans un Sapin baumier ! ».



Bruant des neiges en forêt, Jacques Larivée

Nombre de mentions : mars 27, avril 64, mai 10, total 101

Piranga écarlate *Piranga olivacea*

NDLR : Piranga est le nouveau nom de genre de ce qui était nos tangaras.

Première mention de la saison : Sainte-Blandine, 1 ind. le 16 mai par J. Proulx-Brisson.

Lac Légaré (Packington), 2 ind. le 27 mai par M. Beaulieu qui note : « Deux mâles chantent dans une érablière à Bouleau jaune de forte densité, d'environ 70 ans d'âge et d'au moins 30 hectares de superficie ».

Lac Desrosiers (Saint-Antonin), 1 mâle le 31 mai par C. Douville et J-P. le Bel.

Nombre de mentions : mai 4

Cardinal rouge *Cardinalis cardinalis*

Mention unique : Saint-Eusèbe, 1 femelle le 10 mai par M. Beaulieu qui note : « Une femelle vue près d'un poste d'alimentation, mais ne s'alimente pas; elle reste au sol dans des arbustes ».

Cardinal à poitrine rose *Pheucticus ludovicianus*

Première mention de la saison : Auclair, rang 10, 1 ind. le 9 mai par G. Lagrois.

Nombre de mentions : mai 68

Sturnelle des prés *Sturnella magna*

Première mention de la saison : Saint-Anaclet-de-Lessard, 1 ind. le 22 avril par L. Saint-Laurent et R. Saint-Laurent qui notent : « *Par terre, elle mangeait avec plusieurs Merles d'Amérique dans un champ déneigé ; dessous jaune avec un «V» noir sur la poitrine, dos assez brun et du noir sur les côtés, se confond avec le terrain* ».

Rimouski, 1 ind. le 22 mai par G. Gendron qui note : « *Près des tours de transmission dans le quartier Sacré-Coeur à Rimouski* ».

Nombre de mentions : avril 1, mai 1, total 2

Quiscale rouilleux *Euphagus carolinus*

Première mention de la saison : Le Bic, 3 ind. le 11 avril par J. Boulva et N. Charest.

Lac du Ruisseau des Cèdres, 2 ind. le 17 mai par M. Beaulieu qui note : « *Deux oiseaux chantaient autour d'un vieil étang de castor entouré d'un peuplement de Sapin baumier et d'Épinette noire de 3 à 5 mètres de haut* ».

Lac à Chamard, 2 ind. le 26 mai par M. Beaulieu qui note : « *Deux individus observés en bordure d'un vieil étang de castor entouré d'Aulne rugueux et d'un jeune peuplement résineux d'Épinette noire et de Mélèze laricin de 2 à 4 mètres de haut. Issu d'une coupe totale de 1997 (11 ans)* ».

Nombre de mentions : avril 5, mai 21, total 26

Quiscale bronzé *Quiscalus quiscula*

Première mention de la saison : Rimouski, 1 ind. le 29 mars par L. Masson.

Sainte-Luce, 15 ind. le 15 avril par R. Claveau qui note : « *Deux mâles (d'après le plumage très iridescent) se battent pendant au moins 45 minutes au sol et à la fin le perdant est laissé hébété (13 h 10 à 13 h 55). À 13 h 10, j'ai eu connaissance que deux oiseaux se battaient près de ma fenêtre pas très loin d'un poste d'alimentation très achalandé. Au début, les deux oiseaux virevoltaient presque continuellement et après une dizaine de minutes, j'ai pu voir qu'il y avait un plus fort et un moins fort. Le plus fort s'attaquait de préférence à la région de la tête et du cou à l'aide de son bec et il frappait fréquemment le bout du bec de l'autre, ce qui me semblait une perte d'énergie s'il voulait gagner. Avec le temps, le plus faible est devenu de plus en plus faible et il se faisait régulièrement picosser à la tête et est devenu quasi chauve. Il se lamentait fréquemment. Leurs plumages sont devenus mouillés et ternes avec plein de plumes défaites et cassées. Après quelques séquences de tabassage, le plus fort buvait de l'eau à quelques reprises tout en maintenant son adversaire sous lui. Pour les dernières 35 minutes de l'observation, les deux oiseaux se tenaient fréquemment agrippés par la patte gauche de l'un et la patte droite de l'autre. Le vainqueur, par de violents efforts, a réussi à traîner l'autre en bordure de la montée, mais a été bloqué par un rempart de neige. Pendant la majeure partie du temps, plusieurs corneilles jacassaient fort, passaient et repassaient au-dessus d'eux, parfois de très près. Le gagnant arrêta de se battre à ce moment et surveillait les corneilles. Je m'attendais à une attaque par les corneilles, mais je ne l'ai pas vue. Après 45 minutes de bataille, je suis sorti et j'ai pris une photo. Le gagnant a libéré le perdant à ce moment, mais il est retourné l'attaquer aussitôt que je me suis éloigné. J'ai dû partir ; je ne sais pas s'il a fini par le tuer. À mon retour, le perdant n'était plus là* ».

Saint-Fabien, 20 ind. le 24 mai par L. Masson et J-L. Camiré qui notent : « *Un nid contenant des jeunes ; transport de sac fécal. Nombreux sacs fécaux à exactement 12 mètres du nid, dans et à côté, exactement à côté d'une flaque d'eau dans le chemin de terre* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Nid contenant des jeunes » (date hâtive actuelle : le 30/05/1959 à Trois-Pistoles par le Club des ornithologues de Québec).

Nombre de mentions : mars 2, avril 218, mai 315, total 535

Vacher à tête brune *Molothrus ater*

Amqui, 8 ind. le 18 mai par R. Lang et Y. Angers qui notent : « *Un mâle fait la cour à deux femelles ; les oiseaux sont au sol et se nourrissent de millet. Voici différents comportements du mâle lorsqu'il s'approche d'une femelle : le cou étiré, il se lève la tête et le bec pointant vers le ciel, il ouvre ses ailes et gonfle les plumes en inclinant la tête, ce qui donne l'impression qu'il a le dos rond. Ces comportements sont répétés à plusieurs reprises* ».

Nombre de mentions : mars 1, avril 86, mai 86, total 173

Oriole de Baltimore *Icterus galbula*

Lac Saint-Mathieu, 2 ind. le 24 mai par R. Fortin et R. Pelletier qui notent : « À l'entrée du lac situé à l'ouest du village de Saint-Mathieu, on a vu un couple. Les deux oiseaux s'abreuvaient en même temps dans un abreuvoir rouge à colibri peut-être modifié pour leur faciliter l'accès au liquide ».

Nombre de mentions : mai 11

Roselin pourpré *Carpodacus purpureus*

Amqui, 4 ind. le 13 mai par R. Lang et Y. Angers qui notent : « Une femelle roselin a un plumage différent de celui des autres femelles : il y a des reflets de jaune sur le dessus de la tête et au croupion, la gorge est jaune et le dessus du dos est un peu verdâtre ».

Nombre de mentions : mars 1, avril 61, mai 261, total 323

Roselin familial *Carpodacus mexicanus*

Rimouski, 1 ind. les 18 et 26 mai par R. Pelletier qui note : « Il est rouge-orangé et c'est la première observation dans ma cour en 16 ans ».

Nombre de mentions : mai 2

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*

Mention unique : Rimouski, 4 ind. le 31 mai par L. Robichaud.

Sizerin flammé *Acanthis flammea*

Amqui, 150 ind. le 3 mai par R. Lang, Y. Angers et C. Carré qui notent : « Ce matin et en fin d'après-midi, j'ai été témoin à quelques reprises d'un comportement particulier de la part des Sizerins flammés. À chaque fois qu'un Roselin pourpré mâle se nourrissait au sol avec des graines de tournesol, des sizerins le suivaient et tentaient, lorsque l'enveloppe était brisée, de lui enlever l'amande du bec. Des fois, le roselin s'éloignait alors que d'autres fois, j'avais l'impression qu'il laissait faire les sizerins, comme s'il voulait les nourrir. Il y avait toujours 5 ou 6 sizerins qui suivaient le roselin et se comportaient comme des jeunes oiseaux qui suivent leurs parents pour se faire nourrir ».

Nombre de mentions : mars 95, avril 181, mai 76, total 352

Sizerin blanchâtre *Acanthis hornemanni*

Pointe-au-Père, 1 ind. le 1 mai par A. Brisson qui note : « Un petit individu «exilipes» qui est perché à côté d'un Sizerin flammé ; le Sizerin blanchâtre est environ 1,5 centimètre plus long ».

Nombre de mentions : mars 37, avril 35, mai 10, total 82

Gros-bec errant *Coccothraustes vespertinus*

Grand-Détour, 1 ind. le 23 mai par P-P. Turcotte qui note : « Je suis membre du club des ornithologues et j'ai observé hier un gros-bec un peu bizarre. Il est tout jaune et blanc, très peu de noir. Je l'ai observé vers 14 h et je vous envoie quelques photos. C'est à Matane au Grand-Détour le long de la rivière. Il est venu au site d'alimentation ». [Message envoyé à Régis Fortin, puis publié sur le groupe de discussion COBSL]



Gros-bec errant xanthochroïque, P.-P. Turcotte

Amqui, 7 ind. le 26 mai par R. Lang et Y. Angers qui notent : « *Bataille entre deux mâles pour une femelle : celui qui se tient avec la femelle attaque un autre mâle qui s'approche de trop près de sa femelle. Ce deuxième mâle s'éloigne, mais revient presque aussitôt et il y a encore un affrontement. Cette scène a duré environ 5 minutes et s'est déroulée dans les arbres près de mon poste d'alimentation* ».

Amqui, 10 ind. le 28 mai par R. Lang qui note : « *Un accouplement : l'action s'est déroulée sur le rebord d'un plateau en bois, placé sous une mangeoire pour recueillir les graines et les enveloppes de graines. Je n'étais pas très loin de la scène et je peux confirmer que c'était un accouplement* ».

Nombre de mentions : mars 13, avril 20, mai 122, total 155

Moineau domestique *Passer domesticus*

Rimouski, 60 ind. le 11 mars par L. Masson qui note : « *Une colonie de 40 individus occupe la façade de la place Sears, rue Saint-Barnabé. Nids abandonnés, nids actifs* ».

Rimouski, étang de la rue Dollard, 8 ind. le 9 mai par L. Masson qui note : « *Accouplement répétés et perchés ; au 5 à 8 secondes, ils remettent cela une quinzaine de fois. Un autre mâle essaie de lui voler sa partenaire, mais il chasse le compétiteur* ». Cette mention constitue une référence hâtive à « Accouplements répétés » (date hâtive actuelle : le 11/05/2006 à Rimouski au sentier du Littoral par R. Saint-Laurent).

Nombre de mentions : mars 74, avril 96, mai 105, total 275

Statuts et types des espèces

Nombre total d'espèces (excluant les sp) : 219
 Nombre d'espèces au statut « Hivernant » : 11
 Nombre d'espèces au statut « Résident » : 29
 Nombre d'espèces au statut « Sédentaire » : 10
 Nombre d'espèces au statut « Migrateur » : 160
 Nombre d'espèces au statut « Visiteur » : 14

Nombre d'espèces de type « Nicheur » : 158
 Nombre d'espèces de type « De passage » : 49
 Nombre d'espèces de type « Exotique » : 1
 Nombre d'espèces de type « Sp » : 4
 Nombre de migrants nicheurs : 120
 Nombre de migrants de passage : 40

Liste des observatrices et des observateurs

La cote d'activité est une mesure de la contribution des observations d'une personne au rapport que produit l'ordinateur et que nous utilisons comme source principale d'information pour la rédaction du compte rendu saisonnier que vous venez de lire. Cette cote est calculée depuis plusieurs années de la manière suivante. Chaque feuillet où le nom d'une personne apparaît donne 0,5 point de cote, chaque mention donne 0,1 point et chaque mention au rapport donne 0,3 point. Une mention apparaît au rapport lorsqu'elle est plus improbable que d'autres mentions plus « normales » ; par exemple, elle peut indiquer un grand nombre d'individus, une date d'observation très hâtive ou très tardive ou encore elle peut être associée à une note écrite sur le feuillet. Normalement, plus la cote d'activité est grande, plus la contribution des observations d'une personne au compte rendu est importante.

	Feuillets	Mentions	Mentions au rapport	Heures d'observation	Cote d'activité
Anctil, Lionel	1	1	1	0 h 05 m	0,9
Angers, Yolande	62	958	26	123 h 10 m	134,6
Antoine, Virginie	2	73	5	7 h 15 m	9,8
Asselin, Édith	1	29	1	1 h 45 m	3,7
Auclair, Guillaume	1	3	2	3 h 00 m	1,4
Beaulieu, Diane	1	1	1	0 h 15 m	0,9
Beaulieu, Marco	167	4802	127	370 h 50 m	601,8
Bélanger, Réal	5	155	38	9 h 40 m	29,4
Bellavance, Marco	13	163	7	22 h 45 m	24,9
Bernier, Marcel	3	61	14	4 h 05 m	11,8
Bérubé, Denyse	6	102	9	13 h 00 m	15,9
Bérubé, Gertrude	1	20	0	7 h 00 m	2,5
Binet, Stéphanie	1	26	3	2 h 40 m	4,0
Blais, Stéphane	1	11	3	2 h 00 m	2,5
Boisclair, Monique	1	26	1	11 h 30 m	3,4
Bouchard, Marielle	1	6	0	4 h 30 m	1,1
Boulianne, André	1	1	1	0 h 00 m	0,9
Boulva, Jean	42	1033	53	110 h 00 m	140,2

Bourassa, Andrée	1	13	2	8 h 00 m	2,4
Brassard, Claude	1	33	0	2 h 30 m	3,8
Brisson, Alberte	68	814	119	35 h 47 m	151,1
Brisson, Laurent	39	800	16	123 h 40 m	104,3
Bruaux, Françoise	1	34	3	7 h 00 m	4,8
Bujold, Monique	2	8	0	3 h 00 m	1,8
Camiré, Jean-Luc	3	102	4	12 h 00 m	12,9
Carré, Claude	8	190	10	17 h 50 m	26
Carré, Martine	1	19	1	0 h 30 m	2,7
Carrière, Jean-Luc	1	35	0	4 h 00 m	4,0
Charest, Nicole	5	77	10	4 h 50 m	13,2
Claveau, Louiselle	7	158	8	19 h 00 m	21,7
Claveau, Robert	8	168	9	20 h 00 m	23,5
Cloutier, Catherine	4	97	31	10 h 10 m	21,0
Cossette, Christiane	25	83	12	7 h 35 m	24,4
Côté, Sylvain	1	4	1	0 h 05 m	1,2
Deschênes, Jacques	4	62	1	12 h 15 m	8,5
Deschênes, Réjean	8	88	9	52 h 30 m	15,5
Desjardins, Denis	53	1305	35	314 h 30 m	167,5
Després, Jocelyne	4	53	8	9 h 00 m	9,7
Desroches, Claude	2	55	1	11 h 30 m	6,8
Dionne, René-Jean	4	76	12	3 h 45 m	13,2
Dorais, Robert	4	55	6	24 h 30 m	9,3
Douville, Claire	22	462	68	26 h 20 m	77,6
Dufour, Juliette	3	74	31	7 h 50 m	18,2
Dumas, Pauline	4	51	3	12 h 15 m	8,0
Dumont, Steve	1	1	1	0 h 30 m	0,9
Fortin, Gilles	2	59	5	4 h 35 m	8,4
Fortin, Josée	2	46	17	4 h 20 m	10,7
Fortin, Régis	2	50	8	4 h 00 m	8,4
Fradette, Louis	1	1	1	0 h 00 m	0,9
Fradette, Pierre	3	64	5	7 h 05 m	9,4
Gagné, Claire	1	28	14	3 h 30 m	7,5
Gagné, Diane	2	46	17	4 h 20 m	10,7
Gagné, France	2	33	3	2 h 00 m	5,2
Gasse, Julie	4	97	31	10 h 10 m	21,0
Gauthier, Yves	4	248	15	25 h 15 m	31,3
Gauvin, Francine	5	94	1	12 h 30 m	12,2
Gendron, Guy	4	7	6	0 h 00 m	4,5
Girard, Alain	6	42	5	4 h 30 m	8,7
Girouard, Christian	1	13	1	2 h 00 m	2,1
Harvey, Antonin	1	11	1	1 h 00 m	1,9
Heppell, Yvan	1	7	0	2 h 00 m	1,2
Jalbert, Diane	1	29	1	1 h 45 m	3,7
Joubert, Jean-Étienne	14	624	33	68 h 00 m	79,3
Jourdain, Pierre	1	1	1	0 h 15 m	0,9
Labette, Éric	1	15	1	3 h 00 m	2,3
Labrecque, Marylin	8	351	16	39 h 30 m	43,9
Lafontaine, Dany-Mona	1	36	2	2 h 30 m	4,7
Lagros, Gilles	2	22	2	9 h 00 m	3,8
Lagros, Gilles	11	126	0	115 h 23 m	18,1
Laliberté, Benoît	2	58	16	3 h 45 m	11,6
Landry, Sylvie	2	13	0	0 h 45 m	2,3

Lang, Ronald	111	1760	55	215 h 30 m	248,0
Laplane, V.	1	8	0	1 h 00 m	1,3
Larivée, Jacques	80	1363	564	105 h 12 m	345,5
Larivée, Michel	1	48	1	4 h 00 m	5,6
le Bel, Jean-Pierre	19	285	40	17 h 45 m	50,0
Leclerc, Jocelyn	1	19	1	0 h 30 m	2,7
Lefebvre, Louise	13	140	17	57 h 35 m	25,6
Lettir, Christine	1	36	13	4 h 00 m	8,0
Marcoux, Julie	35	718	26	61 h 30 m	97,1
Masson, Louis	19	339	19	32 h 26 m	49,1
McCarthy, Myriam	2	2	2	0 h 01 m	1,8
Mercier, Suzanne	4	55	1	17 h 00 m	7,8
Messely, Louis	1	1	1	0 h 00 m	0,9
Morand, Suzanne	4	248	15	25 h 15 m	31,3
Morissette, Ghyslain	2	66	5	5 h 00 m	9,1
Munro, Jean	7	122	1	15 h 45 m	16
Normandeau, Claude	1	12	1	0 h 55 m	2,0
Otis, Yolande	1	7	0	1 h 00 m	1,2
Paulin, Anicet	1	14	1	1 h 15 m	2,2
Pelletier, André	2	7	0	4 h 15 m	1
Pelletier, Éliane	1	1	1	0 h 01 m	0,9
Pelletier, Rosaire	58	1016	51	77 h 20 m	145,9
Pintiaux, Renaud	3	23	2	3 h 20 m	4,4
Pitre, Régis	5	11	4	1 h 20 m	4,8
Plourde, Jean-Paul	1	1	1	0 h 00 m	0,9
Proulx-Brisson, Jeanine	38	569	14	109 h 30 m	80,1
Rhéaume, Alain	1	5	1	2 h 30 m	1,3
Rhéaume, René	1	35	1	2 h 30 m	4,3
Rhéaume, Serge	37	742	20	64 h 45 m	98,7
Richer, Pascal	1	11	3	2 h 00 m	2,5
Rioux, Gabrielle	11	147	6	5 h 40 m	22,0
Rioux, Hélène	6	52	5	8 h 30 m	9,7
Rivard, Aline	1	11	1	5 h 00 m	1,9
Rivard, Ghislaine	48	155	28	18 h 48 m	47,9
Robichaud, Line	1	18	2	7 h 00 m	2,9
Rouleau, Nicol	3	61	18	6 h 10 m	13
Rousseau, Jean-François	1	11	3	2 h 00 m	2,5
Roy, Laval	4	187	6	38 h 45 m	22,5
Roy, Yvette	1	6	0	4 h 30 m	1,1
Royer Tardif, Samuel	2	55	1	11 h 30 m	6,8
Sabourin, Éric	3	78	10	6 h 40 m	12,3
Saint-Laurent, Lucille	47	635	95	51 h 05 m	115,5
Saint-Laurent, Rita	128	1791	276	144 h 33 m	325,9
Tremblay, Caroline	3	69	17	6 h 40 m	13,5
Turcotte, Pierre-Paul	1	1	1	0 h 00 m	0,9
Villeneuve, Alix	4	104	4	15 h 00 m	13,6
Villeneuve, Élie	1	13	2	8 h 00 m	2,4
Villeneuve, François	4	104	4	15 h 00 m	13,6
Villeneuve, Jules	1	13	2	8 h 00 m	2,4
Vinet, Maurice	3	61	18	6 h 10 m	13,0
Nombre d'observateurs : 121					



Les belles plumes du COBSL

Les soupçons dans les pensées sont comme les chauves-souris parmi les oiseaux.

Francis Bacon

L'objectif de cette chronique est de publier des textes fictifs ou descriptifs abordant la pratique de l'ornithologie. Plusieurs formes de textes sont possibles : il peut s'agir de fictions, de récits d'observation, de poèmes ou autres. Cette chronique est aussi la rencontre des genres. Ainsi, sont publiables les textes aux formes et esthétiques variées, en autant qu'ils portent une littérature.

Les feuilles rougiront bientôt et les oiseaux migrateurs se rassemblent. Les mangeoires d'hiver sont sur le point d'être remplies et il nous reste en mémoire la chaleur du soleil, la mer étale ou la verdure de la forêt, des voix, des chants, des mouvements d'oiseaux.

Dans ce numéro, trois textes vous sont présentés. D'abord, la chronique fait place à un récit d'observation de notre éditeur Jean-Pierre le Bel (que je remercie de s'être prêté au jeu). Le deuxième texte est un poème d'Yvon Boulanger, rédigé à la suite de la publication d'une photo du Faucon pèlerin du Cégep de Rimouski sur le site de discussion du COBSL. Quant au troisième, il s'agit de la réplique du photographe, Jean-Maurice Turgeon, au poète, réplique qui ne manque pas de verve!

Comme vous le constaterez, je ne me suis pas trompée sur la qualité de la plume des ornithologues de notre Club. N'oubliez pas d'écrire vos observations, impressions, réactions: elles pourraient être publiées! En tout temps, je vous invite à me faire parvenir votre texte à l'adresse suivante : julie.gasse@yahoo.com.

Je vous souhaite le plaisir des mots,

Julie Gasse

Une sortie en ville

Profitant du beau temps de ce vendredi matin, j'ai fait une petite sortie d'observation dans l'estuaire de la rivière Rimouski ainsi que dans le Parc Beauséjour. Les Harles couronnés étaient encore présents au brise-lames. On y voyait un mâle en plumage nuptial avec huit autres oiseaux en plumage juvénile ou femelle. L'arrivée d'un Pygargue à tête blanche de deuxième ou troisième année sème tout à coup la panique dans la multitude de goélands présents sur l'îlot rocheux. Le spécimen avait le dessus de la tête ainsi qu'une partie du dessus du cou blanc, détail qui sera mis à profit dans la poursuite de la sortie. Il approche alors un autre Pygargue en plumage adulte qui se nourrissait au large sur une carcasse d'oiseau non identifié. Il s'accapare alors du butin en faisant fuir facilement l'adulte de taille plus petite, probablement un mâle.

La poursuite de la sortie dans le Parc Beauséjour m'a permis d'observer un attroupement de plusieurs centaines de goélands présents sur les îlots de gravier près de la rampe de mise à l'eau des pédalos. Quel plaisir d'observer en détail, l'un après l'autre et ce à moins de 50 mètres, ces laridés afin de détecter toutes les espèces présentes : Le Goéland argenté domine avec 350 oiseaux, on retrouve aussi 80 Goélands marins et 35 becs cerclés. La prospection minutieuse se poursuit et me permet de détecter 3 Goélands bourgmestres dont un adulte et deux de 2^e hiver. Mes premiers de cet automne. Un Goéland brun tout à coup frappe mon attention et comble mes attentes : un oiseau de 2^e hiver avec un dos gris foncé et une tâche pâle à la base du bec. De taille plus petite que les Goélands argentés et avec un bec beaucoup plus délicat que le costaud Goéland marin. La projection des primaires dépasse bien les plumes de la queue. La pagaille prend tout à coup parmi les goélands qui s'envolent. Un Pygargue de première année apparaît dans le ciel et les oiseaux l'ont détecté à plus d'un kilomètre. Il est plus brun que le premier observé dans l'estuaire et il n'a qu'un petit collier blanc sur le côté du cou.

Donc, 3 beaux pygargues dans le secteur. Des rumeurs courent qu'ils ont été engagés par la Ville de Rimouski pour effaroucher les laridés. Comme l'espèce n'est plus sur la liste des oiseaux menacés aux États-Unis, beaucoup d'oiseaux sont sans emploi et les salaires sont en chute libre. Hum!

Que de plaisir tout ça en pleine ville,

Jean-Pierre le Bel,
Rimouski

Publié sur le site de discussion du COBSL, le vendredi 7 novembre 2008

Ce sera tout juste pour taquiner



*Ce sera tout juste pour taquiner,
Question de rire et de s'amuser.*

*Bien loin de moi la polémique,
Mais même avec notions classiques,
J'essaie dièse, j'essaie bémol,
Je n'peux pas voir votre auréole.*

*Est-il possible que même à l'état de trace,
Vos références religieuses refassent surface,
Qu'en voyant le faucon et ses trois attitudes,
Vous fûtes porté à la béatitude.*

*Si par l'auréole que le volatile créait,
Saint-Antoine, l'état de marbre perdait,
Auriez-vous dans votre ardeur juvénile,
Été témoin du plus récent miracle en ville?*

Yvon Boulanger

Publié le 19 août 2009 sur le site de discussion du COBSL

La riposte du photographe

Toujours à la blague, vos rimes, d'ailleurs fort réussies, ne parviennent pas à dissiper mes soupçons selon lesquels vous entretenez des relents d'iconoclasme, car dans les représentations religieuses de l'époque byzantine, une auréole est une forme circulaire entourant et nimbant la tête de personnages saints. La forme stylistique des rectrices étalées de l'oiseau derrière la tête de St-Antoine me paraissent respecter cette définition. Peut-être aussi ai-je été en proie à des hallucinations visuelles ? Chose certaine, j'ai perdu toute illusion quant à l'ardeur prétendument juvénile dont vous m'affublez : c'est pure affabulation !

J.-Maurice Turgeon

Publié le 20 août 2009 sur le site de discussion du COBSL

La photo est de Jean-Maurice Turgeon

LE TI MOT QUE J'M OU L'ÉTYMO 101

Fort de ma formation lointaine en latin et en grec, j'entreprends cette brève chronique sur l'étymologie des noms des oiseaux à la demande expresse de Jean-Pierre le Bel, l'éditeur du Kakawi, et avec l'espoir que vous y prendrez goût et intérêt.

Précisons d'entrée de jeu que les noms communs des oiseaux, fussent-ils semblables, peuvent varier sensiblement d'une langue à une autre en référence à des caractéristiques particulières retenues chez une espèce précise par une population déterminée. Il en va ainsi dans les pays francophones lorsqu'un nom adopté au Québec ne correspond pas nécessairement à celui utilisé en France pour désigner le même oiseau. Il arrive même que le nom d'une espèce présente en France ait été retenu comme nom vernaculaire d'une espèce différente au Québec : c'est notamment le cas de l'outarde pour désigner la Bernache du Canada ou du rouge-gorge pour nommer le Merle d'Amérique. Une forme d'atavisme, peut-être ! Des efforts importants ont toutefois été consacrés à la normalisation des noms et continuent de l'être.

Plusieurs noms français proviennent directement du grec ou du latin et, parfois, d'une latinisation du nom d'un naturaliste, qu'on a voulu honorer pour sa contribution à l'évolution de l'ornithologie, ou du lieu d'une découverte. Ainsi, comme chacun sait, le terme « ornithologie » dérive de deux mots grecs : *ornis* / *ornithos* « oiseau » et *logia* « discours, science ». Bref, l'ornithologie est la science qui, au sein de la zoologie, traite des oiseaux.

Dernières petites remarques préliminaires : la lettre *upsilon* est traduite en français par « y », et c'est par convention internationale que les noms scientifiques sont exprimés en latin, que le nom de genre prend une majuscule en début de mot et le nom de l'espèce, une minuscule.



Photo de Jean-Maurice Turgeon

Puisqu'il faut rendre à tout seigneur tout honneur, commençons avec *Haliaeetus leucocephalus*, dit le Pygargue à tête blanche ou Bald Eagle dans la langue de Shakespeare. Cet aigle symbolise la puissance américaine depuis le XVIII^e siècle, et ce, contre l'avis de Benjamin Franklin qui proposait d'adopter comme emblème un autre oiseau, le dindon. De la farce ? L'histoire n'en a rien dit jusqu'à aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce nom anglais est trompeur advenant qu'il soit traduit par « aigle chauve », sauf que l'adjectif *bald*, « chauve », pouvait signifier « blanc / shining white » à l'époque où le moyen anglais était utilisé (1066 à 1470).

Le nom de genre est formé sur le grec *hals*, « mer », *halieus* « pêcheur », et *aetos*, « aigle » ; ce nom illustre bien le fait que les pygargues se nourrissent surtout de poissons qu'ils pêchent le plus souvent en mer. Le nom d'espèce *leucocephalus* est lui aussi formé sur le grec *leucos*, « blanc », *egkephalos*, « encéphale, boîte crânienne, tête ». Pygargue dérive du grec *pugè* [fesse] et *argos* [resplendissant, blanc].

Si d'aventure il vous plaisait de dire à une personne qu'elle a de belles fesses, je vous suggère, par souci de rectitude politique, de lui susurrer à l'oreille qu'elle est « callipyge ». Vous pigez ?

J.-Maurice Turgeon

Plongeon huard en détresse

Un Plongeon huard accroupi sur l'herbe en plein jour, cela amène à se questionner. Personne n'ose le déranger, moi-même pensant qu'il est blessé, vu son aile gauche qui semble traîner par terre.

Après un certain temps, je le regarde de nouveau avec mes jumelles et je m'aperçois qu'il a quelque chose de pris dans le bec. J'appelle Jean-Louis qui vient avec une bâche et moi avec une paire de ciseaux. Une ligne à pêche est prise et enroulée dans son bec, de même qu'autour de son aile et d'une patte. Il fait penser à un saucisson. Jean-Louis, Francis et Gaétane le tiennent fortement tandis que je réussis à couper tous les fils de nylon qui le retiennent prisonnier.

Quand nous l'avons finalement relâché, il est parti en criant vers le lac et nous l'avons vu s'ébattre dans l'eau. Par la suite, je ne sais pas si c'est pour nous remercier, mais il s'est retourné et a regardé dans notre direction.

Quel bonheur de l'avoir sauvé d'une mort certaine et d'avoir été là au bon moment!

Rita St-Laurent et ses amis.

Petit lac Macpès, Saint-Narcisse, 30 mai 2009

Un petit jeu-questionnaire sur les noms des oiseaux (suite)

Le feuillet d'observations quotidiennes contient le nom de 306 espèces d'oiseaux. Nous constatons que les espèces qui n'ont plus le même nom qu'au début des années 1900 représentent les 2/3 du total soit 203 espèces. L'on sait que toutes les parulines et les bruants ont changé de nom, mais les changements ont de fait touché toutes les familles d'oiseaux.

Des espèces d'oiseaux du feuillet ne se retrouvent pas dans la publication de Dionne, car elles n'étaient pas encore arrivées au Québec. Les espèces les plus marquantes sur ce point sont l'Étourneau sansonnet qui venait d'être introduit à New York en 1890 ainsi que l'Urubu à tête rouge, la Mésange bicolore, le Roselin familier et le Cardinal rouge. L'on retrouve aussi dans la liste des espèces non mentionnées par Dionne, des oiseaux dont la présence est accidentelle et qui n'avaient pas encore été observés ainsi que des ajouts d'espèces différenciées à la suite d'analyses zoologiques poussées comme ce fut le cas pour la Grive de Bicknell.

Enfin, le suspense ayant assez duré, j'ai eu la surprise de constater que 61 noms d'oiseaux sont identiques à ceux utilisés par Dionne au début du XX siècle. Je m'attendais vraiment à un plus petit nombre. En effet, 54 noms n'ont pas connu de modification et au moins sept ont été modifiés pendant cette période pour revenir au point de départ. L'on peut mentionner ici le Tétrás du Canada qui a fait un petit tour dans les savanes et l'Hirondelle des rivages qui a été prise dans le sable pendant une bonne période.

Voici la liste complète des oiseaux qui ont le même nom français que lors de la publication du livre de C.-E Dionne en 1906. La présentation suit l'ordre du feuillet d'observations quotidiennes. Les espèces ayant subi des changements de nom, mais étant revenues au point de départ sont marquées d'un astérisque.

Bernache du Canada

Canard chipeau	Pluvier kildir	Viréo à tête bleue
Canard d'Amérique*	Chevalier solitaire	Viréo de Philadelphie
Canard noir	Barge marbrée	Viréo aux yeux rouges
Sarcelle à ailes bleues	Bécassine de Wilson*	Corneille d'Amérique
Canard souchet	Bécasse d'Amérique	Hirondelle bicolore
Canard pilet	Phalarope de Wilson	Hirondelle de rivage*
Tétrás du Canada*	Labbe pomarin	Hirondelle à front blanc
Lagopède des saules	Labbe parasite	Mésange à tête noire
Grèbe à bec bigarré	Labbe parasite	Troglodyte des marais
Fou de Bassan	Goéland argenté	Roitelet à couronne rubis
Cormoran à aigrettes	Sterne caspienne	Grive à joues grises
Butor d'Amérique	Sterne arctique	Grive solitaire
Héron vert	Mergule nain	Grive des bois
Épervier brun	Guillemot de Brünnich*	Merle d'Amérique
Épervier de Cooper	Engoulevent d'Amérique*	Tangara écarlate
Buse à queue rousse	Colibri à gorge rubis	Oriole de Baltimore
Faucon pèlerin	Pic à tête rouge	Chardonneret jaune
Râle jaune	Pic maculé	Moineau domestique
Râle de Virginie	Moucherolle à côtés olive	
Foulque d'Amérique	Moucherolle à ventre jaune	
Pluvier semipalmé*	Moucherolle des aulnes	

Cette liste sera bientôt ramenée à 60 espèces, car le Tangara écarlate deviendra un Piranga écarlate.

J'espère que ce jeu-questionnaire vous a amusé. Les plus vieux ont pu se remémorer des souvenirs et les plus jeunes observateurs ont une meilleure connaissance des changements qui eurent lieu avant le début de leur intérêt pour l'observation des oiseaux.

Jean-Pierre le Bel

Changements taxonomiques à la liste de l'American Ornithologists' Union

Comme tous les ans, l'American Ornithologists' Union a publié en juillet les changements à la taxonomie et à la nomenclature des oiseaux de l'Amérique du Nord. Les changements touchant les oiseaux du Québec sont les suivants. Cinq espèces voient leur nom latin modifié : la Mésange à tête brune (*Poecile hudsonicus*), le Sizerin flammé (*Acanthis flammea*), le Sizerin blanchâtre (*Acanthis hornemanni*), le Tarin des aulnes (*Spinus spinus*), le Tarin des pins (*Spinus pinus*) et le Chardonneret jaune (*Spinus tristis*). Une espèce voit son nom anglais modifié, le Bruant de Nelson, qui devient Nelson's Sparrow (tandis que son congénère méridional, le Bruant à queue aigüe, devient Saltmarsh Sparrow). La famille des Odontophoridés (les colins) est déplacée devant celle des Phasianidées dans la séquence taxonomique, tandis que les oiseaux du genre *Piranga* sont retirés de la famille des tangaras (les Thraupidés) pour être replacés dans celle des Cardinalidés (en séquence, devant le Cardinal rouge); ils deviennent donc respectivement le *Piranga* vermillon (*Piranga rubra*), le *Piranga* écarlate (*Piranga olivacea*) et le *Piranga* à tête rouge (*Piranga ludoviciana*)

Source : QuébecOiseaux, Automne 2009

Programme de marquage de Goélands à bec cerclé dans la région de Montréal

M. Jean-François Giroux qui est professeur titulaire au Département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a entrepris, en collaboration avec le Service canadien de la faune, un programme de marquage de Goélands à bec cerclé dans la région de Montréal. Près de 1200 goélands (jeunes et adultes) ont été marqués sur l'île Deslauriers près de Varennes à l'été 2009. Ce programme va durer au moins 3 ans. Tous les oiseaux ont une bague d'acier de l'US Fish & Wildlife Service et une bague de plastique de couleur (jaune avec code noir ou bleu avec code blanc) portant 3 codes alphanumériques. Ces chercheurs étudient la dynamique de cette population de Goéland à bec cerclé, les mouvements locaux et la dispersion post reproductive. Cette dispersion est assez étendue, car un des oiseaux a été rapporté à l'île du Prince-Édouard. Il est donc fort possible que des goélands marqués soient présents dans notre région.

Si vous avez l'occasion d'observer un de ces oiseaux, vous pouvez contacter le chercheur par courriel ou par la poste, à l'adresse présentée au bas de cet article. Les informations requises sont la date, la localisation (coordonnées GPS si possible), le code et la couleur de la bague, le nombre de goélands présents ainsi que l'habitat (rive du fleuve, site d'enfouissement, casse-croûte, parc, etc.). Si une photographie peut être prise, elle permet d'attribuer un code de certitude à l'observation.

Jean-François Giroux
Professeur titulaire, Département des sciences biologiques
Université du Québec à Montréal (UQAM)
141 Président-Kennedy, SB-2630
BP 8888, Succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8 Canada
Tél. : (514) 987-3000 (3353) Fax : (514) 987-4647
giroux.jean-francois@uqam.ca
http://www.bio.uqam.ca/professeurs/giroux_jf.html

Jean-Pierre le Bel



Goéland adulte, portant la bague bleue KKT, marqué le 15 juillet dans la colonie de l'île Deslauriers près de Varennes, juste à l'est de Montréal et photographié par Mme Julie Tremblay le 29 juillet à Stanhope Beach sur l'île du Prince-Édouard.

Découverte d'une nouvelle espèce d'oiseau, le Bulbul chauve

Un curieux oiseau chanteur chauve vivant dans une localité de la province de Savannakhét au Laos a été découvert par des scientifiques de la Wildlife Conservation Society et de l'Université de Melbourne (Australie).

Appelé Bulbul chauve («Bare-faced Bulbul») du fait de l'absence de plumes sur sa face et sur une partie de sa tête, c'est le seul exemple connu d'un oiseau chanteur chauve en Asie continentale. C'est aussi la première nouvelle espèce de bulbul, une famille qui compte environ 130 espèces, décrite en Asie depuis plus de 100 ans. L'oiseau, de la taille d'une grive, est olive-verdâtre avec la poitrine claire, une tête sans plumes de couleur rose avec une zone de peau bleuâtre autour de l'œil s'étendant jusqu'au bec et une ligne étroite de plumes semblables à des cheveux au centre de la couronne. L'oiseau semble vivre principalement dans les arbres ; il a été trouvé dans une forêt claire décidue poussant dans une région karstique accidentée méconnue où d'autres découvertes d'animaux curieux avaient déjà été faites. Iain Woxvold, de l'Université de Melbourne, précise : «sa répartition à priori limitée à une région difficile d'accès explique pourquoi cet oiseau extraordinaire plutôt peu discret et au chant caractéristique est resté inconnu si longtemps ».



Heureusement, une bonne partie de l'aire de répartition présumée de l'espèce se situe dans des zones légalement protégées du Laos. Cependant, l'exploitation du calcaire constitue une menace potentielle, de même que la conversion de l'habitat en zones cultivées.

L'équipe n'a vu que quelques oiseaux sur un seul rocher, donc la taille de la population et son aire de distribution n'ont pas encore été établies. Cette dernière pourrait s'étendre dans la ceinture de chaînes calcaires du centre du Laos et peut-être du centre-ouest du Vietnam.

Les chercheurs ne savent pas pourquoi cet oiseau est chauve : chez les vautours, l'absence

de plumes permet de fouiller les carcasses sans avoir à se nettoyer. Chez le bulbul, cela pourrait avoir un lien avec le comportement de parade.

Résumé d'un article paru dans le magazine électronique Ornithomédia du 20 août 2009.
Jean-Pierre le Bel.

Activités scolaires

Le Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent (COBSL) est à la recherche de personnes afin d'offrir, dans les écoles qui en feront la demande, des sessions d'activités éducatives concernant la faune ailée. Ces personnes seraient **rémunérées** et les programmes déjà montés leur seraient fournis.

Voici plus de détails sur ce programme :

La trousse pédagogique pourra être téléchargée. Le module général fournit des conseils sur le déroulement des animations et la grille tarifaire des activités. Chacun des autres modules porte sur une activité scolaire précise et explique son fonctionnement. Les modules contiennent également les présentations en format PowerPoint en plus des autres fichiers nécessaires aux animations (vidéos, chants).

Le Regroupement Québec Oiseaux se chargera de la promotion, de la gestion des réservations et de la facturation. Les demandes d'animation seront ensuite transmises aux clubs de la région ayant des animateurs disponibles. Le COBSL compte verser la rémunération, de même que les frais de déplacement, à la personne qui dispensera la formation.

Les activités se déroulent soit en classe (durée d'une heure) ou à l'extérieur (durée variable selon les besoins). Les tarifs chargés aux écoles et remis par la suite aux responsables sont :

1 activité : 125 \$

2 activités (même jour) : 100 \$ par activité

3 activités (même jour) : 85 \$ par activité

Si vous êtes intéressés, communiquez avec le club par courriel : cobsl@globetrotter.net.

N'hésitez pas à en parler à vos amis et vos connaissances.



Gros-bec errant mâle, Suzanne Mercier

Des feuillets S.V.P.

Remplir un feuillet d'observations quotidiennes

c'est jouer une rôle crucial

dans la recherche scientifique et dans la protection
des oiseaux et de leurs habitats.

Vous manquez de feuillets d'observations ?
Faites-en la demande à Claire Douville 418 722-3835
ou par courriel à cobsi@globetrotter.net

Il nous fera plaisir de vous transmettre par la poste
la quantité demandée.

Bonnes observations !

Le Club des ornithologues du Bas-Saint-Laurent

Portfolio de Ronald Lang

Photos prises à sa résidence au 71 rue Normand Nord à Amqui et au Lac Castonguay.



Lac Castonguay



Canard noir




Jaseurs boréaux



Hirondelle bicolor

Ce magnifique mâle Guiraca bleu en plumage nuptial complet a pu être observé du 29 au 31 mai 2009 aux mangeoires de Louise Lefebvre dans le Rang 2 Est à Sainte-Luce. La photographie a été prise à travers une fenêtre par Jacques Larivée.

[Retour](#)

A stylized graphic of a scroll with a grey circular element at the top right and a grey semi-circle at the bottom left. The word "Bienvenue!" is written in a large, blue, 3D-style font with a dark blue outline.

Bienvenue!

Le COBSL est fier d'accueillir les personnes qui ont joint ses rangs au cours de l'été 2009 :

Brigitte Bernier, la famille d'Hélène Dionne composée de Marie-Christine et Alain Patry, Louise Guérette, Christian Hubert et Guy Verreault.

[Retour](#)