



**Portrait démographique
et
socio-sanitaire
de la population**

**Centre de santé
et
de services sociaux
de Port-Cartier**

Janvier 2005

***Agence de développement de réseaux locaux de services de santé
et de services sociaux de la Côte-Nord***

Auteur :

Michel Des Roches, agent de recherche

Collaborateur :

Yves Therriault, agent de recherche

***Révision du document, mise en page
et réalisation technique :***

Suzan Bélanger, secrétaire

Portrait démographique et sociosanitaire de la population du Centre de santé et de services sociaux de Port-Cartier

Données démographiques

Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Port-Cartier dispense des services sociaux et de santé à la population des municipalités de Port-Cartier, de Lac-Walker et de l'ancienne ville de Gallix faisant maintenant partie de Sept-Îles. La ville de Port-Cartier regroupe la grande majorité des habitants de ce secteur (82 %). Le CSSS compte 7 434 personnes selon les plus récentes projections de population fournies par l'Institut de la statistique du Québec pour l'année 2005.

De 1981 à 2001, la population locale a connu un déclin démographique de -19,3 % (Côte-Nord : -14,9 %; province : +12,7 %). De 2001 à 2011, on prévoit que ce déclin sera de -12,1 % (Côte-Nord : -8,1 %; province : +5 %).

La population autochtone n'est pas présente sur ce territoire. La plupart des résidents (97,8 %) déclare uniquement le français comme langue maternelle (Côte-Nord : 86,1 %; province : 80,9 %). Fait à considérer, 0,2 % de la population affirme ne pas être en mesure de s'exprimer dans la langue de Molière, plus particulièrement dans la communauté de Port-Cartier (Côte-Nord : 4,4 %; province : 5,4 %).

Les dernières estimations de l'Institut de la statistique du Québec, produites l'automne dernier pour l'année 2001, révèlent que 25,8 % de la population de la MRC de Sept-Rivières a moins de 20 ans (Côte-Nord : 26,1 %; province : 24 %). Par ailleurs, 8,9 % de la population demeurant à cet endroit est âgée de 65 ans et plus (Côte-Nord : 9,6 %; province : 13 %). Au moment d'écrire ces lignes, ces informations n'étaient pas encore disponibles pour le secteur de Port-Cartier.

Selon les plus récentes projections démographiques, la proportion de jeunes âgés de moins de 20 ans dans la MRC de Sept-Rivières devrait diminuer dans les prochaines années pour atteindre

22,2 % en 2011 (Côte-Nord : 21,1 % province : 21,1 %). Dans cet intervalle, la part des personnes âgées de 65 ans et plus devrait augmenter, représentant alors 14,7 % de la population locale (Côte-Nord : 14,5 %; province : 15,9 %).

Sur le territoire du CSSS de Port-Cartier, les personnes seules regroupent 9,6 % de la population vivant en ménages privés, soit environ 725 Nord-Côtiers et Nord-Côtières (Côte-Nord : 9,2 %; province : 12,4 %). Les familles ayant un seul enfant ou aucun enfant vivant à la maison totalisent 70,7 % de toutes les unités familiales (Côte-Nord : 66,8 %; province : 66,4 %). D'un autre côté, 4,6 % des familles ont trois enfants ou plus (Côte-Nord : 8,6 %; province : 9,4 %). La proportion de familles monoparentales est de 13,2 % (Côte-Nord : 17,4 %; province : 16,6 %).

Les effectifs de la population masculine sont plus importants que ceux de la population féminine. On retrouve 111 hommes pour 100 femmes. Sur la Côte-Nord, cette réalité démographique correspond à 103 Nord-Côtiers pour 100 Nord-Côtières. À l'échelle provinciale, le portrait est tout autre, alors qu'on dénombre 95 hommes pour 100 femmes.

Lors du recensement de 2001, 12,8 % de la population desservie par le CSSS de Port-Cartier demeurait dans une autre municipalité que celle où elle résidait cinq ans plus tôt (Côte-Nord : 10,1 %; province : 19,1 %).

Données socioéconomiques

Les personnes inoccupées, c'est-à-dire n'occupant pas d'emploi rémunéré, comptent pour 49,2 % de la population âgée de 15 ans et plus dans la zone administrative du CSSS de Port-Cartier (Côte-Nord : 47,7 %; province : 41,1 %). En mars 2003, 8,7 % des gens âgés de moins de 65 ans bénéficient de l'assistance-emploi, communément appelée aide sociale (Côte-Nord : 6,6 %; province : 8,5 %). En ce qui a trait à la scolarité, 38,7 % de la population âgée de 20 ans et plus n'a pas complété un cinquième secondaire (Côte-Nord : 39,1 %; province : 29,9 %). Par ailleurs, en excluant la localité de Lac-Walker, la proportion de

personnes vivant sous le seuil de faible revenu fixé par Statistique Canada équivaut à 14,9 % (Côte-Nord : 14,3 %; province : 19,1 %). Dans une région rurale, ce seuil équivaut annuellement à 23 892 \$ pour une famille de quatre personnes et à 12 696 \$ pour une personne seule.

En se basant sur le revenu moyen de la population âgée de 15 ans et plus, la proportion des familles disposant d'un revenu de moins de 30 000 \$ par année, ainsi que sur la proportion de gens vivant dans un ménage à faible revenu, l'ancienne municipalité de Rivière-Pentecôte, maintenant fusionnée avec Port-Cartier, représente la zone la plus vulnérable du territoire du CSSS sur le plan économique. Notons qu'il nous a été impossible d'obtenir de Statistique Canada des données socioéconomiques portant sur la localité de Lac-Walker en raison de la faible taille de sa population.

Dans un autre ordre d'idées, le recensement de 2001 révèle que 18,3 % de la population de Port-Cartier âgée de 15 ans et plus consacre, chaque semaine, des heures de bénévolat pour offrir des soins ou de l'aide aux personnes âgées (Côte-Nord : 18,1 %; province : 17,7 %).

Données sur l'état de santé

L'espérance de vie de la population du territoire de la MRC de Sept-Rivières est de 76,6 ans (Côte-Nord : 76,6 ans; province : 77,9 ans). Annuellement, on enregistre 38 décès en moyenne chez les résidents du CSSS de Port-Cartier (Côte-Nord : 568 décès; province 53 607 décès). Le taux comparatif de mortalité (774 décès pour 100 000 habitants) est comparable à celui observé à l'échelle régionale ou provinciale (Côte-Nord : 787; province : 718). Sur le territoire, les deux principales causes de décès sont les cancers (13 décès en moyenne par année) et les maladies de l'appareil circulatoire (11 décès en moyenne annuellement). Elles sont à l'origine de 64,2 % de toute la mortalité (Côte-Nord : 61,7 %; province 65 %).

Le taux de décès par cancer relevé dans le secteur du CSSS (228 décès pour 100 000 habitants) est comparable à celui observé dans l'ensemble de la province (217 décès pour 100 000 habitants). Le taux de décès attribuables aux maladies de l'appareil circulatoire noté dans le secteur de

Port-Cartier (269 décès pour 100 000 habitants) se compare également à celui enregistré au niveau provincial (249 décès pour 100 000 habitants). Alors que les cancers représentent la première cause de décès sur la Côte-Nord, elle se situe au second rang des causes de mortalité au Québec, derrière les maladies de l'appareil circulatoire.

Les causes accidentelles constituent la troisième source de décès chez la population du CSSS de Port-Cartier, totalisant 12,6 % de mortalité. Elles provoquent cinq décès en moyenne chaque année sur ce territoire. Les accidents de la circulation impliquant un véhicule à moteur (50 %) et les suicides (29,2 %) sont à l'origine de plus des trois quarts de la mortalité accidentelle. Le taux comparatif de mortalité par causes accidentelles attribué à la population du CSSS de Port-Cartier (63 décès pour 100 000 habitants) est comparable à celui enregistré chez la population nord-côtière (78 décès pour 100 000 habitants) et dans l'ensemble de la population québécoise (49 décès pour 100 000 habitants).

Les hospitalisations de courte durée

Le tableau à la page 6 fait état des admissions de courte durée des habitants du territoire du CSSS de Port-Cartier au cours de cinq années financières, soit d'avril 1998 à mars 2003. Durant cette période, le système Med-Écho a relevé, en moyenne annuellement, 722 entrées en milieux hospitaliers pour les gens de ce secteur (Côte-Nord : 11 992 admissions). Le taux comparatif d'admission hospitalière (1 131 hospitalisations pour 10 000 habitants) y est comparable à celui observé chez toute la population nord-côtière (1 294 hospitalisations pour 10 000 habitants). Toutefois, ce taux s'avère plus élevé que celui attribué à l'ensemble des résidents du Québec (898 hospitalisations pour 10 000 habitants).

Les causes d'hospitalisations sont très variées. D'avril 2002 à mars 2003, les maladies de l'appareil circulatoire (24,1 %), les complications de la grossesse et des suites de couche, incluant les accouchements normaux, (11,8 %), les maladies de l'appareil digestif (9,7 %), les lésions traumatiques et empoisonnements (8,2 %) ainsi que les troubles mentaux (8,0 %) constituent les causes les plus fréquentes, totalisant 61,8 % de toute la consommation hospitalière de courte durée.

À la même période, les troubles mentaux (1 204 jours), les maladies de l'appareil circulatoire (1 090 jours), les lésions traumatiques et empoisonnements (412 jours), les maladies de l'appareil digestif (397 jours) ainsi que les maladies du système nerveux et des organes du sens (293 jours) sont à l'origine du plus grand nombre de jours d'hospitalisations.

De leur côté, les troubles mentaux (22,7 jours), les maladies du système nerveux et des organes du sens (15,4 jours), les maladies de la peau et des tissus (10,7 jours) ainsi que les maladies endocriniennes et troubles immunitaires (10 jours) génèrent les séjours moyens les plus longs. En considérant toutes les causes d'admissions hospitalières de la population du territoire du CSSS de Port-Cartier, le séjour moyen atteint 7,3 jours (Côte-Nord : 7,9 jours).

Toutes causes confondues, les admissions hospitalières hors région de la population de Port-Cartier totalisent 22,6 % des hospitalisations réalisées (Côte-Nord : 20,9 %). Les maladies endocriniennes et troubles immunitaires (66,7 %), les anomalies congénitales (66,7 %), les maladies de l'appareil circulatoire (47,2 %) ainsi que les maladies de l'appareil génito-urinaire (37,5 %) sont à l'origine de la plus forte consommation hospitalière à l'extérieur de la Côte-Nord.

Tableaux complémentaires

**Admissions hospitalières de la population de la Côte-Nord,
soins de courte durée uniquement, avril 1998 à mars 2003 (5 ans)**

Territoire	Nombre annuel moyen	Répartition des hospitalisations (%)	Répartition de la population en 2001 (%)	Taux comparatif d'hospitalisation (0/000)	Différence statistiquement significative avec la Côte-Nord	Différence statistiquement significative avec le Québec
Haute-Côte-Nord	1 560	13,0	13,2	1 215,1	Non	Oui
Manicouagan	4 159	34,7	34,4	1 298,3	Non	Oui
Port-Cartier	722	6,0	7,9	1 130,9	Non	Oui
Sept-Îles	3 398	28,3	27,6	1 380,5	Oui	Oui
Minganie	1 073	9,0	6,9	1 609,8	Oui	Oui
Basse-Côte-Nord	666	5,5	5,7	1 256,8	Non	Oui
Caniapiscau ¹	414	3,5	4,3	1 181,2	Non	Oui
Côte-Nord	11 992	100,0	100,0	1 293,9	-	Oui
Ensemble du Québec	670 511	-	-	898,2	-	-

Source : Banque de données Med-Écho, ministère de la Santé et des Services sociaux, avril 1998 à mars 2003.

1. Désigne le territoire desservi par le Centre de santé de l'Hématite et celui desservi par le CLSC Naskapi.

N.B. : Ces données ne tiennent pas compte des hospitalisations réalisées à l'extérieur de la province de Québec.

**Admissions hospitalières de la population du CSSS de Port-Cartier,
soins de courte durée uniquement, avril 2002 à mars 2003**

Cause d'admission	Nombre	%	Séjour total (jours)	Séjour moyen (jours)	Hors région (%)	En région (%)
Maladies infectieuses et parasitaires (CIM-9 001 à 139)	6	0,9	46	7,7	0,0	100,0
Tumeurs malignes (CIM-9 140 à 239)	40	6,1	274	6,9	30,0	70,0
Maladies endocriniennes et troubles immunitaires (CIM-9 240 à 279)	3	0,5	30	10,0	66,7	33,3
Maladies du sang (CIM-9 280 à 289)	2	0,3	14	7,0	0,0	100,0
Troubles mentaux (CIM-9 290 à 319)	53	8,0	1 204	22,7	9,4	90,6
Maladies du système nerveux et des organes du sens (CIM-9 320 à 389)	19	2,9	293	15,4	26,3	73,7
Maladies de l'appareil circulatoire (CIM-9 390 à 459)	159	24,1	1 090	6,9	47,2	52,8
Maladies de l'appareil respiratoire (CIM-9 460 à 519)	44	6,7	264	6,0	4,5	95,5
Maladies de l'appareil digestif (CIM-9 520 à 579)	64	9,7	397	6,2	6,3	93,8
Maladies de l'appareil génito-urinaire (CIM-9 580 à 629)	24	3,6	117	4,9	37,5	62,5
Complications de la grossesse et des suites de couche (CIM-9 630 à 676)	78	11,8	209	2,7	0,0	100,0
Maladies de la peau et des tissus (CIM-9 680 à 709)	6	0,9	64	10,7	16,7	83,3
Maladies du système ostéo-articulaire (CIM-9 710 à 739)	33	5,0	149	4,5	27,3	72,7
Anomalies congénitales (CIM-9 740 à 759)	3	0,5	18	6,0	66,7	33,3
Affections périnatales (CIM-9 760 à 779)	0	0,0	-	-	-	-
Symptômes, signes et états morbides mal définis (CIM-9 780 à 799)	43	6,5	166	3,9	16,3	83,7
Lésions traumatiques et empoisonnements (CIM-9 800 à 999)	54	8,2	412	7,6	24,1	75,9
Classification supplémentaire des facteurs influant sur l'état de santé (CIM-9 V01 à V82)	29	4,4	86	3,0	10,3	89,7
Total	660	100,0	4 833	7,3	22,6	77,4

Source : Banque de données Med-Écho, ministère de la Santé et des Services sociaux, avril 2002 à mars 2003.

N.B. : Ces données ne tiennent pas compte des hospitalisations réalisées à l'extérieur de la province de Québec.

**Admissions hospitalières de la population de l'ensemble de la Côte-Nord,
soins de courte durée uniquement, avril 2002 à mars 2003**

Cause d'admission	Nombre	%	Séjour total (jours)	Séjour moyen (jours)	Hors région (%)	En région (%)
Maladies infectieuses et parasitaires (CIM-9 001 à 139)	163	1,4	883	5,4	9,8	90,2
Tumeurs malignes (CIM-9 140 à 239)	782	6,8	7 539	9,6	33,6	66,4
Maladies endocriniennes et troubles immunitaires (CIM-9 240 à 279)	192	1,7	1 678	8,7	18,8	81,3
Maladies du sang (CIM-9 280 à 289)	93	0,8	460	4,9	7,5	92,5
Troubles mentaux (CIM-9 290 à 319)	945	8,2	17 329	18,3	5,2	94,8
Maladies du système nerveux et des organes du sens (CIM-9 320 à 389)	294	2,5	2 239	7,6	28,9	71,1
Maladies de l'appareil circulatoire (CIM-9 390 à 459)	1 858	16,1	14 696	7,9	39,0	61,0
Maladies de l'appareil respiratoire (CIM-9 460 à 519)	1 220	10,6	6 673	5,5	7,9	92,1
Maladies de l'appareil digestif (CIM-9 520 à 579)	1 262	10,9	7 136	5,7	10,6	89,4
Maladies de l'appareil génito-urinaire (CIM-9 580 à 629)	627	5,4	3 135	5,0	30,5	69,5
Complications de la grossesse et des suites de couche (CIM-9 630 à 676)	1 174	10,2	3 930	3,3	10,7	89,3
Maladies de la peau et des tissus (CIM-9 680 à 709)	133	1,2	902	6,8	5,3	94,7
Maladies du système ostéo-articulaire (CIM-9 710 à 739)	411	3,6	3 302	8,0	33,3	66,7
Anomalies congénitales (CIM-9 740 à 759)	84	0,7	868	10,3	70,2	29,8
Affections périnatales (CIM-9 760 à 779)	33	0,3	479	14,5	51,5	48,5
Symptômes, signes et états morbides mal définis (CIM-9 780 à 799)	908	7,9	8 427	9,3	16,0	84,0
Lésions traumatiques et empoisonnements (CIM-9 800 à 999)	932	8,1	6 743	7,2	24,2	75,8
Classification supplémentaire des facteurs influant sur l'état de santé (CIM-9 V01 à V82)	450	3,9	4 980	11,1	22,2	77,8
Total	11 561	100,0	91 399	7,9	20,9	79,1

Source : Banque de données Med-Écho, ministère de la Santé et des Services sociaux, avril 2002 à mars 2003.

N.B. : Ces données ne tiennent pas compte des hospitalisations réalisées à l'extérieur de la province de Québec.

**Taux comparatif de mortalité (Ensemble des causes)
Région Côte-Nord, 1995 à 1999**

Territoire	Nombre annuel moyen de décès	Taux comparatif de mortalité ^{1, 2}	Borne inférieure ³	Borne supérieure ³	Rapport de taux standardisés ⁴
Haute-Côte-Nord	97,4	841,6	671,4	1 011,8	117,1
Manicouagan	186,8	737,4	626,5	848,3	102,6
Port-Cartier	38,2	* 774,1	475,6	1 072,5	107,7
Sept-Îles	152,4	903,7 (+)	731,5	1 075,8	125,8
Minganie	49,0	784,6	561,3	1 007,9	109,2
Basse-Côte-Nord	31,6	* 744,2	479,2	1 009,3	103,6
Caniapiscau ⁵	13,0	** 795,2	0	2 160,1	110,7
Secteur Est ⁶	284,2	806,6	706,4	906,8	112,3
Secteur Ouest ⁶	284,2	771,8	678,8	864,9	107,4
Côte-Nord	568,4	787,3 (+)	719,3	855,3	109,6
Province de Québec	53 607	718,5	712,4	724,5	100,0

Source : Fichier des décès, MSSS, Québec.

**Taux comparatif de mortalité par cancer
Région Côte-Nord, 1995 à 1999**

Territoire	Nombre annuel moyen de décès	Taux comparatif de mortalité ^{1, 2}	Borne inférieure ³	Borne supérieure ³	Rapport de taux standardisés ⁴
Haute-Côte-Nord	36,0	* 298,3	199,2	397,4	137,2
Manicouagan	61,8	228,0	168,9	287,2	104,8
Port-Cartier	13,4	* 228,2	89,4	367,1	104,9
Sept-Îles	57,4	304,1	215,7	392,5	139,8
Minganie	18,6	* 308,0	166,7	449,3	141,6
Basse-Côte-Nord	10,0	* 238,5	88,8	388,1	109,7
Caniapiscau ⁵	2,4	** 256,6	--	--	118,0
Secteur Est ⁶	101,8	279,4 (+)	222,0	336,7	128,4
Secteur Ouest ⁶	97,8	251,0	199,7	302,4	115,4
Côte-Nord	199,6	263,7 (+)	225,6	301,8	121,2
Province de Québec	16 198	217,5	214,1	220,8	100,0

Source : Fichier des décès, MSSS, Québec.

**Taux comparatif de mortalité par maladie de l'appareil circulatoire
Région Côte-Nord, 1995 à 1999**

Territoire	Nombre annuel moyen de décès	Taux comparatif de mortalité ^{1, 2}	Borne inférieure ³	Borne supérieure ³	Rapport de taux standardisés ⁴
Haute-Côte-Nord	26,0	* 239,1	145,9	332,3	95,9
Manicouagan	53,2	240,6	173,9	307,2	96,5
Port-Cartier	11,2	** 269,2	76,4	461,9	108,0
Sept-Îles	38,4	* 267,1	165,3	368,9	107,2
Minganie	12,2	* 190,2	81,2	299,2	76,3
Basse-Côte-Nord	8,2	** 207,3	--	--	83,2
Caniapiscau ⁵	2,2	** 236,7	--	--	95,0
Secteur Est ⁶	72,2	228,4	172,8	284,1	91,7
Secteur Ouest ⁶	79,2	240,3	186,0	294,5	96,4
Côte-Nord	151,4	235,0	196,1	273,8	94,3
Province de Québec	18 662	249,2	245,7	252,8	100,0

Source : Fichier des décès, MSSS, Québec.

Source : Yves THERRIault. «L'évolution de la mortalité sur la Côte-Nord de 1984 à 1999», *La santé recherchée*, Baie-Comeau, Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, volume 3 numéro 2, décembre 2004.

**Taux comparatif de mortalité par traumatisme
Région Côte-Nord, 1995 à 1999**

Territoire	Nombre annuel moyen de décès	Taux comparatif de mortalité^{1,2}	Borne inférieure³	Borne supérieure³	Rapport de taux standardisés⁴
Haute-Côte-Nord	11,4	* 85,9	35,4	136,4	173,8
Manicouagan	29,2	* 83,8 (+)	52,2	115,4	169,5
Port-Cartier	4,8	** 62,9	1,5	124,2	127,2
Sept-Îles	18,2	* 69,3	32,9	105,7	140,2
Minganie	5,4	** 75,7	11,2	140,3	153,2
Basse-Côte-Nord	4,4	** 72,6	2,6	142,7	147,0
Caniapiscau ⁵	5,2	** 128,7	0	278,0	260,4
Secteur Est ⁶	38,0	* 72,1	48,2	96,1	146,0
Secteur Ouest ⁶	40,6	84,4 (+)	57,7	111,1	170,7
Côte-Nord	78,6	78,5 (+)	60,5	96,5	158,8
Province de Québec	3 635	49,4	47,8	51,0	100,0

Source : Fichier des décès, MSSS, Québec.

Références pour les tableaux

1. Le taux comparatif est aussi connu sous les noms de taux standardisé ou taux normalisé. Il s'agit du taux de mortalité qu'un territoire spécifique aurait connu si celui-ci avait exactement la même structure d'âge que celle de la population de référence. Dans le cas présent, la population de référence est la population corrigée du Québec, sexes réunis, de 1996.
 2. La présence d'un signe (-) ou d'un signe (+) indique si la valeur est statistiquement plus faible ou plus élevée que celle du Québec. L'absence de ces symboles traduit une situation similaire à celle du Québec.
 3. Limite inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance à 95 % du taux comparatif de mortalité. La variabilité d'un taux est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand. Il faut donc user de prudence dans l'interprétation et la comparaison de ces taux. L'intervalle de confiance permet également de déterminer si le taux d'un territoire donné est inférieur, égal ou supérieur sur le plan statistique à celui d'un autre territoire pour le même phénomène. Règle générale, lorsque l'intervalle de confiance chevauche l'intervalle de confiance du taux de l'ensemble du Québec, la différence entre les deux taux n'est pas statistiquement significative. Cependant, cette façon de procéder est plutôt conservatrice. Les calculs de différences significatives ont été faits à l'aide des formules mathématiques appropriées, de sorte qu'il est possible que deux taux soient statistiquement différents, même si leurs intervalles de confiance respectifs se chevauchent légèrement.
 4. Le rapport de taux standardisés est calculé en divisant le taux comparatif d'un territoire spécifique par le taux comparatif du Québec. Le résultat est par la suite multiplié par 100.
 5. Désigne le territoire desservi par le Centre de santé de l'Hématite et celui desservi par le CLSC Naskapi.
 6. Le secteur Est comprend les MRC des Sept-Rivières, de la Minganie, de Caniapiscau et de la Basse-Côte-Nord. Le secteur Ouest comprend les MRC de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan.
- * Le coefficient de variation est supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
- ** Le coefficient de variation est supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
- La présence des signes (--) indique que la donnée n'a pas lieu de figurer en raison du petit nombre de cas observés.