

# La santé des Montréalais

selon l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes



RECUEIL STATISTIQUE

GARDER  
notre monde  
EN SANTÉ



La santé des Montréalais  
selon l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

préparé par la  
Direction de santé publique

Mars 2008

par  
Danièle Dorval  
Agente de planification et de programmation

Une réalisation de l'équipe Surveillance du secteur Planification,  
orientations et évaluation de la Direction de santé publique  
de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

### **Rédaction et gestion de projet**

Danièle Dorval Agente de planification et de programmation

### **Avec la collaboration de**

James Massie Technicien en recherche  
Carl Drouin Coordonnateur

### **Infographie et mise en page**

Paul Cloutier Graphiste – équipe de l'information  
Manon Girard Infographe – équipe de l'information

### **Remerciements**

Nous remercions les personnes suivantes pour leur soutien  
et leurs commentaires aux différentes étapes de réalisation de cette  
publication :

de la Direction de santé publique

Sylvie Provost  
Jean Gratton  
Lise Chabot  
Kosal Khun

du Carrefour montréalais de l'information (CMIS) de la Direction des  
ressources humaines, information et planification

Mike Benigeri

Ce projet a été réalisé grâce au financement de la Direction de santé  
publique et de la Direction des ressources humaines, information et  
planification.

© Direction de santé publique de l'Agence de la santé et des services  
sociaux de Montréal (2008)

Tous droits réservés

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2008

ISBN : 978-2-89494-642-8 (version imprimée)

ISBN : 978-2-89494-643-5 (version PDF)

Prix : 20\$

# Mot du directeur

Au cœur de notre mission de santé publique, nous avons le mandat d'informer les décideurs et la population en général de l'état de santé des individus. Ce recueil de statistiques pour Montréal et par territoire de centres de santé et de services sociaux (CSSS) se veut une contribution en ce sens.

En raison de la rareté des sources de données à propos des réalités locales, nous avons davantage développé nos connaissances ayant trait à l'ensemble de l'île de Montréal. Un constat qui touche particulièrement tout le domaine des habitudes de vie. Cependant, lorsque les sources le permettent, il devient utile, voire nécessaire, de présenter des données à une échelle plus restreinte. Cela afin de mieux outiller les planificateurs et les décideurs dans l'exercice d'identification des enjeux de santé propres à leur territoire. Ce recueil se démarque entre autres par le traitement, pour chaque CSSS, des indicateurs sociosanitaires. Une véritable mine d'informations qui permet d'aller plus loin dans la connaissance de l'état de santé des Montréalais. Ainsi, les données de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2005) donnent un bon aperçu de la proportion de gens souffrant de divers problèmes de santé – embonpoint, allergies alimentaires, hypertension, consommation excessive d'alcool, stress au travail – ou encore concernés par l'accessibilité aux services – médecin de famille, psychologue, etc.

Une nouvelle étape dans notre connaissance de la santé des populations à l'échelle des territoires de CSSS et de Montréal qui devrait certainement contribuer à une prise de décision plus fine et, par conséquent, mieux accordée à la réalité des milieux montréalais.

Bonne lecture!



Richard Lessard, M.D.

Direction de santé publique,

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal



# Table des matières

<b>Mot du directeur</b> .....	3
<b>Introduction</b> .....	7
<b>Notes méthodologiques</b> .....	9
<b>Définition des indicateurs</b> .....	13
<b>Partie 1 – Tableaux sommaires de Montréal et ses CSSS</b> .....	17
Montréal .....	19
CSSS de l’Ouest-de-l’île .....	20
CSSS de Dorval-Lachine-Lasalle .....	21
CSSS du Sud-Ouest-Verdun .....	22
CSSS Cavendish .....	23
CSSS de la Montagne .....	24
CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent .....	25
CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord .....	26
CSSS du Cœur-de-l’île .....	27
CSSS Jeanne-Mance .....	28
CSSS de St-Léonard et St-Michel .....	29
CSSS Lucille-Teasdale .....	30
CSSS de la Pointe-de-l’île .....	31
<b>Partie 2 – Regard sur la santé des Montréalais et ses déterminants</b> .....	33
<b>Habitudes de vie</b>	
Tabagisme .....	34
Pratique d’activités physiques .....	36
Loisirs inactifs .....	38
Transport actif .....	40
Consommation d’alcool – quantité .....	42
Consommation d’alcool – fréquence .....	44
<b>Environnement social</b>	
Sentiment d’appartenance .....	46
<b>Environnement physique</b>	
Exposition à la fumée secondaire .....	48

<b>État de santé générale</b>	
Perception de sa santé.....	50
Impact des problèmes de santé .....	52
Journées d'incapacité .....	54
<b>État de santé physique</b>	
Allergies alimentaires .....	56
Allergies autres.....	57
Asthme .....	58
Arthrite ou rhumatisme.....	60
Maux de dos.....	61
Migraines.....	62
Hypertension.....	63
ITS .....	64
MPOC.....	65
Surplus de poids – jeunes .....	65
Embonpoint – adultes.....	66
Obésité – adultes.....	68
Blessures.....	70
<b>État de santé mentale</b>	
Perception de sa santé.....	72
Idées suicidaires .....	74
Stress quotidien.....	76
Stress au travail .....	78
<b>Services préventifs</b>	
Vaccination antigrippale .....	80
Test PAP .....	82
Mammographie.....	84
<b>Services de première ligne</b>	
Médecin de famille .....	86
Consultation – médecin de famille.....	88
Consultation – médecin spécialiste .....	90
Consultation – psychologue.....	92
Consultation – médecine douce.....	94
Besoins non satisfaits .....	96
<b>Annexe</b> .....	99

# Introduction

Ce recueil statistique jette un regard chiffré sur la santé des Montréalais à partir des données de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) menée par Statistique Canada en 2005. Ces données permettent d'enrichir nos connaissances sur l'état de santé de la population montréalaise, notamment parce qu'elles fournissent pour une première fois des estimations à l'échelle des 12 centres de santé et de services sociaux (CSSS).

Cette publication présente, à l'aide de figures et tableaux, un portrait de santé des Montréalais de 12 ans et plus à travers 37 indicateurs touchant à différentes dimensions de la santé : leurs environnements physique et social, leur santé générale, leurs problèmes de santé physique et de santé mentale, leurs habitudes de vie ainsi que l'utilisation qu'ils font des services de santé et des services préventifs.

Divisé en trois sections, ce recueil propose en premier lieu un survol méthodologique et une définition de chacun des indicateurs retenus. La présentation des résultats de l'enquête débute à la seconde section par une série de tableaux où sont compilées les principales données pour chacun des 12 territoires de CSSS et pour l'ensemble de la région sociosanitaire. La troisième partie, qui contient l'essentiel de ce recueil, présente chaque indicateur retenu pour l'ensemble de la population montréalaise et selon ses caractéristiques sociodémographiques : le sexe, l'âge, la scolarité, le revenu, le statut d'immigration, la modalité de vie, sans oublier les résultats par territoire de CSSS. Lorsque possible, l'évolution des différents phénomènes est présentée pour l'ensemble de Montréal en comparaison avec les résultats obtenus pour l'ensemble des autres régions sociosanitaires du Québec. Enfin, pour plus de précision, les données ayant servi à la construction des graphiques et cartes de la section 3 sont fournies en annexe.

Les résultats de ce recueil sont également disponibles sur le site WEB de la Direction de santé publique de Montréal, à l'adresse suivante : <http://www.santepub-mtl.qc.ca>.



# Notes méthodologiques

## Source des données

Les données ayant servi à l'élaboration de ce recueil proviennent de Statistique Canada qui réalisait, en 2005, le troisième cycle<sup>1</sup> de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)<sup>2</sup> permettant d'obtenir des estimations sur l'état de santé et les déterminants de la santé des Canadiens. Les données recueillies concernent un échantillon de la population de 12 ans et plus non institutionnalisée; pour la région de Montréal, 5 390 personnes ont été jointes, ce qui permet d'obtenir des estimations à l'échelle des territoires de CSSS.

## Présentation des résultats

Au total, les 37 indicateurs retenus couvrent plusieurs dimensions de la santé, tant du point de vue de l'état de santé que de celui des déterminants de la santé. Signalons que certaines mesures de l'état de santé font référence à un diagnostic reçu de la part d'un professionnel de la santé alors que d'autres sont issues d'une autoévaluation. Chaque indicateur est présenté graphiquement selon différentes caractéristiques sociodémographiques : l'âge et le sexe (séparément et dans quelques cas conjointement), la modalité de vie, la scolarité, le revenu, le statut d'immigration et le territoire de CSSS (voir la carte des territoires à la page suivante). Ces croisements servent à découvrir les écarts possibles entre des sous-groupes de la population montréalaise en regard de la santé.

## Variables de croisement

- Les **groupes d'âge** varient afin de tenir compte de la nature de l'indicateur.
- La **modalité de vie** décrit les liens familiaux entre les membres d'un ménage correspondant au répondant, soit : personnes seules, couples, couples avec enfants, familles monoparentales et autres.
- Le **niveau de scolarité** est présenté en trois catégories : primaire ou secondaire non complété; diplôme d'études secondaires ou postsecondaires non complété; diplôme d'études postsecondaires.
- Les **catégories de revenu** retenues — faible, moyen, élevé — sont basées sur la distribution en déciles du revenu des ménages à l'échelle de la région sociosanitaire proposée par Statistique Canada<sup>3</sup>. Ainsi, la catégorie faible comprend les 3 premiers déciles, la catégorie du revenu moyen comprend les déciles 4 à 7 inclusivement, et finalement la catégorie à revenu élevé est formée des déciles 8 à 10.
- Les analyses concernant le **statut d'immigration** comparent les résultats de la population dite « locale » — c'est-à-dire celle dont le lieu de naissance est le Canada — à ceux des immigrants récents (arrivés depuis moins de 10 ans) ou de longue date (arrivés depuis 10 ans ou plus).

# Évolution dans le temps

À titre indicatif, des comparaisons ont aussi été faites dans le temps et dans l'espace. Ainsi, les résultats de Montréal en 2005 (cycle 3.1) sont comparés à ceux du reste du Québec et à ceux des cycles aux années antérieures de l'enquête : cycle 1.1 de 2000-2001 et cycle 2.1 de 2003. Malgré l'absence générale de différences statistiquement significatives, ces données peuvent servir à déceler des tendances à la hausse ou à la baisse. Comme des changements sont survenus dans le mode de collecte et la base de sondage, les comparaisons pour certaines variables ne sont faites qu'avec le cycle 2.1 de 2003.

## Précision des estimations

Comme il s'agit d'une enquête, les données ne couvrent qu'un échantillon de la population et sont donc sujettes à des imprécisions statistiques. La précision des résultats doit être évaluée par la variabilité échantillonnale (c'est-à-dire le coefficient de variation). Selon les standards de Statistique Canada, lorsque le coefficient de variation se situe entre 16,6 % et 33,3 %, l'estimation doit être utilisée avec prudence et est identifiée par un astérisque (\*). Un coefficient de variation égal ou supérieur à 33,3 % indique une valeur très imprécise; la donnée est tout de même présentée à titre indicatif : ces cas sont signalés par un double astérisque (\*\*).

Des intervalles de confiance ont également été calculés au seuil de confiance de 95 %. Ils sont illustrés sur les graphiques et fournis en annexe. Pour information, un seuil de 95 % indique qu'il y a 95 % de chance que la valeur réelle de l'indicateur se situe à l'intérieur des limites de l'intervalle calculé. Dans le cas où les effectifs sont plus faibles, par exemple pour les CSSS, les intervalles de confiance sont généralement plus étendus. Notamment, si les intervalles de confiance ne se chevauchent pas, on peut conclure qu'il y a une différence statistiquement significative entre les valeurs. Par contre, lorsque les intervalles se chevauchent, des tests statistiques sont effectués avant de pouvoir conclure à une différence statistiquement significative entre les résultats.


Contrairement à la pratique usuelle, la détection d'écarts statistiquement significatifs entre les CSSS et Montréal dans son ensemble s'est faite en considérant à la fois des seuils de signification de 95 % et de 90 %. Ainsi, lorsque le test effectué au seuil de 95 % ne signalait pas de différence significative, un second test au seuil de 90 % était réalisé<sup>4</sup>. Il en résulte que les estimations d'un CSSS par rapport à celles de Montréal peuvent être qualifiées de 5 façons et que l'on peut leur associer des couleurs différentes :

- Estimation plus élevée (test significatif au seuil de 95 %)
- Estimation possiblement plus élevée (test significatif seulement au seuil de 90 %)
- Estimation non différente significativement (aucun des deux tests n'est significatif)
- Estimation possiblement plus faible (test significatif seulement au seuil de 90 %)
- Estimation plus faible (test significatif au seuil de 95 %)

Précisons aussi que l'utilisation des couleurs rouge (estimation plus élevée) et verte (estimation plus faible) n'a pas de connotation négative ou positive. En fait, une valeur plus élevée peut à la fois référer à des conditions meilleures (par exemple un plus grand accès à un médecin de famille) ou moins bonnes (par exemple une plus grande proportion de fumeurs).

Finalement, signalons que les tableaux synthèse et les tableaux en annexe contiennent des valeurs de la population estimée (N). Celles-ci correspondent au nombre estimé de personnes dans la population (ou la sous-population) d'un territoire donné présentant la caractéristique socio-sanitaire mesurée par l'indicateur. Par exemple, cette estimation permet de dire que la population montréalaise en ménage privé compte environ 403 400 fumeurs de 12 ans et plus.

Carte des centres de santé et de services sociaux (CSSS)



1. Le premier cycle ayant eu lieu en 2000-2001 et le deuxième en 2003.
2. Pour plus d'information sur cette enquête, le lecteur peut consulter le site WEB suivant : [www.statcan.ca/menu-fr.htm](http://www.statcan.ca/menu-fr.htm).
3. « Cette variable dérivée est une distribution des résidents de chacune des régions sociosanitaires en déciles (dix catégories comprenant à peu près le même pourcentage de résidents pour chaque province) basée sur leur valeur à INCEDADR c'est-à-dire le ratio ajusté du revenu total de leur ménage au seuil de faible revenu correspondant aux tailles de leur ménage et de leur communauté. Elle fournit, pour chaque répondant, une comparaison proportionnelle du revenu de leur ménage à l'ensemble des revenus des ménages répondants de la même région sociosanitaire. Les déciles sont produits à partir de données pondérées. Les ratios ajustés sont présentés par ordre croissant, du plus petit au plus grand, pour l'ensemble des 10 provinces sans égard à la taille du ménage et de la communauté. Les variables dérivées ne sont calculées que pour les réponses valides (non déclaré, refus, etc., sont exclus). Du nombre total pondéré de cas pour lesquels des variables dérivées sont calculées, des bornes sont déterminées pour dériver des déciles. » Statistique Canada (2006), Spécifications des variables dérivées (VD) et des variables groupées intégrées ESCC cycle 3.1 (2005), 264 pages.
4. La même méthode a été employée pour les comparaisons entre Montréal et le reste du Québec.



# Définition des indicateurs

## Habitudes de vie

**Fumeurs** : fumeurs réguliers ou occasionnels de cigarettes parmi les personnes de 12 ans et plus.

**Peu actif durant les loisirs** : population de 18 ans et plus peu active ou sédentaire durant ses loisirs. L'indicateur tient compte de l'intensité, de la durée et de la fréquence de pratique des différentes activités.

**Faible fréquence de l'activité physique** : population de 12 ans et plus qui pratique rarement des activités physiques d'une durée de 15 minutes ou plus. Cette mesure est calculée sur une moyenne de 3 mois.

**Aucun transport actif pour les déplacements** : population de 12 ans et plus qui, au cours d'une semaine normale, ne fait aucun déplacement par la marche ou le vélo pour se rendre au travail, à l'école ou faire ses emplettes.

**14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine** : population de 12 ans et plus ayant consommé 14 verres et plus d'alcool au cours d'une période de sept jours.

**Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus au cours de la dernière année** : population de 12 ans et plus qui a consommé 5 verres ou plus d'alcool durant une même occasion au moins à 12 reprises ou plus au cours des 12 derniers mois.

## Environnement social

**Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale** : population de 12 ans et plus dont le sentiment d'appartenance à sa communauté locale est faible ou très faible. Cet indicateur est basé sur la question suivante : « comment décririez-vous votre sentiment d'appartenance à votre communauté locale? ».

## Environnement physique

**Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison** : population de non-fumeurs de 12 ans et plus exposée quotidiennement à la fumée des autres à la maison.

# État de santé générale

**Perception négative de l'état de santé :** population de 12 ans et plus qui considère que sa santé est passable ou mauvaise. Cet indicateur est fondé sur la question « en général, diriez-vous que votre santé est excellente, très bonne, bonne, passable, mauvaise? ».

**Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie :** population de 12 ans et plus dont les problèmes de santé ont parfois ou souvent des répercussions sur les activités de vie. L'indicateur reflète l'impact des problèmes de santé physique et de santé mentale à long terme (durée de 6 mois ou plus) sur les principales sphères de la vie : maison, travail, école et autres activités. Cet indicateur ne permet pas d'obtenir le taux d'incapacité ou de limitation des activités au sein de la population.

**Incapacité d'une journée ou plus au cours des 2 dernières semaines :** proportion de la population de 12 ans et plus qui a été alitée ou a limité ses activités au moins une journée au cours des 2 dernières semaines sans égard à la raison.

# État de santé physique

**Allergies alimentaires :** population de 12 ans et plus qui souffre d'allergies alimentaires.

**Allergies autres qu'alimentaires :** population de 12 ans et plus qui souffre d'allergies autres qu'alimentaires.

**Asthme :** population de 12 ans et plus qui fait de l'asthme.

**Arthrite ou rhumatisme :** population de 45 ans et plus qui a reçu un diagnostic d'arthrite ou de rhumatisme par un professionnel de la santé.

**Maux de dos :** population de 12 ans et plus qui a reçu un diagnostic de maux de dos ayant une autre cause que la fibromyalgie ou l'arthrite par un professionnel de la santé.

**Migraines :** population de 12 ans et plus qui a reçu un diagnostic de migraines par un professionnel de la santé.

**Hypertension :** population de 45 ans et plus qui souffre d'hypertension.

**Maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) :** population de 45 ans et plus qui a reçu un diagnostic de bronchite chronique, d'emphysème ou de bronchopneumopathie chronique obstructive par un professionnel de la santé.

**Embonpoint :** population de 18 ans et plus (excluant les femmes enceintes) dont l'indice de masse corporelle (IMC) se situe entre 25,0 et 29,9. L'IMC est calculé en divisant le poids (en kilogrammes) par le carré de la taille d'un individu (en mètres). Selon la norme internationale, l'IMC se répartit en quatre catégories :

poids insuffisant (IMC < 18,5)

poids normal (18,5 ≤ IMC ≤ 24,9)

embonpoint (25,0 ≤ IMC ≤ 29,9)

obésité (IMC ≥ 30,0)

**Obésité :** population de 18 ans et plus (excluant les femmes enceintes) dont l'indice de masse corporelle (IMC) est de 30,0 ou plus.

**Surplus de poids** : population de 12 à 17 ans dont l'indice de masse corporelle (IMC) est de 25,0 ou plus.

**Diagnostic d'une ITS** : population de 15 à 49 ans qui a déjà eu un diagnostic d'une infection transmise sexuellement.

**Blessures au cours de la dernière année** : population de 12 ans et plus qui s'est blessée de façon suffisamment grave pour limiter les activités normales - par exemple fracture, coupure profonde, brûlure grave, entorse à la cheville - au cours des 12 derniers mois, excluant les blessures attribuables aux mouvements répétitifs.

## État de santé mentale

**Perception négative de la santé mentale** : population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, ce qui correspond aux catégories passable et mauvaise. L'indicateur est fondé sur la question « en général, diriez-vous que votre santé mentale est excellente, très bonne, bonne, passable, mauvaise? ».

**Idees suicidaires sérieuses au cours de la vie** : population de 15 ans et plus ayant sérieusement songé au suicide à un moment de sa vie.

**Éprouve un stress quotidien élevé** : population de 20 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé, ce qui inclut les catégories assez et extrêmement stressantes. L'indicateur est fondé sur la question « en pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées ne sont pas du tout stressantes, pas tellement stressantes, sont un peu stressantes, assez stressantes, ou extrêmement stressantes? ».

**Éprouve un stress important au travail** : population de 20 à 74 ans qui considère que la plupart des journées au travail sont assez ou extrêmement stressantes.

## Services préventifs

**Vaccin antigrippal au cours de la dernière année** : population de 60 ans et plus qui a reçu un vaccin contre l'influenza au cours des 12 derniers mois.

**Test PAP au cours des 3 dernières années** : femmes de 18 à 69 ans qui ont subi un test de dépistage du col utérin (test de PAP) au cours des 36 derniers mois.

**Mammographie au cours des 2 dernières années** : femmes de 35 ans et plus qui ont subi une mammographie de dépistage ou diagnostique au cours des 24 derniers mois.

## Services de première ligne

**Avoir un médecin de famille :** population de 12 ans et plus qui dit avoir un médecin de famille.

**Avoir consulté un médecin de première ligne au cours de la dernière année :** population de 12 ans et plus qui a vu ou consulté par téléphone un médecin de famille ou pédiatre pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux au cours des 12 derniers mois.

**Avoir consulté un médecin spécialiste au cours de la dernière année :** population de 12 ans et plus qui a vu ou consulté un spécialiste (par exemple allergologue, orthopédiste, gynécologue, psychiatre) à l'exception des spécialistes des yeux, pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux au cours des 12 derniers mois.

**Avoir consulté un psychologue au cours de la dernière année :** population de 12 ans et plus qui a vu ou consulté par téléphone un psychologue pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux au cours des 12 derniers mois.

**Avoir consulté un intervenant en médecine douce au cours de la dernière année :** population de 12 ans et plus qui a vu ou consulté un intervenant en médecine douce (par exemple acupuncteur, homéopathe, massothérapeute) pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux au cours des 12 derniers mois.

**Besoins de soins de santé non satisfaits au cours de la dernière année :** population de 12 ans et plus qui, à un moment donné, n'a pas reçu les soins de santé nécessaires au moment désiré au cours des 12 derniers mois.

# Partie 1

## **Tableaux sommaires de Montréal et ses CSSS**





**Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, Montréal, 2005**  
**Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1**

Indicateurs	Population estimée	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre Montréal et le reste du Québec		
				-100 %	0	+100 %
<b>Habitudes de vie</b>						
Fumeurs	404 300	25	[23,4 ; 26,5]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	588 900	39 ●	[37,8 ; 40,1]			
Faible fréquence de l'activité physique	323 100	20 ●	[18,5 ; 21,4]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	351 800	21 ●	[19,5 ; 22,4]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	111 500	7	[ 5,8 ; 7,6]			
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus (dernière année)	241 600	15 ●	[13,6 ; 16,1]			
<b>Environnements social et physique</b>						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	726 100	45	[43,0 ; 46,6]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	128 200	11 ●	[ 9,3 ; 11,8]			
<b>État de santé générale</b>						
Perception négative l'état de santé	181 600	11 ●	[10,1 ; 12,3]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	331 900	20	[19,0 ; 21,9]			
Incapacité d'une journée ou plus (2 dernières semaines)	221 100	14	[12,4 ; 14,9]			
<b>État de santé physique</b>						
Allergies alimentaires	112 800	7 ●	[ 6,1 ; 7,9]			
Allergies autres qu'alimentaires	420 700	26 ●	[24,4 ; 27,5]			
Asthme	146 200	9	[ 8,0 ; 10,0]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	200 700	28 ●	[25,2 ; 30,0]			
Maux de dos	265 800	16	[15,1 ; 17,7]			
Migraines	154 400	10	[ 8,5 ; 10,6]			
Hypertension - 45 ans et plus	206 200	28	[26,0 ; 30,8]			
MPOC - 45 ans et plus	44 100	6	[ 4,9 ; 7,5]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	458 400	30 ●	[28,7 ; 32,1]			
Obésité ( IMC ≥ 30 ) - 18 ans et plus	196 800	13 ●	[11,8 ; 14,3]			
Surplus de poids (IMC ≥ 25) - 12 à 17 ans	19 200	17	[12,7 ; 24,0]			
Diagnostic d'une ITS - 15 à 49 ans	81 100	8	[ 6,8 ; 9,3]			
Blessures (dernière année)	182 400	11	[10,1 ; 12,4]			
<b>État de santé mentale</b>						
Perception négative de la santé mentale	71 300	4 ●	[ 3,7 ; 5,2]			
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	184 900	12	[10,6 ; 13,0]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	401 700	27 ●	[25,7 ; 29,1]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	378 000	37	[34,8 ; 39,3]			
<b>Services préventifs</b>						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	194 900	57	[53,4 ; 61,2]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	486 400	72 ●	[69,7 ; 74,7]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	244 800	45	[42,4 ; 48,6]			
<b>Services de première ligne</b>						
Avoir un médecin de famille	1 094 700	68 ●	[65,9 ; 69,2]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	1 080 500	67 ●	[64,9 ; 68,3]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	567 300	35 ●	[33,3 ; 36,7]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	98 700	6 ●	[ 5,2 ; 6,9]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	216 100	13 ●	[12,1 ; 14,5]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	216 700	13 ●	[12,2 ; 14,6]			
				-100 %	0	+100 %

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, Statistique Canada, 2005.

**Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS de l'Ouest-de-l'Île, 2005**  
**Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1**

Indicateurs	Population estimée	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre le CSSS et Montréal		
				-100 %	0	+100 %
<b>Habitudes de vie</b>						
Fumeurs	36 500	20 ●	[15,9 ; 24,5]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	59 600	35 ●	[30,0 ; 40,5]			
Faible fréquence de l'activité physique	28 700	16 ●	[11,9 ; 19,8]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	61 100	32 ●	[27,4 ; 37,3]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	13 500	7*	[ 4,8 ; 10,6]			
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus (dernière année)	21 700	12 ●	[ 8,5 ; 15,6]			
<b>Environnements social et physique</b>						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	80 400	44 ●	[38,6 ; 49,2]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	10 300	7* ●	[ 4,2 ; 10,6]			
<b>État de santé générale</b>						
Perception négative de l'état de santé	16 700	9*	[ 6,2 ; 12,5]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	48 600	27 ●	[21,9 ; 31,2]			
Incapacité d'une journée ou plus (2 dernières semaines)	24 200	13 ●	[ 9,9 ; 17,4]			
<b>État de santé physique</b>						
Allergies alimentaires	20 000	11 ●	[ 7,9 ; 14,8]			
Allergies autres qu'alimentaires	55 700	30 ●	[25,5 ; 35,2]			
Asthme	21 200	12 ●	[ 8,4 ; 15,4]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	21 400	26 ●	[19,2 ; 33,6]			
Maux de dos	30 600	17 ●	[13,0 ; 21,1]			
Migraines	17 200	9*	[ 6,4 ; 12,8]			
Hypertension - 45 ans et plus	23 200	28 ●	[21,4 ; 36,2]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	53 400	32 ●	[26,5 ; 36,8]			
Obésité ( IMC ≥ 30 ) - 18 ans et plus	22 400	13 ●	[ 9,7 ; 17,5]			
Blessures (dernière année)	22 000	12 ●	[ 8,8 ; 16,1]			
<b>État de santé mentale</b>						
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	15 500	9* ●	[ 5,9 ; 12,5]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	35 200	21 ●	[16,7 ; 25,8]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	33 500	28 ●	[21,9 ; 33,8]			
<b>Services préventifs</b>						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	23 000	63 ●	[50,2 ; 74,7]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	63 000	85 ●	[78,1 ; 90,7]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	29 200	47 ●	[37,5 ; 55,6]			
<b>Services de première ligne</b>						
Avoir un médecin de famille	131 700	72 ●	[67,1 ; 76,6]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	123 700	67 ●	[62,5 ; 72,4]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	74 500	41 ●	[35,5 ; 45,9]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	13 000	7*	[ 4,7 ; 10,5]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	26 600	14 ●	[10,9 ; 18,6]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	24 800	14 ●	[10,2 ; 17,7]			

-100 %      0      +100 %

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

**Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, 2005**  
**Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1**

Indicateurs	Population estimée	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre le CSSS et Montréal		
				-100 %	0	+100 %
<b>Habitudes de vie</b>						
Fumeurs	32 000	27	[21,2 ; 32,9]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	41 900	38	[31,3 ; 44,6]			
Faible fréquence de l'activité physique	18 200	15 ●	[10,8 ; 20,8]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	38 400	31 ●	[24,9 ; 37,0]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	4 800	4* ●	[ 1,9 ; 7,6]			
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus (dernière année)	13 900	12*	[ 7,8 ; 16,7]			
<b>Environnements social et physique</b>						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	50 000	42	[35,8 ; 49,1]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	8 600	10*	[ 5,8 ; 15,5]			
<b>État de santé générale</b>						
Perception négative de l'état de santé	13 700	12*	[ 7,8 ; 16,6]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	21 900	18	[13,6 ; 24,2]			
Incapacité d'une journée ou plus (2 dernières semaines)	18 000	15	[10,8 ; 20,7]			
<b>État de santé physique</b>						
Allergies alimentaires	7 700	7*	[ 3,8 ; 10,9]			
Allergies autres qu'alimentaires	28 700	24	[18,7 ; 30,0]			
Asthme	9 000	8*	[ 4,5 ; 11,9]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	14 200	27	[18,6 ; 36,8]			
Maux de dos	26 700	23 ●	[17,0 ; 28,0]			
Migraines	17 100	14 ●	[10,0 ; 19,6]			
Hypertension - 45 ans et plus	16 900	32	[22,9 ; 41,1]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	30 200	27	[21,0 ; 33,2]			
Obésité ( IMC ≥ 30 ) - 18 ans et plus	18 100	16	[11,5 ; 22,1]			
Blessures (dernière année)	14 000	12*	[ 7,9 ; 17,0]			
<b>État de santé mentale</b>						
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	13 100	12*	[ 7,6 ; 16,9]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	28 500	27	[20,4 ; 32,6]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	30 800	41	[32,4 ; 48,8]			
<b>Services préventifs</b>						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	12 300	51	[35,5 ; 66,7]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	37 300	74	[63,3 ; 82,3]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	17 500	43	[32,0 ; 54,5]			
<b>Services de première ligne</b>						
Avoir un médecin de famille	86 100	73 ●	[67,3 ; 78,9]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	79 400	67	[60,9 ; 73,3]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	37 900	32	[25,8 ; 38,1]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	6 000	5*	[ 2,5 ; 8,7]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	11 500	10* ●	[ 6,3 ; 14,6]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	10 800	9* ●	[ 5,6 ; 13,6]			

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

**Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS du Sud-Ouest—Verdun, 2005**  
**Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1**

Indicateurs	Population estimée	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre le CSSS et Montréal		
				-100 %	0	+100 %
<b>Habitudes de vie</b>						
Fumeurs	33 800	29	[23,2 ; 35,2]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	34 600	33 ●	[26,0 ; 39,0]			
Faible fréquence de l'activité physique	18 000	16 ●	[11,1 ; 21,2]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	20 600	17	[12,6 ; 23,0]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	10 600	9*	[ 5,4 ; 13,5]			
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus (dernière année)	19 700	17	[12,0 ; 22,4]			
<b>Environnements social et physique</b>						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	58 700	51	[43,9 ; 57,5]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	11 100	14*	[ 8,5 ; 20,0]			
<b>État de santé générale</b>						
Perception négative de l'état de santé	14 100	12*	[ 8,0 ; 17,1]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	24 000	21	[15,3 ; 26,1]			
Incapacité d'une journée ou plus (2 dernières semaines)	14 800	13*	[ 8,7 ; 17,9]			
<b>État de santé physique</b>						
Allergies alimentaires	7 100	6*	[ 3,2 ; 9,9]			
Allergies autres qu'alimentaires	25 800	22	[16,9 ; 27,9]			
Asthme	11 000	10*	[ 6,0 ; 14,3]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	15 000	29	[19,9 ; 38,6]			
Maux de dos	21 900	19	[13,8 ; 24,5]			
Migraines	11 300	10*	[ 6,0 ; 14,3]			
Hypertension - 45 ans et plus	15 400	30	[21,0 ; 40,0]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	34 900	33	[26,0 ; 39,3]			
Obésité ( IMC ≥ 30 ) - 18 ans et plus	13 800	13*	[ 8,6 ; 18,5]			
Blessures (dernière année)	17 100	15	[10,2 ; 20,1]			
<b>État de santé mentale</b>						
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	17 600	16	[11,1 ; 21,6]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	33 900	32	[25,9 ; 39,0]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	26 900	37	[29,1 ; 45,5]			
<b>Services préventifs</b>						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	12 600	48	[33,2 ; 62,9]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	32 700	73	[61,8 ; 81,8]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	18 600	49	[36,9 ; 60,3]			
<b>Services de première ligne</b>						
Avoir un médecin de famille	77 600	67	[60,9 ; 73,3]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	77 900	67	[60,8 ; 73,4]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	35 400	31	[24,5 ; 36,7]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	8 300	7*	[ 4,2 ; 11,6]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	16 800	15	[10,2 ; 20,0]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	17 700	15	[10,6 ; 20,5]			

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

**Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS Cavendish, 2005**  
**Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1**

Indicateurs	Population estimée	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre le CSSS et Montréal		
				-100 %	0	+100 %
<b>Habitudes de vie</b>						
Fumeurs	25 400	24	[18,4 ; 30,8]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	30 800	32 ●	[25,0 ; 38,7]			
Faible fréquence de l'activité physique	14 500	14* ●	[ 9,4 ; 19,7]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	19 900	18	[13,1 ; 24,3]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	9 000	8*	[ 4,8 ; 13,0]			
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus (dernière année)	19 800	19	[13,7 ; 25,2]			
<b>Environnements social et physique</b>						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	46 100	44	[36,9 ; 51,0]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	8 500	11*	[ 6,2 ; 16,9]			
<b>État de santé générale</b>						
Perception négative de l'état de santé	8 400	8*	[ 4,6 ; 12,8]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	20 200	19	[14,0 ; 25,4]			
Incapacité d'une journée ou plus (2 dernières semaines)	15 200	15*	[10,0 ; 20,4]			
<b>État de santé physique</b>						
Allergies alimentaires	8 200	8*	[ 4,3 ; 12,2]			
Allergies autres qu'alimentaires	25 900	25	[18,8 ; 31,2]			
Asthme	6 800	7*	[ 3,5 ; 10,9]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	12 200	26*	[17,3 ; 36,6]			
Maux de dos	15 100	14*	[ 9,6 ; 19,8]			
Migraines	9 800	9*	[ 5,5 ; 14,0]			
Hypertension - 45 ans et plus	13 600	28*	[19,2 ; 39,1]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	27 400	28	[21,9 ; 35,9]			
Obésité ( IMC ≥ 30 ) - 18 ans et plus	9 800	10*	[ 5,9 ; 15,4]			
Blessures (dernière année)	12 700	12*	[ 8,0 ; 17,9]			
<b>État de santé mentale</b>						
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	7 300	7* ●	[ 3,9 ; 12,2]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	25 300	26	[20,1 ; 33,6]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	20 500	32	[23,6 ; 40,3]			
<b>Services préventifs</b>						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	13 600	67	[49,0 ; 81,4]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	31 500	73	[61,8 ; 82,5]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	16 300	45	[33,1 ; 57,5]			
<b>Services de première ligne</b>						
Avoir un médecin de famille	73 900	70	[63,5 ; 76,6]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	73 600	70	[63,5 ; 76,2]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	39 800	38	[31,1 ; 44,6]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	7 200	7*	[ 3,9 ; 11,5]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	10 700	10*	[ 6,3 ; 15,2]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	13 800	13*	[ 8,7 ; 18,6]			

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

**Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS de la Montagne, 2005**  
**Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1**

Indicateurs	Population estimée	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre le CSSS et Montréal		
				-100 %	0	+100 %
<b>Habitudes de vie</b>						
Fumeurs	37 200	19 ●	[15,1 ; 23,3]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	66 400	36	[30,6 ; 40,7]			
Faible fréquence de l'activité physique	28 300	14 ●	[10,9 ; 18,3]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	32 900	16 ●	[12,4 ; 20,1]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	16 100	8*	[ 5,4 ; 11,2]			
Consommation élevée d'alcool (dernière année)	26 500	13	[10,0 ; 17,3]			
<b>Environnements social et physique</b>						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	80 100	41	[35,7 ; 45,9]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	11 500	7* ●	[ 4,7 ; 10,9]			
<b>État de santé générale</b>						
Perception négative de l'état de santé	13 900	7* ●	[ 4,6 ; 10,1]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	37 900	19	[15,3 ; 23,6]			
Incapacité d'une journée ou plus (2 dernières semaines)	30 000	15	[11,7 ; 19,3]			
<b>État de santé physique</b>						
Allergies alimentaires	16 500	8*	[ 5,7 ; 11,7]			
Allergies autres qu'alimentaires	43 600	22	[18,0 ; 26,5]			
Asthme	19 400	10	[ 7,1 ; 13,5]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	23 200	27	[20,0 ; 33,9]			
Maux de dos	22 800	12 ●	[ 8,5 ; 15,3]			
Migraines	17 000	9*	[ 6,0 ; 12,0]			
Hypertension - 45 ans et plus	21 700	25	[18,5 ; 32,2]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	55 500	30	[25,0 ; 34,7]			
Obésité ( IMC ≥ 30 ) - 18 ans et plus	15 600	8* ●	[ 5,7 ; 11,8]			
Blessures (dernière année)	24 400	13	[ 9,2 ; 16,4]			
<b>État de santé mentale</b>						
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	19 400	10	[ 7,0 ; 13,7]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	46 800	26	[21,6 ; 31,1]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	45 600	38	[31,8 ; 44,7]			
<b>Services préventifs</b>						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	29 100	74 ●	[62,4 ; 84,0]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	58 100	72	[64,1 ; 79,2]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	31 900	47	[38,1 ; 56,0]			
<b>Services de première ligne</b>						
Avoir un médecin de famille	134 700	69	[63,8 ; 73,3]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	125 600	64	[59,0 ; 68,8]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	73 200	37	[32,4 ; 42,3]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	7 800	4* ●	[ 2,3 ; 6,6]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	25 700	13	[ 9,7 ; 16,9]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	32 300	16	[12,8 ; 20,6]			

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

**Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS de Bordeaux-Cartierville—St-Laurent, 2005**  
**Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1**



1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

\*\* L'estimation est très imprécise, elle est fournie à titre indicatif seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

**Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord, 2005**  
**Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1**

Indicateurs	Population estimée	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre le CSSS et Montréal		
				-100 %	0	+100 %
<b>Habitudes de vie</b>						
Fumeurs	27 900	19 ●	[14,7 ; 24,4]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	54 600	41	[34,7 ; 46,9]			
Faible fréquence de l'activité physique	28 400	20	[15,1 ; 24,9]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	27 900	19	[14,2 ; 23,8]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	6 300	4* ●	[ 2,0 ; 7,3]			
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus (dernière année)	12 200	8* ●	[ 5,2 ; 12,2]			
<b>Environnements social et physique</b>						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	65 100	45	[39,1 ; 51,1]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	12 600	11*	[ 7,1 ; 15,9]			
<b>État de santé générale</b>						
Perception négative de l'état de santé	18 600	13	[ 9,2 ; 17,5]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	28 900	20	[15,4 ; 24,9]			
Incapacité d'une journée ou plus (2 dernières semaines)	16 600	11*	[ 7,9 ; 15,8]			
<b>État de santé physique</b>						
Allergies alimentaires	8 800	6*	[ 3,7 ; 9,8]			
Allergies autres qu'alimentaires	35 200	24	[19,2 ; 29,4]			
Asthme	7 600	5* ●	[ 2,8 ; 8,5]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	18 300	28	[20,3 ; 37,0]			
Maux de dos	24 900	17	[13,0 ; 22,3]			
Migraines	13 700	10*	[ 6,3 ; 13,6]			
Hypertension - 45 ans et plus	17 600	27	[19,4 ; 35,8]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	51 000	38 ●	[32,2 ; 44,4]			
Obésité ( IMC ≥ 30 ) - 18 ans et plus	15 000	11*	[ 7,5 ; 15,8]			
Blessures (dernière année)	14 800	10*	[ 7,0 ; 14,7]			
<b>État de santé mentale</b>						
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	15 100	11*	[ 7,4 ; 15,6]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	37 700	29	[23,3 ; 34,7]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	35 000	41	[33,0 ; 48,2]			
<b>Services préventifs</b>						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	17 500	55	[42,4 ; 68,0]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	35 900	61 ●	[51,7 ; 69,8]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	17 900	37 ●	[26,8 ; 46,3]			
<b>Services de première ligne</b>						
Avoir un médecin de famille	94 300	65	[59,8 ; 71,1]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	91 700	63	[57,7 ; 69,2]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	46 600	32	[26,8 ; 37,9]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	7 100	5*	[ 2,5 ; 8,1]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	16 600	11*	[ 7,9 ; 15,8]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	18 400	13	[ 9,1 ; 17,4]			

-100 %      0      +100 %

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

**Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS du Cœur-de-l'Île, 2005**  
**Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1**

Indicateurs	Population estimée	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre le CSSS et Montréal		
				-100 %	0	+100 %
<b>Habitudes de vie</b>						
Fumeurs	25 200	26	[20,0 ; 33,2]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	32 100	36	[28,2 ; 42,9]			
Faible fréquence de l'activité physique	17 100	18	[12,3 ; 24,2]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	15 100	15*	[10,0 ; 20,8]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	5 400	6*	[ 2,7 ; 9,9]			
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus (dernière année)	18 400	19	[13,4 ; 25,3]			
<b>Environnements social et physique</b>						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	40 000	42	[34,3 ; 49,0]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	9 500	13*	[ 8,1 ; 20,3]			
<b>État de santé générale</b>						
Perception négative de l'état de santé	11 800	12*	[ 7,7 ; 17,7]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	23 300	24	[18,1 ; 31,1]			
Incapacité d'une journée ou plus (2 dernières semaines)	15 500	16*	[10,9 ; 22,1]			
<b>État de santé physique</b>						
Allergies alimentaires	4 600	5*	[ 2,3 ; 9,1]			
Allergies autres qu'alimentaires	25 500	26	[20,1 ; 33,4]			
Asthme	11 200	12*	[ 7,3 ; 17,1]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	12 800	29*	[19,7 ; 40,4]			
Maux de dos	17 000	18	[12,3 ; 23,9]			
Migraines	9 200	9*	[ 5,5 ; 14,5]			
Hypertension - 45 ans et plus	11 000	26*	[16,6 ; 36,4]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	24 300	27	[20,4 ; 34,3]			
Obésité ( IMC ≥ 30 ) - 18 ans et plus	10 500	12*	[ 7,4 ; 17,8]			
Blessures (dernière année)	11 200	12*	[ 7,5 ; 17,6]			
<b>État de santé mentale</b>						
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	14 000	15*	[10,1 ; 21,5]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	28 200	32	[25,0 ; 39,2]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	25 900	41	[31,9 ; 49,9]			
<b>Services préventifs</b>						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	9 500	53*	[34,3 ; 71,7]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	26 900	69	[57,5 ; 79,8]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	12 700	44	[30,2 ; 57,8]			
<b>Services de première ligne</b>						
Avoir un médecin de famille	62 700	65	[57,9 ; 71,8]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	68 700	71	[63,7 ; 77,4]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	33 800	35	[28,1 ; 41,9]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	7 300	8*	[ 4,2 ; 12,5]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	18 300	19	[13,7 ; 25,6]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	16 500	17	[11,9 ; 23,3]			

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

**Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS Jeanne-Mance, 2005**  
**Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1**

Indicateurs	Population estimée	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre le CSSS et Montréal		
				-100 %	0	+100 %
<b>Habitudes de vie</b>						
Fumeurs	43 800	36 ●	[29,7 ; 42,2]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	35 400	31 ●	[24,7 ; 37,0]			
Faible fréquence de l'activité physique	22 500	18	[13,6 ; 24,1]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	9 100	7* ●	[ 4,4 ; 11,6]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	14 300	11* ●	[ 7,6 ; 16,3]			
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus (dernière année)	34 700	29 ●	[22,6 ; 34,4]			
<b>Environnements social et physique</b>						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	45 200	37 ●	[30,9 ; 43,5]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	7 600	10*	[ 5,3 ; 15,6]			
<b>État de santé générale</b>						
Perception négative de l'état de santé	13 200	11*	[ 7,2 ; 15,6]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	24 400	20	[14,9 ; 25,3]			
Incapacité d'une journée ou plus (2 dernières semaines)	16 200	13*	[ 9,3 ; 18,6]			
<b>État de santé physique</b>						
Allergies alimentaires	7 200	6*	[ 3,4 ; 10,0]			
Allergies autres qu'alimentaires	37 600	31	[24,9 ; 36,8]			
Asthme	11 000	9*	[ 5,7 ; 13,6]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	14 400	26	[18,2 ; 36,1]			
Maux de dos	20 200	17	[12,0 ; 22,0]			
Migraines	7 600	6* ●	[ 3,4 ; 10,0]			
Hypertension - 45 ans et plus	16 600	30	[21,5 ; 39,3]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	25 500	22 ●	[16,4 ; 27,5]			
Obésité ( IMC ≥ 30 ) - 18 ans et plus	10 000	8* ●	[ 5,1 ; 13,0]			
Blessures (dernière année)	17 100	14 *	[ 9,7 ; 19,2]			
<b>État de santé mentale</b>						
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	20 400	17 ●	[12,5 ; 23,0]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	35 500	32	[26,0 ; 38,7]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	33 400	42	[34,2 ; 50,2]			
<b>Services préventifs</b>						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	14 800	62	[46,5 ; 76,2]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	38 900	74	[63,9 ; 82,1]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	15 400	40	[28,9 ; 51,6]			
<b>Services de première ligne</b>						
Avoir un médecin de famille	71 900	59 ●	[52,8 ; 65,5]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	82 200	68	[61,6 ; 73,7]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	42 100	34	[28,3 ; 40,7]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	13 800	11* ●	[ 7,6 ; 16,2]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	26 500	22 ●	[16,4 ; 27,1]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	14 000	11*	[ 7,6 ; 16,2]			

-100 %      0      +100 %

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

**Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS de St-Léonard et St-Michel, 2005**  
**Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1**

Indicateurs	Population estimée	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre le CSSS et Montréal		
				-100 %	0	+100 %
<b>Habitudes de vie</b>						
Fumeurs	26 600	24	[18,0 ; 29,6]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	48 300	47 ●	[39,5 ; 53,7]			
Faible fréquence de l'activité physique	29 800	27 ●	[20,8 ; 32,9]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	22 200	19	[14,0 ; 25,0]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	5 700	5*	[ 2,3 ; 8,7]			
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus (dernière année)	12 500	11* ●	[ 7,1 ; 16,1]			
<b>Environnements social et physique</b>						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	48 500	44	[36,9 ; 50,6]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	7 300	9*	[ 4,9 ; 14,2]			
<b>État de santé générale</b>						
Perception négative de l'état de santé	15 700	14*	[ 9,8 ; 19,7]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	20 000	18	[13,1 ; 23,9]			
Incapacité d'une journée ou plus (2 dernières semaines)	18 600	17	[11,9 ; 22,4]			
<b>État de santé physique</b>						
Allergies alimentaires	5 500	5*	[ 2,3 ; 8,6]			
Allergies autres qu'alimentaires	25 900	23	[17,6 ; 29,1]			
Asthme	9 400	9*	[ 5,1 ; 13,1]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	15 800	32	[22,5 ; 41,3]			
Maux de dos	16 500	15	[10,3 ; 20,3]			
Migraines	12 500	11*	[ 7,4 ; 16,5]			
Hypertension - 45 ans et plus	13 100	27*	[18,0 ; 36,7]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	34 700	34	[26,9 ; 40,5]			
Obésité ( IMC ≥ 30 ) - 18 ans et plus	22 300	22 ●	[16,1 ; 28,4]			
Blessures (dernière année)	9 700	9*	[ 5,1 ; 13,3]			
<b>État de santé mentale</b>						
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	11 600	11*	[ 6,7 ; 16,0]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	26 700	27	[20,3 ; 33,3]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	25 900	37	[28,3 ; 45,3]			
<b>Services préventifs</b>						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	11 000	43* ●	[28,3 ; 59,0]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	32 800	70	[60,1 ; 79,5]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	18 600	51	[38,6 ; 62,9]			
<b>Services de première ligne</b>						
Avoir un médecin de famille	71 800	64	[58,0 ; 70,9]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	74 700	67	[60,8 ; 73,5]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	32 900	30 ●	[23,4 ; 35,7]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	3 000	3** ●	[ 1,1 ; 6,1]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	10 200	9* ●	[ 5,5 ; 13,8]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	15 600	14*	[ 9,4 ; 19,2]			

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

\*\* L'estimation est très imprécise, elle est fournie à titre indicatif seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

**Indicateurs socio-sanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS Lucille-Teasdale, 2005**  
**Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1**

Indicateurs	Population estimée	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre le CSSS et Montréal		
				-100 %	0	+100 %
<b>Habitudes de vie</b>						
Fumeurs	46 100	31 ●	[25,2 ; 35,9]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	59 400	42	[36,0 ; 48,0]			
Faible fréquence de l'activité physique	41 100	27 ●	[22,1 ; 32,5]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	30 800	20	[15,5 ; 25,0]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	14 800	10*	[ 6,4 ; 13,6]			
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus (dernière année)	28 200	19	[14,4 ; 23,9]			
<b>Environnements social et physique</b>						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	81 200	54 ●	[47,7 ; 59,5]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	12 600	12*	[ 7,9 ; 17,5]			
<b>État de santé générale</b>						
Perception négative de l'état de santé	21 800	14	[10,5 ; 19,0]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	28 200	19	[14,3 ; 23,6]			
Incapacité d'une journée ou plus (2 dernières semaines)	17 300	12	[ 8,1 ; 15,8]			
<b>État de santé physique</b>						
Allergies alimentaires	9 500	6*	[ 3,8 ; 9,8]			
Allergies autres qu'alimentaires	43 800	29	[23,6 ; 34,1]			
Asthme	14 600	10*	[ 6,4 ; 13,5]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	19 600	29	[21,4 ; 37,9]			
Maux de dos	31 100	20 ●	[15,8 ; 25,2]			
Migraines	13 800	9*	[ 6,1 ; 13,1]			
Hypertension - 45 ans et plus	21 600	32	[23,6 ; 39,9]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	32 800	23 ●	[18,2 ; 28,5]			
Obésité ( IMC ≥ 30 ) - 18 ans et plus	23 300	16	[12,1 ; 21,5]			
Blessures (dernière année)	15 000	10*	[ 6,6 ; 14,0]			
<b>État de santé mentale</b>						
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	22 300	15	[11,2 ; 20,3]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	42 900	31	[25,6 ; 36,9]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	39 600	42	[34,9 ; 49,8]			
<b>Services préventifs</b>						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	18 000	54	[41,7 ; 66,3]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	44 600	71	[61,5 ; 78,8]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	20 300	40	[29,8 ; 49,4]			
<b>Services de première ligne</b>						
Avoir un médecin de famille	97 500	65	[59,0 ; 70,1]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	96 600	64	[58,3 ; 69,4]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	53 100	35	[29,5 ; 40,6]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	10 700	7*	[ 4,3 ; 10,6]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	21 100	14	[10,2 ; 18,6]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	19 500	13	[ 9,3 ; 17,4]			

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

**Indicateurs sociosanitaires, population de 12 ans et plus, CSSS de la Pointe-de-l'Île, 2005**  
**Résultats de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - cycle 3.1**

Indicateurs	Population estimée	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance à 95 %	Tendance de la variation entre le CSSS et Montréal		
				-100 %	0	+100 %
<b>Habitudes de vie</b>						
Fumeurs	45 200	27	[22,2 ; 32,1]			
Peu actif durant les loisirs - 18 ans et plus	81 700	53 ●	[46,8 ; 58,4]			
Faible fréquence de l'activité physique	49 200	30 ●	[24,6 ; 34,9]			
Aucun transport actif pour les déplacements (travail / études / emplettes)	40 400	24	[18,9 ; 28,3]			
14 consommations d'alcool et plus au cours d'une semaine	9 400	5*	[ 3,2 ; 8,6]			
Consommation élevée d'alcool 12 fois ou plus (dernière année)	23 300	14	[10,4 ; 18,4]			
<b>Environnements social et physique</b>						
Faible sentiment d'appartenance à la communauté locale	75 900	46	[40,3 ; 51,5]			
Exposition des non-fumeurs à la fumée secondaire à la maison	16 400	14*	[ 9,4 ; 18,7]			
<b>État de santé générale</b>						
Perception négative de l'état de santé	23 900	14	[10,7 ; 18,8]			
Impact des problèmes de santé sur les principales sphères d'activité de la vie	31 100	19	[14,7 ; 23,6]			
Incapacité d'une journée ou plus (2 dernières semaines)	21 100	13	[ 9,3 ; 17,0]			
<b>État de santé physique</b>						
Allergies alimentaires	12 400	7*	[ 4,7 ; 10,8]			
Allergies autres qu'alimentaires	49 700	30	[25,0 ; 35,1]			
Asthme	17 400	11	[ 7,4 ; 14,5]			
Arthrite ou rhumatisme - 45 ans et plus	23 100	31	[23,3 ; 38,6]			
Maux de dos	23 400	14	[10,4 ; 18,5]			
Migraines	16 700	10*	[ 7,1 ; 14,1]			
Hypertension - 45 ans et plus	23 900	32	[24,4 ; 39,9]			
Embonpoint (25 ≤ IMC ≤ 29,9) - 18 ans et plus	51 300	33	[27,6 ; 38,6]			
Obésité ( IMC ≥ 30 ) - 18 ans et plus	22 200	14	[10,4 ; 18,9]			
Blessures (dernière année)	14 100	8*	[ 5,5 ; 12,2]			
<b>État de santé mentale</b>						
Idées suicidaires sérieuses au cours de la vie - 15 ans et plus	20 800	13	[ 9,2 ; 17,4]			
Éprouve un stress quotidien élevé - 20 ans et plus	32 800	22 ●	[17,2 ; 26,8]			
Éprouve un stress important au travail - 20 à 74 ans	33 900	32	[25,7 ; 38,9]			
<b>Services préventifs</b>						
Vaccin antigrippal (dernière année) - 60 ans et plus	18 300	48	[36,4 ; 60,5]			
Test PAP (3 dernières années) - 18 à 69 ans	50 300	71	[62,7 ; 78,8]			
Mammographie (2 dernières années) - 35 ans et plus	27 100	51	[41,1 ; 60,9]			
<b>Services de première ligne</b>						
Avoir un médecin de famille	118 000	71	[66,1 ; 76,2]			
Avoir consulté un médecin de première ligne (dernière année)	113 500	68	[63,3 ; 73,7]			
Avoir consulté un médecin spécialiste (dernière année)	55 800	34	[28,3 ; 38,8]			
Avoir consulté un psychologue (dernière année)	9 900	6*	[ 3,7 ; 9,3]			
Avoir consulté un intervenant en médecine douce (dernière année)	19 000	12	[ 8,2 ; 15,6]			
Besoins de soins de santé non satisfaits (dernière année)	20 600	12	[ 9,0 ; 16,6]			

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.



# Partie 2

## **Regard sur la santé des Montréalais et ses déterminants**




# Habitudes de vie


## tabagisme

### Proportion de la population de 12 ans et plus fumant la cigarette, Montréal, 2005


Selon l'âge




Selon le sexe




Selon le statut d'immigration



Selon le niveau de scolarité




Selon le niveau de revenu




## Proportion de la population de 12 ans et plus fumant la cigarette, Montréal, 2005

Selon le territoire de CSSS



Selon l'année








Source :  
Statistique Canada,  
Enquête sur la santé  
dans les collectivités  
canadiennes, 2005.


# Habitudes de vie

## fréquence d'activités physiques


### Proportion de la population de 12 ans et plus pratiquant rarement une activité physique d'une durée de 15 minutes et plus, Montréal, 2005



## Proportion de la population de 12 ans et plus pratiquant rarement une activité physique d'une durée de 15 minutes et plus, Montréal, 2005



### Selon l'année








\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Habitudes de vie


## loisirs inactifs

### Proportion de la population de 18 ans et plus inactive durant ses loisirs, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 18 ans et plus inactive durant ses loisirs, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS



### Selon l'année




Source :  
Statistique Canada,  
Enquête sur la santé  
dans les collectivités  
canadiennes, 2005.

# Habitudes de vie


## transport actif

### Proportion de la population de 12 ans et plus n'utilisant pas un transport actif pour le travail, l'école ou emplettes, Montréal, 2005


Selon l'âge




Selon le sexe




Selon le statut d'immigration





Selon le niveau de scolarité



Selon le niveau de revenu



## Proportion de la population de 12 ans et plus n'utilisant pas un transport actif pour le travail, l'école ou emplettes, Montréal, 2005



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.


Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Habitudes de vie


## alcool quantité

### Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consommé 14 verres et plus d'alcool au cours d'une semaine, Montréal, 2005


Selon l'âge




Selon le sexe




Selon le statut d'immigration



Selon le niveau de scolarité




Selon le niveau de revenu



## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consommé 14 verres et plus d'alcool au cours d'une semaine, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS




\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

\*\* L'estimation est très imprécise, elle est fournie à titre indicatif seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

### Selon l'année




# Habitudes de vie


## alcool fréquence

**Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consommé 5 verres et plus d'alcool au cours d'une même occasion au moins à 12 reprises durant l'année, Montréal, 2005**


Selon l'âge




Selon le sexe




Selon le statut d'immigration





Selon le niveau de scolarité



Selon le niveau de revenu








## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consommé 5 verres et plus d'alcool au cours d'une même occasion au moins à 12 reprises durant l'année, Montréal, 2005



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.


Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

### Proportion de la population de 12 ans et plus ayant un faible sentiment d'appartenance à la communauté locale, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant un faible sentiment d'appartenance à la communauté locale, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS




### Selon la modalité de vie



Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

### Selon l'année




# Environnement physique


## fumée secondaire

### Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire à la maison, Montréal, 2005


Selon l'âge



Selon le sexe




Selon le statut d'immigration




## Proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire à la maison, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS



### Selon l'année








\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.





# Santé générale

## perception de sa santé

### Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, Montréal, 2005



## Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, Montréal, 2005



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.






\*\* L'estimation est très imprécise, elle est fournie à titre indicatif seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Santé générale


## impact des problèmes de santé

### Proportion de la population de 12 ans et plus dont les problèmes de santé ont une incidence sur les principales sphères d'activité de la vie, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 12 ans et plus dont les problèmes de santé ont une incidence sur les principales sphères d'activité de la vie, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS




### Selon la modalité de vie



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.






### Selon l'année



# Santé générale


## jours d'incapacité

### Proportion de la population de 12 ans et plus ayant eu une journée ou plus d'incapacité au cours des deux dernières semaines, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant eu une journée ou plus d'incapacités au cours des deux dernières semaines, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS




### Selon la modalité de vie



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

### Selon l'année




# Santé physique


## allergies alimentaires

### Proportion de la population de 12 ans et plus souffrant d'allergies alimentaires, Montréal, 2005


#### Selon l'âge



#### Selon le sexe




#### Selon l'année



#### Selon le territoire de CSSS

##### Estimation du CSSS par rapport à la moyenne régionale

- Estimation plus élevée
- Estimation possiblement plus élevée
- Estimation non différente significativement
- Estimation possiblement plus faible
- Estimation plus faible



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.


Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Santé physique


## allergies autres

### Proportion de la population de 12 ans et plus souffrant d'allergies autres qu'alimentaires, Montréal, 2005


Selon l'âge



Selon le sexe




Selon l'année



Selon le territoire de CSSS

#### Estimation du CSSS par rapport à la moyenne régionale

- Estimation plus élevée
- Estimation possiblement plus élevée
- Estimation non différente significativement
- Estimation possiblement plus faible
- Estimation plus faible








Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Santé physique


## asthme

### Proportion de la population de 12 ans et plus souffrant d'asthme, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 12 ans et plus souffrant d'asthme, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS



### Selon l'année







\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Santé physique

## arthrite ou rhumatisme

### Proportion de la population de 45 ans et plus souffrant d'arthrite ou rhumatisme, Montréal, 2005



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.


Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Santé physique


## maux de dos

### Proportion de la population de 12 ans et plus souffrant de maux de dos autres que la fibromyalgie, Montréal, 2005


#### Selon l'âge



#### Selon le sexe




#### Selon l'année



#### Selon le territoire de CSSS

##### Estimation du CSSS par rapport à la moyenne régionale

- Estimation plus élevée
- Estimation possiblement plus élevée
- Estimation non différente significativement
- Estimation possiblement plus faible
- Estimation plus faible



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.


Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Santé physique


## migraines

### Proportion de la population de 12 ans et plus souffrant de migraines, Montréal, 2005


#### Selon l'âge



#### Selon le sexe




#### Selon l'année



#### Selon le territoire de CSSS

##### Estimation du CSSS par rapport à la moyenne régionale

- Estimation plus élevée
- Estimation possiblement plus élevée
- Estimation non différente significativement
- Estimation possiblement plus faible
- Estimation plus faible







\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Santé physique

## hypertension

### Proportion de la population de 45 ans et plus souffrant d'hypertension, Montréal, 2005







\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Santé physique

ITS

## Proportion de la population de 15-49 ans ayant déjà eu un diagnostic d'infection transmise sexuellement, Montréal, 2005



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.



\*\* L'estimation est très imprécise, elle est fournie à titre indicatif seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Santé physique



## MPOC

### Proportion de la population de 45 ans et plus souffrant d'emphysème, de bronchite ou d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, Montréal, 2005



## surplus de poids jeunes

### Proportion de la population de 12-17 ans présentant un surplus de poids, Montréal, 2005






\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Santé physique


## embonpoint adultes

### Proportion de la population de 18 ans et plus souffrant d'obésité, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 18 ans et plus souffrant d'embonpoint, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS




Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

### Selon le niveau de scolarité






### Selon le niveau de revenu



# Santé physique


## obésité adultes

### Proportion de la population de 18 ans et plus souffrant d'obésité, Montréal, 2005



## Proportion de la population de 18 ans et plus souffrant d'obésité, Montréal, 2005


### Selon le territoire de CSSS



### Estimation du CSSS par rapport à la moyenne régionale

- Estimation plus élevée
- Estimation possiblement plus élevée
- Estimation non différente significativement
- Estimation possiblement plus faible
- Estimation plus faible


### Selon le niveau de scolarité



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

### Selon le niveau de revenu




# Santé physique


## blessures

**Proportion de la population de 12 ans et plus ayant subi une blessure au cours de la dernière année, Montréal, 2005**


Selon l'âge




Selon le sexe




Selon le statut d'immigration



Selon le niveau de scolarité




Selon le niveau de revenu




## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant subi une blessure au cours de la dernière année, Montréal, 2005

Selon le territoire de CSSS



Selon l'année








\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.



# Santé mentale

## perception de sa santé

### Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, Montréal, 2005



## Proportion de la population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, Montréal, 2005



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

\*\* L'estimation est très imprécise, elle est fournie à titre indicatif seulement.


Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Santé mentale


## idées suicidaires

### Proportion de la population de 15 ans et plus ayant eu des idées suicidaires sérieuses au cours de sa vie, Montréal, 2005


Selon l'âge




Selon le sexe




Selon le statut d'immigration




Selon le niveau de revenu



Selon le niveau de scolarité




Selon l'année




## Proportion de la population de 15 ans et plus ayant eu des idées suicidaires sérieuses au cours de sa vie, Montréal, 2005

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.








### Selon le territoire de CSSS



# Santé mentale


## stress quotidien

### Proportion de la population de 20 ans et plus éprouvant un stress quotidien important, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 20 ans et plus éprouvant un stress quotidien important, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS




### Selon la modalité de vie



Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.






### Selon l'année



# Santé mentale


## stress au travail

### Proportion de la population de 20-74 ans éprouvant un stress important au travail, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 20-74 ans éprouvant un stress important au travail, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS




### Selon la modalité de vie



Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

### Selon l'année




# Services préventifs


## vaccination antigrippale

### Proportion de la population de 60 ans et plus ayant reçu un vaccin antigrippal au cours de la dernière année, Montréal, 2005


Selon l'âge




Selon le niveau de scolarité



Selon le niveau de revenu




Selon la modalité de vie



## Proportion de la population de 60 ans et plus ayant reçu un vaccin antigrippal au cours de la dernière année, Montréal, 2005


Selon le territoire de CSSS



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.






Selon l'année



# Services préventifs


## test PAP

### Proportion de la population féminine de 18-69 ans ayant passé un test PAP au cours des trois dernières années, Montréal, 2005



## Proportion de la population féminine de 18-69 ans ayant passé un test PAP au cours des trois dernières années, Montréal, 2005

Selon le territoire de CSSS




Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Services préventifs


## mammographie

### Proportion de la population féminine de 35 ans et plus ayant passé une mammographie au cours des deux dernières années, Montréal, 2005


Selon le sexe




Selon le statut d'immigration



Selon le niveau de scolarité




Selon le niveau de revenu



## Proportion de la population féminine 35 ans et plus ayant passé une mammographie au cours des deux dernières années, Montréal, 2005


### Selon le territoire de CSSS



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.






### Selon l'année



# Services de première ligne


## médecin de famille

### Proportion de la population de 12 ans et plus ayant un médecin de famille, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant un médecin de famille, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS



### Selon l'année









Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

# Services de première ligne


## consultation médecin

### Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consulté un médecin de famille, un pédiatre ou un omnipraticien au cours de la dernière année, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consulté un médecin de famille, un pédiatre ou un omnipraticien au cours de la dernière année, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS




### Selon la modalité de vie



Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.







### Selon l'année



# Services de première ligne


## consultation spécialiste

### Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consulté un autre médecin ou spécialiste au cours de la dernière année, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consulté un autre médecin ou spécialiste au cours de la dernière année, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS




### Selon la modalité de vie



Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.






### Selon l'année



# Services de première ligne


consultation psychologue

## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consulté un psychologue au cours de la dernière année, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consulté un psychologue au cours de la dernière année, Montréal, 2005

Selon le territoire de CSSS



Selon la modalité de vie



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

\*\* L'estimation est très imprécise, elle est fournie à titre indicatif seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.







Selon l'année



# Services de première ligne

consultation  
médecine douce


## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consulté un intervenant en médecine douce au cours de la dernière année, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant consulté un intervenant en médecine douce au cours de la dernière année, Montréal, 2005

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.








### Selon le territoire de CSSS



# Services de première ligne


besoins non satisfaits

## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant des besoins de soins de santé non satisfaits au cours de la dernière année, Montréal, 2005




## Proportion de la population de 12 ans et plus ayant des besoins de soins de santé non satisfaits au cours de la dernière année, Montréal, 2005

### Selon le territoire de CSSS




### Selon la modalité de vie



\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

### Selon l'année





# Annexe



<b>Habitudes de vie</b>	
Tabagisme .....	101
Pratique d'activités physiques .....	102
Loisirs inactifs .....	103
Transport actif .....	104
Consommation d'alcool – quantité .....	105
Consommation d'alcool – fréquence .....	106
<b>Environnement social</b>	
Sentiment d'appartenance .....	107
<b>Environnement physique</b>	
Exposition à la fumée secondaire .....	108
<b>État de santé générale</b>	
Perception de sa santé .....	109
Impact des problèmes de santé .....	110
Journées d'incapacité .....	111
<b>État de santé physique</b>	
Allergies alimentaires .....	112
Allergies autres .....	112
Asthme .....	113
Arthrite ou rhumatisme .....	114
Maux de dos .....	114
Migraines .....	115
Hypertension .....	115
MPOC .....	116
Surplus de poids – jeunes .....	116
Embonpoint – adultes .....	117
Obésité – adultes .....	118
Blessures .....	119
ITS .....	120
<b>État de santé mentale</b>	
Perception de sa santé .....	121
Idées suicidaires .....	122
Stress quotidien .....	123
Stress au travail .....	124
<b>Services préventifs</b>	
Vaccination antigrippale .....	125
Test PAP .....	126
Mammographie .....	127
<b>Services de première ligne</b>	
Médecin de famille .....	128
Consultation – médecin de famille .....	129
Consultation – médecin spécialiste .....	130
Consultation – psychologue .....	131
Consultation – médecine douce .....	132
Besoins non satisfaits .....	133

## Population de 12 ans et plus fumant la cigarette, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	404 300	25	[ 23,4 ; 26,5 ]	3,1
<b>Sexe</b>				
Hommes	210 300	27	[ 24,6 ; 29,1 ]	4,3
Femmes	194 100	23	[ 21,1 ; 25,3 ]	4,6
<b>Âge</b>				
12-19 ans	24 100	15	[ 11,4 ; 19,9 ]	13,7
20-44 ans	219 600	30	[ 27,3 ; 32,1 ]	4,1
45-64 ans	127 800	28	[ 24,7 ; 30,6 ]	5,5
65 ans et plus	32 800	13	[ 9,8 ; 15,8 ]	11,9
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	122 100	30	[ 26,9 ; 33,4 ]	5,5
Moyen	147 600	27	[ 24,7 ; 30,2 ]	5,1
Élevé	87 700	22	[ 18,9 ; 24,7 ]	6,9
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	62 800	20	[ 17,0 ; 23,5 ]	8,2
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	85 800	32	[ 27,5 ; 35,5 ]	6,5
Diplôme d'études postsecondaires	242 300	25	[ 23,2 ; 27,2 ]	4,1
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	33 800	19	[ 15,3 ; 24,1 ]	11,2
Immigrants de longue date	56 000	20	[ 16,3 ; 23,2 ]	8,7
Non immigrants	299 900	28	[ 26,1 ; 30,0 ]	3,6
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	36 500	20 ●	[ 15,9 ; 24,5 ]	10,8
Dorval-Lachine-LaSalle	32 000	27	[ 21,2 ; 32,9 ]	11,0
Sud-Ouest—Verdun	33 800	29	[ 23,2 ; 35,2 ]	10,5
Cavendish	25 400	24	[ 18,4 ; 30,8 ]	12,6
de la Montagne	37 200	19 ●	[ 15,1 ; 23,3 ]	10,8
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	24 500	22	[ 16,3 ; 27,5 ]	13,0
Ahuntsic et Montréal-Nord	27 900	19 ●	[ 14,7 ; 24,4 ]	12,5
Coeur-de-l'île	25 200	26	[ 20,0 ; 33,2 ]	12,4
Jeanne-Mance	43 800	36 ●	[ 29,7 ; 42,2 ]	8,8
St-Léonard et St-Michel	26 600	24	[ 18,0 ; 29,6 ]	12,3
Lucille-Teasdale	46 100	31 ●	[ 25,2 ; 35,9 ]	8,9
Pointe-de-l'île	45 200	27	[ 22,2 ; 32,1 ]	9,3

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus pratiquant rarement une activité physique d'une durée de 15 minutes et plus, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	323 100	20 ●	[ 18,5 ; 21,4 ]	3,7
<b>Sexe</b>				
Hommes	144 000	18	[ 16,4 ; 20,3 ]	5,5
Femmes	179 200	21	[ 19,4 ; 23,5 ]	4,9
<b>Âge</b>				
12-19 ans	17 500	11	[ 7,9 ; 15,6 ]	16,4
20-44 ans	131 600	18	[ 15,8 ; 19,8 ]	5,8
45-64 ans	95 100	21	[ 17,9 ; 23,2 ]	6,7
65 ans et plus	80 200	31	[ 26,4 ; 34,8 ]	7,0
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	104 400	26	[ 22,6 ; 28,9 ]	6,2
Moyen	106 800	20	[ 17,3 ; 22,3 ]	6,4
Élevé	47 900	12	[ 9,5 ; 14,1 ]	10,0
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	83 000	27	[ 23,3 ; 30,7 ]	7,0
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	58 700	22	[ 18,0 ; 25,2 ]	8,4
Diplôme d'études postsecondaires	161 000	17	[ 15,1 ; 18,5 ]	5,2
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	41 900	24	[ 19,3 ; 28,6 ]	9,9
Immigrants de longue date	78 800	28	[ 23,9 ; 31,7 ]	7,1
Non immigrants	182 400	17	[ 15,4 ; 18,7 ]	4,9
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	28 700	16 ●	[ 11,9 ; 19,8 ]	12,6
Dorval-Lachine-LaSalle	18 200	15 ●	[ 10,8 ; 20,8 ]	16,0
Sud-Ouest—Verdun	18 000	16 ●	[ 11,1 ; 21,2 ]	15,7
Cavendish	14 500	14* ●	[ 9,4 ; 19,7 ]	17,8
de la Montagne	28 300	14 ●	[ 10,9 ; 18,3 ]	12,8
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	27 400	25	[ 18,7 ; 30,6 ]	12,3
Ahuntsic et Montréal-Nord	28 400	20	[ 15,1 ; 24,9 ]	12,3
Coeur-de-l'île	17 100	18	[ 12,3 ; 24,2 ]	16,3
Jeanne-Mance	22 500	18	[ 13,6 ; 24,1 ]	13,9
St-Léonard et St-Michel	29 800	27 ●	[ 20,8 ; 32,9 ]	11,5
Lucille-Teasdale	41 100	27 ●	[ 22,1 ; 32,5 ]	9,7
Pointe-de-l'île	49 200	30 ●	[ 24,6 ; 34,9 ]	8,8

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 18 ans et plus inactive durant ses loisirs, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %		Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	588 900	39	●	[ 37,8 ; 40,1 ]	1,5
<b>Sexe</b>					
Hommes	263 000	36		[ 34,8 ; 37,9 ]	2,2
Femmes	326 000	41		[ 39,7 ; 43,0 ]	2,0
<b>Âge</b>					
18-44 ans	276 000	35		[ 33,7 ; 36,6 ]	2,1
45-64 ans	192 300	42		[ 39,5 ; 43,7 ]	2,6
65 ans et plus	121 400	46		[ 43,2 ; 49,4 ]	3,4
<b>Niveau de revenu</b>					
Faible	162 400	44		[ 41,2 ; 46,1 ]	2,9
Moyen	195 100	39		[ 36,9 ; 40,8 ]	2,6
Élevé	124 700	32		[ 30,5 ; 34,5 ]	3,1
<b>Niveau de scolarité</b>					
Primaire ou secondaire non complété	111 200	51		[ 47,8 ; 55,0 ]	3,6
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	96 700	38		[ 35,1 ; 40,4 ]	3,6
Diplôme d'études postsecondaires	344 200	36		[ 34,6 ; 37,2 ]	1,9
<b>Statut d'immigration</b>					
Immigrants récents	70 200	43		[ 39,1 ; 46,4 ]	4,3
Immigrants de longue date	130 300	47		[ 43,7 ; 49,6 ]	3,2
Non immigrants	351 300	36		[ 34,7 ; 37,3 ]	1,9
<b>Territoire de CSSS</b>					
Ouest-de-l'île	59 600	35		[ 30,0 ; 40,5 ]	7,6
Dorval-Lachine-LaSalle	41 900	38		[ 31,3 ; 44,6 ]	9,0
Sud-Ouest—Verdun	34 600	33	●	[ 26,0 ; 39,0 ]	10,2
Cavendish	30 800	32	●	[ 25,0 ; 38,7 ]	10,9
de la Montagne	66 400	36		[ 30,6 ; 40,7 ]	7,2
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	44 400	43		[ 35,9 ; 50,0 ]	8,3
Ahuntsic et Montréal-Nord	54 600	41		[ 34,7 ; 46,9 ]	7,6
Coeur-de-l'île	32 100	36		[ 28,2 ; 42,9 ]	10,5
Jeanne-Mance	35 400	31	●	[ 24,7 ; 37,0 ]	10,2
St-Léonard et St-Michel	48 300	47	●	[ 39,4 ; 53,7 ]	7,8
Lucille-Teasdale	59 400	42		[ 36,0 ; 48,0 ]	7,3
Pointe-de-l'île	81 700	53	●	[ 46,8 ; 58,4 ]	5,6

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus n'utilisant pas un transport actif pour le travail, l'école ou emplettes, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	351 800	21 ●	[ 19,5 ; 22,4 ]	3,5
<b>Sexe</b>				
Hommes	178 800	22	[ 20,0 ; 24,2 ]	4,9
Femmes	172 900	20	[ 17,8 ; 21,8 ]	5,1
<b>Âge</b>				
12-19 ans	11 600	7	[ 4,5 ; 10,7 ]	21,0
20-44 ans	146 300	19	[ 17,3 ; 21,4 ]	5,5
45-64 ans	116 500	25	[ 21,7 ; 27,5 ]	5,9
65 ans et plus	78 600	27	[ 23,3 ; 31,1 ]	7,3
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	77 300	18	[ 15,6 ; 21,1 ]	7,6
Moyen	109 800	20	[ 17,5 ; 22,4 ]	6,3
Élevé	94 300	23	[ 20,1 ; 26,1 ]	6,6
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	64 100	19	[ 16,2 ; 22,8 ]	8,4
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	53 600	19	[ 15,9 ; 22,9 ]	9,0
Diplôme d'études postsecondaires	213 900	22	[ 20,0 ; 23,8 ]	4,4
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	31 500	17	[ 13,4 ; 21,8 ]	12,1
Immigrants de longue date	80 200	27	[ 22,9 ; 30,4 ]	7,2
Non immigrants	216 200	20	[ 18,0 ; 21,5 ]	4,5
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	61 100	32 ●	[ 27,4 ; 37,3 ]	7,8
Dorval-Lachine-LaSalle	38 400	31 ●	[ 24,9 ; 37,0 ]	10,0
Sud-Ouest—Verdun	20 600	17	[ 12,6 ; 23,0 ]	14,7
Cavendish	19 900	18	[ 13,1 ; 24,3 ]	15,1
de la Montagne	32 900	16 ●	[ 12,4 ; 20,1 ]	11,9
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	33 700	29 ●	[ 22,9 ; 35,2 ]	10,8
Ahuntsic et Montréal-Nord	27 900	19	[ 14,2 ; 23,8 ]	12,6
Coeur-de-l'île	15 100	15* ●	[ 10,0 ; 20,8 ]	17,8
Jeanne-Mance	9 100	7* ●	[ 4,4 ; 11,6 ]	23,3
St-Léonard et St-Michel	22 200	19	[ 14,0 ; 25,0 ]	14,2
Lucille-Teasdale	30 800	20	[ 15,5 ; 25,0 ]	11,9
Pointe-de-l'île	40 400	24	[ 18,9 ; 28,3 ]	10,2

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus ayant consommé 14 verres et plus d'alcool au cours d'une semaine, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	111 500	7	[ 5,8 ; 7,6 ]	6,8
<b>Sexe</b>				
Hommes	86 000	11	[ 9,1 ; 12,3 ]	7,5
Femmes	25 600	3	[ 2,2 ; 4,0 ]	14,4
<b>Âge</b>				
12-19 ans	7 600	5*	[ 2,6 ; 7,8 ]	26,1
20-44 ans	50 900	7	[ 5,5 ; 8,2 ]	10,0
45-64 ans	38 500	8	[ 6,4 ; 10,1 ]	11,5
65 ans et plus	14 500	5*	[ 3,5 ; 7,8 ]	19,1
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	18 000	4*	[ 3,1 ; 6,2 ]	16,8
Moyen	37 600	7	[ 5,4 ; 8,6 ]	11,5
Élevé	46 000	11	[ 8,9 ; 13,4 ]	10,2
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	8 000	3*	[ 1,4 ; 4,2 ]	25,5
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	16 100	6*	[ 4,0 ; 8,2 ]	17,7
Diplôme d'études postsecondaires	83 800	8	[ 7,2 ; 9,8 ]	7,7
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	6 100	3*	[ 1,7 ; 5,9 ]	29,6
Immigrants de longue date	12 100	4*	[ 2,7 ; 6,4 ]	20,4
Non immigrants	89 200	8	[ 7,0 ; 9,4 ]	7,5
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	13 500	7*	[ 4,8 ; 10,6 ]	19,3
Dorval-Lachine-LaSalle	4 800	4* ●	[ 1,9 ; 7,6 ]	32,7
Sud-Ouest—Verdun	10 600	9*	[ 5,4 ; 13,5 ]	21,9
Cavendish	9 000	8*	[ 4,8 ; 13,0 ]	24,0
de la Montagne	16 100	8*	[ 5,4 ; 11,2 ]	17,8
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	1 800	1** ●	[ 0,3 ; 4,1 ]	57,3
Ahuntsic et Montréal-Nord	6 300	4* ●	[ 2,0 ; 7,3 ]	29,5
Coeur-de-l'île	5 400	6*	[ 2,7 ; 9,9 ]	30,7
Jeanne-Mance	14 300	11* ●	[ 7,6 ; 16,3 ]	18,5
St-Léonard et St-Michel	5 700	5*	[ 2,3 ; 8,7 ]	30,9
Lucille-Teasdale	14 800	10*	[ 6,4 ; 13,6 ]	18,3
Pointe-de-l'île	9 400	5*	[ 3,2 ; 8,6 ]	23,6

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

\*\* L'estimation est très imprécise, elle est fournie à titre indicatif seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus ayant consommé 5 verres et plus d'alcool au cours d'une même occasion au moins à 12 reprises durant l'année, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	241 600	15 ●	[ 13,6 ; 16,1 ]	4,3
<b>Sexe</b>				
Hommes	162 000	21	[ 18,5 ; 22,6 ]	5,1
Femmes	79 500	9	[ 8,0 ; 10,9 ]	7,8
<b>Âge</b>				
12-19 ans	19 800	13	[ 9,0 ; 16,9 ]	15,4
20-44 ans	149 000	20	[ 18,0 ; 22,2 ]	5,4
45-64 ans	61 900	13	[ 11,1 ; 15,7 ]	8,6
65 ans et plus	10 400	4*	[ 2,4 ; 6,1 ]	22,5
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	48 200	12	[ 9,6 ; 14,2 ]	9,8
Moyen	83 300	15	[ 13,2 ; 17,7 ]	7,3
Élevé	83 900	21	[ 17,9 ; 23,6 ]	7,1
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	19 000	6	[ 4,4 ; 8,4 ]	16,1
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	50 000	18	[ 15,0 ; 21,9 ]	9,3
Diplôme d'études postsecondaires	165 600	17	[ 15,5 ; 18,9 ]	5,2
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	12 800	7*	[ 4,7 ; 10,6 ]	19,7
Immigrants de longue date	18 000	6	[ 4,4 ; 8,7 ]	16,6
Non immigrants	202 800	19	[ 17,2 ; 20,6 ]	4,6
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	21 700	12 ●	[ 8,5 ; 15,6 ]	14,9
Dorval-Lachine-LaSalle	13 900	12*	[ 7,8 ; 16,7 ]	18,4
Sud-Ouest—Verdun	19 700	17	[ 12,0 ; 22,4 ]	15,2
Cavendish	19 800	19	[ 13,7 ; 25,2 ]	14,8
de la Montagne	26 500	13	[ 10,0 ; 17,3 ]	13,3
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	10 700	10* ●	[ 5,9 ; 14,3 ]	21,3
Ahuntsic et Montréal-Nord	12 200	8* ●	[ 5,2 ; 12,2 ]	20,4
Coeur-de-l'île	18 400	19	[ 13,4 ; 25,3 ]	15,5
Jeanne-Mance	34 700	29 ●	[ 22,6 ; 34,4 ]	10,5
St-Léonard et St-Michel	12 500	11* ●	[ 7,1 ; 16,1 ]	19,7
Lucille-Teasdale	28 200	19	[ 14,4 ; 23,9 ]	12,4
Pointe-de-l'île	23 300	14	[ 10,4 ; 18,4 ]	14,0

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus ayant un faible sentiment d'appartenance à la communauté locale, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	726 100	45	[ 43,0 ; 46,6 ]	2,0
<b>Sexe</b>				
Hommes	350 700	45	[ 42,1 ; 47,3 ]	2,9
Femmes	375 400	45	[ 42,4 ; 47,4 ]	2,9
<b>Âge</b>				
12-19 ans	53 800	34	[ 28,9 ; 39,9 ]	8,2
20-44 ans	375 900	51	[ 48,2 ; 53,5 ]	2,7
45-64 ans	209 000	45	[ 41,8 ; 48,5 ]	3,8
65 ans et plus	84 700	32	[ 28,1 ; 36,8 ]	6,8
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	147 500	47	[ 43,0 ; 51,1 ]	4,4
Couples	173 400	47	[ 43,2 ; 50,8 ]	4,1
Couples avec enfants	210 900	40	[ 37,2 ; 43,4 ]	3,9
Monoparentales	68 300	45	[ 38,9 ; 50,6 ]	6,7
Autres	118 500	49	[ 43,9 ; 53,2 ]	4,9
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	170 600	42	[ 38,7 ; 45,9 ]	4,3
Moyen	237 200	44	[ 41,0 ; 47,2 ]	3,6
Élevé	203 200	50	[ 46,8 ; 54,0 ]	3,6
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	102 600	33	[ 29,5 ; 37,4 ]	6,1
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	120 200	44	[ 39,8 ; 48,5 ]	5,0
Diplôme d'études postsecondaires	464 600	48	[ 46,1 ; 50,7 ]	2,5
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	68 900	39	[ 34,1 ; 44,9 ]	7,0
Immigrants de longue date	106 500	38	[ 33,4 ; 41,9 ]	5,7
Non immigrants	507 700	47	[ 45,3 ; 49,7 ]	2,4
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	80 400	44	[ 38,6 ; 49,2 ]	6,2
Dorval-Lachine-LaSalle	50 000	42	[ 35,8 ; 49,1 ]	8,0
Sud-Ouest—Verdun	58 700	51	[ 43,9 ; 57,5 ]	6,8
Cavendish	46 100	44	[ 36,9 ; 51,0 ]	8,2
de la Montagne	80 100	41	[ 35,7 ; 45,9 ]	6,4
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	55 200	49	[ 42,5 ; 56,5 ]	7,2
Ahuntsic et Montréal-Nord	65 100	45	[ 39,1 ; 51,1 ]	6,8
Coeur-de-l'île	40 000	42	[ 34,3 ; 49,0 ]	9,0
Jeanne-Mance	45 200	37	[ 30,9 ; 43,5 ]	8,6
St-Léonard et St-Michel	48 500	44	[ 36,9 ; 50,6 ]	8,0
Lucille-Teasdale	81 200	54	[ 47,7 ; 59,5 ]	5,6
Pointe-de-l'île	75 900	46	[ 40,3 ; 51,5 ]	6,2

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Non-fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire à la maison, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	128 200	11 ● <sup>1</sup>	[ 9,3 ; 11,8 ]	6,1
<b>Sexe</b>				
Hommes	67 200	12	[ 9,8 ; 13,7 ]	8,3
Femmes	61 000	10	[ 7,9 ; 11,3 ]	8,9
<b>Âge</b>				
12-19 ans	33 100	25	[ 19,5 ; 30,3 ]	11,0
20-44 ans	46 100	9	[ 7,2 ; 10,8 ]	10,2
45-64 ans	35 000	11	[ 8,1 ; 12,9 ]	11,6
65 ans et plus	14 000	6*	[ 4,0 ; 8,7 ]	19,0
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	33 700	12	[ 9,4 ; 15,1 ]	11,7
Moyen	43 000	11	[ 8,7 ; 13,2 ]	10,5
Élevé	26 600	8	[ 6,3 ; 10,9 ]	13,5
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	11 400	8*	[ 5,3 ; 12,3 ]	20,4
Immigrants de longue date	13 800	6*	[ 4,0 ; 8,7 ]	19,0
Non immigrants	91 400	12	[ 10,2 ; 13,6 ]	20,4
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	10 300	7* ●	[ 4,2 ; 10,6 ]	22,1
Dorval-Lachine-LaSalle	8 600	10*	[ 5,8 ; 15,5 ]	23,7
Sud-Ouest—Verdun	11 100	14*	[ 8,5 ; 20,0 ]	20,3
Cavendish	8 500	11*	[ 6,2 ; 16,9 ]	23,6
de la Montagne	11 500	7* ●	[ 4,7 ; 10,9 ]	20,5
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	12 100	14*	[ 9,1 ; 20,3 ]	19,3
Ahuntsic et Montréal-Nord	12 600	11*	[ 7,1 ; 15,9 ]	19,3
Coeur-de-l'île	9 500	13*	[ 8,1 ; 20,3 ]	21,9
Jeanne-Mance	7 600	10*	[ 5,3 ; 15,6 ]	25,4
St-Léonard et St-Michel	7 300	9*	[ 4,9 ; 14,2 ]	25,5
Lucille-Teasdale	12 600	12*	[ 7,9 ; 17,5 ]	19,1
Pointe-de-l'île	16 400	14*	[ 9,4 ; 18,7 ]	16,7

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	181 600	11 ●	[ 10,1 ; 12,3 ]	5,1
<b>Sexe</b>				
Hommes	74 400	9	[ 8,0 ; 11,0 ]	8,0
Femmes	107 200	13	[ 11,2 ; 14,4 ]	6,6
<b>Âge</b>				
12-19 ans	8 200	5*	[ 2,9 ; 8,3 ]	25,2
20-44 ans	40 700	6	[ 4,4 ; 6,9 ]	11,1
45-64 ans	63 600	14	[ 11,5 ; 16,0 ]	8,5
65 ans et plus	69 200	26	[ 22,3 ; 30,1 ]	7,5
<b>Âge et sexe</b>				
12-19 ans				
Hommes	3 200	4**	[ 1,5 ; 8,5 ]	40,0
Femmes	5 000	6*	[ 2,9 ; 11,4 ]	32,3
20-44 ans				
Hommes	18 400	5	[ 3,5 ; 6,8 ]	16,5
Femmes	22 300	6	[ 4,5 ; 8,2 ]	14,9
45-64 ans				
Hommes	26 200	12	[ 8,8 ; 15,2 ]	13,4
Femmes	37 400	16	[ 12,4 ; 19,3 ]	10,9
65 ans et plus				
Hommes	26 600	25	[ 18,9 ; 30,9 ]	12,3
Femmes	42 500	27	[ 22,1 ; 32,2 ]	9,5
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	54 600	17	[ 14,5 ; 20,7 ]	9,0
Couples	51 200	14	[ 11,3 ; 16,5 ]	9,4
Couples avec enfants	35 700	7	[ 5,3 ; 8,5 ]	11,8
Monoparentales	14 100	9*	[ 6,0 ; 12,9 ]	18,7
Autres	23 600	10	[ 7,2 ; 12,8 ]	14,2
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	66 900	17	[ 13,9 ; 19,2 ]	8,1
Moyen	48 300	9	[ 7,3 ; 10,9 ]	10,0
Élevé	20 300	5	[ 3,6 ; 6,8 ]	15,8
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	69 800	23	[ 19,2 ; 26,0 ]	7,7
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	30 000	11	[ 8,5 ; 14,1 ]	12,5
Diplôme d'études postsecondaires	67 600	7	[ 5,8 ; 8,2 ]	8,6
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	9 400	5*	[ 3,3 ; 8,5 ]	22,9
Immigrants de longue date	45 400	16	[ 13,0 ; 19,4 ]	9,9
Non immigrants	115 200	11	[ 9,4 ; 12,1 ]	6,4
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	16 700	9*	[ 6,2 ; 12,5 ]	17,1
Dorval-Lachine-LaSalle	13 700	12*	[ 7,8 ; 16,6 ]	18,4
Sud-Ouest—Verdun	14 100	12*	[ 8,0 ; 17,1 ]	18,4
Cavendish	8 400	8*	[ 4,6 ; 12,8 ]	24,0
de la Montagne	13 900	7* ●	[ 4,6 ; 10,1 ]	18,9
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	9 700	9*	[ 5,2 ; 13,2 ]	22,5
Ahuntsic et Montréal-Nord	18 600	13	[ 9,2 ; 17,5 ]	15,8
Coeur-de-l'île	11 800	12*	[ 7,7 ; 17,7 ]	20,0
Jeanne-Mance	13 200	11*	[ 7,2 ; 15,6 ]	18,9
St-Léonard et St-Michel	15 700	14*	[ 9,8 ; 19,7 ]	16,9
Lucille-Teasdale	21 800	14	[ 10,5 ; 19,0 ]	14,5
Pointe-de-l'île	23 900	14	[ 10,7 ; 18,8 ]	13,8

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

\*\* L'estimation est très imprécise, elle est fournie à titre indicatif seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus dont les problèmes de santé ont une incidence sur les principales sphères d'activité de la vie, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	331 900	20	[ 19,0 ; 21,9 ]	3,6
<b>Sexe</b>				
Hommes	135 900	17	[ 15,4 ; 19,2 ]	5,7
Femmes	196 100	23	[ 21,3 ; 25,5 ]	4,6
<b>Âge</b>				
12-19 ans	17 000	11*	[ 7,6 ; 15,0 ]	16,7
20-44 ans	114 300	15	[ 13,5 ; 17,3 ]	6,3
45-64 ans	114 700	25	[ 21,9 ; 27,6 ]	5,9
65 ans et plus	85 800	33	[ 28,5 ; 36,8 ]	6,4
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	84 000	27	[ 23,2 ; 30,4 ]	6,8
Couples	83 500	23	[ 19,5 ; 25,7 ]	7,0
Couples avec enfants	83 000	16	[ 13,5 ; 18,1 ]	7,3
Monoparentales	37 500	24	[ 19,5 ; 29,4 ]	10,3
Autres	38 700	16	[ 12,6 ; 19,5 ]	10,7
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	101 600	25	[ 22,0 ; 28,2 ]	6,3
Moyen	96 700	18	[ 15,6 ; 20,3 ]	6,7
Élevé	68 300	17	[ 14,3 ; 19,6 ]	8,0
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	70 500	23	[ 19,5 ; 26,3 ]	7,6
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	58 200	21	[ 17,9 ; 24,9 ]	8,5
Diplôme d'études postsecondaires	181 200	19	[ 17,1 ; 20,7 ]	4,9
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	23 800	14	[ 10,2 ; 17,9 ]	13,9
Immigrants de longue date	65 800	23	[ 19,6 ; 26,8 ]	7,9
Non immigrants	219 000	20	[ 18,7 ; 22,2 ]	4,4
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	48 600	27 ●	[ 21,9 ; 31,2 ]	8,9
Dorval-Lachine-LaSalle	21 900	18	[ 13,6 ; 24,2 ]	14,1
Sud-Ouest—Verdun	24 000	21	[ 15,3 ; 26,1 ]	13,3
Cavendish	20 200	19	[ 14,0 ; 25,4 ]	14,6
de la Montagne	37 900	19	[ 15,3 ; 23,6 ]	10,7
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	23 500	21	[ 15,5 ; 26,6 ]	13,4
Ahuntsic et Montréal-Nord	28 900	20	[ 15,4 ; 24,9 ]	12,1
Coeur-de-l'île	23 300	24	[ 18,1 ; 31,1 ]	13,1
Jeanne-Mance	24 400	20	[ 14,9 ; 25,3 ]	13,2
St-Léonard et St-Michel	20 000	18	[ 13,1 ; 23,9 ]	14,7
Lucille-Teasdale	28 200	19	[ 14,3 ; 23,6 ]	12,4
Pointe-de-l'île	31 100	19	[ 14,7 ; 23,6 ]	11,7

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus ayant eu une journée ou plus d'incapacité au cours des deux dernières semaines, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	221 100	14	[ 12,4 ; 14,9 ]	4,6
<b>Sexe</b>				
Hommes	92 300	12	[ 10,1 ; 13,4 ]	4,6
Femmes	128 800	15	[ 13,6 ; 17,2 ]	7,1
<b>Âge</b>				
12-19 ans	19 900	13	[ 9,1 ; 17,0 ]	15,4
20-44 ans	105 800	14	[ 12,5 ; 16,2 ]	6,5
45-64 ans	64 600	14	[ 11,7 ; 16,3 ]	8,4
65 ans et plus	30 800	12	[ 9,0 ; 14,9 ]	12,3
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	51 700	16	[ 13,5 ; 19,7 ]	9,3
Couples	44 100	12	[ 9,5 ; 14,3 ]	10,3
Couples avec enfants	62 500	12	[ 9,9 ; 14,0 ]	8,6
Monoparentales	24 700	16	[ 12,2 ; 21,0 ]	13,4
Autres	35 500	15	[ 11,4 ; 18,1 ]	11,3
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	56 400	14	[ 11,5 ; 16,4 ]	9,0
Moyen	76 300	14	[ 12,0 ; 16,3 ]	7,7
Élevé	59 900	15	[ 12,3 ; 17,4 ]	8,7
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	32 800	11	[ 8,3 ; 13,4 ]	12,0
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	39 500	14	[ 11,5 ; 17,8 ]	10,8
Diplôme d'études postsecondaires	141 900	15	[ 13,2 ; 16,4 ]	5,6
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	23 300	13	[ 9,9 ; 17,5 ]	14,0
Immigrants de longue date	30 100	11	[ 8,2 ; 13,6 ]	12,5
Non immigrants	159 700	15	[ 13,4 ; 16,5 ]	5,3
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	24 200	13	[ 9,9 ; 17,4 ]	13,7
Dorval-Lachine-LaSalle	18 000	15	[ 10,8 ; 20,7 ]	15,8
Sud-Ouest—Verdun	14 800	13*	[ 8,7 ; 17,9 ]	17,6
Cavendish	15 200	15*	[ 10,0 ; 20,4 ]	17,2
de la Montagne	30 000	15	[ 11,7 ; 19,3 ]	12,3
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	13 600	12*	[ 8,2 ; 17,6 ]	18,4
Ahuntsic et Montréal-Nord	16 600	11*	[ 7,9 ; 15,8 ]	16,9
Coeur-de-l'île	15 500	16*	[ 10,9 ; 22,1 ]	17,0
Jeanne-Mance	16 200	13*	[ 9,3 ; 18,6 ]	16,7
St-Léonard et St-Michel	18 600	17	[ 11,9 ; 22,4 ]	15,4
Lucille-Teasdale	17 300	12	[ 8,1 ; 15,8 ]	16,4
Pointe-de-l'île	21 100	13	[ 9,3 ; 17,0 ]	14,8

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus souffrant d'allergies alimentaires, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	112 800	7 ●	[ 6,1 ; 7,9 ]	6,6
<b>Sexe</b>				
Hommes	38 300	5	[ 3,8 ; 6,1 ]	11,5
Femmes	74 500	9	[ 7,5 ; 10,3 ]	8,0
<b>Âge</b>				
12-19 ans	8 500	5*	[ 3,1 ; 8,7 ]	24,3
20-44 ans	54 000	7	[ 6,0 ; 8,8 ]	9,5
45-64 ans	32 600	7	[ 5,5 ; 9,0 ]	12,2
65 ans et plus	17 600	7*	[ 4,6 ; 9,2 ]	16,8
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	20 000	11 ●	[ 7,9 ; 14,8 ]	15,3
Dorval-Lachine-LaSalle	7 700	7*	[ 3,8 ; 10,9 ]	24,9
Sud-Ouest—Verdun	7 100	6*	[ 3,2 ; 9,9 ]	26,9
Cavendish	8 200	8*	[ 4,3 ; 12,2 ]	24,8
de la Montagne	16 500	8*	[ 5,7 ; 11,7 ]	17,2
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	5 200	5*	[ 2,3 ; 8,5 ]	30,9
Ahuntsic et Montréal-Nord	8 800	6*	[ 3,7 ; 9,8 ]	23,5
Coeur-de-l'île	4 600	5*	[ 2,3 ; 9,1 ]	32,5
Jeanne-Mance	7 200	6*	[ 3,4 ; 10,0 ]	25,9
St-Léonard et St-Michel	5 500	5*	[ 2,3 ; 8,6 ]	30,9
Lucille-Teasdale	9 400	6*	[ 3,8 ; 9,8 ]	22,8
Pointe-de-l'île	12 400	7*	[ 4,7 ; 10,8 ]	20,1

## Population de 12 ans et plus souffrant d'allergies autres qu'alimentaires, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	420 700	26 ●	[ 24,4 ; 27,5 ]	3,1
<b>Sexe</b>				
Hommes	178 600	23	[ 20,6 ; 24,9 ]	4,8
Femmes	242 200	29	[ 26,7 ; 31,2 ]	3,9
<b>Âge</b>				
12-19 ans	42 500	27	[ 22,1 ; 32,2 ]	9,5
20-44 ans	210 600	28	[ 26,1 ; 30,8 ]	4,2
45-64 ans	115 000	25	[ 22,0 ; 27,7 ]	5,9
65 ans et plus	52 600	20	[ 16,5 ; 23,8 ]	9,0
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	55 700	30 ●	[ 25,5 ; 35,2 ]	8,1
Dorval-Lachine-LaSalle	28 700	24	[ 18,7 ; 30,0 ]	11,8
Sud-Ouest—Verdun	25 800	22	[ 16,9 ; 27,9 ]	12,6
Cavendish	25 900	25	[ 18,8 ; 31,2 ]	12,4
de la Montagne	43 600	22	[ 18,0 ; 26,5 ]	9,7
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	23 300	21 ●	[ 15,4 ; 26,3 ]	13,4
Ahuntsic et Montréal-Nord	35 200	24	[ 19,2 ; 29,4 ]	10,7
Coeur-de-l'île	25 500	26	[ 20,1 ; 33,4 ]	12,4
Jeanne-Mance	37 600	31	[ 24,9 ; 36,8 ]	9,9
St-Léonard et St-Michel	25 900	23	[ 17,6 ; 29,1 ]	12,5
Lucille-Teasdale	43 800	29	[ 23,6 ; 34,1 ]	9,3
Pointe-de-l'île	49 700	30	[ 25,0 ; 35,1 ]	8,6

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus souffrant d'asthme, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	146 200	9	[ 8,0 ; 10,0 ]	5,7
<b>Sexe</b>				
Hommes	60 000	8	[ 6,3 ; 9,0 ]	9,0
Femmes	86 200	10	[ 8,8 ; 11,8 ]	7,4
<b>Âge</b>				
12-19 ans	18 800	12	[ 8,7 ; 16,5 ]	15,6
20-44 ans	57 000	8	[ 6,4 ; 9,3 ]	9,2
45-64 ans	43 900	10	[ 7,6 ; 11,6 ]	10,4
65 ans et plus	26 500	10	[ 7,6 ; 13,1 ]	13,4
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	38 500	10	[ 7,6 ; 11,9 ]	11,1
Moyen	47 900	9	[ 7,3 ; 10,9 ]	10,0
Élevé	39 200	10	[ 7,7 ; 12,0 ]	11,1
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	39 600	13	[ 10,2 ; 15,8 ]	10,8
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	30 600	11	[ 8,7 ; 14,3 ]	12,4
Diplôme d'études postsecondaires	72 600	8	[ 6,3 ; 8,8 ]	8,2
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	4 700	3*	[ 1,3 ; 5,1 ]	32,9
Immigrants de longue date	20 100	7	[ 5,1 ; 9,6 ]	15,6
Non immigrants	115 000	11	[ 9,4 ; 12,1 ]	6,4
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	21 200	12	[ 8,4 ; 15,4 ]	14,9
Dorval-Lachine-LaSalle	9 000	8*	[ 4,5 ; 11,9 ]	23,3
Sud-Ouest—Verdun	11 000	10*	[ 6,0 ; 14,3 ]	20,7
Cavendish	6 800	7*	[ 3,5 ; 10,9 ]	26,8
de la Montagne	19 400	10	[ 7,1 ; 13,5 ]	15,6
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	7 600	7*	[ 3,7 ; 10,9 ]	25,8
Ahuntsic et Montréal-Nord	7 600	5*	[ 2,8 ; 8,5 ]	26,0
Coeur-de-l'île	11 200	12*	[ 7,3 ; 17,1 ]	20,5
Jeanne-Mance	11 000	9*	[ 5,7 ; 13,6 ]	20,8
St-Léonard et St-Michel	9 400	9*	[ 5,1 ; 13,1 ]	22,5
Lucille-Teasdale	14 600	10*	[ 6,4 ; 13,5 ]	18,3
Pointe-de-l'île	17 400	11	[ 7,4 ; 14,5 ]	16,5

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 45 ans et plus souffrant d'arthrite ou rhumatisme, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	200 700	28 ●	[ 25,2 ; 30,0 ]	4,4
<b>Sexe</b>				
Hommes	59 800	18	[ 15,1 ; 21,1 ]	8,6
Femmes	141 000	36	[ 32,1 ; 39,0 ]	4,9
<b>Âge</b>				
45-64 ans	87 200	19	[ 16,3 ; 21,4 ]	7,0
65 ans et plus	113 400	43	[ 38,8 ; 47,5 ]	5,2
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	21 400	26	[ 19,2 ; 33,6 ]	13,6
Dorval-Lachine-LaSalle	14 200	27	[ 18,6 ; 36,8 ]	16,4
Sud-Ouest—Verdun	15 000	29	[ 19,9 ; 38,6 ]	16,0
Cavendish	12 200	26*	[ 17,3 ; 36,6 ]	17,9
de la Montagne	23 200	27	[ 20,0 ; 33,9 ]	12,9
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	10 800	21*	[ 13,5 ; 30,9 ]	19,8
Ahuntsic et Montréal-Nord	18 300	28	[ 20,3 ; 37,0 ]	14,5
Coeur-de-l'île	12 800	29*	[ 19,7 ; 40,4 ]	17,2
Jeanne-Mance	14 400	26	[ 18,2 ; 36,1 ]	16,5
St-Léonard et St-Michel	15 800	32	[ 22,5 ; 41,3 ]	15,1
Lucille-Teasdale	19 600	29	[ 21,4 ; 37,9 ]	13,8
Pointe-de-l'île	23 100	31	[ 23,3 ; 38,6 ]	12,7

## Population de 12 ans et plus souffrant de maux de dos ayant une autre cause que la fibromyalgie ou l'arthrite, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	265 800	16	[ 15,1 ; 17,7 ]	4,1
<b>Sexe</b>				
Hommes	119 900	15	[ 13,4 ; 17,1 ]	6,1
Femmes	145 900	17	[ 15,6 ; 19,3 ]	5,5
<b>Âge</b>				
12-19 ans	10 100	6*	[ 3,9 ; 9,9 ]	22,2
20-44 ans	111 600	15	[ 13,2 ; 17,0 ]	6,3
45-64 ans	93 900	20	[ 17,6 ; 23,0 ]	6,7
65 ans et plus	50 300	19	[ 15,8 ; 22,9 ]	9,2
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	30 600	17	[ 13,0 ; 21,1 ]	12,0
Dorval-Lachine-LaSalle	26 700	23 ●	[ 17,0 ; 28,0 ]	12,4
Sud-Ouest—Verdun	21 900	19	[ 13,8 ; 24,5 ]	14,1
Cavendish	15 100	14*	[ 9,6 ; 19,8 ]	17,5
de la Montagne	22 800	12 ●	[ 8,5 ; 15,3 ]	14,3
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	15 800	14*	[ 9,8 ; 19,7 ]	16,9
Ahuntsic et Montréal-Nord	24 900	17	[ 13,0 ; 22,3 ]	13,3
Coeur-de-l'île	17 000	18	[ 12,3 ; 23,9 ]	16,1
Jeanne-Mance	20 200	17	[ 12,0 ; 22,0 ]	14,8
St-Léonard et St-Michel	16 500	15	[ 10,3 ; 20,3 ]	16,6
Lucille-Teasdale	31 100	20 ●	[ 15,8 ; 25,2 ]	11,7
Pointe-de-l'île	23 400	14	[ 10,4 ; 18,5 ]	14,0

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus souffrant de migraines, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	154 400	10	[ 8,5 ; 10,6 ]	5,6
<b>Sexe</b>				
Hommes	50 200	6	[ 5,2 ; 7,7 ]	9,9
Femmes	104 100	12	[ 10,8 ; 14,1 ]	6,7
<b>Âge</b>				
12-19 ans	15 900	10*	[ 7,0 ; 14,2 ]	17,3
20-44 ans	79 500	11	[ 9,1 ; 12,4 ]	7,7
45-64 ans	45 900	10	[ 8,1 ; 12,2 ]	10,2
65 ans et plus	13 000	5*	[ 3,3 ; 7,3 ]	19,5
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	17 200	9*	[ 6,4 ; 12,8 ]	16,8
Dorval-Lachine-LaSalle	17 100	14 ●	[ 10,0 ; 19,6 ]	16,4
Sud-Ouest—Verdun	11 300	10*	[ 6,0 ; 14,3 ]	20,7
Cavendish	9 800	9*	[ 5,5 ; 14,0 ]	22,5
de la Montagne	17 000	9*	[ 6,0 ; 12,0 ]	16,9
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	8 500	8*	[ 4,4 ; 12,0 ]	24,0
Ahuntsic et Montréal-Nord	13 700	10*	[ 6,3 ; 13,6 ]	18,7
Coeur-de-l'île	9 200	9*	[ 5,5 ; 14,5 ]	23,1
Jeanne-Mance	7 600	6* ●	[ 3,4 ; 10,0 ]	25,9
St-Léonard et St-Michel	12 500	11*	[ 7,4 ; 16,5 ]	19,2
Lucille-Teasdale	13 700	9*	[ 6,1 ; 13,1 ]	18,7
Pointe-de-l'île	16 700	10*	[ 7,1 ; 14,1 ]	16,8

## Population de 45 ans et plus souffrant d'hypertension, Montréal, 2005

<b>Montréal</b>	206 200	28	[ 26,0 ; 30,8 ]	4,3
<b>Sexe</b>				
Hommes	91 300	28	[ 24,2 ; 31,2 ]	6,5
Femmes	114 900	29	[ 25,7 ; 32,3 ]	5,7
<b>Âge</b>				
45-64 ans	100 600	22	[ 19,0 ; 24,4 ]	6,4
65 ans et plus	105 700	40	[ 35,8 ; 44,4 ]	5,5
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	23 200	28	[ 21,4 ; 36,2 ]	12,8
Dorval-Lachine-LaSalle	16 900	32	[ 22,9 ; 41,1 ]	14,6
Sud-Ouest—Verdun	15 400	30	[ 21,0 ; 40,0 ]	15,5
Cavendish	13 600	28*	[ 19,2 ; 39,1 ]	16,9
de la Montagne	21 700	25	[ 18,5 ; 32,2 ]	13,5
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	11 600	23*	[ 15,3 ; 33,3 ]	18,7
Ahuntsic et Montréal-Nord	17 600	27	[ 19,4 ; 35,8 ]	14,9
Coeur-de-l'île	11 000	26*	[ 16,6 ; 36,4 ]	18,8
Jeanne-Mance	16 600	30	[ 21,5 ; 39,3 ]	15,0
St-Léonard et St-Michel	13 100	27*	[ 18,0 ; 36,7 ]	17,1
Lucille-Teasdale	21 600	32	[ 23,6 ; 39,9 ]	13,1
Pointe-de-l'île	23 900	32	[ 24,4 ; 39,9 ]	12,3

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 45 ans et plus souffrant d'emphysème, de bronchite chronique ou d'une maladie pulmonaire obstructive chronique, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	44 100	6	[ 4,9 ; 7,5 ]	10,6
<b>Sexe</b>				
Hommes	17 000	5*	[ 3,6 ; 7,2 ]	17,2
Femmes	27 000	7	[ 5,1 ; 8,9 ]	13,5
<b>Âge</b>				
45-64 ans	23 500	5	[ 3,7 ; 6,7 ]	14,7
65 ans et plus	20 600	8	[ 5,7 ; 10,6 ]	15,4

## Population de 12-17 ans présentant un surplus de poids, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	19 200	17	[ 12,7 ; 24,0 ]	15,6
<b>Sexe</b>				
Hommes	12 200	20*	[ 13,2 ; 29,2 ]	19,0
Femmes	6 900	14*	[ 7,7 ; 23,9 ]	26,7
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants	4 000	27*	[ 11,6 ; 47,8 ]	32,3
Non immigrants	15 100	16*	[ 10,8 ; 22,8 ]	18,0

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 18 ans et plus souffrant d'embonpoint, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	458 400	30 ●	[ 28,7 ; 32,1 ]	2,9
<b>Sexe</b>				
Hommes	265 100	37	[ 34,1 ; 39,2 ]	3,6
Femmes	191 200	24	[ 22,1 ; 26,6 ]	4,7
<b>Âge</b>				
18-44 ans	201 200	26	[ 23,4 ; 27,9 ]	4,5
45-64 ans	164 500	36	[ 32,3 ; 38,8 ]	4,6
65 ans et plus	92 000	35	[ 30,7 ; 39,2 ]	6,2
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	106 500	29	[ 25,2 ; 32,0 ]	6,1
Moyen	161 900	32	[ 29,2 ; 35,2 ]	4,8
Élevé	117 500	31	[ 27,3 ; 34,1 ]	5,7
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	77 700	36	[ 31,1 ; 40,6 ]	6,7
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	69 000	27	[ 23,0 ; 31,0 ]	7,6
Diplôme d'études postsecondaires	285 100	30	[ 27,6 ; 31,9 ]	3,7
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	48 900	30	[ 24,7 ; 35,3 ]	9,0
Immigrants de longue date	110 300	39	[ 35,2 ; 43,7 ]	5,4
Non immigrants	272 600	28	[ 25,8 ; 30,0 ]	3,8
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	53 400	32	[ 26,5 ; 36,8 ]	8,3
Dorval-Lachine-LaSalle	30 200	27	[ 21,0 ; 33,2 ]	11,5
Sud-Ouest—Verdun	34 900	33	[ 26,0 ; 39,3 ]	10,3
Cavendish	27 400	28	[ 21,9 ; 35,9 ]	12,1
de la Montagne	55 500	30	[ 25,0 ; 34,7 ]	8,3
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	37 500	36	[ 29,3 ; 43,0 ]	9,7
Ahuntsic et Montréal-Nord	51 000	38 ●	[ 32,2 ; 44,4 ]	8,1
Coeur-de-l'île	24 300	27	[ 20,4 ; 34,3 ]	12,7
Jeanne-Mance	25 500	22 ●	[ 16,4 ; 27,5 ]	12,9
St-Léonard et St-Michel	34 700	34	[ 26,9 ; 40,5 ]	10,3
Lucille-Teasdale	32 800	23 ●	[ 18,2 ; 28,5 ]	11,3
Pointe-de-l'île	51 300	33	[ 27,6 ; 38,6 ]	8,5

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 18 ans et plus souffrant d'obésité, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	196 800	13 ●	[ 11,8 ; 14,3 ]	4,9
<b>Sexe</b>				
Hommes	100 100	14	[ 12,0 ; 15,7 ]	6,8
Femmes	96 300	12	[ 10,5 ; 14,0 ]	7,1
<b>Âge</b>				
18-44 ans	76 500	10	[ 8,2 ; 11,3 ]	8,1
45-64 ans	74 800	16	[ 13,7 ; 18,6 ]	7,8
65 ans et plus	45 000	17	[ 13,8 ; 20,7 ]	10,0
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	53 400	14	[ 11,8 ; 17,0 ]	9,3
Moyen	62 500	13	[ 10,4 ; 14,6 ]	8,7
Élevé	44 100	12	[ 9,1 ; 13,9 ]	10,5
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	46 500	22	[ 17,5 ; 25,6 ]	9,6
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	34 900	14	[ 10,6 ; 17,1 ]	11,6
Diplôme d'études postsecondaires	102 400	11	[ 9,2 ; 12,1 ]	6,9
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	12 600	8*	[ 4,8 ; 11,3 ]	20,5
Immigrants de longue date	39 400	14	[ 11,2 ; 17,4 ]	10,8
Non immigrants	129 500	13	[ 11,7 ; 14,8 ]	6,0
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	22 400	13	[ 9,7 ; 17,5 ]	14,4
Dorval-Lachine-LaSalle	18 100	16	[ 11,5 ; 22,1 ]	15,9
Sud-Ouest—Verdun	13 800	13*	[ 8,6 ; 18,5 ]	18,7
Cavendish	9 800	10*	[ 5,9 ; 15,4 ]	23,0
de la Montagne	15 600	8* ●	[ 5,7 ; 11,8 ]	17,8
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	14 100	13*	[ 8,8 ; 19,1 ]	18,6
Ahuntsic et Montréal-Nord	15 000	11*	[ 7,5 ; 15,8 ]	18,1
Coeur-de-l'île	10 500	12*	[ 7,4 ; 17,8 ]	21,0
Jeanne-Mance	10 000	8* ●	[ 5,1 ; 13,0 ]	22,6
St-Léonard et St-Michel	22 300	22 ●	[ 16,1 ; 28,4 ]	13,8
Lucille-Teasdale	23 300	16	[ 12,1 ; 21,5 ]	14,1
Pointe-de-l'île	22 200	14	[ 10,4 ; 18,9 ]	14,6

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus ayant subi une blessure au cours d'une année, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	182 400	11	[ 10,1 ; 12,4 ]	5,2
<b>Sexe</b>				
Hommes	108 200	14	[ 12,0 ; 15,6 ]	6,6
Femmes	74 000	9	[ 7,4 ; 10,3 ]	8,2
<b>Âge</b>				
12-19 ans	29 200	19	[ 14,5 ; 23,7 ]	12,2
20-44 ans	94 900	13	[ 11,0 ; 14,6 ]	7,1
45-64 ans	38 000	8	[ 6,5 ; 10,3 ]	11,5
65 ans et plus	19 500	7	[ 5,2 ; 10,2 ]	16,5
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	45 400	11	[ 9,0 ; 13,5 ]	10,2
Moyen	58 400	11	[ 8,9 ; 12,7 ]	9,0
Élevé	54 500	14	[ 11,1 ; 15,9 ]	9,2
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	36 300	12	[ 9,2 ; 14,6 ]	11,4
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	28 500	11	[ 8,0 ; 13,5 ]	12,9
Diplôme d'études postsecondaires	109 500	11	[ 9,9 ; 12,8 ]	6,6
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	17 800	10	[ 7,0 ; 13,8 ]	16,5
Immigrants de longue date	19 300	7	[ 4,8 ; 9,2 ]	16,1
Non immigrants	135 600	13	[ 11,2 ; 14,1 ]	5,8
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	22 000	12	[ 8,8 ; 16,1 ]	14,6
Dorval-Lachine-LaSalle	14 000	12*	[ 7,9 ; 17,0 ]	18,4
Sud-Ouest—Verdun	17 100	15	[ 10,2 ; 20,1 ]	16,6
Cavendish	12 700	12*	[ 8,0 ; 17,9 ]	19,5
de la Montagne	24 400	13	[ 9,2 ; 16,4 ]	14,1
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	10 000	9*	[ 5,3 ; 13,6 ]	22,5
Ahuntsic et Montréal-Nord	14 800	10*	[ 7,0 ; 14,7 ]	18,2
Coeur-de-l'île	11 200	12*	[ 7,5 ; 17,6 ]	20,5
Jeanne-Mance	17 100	14*	[ 9,7 ; 19,2 ]	16,7
St-Léonard et St-Michel	9 700	9*	[ 5,1 ; 13,3 ]	23,2
Lucille-Teasdale	15 000	10*	[ 6,6 ; 14,0 ]	18,3
Pointe-de-l'île	14 100	8*	[ 5,5 ; 12,2 ]	19,1

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 15-49 ans ayant déjà eu un diagnostic d'infection transmise sexuellement, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	81 100	8	[ 6,8 ; 9,3 ]	8,0
<b>Sexe</b>				
Hommes	39 800	8	[ 6,1 ; 9,7 ]	11,5
Femmes	41 300	8	[ 6,6 ; 10,3 ]	11,2
<b>Âge</b>				
15-19 ans	600	1**	[ 0,0 ; 2,8 ]	99,4
20-29 ans	21 300	7	[ 5,0 ; 9,5 ]	15,6
30-49 ans	59 800	10	[ 8,2 ; 11,9 ]	9,4
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	2 900	3**	[ 0,9 ; 6,0 ]	43,8
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	9 800	6*	[ 3,4 ; 8,9 ]	22,7
Diplôme d'études postsecondaires	65 800	9	[ 7,9 ; 11,2 ]	8,7
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	3 600	2**	[ 0,8 ; 4,5 ]	40,3
Immigrants de longue date	5 900	4*	[ 2,1 ; 7,8 ]	30,8
Non immigrants	68 300	10	[ 8,6 ; 12,1 ]	8,4

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

\*\* L'estimation est très imprécise, elle est fournie à titre indicatif seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	71 300	4 ●	[ 3,7 ; 5,2 ]	8,5
<b>Sexe</b>				
Hommes	25 600	3	[ 2,4 ; 4,3 ]	14,3
Femmes	45 700	5	[ 4,3 ; 6,6 ]	10,6
<b>Âge</b>				
12-19 ans	2 600	2**	[ 0,6 ; 4,0 ]	44,3
20-44 ans	33 900	5	[ 3,5 ; 5,8 ]	12,3
45-64 ans	23 400	5	[ 3,7 ; 6,8 ]	14,7
65 ans et plus	11 300	4*	[ 2,7 ; 6,6 ]	21,9
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	20 800	7	[ 4,7 ; 8,9 ]	15,5
Couples	13 800	4*	[ 2,4 ; 5,4 ]	19,6
Couples avec enfants	19 900	4	[ 2,7 ; 5,2 ]	16,1
Monoparentales	8 500	6*	[ 3,3 ; 9,1 ]	24,3
Autres	7 800	3*	[ 1,7 ; 5,2 ]	26,3
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	28 000	7	[ 5,2 ; 9,0 ]	13,5
Moyen	13 700	3*	[ 1,6 ; 3,7 ]	19,7
Élevé	11 400	3*	[ 1,7 ; 4,2 ]	21,5
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	17 100	6*	[ 3,9 ; 7,9 ]	17,4
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	13 900	5*	[ 3,4 ; 7,4 ]	19,1
Diplôme d'études postsecondaires	33 700	4	[ 2,7 ; 4,5 ]	12,4
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	4 300	2**	[ 1,0 ; 4,8 ]	34,9
Immigrants de longue date	9 000	3*	[ 1,8 ; 5,0 ]	24,6
Non immigrants	47 500	4	[ 3,6 ; 5,4 ]	10,4

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

\*\* L'estimation est très imprécise, elle est fournie à titre indicatif seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 15 ans et plus ayant eu des idées suicidaires sérieuses au cours de sa vie, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	184 900	12	[ 10,6 ; 13,0 ]	5,2
<b>Sexe</b>				
Hommes	81 300	11	[ 9,1 ; 12,4 ]	7,8
Femmes	103 600	13	[ 11,0 ; 14,5 ]	6,9
<b>Âge</b>				
15-19 ans	9 000	9*	[ 5,1 ; 13,3 ]	23,2
20-44 ans	94 800	13	[ 11,0 ; 14,6 ]	7,1
45-64 ans	67 900	15	[ 12,4 ; 17,2 ]	8,4
65 ans et plus	11 600	4*	[ 2,7 ; 6,9 ]	22,4
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	55 100	18	[ 14,5 ; 21,0 ]	9,1
Couples	34 600	9	[ 7,3 ; 11,9 ]	12,2
Couples avec enfants	47 200	10	[ 7,7 ; 11,7 ]	10,3
Monoparentales	13 100	9*	[ 5,9 ; 13,5 ]	19,9
Autres	32 300	14	[ 10,7 ; 17,6 ]	12,3
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	48 700	13	[ 10,2 ; 15,1 ]	9,9
Moyen	68 200	13	[ 11,0 ; 15,2 ]	8,3
Élevé	45 300	11	[ 9,2 ; 13,7 ]	10,2
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	24 200	9	[ 6,9 ; 12,4 ]	14,5
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	32 000	12	[ 9,1 ; 14,9 ]	12,2
Diplôme d'études postsecondaires	121 200	13	[ 11,1 ; 14,1 ]	6,2
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	9 200	5*	[ 3,2 ; 8,6 ]	23,6
Immigrants de longue date	16 800	6*	[ 4,0 ; 8,3 ]	17,7
Non immigrants	150 800	15	[ 13,1 ; 16,3 ]	5,5
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	15 500	9* ●	[ 5,9 ; 12,5 ]	18,0
Dorval-Lachine-LaSalle	13 100	12*	[ 7,6 ; 16,9 ]	19,2
Sud-Ouest—Verdun	17 600	16	[ 11,1 ; 21,6 ]	16,2
Cavendish	7 300	7* ●	[ 3,9 ; 12,2 ]	26,7
de la Montagne	19 400	10	[ 7,1 ; 13,7 ]	16,3
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	7 500	7* ●	[ 3,7 ; 11,4 ]	26,8
Ahuntsic et Montréal-Nord	15 100	11*	[ 7,4 ; 15,6 ]	18,2
Coeur-de-l'île	14 000	15*	[ 10,1 ; 21,5 ]	18,4
Jeanne-Mance	20 400	17 ●	[ 12,5 ; 23,0 ]	15,0
St-Léonard et St-Michel	11 600	11*	[ 6,7 ; 16,0 ]	21,1
Lucille-Teasdale	22 300	15	[ 11,2 ; 20,3 ]	14,5
Pointe-de-l'île	20 800	13	[ 9,2 ; 17,4 ]	15,6

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 20 ans et plus éprouvant un stress quotidien important, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	401 700	27 ●	[ 25,7 ; 29,1 ]	3,1
<b>Sexe</b>				
Hommes	196 300	28	[ 25,4 ; 30,2 ]	4,4
Femmes	205 400	27	[ 24,7 ; 29,3 ]	4,4
<b>Âge</b>				
20-44 ans	233 100	32	[ 29,1 ; 34,0 ]	3,9
45-64 ans	140 100	30	[ 27,2 ; 33,3 ]	5,2
65 ans et plus	28 100	11	[ 8,0 ; 13,7 ]	13,1
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	80 400	26	[ 22,5 ; 29,7 ]	7,0
Couples	94 300	26	[ 22,4 ; 28,9 ]	6,5
Couples avec enfants	125 300	29	[ 25,6 ; 31,8 ]	5,5
Monoparentales	34 600	29	[ 23,4 ; 35,4 ]	10,4
Autres	62 200	29	[ 24,8 ; 33,6 ]	7,7
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	85 400	24	[ 20,7 ; 27,1 ]	6,9
Moyen	132 600	27	[ 24,1 ; 29,8 ]	5,4
Élevé	120 800	32	[ 28,9 ; 35,8 ]	5,4
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	36 000	17	[ 13,4 ; 21,0 ]	11,1
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	53 500	24	[ 19,5 ; 27,6 ]	8,7
Diplôme d'études postsecondaires	289 600	31	[ 28,4 ; 32,7 ]	3,6
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	42 200	27	[ 21,6 ; 31,6 ]	9,6
Immigrants de longue date	56 500	21	[ 17,1 ; 24,1 ]	8,7
Non immigrants	278 500	30	[ 27,4 ; 31,7 ]	3,7
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	35 200	21 ●	[ 16,7 ; 25,8 ]	10,9
Dorval-Lachine-LaSalle	28 500	27	[ 20,4 ; 32,6 ]	11,8
Sud-Ouest—Verdun	33 900	32	[ 25,9 ; 39,0 ]	10,3
Cavendish	25 300	26	[ 20,1 ; 33,6 ]	12,6
de la Montagne	46 800	26	[ 21,6 ; 31,1 ]	9,1
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	28 200	28	[ 21,8 ; 35,0 ]	11,7
Ahuntsic et Montréal-Nord	37 700	29	[ 23,3 ; 34,7 ]	10,0
Coeur-de-l'île	28 200	32	[ 25,0 ; 39,2 ]	11,3
Jeanne-Mance	35 500	32	[ 26,0 ; 38,7 ]	10,1
St-Léonard et St-Michel	26 700	27	[ 20,3 ; 33,3 ]	12,1
Lucille-Teasdale	42 900	31	[ 25,6 ; 36,9 ]	9,3
Pointe-de-l'île	32 800	22 ●	[ 17,2 ; 26,8 ]	11,2

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 20-74 ans éprouvant un stress important au travail, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	378 000	37	[ 34,8 ; 39,2 ]	3,0
<b>Sexe</b>				
Hommes	199 500	37	[ 33,7 ; 39,6 ]	4,2
Femmes	178 500	37	[ 34,3 ; 40,7 ]	4,4
<b>Âge</b>				
20-44 ans	238 400	37	[ 34,5 ; 40,0 ]	3,8
45-74 ans	134 200	38	[ 34,7 ; 42,2 ]	5,0
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	71 500	41	[ 35,5 ; 46,2 ]	6,6
Couples	91 100	40	[ 35,7 ; 45,3 ]	6,0
Couples avec enfants	125 200	34	[ 30,7 ; 37,9 ]	5,4
Monoparentales	25 500	32	[ 24,8 ; 40,0 ]	12,0
Autres	61 100	37	[ 31,8 ; 42,7 ]	7,5
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	62 800	34	[ 29,3 ; 39,7 ]	7,7
Moyen	140 600	37	[ 33,7 ; 40,9 ]	4,9
Élevé	131 100	40	[ 36,6 ; 44,4 ]	4,9
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	19 000	28	[ 19,6 ; 36,9 ]	15,3
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	44 700	29	[ 24,1 ; 34,8 ]	9,3
Diplôme d'études postsecondaires	298 600	40	[ 37,1 ; 42,2 ]	3,3
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	42 500	36	[ 29,8 ; 42,9 ]	9,2
Immigrants de longue date	50 200	29	[ 24,3 ; 34,6 ]	8,9
Non immigrants	268 000	40	[ 36,9 ; 42,3 ]	3,5
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	33 500	28 ●	[ 21,9 ; 33,8 ]	10,9
Dorval-Lachine-LaSalle	30 800	41	[ 32,4 ; 48,8 ]	10,3
Sud-Ouest—Verdun	26 900	37	[ 29,1 ; 45,5 ]	11,2
Cavendish	20 500	32	[ 23,6 ; 40,3 ]	13,4
de la Montagne	45 600	38	[ 31,8 ; 44,7 ]	8,6
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	26 900	38	[ 29,1 ; 45,9 ]	11,4
Ahuntsic et Montréal-Nord	35 000	41	[ 33,0 ; 48,2 ]	9,6
Coeur-de-l'île	25 900	41	[ 31,9 ; 49,9 ]	11,2
Jeanne-Mance	33 400	42	[ 34,2 ; 50,2 ]	9,7
St-Léonard et St-Michel	25 900	37	[ 28,3 ; 45,3 ]	11,7
Lucille-Teasdale	39 600	42	[ 34,9 ; 49,8 ]	8,9
Pointe-de-l'île	33 900	32	[ 25,7 ; 38,9 ]	10,5

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 60 ans et plus ayant reçu un vaccin antigrippal au cours de la dernière année, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	194 900	57	[ 53,4 ; 61,2 ]	3,5
<b>Sexe</b>				
Hommes	80 500	56	[ 50,0 ; 62,1 ]	5,5
Femmes	114 400	58	[ 53,1 ; 63,4 ]	4,5
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	70 400	59	[ 52,2 ; 65,0 ]	5,6
Couples	89 100	60	[ 54,0 ; 65,8 ]	5,0
Couples avec enfants	13 300	61	[ 43,5 ; 76,9 ]	13,3
Monoparentales	7 000	48*	[ 27,8 ; 68,7 ]	20,8
Autres	14 000	43	[ 30,1 ; 56,7 ]	15,7
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	57 300	54	[ 47,1 ; 61,4 ]	6,7
Moyen	58 000	58	[ 51,2 ; 65,8 ]	6,3
Élevé	30 900	60	[ 50,4 ; 70,5 ]	8,5
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	67 600	56	[ 49,0 ; 62,4 ]	6,2
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	31 700	54	[ 44,3 ; 63,0 ]	8,9
Diplôme d'études postsecondaires	80 800	61	[ 55,3 ; 67,6 ]	5,1
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	23 000	63	[ 50,2 ; 74,7 ]	9,5
Dorval-Lachine-LaSalle	12 300	51	[ 35,5 ; 66,7 ]	14,9
Sud-Ouest—Verdun	12 600	48	[ 33,2 ; 62,9 ]	15,1
Cavendish	13 600	67	[ 49,0 ; 81,4 ]	11,8
de la Montagne	29 100	74 ●	[ 62,4 ; 84,0 ]	7,0
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	14 900	63	[ 46,9 ; 77,9 ]	11,9
Ahuntsic et Montréal-Nord	17 500	55	[ 42,4 ; 68,0 ]	11,8
Coeur-de-l'île	9 500	53*	[ 34,3 ; 71,7 ]	17,1
Jeanne-Mance	14 800	62	[ 46,5 ; 76,2 ]	11,6
St-Léonard et St-Michel	11 000	43* ●	[ 28,3 ; 59,0 ]	17,3
Lucille-Teasdale	18 000	54	[ 41,7 ; 66,3 ]	11,6
Pointe-de-l'île	18 300	48	[ 36,4 ; 60,5 ]	12,7

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population féminine de 18-69 ans ayant passé un test PAP au cours des trois dernières années, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	486 400	72 ●	[ 69,7 ; 74,7 ]	1,8
<b>Âge</b>				
18-29 ans	121 900	67	[ 62,4 ; 72,5 ]	3,8
30-49 ans	220 900	80	[ 76,2 ; 83,2 ]	2,2
50-69 ans	143 300	67	[ 62,0 ; 71,3 ]	3,6
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	108 800	63	[ 57,5 ; 68,3 ]	4,4
Moyen	174 200	78	[ 73,5 ; 81,6 ]	2,6
Élevé	131 000	82	[ 77,6 ; 86,6 ]	2,7
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	46 600	60	[ 52,2 ; 68,7 ]	7,0
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	74 500	62	[ 55,9 ; 68,7 ]	5,2
Diplôme d'études postsecondaires	343 400	77	[ 74,6 ; 80,3 ]	1,9
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	45 200	58	[ 49,7 ; 66,0 ]	7,2
Immigrants de longue date	71 400	67	[ 60,1 ; 73,6 ]	5,2
Non immigrants	340 700	76	[ 73,6 ; 79,3 ]	1,9
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	63 000	85 ●	[ 78,1 ; 90,7 ]	3,6
Dorval-Lachine-LaSalle	37 300	74	[ 63,3 ; 82,3 ]	6,3
Sud-Ouest—Verdun	32 700	73	[ 61,8 ; 81,8 ]	6,7
Cavendish	31 500	73	[ 61,8 ; 82,5 ]	6,9
de la Montagne	58 100	72	[ 64,1 ; 79,2 ]	5,1
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	34 400	71	[ 60,5 ; 80,8 ]	6,9
Ahuntsic et Montréal-Nord	35 900	61 ●	[ 51,7 ; 69,8 ]	7,6
Coeur-de-l'île	26 900	69	[ 57,5 ; 79,8 ]	7,8
Jeanne-Mance	38 900	74	[ 63,9 ; 82,1 ]	6,0
St-Léonard et St-Michel	32 800	70	[ 60,1 ; 79,5 ]	7,1
Lucille-Teasdale	44 600	71	[ 61,5 ; 78,8 ]	6,0
Pointe-de-l'île	50 300	71	[ 62,7 ; 78,8 ]	5,5

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population féminine de 35 ans et plus ayant passé une mammographie au cours des deux dernières années, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	244 800	45	[ 42,4 ; 48,6 ]	3,5
<b>Âge</b>				
35-49 ans	48 500	24	[ 19,3 ; 27,8 ]	9,2
50-69 ans	147 900	70	[ 65,5 ; 74,6 ]	3,3
70 ans et plus	44 600	39	[ 32,5 ; 45,9 ]	8,7
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	55 600	40	[ 34,0 ; 46,1 ]	7,7
Moyen	79 400	49	[ 42,9 ; 54,2 ]	5,9
Élevé	52 700	44	[ 37,3 ; 50,4 ]	7,6
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	53 500	47	[ 39,7 ; 53,7 ]	7,6
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	41 000	51	[ 42,7 ; 58,6 ]	8,0
Diplôme d'études postsecondaires	131 800	43	[ 38,8 ; 46,9 ]	4,8
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	8 900	27*	[ 16,1 ; 39,7 ]	21,4
Immigrants de longue date	56 600	51	[ 44,0 ; 58,1 ]	7,0
Non immigrants	160 500	45	[ 41,3 ; 48,9 ]	4,3
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	29 200	47	[ 37,5 ; 55,6 ]	9,9
Dorval-Lachine-LaSalle	17 500	43	[ 32,0 ; 54,5 ]	13,3
Sud-Ouest—Verdun	18 600	49	[ 36,9 ; 60,3 ]	12,3
Cavendish	16 300	45	[ 33,1 ; 57,5 ]	13,7
de la Montagne	31 900	47	[ 38,1 ; 56,0 ]	9,7
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	19 500	53	[ 40,9 ; 65,4 ]	11,7
Ahuntsic et Montréal-Nord	17 900	37 ●	[ 26,8 ; 46,3 ]	13,7
Coeur-de-l'île	12 700	44	[ 30,2 ; 57,8 ]	16,0
Jeanne-Mance	15 400	40	[ 28,9 ; 51,6 ]	14,4
St-Léonard et St-Michel	18 600	51	[ 38,6 ; 62,9 ]	12,2
Lucille-Teasdale	20 300	40	[ 29,8 ; 49,4 ]	12,6
Pointe-de-l'île	27 100	51	[ 41,1 ; 60,9 ]	9,9

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus ayant un médecin de famille, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	1 094 700	68 ●	[ 65,9 ; 69,2 ]	1,3
<b>Sexe</b>				
Hommes	471 100	60	[ 57,6 ; 62,6 ]	2,1
Femmes	623 600	75	[ 72,4 ; 76,7 ]	1,5
<b>Âge</b>				
12-19 ans	96 700	62	[ 56,3 ; 67,5 ]	4,6
20-44 ans	402 300	54	[ 51,8 ; 57,0 ]	2,5
45-64 ans	357 900	77	[ 74,6 ; 80,1 ]	1,8
65 ans et plus	237 600	90	[ 87,4 ; 92,8 ]	1,5
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	259 400	64	[ 60,7 ; 67,5 ]	2,7
Moyen	357 700	66	[ 63,5 ; 69,3 ]	2,2
Élevé	277 500	69	[ 65,4 ; 72,0 ]	2,4
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	232 900	75	[ 71,8 ; 78,9 ]	2,4
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	181 900	67	[ 62,8 ; 70,9 ]	3,1
Diplôme d'études postsecondaires	619 300	64	[ 62,3 ; 66,7 ]	1,7
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	87 300	50	[ 44,6 ; 55,4 ]	5,5
Immigrants de longue date	213 000	75	[ 71,3 ; 78,7 ]	2,5
Non immigrants	725 800	68	[ 65,8 ; 69,9 ]	1,5
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	131 700	72 ●	[ 67,1 ; 76,6 ]	3,4
Dorval-Lachine-LaSalle	86 100	73 ●	[ 67,3 ; 78,9 ]	4,1
Sud-Ouest—Verdun	77 600	67	[ 60,9 ; 73,3 ]	4,7
Cavendish	73 900	70	[ 63,5 ; 76,6 ]	4,6
de la Montagne	134 700	69	[ 63,8 ; 73,3 ]	3,5
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	74 400	67	[ 60,3 ; 73,0 ]	4,9
Ahuntsic et Montréal-Nord	94 300	65	[ 59,8 ; 71,1 ]	4,4
Coeur-de-l'île	62 700	65	[ 57,9 ; 71,8 ]	5,5
Jeanne-Mance	71 900	59 ●	[ 52,8 ; 65,5 ]	5,5
St-Léonard et St-Michel	71 800	64	[ 58,0 ; 70,9 ]	5,1
Lucille-Teasdale	97 500	65	[ 59,0 ; 70,1 ]	4,4
Pointe-de-l'île	118 000	71	[ 66,1 ; 76,2 ]	3,6

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

**Population de 12 ans et plus ayant consulté un médecin de famille, un pédiatre  
ou un omnipraticien au cours de la dernière année, Montréal, 2005**

	<b>Population estimée N</b>	<b>Mesure<sup>1</sup> %</b>	<b>Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %</b>	<b>Coefficient de variation %</b>
<b>Montréal</b>	<b>1 080 500</b>	<b>67</b>	<b>[ 64,9 ; 68,3 ]</b>	<b>1,3</b>
<b>Sexe</b>				
Hommes	487 000	62	[ 59,6 ; 64,6 ]	2,0
Femmes	593 500	71	[ 68,6 ; 73,1 ]	1,6
<b>Âge</b>				
12-19 ans	85 400	55	[ 49,1 ; 60,5 ]	5,3
20-44 ans	452 100	61	[ 58,5 ; 63,7 ]	2,1
45-64 ans	331 800	72	[ 68,7 ; 74,7 ]	2,1
65 ans et plus	211 200	80	[ 76,5 ; 83,7 ]	2,2
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	217 600	69	[ 65,6 ; 73,0 ]	2,7
Couples	267 700	72	[ 69,1 ; 75,8 ]	2,3
Couples avec enfants	338 600	65	[ 61,5 ; 67,5 ]	2,4
Monoparentales	98 100	64	[ 58,4 ; 69,5 ]	4,4
Autres	148 500	61	[ 56,4 ; 65,3 ]	3,7
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	255 900	63	[ 59,9 ; 66,7 ]	2,8
Moyen	356 400	66	[ 63,3 ; 69,1 ]	2,2
Élevé	287 600	71	[ 68,1 ; 74,5 ]	2,3
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	209 300	68	[ 64,0 ; 71,6 ]	2,9
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	172 200	63	[ 59,0 ; 67,3 ]	3,4
Diplôme d'études postsecondaires	643 900	67	[ 64,9 ; 69,2 ]	1,6
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	91 800	53	[ 47,2 ; 58,0 ]	5,2
Immigrants de longue date	205 000	72	[ 68,4 ; 76,0 ]	2,7
Non immigrants	727 300	68	[ 65,9 ; 70,0 ]	1,5
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	123 700	67	[ 62,5 ; 72,4 ]	3,7
Dorval-Lachine-LaSalle	79 400	67	[ 60,9 ; 73,3 ]	4,7
Sud-Ouest—Verdun	77 900	67	[ 60,8 ; 73,4 ]	4,8
Cavendish	73 600	70	[ 63,5 ; 76,2 ]	4,7
de la Montagne	125 600	64	[ 59,0 ; 68,8 ]	3,9
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	72 700	65	[ 58,8 ; 71,7 ]	5,0
Ahuntsic et Montréal-Nord	91 700	63	[ 57,7 ; 69,2 ]	4,6
Coeur-de-l'île	68 700	71	[ 63,7 ; 77,4 ]	4,8
Jeanne-Mance	82 200	68	[ 61,6 ; 73,7 ]	4,6
St-Léonard et St-Michel	74 700	67	[ 60,8 ; 73,5 ]	4,8
Lucille-Teasdale	96 600	64	[ 58,3 ; 69,4 ]	4,5
Pointe-de-l'île	113 500	68	[ 63,3 ; 73,7 ]	2,0

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

**Population de 12 ans et plus ayant consulté un autre médecin  
ou un spécialiste au cours de la dernière année, Montréal, 2005**

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	567 300	35 ●	[ 33,3 ; 36,7 ]	2,5
<b>Sexe</b>				
Hommes	204 500	26	[ 23,8 ; 28,3 ]	4,4
Femmes	363 100	43	[ 40,9 ; 45,8 ]	2,9
<b>Âge</b>				
12-19 ans	32 000	21	[ 15,9 ; 25,1 ]	11,5
20-44 ans	245 500	33	[ 30,7 ; 35,7 ]	3,8
45-64 ans	187 400	40	[ 37,2 ; 43,7 ]	4,1
65 ans et plus	102 400	39	[ 34,6 ; 43,2 ]	5,6
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	116 000	37	[ 33,1 ; 40,8 ]	5,4
Couples	154 400	42	[ 38,1 ; 45,5 ]	4,5
Couples avec enfants	179 200	34	[ 31,2 ; 37,1 ]	4,4
Monoparentales	49 700	32	[ 27,0 ; 37,8 ]	8,5
Autres	63 500	26	[ 21,6 ; 29,6 ]	7,9
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	127 200	31	[ 28,2 ; 34,7 ]	5,3
Moyen	190 200	35	[ 32,4 ; 38,3 ]	4,2
Élevé	162 100	40	[ 36,7 ; 43,7 ]	4,4
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	89 100	29	[ 25,2 ; 32,5 ]	6,5
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	89 000	33	[ 28,6 ; 36,7 ]	6,3
Diplôme d'études postsecondaires	361 700	38	[ 35,4 ; 39,9 ]	3,0
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	57 200	33	[ 27,8 ; 37,9 ]	7,9
Immigrants de longue date	97 500	34	[ 30,3 ; 38,3 ]	6,0
Non immigrants	380 300	36	[ 33,5 ; 37,6 ]	3,0
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	74 500	41 ●	[ 35,5 ; 45,9 ]	6,5
Dorval-Lachine-LaSalle	37 900	32	[ 25,8 ; 38,1 ]	9,8
Sud-Ouest—Verdun	35 400	31	[ 24,5 ; 36,7 ]	10,2
Cavendish	39 800	38	[ 31,1 ; 44,6 ]	9,1
de la Montagne	73 200	37	[ 32,4 ; 42,3 ]	6,8
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	42 100	38	[ 31,4 ; 44,5 ]	8,8
Ahuntsic et Montréal-Nord	46 600	32	[ 26,8 ; 37,9 ]	8,8
Coeur-de-l'île	33 800	35	[ 28,1 ; 41,9 ]	10,1
Jeanne-Mance	42 100	34	[ 28,3 ; 40,7 ]	9,1
St-Léonard et St-Michel	32 900	30 ●	[ 23,4 ; 35,7 ]	10,7
Lucille-Teasdale	53 100	35	[ 29,5 ; 40,6 ]	8,1
Pointe-de-l'île	55 800	34	[ 28,3 ; 38,8 ]	8,0

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus ayant consulté un psychologue au cours de la dernière année, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	98 700	6 ●	[ 5,2 ; 6,9 ]	7,1
<b>Sexe</b>				
Hommes	37 100	5	[ 3,7 ; 5,9 ]	11,7
Femmes	61 600	7	[ 6,1 ; 8,6 ]	8,9
<b>Âge</b>				
12-19 ans	8 000	5*	[ 2,9 ; 8,3 ]	25,2
20-44 ans	53 600	7	[ 5,9 ; 8,7 ]	9,6
45-64 ans	32 000	7	[ 5,3 ; 8,8 ]	12,5
65 ans et plus	5 100	2*	[ 1,0 ; 3,7 ]	31,3
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	23 000	7	[ 5,3 ; 9,7 ]	14,7
Couples	17 800	5*	[ 3,3 ; 6,6 ]	17,0
Couples avec enfants	30 000	6	[ 4,4 ; 7,4 ]	12,9
Monoparentales	10 800	7*	[ 4,3 ; 10,5 ]	18,0
Autres	15 200	6*	[ 4,3 ; 8,9 ]	21,6
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	18 400	5	[ 3,2 ; 6,3 ]	16,5
Moyen	31 000	6	[ 4,4 ; 7,3 ]	12,8
Élevé	34 600	9	[ 6,7 ; 10,8 ]	11,9
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	8 500	3*	[ 1,6 ; 4,4 ]	24,7
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	14 300	5*	[ 3,5 ; 7,6 ]	18,7
Diplôme d'études postsecondaires	70 800	7	[ 6,2 ; 8,6 ]	8,3
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	3 200	2**	[ 0,7 ; 3,9 ]	40,5
Immigrants de longue date	9 300	3*	[ 1,9 ; 5,0 ]	23,9
Non immigrants	81 400	8	[ 6,4 ; 8,7 ]	7,8
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	13 000	7*	[ 4,7 ; 10,5 ]	19,3
Dorval-Lachine-LaSalle	6 000	5*	[ 2,5 ; 8,7 ]	29,4
Sud-Ouest—Verdun	8 300	7*	[ 4,2 ; 11,6 ]	24,1
Cavendish	7 200	7*	[ 3,9 ; 11,5 ]	25,8
de la Montagne	7 800	4* ●	[ 2,3 ; 6,6 ]	25,3
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	4 700	4*	[ 2,0 ; 7,9 ]	32,6
Ahuntsic et Montréal-Nord	7 100	5*	[ 2,5 ; 8,1 ]	27,1
Coeur-de-l'île	7 300	8*	[ 4,2 ; 12,5 ]	25,7
Jeanne-Mance	13 800	11* ●	[ 7,6 ; 16,2 ]	18,5
St-Léonard et St-Michel	3 000	3** ●	[ 1,1 ; 6,1 ]	40,2
Lucille-Teasdale	10 700	7*	[ 4,3 ; 10,6 ]	21,6
Pointe-de-l'île	9 900	6*	[ 3,7 ; 9,3 ]	22,2

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

\*\* L'estimation est très imprécise, elle est fournie à titre indicatif seulement.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus ayant consulté un intervenant en médecine douce au cours de la dernière année, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	216 100	13 ●	[ 12,1 ; 14,5 ]	4,6
<b>Sexe</b>				
Hommes	75 600	10	[ 8,1 ; 11,2 ]	7,9
Femmes	140 500	17	[ 14,9 ; 18,6 ]	5,6
<b>Âge</b>				
12-19 ans	8 200	5*	[ 2,9 ; 8,3 ]	25,2
20-44 ans	121 200	16	[ 14,5 ; 18,3 ]	6,0
45-64 ans	73 500	16	[ 13,5 ; 18,3 ]	7,8
65 ans et plus	13 100	5*	[ 3,3 ; 7,3 ]	19,5
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	45 500	15	[ 11,8 ; 17,6 ]	10,0
Couples	50 900	14	[ 11,2 ; 16,3 ]	9,5
Couples avec enfants	69 000	13	[ 11,0 ; 15,3 ]	8,2
Monoparentales	17 900	12	[ 8,3 ; 16,0 ]	16,1
Autres	30 100	12	[ 9,5 ; 15,7 ]	12,4
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	26 900	7	[ 5,0 ; 8,7 ]	13,5
Moyen	77 500	14	[ 12,2 ; 16,5 ]	7,7
Élevé	88 100	22	[ 18,9 ; 24,7 ]	6,9
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	15 100	5*	[ 3,4 ; 7,1 ]	18,1
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	22 000	8	[ 5,9 ; 10,9 ]	14,8
Diplôme d'études postsecondaires	172 900	18	[ 16,3 ; 19,8 ]	5,0
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	14 900	9*	[ 5,7 ; 12,1 ]	18,1
Immigrants de longue date	27 800	10	[ 7,3 ; 12,5 ]	13,2
Non immigrants	167 100	16	[ 14,0 ; 17,2 ]	5,2
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	26 600	14	[ 10,9 ; 18,6 ]	13,1
Dorval-Lachine-LaSalle	11 500	10* ●	[ 6,3 ; 14,6 ]	20,2
Sud-Ouest—Verdun	16 800	15	[ 10,2 ; 20,0 ]	16,3
Cavendish	10 700	10*	[ 6,3 ; 15,2 ]	21,2
de la Montagne	25 700	13	[ 9,7 ; 16,9 ]	13,5
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	13 400	12*	[ 7,9 ; 17,1 ]	18,8
Ahuntsic et Montréal-Nord	16 600	11*	[ 7,9 ; 15,8 ]	16,9
Coeur-de-l'île	18 300	19 ●	[ 13,7 ; 25,6 ]	15,2
Jeanne-Mance	26 500	22 ●	[ 16,4 ; 27,1 ]	12,5
St-Léonard et St-Michel	10 200	9* ●	[ 5,5 ; 13,8 ]	21,9
Lucille-Teasdale	21 100	14	[ 10,2 ; 18,6 ]	14,7
Pointe-de-l'île	19 000	12	[ 8,2 ; 15,6 ]	15,7

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.

## Population de 12 ans et plus ayant des besoins de santé non satisfaits, au cours de la dernière année, Montréal, 2005

	Population estimée N	Mesure <sup>1</sup> %	Intervalle de confiance (au seuil de 95 %) %	Coefficient de variation %
<b>Montréal</b>	216 700	13 ●	[ 12,2 ; 14,6 ]	4,6
<b>Sexe</b>				
Hommes	90 300	11	[ 9,9 ; 13,1 ]	7,2
Femmes	126 400	15	[ 13,4 ; 16,9 ]	6,0
<b>Âge</b>				
12-19 ans	14 000	9*	[ 5,9 ; 12,7 ]	18,7
20-44 ans	122 200	17	[ 14,6 ; 18,5 ]	6,0
45-64 ans	58 700	13	[ 10,5 ; 14,9 ]	8,9
65 ans et plus	21 900	8	[ 6,0 ; 11,1 ]	15,0
<b>Modalité de vie</b>				
Personnes seules	40 300	13	[ 10,2 ; 15,8 ]	10,7
Couples	46 600	13	[ 10,1 ; 15,1 ]	10,0
Couples avec enfants	75 200	14	[ 12,2 ; 16,5 ]	7,8
Monoparentales	20 000	13	[ 9,5 ; 17,6 ]	15,1
Autres	31 500	13	[ 9,9 ; 16,2 ]	12,2
<b>Niveau de revenu</b>				
Faible	46 100	11	[ 9,1 ; 13,6 ]	10,1
Moyen	77 800	14	[ 12,3 ; 16,6 ]	7,6
Élevé	58 100	14	[ 11,9 ; 16,9 ]	8,8
<b>Niveau de scolarité</b>				
Primaire ou secondaire non complété	20 500	7	[ 4,8 ; 9,0 ]	15,5
Diplôme secondaire ou postsecondaire non complété	36 900	14	[ 10,8 ; 16,9 ]	11,1
Diplôme d'études postsecondaires	149 800	16	[ 13,9 ; 17,3 ]	5,5
<b>Statut d'immigration</b>				
Immigrants récents	27 300	16	[ 11,8 ; 19,9 ]	12,9
Immigrants de longue date	35 500	13	[ 9,8 ; 15,6 ]	11,4
Non immigrants	140 200	13	[ 11,6 ; 14,6 ]	5,7
<b>Territoire de CSSS</b>				
Ouest-de-l'île	24 800	14	[ 10,2 ; 17,7 ]	13,6
Dorval-Lachine-LaSalle	10 800	9* ●	[ 5,6 ; 13,6 ]	21,3
Sud-Ouest—Verdun	17 700	15	[ 10,6 ; 20,5 ]	16,0
Cavendish	13 800	13*	[ 8,7 ; 18,6 ]	18,3
de la Montagne	32 300	16	[ 12,8 ; 20,6 ]	11,7
Bordeaux-Cartierville—St-Laurent	12 700	11*	[ 7,5 ; 16,5 ]	19,2
Ahuntsic et Montréal-Nord	18 400	13	[ 9,1 ; 17,4 ]	15,8
Coeur-de-l'île	16 500	17	[ 11,9 ; 23,3 ]	16,4
Jeanne-Mance	14 000	11*	[ 7,6 ; 16,2 ]	18,5
St-Léonard et St-Michel	15 600	14*	[ 9,4 ; 19,2 ]	17,2
Lucille-Teasdale	19 500	13	[ 9,3 ; 17,4 ]	15,3
Pointe-de-l'île	20 600	12	[ 9,0 ; 16,6 ]	15,0

1. Pour consulter la légende, voir la page 10.

\* L'estimation est jugée légèrement imprécise, la donnée doit être utilisée avec prudence.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005.





# BON DE COMMANDE

QUANTITÉ	TITRE DE LA PUBLICATION (version imprimée)	PRIX UNITAIRE (tous frais inclus)	TOTAL
	<i>La santé des Montréalais selon l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – recueil statistique</i>	<b>20 \$</b>	
	NUMÉRO D'ISBN (version imprimée) <b>978-2-89494-642-8</b>		

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

No Rue App.

Ville Province Code postal

Téléphone \_\_\_\_\_ Télécopieur \_\_\_\_\_

**Les commandes sont payables à l'avance par chèque ou mandat-poste à l'ordre de la Direction de santé publique de Montréal.**

**Retourner à l'adresse suivante :**

Centre de documentation  
Direction de santé publique  
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal  
1301, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec) H2L 1M3

**Pour information : 514-528-2400, poste 3646**


DIRECTION DE  
SANTÉ PUBLIQUE

Votre partenaire  
pour garder notre  
monde en santé

1301, rue Sherbrooke Est  
Montréal (Québec) H2L 1M3  
Téléphone : 514-528-2400  
www.santepub-mtl.qc.ca







Préparé à partir des données de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de Statistique Canada menée en 2005, ce recueil statistique présente tour à tour des données concernant plus d'une trentaine d'indicateurs, permettant d'accroître nos connaissances sur la santé des Montréalais. Le recueil contient des résultats par territoire de Centre de santé et de services sociaux. Graphiques, cartes et tableaux servent à illustrer l'ampleur de certaines habitudes de vie adoptées par la population ainsi que la prévalence de plusieurs problèmes de santé qui affectent les Montréalais et les Montréalaises.