

Grippe A H1N1

BULLETIN HEBDOMADAIRE DE LA SURVEILLANCE DE L'ACTIVITÉ GRIPPALE CHEZ LES JEUNES DE 0 À 17 ANS À MONTRÉAL

DONNÉES DU 30 AOÛT AU 31 OCTOBRE 2009

SOMMAIRE

MOT DU DIRECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE ...	1
FAITS SAILLANTS	1
RECOMMANDATIONS DE SANTÉ PUBLIQUE	2
COURBES ET TABLEAUX	
FIGURE 1 Courbe épidémiologique des cas de H1N1 confirmés en laboratoire	3
FIGURE 2 Répartition selon l'âge des cas de H1N1 confirmés en laboratoire	3
FIGURE 3 Zones d'activité grippale par CLSC	
Du 25 au 31 octobre	4
Du 30 août au 31 octobre	4

Qu'est-ce qu'un syndrome d'allure grippale (SAG)?

- Fièvre (38 °C ou plus) accompagnée d'une toux persistante.
- Être infecté par un SAG ne veut pas nécessairement dire que nous sommes atteints de la grippe A (H1N1).

MOT DU DIRECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE

Surveiller l'état de santé de la population montréalaise, promouvoir et protéger sa santé et l'en informer, tel est mon mandat de directeur de santé publique à Montréal.

Comme vous le savez certainement, la première vague de grippe A (H1N1) a touché nombre d'enfants et d'adolescents en parfaite santé, des populations normalement moins à risque de contracter la grippe saisonnière.

En tant que partenaires régionaux concernés par l'état de santé des jeunes montréalais, vous êtes des alliés de premier plan de la santé publique dans la lutte à la propagation du virus A (H1N1).

C'est avec cet objectif en tête que nous vous acheminons aujourd'hui, le premier d'une série de bulletins hebdomadaires sur la surveillance de l'activité grippale chez les jeunes de 0 à 17 ans à Montréal. Nous souhaitons que les données qu'il contient vous permettent de suivre facilement l'évolution de la situation épidémiologique chez les jeunes de votre secteur et d'ajuster, au besoin, vos interventions quotidiennes de prévention par l'application ou le renforcement des mesures recommandées de santé publique.

À cet égard, nous invitons toutes les directions d'écoles à continuer de nous signaler la première éclosion d'infections respiratoires d'allure grippale dans leurs établissements en remplissant la **fiche de signalement**. Ces précieuses informations nous aident à moduler nos interventions de santé publique selon l'évolution de la situation.

Merci de nous aider à *Garder notre monde en santé* !

Richard Lessard, M.D.



FAITS SAILLANTS DE LA SEMAINE À MONTRÉAL

- 35 éclosions de syndrome d'allure grippale (SAG) dans les écoles primaires et secondaires depuis le début de l'année scolaire.
- 28 nouvelles éclosions entre le 25 et le 31 octobre 2009 dont 26 dans des écoles primaires et 2 dans des écoles secondaires.
- Intensité d'activité grippale élevée partout sur l'île.
- 70 cas de H1N1 chez les moins de 18 ans depuis le 30 août 2009, dont près de la moitié sont chez des enfants de moins de 5 ans.
- 51 nouveaux cas de H1N1 entre le 25 et le 31 octobre 2009 chez les moins de 18 ans, ce qui correspond au quart de tous les nouveaux cas de H1N1 à Montréal.
- Le tiers de toutes les hospitalisations pour H1N1 depuis le 30 août 2009 sont chez les moins de 5 ans.
- En revanche, très peu de jeunes d'âge scolaire sont hospitalisés pour le H1N1.
- Aucun décès parmi les cas confirmés de H1N1 chez les moins de 18 ans.

RECOMMANDATIONS DE SANTÉ PUBLIQUE

NOUVEAUTÉ

La vaccination est débutée !

Il n'y aura pas de vaccination dans les écoles et les services de garde. Au Québec, la vaccination contre la grippe A (H1N1) sera réalisée sous la responsabilité des centres de santé et de services sociaux (CSSS).



À Montréal seulement

À partir du 5 novembre 2009

- Enfants de 6 mois à 5 ans
- Parents, frères et sœurs de nourrissons de moins de 6 mois
- Femmes enceintes ayant 20 semaines et plus de grossesse (vaccin avec adjuvant)
- Femmes enceintes atteintes d'une maladie chronique (vaccin avec adjuvant)

À partir du 9 novembre 2009

- Femmes enceintes ayant moins de 20 semaines de grossesse

À partir du 16 novembre 2009

- Personnes de 18 ans et moins atteintes d'une maladie chronique (diabétiques, asthmatiques, bronchitiques, insuffisants cardiaques, etc.)

À partir du 23 novembre 2009

- Personnes de 18 à 65 ans atteintes d'une maladie chronique (diabétiques, asthmatiques, bronchitiques, insuffisants cardiaques, etc.)

À partir du 7 décembre 2009

- Jeunes de 5 à 18 ans
- Adultes de 19 à 65 ans
- Personnes âgées de plus de 65 ans

À chacun son tour !

Le calendrier de vaccination a été établi en tenant compte des clientèles les plus vulnérables. **Des ajustements sont possibles en fonction de la disponibilité des vaccins. Les autorités de santé publique de la région de Montréal appellent les citoyens au civisme en leur demandant de respecter la séquence de vaccination.** D'ici Noël, toutes les personnes qui le souhaitent pourront être vaccinées.

Pour connaître les lieux de vaccination sur l'Île de Montréal, **cliquez ici**.

RAPPELS

Signalement d'écllosion dans les établissements scolaires

- Pour permettre à la santé publique d'informer régulièrement ses partenaires sur la situation montréalaise dans le contexte de la grippe A (H1N1), chaque établissement d'enseignement doit signaler la première écllosion d'infections respiratoires d'allure grippale en remplissant la **fiche de signalement**.

Moyens de protection contre la grippe

- Se faire vacciner.
- Pratiquer le lavage des mains et l'hygiène respiratoire.
- Pour plus d'information, consultez le **guide auto-soins** du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Mesures préventives additionnelles en milieu scolaire

- Les élèves, les étudiants et le personnel ayant des symptômes de fièvre et toux ne doivent pas se présenter à l'école, et ce, jusqu'à la fin des symptômes.
- Les élèves, les étudiants et le personnel qui se présentent à l'école avec des symptômes de fièvre et toux doivent être retournés à la maison.
- Les élèves, les étudiants et le personnel présentant un risque élevé de complications par la grippe doivent consulter rapidement un médecin s'ils présentent des symptômes d'allure grippale en vue d'un traitement antiviral précoce.



Retour en classe

- Il est recommandé de ne **PAS** exiger un certificat médical pour justifier une absence ou un retour en classe après une grippe, car cela engorgerait inutilement les services médicaux.
- De la même façon, il n'est **PAS** recommandé à une école d'exiger qu'un élève obtienne un test de laboratoire pour confirmer ou exclure le diagnostic de grippe A (H1N1).


MÉTHODOLOGIE

La date du 30 août 2009 est utilisée comme point de référence universel de surveillance par les autorités de santé publique.

FIGURE 1

COURBE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES CAS DE H1N1 CONFIRMÉS EN LABORATOIRE CHEZ LES JEUNES (0-4 ANS ET 5-17 ANS) ET DANS LA POPULATION GÉNÉRALE À MONTRÉAL, DU 30 AOÛT AU 31 OCTOBRE 2009

Courbe épidémique des cas de H1N1 selon la date de prélèvement, résidents de l'île de Montréal, 2e vague (du 30 août 2009 au 31 octobre 2009)




Note: Les cas sont représentés selon la date de prélèvement. Certains cas signalés peuvent ne pas apparaître sur la courbe en raison de l'absence de la date de prélèvement.

FIGURE 2

RÉPARTITION SELON L'ÂGE DES CAS DE H1N1 CONFIRMÉS EN LABORATOIRE, A) DU 22 AVRIL AU 29 AOÛT ET B) DU 30 AOÛT AU 31 OCTOBRE

Cas déclarés 1ère vague (jusqu'au 29 août 2009)



Cas déclarés 2e vague (du 30 août au 31 octobre 2009)




FIGURE 3

ZONES D'ACTIVITÉ GRIPPALE PAR CLSC GRADÉES 1 À 4 SELON LA PRÉSENCE DE CAS CONFIRMÉ ET D'ÉCLOSION DANS UNE ÉCOLE, A) DU 25 AU 31 OCTOBRE ET B) DU 30 AOÛT AU 31 OCTOBRE

Figure 3b. Classification des zones d'activité grippale / H1N1, selon le nombre de cas de H1N1 et éclosions * de syndromes d'allure grippal (SAG) dans les écoles

CLSC de Montréal, du 25 au 31 octobre 2009

Zones d'activité grippale / H1N1

- intensité 1 (plus faible)
- intensité 2
- intensité 3
- intensité 4 (plus élevée)

Limites des territoires

- CSSS
- CLSC

* Écllosion: 10% et plus d'élèves avec SAG au cours d'une même journée, dans une même classe ou un même niveau




Figure 3b. Classification des zones d'activité grippale / H1N1, selon le nombre de cas de H1N1 et éclosions * de syndromes d'allure grippal (SAG) dans les écoles

CLSC de Montréal, du 30 août au 31 octobre 2009

Zones d'activité grippale / H1N1

- intensité 1 (plus faible)
- intensité 2
- intensité 3
- intensité 4 (plus élevée)

Limites des territoires

- CSSS
- CLSC

* Écllosion: 10% et plus d'élèves avec SAG au cours d'une même journée, dans une même classe ou un même niveau

